



ANDREAE VESALII  
BRUXELLENSIS, INVI-  
ctissimi CAROLI V. Imperatoris  
medici, de Humani corporis  
fabrica Libri septem.

*Andreas Vesalius*

CVM CAESAREAE  
Majest. Galliarum Regis, ac Senatus Vene-  
tiae esset, in diplomato eorundem continetur.

BASILEAE, PER IOANNEM OPORINUM.



# AD DIVVM CAROLVM QVINTVM, MAXIMVM, INVICTISSIMVM

QVE IMPERATOREM, ANDREAE VESALII IN SVOS

de Humani corporis fabrica libros, Præfatio.



T C V N Q V E uaria in artibus scientijsq; tractandis grauiter obſtent, quo minus accuratè perdiscantur, minusq; foeliciter in uſum ſuccedant, Carole clemētiffime Cæſar, tamen haud mediocre diſpendiū quoque adferre arbitror, nimium diductam diſciplinarum, quæ uni cuiſpiam arti abſoluendæ famulantur, diuiſionem: & multo adhuc magis eius artis exercitiorum adeo moroſam ad diuerſos artifices diſtributionem, ut qui artis ſcopum ſibi præfixerunt, unam eius partem ita complexentur, ut cę

teris, quæ ipſum maximopere ſpectant, & ab illo ſeiungi nequeunt, relictis, nihil unquam egregium præſtent, ac propoſitum finem nunquam attingentes, à uera artis conſtitutione perpetuò declinent. Nam, ut cæteras quidem ſilentio præteream, & de ea quæ ſanitati hominum præficitur, aliquantiſper ſermonem inſtituam, proſectò in hac, reliquarum omnium quas hominis ingenium adinuenit, longè commodiſſima, & in primis neceſſaria, perdifficiliq; ac operoſa, nihil peſtilentius irrepere potuiſſet, quàm quòd aliquando, & præcipuè poſt Gotthorum illuuiem, Manſoremq; Bocharæ in Perſia regem (ſub quo Arabes nobis adhuc cum Græcis meritò familiares uigebant) medicina eoſque lacerari cœperit, quòd primarium eius inſtrumētum, manus operam in curando adhibens, ita neglectum ſit, ut ad plebeios, ac diſciplinis medicæ arti ſubſeruientibus ne uiquam inſtructos, id quaſi uideatur eſſe demandatum. Quamuis enim tres medicorum ſectæ olim extiterint, Logica uidelicet, Empirica, & Methodica, nihilominus tamen illarum auctores, uniuerſæ artis ſcopum, ad conſeruandam ſanitatem, morboſq; profligandos direxerunt. deinde huc omnia, quæ ſinguli in ſuis ſectis arti neceſſaria exiſtimabant, referentes, triplici auxiliorum inſtrumento utebantur: quorum primum, uictus fuit ratio: ſecundum, omnis medicaminum uſus: tertium, manus opera, quæ uel præcæteris medicinam eſſe deficientium additionem, & ſuperfluorum ablationem, eleganter oſtendit, ac nunquam non ſui uſum in affectuum curatione præbet, quoties in re medica obimus, quorum beneficio hanc generi humano ſaluberrimam eſſe, tempora uſuſq; docuerunt. Triplex hæc medendi ratio, cuiuſcunque ſectæ medicis æquè erat familiaris: ipſiq; proprias manus pro affectuum natura curationi accommodantes, non minorem induſtriam in illis exercendis impenderunt, quàm inſtituendæ uictus rationi, aut medicamentiſ dignoſcendis, ac componendis. quemadmodum præter cæteros diuini Hippocratiſ libros, ij liquidò arguunt, quos de Medici munere, de Oſium fracturis, Articulorum luxationib. eiusq; generis malis, omniū abſolutiſſimè conſcripſit. **Q**uin & Galenus, poſt Hippocratem medicinæ princeps, præterquam quòd Pergamenſium gladiatorum curationem ſibi ſoli cōmiſſam ſubinde gloriatur, neq; ingraueſcente iam ætate, ſimias ab ipſo ſecandas, famulorum opera exoriri uoluit, crebrò inculcat, quantum manus artificio oblectatus ſit, quamq; ſtudioſe



diose id cum cæteris Asiæ medicis exercuerit. Imò ueterum nullus non æquè  
 attentè curationem quæ manu fit, atque eam quæ uictu ac medicamentis per-  
 ficitur, posteris tradidisse uidetur. Verùm maximè post Gotthorum uastatio-  
 nem, quando omnes scientiæ, antea pulcherrimè florentes, utq; decebat exer-  
 citæ, pessum iuere, lautiores medici primùm in Italia, ad ueterū Romanorum  
 imitationem, manus operam fastidientes, quæ in ægris manu facienda duce-  
 rent, seruis præscribere, ac illis tantùm architectorum modo astare, cœperunt.  
 Mox quum sensum ceteri quoq; ueram medicinam exercitantium incommo-  
 da detrectarent, quæstui honoriq; nihil interim subducentes, à prisca medicis  
 promptè degenerarunt, coquendi modum, omnemq; ad eò uictus præpara-  
 tionem ægrorum custodibus, medicaminum compositionem pharmacopo-  
 lis, manuum uerò munus tonsoribus relinquentes. Atque ita temporis succes-  
 su, curandi ratio tam miserè diuulsa est, ut medici quidem, se phylicorum no-  
 mine uenditantes, medicamentorum & uictus ad reconditos affectus præscri-  
 ptionem sibi duntaxat arrogauerint: reliquam autem medicinā, ijs quos Chi-  
 rurgos nominant, uixq; famulorū loco habent, relegarint, turpiter à se, quod  
 præcipuum & antiquissimum est medicinæ membrum, quodq; naturæ spe-  
 culationi (si modò quod aliud) præcipuè innititur, depellētes: id quod tamen  
 hodie apud Indos maximè reges exercent, Persæ hæreditario iure suis liberis,  
 perinde ac quondam tota Asclepiadum ars, tradunt, Thraces cum plerisque  
 nationibus summe colunt, ac uenerantur. ea artis parte propemodum negle-  
 cta, quam olim multi, tanquam eludendis interimendisq; hominibus excogi-  
 tata, è Republica proscripserunt: ut quæ citra naturæ opem nihil penitus ac-  
 commodet, imò & illam alioquin in morbo à se explicando satagentem, iuuare  
 studens, frequenter totam pessundet, & ab officio prorsus abstrahat. Vnde  
 etiam illi potissimum debemus, quod tot conuicijs in medicos iaci solitis, hæc  
 sacratissima ars eluditur: quum tamen ipsius pars, quam liberalibus disciplinis  
 instituti, à se turpiter diuelli sinunt, præcipua laude illam perpetuò illustret.  
 Quando enim ingeniorum fons Homerus medicum uirum multis præstan-  
 tiorem esse affirmat, & cum uniuersis Græciæ poetis Podalirium & Machao-  
 nem celebrat, hi diui Aesculapij filij non ideo prædicantur, quod febriculam,  
 & quæ sola Natura, absque medici auxilio leuius, quàm illo adhibito, plerunq;  
 sanat, remouerent, hominum uel palato in reconditis deploratisque affectibus  
 subseruirent: sed quia luxationum, fracturarum, contusionum, uulnerum, &  
 reliquarum continuitatis solutionum, sanguinisque fluxus curationi potissi-  
 mum præessent, ac spiculis, telis, atque alijs eiusmodi malis (quæ bella in pri-  
 mis inferunt, diligentemque medici operā semper expetunt) generosissimos  
 Agamemnonis milites liberarent. Verùm haudquaquam unum medicinæ  
 instrumentum alijs præferre proposui, quum triplex dicta auxiliorum ratio  
 minimè disiungi distrahique possit, & tota ad unum artificem atineat: atque ad  
 hanc ut debitè exequatur, omnes medicinæ partes ex æquo ita constitutæ pa-  
 ratæq; sint, ut singula eo felicius in usum referantur, quo quis cumulatius om-  
 nia inuicem iungat. Quamuis etiam rarus omnino morbus occurrit, qui non  
 statim triplex præsidiorum instrumentum requiratur: itaq; opportuna uictus ra-  
 tio instituenda, & medicamentis, ac demum manu aliquid molindū sit. ad eò  
 ut huius artis tyrones modis omnibus hortandi ueniant, ut illorum (si Dijs pla-  
 cet) physicorum susurros uilipendētes, Græcorum more, ac quemadmodum  
 artis natura & ratio penitus præcipit, manus quoque curationi ad moueant, ne  
 laceram deinceps medicinam, in communis hominum uitæ perniciem con-  
 uertant.



uertant. Atque hoc eo instigandi sunt diligentius, quo in arte integrius hodie eruditos, à manus opera, tanquam à peste, ideo praesertim abstinere cernimus, ne à medicorum Rabinis apud indoctam plebem pro tonforibus traducatur, ipsiq; postmodum neque par cum istis uix dimidiatò medicis quaestus, neque honor, neque apud imperitum uulgus & principes quoq; aestimatio accedat. Hæc etenim detestabilis multorū opinio in primis remoratur, quo minus totum curandi artificium, uel hoc etiam seculo assumamus, & interiorum affectuum curationem duntaxat nobis asciscentes, magna mortalium noxa (ut semel uereq; dicā) modica solum ex parte, medici esse studeamus. quippe quum primum ad pharmacopolas uniuersa medicamentorum compositio relegatur, mox etiam medici impenſe ipsis necessariam simplicium medicaminum cognitionem amiserunt: atque ut tot barbaris uocibus, & falsis etiam pharmacis officinae scaterent, totq; elegantissimæ ueterum compositiones nobis pariter deessent, ac adhuc complures etiam lateant, autōres fuere; & inexhaustum denique laborē pararunt cū ætatis nostræ, tum qui ante annos aliquot hanc præcessere eruditissimis uiris, indefesso studio simplicium medicamentorum cognitioni sic incumbentibus, ut illam pristino nitore restituere conati, plurimum cōtulisse uideantur. Cæterum peruersissima hæc curationis instrumentorum ad uarios artifices diductio, adhuc multo execrabilius naufragium, ac longè atrociorē cladem præcipuæ naturalis philosophiæ parti intulit: cui, quum hominis historiam complectatur, firmissimumq; totius medicæ artis fundamentum, ac constitutionis initium iure habenda sit, Hippocrates & Plato tantū tribuerunt, ut illi inter medicinæ partes primas esse adscribendas non dubitarint. Hæc namque cum prius à medicis unice excoleretur, ipsiq; in hac adipiscēda omnes nervos intenderent, tum demū miserè collabi cœpit, quum ipsi manuum minus ad alios reiicientes, Anatomicen perdidērunt. Dum enim medici solum interiorum affectuum curationē ad se pertinere autumabant, uiscerum duntaxat cognitionē sibi abundē sufficere arbitrati, osium, musculorum, neruorum, uenarum, arteriarum quæ ossa musculosq; perreptant, fabricam, ueluti ad ipsos non spectantem, neglexerunt. Ad hæc, quum uniuersa administratio tonforibus committebatur, non solum uera uiscerum cognitio medicis periit, uerū etiam dissectiō industria prorsus intercidit: eo quòd scilicet hi refectionem non aggredierentur, illi uerò, quibus manus artificii delegabatur, indoctiores essent, quàm ut dissectiōnis professorum scripta intelligerent: tantum abest, ut difficillimam artem, manu ipsis traditam, id hominum genus nobis asseruaret, utq; hæc deploranda curatiuæ partis dispersio, detestabilem ritū in Gymnasijs non inueheret, quo alij humani corporis sectionem administrare, alij partium historiam enarrare consueuerunt. his quidem græculorum modo, quæ nunquam aggressi sunt, sed tantum ex aliorum libris memoriæ commendant, descripta uel ob oculos ponunt, altè in cathedra egregio fastu occinentibus: illis autem adeò linguarum imperitis, ut dissecta spectatoribus explicare nequeant, atque ex phyci præscripto ostendenda lacerent, qui manu sectioni nunquam adhibita, tantum ex commentario nautam non sine supercilio agit. Atque ut sic omnia perperam docentur, ac ridiculis quaestionibus dies aliquot abeunt: ita quoq; spectatoribus in illo tumultu pauciora proponuntur, quàm lanus in macello medicum docere posset. ut eas præteream scholas, ubi de humani corporis compage refecāda uix unquam cogitatur: usque adeò uetus medicina à pristino decore ante plures annos desciiuit. Porro quum illa iam pridem in tanta huius seculi (quod tuo numine prudenter mo-



derari uolunt superi) felicitate cum omnibus studiis ita reuiuiscere, atq; à profundissimis tenebris caput suum erigere cœpisset, ut ueterem candorem citra controuersiam in nonnullis Academijs propemodum recuperasse uideretur, nihilq; illa impensius adhuc desideraret, ac prorsus emortuam humani corporis partium scientiam, ipse tot præstantiũ uirorum exemplo prouocatus, huic pro mea uirili, ac ijs quibus possem rationibus opem ferendam duxi. & ne, omnibus aliquid communium studiorum gratia tanto successũ attentantibus, solus torpescerem, aut etiã à meis progenitoribus, non obscuris sanè medicis, degenerarem, hoc naturalis philosophiæ membrũ ita ab inferis reuocandum putauĩ, ut si non absolutius apud nos, quàm aliàs unquã, apud priſcos dissectionum doctores uersaretur: eò tamen pertingeret, ut aliquando haud puderet asserere, nostram dissectionis rationem cum antiqua illa conferri posse: hacq; tempestate nihil simul ita collapsum, moxq; integritati restitutum, ac Anatomicen fuisse. Verũ id studium neutiquam successisset, si, quum Parisijs medicinæ operam darem, huic negotio manus non admoisssem ipse, ac obiter mihi & consodalibus à quibusdam tonsoribus in una atque altera publica sectione uisceribus aliquot superficiei tenus ostensis, acquieuissem. adeò enim perfunttoriè illic, ubi primum medicinam prosperè renasci uidimus, Anatome tunc tractabatur, ut ipse in brutorũ aliquot sectionibus meo Marte exercitatus, tertiam, cui unquam mihi adesse contigit, sectionem (quæ circa uiscera solum potissimumq; ut illic moris fuit, uersabatur) solito absolutius, & commilitonum & præceptorũ hortatu adductus, publicè administrare. Quum autem secundo illam aggredider, musculos manus cum accuratiori uiscerũ dissectione conatus sum ostendere. præter octo enim abdominis musculos turpiter, peruersoq; ordine laceratos, nullũ unquam musculum, ut neq; etiã os aliquod, multoq; minus adhuc neruorũ, uenarum, & arteriarũ seriem, quisquã mihi (quod uerè dixerim) cõmonstrauit. Mox Louanij, quò ob belli tumultus mihi redeundum fuerat, quòd illic decẽ & octo annis de Anatome ne fomniauerat quidem medici, utq; de eius Academiæ studiosis benemereret, ac ipse in re prorsus abdita, & mihi ad uniuersam medicinã apprimè necessaria, peritior redderet, accuratius paulo quàm Parisijs, humanã fabricam ita inter rescandũ enarraui, ut iuniores eius Academiæ professores nunc magnũ, atq; adeò serium in hominis partibus dignoscendis studiũ impendere uideantur, probè intelligentes, quàm egregiam philosophandi supellectilẽ earum notitia ipsis suppeditet. Porro Patauij in clarissimo totius orbis gymnasio, quia ad medicinæ chirurgicæ professionẽ mihi iam annis quinq; ab illustrissimo, & erga doctinarũ studia longè liberalissimo Senatu Veneto concreditã, Anatomices tractatio pertinet, eam in hominis constructione inquirenda nauauĩ operã, ut modò sæpius hanc ita administruerim, ridiculoq; scholarũ more expulso, sic docuerim, ut in ipsa nihil quod à ueteribus proditũ ad nos peruenit, desiderare possimus. At medicorum segnities nimĩ cavit, ne Eudemi, Herophili, Marini, Andreae, Lycii, ac aliorũ dissectionis procerũ scripta nobis reseruaretur, quum ne fragmen tum quidẽ alicuius paginæ superſit tot illustriũ autorum, quos uel Galenus secundo cõmentario in Hippocratis librũ de Natura humana, plures uiginti cõmemorat: imò & ipsius Anatomicorũ librorum uix dimidia pars ab interitu est uindicata. Qui uerò Galenũ sunt secuti, in quorũ classẽ Oribasium, Theophilum, Arabes, & nostros quotquot legere hætenus mihi contigit, recensco (illorũ bona scripserim uenia) omnes, si modò quid lectu dignũ tradiderunt, ex ipso id sunt mutuati. & per Iouem studiose secanti, nihil unquam minus ag-



gressi uidentur, quàm corporum sectionem: adeò mordicus horum primarij nescio cui dicendi generi, aliorumq; in refecado oscitantiae fidentes, Galenum in dispendiosa còpendia turpiter redegerunt, nunquā ab illo, dum ipsius sensa assequuntur, ne latū quidem unguem recedentes: imò librorū frontibus adiungunt, ipsorū scripta ē Galeni placitis penitus confarcinata, suaq; illius esse omnia. Atq; ita huic uniuersi fidē dedere, ut nullus repertus sit medicus, qui in Galeni anatomicis uoluminibus uel leuissimū quidem lapsum unquā deprehensum esse, multoq; minus deprehendi posse censuerit: quum interim (præterquam quòd Galenus se frequenter corrigit, suamq; negligentia in quibusdam libris commissam, in alijs, postea exercitator redditus, non semel indicat, contrariaq; subinde docet) nobis modò ex renata disseccionis arte, diligentiq; Galeni librorū prælectione, & in plerisq; locis eorundē non pœnitenda restitutione constet, nunquā ipsum, nuper mortuū corpus humanū refecuisse. At uerò suis deceptum simijs (licet ipsi arida, ac ueluti ad ossium inspectionē parata hominum cadauera occurrerint) crebrò ueteres medicos, qui hominū confectionibus se exercuerāt, immeritò arguere. Quin etiam quamplurima apud illū inuenias, quæ in simijs quoq; minus rectē est affecutus. Vt taceam, mirandū esse maximē, in multiplici infinitaq; humani corporis organorū ad simiam differētia, nullam ferē nisi in digitis, ac poplitis flexu, Galenū animaduertisse: quam cum cæteris procul dubio omisisset, nisi citra hominis disseccionē ipsi fuisset obuia. Verū in præsentia haudquaquam institui, falsa Galeni, disseccionis professorum faciliè primarij, dogmata perstringere: multoq; adhuc minus in ipsum bonorum omnium autorem, mox initio impius, suæq; autoritatis parum obseruās haberi uelim. Haud enim ignoro, quàm multo sepius quàm ducēties à uera hominis sectatores) turbari soleant, quum multo sepius quàm ducēties à uera hominis partium harmonie, usus functionisq; descriptione, Galenū declinasse, in unius, quam modò in scholis exhibeo, Anatomes administratione, obseruant, toruē interim, & summo defendendi studio, dissectas particulas expendētes. Quamuis & hi ueritatis amore ducti, paulatim inde mitescant, suisq; oculis ac rationi bus non inefficibus plus fidei, quàm Galeni scriptis adhibeant: hæc uerè paradoxo non ex aliorū conatibus emēdicata, neq; autoritatū congerie tantum firmata, huc illuc ad amicos tam sedulò perscribentes, & ad illorū inspectionem, ac demum ad uerę Anatomes cognitionē, adeò sollicitē & amicē hortantes, ut spes sit, hanc breui in omnibus Academijs ita excolendā, quemadmodum in Alexandria olim exerceri consueuit. Quod quo felicioribus Musarū auspicijs succedat, quantū in me fuit, præter illa quæ aliàs huius argumenti in lucē edidi, & quæ plagarij quidā, me procul à Germania absente arbitrati, tanquam sua illic miserunt, iam de integro humani corporis partiū historiam eo ordine in septem libros redegi, quo in hac urbe, & Bononiæ, & Pisis, in illo eruditorū uirorum cœtu ipsam pertractare soleo. Hac siquidē ratione, qui secanti adfuere, demonstratorū habebunt còmentarios, cæterisq; leuiori negotio Anatomeri ostendent. Quanquā alioquin & his, quibus inspectio denegatur, minime futuri sint inutiles, quum cuiusq; humani corporis particulæ numerum, situm, formam, substantiā, ad alias partes connexū, usum, munus, ac eiusmodi permulta, quæ in partiū natura dissectantes rimari consueuimus, unā cum mortuorū uiuorumq; refectionis artificio, satis diffusē persequātur, & partiū omnium imā gines sermonis contextui insertas ita contineant, ut ueluti dissectū corpus ope rum Naturæ studiosis ob oculos collocent. Ac primo quidē libro omnium ossium cartilaginumq; naturam enarraui, quæ, quòd illis reliquæ partes sufful-



AD CAROLUM V. IMPERATOREM

*Summa totius libelli*  
*de Anatomia*  
*96*  
*97*  
*98*  
*99*  
 ciantur, & secundum hæc describantur, ab Anatomes studiosis primùm cognoscenda ueniunt. Secundus liber ligamenta, quorū beneficio ossa cartilagineſq; inuicem connectuntur, & dein musculos, motus è nostro arbitratu pendētis opifices, cōmemorat. Tertius, uenarum quæ musculis & ossibus, cæterisq; particulis familiarē, quo enutriantur, sanguinem deferunt, ac dein arteriarum, insiti caloris spiritusq; uitalis temperiem moderantiū, frequentissimam feriem cōplectitur. Quartus non modò neruorum, qui musculis animalē spiritum perferunt, sed & reliquorū quoq; omnium propagines edocet. Quintus organorū nutritioni, quæ potu & cibo perficitur, famulantiū constructiōnem tradit: ac insuper ob sedis uiciniam, instrumenta etiam cōtinet, ad speciei successiōnem à summo rerū Opifice fabricata. Sextus cordi uitalis facultatis fomiti, ipsiq; subministrantibus particulis dicatur. Septimus uerò cerebri & sensus organorū harmoniam ita persequitur, ut illic neruorum à cerebro originem ducentiū series quarto libro expressa, non repetatur. Quippe in horum librorum ordine digerendo, Galeni sententiā sum sequutus, qui post musculo rum historiam, uenarū, arteriarum, neruorum, & dein uiscerum Anatomem pertractandam duxit. Quantumuis non ineptē, ac potissimū apud huius scientiæ tyronem, aliquis cum uasorū distributione, uiscerum cognitiōe ita persequendam contendet, quemadmodū in Epitome præstiti: quam ueluti horum librorum semitam, ac in illis demonstratorum indicem preparauī, serenissimi Principis Philippi, Maiestatis tuę filij, uiuīq; paternarum uirtutum exemplaris, splendore decoratā. Verū hīc quorundā iudiciū mihi succurrit, qui non duntaxat herbarū, sed & humani corporis partium quantumuis etiam exquisitissimas delineationes, rerum naturalīū studiosis proponi, acriter damnant: quod has non picturis, uerū sedula refectione, rerumq; ipsarum intuitu disci oporteat, perinde sanē, ac si hoc nomine uerissimas, et utinā à typographis nunquam deprauandas partiū icones, sermonis contextui adhibuissē, ut studiosi illis freti, à corporū sectione temperarent: ac non ijs potius, quibus possem modis, medicinę candidatos ad cōsectiones proprijs manibus obeundas hortarer. Profectò si ueterū, qui pueros domi in cōsectionibus administrandis, perinde atq; in pingendis elemētis & lectione exercebant, cōsuetudo huc usq; deducta fuisset, non picturis modò, uerū & omnibus cōmentarijs, perinde atq; ueteres illos, faciliē nos carere permetterē: qui tum primū de Administrādis dissectionibus scribere sunt aggressi, quum non liberis solū, sed alienis etiam uiris, quos uirtutis nomine suspiciebant, artem cōmunicare, honestum esse censuerunt. Cum primū enim pueri non amplius in sectionibus exercebātur, protinus necessariò accidit, ut Anatomem infelicius discerēt, exercitatione, quam in pueritia auspicari solebant, abolita. Adeò ut quum ars Asclepiadū familia excidisset, multisq; seculis in deterius uergeret, opus fuerit libris, qui speculationē ipsius integram conseruarent. Quantum uerò picturæ illis intelligendis opitu lentur, ipsoq; etiam uel explicatissimo sermone rem exactius ob oculos collocent, nemo est qui non in geometria, alijsq; mathematicis disciplinis experiatur. Vt cunq; uerò sit, toto opere id unicè studui, ut in negotio longè reconditissimo, neq; minus arduo, quam plurimis prodessem, humaniq; corporis fabricæ non decem, aut duodecim (uti obiter spectāti apparet) sed aliquot mille diuersis partibus extructæ historiā, quam uerissimè & absolutissimè pertractarem, ac intelligendis huius doctrinæ Galeni libris, inter cætera ipsius monumenta, præceptoris operā maximè requirētibus, non spernendam frugem medicinæ candidatis adferrem. At interim non me latet, quā conatus iste, meæ ætatis, qua

qua uigefimum octauum annum nondum exceffi, occasione, parum autoritatis habebit, ac quāminimè ob crebrā non uerorum Galeni dogmatū indicatōnem, ab illorū morfibz erit tutus, qui, perinde ac nos in Italicis ſcholis, Anato-  
men ſedulo non ſunt aggreſſi, quosq; iam ſenes inuidia ob iuuenū rectè inuen-  
ta tabeſcētes, pudebit cum cēteris Galenū ſubſecutis, haftenus cęcutiuiſſe, eaq;  
quē modò proponimus, etſi magnū ſibi in arte nomen arrogent, non animad-  
uertiffē, niſi magno alicuius numinis patrociniō ex more commendatus, in lu-  
cem auſpicatò prodeat. Verū quia maiori nullo, quā diui Caroli, inuictiſ.  
maximiq; Imperatoris, nunquā inter morituro nomine tutius muniri, ſplendi-  
diusq; ornari poteſt, tuam Maieſtatē obſecrō, ut iuuenile hoc meū ſtudiū, mul-  
tis rationibz. cauſisq; ſibi obnoxii, ſub ipſius ductu, ſplendore, ac patrociniō, in  
hominū manibz tantisper uerſari ſinat, donec per rerū uſum, ac quod ætate  
creſcit iudiciū, eruditionemq; hūc laborē ſummo optimoq; Principi dignum  
reddā, aut aliud non reiſciēdum aliis ex arte noſtra deprompti argumenti mu-  
nus offerā. Quamuis augurer, ex uniuerſa Apollinea diſciplina, adeoq; tota na-  
turali philoſophia, nihil tuę Maieſt. gratius acceptius ue procudi poſſe, hiſtoria,  
qua corpus & animū, ac præterea diuinū quoddā numen ex utriuſq; ſympho-  
nia, & noſmetipſos deniq; (quod uerè hominis eſt) cognoscimus. Atq; ut id plu-  
ribz colligo argumētis, ita inde in primis cōijcio, quod in illa librorū frequen-  
tia, quę feliciſ memorię Maximiliano Rom. maximo Imperatori, auo tuo, cōſe-  
crati fuere, nullus præſentis negocij libello unquā gratioſ extiterit. Neq; unquā  
obliuiſcar, qua uoluptate tabulas meas Anatomicas inſpexeris, quamq; curioſe  
de ſingulis percūſtatuiſ ſis, quas pater meus Andreas, Maieſt. T. à pharmacis pri-  
marius iuxta ac fideliffimus, aliquando intueudas obtulit. Vt nunc præteream  
incredibilem illū, ut in omnes diſciplinas, ita etiā multo maximè in mathema-  
ticas, & præſertim eius quæ mundi aſtrorumq; ſcienciā pertractat, amorem, &  
in tāto heroe admirabilē eius peritiā. Adeò, ut haud fieri queat, quin ut mun-  
di ſciencia unicè teneris, ita etiam aliquādo omnium creaturarū abſolutiſſimę  
fabricatione expendenda delecteris, & immortalis animæ diuerſorio inſtru-  
mentoq; cōſiderando uoluptatē capias: quod quia permultis nominibus mun-  
do egregiè correſpōdet, ueteribus haud ab re paruus mundus nuncupabatur.  
Cæterū, uti modò homini digniſſimā ſui corporis ſtructuræ cognitionem,  
per ſe longè cōmendatiſſimam, & cui tāto opere uel Romę ſummos uiros, tum  
rebus, tum diſciplinis philoſophicis per omnia præcipuos, operam impendere  
iuiuit, minimè hic prædicandā ſtatui: ita quoq; Magni illius Alexandri, qui non  
niſi ab Apelle pingi, à Lyſippo in ære duci, & à Pyrgotele ſculpi uoluit, probè  
memor, multo minus hic laudum tuarum aliquid recensendū duxi, ne ieiuna  
& parum exercitata oratione, illis pro luce tenebras offundā. præſertim quum  
prorſus improbandus ſit, nimium receptus in Præſationibus ritus, quo abſque  
omni delectu, & ferè præter meritum, ueluti ex typo & formula quapiam, ui-  
lis alicuius præmioli gratia, omnibz aſcribi ſolēt, ſuſpicienda doctrina, ſingula-  
ris prudentia, mira manſuetudo, ac re iudicium, in deſeſſa liberalitas, erga lita-  
ratos & ſtudia mirus amor, in rebus agēdis matura celeritas, omnisq; adeò uir-  
tutum chorus, quo tuam maieſtatem non minus quā dignitate, ac felicitate,  
rerumq; geſtarum triumphis uniuerſos mortales anteire, nullus non (quam-  
uis hic à me non dicatur) perfectiſſimum habet. unde etiam ſummi numinis  
loco adhuc uiuus coleris: quod ut Dij ſtudijs & toti orbi non inuideant, ſed diu-  
tiſſimè mortalibus incolume, perpetuoq; felix ſeruent ac tueantur, precor. Pa-  
tauij. Calend. Auguſti, Anno poſtnatum Chriſtum M. D. XLII.



Quoniam Epistola, quam unā cum Tabulis, ad hosce de Humani corporis fabrica libros & ipsorum Epitomen paratis, ab Andrea Vesalio ex Italia missam accepimus, pleraque continere nobis uisa est, quorum alioquin Lectorem initio admonendum putassimus, quaeque Typographis, praecipue ita parui Principum decreta pendentibus, & ad ea quae in rei literariae usum euulgatum deprauandam, significanda uidebantur: opera precium duximus, illam ita quodque, uti ad nos missa est, candidis Lectoribus communicare.

## IOANNI OPORINO, GRAECARUM LITERARUM

APUD BASILIENSES PROFESSORI,

amico charissimo suo.

S.



ACCIPIES propediem, mi Oporine, per Mediolanenses mercatores Danonos, tabulas ad meos de Humani corporis fabrica libros, & eorundem Epitomen sculptas. Utinam tam integrè ac tuto Basileam perferantur, atque sedulo cum sculptore, & Nicolao Stopio, in humanioribus studiis apprime uersato iuvene, eis composui: ne aliqua ex parte atterantur, aliud ue incommodum ipsis uentura inferat. Inter tabularum seriem exemplar frustatim repositum, simul cum impresso singularum figurarum typo, cui quoque loco reponenda ueniat, ascripti: ne forte illarum ordo ad dispositionem tibi tuis ue operis negotium facesset, figurarum non ordinatim imprimerentur. In exemplari promptè discernes, ubi genus characterum sit immutandum. quandoquidem scripturae partem, quae organorum historiam complectitur, continuo orationis contextu singulis capitibus absoluitur, lineis ab ea distincti, quae ad characterum qui in tabulis sculpti occurrunt, explicationem inuit: ob idque figurarum & earundem characterum Index appellatur. In continua orationis serie, nusquam figuris indicandis interrupta, literulas expendes, quas in officinis superlineares nuncupatis: quae illis respondent annotationibus, quas interiori margini non tanta industria, quanto labore & tadio, adhibuit, ut lectori uelut scriptorum essent commentarius, exprimens in qua nam potissimum figura pars, cuius mentio incidit, spectari possit: uti annotationes in exteriori margine obuiæ, eorum quae enarrantur seriem & argumentum quodammodo proponunt. In interioribus, ne essem prolixior, eam rationem obseruavi, ut quotiescunque figura indicatur, quae capiti, ubi annotatio spectatur, praefixa est, nullum capitis numerum indicem: quem alioquin appono, si figura alteri praeposatur capiti. Rursus, si figura in libro ubi annotatio occurrit, inueniatur, libri numerum figuræ haud subijcio. Quamobrem uero figuræ hoc illo ue loco collocandas duxerim, in librorum titulis, & characterum fere indicibus explicatum reperies. Notarum enim, quibus partes in delineatione quapiam insignienda fuerunt, loco, characteres, quorum in officinis perpetuo usus est, in tabulis sculptis: primum fere à maiusculis, & dein alijs Latinorum orsi: in super Græcorum minoribus, mox ab eorundem grandioribus, qui Latinis non sunt familiares. Quum uero hi omnes non sufficeret, numerorum typos assumpsimus, & si quæ alia notula in communibus typis occurrebat. In horum indicum descriptione obseruatum est, ut indicans, etiamque priuatam explicationem habens character, in margine liber collocetur: si uero peculiarem non habeat indicem, ac uelut cum alio characterè exprimatur, ipsi punctum in margine subiecti, ut unā cum cæteris lectori in serie obuius fieret. Verum nunc ijs quibus possum modis hortor, & rogo pariter, ut omnia quam nitidissime & ocus excendantur: utque in meis conatibus expectationi, quam omnes de tua Officina, nunc primum magno studio forum commodo, feliciq. Ausarum ordine instituta conceperunt, satisfacias. Praecipuum studium in tabularum impressione erit impendendum, quod non uulgariter ac scholasticè, uelutque simplicibus duntaxat lineis sint expressæ: nusquam picturae ratione (si interdum locum, quo res delineatæ suffulceretur, excipias) neglecta. Et quamquam hic iudicio ualeas, nihilque non de tua industria & sedulitate mihi pollicear, hoc unum perciperem, ut inter excusandum id exemplar quam proximè imitaberis, quod a sculptore spectaminis sui loco impressum, unā cum ligneis formis reclusum inuenies. ita enim nullus character, quantumuis etiam in umbra reconditus, oculatum sedulumque lectorem latitabit. & quod in hac pictura longe est artificiosissimum, mihiq. spectatur perquam iucundum, linearum in quibusdam partibus crassities simul cum eleganti umbrarum obfuscatione apparebit. Verum non est quod hac tibi praescribam, quum in papyri leuitate & densitate, ac in primis in uestrarum operarum diligentia poscitur sit, ut singula nitidissime ex tua Officina omnibus proponantur, multisq. fiant communia. Dabo operam, ut non ita multo post ad uos proficiam, & si non toto impressionis tempore, saltem aliquandiu Basileæ commorer, mecum formulam decreti Senatus Veneti allaturus, quo cauetur, ne quis tabularum aliquam absque meo consensu imprimat, aut quauis ratione eorum scriptorum quicquam imitetur. Caesaris, quantumuis tu generale in omnes libros, quos primus imprimis, habeas, mater mea ad te Bruxella mittet, dudum enim mihi impe-

ratum

# ANDREAE VESALII DE CORPORIS HUMANI FABRICA LIBER PRIMVS, IIS QVAE VNIVERSVM CORPVS

sustinent ac suffulciunt, quibusq; omnia stabiliuntur  
& adnascuntur, dedicatus.

QVID OS, QVISQVE OSSIVM VSVS  
& differentia. Caput I.

*Q*uia primum hoc Caput omnibus pariter ossibus est commune, ipsi nulla illorum praepositur delineatio, neq; etiam hac ratione ullam sibi uendicat peculiarem. nisi quis forte omnes figuras arbitraretur hic praefigendas, quae singulorum ossium Capitibus necessario adhibebuntur, quibusq; uniuersus & integer ossium contextus, cum uarijs eorundem nominibus, ad primi huius libri calcem exprimeretur. Verum omnes huc reponere, uel ideo parum conducere, quod tunc eadem sibi, similes figurae passim essent obuia, ac praeter modum paginas occuparent: quodq; statim initio de Lectoris in totius operis leuiter spectandis imaginibus, totoq; adeo libro rum & capituli ordine cursim ante seriam lectionem expendendo, industria & studio nimium diffidere uideremur.



**S** CAETERARVM hominis partium <sup>ossis natus a.</sup> maximè est terreum, ac proinde aridissimum & durissimum. Eius enim temperamenti summus rerum opifex Deus substantiam meritò efformauit, corpori uniuerso <sup>ossium usus.</sup> fundamèti instar subiiciendam. Nam quod parietes & trabes in domibus, & in tentorijs pali, & in nauibus carinae simul cum coctis praestant, id in hominis fabrica ossium praebet substantia. Ossium siquidem alia <sup>ossis differentia ab usu.</sup> roboris nomine tanquam corporis fulcra procureantur: è quorum numero sunt tibiurum

& femorum ossa, & dorsi uertebrae, ac omnis ferè ossium contextus. Alia, praeterquam quòd sustinent, reliquis etiam partibus ueluti propugnacula, tutissimiq; ualli & muri à Natura obijciuntur: quemadmodum caluaria, uertebrae spinæ, & transuersi earundè processus, pectoris os, costae. Alia tendinibus praecipua sui parte innata, quorundam ossium articulis praelocantur, tendinù robori eleganter succurrentia, laxoq; articulorum motui quodammodo praefecta. Hac etenim occasione, <sup>a</sup> patella in genu occurrit, ipsaq; pariter <sup>b</sup> ossicula sesamo femini à dissectionum peritis assimilata secundo pollicis manus interno dio, & quatuor reliquorum digitorum primis internodijs, & primis etiam internodijs quinq; digitorù pedis, apponuntur. Dentes porrò incidendis & confringendis & atterendis moliendisq; cibis priuatim còducunt, perinde ac duo auditus instrumenti <sup>c</sup> ossicula peculiari usu, audiendi officio famulatur. Verum cuiusq; ossis primum munus, Capita quibus singula ossa sumus descripturi, fusius ostendent, quandoquidem in praesentia abundè sit, generatim illorum usum recensere: quo (ut semel dicam) ossa fulcrorum modo uniuersam corporis molem sustentant, & ijs omnia adnascuntur & firmantur, & ab iisdem suspenduntur, adeò sanè ut ex ossium usu aut officio, non alia quam modo ferè diximus, desumi possit illorù differentia. In magnitudine uerò ossa uariant, quòd nonnulla quidem sint grandia, ut femur, tibiae os, humerus, & ossa sacri, ossis lateribus utrinq; connexa: nonnulla autè parua existant, ut brachialis ossa, dentes, & ossicula quae sesamo comparantur. Alia rursus ampla sunt, ut ossa sacri ossis

*Differentia à magnitudine, & forma.*



cri ossis lateribus coarctata, scapule, sacrum os, uerticis ossa, frontis & occipitij. Alia angusta & gracilia & longa, ut fibula, radius, ulna, & costæ. Porro satius erit omnes differentias, quas à forma petere integrum esset (cum innumeræ occurrant) ad priuatas ossium descriptiones referuare. Arduum quippe esset, ossibus nondum enarratis assequi, quæ nam horum sint aspera: ut ea quæ lapidea in caluariæ basi uocabimus, quod præruptæ rupi similia uideantur. item quæ læuia sint, ut uerticis ossa, frontis os, pectoris os. deinde quæ triangulum referant, ut scapulæ: & quadrangulum, ut uerticis ossa: & quæ cunei speciem obtineant, ut septimum in capite enumerandum os: & quæ cribri ac spongiæ, ut octauum capitis os: & quæ iugis asimilentur, ut ea quæ iugalia uocantur: & quæ snotrum ininitentur, ut clauiculæ: & quæ ensis effigiem ostendant, ut pectoris os: insuper quæ u referant, ut linguæ radici impositum os: & quæ radij quo latiores cordulæ texuntur, figuram exprimant, ut cubiti os, radij nomine donatum: & quæ cubo tesseræq; & grandini comparemus, ut pedis os, à cubi forma nomen obtinens: & quæ cymbæ seu scaphæ modo caua existant, ut pedis os, cui cymbæ imago nomē dedit: & quæ

mole, scuto, & patellæ similia dicantur, ut os genu articulo præpositum: ad hæc quæ totius Italiæ circumscriptionem quodammodo proponant, ut femur: & quæ fibulam repræsentent, ut tenuius in tibia os, fibula appellatum: & quæ coccygis, seu cuculi auis rostro comparentur, ut sacro ossi suppositum os, quod coccyx nuncupatur: dein quæ incudis, uel molaris dentis effigiem leuiter repræsentent, ut minus organi auditus ossiculum: & quæ malleum, ut grandius eiusdem organi ossiculum: præterea quæ à uerticuli forma nomen fortiantur, ut dorsi uerteræ: & quæ clauo correspodeant, ut dentes: & quæ mediam maiusculæ pisæ, seu cicoris formam præferant, ut duo pedis ossicula, primo pollicis internodio supposita: eiusque generis ossium, quæ forma inuicem uariât, permulta, non ita obiter ab illo, cui ossa adhuc incognita sunt, intelligeretur. Atq; hæc etiam ratione, quæ in ossibus processuum, appendicum, capitum, superciliorum, sinuum, & tuberculorum occurrunt imagines, in præsentī nequitiam recedendæ ueniunt: quemadmodum neq; aliqua quæ ex hisce sumi possit ossium differentia, quum quid processus, appendix, eiusq; ordinis reliqua sint, hætenus non expresserim, ista secundo ab hoc Capite pertractaturus. Ac proinde etiam differentiæ ab ossium

Differentia ab  
appendicibus,  
processibus, ca-  
pitibus, &c.

Quoniam quæ hic traditur ossium differentia in figuris, Capitibus singulis, quibus priuatis os aliquod describitur, præpositus, & non fracta ossa ostenduntur, ita ut reliqua quæ



hoc Capite pertractantur, non est obuia, hic appropinquamus humeri secundum longitudinem difficti alteram partem, quæ ipsius capitis, quod scapula articulat, cauernulas pumicis modo efformatas, & A insignitas commonstrat: quemadmodum & B squamam illis cauernulis obductam, & B notatam. C autē inscribitur portio exterioris superficiei istius ossis, hic conspicua, & dicta squamæ cetermina. Insuper D sinum commonstrat ampliter caui, qui solidissima crassaq; ossis parte E ac F indicata circundatus, secundum humeri longitudinem exporrigitur. Ad sinum uerò summum, ubi G reperiuntur, & inum ubi H uisunt, ossæ occurrunt lineæ, medullam hoc sinu contentam intexentes. Ceterum sub humero os cymbam referens, ac undecima figura trigonij tertij Capitis exprimendum, hic uerò per medium dissectum, & I & K insignitum delineauimus, ut ossis apparet substantia pumicis instar constructa. Ac utrumq; quidem L, cauernolam spongiam uel huius ossis notat substantiam. M uerò, squamam, quæ ossi constituit superficem, & undiq; illi spongiosa substantia circumducitur. Præterea huius ossis unum ossiculorum subiuuimus, quæ primo pollicis pedis internodio coarctata, in secundo trigonij tertij Cap. figura u & A ostenduntur. Atq; hoc ideo, N notatum, integre per medium diuisimus, ut aliquod os impense solidum, & cauernulis penè destitutum, in conspectum quous pacto ueneret.

Atq; hoc ideo, N notatum, integre per medium diuisimus, ut aliquod os impense solidum, & cauernulis penè destitutum, in conspectum quous pacto ueneret.

commis-

commiffurarum speciebus petiæ, nisi commiffuris accuratè explicatis, obuiæ esse non queunt. Quodd autem quamplurimæ sint, & cognitu non admodum faciles, quartum Caput attestabitur. Item differentias quæ à cartilagine dependere possunt, nondum natura cartilaginis exposita, haud promptè quivis assequeretur. Incognita enim cartilagine, intellectu difficile est, quæ nam ossa cartilagine prorsus destituantur, ut uerticis ossa: quæ illa undiq; ferè, ut quædā brachialis ossa, aut aliqua tantum ex parte, ut femur, incrustentur: quæ item in cartilaginem degenerent, ut nasi ossa, costæ, pectoris os. His igitur differentijs in suum locum asseruatis, eas quæ à substantia & ossium constitutione colliguntur, sermoni hîc adjiciamus. Sunt enim quædam ossa planè solida, neq; quovis pacto effracta, interius cauernulis sinibusq; uel obfita uidentur: ut, præter cætera, duo nasi ossa, & quod in oculorum sede minimum, ac superioris maxillæ ossium secundum numerabitur: & ea quæ sesamo semini cōparantur: & duo ossicula auditus organo propria. quæ omnia, nisi tēporis successu impensè reficcata, nullam omnino cavitatem in tus ostendunt. Nonnulla uerò exterius, quasi continua crusta aut lamina obducerentur, solida apparent, sed effracta. quædam parvis tantum sinibus cauernulisq; compactissimæ spongiæ, uel læuissimi pumicis foramina quamproximè referentibus, intus oppleta cernuntur, quandam exiccati fungi speciem exprimentia: ut in minorum ossium numero, brachialis ossa, & tarsi ossa: in maiorum autem, sacrum os, uertebrarum corpora, pectoris os, calcis os, talus, deinde & uerticis ossa. quædam uerò præter has cauernulas, nulla serie aut numero positas, amplum aliquem & insigniter cauum ostendunt sinum, qui solidissima ualidissimaq; ossis substantia circumdatus, in extremis angulis, ossis ueluti lineis interstinguitur. Hunc sinum singula ossa, quibus obtigit, unicum ferè adipiscuntur. Sunt autem huius classis inter minora ossa, pedij, postbrachialis, & digitorū ossa: atq; ex his potissimum primæ & secundæ digitorum acies, quantumuis secus Galeno Anates profefforum præcipuo uisum sit, ossa digitorum solida constituenti. Grandiora uerò ossa eiusmodi sinu donata, sunt, femur, tibiæ os, humerus, maxilla inferior, quartum superioris maxillæ os, frontis os, temporum ossa, & plerunq; ipsum cuneiforme os. Dentes autem, qui omnium ossium facile sunt durissimi, huius generis sinum quoq; obtinent: sed interim dictis nuper cauernulis, & pumicis modo efformatis foraminulis, prorsus destituuntur. Maiores isti sinus, & illa pumici ac fungo non absimilis constructio, ossibus contigerunt, cum quò motus nomine, quum necessariò magni alicuius usus occasione crassa, aut alioquin grandia esse debuerunt, leuiora redderētur: tum ut medullam propriam ipsorum nutrimentum illis continerent, aut priuatim aerem, aliquam uel peculiam materiam (ut frontis os, & temporum ossa) præter medullam, amplecterentur. Neq; solum in maioribus ijs ossium sinibus, ut quispiam fortè arbitraretur, medulla reponitur: uerum illæ etiam spongiæ modo extructæ cauernulæ, non minus quàm insigniores illi sinus, medulla infarciuntur. Præter cauernulas & sinus, quibus ossa intus scatent, quædam etiam amplis foraminibus sunt peruiæ: ut occipitis os, & uertebræ, quæ dorsalem transmittunt medullam. pubis quoq; ossa, quò pōdere minus grauent, cæteris omnibus grandius foramen obtinent. Alia autem paruis perforantur foraminibus, ut pleraq; capitis & maxillarum ossa, uenis, neruis, arterijs uiam præbētia: & os quod inter capitis ossa octauum numerabitur, odorum gratia tenuibus foraminulis cribri, aut ut qui budam placuit, spongiæ modo perforatū cernitur. Alia exterius ac in superficie nullum quod sensu dignoscitur, foramen commōstrant: ut brachialis ossa,

Ab ossium commiffuris.

A cartilagine.

Ab ossium substantia & constitutione.

Centurionis Glandis cap. 7. de ossibus.

In 1. de respiratione, & 2. lib. Commentar. in Hippocr. lib. de Fracturis.

Qua ossium parte medulla reponatur.

Ab ossium foraminibus.



& dentes, & digitorum ossium permulta. Non paucis autem ossibus foramina obtingunt, quæ exterius ac in superficie sunt conspicua: non tamen uniuersum os penetrant, sed tantum uenis & arterijs crassiora ossa subeuntibus preparantur. Eiusmodi foramina in calcis osse, & talo, & crassioribus sacri ossis sedibus, & in grandium uerterbrarum corporibus passim occurrunt: quod uidelicet hæc corpulentiora sint, quam ut à uasis ipsorum superficiem tantum per-

*A sensu.* reptantibus, alimentum commodè possint assumere. Ab ossium sensu levis admodum pendet differentia. Solos enim dentes sensu præditos, reliqua autem ossa illo destituta arbitramur: quamuis non nimium temerè ossibus omnem sentiendi uim adimere cõueniat, quum in crebris quas manu obimus curationibus, interdum ossa dolore affici, etiam præstantissimi medici affirmant: non ignorantes interim membranam quandam ossibus circumduci, quam ob id Græci *μυόσσω* (ac si circumossalem diceres) uocarunt, cuius gratia alijs ossa (si

*Ab occultatione.*

*A membrana ossa circumcingente.*

quid modò sentiunt) sensu pollere uisum fuit. Præterea & soli dentes tota sede qua extra gingiuas prominent, nudi sunt: reliquis interim ossibus omni ex parte tectis, & ante sectionem latitantibus. Ad hæc, dentes ubi prominent, communi membrana ossa inuolvente destituuntur, ut & caluariæ interior superficies, quæ cerebrum continetur, quam dura cerebrum induens membrana proximè succingit: quum alioquin cæteris ossibus dicta prius membrana undiq; circumducatur, si eas sedes exceperis, quibus ossa uel articulantur inuicem, uel alioquin mutuò construuntur.

## QVID CARTILAGO, ET QVIS IPSIVS

usus & differentia. Cap. II.

*Q V I D* & præsens quoq; Caput omnibus simul cartilaginibus commune sit, nullas quibus illæ delineantur figuras (quia scilicet omnes alioquin hic adhibendæ erant) ipsi præposuimus, earum imagines ad singula quibus primatim describuntur Capita asseruantes.

*Cartilaginis natura.*



*usus communi ossium uisui respondens.*

**A R T I L A G O** osse mollior est: terrestris tamen, ac durissima partium corporis secundum os particula, prorsus solida, & nullis foraminibus cauernulisq; ossium modo intus oppleta, & medullæ ac sensus ferè expers. Huius usus perquam uariis est. Primum namque idem præstat quod ossa, quum uelut fulcrum quoddam sit, cui proximæ partes adnascantur & adstabiliantur. Cartilagine enim, quibus larynx constat, ossium munere eleganter funguntur. quippe ipsis quidam implantantur muscoli, ac nonnulli ab illis enascuntur. Insuper laryngem perinde effingunt, atq; rusticorum domus ex trabibus confectas cernimus, priusquam stramina, tegulæ, & lutum illis adhibentur. Neq; sanè hominum ossa & cartilagine carne nudatas, ac postmodum unà contextas, propius cuiusdam imagini assimilaueris, quàm tuguriorum fabricæ iamprimum erectæ, & nondum ramis aut terra ornata. Pari quoq; ratione cartilagine alia ossi uicem obeunt, quæ inibi reponuntur, ubi nullo locato osse, musculi suam insertionem tentant: quod palpebris euenit. In harum enim extremis oblongæ consistunt cartilagine, in quas musculi palpebras mouentes inferuntur. Ad hæc, nasi alæ cartilaginibus efformantur, quæ musculorum insertionem perinde ac ossa excipientes, unà cum alijs cartilaginibus à nasi ossibus prognatis, apicem nasi eleganter ossium ritu suffulciunt, eriguntq; Præterea costarum ossa in cartilagine si niunt, suffulciendi munere illis ossibus respondentes: uerum ex abundanti cartilaginibus ossium uicem hac in parte subeuntibus, peculiaris usus, ob molliorem,

*Ossa  
ex  
hæc  
lib. 1.  
f. 50.*

*a figur. ca.  
38. & fig.  
ca. 11. lib. 1.*

*b fig. ca. 35.  
c fig. cap.  
10. lib. 1.  
d 4. musc.  
tab. L.  
e 4. musc.  
tab. K.  
f 1. fig. 9.  
cap. 3. 2.  
g 1. 3. fig.  
cap. 19. A  
in B.*

*Cartilagineum  
osse sequacior  
rem esse.*

*Cartilaginis  
usum in articu-  
lis.*

*Tertia in arti-  
culis quibusdā  
cartilago.*

*Cartilago diti-  
us uice substituitur.*

*Ligamentorum  
substantiam in-  
grediens carti-  
lago.*

*Cartilagine  
aliquid conti-  
nuo erigentes.*

*Ex tribus par-  
tibus adnata  
cartilaginea.*

rem, magisq; sequacem, quàm ossibus obtigit, temperiem, accedit, quo quam efformant cavitatem, promptius dilatari & constringi patiuntur, quàm si rigida, ossisq; modo duræ essent. Atq; ita huius etiam usus occasione, asperæ arteriæ<sup>h</sup> cartilagine C nostri imaginē exprimentes, in hoc ab ossibus discrepant, quòd præter id quòd bellè sustinent, citra uarium articularum contextum, secus quàm ossa comprimì distendiq; possunt. Adde & alium cartilaginis usum neutiquam infimum, quo hæc ossibus occasionem præbet, ut in continuis frequentibusq; motibus attritu minus uidentur. Ossium namq; commissuræ motus gratia extructæ, propter ossium siccitatem ex mutuo contactu, leui operarumperentur, nisi ossa, tota sede qua se inuicem contingunt, articulumq; formant, cartilagine quadam ueluti crusta seorsim obducerentur, & hæc cartilago suo in duritie mollitiq; temperamento ossium impetui resisteret, & unà incidentis uim cedendo leuiter exolueret. Neq; solum cartilago in ossium affricu, quo minus mutuo contactu atterantur, commoda est: at ita læuis plana; uisitur, ut promptissimè ossis caput in suo sinu uoluatur, nulla; asperitas motus promptitudinē impedit: accedente huc uiscido lubricoq; humore, & ueluti smeumate quopiam, quo rotulas & cardines, ut ad reflectendum reddantur aptiores, oblinimus. Quinetiam sagax rerum Opifex adeò præstantem cartilaginis usum in articulis fore cognouit, ut non solum ad eum quem diximus modum, ossa in mutuo contactu cartilagine læui & lubrica incrustauerit, uerum in nonnullis articulis priuatorum quorundam motuum gratia, tertiam insuper quandam adhibuerit, quæ neutrius ossis cartilagini, sed tantum membraneis articuli ligamenti orbicularim connascitur, & ueluti cartilaginis ossibus obductarum quoddam interstitium efficitur, utrinq; quæ inter alias cartilagine consistit, læue, & lubricū, & multo illis cartilaginibus, quæ ossibus obnascuntur (quo promptius comprimat, assurgatq; iterum) mollius. Huiusmodi cartilagine inferioris maxillæ ad temporum ossa articulos intercedere, suo loco audies: deinde<sup>e</sup> aliam pectoris ossis cum clauicula articulum, & nexum clauiculæ cum superiori scapulæ processu, & ulnæ cum brachiali, & tibiæ ossis cum femore: in quo articulo huius generis cartilagine, sinus, quibus femoris capita excipiuntur, magna Naturæ prouidentia peculiariter augent. Huiusmodi itaq; usum cartilago in articulis suppeditat. ad quem rursus accedit, quòd in plerisq; ossium commissuris non ad motum institutis, cartilago quasi glutinis uice interuenit: quomodo in pubis ossium commissura fieri animaduertimus,<sup>o</sup> & pueris, in appendicis cum reliquo osse coalitu. Porro de conglutinantis cartilaginis natura, ubi ossium commissurarum differentias persequemur, denuò agendum erit: uti & cartilaginis species, quam ligamenta cartilaginosa aliquando efformare docebimus, in ligamentorum enarratione pertractabitur. Sunt autem eius generis in corporum uertebraum<sup>q</sup> contextu, in coxæ articulo, & in genu. Cartilagine insuper quædam in hoc fabricantur, ut quippiam in ipsis quod cōtinuò erectum esse oportuit, firmetur. Cuius generis palpebrarū sunt cartilagine, quæ cilia seu palpebrarum pilos erectos sustinent: præterea nudæ prominentesq; corporis particulae, & ossium fines alteri ossi non commissi, cartilagine adaugentur, ut tali consentiant substantia, qualis neq; frangi propter mollicitē, neq; rumpi propter siccitatem queat. Quòd autem cartilago non minus quàm unguis ea formetur substantia, uel pueri nos docent, qui maiusculam cartilaginei piscis, aut uituli cartilaginem nacti, eam in globulum scindunt, ac ut ualidissimè frequentissimeq; resiliat, lapidi cuiuspiam iniiciunt. Is enim resulsus liquidò cartilaginis temperiem

b 14, 15 fi.  
cap. 38

i fig. capiti  
10 inserta.  
h 4 fig. ca.  
22 S.  
l 4 fig. ca.  
22 R.  
m 1, 2, 3 fi.  
cap. 24 T.  
n 8 fig. ca. 31

o in integritate ossium  
figuris 1.  
p fig. ca. 40.  
lib. 2. character 2, 5.

q eiusdem  
fig. char. 3.  
r 2 fig. ca.  
40 lib. 2. p  
5 fig. cap. 1.  
lib. 2. X.




*Cartilaginum  
differentia.*

ita arguit, ac quum cæsim punctimq; cartilago superficietenus cultro petitur, & ab illo dein refilit. In cartilaginum, quæ nudis partibus contigerunt, numero, obseruabis nafi cartilagine, eam quæ in mucronem gladij modo à pectoris ofsis fine exacuitur, spuriarû costarum cartilagine, & eam quæ ofsis coccygis termino adnascitur: & auris cartilaginem, quæ tenuis mollisq; est, ac cute obducta, auris corpus ofsis instar pulchrè suffulcit. Cæterum isti cartilaginum inter se uariantes usus, earundem quoq; differentias explicant, aded ut nunc neq; has, neq; cartilaginum formas, prolixius enarrare conueniat, præsertim quum singulæ cartilagine perinde ac ossa à nobis priuatim ueniant describendæ. Quamuis fortè aliquis hic adhuc additum uelit, in minoribus natu cartilagine molles esse: in senioribus uerò ita subinde indurari, ut fragilis ac friabilis ofsis naturam referant. quod potissimum laryngis accidit cartilaginibus, & illis quas superiores costæ educunt. Hæ enim temporis succellu, idq; maxime in brutis, ossæ fiunt, exterius duntaxat cartilagine ueluti mēbrana quapiam obcinctæ, quæ ab ossæ illa cartilaginis substantia per elixationem leui negotio abscedit & diuellitur.

t. fig. cap.  
10. h.  
11. fig. ca.  
12. F, F  
13. 3. fig. ca.  
18. G.

NOMINA, QVIBVS OSSIVM CARTILAGINUMq; partes, sedes'ue appellantur. Cap. III.

TERTII CAPITIS FIGURA.



TERTII

TERTII CAPITIS FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum index.

PROPOSITA modo figura, aliquot ossa in hoc tantum delineantur, ut ossium partes & sedes, quarum nomina hoc Capite persequar, in nonnullis saltem ossibus exprimantur. Cuiusmodi verò hic occurrant ossa, characterum index docebit.

- A Dextrum femur, cuius appendices sua sede dimouimus, ac ueluti quodam interstitio à reliquo osse disjunctimus.  
 B Dextrum femur, cui appendices suis sedibus adhuc commissaeherent.  
 C Maxilla inferior, una cum humiliori dentium serie.  
 D Hic os dextro sacri ossis lateri coarticulatum, externa sede exprimitur. OS COXA  
 I. 2. 3. 4. Sub iam commemorato osse, & inferiori maxilla, pedis dextri ossa ita uidentur, ut quatuor tarsi ossa, cha-  
 E. F. G. racteribus 1. 2. 3. 4. insignita, cum osse cymba non absimili, ac E indicato, & talo F inscripto, & calcis osse G si  
 H. I, II, gnificato, à quinq. pedis ossibus I, II, III, IIII, U notatis, & digitorum ossibus H & H ostensis, adeo remo-  
 III, & c. ueantur, ut sedes qua pedis ossa tarsi ossibus committuntur, intueri possit. Hac namq. ratione sinus in superficie  
 H H. tantum insinuat, & capita leuiter admodum protuberantia, opportune commonstrantur.  
 I Padi sibi iacet humerus, anteriorem ipsius sedem ostendens.  
 K Scapulae porio, in hoc ex dorso posteriori ue parte depicta, ut spinam ipsius cum sua appendice lineis interstincta,  
 uarijsq. partibus efformata ostenderet. Reliqui characteres ossium partibus ostendendis hunc in modum ser-  
 uiunt.  
 L & c. Quatuor L in femore A notatio posita, quatuor femoris appendices indicantur.  
 M & c. Quatuor M in femore B notato locatis, etiam quatuor femoris appendices insinuantur, quarum circumscri-  
 ptionem lineae notant, quibus ille à reliquo femoris osse diuimuntur.  
 N, N Superius N in osse sacri ossis lateri commissio, appendicem notat ossis illum. inferius autem N, appendicem ossis  
 coxendicis.  
 O & c. Aliquot O in pedis ossibus ponuntur, & deinde in primo secundoq. pollicis osse, & primo secundoq. medij digi-  
 ti appendices aliquot in his ossibus insinuantia.  
 P Humeri appendix.  
 Q Appendix spinae scapulae.  
 R Lineae, quae plures spinae scapulae appendicis portiones intercedunt.  
 S, S In utroq. femore duo scriptimus S, femoris notantes processus.  
 T Processus acutus inferioris maxillae.  
 U, U Duo sunt processus, in osse alteri sacri ossis lateri coartelato.  
 X Processus superioris appendicis pedis ossis, paruo digito praepositi.  
 Y, Y Duo processus, seu tuber inferioris sedis humeri, qua cubiti ossibus articulatur.  
 a, a, a In utroq. femore ter a ponitur, tria femoris ostendens capita.  
 b Caput maxilla inferioris dextrum.  
 c Caput talis, sinum ossis quod cymbam refert, subintrans.  
 d Caput talis, tibiae sinum subiens, quod F notatur.  
 e, e, e Aliquoties in pedis figura e occurrit, capita notans pedis & digitorum ossium.  
 f Caput humeri superius, quod scapulae articulatur.  
 g, g Duo capita inferiora humeri, seu potius sedes, quibus ulna & radius articulantur.  
 h, h In utroq. femore semel h ponitur, ceruicem capitis indicans, quod coxendicis ossi immittitur.  
 i Ceruix in inferiori maxilla.  
 k Ceruix in talo.  
 l, l Ceruices pedis ossium.  
 m Ceruix in humero.  
 n Acetabulum in coxendicis osse, cui femur inarticulatur.  
 o Acetabulum in humero, anteriorem ulnae processum admittens.  
 p, p, p Superficietenus exculpti sinus, qui in tarsi ossibus uidentur.  
 q, q Pedis ossium minime extuberantia tubercula.  
 r, r Supercilia in coxendicis osse, ad superiorem acetabuli sedem conspicua. Si forte in cartilaginibus eiusmodi quoq.  
 ossium partes aut sedes contueri libet, omnes fere quae in cartilaginibus spectari possunt, effigies cartilaginum tri-  
 gesimo octauo Capiti praeposita commonstrabunt.



Varia esse vo-  
ces, quib. ossis  
partes sedesq.  
nuncupantur.



TCVNQVE uocum multitudo, & uariis illarū uel apud eundem authorem usus, rerum descriptionē arduam red- dat: nulla tamen æquē uaria pugnantē; dictionum est con- geries, ac nominum, quibus ossium partes sedesq. indican- tur. Vt enim ad sequens Caput uarias adhuc appellationes asseruam, quibus commissurarū ossa iungentium species significantur, huc modò referuntur, *ἐπίφυσις, ἀνέφυσις, κερῶ- νη, λεφαλή, ἀφύρον, κύνυλον, τεύχιον, αἰχμή, κτύλη, κστυλιδιον, ὀφθαλμοφ, γλῶνη, ἐπὶ δὲ, ὀφρυς, ἄμβονος, χεῖλη, βαβυλιδος*, eiusq. generis uoces quamplurimæ, quæ Græco- rum sunt nomina: Latinis autem, & si priuatim nonnulla tantum illis habeant- tur, interpretum tamen lasciuia, tot nominū myriades passim ita sunt obuia, ut iam nobis seorsum unumquodq. Græcorum nomen assumendum ueniat: & quid ueteres, qui pueros domi sedulò discendi rationem docebant, illis in- tellexerint, addendū, quò tandem cuiusmodi uoce nos quoq. simus usuri, sta- tuatur. *ἐπίφυσις* itaq. quam Latini *appēdicem*, *applantationem*, *adnexum*, *ad- ditamentum*, *adnascentiam*, & alijs innumeris profectò modis reddunt, per- petuò *appendicem* appellabo. Est autem *ἐπίφυσις* seu *appendix*, os alteri ossi ad- natum, & peculiarem obrinens circumscriptionē; neq. illius ossis cui committit- ur, penitus uera portio. Huiusmodi appendicis naturam, quoties aut uituli, aut hœdi, aut agni, aut alicuius iunioris animalis pars aliqua mensæ apponitur, discere licet. Femore enim, humero, tibia, radio, ulna, aut alio his simili osse à cæteris ossibus carnibusq. liberato, & ualidius nonnihil extremis partibus at- trectato, ab illo ueluti aliud quoddam os decidere conspiciamus, *appendicis* no- mine donatum. Atq. id in iunioribus duntaxat animantibus intuemur: in æta- te enim prouectis, *appendices* adeò pertinaciter suis ossibus adnascentur, ut ab osse auelli nequeant, uixq. coniunctionis lineam expriment, & ueræ suorum ossium portiones esse uideantur: cum interim in nuper natis magnam cartila- ginis portionem inter *appendicem* & os cui ea adnectitur, intercedere uidea- mus, quæ *appendicē* ossi glutinis modo connectit. Coalitus hic non læui pla- naq. cōtingit superficie: uerū os cui *appendix* committitur, plerunq. sinibus quibusdam & asperitatibus abundat, quibus *appendicis* tubercula sinusq. mu- tuo ingressu ualide accommodantur. Præterea connexus iste hoc quoq. pri- uatim nanciscitur, quòd os cui *appendix* committitur, nulla prorsus sui sede mollius, & in duritia infirmius, quàm circa ipsum connexum, cernatur. Perpe- tuò enim os inibi pumicis spongiæ uel modo multis cauernulis intus plenum est. & quamuis id subinde reliqua propemodum ipsius longitudine unum si- num ampliter cauum, & duntaxat medulla oppletum sibi uendicet, ac durissi- mum ualidissimumq. secundum sinus illius longitudinem existat: nihilominus tamen priusquam *appendici* os annectitur, sinus ille deficit, & ipsum mol- lius redditum, cauernulis scatet, quemadmodum & *appēdix* ipsa, quæ reliqua ossis parte mollior semper cernitur. Atq. id ita perficitur, ut Galenus *appendi- ces*, sinuum medullam continentium opercula esse tradiderit. quasi uerò *ap- pendicum* cauernulæ medulla, aut succo ipsi prorsus simili destituerentur, & non quamplurima ossa sinibus quibus medulla ossuosis fibris non intertexta continetur carentia, *appendicem* asciscerent. Amplis enim ossibus, quæ sacri ossis lateribus coarctantur, eiusmodi sinus neuti quam adest: nihilominus ta- men tot ilium ossis spine <sup>a</sup> *appendix* coalescit, quemadmodum & toti infimæ sedi coxendicis ossis. Quin & scapulæ nulla ferè ex parte medullosæ, <sup>d</sup> quatuor *appendices* annectuntur. duæ quidem ad ipsius basim, una ad mucronem inte- rioris

a Expende  
femoris ap-  
pendices si.  
A.

b fig. capiti  
i. inserta in  
ter G & A

In vi. de r'su  
partium.  
Appendices si-  
nuū medullam  
continentium  
non esse opercu-  
la.

c N, N. si.  
D.  
d X, Y, E,  
K fig. 1, 2  
cap. 21.

rioris sui processum, & quarta superiore ipsius processum: quæ peculiariter ex pluribus particulis extruitur. Demum dorſi uertebræ eius generis ſinu carent: atamen ipſarum corpora ſuperius inferiusq; ſibi appêdices uendicant. Imò non modò uertebrarum corpora appendices habent, ſed etiam tranſuerſorum in thorace ac lumbis uertebrarum proceſſum & ſpinarum muonibus appendices annectuntur. Inſuper & coſtarum radici uertebris cœarticulatae appendix committitur, etiam ſi coſtarum os nullo amplo ſinu medullam recipiente donetur. Cæterum uertebræ & puerorū dentes, qui etiam appendicibus decorantur, non ſolum indicant oſſa his ſinibus deſtituta appendices obtinere: uerū etiam argumēto ſunt, non ſolis grandibus oſſibus Naturam appendices dediffe: quantumuis antehac Anatomicorū præcipui oppoſitum aſſeruiſſe uideantur, appendices magnis tantum oſſibus adſcribentes. adeò ſanè, ut ſi appendicum rationem rectè ſcrutabimur, eas non ſinum opercula quocunq; tandem modo ſtatuemus, uerū illis rerum Opificem uſum eſſe, haud immeritò aſſeremus, quum os aliquod parte quapiam mollius quàm reliqua ipſius ſede fabricandum duxit, ſiue commodè opportunæq; articulationis, quæ crāſſam, ac proinde non prorſus ſolidam cōpactamq; oſſis ſedem requirebat, ſiue molliorum corporum inſertionis, exortus uē, aut eiufmodi alitius occaſione. quantumuis interim Galenus undecimo libro de Partiū uſu, appendicum ſubſtantiam reliqua oſſium quæ illis donantur ſede ſolidiorem durioremq; eſſe conſuerit: appêdices in nuper natis parum expendens, quibus magna ex parte ſunt cartilagineæ, quemadmodū & in ſenibus cætera oſſium ſede (uti iam antea dixi) molliores rarioresq; occurrunt. Oſſium itaq; amplos illos & oſſiuoſis fibris non undiq; oppletoſius habentium, femori quidem<sup>s</sup> quatuor annectuntur appendices: unus capiti, quo coxendicis oſſi inarticulatur: unus inferiori ipſius parti, quæ tibiæ cōmittitur: & duo alij duobus ipſius proceſſibus, quos ſerè rotatores uocamus. Tibiæ oſſi & fibulæ ad genu & ad pedem appendices adnæſcuntur. Radius quoq; iuxta brachiale & humerum appendicibus donatur. Humero autem tantummodo ſuperius, quā ſcapulā ſpectat, appendix contigit: quemadmodum ulnæ duntaxat ad brachiale. quam huic interdum in admodum puerulis ad ſupremam ipſius partem parua appendix adnata<sup>a</sup> occurrat, uti & humero<sup>i</sup> tota inferior pars cubiti, articuli portionem efformans, quibuſdam appêdice efformari uiſa eſt. Atq; hæc oſſa grandia ſunt, quibus inſignes Natura ſinus largitur. Parua autem, quæ & nos quoq; eius generis ſinu cōtra Galeni placitum donari diximus, haudquaquam appendice carent: quippe poſtbrachialis & <sup>a</sup> pedij oſſa ad unum omnia maniſiſſimam appendicem obtinent, ubi primorum digitorum oſſium ſinus ad articulationem ſubeunt. Superius uerò quā hæc oſſa brachiale & tarſum reſpiciunt, ſubinde appendicem quidem adipiſcūtur, at firmius ſemper quàm ima parte, ipſorum oſſi coalitam. Item omnia digitorum oſſa ſuperius & inferius appendicibus plerunq; decorantur, ſi ultima excipias, quæ ſuperius tantum appendices habent. <sup>ἀνθρώποις</sup> quem interpretes proceſſum, exceſſum, explantationem, & neſcio quibus alijs uocibus uertunt, nobis proceſſus appellabitur: eſtq; oſſis pars, nihil à ſuo oſſe differens, quàm quòd tuberculi ſeu gibbi inſtar ex oſſe procedit, quemadmodum ex arboris trunco radices & rami extubere procedereq; uidentur. Eiufmodi proceſſus, qui & <sup>ὀφθαλμοῖς</sup> quandoq; uocantur, in oſſibus ſunt quamplurimi. Nulla enim dorſi eſt uertebræ, quæ non multis donetur. quandoquidem aliquot<sup>b</sup> ceruicis uertebras etiam plures undecim proceſſus habere, thoracis autem uertebras ſeptem, lumborum uertebras nouem

*Nō solum gran-  
dibus ossibus  
appendices con-  
tingere.*

Επιδείκνεται ως.

25 ligaments & straps  
Calcaneal tub. & deepit c. 2.

*Galen. lib. de  
Ossibus.*

Processus.



uem, suis locis docebimus. Deinde & inferior maxilla processibus utrinque duobus donatur, & humerus quoq; & omnia corporis ossa processus ostendunt, quoties extra planam superficiem aliqua sui sede extuberant. Porro processuum, sicut & appendicum, nonnullæ sunt differentiae. Quibusdam enim

Processuum et  
appendicum  
differentia.

processibus appendix adnascitur. nam femoris processus rotatores nuncupati, & scapulæ spina (quæ processus scapulæ est) appendicem obtinent: quemadmodum & interior quoq; scapulæ processus. Alijs processibus nulli sunt appendices. nam maxillæ inferioris, tali, & reliquorum ferè fungosorum ossium processibus appendices rarissimè contingunt, modò & eorum quoq; ossium processus fungosi sint. Rursus ipsi appendices plerunque sibi processus uendicant. Vlnæ enim appendici processus accidit, quem columnæ, & quo scribimus stilo, dissectionum periti assimilarunt. Tibiæ quoq; ossis inferiori appendici processus obtigit, quem anteriorem malleolum nuncupamus. Deinde & pedij ossis paruum digitum sustinentis superior appendix processum habet, cui octauus pedem mouentium musculus inseritur. Appendix quoq; infima femoris, in duos processus aded insignes diuiditur, ut utriq; capitis nomen ferorsum mereantur. Ad appendicem itaq; & processum referuntur, quæ iam explicabimus ossium capita, ceruices, sinus, tubercula, & supercilia. Quanquam tamen processus nomen illis tantum processibus adhiberi satius erit, qui alteri ossi non articlatur. Femoris namq; & humeri capita processus ferè non nuncupamus: quemadmodum sanè acutos maxillæ inferioris processus, & tubera humeri, quæ ad cubiti articuli latera prominent. Deinde & processus appendicibus ornatos, non appendices, sed processus simpliciter appellare, opportunius fore putamus. Femoris enim rotatores, & scapulæ & uertebrae processus, etiam si appendices habeant, processus aliorum Anatomicorum more (qui subinde *ἐπιφύσιον* cum *ἄρσενος* confundunt) nuncupabimus: Appendicis autem processum simpliciter nunquam, non addito appendicis nomine, proferemus. quippe anteriorem malleolum, inferioris tibiæ ossis appendicis processum esse dicemus. At hæc omnia, obiter tantum intellectis nominibus, in ossium descriptionibus erunt obuia, ut & processuum quoq; usus in singulis ossibus manifestus euadet. Conferunt autem processus præcipuè ad commodam articulationem, & ossium commissuram: deinde ad multarum partium exortum, aut insertionem. Si enim ossa nullibi extuberarent, neq; collum ritu educerentur, ac rursus uallium modo exculperentur, paucissima ex ipsis nasci, ipsisq; inferi possent. Nunc autè processus montis instar prominent, à quo plura quàm ex plano pronascuntur, aliaq; ei dein inferuntur, & super ipsum exedificantur. Quinetiam processus quosdam propugnaculi uice quodammodo esse, scapularum & uertebrae processus testabuntur. *κροῶν*, seu *κροῶν*, & *κροῶν*, interpretibus quibusdā cornix, alijs corona dicitur. At ueteres Græci in ossibus hac uoce acutū significabant processum, quem ad arcus cornu & incisionem, ubi neruus sedet, referebant. Huius generis unus utrinq; in inferiore maxilla habetur, cui temporalis musculi tendo inferitur. Deinde in temporum osse alius cernitur, quem mammarū papillis assimilant. Sic & in eodem osse alius consiluit, qui gallorum calcaribus, & scriptorio stilo comparatur. Verùm Galeus non eiusmodi acutos processus, musculorum insertionibus & exortibus paratos, ita solum appellasse uidetur: sed & nonnulla ossium capita, aliorum ossium sinus articulationis ergò subeuntia. Occipitij enim ossis capitula primæ ceruicis uertebrae sinibus articulata, non semel eo nomine appellauit: quum interim, idq; potissimum in homine, acuti processus nomē neutiquam

Processuum  
usum.

κροῶν.

In libro de  
ossibus.

l. 1. f. c. et  
6. mus. tab.  
A, B.  
m. 4, 5. f. 6  
cap. h.  
n. eiusdem  
fig. 4.

o. 1. f. cap.  
15. B.  
p. 2. f. cap.  
15. N.

mereantur.

mereantur. κεφαλή, & κεφάλαιον, Latinis nomine capitis explicantur: qui hac uoce appellant ossis tuberculum, alterius ossis cauum articulationis motusq; arbitrij occasione subintrans. Et caput rursus prominēs aut depressum nuncupamus, ad ipsius ceruicem id referentes. Femoris enim<sup>a</sup> caput, coxendicis ossis<sup>r</sup> sinui inarticulatum, prominens dicitur, quod ab ipsius ceruice ad uerticem usq; longus pertingat ductus: quemadmodum & humeri<sup>r</sup> caput scapulæ commissum, prominentis capitis loco numeramus, quod ipsius eminentissima parte ceruicē aut collum longē excedat. Verū pedij ossium<sup>r</sup> capita, quæ tarſi ossibus cōmittuntur, adēd depressa plana q; sunt, ut uix dicere queas, num ipsa tarſi ossium sinus subintrent, aut tarſi ossiū tubercula in se recipiant. Præterea neq; in<sup>n</sup> trium interiorum tarſi ossium cum osse cymbam referente contextu, à sinibus capita distinguere licet. dein eiufmodi capitula in plerisq; uertebriſ<sup>x</sup> haberi, suo loco admonebimus. In præsentia enim sufficit addidisse, Græcos Naturæ operum studio flagrantēs, capita prominentia nuncupasse, quæ manifestum ostendunt tuber, & ipsorum medio (quantum ad superficiem spectat) magis quàm lateribus, aut in orbiculo, eminent & extuberāt. depressa autem, quæ adēd obscuro tubere gibbo<sup>u</sup> ue prædita sunt, ut num caput, num si nus ea uocari debeant, non satis constet. Atq; hæc posteriora capita illi κεφάλαια κορυφαίαι uidentur appellasse, priora autem simpliciter κεφάλαια. At de condylo non ita nullo pōst quædā (quum ita uariē à multis id nomen usurpetur) adhuc subijciemus. ἄρθρον, quem nos Articulum dicimus, Græci primū uocant, ossium commissuram ad motum paratam. Verū Hippocrates crebrō, idq; potissimum in libris de Fracturis & articulis, ac Galenus etiam in eorundem librorum Commentarijs, articulum nominarunt rotundam ossis partem, in proximi ossis cauum sinum<sup>u</sup> ue immisſam, & capitis nomine appellatam. Huiusmodi caput, Latini etiam uertebrium seu uertebra appellare uidentur, quando femoris<sup>a</sup> caput coxendicis ossis<sup>r</sup> sinum subingrediens, ita nominant. quamquam alijs rursus uniuersum coxendicis ossis cum femore articulum ita uocare libuit. Satiſ tamen fuerit, uertebrae nomen<sup>e</sup> dorſi ossibus tantum accommodare, ut nobis uertebra idem significet, quod Græcis σπόνδυλος, nimirum quoduis dorſi os: quod & uerticulum nonnullis dicitur, à uerticuli uidelicet, quo mulieres fuso aggrauant, forma. Cæterum capita quæ iam dicto modo extuberant, quibusdam ossibus simplicia obtigerunt, ut femori qua coxendicis ossi articulatur, pedij & postbrachialis ossibus, qua digitorum prima ossa subeunt. Alijs duplicia sunt, ac gemina, & sinu quodam interſtincta, ut<sup>r</sup> femori quā tibiæ committitur, primis & secundis digitorum ossibus, in inferioribus partibus, quæ subsequentiū ossium sinus subintrans. Rursus capitum alia rotunda conspiciuntur, ut femoris supremum caput: alia à dextra sede sinistrorsum longius ducuntur, atq; ita quodammodo lata fiunt, ut maxillæ inferioris<sup>s</sup> capita. & alia à priori sede retrorsum longius feruntur, ut<sup>n</sup> capita occipitij ossis primæ uertebrae sinus subeuntia. præter alias innumeras capitū ex forma differentias, in priuatis ossium descriptionibus explicandas. Porrō ossiū capita non semel Galeno ὑπάρχεις, seu appendices uocantur, fortassis quod eorum nonnulla appendice consent: quemadmodū femoris capita, superius humeri caput, pedij & postbrachialis ossium capita, quibus primis digitorum ossibus coarctantur. Sed interim pleraq; ossium capita neutiquam appendice formantur. Talus enim prorsus appendice caret: quemadmodum & maxilla quoq; inferior capita, non autem appendices obtinet. Vnde non admodum recipienda uenit Galeni oratio, qua κώλωρ, hoc est artuum capita, ὑπάρχεις & κορυφαίαι uocari

κεφαλή, κεφάλαιον, Caput. Capitiſ alia prominētia, alia depressa.

κορυφαίαι

ἄρθρον, Articulus.

uertebrium. Vertebra.

σπόνδυλος.

Capitiſ differentia.

In u. de vſu partium.

q. Metircid  
d. ad B. 1  
fig. cap. 30.  
r. 1, 2 fig. ca.  
20 c. f. g.  
s. Ab m. ad  
f in fi. 1.  
t. q. q. in pe  
de.

n. Confer f.  
t. u. 13 fig. ca.  
33. cum n.  
in l. fig. 10.  
x. 9 fig. 15  
ca. d. c. f. si  
gnat. 16 ca.  
X, Y.

a. b. Immitte  
te A. f. ca.  
30 in c. f. g.  
fig. a. ca. 30.  
c. figure  
cap. 14, 15,  
16, 17.

d. 1 fig. ca.  
27 C.  
e. 1 fig. ca.  
30 B. f. l.  
f. 2 fig. cap.  
27 G. H. L.  
g. 1, 2 fig. ca.  
10 A.  
h. 1 fig. ca. 15  
d. C. ad D.

*latinos.* cari docuit. Porro *κύνδυλον* Latini nunc articulum, nunc nodum, nunc gibberum, nunc caput, nunc capitulum, nunc digitorum ossa uertunt: quòd admodum uariè hanc uocem à Græcis haberi cognoscant. In Galeni enim iam dicta oratione, artuum capita eo nomine nuncupari uidentur. In libris autem de Administrandis sectionibus, ita duo inferiora femoris capita uocat, & tubera capita uel inferiora humeri, perinde ac si eo nomine indicarentur gemina ossium capita. quod & Hippocrates in libro de Articulis insinuat, ubi luxatum humerū *κύνδυλσις*, hoc est digitorū articulis restituere docet. Verisimile enim est, digitorum ossa ita ab aliquibus fuisse nuncupata, quòd geminis<sup>i</sup> capitibus, quemadmodum femur inferiori sede donentur. & potissimum prima quatuor digitorum ossa, quæ in luxationis restitutione, manu in pugnum acta, humerum extrorsum, & dein sursum præcipuè ducunt. Cæterum Galenus in primò de Musculorum motu, *κύνδυλον* appellat, depressum ossis capitulum, quando *κεφαλὴν* seu caput, *κτύλην* seu acetabulo, profundo uel seu alto sinui confert: *κύνδυλον* uerò, seu depressum, minimeq; extuberans & planum capitulum, *γλῶυν*, quam sinum esse dicimus, adeò leuiter in ossè cælatur, ut an sinus, an capitulum sit, diiudicare uix possis. Atq; in hunc modum à primis dissectionum professoribus, *κύνδυλον* nomen proculdubio institutum fuit. quamuis interim facile curauero, ne hoc nomen quicquam obscuritatis alibi in nostra oratione pariat: quum non minus promptum fuerit, obscurè & leuiter extuberans capitulum, aut internum externum uel femoris iuxta genu caput, dicere, quàm ambigua uoce condylum, uel nodum, uel quippiam simile sermoni inferere.

*κεφαλὴν.*  
*αὐχλὸν.*  
*Collum.*  
*Cervix.*

*τράχηλον, & αὐχρῖα*, Latini collum & cervicem nuncupant, his uocibus ossis partem, quæ collo nostro respondet, significantes. Collum namq; & cervix tenues ossium sunt processus, quorum extremum crassius redditum, in ossis caput finitur. Huiusmodi ceruices nullibi perinde conspiciuntur, ac in<sup>a</sup> femore, iuxta ipsius caput, coxædici ossi inarticulatum. Dein in maxilla inferiori adeò insignis<sup>b</sup> ceruix se offert, ut & caput inferioris maxillæ, ceruicis nomine ab Anatomis subinde donatum fuerit. Quinetiam in talo quoq; ceruix apparet, ante orbiculatum ipsius caput conspicua, quod nauiformi ossi inarticulatur.

*Galenus in libro de ossibus.*

Ad hæc, pedij & postbrachialis ossa, quæ digitis coarctantur, ceruices ostendunt. In reliquis autem ossibus illæ non æquè manifestò conspiciuntur. Cæterum aliquando non modò tenuiores ossium partes in capita extuberantes, ceruices dicuntur: quinetiam & tenues processus ita uocantur, qui latiores dein redditi, sinum constituunt, cui aliud os coarctatur. quod si in aliquo ossè conspicitur, sanè in scapula est manifestissimum: cuius<sup>a</sup> arctior pars ante sinum cui humerus inarticulatur posita, ceruicis quoq; nomen ab Anatomis professoribus obtinuit. *κτύλην, & κτύλην δέναν*, ac insuper *ὀφθαλμόν*, Latini in ossium descriptione (nulla namq; nobis modò mensurarum est ratio) acetabulum & acceptabulum, & uulgò pyxidem, & interdum buccellam uocant: his nominibus sinus indicantes, qui altius profundius uel descendunt, excavanturq; ac ossium capita excipiunt. Obseruatur autem eiusmodi sinus<sup>f</sup> in coxendicis ossè, quo femoris caput admittitur: dein<sup>g</sup> in ossè cymbam referente, in quem tali caput ingreditur. Neq; sanè in uniuerso corpore alij sinus, quibus ossium capita inarticulantur, illis duobus profundiores existunt. Verum arbitror à primis dissectionis professoribus, non solum insigniter profundos sinus acetabuli nomine appellatos esse, sed omnem sinum alterius ossis caput excipientem: modò quiuis illum primo intuitu sinum esse attestaretur. *γλῶυν* autem oculus sinus (quantum coniector) forma sinus dicitur, qui leuiter & superficietenus tantum

<sup>i</sup> G. H. f. 2.  
cap. 27.

<sup>a</sup> fig. A. &  
B. h. h.

<sup>b</sup> fig. C. i. &  
1, 2 fig. cap.  
10 B.  
<sup>c</sup> in pede h.

<sup>d</sup> in pede  
h. h.

<sup>e</sup> 1, 2 fig. ca.  
21 C. D.

<sup>f</sup> fig. D.

<sup>g</sup> 11 fig. 35  
cap. h.

*Galenus in libro de ossibus.*

*κεντρον.*  
*ὀφθαλμός.*  
*Acetabulum.*  
*etc.*

*γλῶυν.*



tantum cautus est: ac talis occurrit, ut ignores num aliud os admittat, aut aliud os subeat, nihilo secus quam si duo plañi læuigatiq; asseres inuicem imponerentur. atq; sic γλῶττι depresso responderet capiti, quod omnium primum

h p, p, p in  
pedes, c. 12  
fig. c. d. 33, 3  
n, a, m, b.  
i fig. 10. c. d.  
33. n, m, l.  
h 6 fig. 25  
cap. 33, l.  
K.  
I Y c. 12. c. d.  
fig. c. d. 15  
cipit c. quin  
te fig.  
m 7 fig. 31  
cap. F, G.  
κόνδυλος nuncupatū esse arbitror. Tales sinus habentur in<sup>a</sup> tarfi ofsisibus, quae pedij ossa ipsis coarctantur. Item<sup>a</sup> ofsis cymbam referentis sedes, quibus id tarfi ossa excipit, huiusmodi quoq; sunt: ut &<sup>a</sup> brachialis ofsium nonnullæ, quibus postbrachialis ossa articulantur. Præterea in prima ceruicis uertebra, ubi hæc depresso secunda uertebra capitula admittit, uix cauat illi sinus occurrunt. Verum hæc non ita dico, quasi inhibere uelim, sinus quosdam (qui etsi manifesti sinus formam præferant, tamen non admodum profundè insinuantur) etiam γλῶττι appellari. Nollem enim cōtentiose rixari, num tibiæ ofsis<sup>m</sup> sinus, quibus inferiora femoris capita insident, κόνδυλος aut γλῶττι nomen mereantur. Attamen si articulationis species diligēter discusserimus, meritisimò κόνδυλος uocabimus apparentē sinum: γλῶττι uerò, sinum adè obsecrum, ut ambigamus an uerè sinuum numero ueniat adscribendus. Quamobrem autem sinus nunc leuiter, nunc profundè insculpantur, sequenti Capite, quod ofsium commissurarum differentias explicabit, ostendemus: quandoquidē articulationis gratia tam sinus quam capita formentur. Hic autē suffecerit nomina duntaxat declarasse: & si cui interim uisum fuerit, licebit & alias quasdam sinuum differentias hic quoq; sermوني obiter adijcere. Quippe præterquam quòd alij altè, alij uerò in superficie tantum inciduntur, alij rotundi orbicularesq; sunt, ut co-

Sinum differ-  
entia.

n fig. D. n.  
o 1 fig. c. d.  
27 D.  
p 8 fig. 24  
cap. x. c. d. 7.  
q 2 fig. c. d.  
15 N.  
r 1 fig. c. d.  
6 b.  
s 2 fig. 27  
cap. 1, K.  
t 2, 3 fig. 23  
cap. K, l.  
M.  
u 1 fig. 24  
c. d. E, C, D.  
xendicis ofsis<sup>i</sup> sinus, femoris caput excipiens, & digitorū ofsium<sup>n</sup> sinus, quibus postbrachialis ossa inarticulātur. Alij autē oblōgi sunt, ut radij<sup>p</sup> sinus, brachiale admittens: & primæ uertebra<sup>q</sup> sinus, qui occipitis ofsis capitula excipiunt: & maxillæ superioris<sup>r</sup> sinus, admittendæ inferiori maxillæ parati, in horū quoq; sinuum numero repōnuntur. Alij gemini sunt, ut tibiæ ofsis sinus, quibus inferiora femoris capita cōmittuntur: dein digitorū ofsium<sup>s</sup> sinus pleriq; gemini quoq; censentur. Alij trochleis rotulisq; respondent, ut humeri<sup>t</sup> sinus, ulnam mutuò admittēs. Alij C referunt, ut<sup>u</sup> sinus ulnæ, quē humerus ingreditur. Cæterum ut sinus & capita articularum gratia constituuntur, ita quoque & τῦνδ, ὀφρῦνδ, ἄμβωνδ, χεῖλη, quæ Latinis supercilia & labra nuncupantur. Sunt autem processus ad sinuum orbem instar laborum prominentes, sinuumq; profunditatem augētes. Hi tametsi in omnibus articulis ferè & ofsium commissuris conspicui sint, euidentissimè tamen ipsorum naturam in profundissimis finibus ostendunt. Quare etiam in coxendicis ofsis sinu, cui femur inarticulatur, altissima, maximeq; prominentia uidentur<sup>a</sup> supercilia, ut sinum impenitus cauum redderent, femorisq; luxationē accuratius prohiberēt. Quo minus enim ossa promptè luxentur, supercilia in primis conducunt. βαθμῖδς autem, sinus quidam esse creduntur, qui basis firmamētūq; ritu, ultrà quàm animanti ex usu sit, os moueri haudquaquam sinunt. In<sup>b</sup> anteriori enim humeri sede, & in<sup>c</sup> posteriori sinus exculpitur, ulnæ<sup>d</sup> processum excipiēs. Anterior namq; sinus priorem ulnæ admittit processum, quando cubitus extremè flectitur: posteriorem autem sinū posterior ulnæ processus in cubiti extensionibus ingreditur. Quoniam itaq; posterior sinus in anteriorem non est peruius, hi ulnam ultrà quàm expedit, haudquaquā moueri sinūt. Si enim essent peruij, neq; processibus obuiam irent, cubitum æquè in acutum angulum extenderemus, atq; modò flectimus. Atq; ita primi dissectionum professores, hos sinus βαθμῖδς uocarunt: quamuis Hippocrati non huiusmodi tantū sinus ita appellentur, uerum etiam reliqui, quibus ofsium capita passim inarticulantur. Vlnæ namque<sup>e</sup> sinum, C

trus.  
opos.  
ambone.  
cheiln.  
Supercilia.  
Labra.

βαθμῖδς.

c modo

e 1 fig. c. d.  
24 C, E, D.

Libro de Fra-  
cturis.

Sinus articu-  
lionis nomine  
non parati.

modo exculptum, & quem humeri orbita subit, *basilide* nuncupauit, quem admodum alij totum cubiti cum humero articulum. Illi quos paulo antè in humero narrabam sinus, id priuatim sibi uendicant, quòd illi ferè soli omnium si nuum alterius ossis processus in articularum motibus excipientium, cartilagine uix incrustentur: quemadmodum alij pleriq; ossium sinus, articulandis ossibus non parati, sed solum in hoc incisi, ut ligamenta aut musculi in ipsis ualidius aptioriq; sede inserantur, & interdum quoq; aliqua ex iisdem initium com modius ducant. Cuiusmodi sinus in interno latere magni externiq; processus femoris obseruatur, & in talo & calce, in medio duorum articularum, quibus hæc ossa inuicem coarctantur. At hæc omnia (quemadmodum & sinus, quibus tendines uehuntur, atq; ne sua aberrent sede, continentur, quales in externa radij sede iuxta brachiale non pauci occurrunt) in priuatis ossium descriptionibus magis erunt obuia: & si aliud quoddam nomen, quo in ossium descriptione utendum erit, hic prætermiserim, id sequentibus Capitibus recensebo. Vereor enim ne ista, utcumq; utilis sit, ante ossis cuiusq; enarrationem prolixitas, ab Anatomæ studio aliquem properandi cupidum deterreat, isq; non mediocri dispendio aliud perquirat compendium. Quamuis non minus Galeni librorum occasione, quàm quæ subsequetur ossium descriptionis gratia, in hunc modum nomina prælibauerim.

f. fig. cap.  
30 R.  
g. 4 fig. 33  
ca. T. I. et  
7, 8 h. V. V.  
h. 2 fig. ca.  
24, 25, 26, 27.

DE OSSIVM CARTILAGINVMQVE INTER  
se structura & contextu. Caput IIII.



SSA humani corporis instar unius continuiq; ossis, lapideæ cuiusdam statum modo, simul confingi construiq; nequierunt. Nam etsi ita quidem hominis fabrica iniurijs minus foret obnoxia, & ipsius ossa firmiorem adipiscerentur sedem, neq; luxari ac distorqueri possent: tamè quia homo motu (qui animali maximè, si quid aliud, proprius censetur) neutiquā destitui debuit: et quum motus citra ossium diuisiones commissurasq; haud perficiatur, hominem è multis ossibus fabricari admodum conduxit. Quinetiam ossa inuicem componuntur non tantum motus gratia, sed etiam alicuius corporis transitus occasione, aut securitatis, seu noxas melius ferendi causa, aut partium diuersitatis nomine. Propter motum quidem digitorum ossa inuicem committuntur, deinde ulna & radius cum humero, & humerus cum scapula, & femur cum tibia, præter eiusmodi innumeros ossium connexus. Transpirationis uerò seu transitus alicuius corporis gratia, suturas capitis efformari, tunc dicam, quando has fortè fuliginosa cerebri recrementa transmittere, & duræ cerebri membranæ fibris uiam præbere doceo, ex quibus membrana caluariâ obcingens conflatur. Pariter quoque & in capitis futurarū sermone, caluariam non uno osse, sed pluribus efformari audies, ne fortè hæc quapiam ex parte læsa, latè rumpatur, uertumq; ueluti in fictilem ollam longius quàm ad ossis circumscriptionem pertingat, sed ut ipsum unà cum osse ad futuram terminetur. Ad hæc, propter partium differentiam, uerticis ossa utcumq; mollia duris temporum ossibus committi, in eorum ossium commissurarum sermone intelliges. Omnia igitur ossa simul cum cartilaginibus inter se sunt cõtigua, neq; os ullū (nisi aliquod in cordis basi cõstitat) seorsim per se habetur: sed aut pars cõtiniua est, aut aliud os, mediâte subinde cartilagine, contingit, alteriq; adnectitur: adeò ut sagax rerū parens Natura, ossibus

Hominem pluribus ossib. constare, motus gratia.

Transitus alicuius, seu respirationis gratia.

Gratia difficultatis patiendi.

Partium differentie gratia.

250

Galen. 11. de Vi. et 12. et 13. in Comm. 498.

ofsibus simul cum cartilaginibus ipsis adnatis, tanquam uno continuoq; & tanquam pluribus ad commemoratos usus hominem uti uoluerit. Cæterum ut uarius compositionis ofsium usus est, ita quoq; multiplex eiusdem est ratio.

Primùm itaq; uoluntarij motus gratia, ofsium naturalis fit compositio, quæ à Græcis ἀρθρωσις & ἀρθρον, nobis articulatio articulusq; nuncupatur. Verùm motus huius in omnibus articulis non idem est modus: quandoquidem alij motus euidentes sunt, neque quenquam latent. Nemo enim non caput super colulum moueri sentit, femurq; ad coxendicis os, & manum ad cubitum. Atq; hæc articulationis species euidentem motum ostendens, *δυσάρθρωσις* dicitur, quasi laxa esset dearticulatio: quemadmodum & Hippocrates eam ἀπάρθρωσις, quasi ab articulationem, uocauit. Quorundam articulorum neq; ualidis, neq; manifestis, sed obscuris, adeoq; difficilis latensq; motus sentitur, ut is neutiquam à singulis promptè diiudicari queat. Cuius enim postbrachialis ofsium ad brachialis ossa coarticulationis motus non est obuius: si tamen in planam superficiem primùm digitos extenderis, ac indicem dein, minimumq; digitum medio & annulari instar X, seu decussatim subieceris, digitorumq; radicibus ueluti semicirculū statuere coneris, postbrachialis ossa non prorsus immobilia apparebunt. Atq; idem quoq; in brachialis ofsium inter se commissuris, & calcis cum talo, taliq; cum osse cymbam exprimēte, ac rursum huius cum tribus interioribus tarfi ofsibus, & calcis cum tarfi osse cubum referente, tarfiq; ofsium cum pedij ofsibus nexu, usuuenit. Harum namq; commissurarū uel maximos motus, nisi mente sedulò adhibita, animaduertes. Vocata est autem hæc articulationis species, *συνάρθρωσις*, quasi coarticulationem dixeris, quæ solius motus quantitate à dearticulatione discrimen recipit. Cæterum utramq; articulationis speciem Natura non simplici cōpositionis genere nexuit, quemadmodum etiam neq; omnibus articulis par motus forma attribuitur. Alij enim flectuntur & extenduntur, atq; in hoc illudq; latus adducuntur & abducuntur, ac demum ueluti in gyrum quoq; circumuertuntur. Femur enim & brachium hos motus ostendunt. quippe brachium pectori adducis, & retrorsum ad dorsum agis, dein sursum ad caput moues, deorsumq; ad ilia fers: ac demū circumagis quoq; quum pollice in mensam fixo, reliquis digitis circulum quàm potes maximè moliris. Ita & femur antroorsum retrorsumq; & introorsum ad aliud femur, & extroorsum ab alio ducis, et circumuertis pariter, quum calce in terram firmato, quasi circulum factururus, digitos huc atq; illuc in latera agis. Hoc enim pacto circūuersionis motum subaudire cōuenit: non autem quum brachium modò antroorsum, modò sursum, modò retrorsum, modò deorsum, succedentibus motibus ueluti in circulū, ac quasi funda lapidem emissurus, moues. Alij articuli duntaxat flectuntur et extenduntur, atq; in latera mouentur, omnis motus circumuersionis expertes: ut prima digitorū internodia, & ipsum brachiale quā cubito iungitur. Alij uerò flectuntur & extenduntur, simulq; circumuertuntur, nullum interim in latera motum sibi uendicantes: ut radius ad humerum flectitur & extenditur, ac etiam circūuertitur, seu in pronom supinumq; agit. Alij solum flectuntur & extenduntur: ut ulna ad humerum, & tibia ad femur, & secunda & tertia quatuor digitorum internodia, & tertium pollicis. Alij duntaxat circumuertuntur: ut prima ceruicis uertebra supra secundam, uelut ad axem cum uniuerso capite circūuoluitur: & radius supra ulnam, non nisi in pronom supinumq; circumuersionis motu ducitur. Quoniam igitur omnes articuli non simili pollent motu, nequaquam mirum uideri debet, diuersa quoque compositionis forma seu specie eosdem necessariò compingi.

Quibus commissurarū differentijs ossa inuicem cōpinguntur, et quæ harum motū edunt.

ἀρθρον.

Articulus.

Motus. Quæ Articuli motus edunt.

T. manifestus. I. flectuntur.

δυσάρθρωσις.

Lib. de Artic.

et latera uoluerunt.

συνάρθρωσις.

Coarticulatio.

Articulus omnes non eisdem agimotibus.



Tres articulo-  
rum forma.

ὁ ἀρθρωσις.

ἀρθρωσις.

γίγγλυμος.

Ac species hæc est tripartita, & à uetustissimis Græcorum triplici uoce fuit do-  
nata, *ἡ ἀρθρωσις* uidelicet, *ἀρθρωδία*, & *γίγγλυμος*. Quanquam fortassis hæc nomina  
à Diocle, & illis qui primùm refecandi rationem cōmentarijs tradidere, post-  
modum fuerint confusa. *ἡ ἀρθρωσις* itaq; articulationis speciem significabat, in  
qua excipientis ossis cauum sinus<sup>a</sup> ue altus, & acetabuli modo exculptus est, ca-  
put autem quod illi inarticulatur extuberans. adde & sinum in hac articulatione  
nis differentia similiter ac caput esse simplicē, unicū scilicet sinum, & unum  
caput,<sup>b</sup> perinde ac in femoris articulatione cum coxendicis osse,<sup>c</sup> & in humeri  
cum scapula,<sup>d</sup> & postbrachialis pedijq; ossium cum primis digitorum ossibus  
fieri conspiciamus. Commemorati modò articuli manifestis pluribusq; moti-  
bus donantur. Femur enim & humerus flectuntur ac extenduntur, & ad late-  
ra ducuntur, ac dein circumuertuntur. Prima autem digitorum ossa non cir-  
cumuertuntur, ut neq; <sup>e</sup> brachiale in radio circūuertitur, etsi haud secus quàm  
illa digitorum ossa flectatur & extendatur, & in latera quoq; agatur. Præterea  
radius quantumuis ad humerum flectatur, & extendatur, & insuper circum-  
uertatur, motu tamen destituitur laterali, quòd Natura priuatim horum arti-  
culorum, qui etiam inarticulatione componuntur, capita non adamussim ex-  
truxit rotūda, idq; magni alicuius beneficij, ut suis locis docebimus, occasione.  
Natura enim etsi hanc articuli speciem in simplicibus articulis tum semper  
machinetur, quum pluribus simul motibus ossa moueri cupit, non tamen om-  
nibus mox inarticulationibus triplex motuum genus tribuit: at tertium ple-  
runq; genus, quo non indigebant, peculiari structura ipsis abstulit, qua interim  
articuli consiluitur robori: isq; ualidior, & minus luxationi expositus redditur,  
quàm si ea constaret fabrica, cuius ope triplici motuum differentia polleret.  
Quanquam interim inarticulatio, non tantum in articulis manifestissimos  
motus edentibus spectatur, sed tali etiam rotundū caput (ut & obscurorum  
motuum quædam proponantur exempla) ossi cymbam referenti inarticula-  
tur, perinde ac quædam brachialis<sup>f</sup> ossa inuicem, non minus quàm secundæ,  
tertiæ, quartæ, & quintæ, sextæq; costarum cartilagine pectoris ossis sinibus  
hac articuli specie<sup>g</sup> committuntur. *ἀρθρωδία* species articuli est, quæ unius os-  
sis cauum sinum<sup>h</sup> ue leuiter tantum, ac ueluti superficietenus exculptum ha-  
bet, & alterius ossis caput depressum, uixq; extuberans adipiscitur, perinde ac  
si planæ quodammodo superficies hunc contextum efficerent. Vti enim in  
enarthrosi, quis sinus caputq; sit, iudicatu est facillimū: ita è diuerso in arthro-  
dia, utraq; adeò obscura sunt, ut ignores cui nam ossi sinus aut capitis nomen  
opportune debeas ascribere. Hac specie cōmittuntur tria interiora tarfi ossa,  
cymbam referenti ossi, & <sup>i</sup> pedij ossa tarfi ossibus, nonnullaq; brachialis ossa  
postbrachialis ossibus, dein <sup>j</sup> quartum brachialis os tertio brachialis ossi, & <sup>k</sup> cla-  
uicula superiori scapulæ processui. In quibus commissuris adeò obscuri sunt  
motus, ut perquàm arduè sentiri deiudicariq; possint. ita sanè, ac si Natura  
hanc articulationis differentiam in simplici unicoq; duorum ossium articulo  
fabricaret, quum uix tantillum os moueri statuit. *γίγγλυμος* manifestis sinibus  
capitibusq; perficitur, sed nequaquam simplicibus, una<sup>l</sup> ue tantum superfi-  
cie, aut gibba, aut caua, aut plana cōstantibus. Occurrit enim ginglymos, quum  
mutuo ingressu ossa inuicem iunguntur, sic ut unius ossis gibba, alterius caua  
subintrent: & rursus unius ossis sinus, alterius gibba admittat. perinde ac ostio-  
rum fenestrarumq; cardines, à quibus tertia hæc articuli species nomen inue-  
nit, contextuntur. Atque ut illorum duæ præcipuæ spectantur differentiæ, ita  
quoq; mutui ossium contextus, duplex est potissimum ratio. Cardines enim,  
quibus

a Immissū  
hic finge A  
1, 2 fig. 30.  
cap. in c, g,  
f. 1 & 2 fi.  
29 capitis.  
b 1, 2 figu-  
rarum cap.  
23 in A, B, 2  
figura cap.  
21.  
c 1 tabella  
fig. cap. 27  
C in D.  
d characte-  
res 1, 2, 3, fi.  
1, 2 ca. 25 in  
x, y, z, fi. 1  
cap. 24.  
e q fig. ca.  
24. O ad P  
1 fig. ca. 22.

f iunge  
3 fig. ca. 33  
in h. 11 fig.  
cap. euulsi.  
g 2 fig. ca.  
25 chara-  
cter 7 in 1.  
h ac si B 3  
fi. ca. 29 in  
mitteres in  
x aut y fi. 6  
cap. euulsi.


i iunge fi.  
4 fig. 33 ca.  
33 cū u, m, l  
fig. 10.  
k fig. cap. 3  
q, q ad p, p.  
l char. o ad  
111, 1111  
fi. 2 ca. 25.  
m fig. 1 ca.  
25 char. 4  
ad 3.  
n 3 fig. ca.  
22 Q ad L  
1 fig. ca. 21.

quibus plerunq; duo afferes inuicem hærent, sic mutuò gibbi sunt & caui, ut unius ferri gibba in alterius ferri caua suscipiantur, & unius caua alterius gibba admittant, & clauus dein omnia simul gibba permeet. Cardines uerò quibus

ostia aut fenestræ parietibus firmantur, ita se habent, ut ferrum rectà parieti infixum, tereti & tanquam ex perpédiculo sursum ducto emineat tubere, quod cauum ferri ostio fenestræ uel clauibus firmati orbem subingreditur, adeò ut cauus ille orbis seu anulus aut uertebræ teres excipiat tuber, & ferrum ex quo id educitur, uertebræ illam mutuo ingressu admittat. Ad imaginem

itaq; priorum cardinum (° præcipuè si alterum ipsorum ferrum, unum duntaxat in sui medio gibbum habeat, & suprà infraq; excisum sit: alterum uerò duo ostendat gibba, in eorumq; medio excauetur) secundi & tertij quatuor digitorum manus & pedis committuntur<sup>o</sup> articuli, & præter alios quâplurimos, femoris ad tibiam<sup>o</sup> articulus. Vnum namq; horum articularum os duo habet capita in medio sinu quodam dirempta: alterum uerò duos obtinet sinus, in medio tubere quodam distinctos. atque ita duo unius ossis capita, alterius ossis binos subeunt sinus: & unius ossis sinus, alterius ossis tuber admittit. Ad secundi autem cardinis formam, ulna uidetur humero coniungi, quum orbicularis ulnæ sinus ad humeri orbitâ rotulam uel flectitur & extenditur, seu alioquin aduoluitur. quamuis insuper & in hoc articulo pleraq; cum priori cardine conueniant. Molitur autem Natura mutuos istos contextus, quum articularum robori in primis uult esse cõsultum, uni q; tantum motui illos præesse sat est. quod nuper commemorati attestantur articuli, quos tantum flectere extendereq; possumus, nullo alio interim indigentes motu. Cæterum dictos hætenus Naturæ in tribus articularum speciebus formandis scopos, in articulis subaudire conuenit, qui simplices ac unici tantum in duorum ossium applicatione occurrunt. Non uulgaris enim pluribinde usus occasione impedita, duo ossa simplici articulo neutiquam committere potuit, sed duos, ac interdum quoq; plures à se inuicem distantes, neq; sibi continuos nexus articulos uel effinxit. Vt enim in media cubiti longitudine radius ab ulna plurimum non leui sanè causa dehisceret, ipsa<sup>o</sup> duplici articulo, non autem simplici per totam cubiti longitudinem tenso, radium ulnæ commisit: iuxta cubiti quidem flexum, radij<sup>o</sup> capitulo<sup>o</sup> sinum ulnæ subeunte, & iuxta brachiale, ulnæ<sup>o</sup> capitulo in radij<sup>o</sup> sinum articulato. quum interim duobus illis ne xibus radius tantum circũuertatur, seu in pronom supinumq; ducatur. Dein propter dorsalis medullæ transitum, occipitis os primæ uertebræ duplici articulo necitur, utroq; ad inarticulationis speciem quodammodo extructo: & tamen illius beneficio, caput supra primam uertebram, meritò ob structurę in distantibus inuicem articulis rationem, in posteriora & anteriora tantum agitur. Insuper<sup>o</sup> prima uertebræ, supra secundæ uertebræ corporis latera, duabus ueluti arthrodijs, seu planis contextibus, iungitur: & secundæ uertebræ dens, primæ uertebræ quodammodo inarticulatur: attamē tribus illis articulis prima uertebræ cum capite supra secundam, duntaxat (uti suis locis cõtra Galeni sententiam docebimus) circumagitur. Ad hæc, quia dorsalis medullæ quoq; gratia, cæteræ dorsi uertebræ perforandæ, & simul multæ constituendę fuerant, Natura non simplicibus nexibus articulisq; in duarum uertebrarum compo-

Superiori figura cardo exprimitur, quo hic duos afferes herere scribimus. ac A unum indicat ferrum, B alterum,



notat parieti infixum, E autem ferrum quo ossis aut fenestræ clauus affigitur.

que clauo C indicato, ad mutuum ipsorum ingressum firmantur.

Inferiori figura alius delineatur cardo, in quo D ferrum

Qui Natura in terdum duo ossa pluribus articulis cõmisit.

tione est usa. præter contextum enim rarum & peculiarem, quo uerterbarum<sup>b</sup> corpora non læui lubricoq; ut cæteri omnes articuli, attactu, compinguntur, à secunda ceruicis uerterbra ad duodecimam usq; thoracis, arthrodia quodammodo subditæ uerterbræ ascendentes nobis appellandi processus, superpositæ seu incumbētis uerterbræ descendētib; processibus submittuntur. Verūm interim hæ uerterbræ præter manifestam flexionem & extensionem, etiam motum in latera experiuntur. quemadmodum & lumborum uerterbræ, quæ perinde ac duodecima thoracis descendētib; processibus, in subditæ uerterbræ ascendentes processus enarthrosi articulantur. Cæterum quid Galeno in

Libro de ossibus, & 3 lib. Commentar. in Hippocr. lib. de Artic.

Quæ ossis commissuras diffinitio nulla prædita sunt motu. γινώσκουσιν.

Cap. 9 libri 2 de Partibus animalium.

ἰσχυρὰ. Sutura.

Serrata commissa.  
p. 39.  
Dissar unguinis commissura.  
p. 4.  
Asserum nexu.

Limborum sutura insulata.



Cæterum posteriores, futuræ formam accuratius quam priores explicant. quemadmodum omnium proximè eam afsimilant, qui futuras ad limborum futuræ effigiem cōferunt, quando, ut de unguibus diximus, panni unius flosculi in alterius sinus mutuis ingressibus consuuntur. Eiusmodi futuræ ossa capitatis magna ex parte compinguntur: & inter reliquas semper futuræ speciem elegantissimè ea ostendit, quam A literæ in occipitio comparamus. ἀγροναῖα ossium structura est per simplicem lineam, citra omnem tuberis, sinus, & asperitatis

b fig. ca. 14.  
R. K. Atq;  
ita de in-  
ceps spectat  
illam figu-  
rā & alia  
trium subse-  
quentium  
dein cap.  
ad process-  
us ascen-  
& descen.

c quæstio-  
flares 3 fi-  
gura ca. 19  
S, T, V. ut  
T primum  
sit, 2, V, 3.  
d Immitte  
dentium se-  
rie A. A no-  
tatum si. ca.  
11. in quar-  
tā fig. ca. 6.

e Expēde  
qui in 3 in-  
tegrari si.  
a inter o  
et a consi-  
lit.

f 1. 6. ca.  
A, B, C.  
D 3. 6. ca.  
g B in ter-  
tia integra  
tumi.



b. fi. ca. 12  
 42. ad f. tatis mutuū ingressū commissā. Ad hunc<sup>h</sup> modum quædam maxillæ su-  
 perioris ossa, & præsertim nasi inter se iungi putantur. Cæterū quia harmo-  
 niæ connexus uix unquam ad amulsim instar simplicis lineæ perficitur, sed  
 nonnullæ asperitates mutuò ingredients, perpetuò ferè cum ossa rumpun-  
 tur, in harmonia occurrunt, pleriq; futurarum uoce etiam harmonias pluri-  
 mū complexi uidentur. *σύνφωσις* est naturalis ossium unio, qua commissu-  
 ræ forma appendices suis ossibus connascuntur, in ætate quidem minoribus,  
 i. fig. ca. 40  
 li. scilicet 1,  
 2. 45. quū ossa adhuc mollia fungosaq; existunt, cartilaginis interuentu: in gran-  
 dioribus uerò, ubi iam ossa indurere, appendices citra alicuius corporis inter-  
 uentum ossibus ad eū uniuntur, ut coalitus lineæ uix coniungere queas. Hac quo-  
 que unione, ossa sacri ossis lateribus commissā, inuicem<sup>k</sup> in pube coalescunt.  
 k. i. figura  
 integræ r. Dein admodum pueris utriusq; lateris os tribus formari ossibus apparet, quæ  
 tribus lincis in coxendicis ossis acetabulum concurrentibus interstinguuntur:  
 ut etiam in agnis uidere est, in quibus cartilago lineas has sicut in pueris inter-  
 cedit. in paulo autem prouectioribus tres illæ partes ad eū connascuntur, ut ne  
 linearum quidem species se offerat. At de his ossibus, ipsis dicendo Capite per-  
 tractabitur: quemadmodum & de uertebis, quæ in pueris quoque pluribus  
 constant partibus. quemadmodum & occipitis os, & alia corporis pleraq; quæ  
 alioquin unius ossis nomine ideo habentur, quòd coalitus imago planè in æta-  
 te prouectioribus lateat. Libri Introductorij, seu Medici, qui Galeno ascribi-  
 tur, author, ossium disciplinam instituens, non eiusmodi unionem, quam nos  
 iam descripsimus, *σύνφωσις* uocat, uerū futuras ad harmoniam quodammo-  
 do accedentes. Maxillæ enim superioris ossium cōmissuras, *συνφύσεις* (at non  
 rectè interim) appellat. Omnes ossium constructuræ species, aut alicuius, *Quorum bene-*  
 i. fig. cap. 1  
 lib. 2. aut nullius corporis beneficio committuntur. Vniuersi namq; articuli, *ficio ossa inuicē*  
 lib. 2. P. mentis inuicem alligantur, quæ orbiculatim ossa inuestiunt. interdum uerò  
 n. fi. ca. 14. & hæc in ossium medio consistunt,<sup>n</sup> ut in femoris cum coxendicis ossē articu-  
 R. R. lo, & in uerteburarum corporum<sup>n</sup> nexu. Hic ossium connexus, ligamentorum  
 auxilio commissus, Græcis *συνσύνφωσις* nuncupatur: nerui interim uoce ad liga-  
 menta propriè dicta, & ad tendines, nervosq; qui à cerebro dorsaliq; medulla  
 prodeunt, deducta. Hæc namq; omnia ueteres, ut & uulgus hodie, nerui nomi-  
 ne subaudierūt: & præcipuè Aristoteles cū aliàs semper, tum maximè quum  
 ossium recenset contextum. Nonnulla uerò ossa carnis etiam ope commit-  
 tuntur,<sup>o</sup> ut generatim omnes articuli musculis obducti. Musculi enim quum  
 ab uno osse plerunq; principium ducentes alteri inserātur, uinculorum etiam  
 loco iure habentur, ossaq; inuicem nectunt. Cæterū quia musculi ueteribus  
 plerisq; & potissimum Aristoteli, carnis nomine appellantur, connexus qui  
 musculis fit, *συνσύνφωσις* meritò nuncupatur. Porro & dentes quoq; in suis al-  
 uiculis carne quapiam firmari uidentur, ad eū ut ea quasi ratione, ossium con-  
 structio reperiretur, in qua caro non duntaxat musculorum modo cōnexum  
 exterius ambiret, sed & interueniret quoq; Insuper alia cartilaginis medio con-  
 nascuntur. quippe<sup>p</sup> appendices in prima ætate cartilaginis interuentu suis ossi-  
 bus committuntur, quemadmodum & pubis ossa, & ossis uimitantis ossicu-  
 la. Hæc connexus species à cartilagine *συνσύνφωσις* uocatur. Suturae autem &  
 q. i. fi. inte-  
 grarum 1. harmoniæ nullius corporis beneficio, quàm ossium structuræ coeunt. Nam  
 r. fi. 1. 2. ca.  
 13 G. & si duræ cerebrum inuestientis membranæ fibræ aliquot futuras transeant,  
 non tamen ob id eas connectunt: quemadmodum neq; cartilagine in articu-  
 lis ossa oblinentes, ad ossium firmitatem & connexum quicquam auxiliantur.  
 Præterea in senioribus appendices non amplius cartilaginis, quæ glutinis ut-

*σύνφωσις.**Quorum bene-  
ficio ossa inuicē  
committuntur.**Ligamentorum.  
συνσύνφωσις.**Lib. 2. de Part.  
anim. cap. 9.**Carnis.  
συνσύνφωσις.**Cartilaginis.**συνσύνφωσις.  
Quæ nullius  
corporis inter-  
uentu commit-  
tantur.*

cem subeat, interuentu ofsibus connascuntur, sed cartilagine prorsus deperdita, adeò committuntur, ut, quemadmodum iam antea quoq; dixi, coalitus regionem obseruare arduum sit. Institutum modò erat huic Capiti finem imponere, atq; ad singulares ofsium descriptiones sermonē dirigere, nisi magnopere Galeni autoritas me remoraretur: quæ meritò prohibet, adeò leuiter ea quæ in præsentî Capite ab ipsius placitis deflectunt, prætergredi. Vt enim ex multis, præter prius etiam commemorata, aliquid proponam, primum ipsius dogmati non accessi, quo in libro de Ofsibus, futuram, harmoniã, & gomphosim, synarthrosis species esse docet. Ego enim synarthrosi obscurũ, & non manifestum ascripsi motum, iisdemq; articulationis differentijs ac formis illam atq; diarthrosin fieri commemorauî: deinde futuræ, harmoniæ & gomphosi non obscurum aut difficilem, sed nullum prorsus motum dedi, & has connexus species nequaquã articuli nomine cum Galeno sum complexus. quod profectò neq; ab ipso faciundum fuerat, nisi brachialis, & postbrachialis, & tarsi, & pedij, & costarum cum pectoris ossẽ cartilaginum constructionem suis locis enarrans, hæc per synarthrosin committi falso asserere uoluisset. Quum enim inibi uerè hæc ossa synarthrosi coarctari diceret, non ne animaduertendũ ipsi fuerat, hæc neq; futura, neq; harmonia, neq; gomphosi cõnecti? Quod sanè fieret, si modò synarthrosis species harmoniam, futurã, & gomphosim rectè statuisset. Verũ per me cuius integrũ erit, de synarthrosi ex suo arbitratu constituere: si interim non ignoret, hanc lógẽ secus plerũq; à Galeno accipi, quàm initio libri de Ofsibus. Nam uel in XIII, XIX, XXI, XXIII, Capitibus eiusdem libri, aliter quàm inibi, Galenus sentit. Deinde Introductorij seu Medici author, Galeni decreto non acquiescens, & sibi priuatim ofsium connexus diuidens, inquit: Ea aut ad motum componi, uocariq; eam cõpositionis seriẽm *αρθροποιον* seu articulum: aut ad nullum motum, ac tunc *συνάκθωσις* appellari: cuius species, futurã, gomphosim, & symphyfin enumerat. Verũ hac ratione brachialis, postbrachialis, tarsi & pedij ofsium compositionis synarthrosis accommodari nequaquam possit, quum neq; futura, neq; gomphosi, multoq; minus symphyfi inuicem connectantur. Insuper magis à Galeni dogmate recessi, quum omnes ofsium commissuras, aut alicuius corporis beneficio, aut nullius committi proponerem: quandoquidem Galenus id soli symphyfi, in libris de Ofsibus tribuerit, atq; synneurosin, synsarcofin, & synchõdrofin, symphyseos tantum species enumerauerit. Quòd autem illum non sim secutus, primã occasionem mihi ipsius parum uera præstitit oratio, qua fungosa molliãq; inter se nullis medijs per symphyfin connasci, sciciora uerò densioraq; nonnullis intermedijs coalescere docuit. Comperio enim in mollibus adhuc & teneris ofsibus, appendices cartilaginis interuẽtu suis ofsibus uniri: in duris uerò & assiccatis, & in senibus, nihil prorsus symphyfin intercedere. Deinde nulla prorsus mihi se exhibet symphysis, seu unio, quam ligamenti interuentu uerè unitam liceret asserere. adeò ut synneurosis sub symphyfi cõprehendi nequeat, dummodo nulla unio ligamenti ope perficiatur: uti sanè articuli ad unum omnes ligamenti beneficio coeunt, nunc (ut & antea dixi) orbiculatim obducti, nunc etiam in mutuo ofsium contactu interuenientis. Præterea ad amussim mihi singula perpendenti, multo adhuc minus symphysis sese obtulit, quam carnis interuẽtu committi quis rectè assereret. In nullo enim ofsium connexu caro intercedit, nisi fortassis in dentium cum maxillis cõnexu, qui gomphosis, non autem symphyfis censetur: quantumuis etiam ille dentium connexus nullum ostendat motum, non magis scilicet quàm harmonia, aut futura. At carnis in-

terim,

*Quæ potissimũ  
à Galeni placitis  
in hoc Capite  
declinant.*

terim, hoc est musculorum auxilio, omnes ferè committuntur articuli: quem connexum symphysis speciem nemo dicere possit. Ad hæc, Aristotelis quoq; locus secūdi libri de Partibus animalium, ut promptius à Galeno dissentirem, admonuit: ubi Aristoteles ossa nervis, carne & cartilagine committi affirmat, eum connexum uniuersim ad omnes ossium cōmissuras doctissimè referens. Quamuis etiam hanc Aristotelis sententiā Galenus haud oscitanter præterijt, quando eorum quæ in libro de Ossibus docuit immemor, ad finem secundi de Administrandis sectionibus libri, ossium constructiones perfunctoriè, licet sanè eleganter, percurrit, & quodammodo Aristotelis uerba recenset. Cæterum nunc tandem tempestiuum fuerit, priuatas singulorum ossium historias aggredi, ijsq; à structuræ capitis ratione, & uarijs eiusdē figuris initium ponere.


## CAPITIS STRUCTURÆ RATIO,

quotq; eiusdem figuræ. Caput v.

PRIMA FIGURA  
V. CAPITIS.

SECUNDA.

TERTIA.



QUARTA.

QUINTA.

## QUINQUE FIGURARVM QVINTI

Capitis index.

*PRIMA* figura, naturalis capitis seu caluarie forma, oblongam sphaeram utrinq; leuiter depressam representans, & anterius posteriusq; exuberans, delineatur.

*Secunda*, primam non naturalem capitis figuram demonstrat, in qua anterior eminentia perijt.

*Tertia*, secundam capitis figuram non naturalem ostendit, in qua anterior eminentia deperditur.

*Quarta*, tertia non naturalis capitis figura indicatur, in qua utrinq; tuber, anterius nimirum & posterius, intercidit.

*Quinta*, quartam non naturalem capitis figuram expressimus, in qua amba naturalis figurae eminentiae ad latera, non autem antrorsum retrorsumq; spectant.

HVMA-



Caput oculo-  
rum gratia for-  
matum.  
Lib. 8. de visu  
partium.



Quæ Natura o-  
culos minuit-  
rit.

Cerebrum ocu-  
loris gratia in  
capite locari, et  
deinde cerebri no-  
mine reliquos  
sensus.

Naturalis capi-  
tis figura.

V M A N V M caput, oculorum gratia efformari, cancro-  
rum, locustarum, & quorundam quæ capite destituuntur  
animalium oculos manifestò cōmonstrare, Galenus docuit.  
His siquidē oculi super processum prælongos locantur, neq;  
imi, quemadmodū os, nasus, & aures in pectore ipsis con-  
duntur. Oculos enim alta eguisse sedē, attestātur hostium  
incurfus, latronumq; speculatores, qui muros, montes, &  
altas tures eodem usu ascendunt, quo nautę nauium antennas, terram ocyus,  
quā qui subsunt in naui, conspēcturi. Commemoratis igitur animalibus tes-  
tacea & dura cute obtectis, integrum fuit oculos in oblongis processibus tutò  
reponi, quòd illi duriores erant futuri, & tunica extrorsum obduci poterant,  
quæ ab illorum animalium cute prognata, simul durissima & testacea esset. Ho-  
mini uerò, propter corporis substantiam, & mollem tenuemq; qua oculi inue-  
stiuntur, membranā, exquisitioremq; sensum, totos oculos necessariò mol-  
les habituro, hi prælongis processibus citra periculū apponi nequierunt. Quan-  
do itaq; in imo hominis oculos locare, non erat eorum functioni cōmodum,  
& nudis ceruicibus eos adnectere haudquaquam decebat, Natura nec oculo-  
rum usum prohiberi, neq; eorundem securitatē uitari uolens, partem extru-  
xit altam, & eleganter oculos ab iniurijs uindicantē. Superius enim palpebras,  
supercilia, & frontis os collocauit: inferius uerò, præter palpebras, malæ etiam  
& genæ oculos tutantur. Internis autem partibus nasus muri instar oculis in-  
teriectus est, exterius deinde ualidissimum os externum oculorum sedis angu-  
lum occupat, adēd ut editis ac extuberantibus undiq; partibus oculi sepiantur,  
utiliterq; ueluti in sinuosa ualle latitent. Cæterum horū quæ oculos muniunt  
coaceruatio & congeries, caput minimè est, quamuis etiam illa sine capite con-  
sistere nequeant. Quæ igitur fuit necessitas, hic quoq; alias cōponi partes, qua-  
rum fabrica capitis nomen meretur? Singula sensus organa, uisus nimirum, o-  
doratus, gustus, & auditus, quæ neruo indigent molli: neruo quidem, quòd il-  
le sit animalis spiritus facultatisq; uehiculum: molli autem, quoniam affici &  
disponi quodammodo oportet, ab extrorsum incidente sensibili. Quando ita-  
que oculi mollibus cerebri neruis indigebant, ac mollia omnia si ulterius pro-  
cederent promptè diuulsa frangerentur, offenderenturq; aut etiam uia longi-  
tudine plus æquo indurescerent, cerebrum iurē non procul ab oculis reponi  
debeuit. Atq; ita colligitur, cerebrum in capite locari oculorum causa, odoratus  
autem & auditus gustusq; organa propter cerebrum. Quāquam & hæc orga-  
na alioquin altissimam sedem opportunè fortiātur. Aures enim quum sonum  
percipere debeant, qui naturā in sublime fertur, rectē in altis corporum parti-  
bus locatæ sunt. Item nares, eo quòd omnis odor ad superiora ducitur, meritò  
fursum sunt: & quòd magnum cibi & potionis iudicium ad nares quoq; perti-  
net, non sine causa uicinitatem oris illæ sequuntur. Iam gustatus, qui sentire eo-  
rum quibus uescimur genera debet, cōmodè habitat in ea oris parte, qua escu-  
lentis & poculentis Natura iter patefecit. Tactus autem toto corpore æquali-  
ter fusus est, ut omnes ictus, omnesq; nimios & frigoris & caloris appulsus sen-  
tire possimus. Cæterum caluariæ<sup>a</sup> figuram maximè naturalem concinnamq; omnes definiunt,  
quæ instar sphaeræ utrinque in anteriora leuiter compressæ  
spectatur: ac ueluti compressionis occasione, anteriori parte multo angustior,  
quā posteriori, redditur. Formæ huius rationem Galenus ad cerebrum, re-  
fert, caluariam, quum cerebri sit<sup>b</sup> receptaculum, ac ueluti galea & propugna-  
culum, illius debere formam exprimere astruens: & addens pariter, qui poste-  
riori

a prima fi.  
e. pler. eq;  
6 cap. fig.

b Apparet  
id figuris se-  
re omnibus  
libri 7.

reriori cerebri parti cerebellum allocetur, dorsalisq; medulla illinc prodeat: anteriori uerò parte ad olfactus organa, & ad oculos à cerebro processus educantur. quum interim nos faciliè in septimo libro ostendemus, cerebrum nulla peculiari egiisse figura, & posteriorè eius partem retrorsum magis quàm ipsùm cerebellum<sup>e</sup> prominere, ac præterea processus illos olfactui seruientes, & uisibiles nervos ex cerebri basis quasi medio, noni autem ex anteriori ipsius sede initium ducere: adeò ut cerebri ratione nihil obstiterit, quo minus caluariam instar exacti globi, sphæræ<sup>e</sup> uel, utpote figuræ iniurijs repellendis promptissimæ, efformatâ cernamus. Verùm maxillæ superioris, & nasi, oculorumq; sedium, & temporalium musculorum habenda fuit ratio, & insuper connexus caluariæ cum dorso uertebra gratia, posteriorem capitis partem latiore capaciorèq; fieri decuit, si modo iusti ponderis haud negligenda erat occasio. Hippocrates porrò naturalis appellatæ nobis formæ causam in obstetrices nutricesq; uidetur reiecisit, quum asserit quosdâ oblonga capita existimasse esse pulchra, hosq; ideo in puerulis ea còpressisse, atq; ita tandem natura in hanc oblongam formam procreata esse: eo propè modo, quo pleraq; nationes peculiare quid in capitis forma sibi uendicare constat. Genuensium namque, & magis adhuc Græcorum & Turcarû capita globi ferè imaginem exprimunt, ad hanc quoq; (quam illorum non pauci elegantem, & capitis quibus uariè utitur tegumentis accommodum censent) obstetricibus nonnunquam magna matrum solitudine opem ferentibus. Germani uerò compresso plerumq; occipitio, & lato capite spectâtur, quòd pueri in cunis dorso semper incumbant, ac manibus ferè citra fasciarum usum, cuniarum lateribus utrinq; alligentur. Belgis oblongiora cæteris propemodum referuntur permanent uel capita, quòd matres suos puerulos fascijs inuolutos, in latere & temporibus potissimum dormire sinant. Vt cunq; autem sit, Anatomici eam capitis figurâ appellant naturalem, quæ ad oblongæ sphæræ formam potissimum extruitur, priorem posterioremq; partem obtinens magis proceram. Omnes autem reliquæ ab hac euariantes figuræ, non naturales censentur: quemadmodum ea, in qua anterior eminentia à syncipite, frontis uel elatiori sede producta perit: posterior autem, quæ occipitis est, referuatur. Item<sup>e</sup> quæ huic planè contraria uisitur, ac posteriorem, occipitij nimirum, eminentiam manente anteriore perdidit. Deinde<sup>f</sup> tertia, naturali adhuc magis opponitur, in qua ambæ capitis eminentiæ abolerentur, & caput ad amussim rotundum, & instar exactæ sphæræ, ac ueluti scillæ obseruatur: qua figura Therfites ab Homero fuisse traditur. hanc enim ab ipso<sup>g</sup> φούρῳ appellari, nonnulli asserunt: quanquam plerisq; omnes acuminatas capitis figuras eo nomine, & ὀξύκεφάλου, nunc cupare libuerit. Quarta species non naturalis figuræ ab Hippocrate quoq; enumeratur, in qua caput in latera ad utranq; aurem insignius, quàm in anteriori posterioriq; sede, prominet. Ac hæc naturali capitis figuræ omni ex parte dissimilis est, haud secus quàm si ad alteram autem in naturali figura faciem, ad alteram uerò posteriorem ceruicis sedem fingeres. Verùm Galenus alibi hanc excogitari quidem, non autem in rerum natura consistere posse affirmat: quamuis interini Venetijs puer multis partibus deformis, & admodum amens, hac figura hodie còspiciatur. Imò apud Bononienses mendicus obambulat, cui caput quadratum, sed latius paulo quàm longius contigit. Præterea Genuæ puellus annos natus fortè tres, à mendica ostiatim circulatus est, & paulo post in nobilissima Belgarum Brabantia ab histronibus fuit propositus, cuius caput in utrinq; latus protuberans, duobus uiorum capitibus grandius extitit. Verùm arbitror illum puerum simili affectu labo-

In lib. de Aëre, aquis, & locis.

Prima non naturalis capitis figura.

Secunda.

Tertia.

Quarta.

Lib. 9. de respiratione.  
Varia insuper capitis figura.

e in 1. et 2. fig. cap. 2. lib. 4.

d. 1. figura.

e. 1. figura.

f. 4. figura.

g. 1. figura.

in puellâ, cui caput inuicibilis  
a supra modum increuerat

laborasse, quem Augustæ Vindelicorum in bienni puella obseruauit, cuius caput in mensibus plus minus septem ita increuerat, ut nullû uiri caput unquam uiderim, quod non mole illi cederet. Fuitq; is affectus, quem ueteres hydrocephalum uocarunt, ab aqua quæ in capite asseruatur, sensimq; colligitur. Quamquam ea non inter caluariam, & exterius ipsam succingentem membranam, aut cutem (ubi aliàs aquam reponi, medicorum libri docent) huic puellæ fuerit collecta: uerùm in ipsius cerebri cavitae, adeoq; in dextro sinistroq; illius<sup>h</sup> uentriculis: quorum cavitâs amplitudoq; ita increuerat, ipsûmq; cerebrum ita extensum fuerat, ut nouem ferè aquæ librâs, aut tres Augustanas uini mensuras (ita me ament Superi) continuerint. Ad hæc, ut cerebrum in capitis uertice, membranæ quasi modo erat tenue, & quodammodo continuum cum tenui sua membrana corpus: ita quoq; caluaria fuit prorsus membranæ, tantâq; duntaxat sede ossæ, quanta caluariæ puellæ erat amplitudo, priusquam caput extra modum increfceret: ea ferè ratione, qua in nuper natis pueris, frontis os & uerticis ossâ constare cernimus, ubi illa alioquin mutuò sunt contermina, et in admodum pueris, insigni interuallo, amplitudineq; uisuntur membranæ. Cerebellum interim, cerebriq; uniuersa basis, secundum naturam habebant, uti & neruorum productiones. Dein nullis prorsus sedibus, quàm in cerebri uentriculis adeò atq; dixi adauctis, aquam reperi, & puella ad mortem usque sensibus omnibus integrè est usâ: & quoties caput, quum illâ paucis ante mortem diebus conspexi, ab assistantibus mouebatur, & non nihil, quantumuis etiam leuiter, erigebatur, grauis ilico tussis puellæ molesta fuit, cum difficili respiratione, & totius faciei miro rubore, sanguinisq; suffusione, & lacrymarum prouentu. Reliquo corpore mediocriter habuit: etsi laxis infirmisq; sed non resolutis tamen fuerit articulis, neq; præsentè etiam insigni macie, aut etiam seroso in membris tumore, aut morbi comitalis, aut tremoris alicuius notis. Iecur quum paulo post mortem spectaretur, sup pallidum, & nonnihil naturalis aliàs iecore contractus duriusq; occurrit: liene interim maximo & molli conspicuo, perinde ac si iecoris uices aliquandiu obiuisset: adeò ut cum præsentibus medicis nihil æquè admiratus fuerim, ac tantam aquæ uim in cerebri uentriculis absq; maioribus symptomatibus tam diu fuisse collectam. Quemadmodum eodè ferè tempore non uulgariter nos mirari coegit, nobilissimi & unâ doctissimi uiri cor, in cuius sinistro uentriculo glandulosæ (sed subnigricantis interim) carnis librâs propemodû duas reperimus, corde instar uteri, ac puellæ illius cerebri, ad eius carnis molem extenso, & homine ante mortem habitu utcunq; melancholico, & admodum uigili, & pulsu prædito miris sanè modis inæquali & uario, quiq; arteriæ contractionem manifestè ostendebat. Ita enim multis mensibus ante mortem (quum tamen alioquin ueluti sanus obambulare) pulsus aut arteria potius cōtrahi uisâ fuit, ut trium aut quatuor pulsationum ictuum uel interuallo contracta maneret, uelutq; expulsionem moliretur. Imò postremis uitæ septimanis, ex nouem ictuum interuallo tres tantum aut duo dilatationes arteriæ, tactui subinde occurrerunt. Dein animalis facultas cum principis animæ functionibus ad mortem usq; satis cōstabat, quæ non tam ex cordis uitio proximè obuenit, atq; ex sinistri cruris gangrænâ, quæ ab impedito arteriæ pulsu occasionem perinde duxit, ac si intermissi illi ex cordis uitio pulsus, cruris illius natiuum calorem parum aptè euentillâssent. potissimum quum ex sclopeti ictu ante annos aliquot ipsi uitata esset arteria quæ

<sup>h</sup> s. lib. 7  
D. D. E.  
E.

i fig. ccl. 12.  
lib. 3. A.


artus



artis medicæ tractationem apprimè idoneas describemus: quum interim præfenti Opere, corporis humani affabrè cōpositi tantum historiā enarrare instituamus, monstruosa omnia, & quæ in malè sanis ægrisq; solum occurrerunt, si lentio præterituri. Capitis autem figurarum non naturalium hic meminimus, quòd illæ à dissectionum professoribus sunt quoq; passim pertractatæ: quodq; non naturales capitis uocatæ effigies, etiam in egregiè prudentibus (quandoquidem scilicet cerebrum nulla, uti iam innuimus, propria admodum indigeat figura) interdum spectentur, etiam si tales caluariæ, ac potissimum suturarum specie, ut proximo dicetur Capite, à naturali forma differentes, nobis in cœmiterijs perquam rarò sese offerant. ut profectò subinde forsan occurrerent, si Alpium quæ Stiriam spectant, accolarum cœmiteria scrutaremur: quum illos homines, non dictis modò capitis figuris, sed longè etiam magis discrepantibus deformes esse audiam.

DE OCTO CAPITIS OSSIBVS, ET SVTV-  
ris hæc inuicem, & cum conterminis ipsis maxillæ superioris  
ossibus, committentibus. Caput VI.

PRIMA SEXTI CAPITIS FIGURA, QUAE  
DVAS VERTICIS OSSIVM PORTIONES INVICEM  
nonnihil seiunctas commonstrat, ut commodius artificiosissima sutura  
fabrica oculis subijceretur.



SECUNDA SEXTI CAPITIS FIGURA, POR-  
TIONEM QVANDAM OSTENDENS VERTICIS OSSIS,  
ferra à reliqua ossis parte diuisam, ut caluaria in fronte, uertice & occipitio proponatur sub-  
stantia, quæ duabus densis solidisq; efformatur squamis seu laminis, quas uulgo capitis appel-  
lamus tabulas & diplomas. hicq; ipsarum superior exterior uel eïnsonitur, interior autè ci.  
In harum medio cauernosa ac ueluti spongiosa fistulosa uel ossis consistit  
substantia, cui cu inscripsimus.




d

TERTIA

TERTIA SEPTI CAPITIS FIGURA, IN-  
TEGRAM CALVARIAM ABSQVE INFE-  
riori maxilla in sinistro latere depictam exhibens.



QUARTA SEPTI CAPITIS FIGURA, CALUA-  
RIAM SINISTRO LATERI MAGIS INCVMBENTEM  
exprimit, ut & basis calvariae in conspectum nonnihil veniret. Aliquot vero suturarum causa,  
ab hac figura os iugale ferra adremimus. ipsam namq. superioris maxillae ossibus cognos-  
cendis, & quibusdam calvariae foraminibus ostendendis subseruire, suo-  
rum charactere in sinuabit Index.



CHARA-

PRÆSENS characterum index, tertia ac quarta figura communis erit, quod scilicet eidem sere characteres in utraq. collocentur. etsi casu quis aut tertia, aut quarta figura duntaxat peculiaris occurrerit, illi pro figura ratione, aut 3 aut 4 subijciam.

A, B Coronalis anterior ne sutura earum quæ transuersim ducuntur. Huius dextra pars in tertia, sinistra uero in quarta spectatur.

C, D Posterior sutura transuersarum, quæ Δ Græcorum maiusculæ literæ assimilatur. In tertia huius sutura sinistra pars conspicitur, in quarta uero dextra.

E 3 Sutura à medio suturae Δ referentis ad medium coronalis, seu à D ad B deducta.

F Squamosa conglutinatio, ac in tertia quidem figura uidetur sinistra, in quarta autem dextra. Dein in ambabus

G à C ad G interuallum notatur, quod non mutuo incumbentium squamarum, sed ueræ suturae constructionem

H ostendit. Quod autem à G ad H per F porrigitur, uera squamæ formis est conglutinatio; uerticis ossis & temporis ossis communis. Ab H autem ad A indicatur glutinatio squamæ formis, ossis uerticis & frontis ossis communis.

I 3 Sinistrum uerticis os.

K Dextrum uerticis os.

L Frontis os, quod unicum est.

M Occipitis os, similiter unum.

N Sinistri temporis os in tertia, dextri autem in quarta ostenditur.

O Os cuneiforme, quod unicum est, & coniugis expers.

P Cuneiformis ossis processus, ne fertilionum alis comparati. Hi utrinq. duo sunt, in quarta figura conspiciuntur, & præter P, etiam numeris his 2, 3, 4, & 5 notati, ac deniq. in quinta figura accuratius sese offerentes.

2, 3, 4, 5 Q, Q, Q Primum in utroq. latere superioris maxillæ os, quod pluribus Q insignitur, ne forte sedem Q, quod d. uicinius

\* est, notatam, aliud os à præsentis esse arbitraretis. Linea inter duo Q consistens, ac \* insignita, processum eius ossis delineat, qui cavi aatem in tempore exsculptam ualde auget.

R, R, R Lenis in frontis osse & uerticis asperitas, à qua semicirculi modo temporalis musculus pronascitur.

S S Quartum maxillæ superioris os: in tertia sinistrum, in quarta dextrum notatur.

U, X 3 Caluarie sedes, quam os ingale appellamus. U hic notat processum temporis ossis, ad ingalis ossis constitutionem

Z 3 eductum. X uero, processum primi maxillæ superioris ossis. Z autem sutura indicatur, dictos nuper processus

U, X 4 necstens, quibus ingale os efformatur. Porro U & X in quarta figura notant sedes, à quibus processus illos ferre resecumus.

a a Sutura cuneiforme os circumscribens interuallum, illi ossi ac temporis ossi commune.

b Sutura cuneiforme os circumscribens interuallum, huic & frontis ossi commune.

c 4 Pars hæc cuneiformis ossis interdum peculiare uidetur ossiculum, squamæ modo tenue, & lineæ à cuneiformi

osse direptum, quam g. in quarta figura indicauimus. Verum hæc non ita crebro se offert.

e Sutura os cuneiforme circumscribens interuallum, ipsi & maximo superioris maxillæ ossi paulo ante S insignito commune.

ff 4 In quarta figura f conspiciuntur, præsentis Capiti nihil seruiens: notatur enim sutura primo & quarto superioris maxillæ ossibus communis, quam cum reliquis maxillæ superioris suturis persequar.

g g Sutura frontis os à cuneiformi & maxilla superiori dirimens.

h 4 Sinus, cui capitulum inferioris maxillæ articulat.

i Temporis ossis processus, scriptorii stili modo prominens.

k Alammillarum processus, è temporis osse productus. Quarta figura utriusq. lateris processum k notat.

l, l 4 Capiti occipitij ossis, quæ primæ ceruicis uertebrae simbus articulantur. In horum medio foramen occurrit, dorsalis medullæ causa calatum. Verum ut præsentis Capite ossium foramina enarrare non institimus, sic neq. ea-

Φ 4 dem hic characteribus insignienda duximus. Quamuis priuatim in quarta figura Φ ponatur, ad quod à duodecimo Capite foraminibus dedicando remitteris.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
QUINTA SEXTI CAPITIS FIGURA,  
BASIM CALVARIAE RE-  
ferens.




CHARACTERVM QVINTAE FI-  
gurae index.

QVINTAE figurae multos characteres, tertiae & quarta figurae communes, in hunc modum adhibui-  
mus.


- A Coronalis suturae extremum, in temporis cavo conspicuum.  
C C Suturae A exprimens: atq; hi characteres inferiorem huius suturae crurum partem notant, ubi hac non am-  
plius suturae effigiem accurate demonstrat.  
F Squamiformis conglutinatio non omni ex parte hic visitur. quare etiam alios characteres tertiae & quarta fi-  
gurae ipsi non accommodauimus.  
K Verticis sinistrum os, verum modica ipsius conspicitur portio.  
L Frontis os, cuius etiam modica pars hic occurrit.  
M, M, M Maxillam occipitij ossis partem hic cernere licet, totam nimirum qua in calvariae basi consistit.  
N, N Utrinq; unum tempora os notatur.  
O O Cuneiforme os.  
P P Processus cuneiformis ossis, ne spertilionum alarum imagini respondentes. Qui numero quatuor sunt, his chara-  
2, 3, 4, 5.cteribus 2, 3, 4, 5 notati.  
Q F Primum maxillae superioris os, quod & F hic notavi.  
S, A Maxillum quartum, ne maxillae superioris os, & hoc quoq; peculiariter aliquot A indicatur.  
U, X Os iugale.  
Y Sutura ossis iugalis.  
a, a Suturae os cuneiforme circumscribens intervallum, illi & temporum ossi commune.  
b Suturae os cuneiforme circumscribens intervallum, illi ac frontis ossi commune.  
d Hac sede occultatur suturae os cuneiforme circumscribens intervallum commune illi & ossi externum angu-  
lum sedis oculorum constituenti.  
e Suturae os cuneiforme circumscribens intervallum, illi & quarto maxilla superioris ossi commune.  
f Hac sutura superiori maxillae peculiaris censetur, ac proinde hic non venit explicanda.  
g Sutura frontis ossi & superiori maxillae communis.

b Sinus,


- h Sinus, cui capitulum inferioris maxilla inarticulatur.  
i Processus scriptorio stylo non absimilis.  
k Mammillaris processus.  
l Capita occipitis ossis, quae primae cervicis vertebrae coarctantur.  
m, m, m Haec characteribus, qui quinta figurae, ut & subsequentes, proprii sunt, notantur suturae  $\Delta$  imitantis additamentum, per calvariae basin antroorsim deducta, atque ad se invicem, nempe ad n tendentia.  
n, n Linea, dicta nunc additamentum iungens, ac ossi cuneiformi & occipitis ossi communis.  
o, p Sutura à linea n indicata, in dextrum latus repens, inter os cuneiforme & sinistri temporis os. Verum ab n ad o non proprie sutura est, quemadmodum neque ab anteriori m ad n: sed rima, & os ab osse notabilis distantia, secus nimirum quam in alijs suturis harmonijs se occurrit.  
q, q Sutura os cuneiforme circumscribens intervallum, illi & sextis superioris maxillae ossibus  $\Pi$  notatis commungularum animaduertens characteres. Ab n igitur ad o, hinc ad p, a, w, t, f, b, d, e, & q procedo, atque ita utriusque cuneiforme os suturis terminatum fingito, sed non nisi hominis calvaria inspectioni adhibita, ut quae in omnem partem prompte uerti poterit. quum interim hic tres simul tabulae inspicendae sint, ut uel in externa calvariae sede id os circumscribas. quod quo leuius praestet, suturam  $\Delta$  similem cum suis additamentis, & linea occipitis ossi & cuneiformi communi, sutura denique cuneiforme os circumscribente, hic delineauimus, iisdem characteribus in hac figura, atque in tertia, quarta, & quinta undique adiectis.  
r In hac quinta figura, ut et in quarta, temporis ossis linea notatur, inibi sutura modo os, cui auditorij meatus initium insculpitur, continens, & uelut à reliquo osse se iungens.  
s Ossis temporis asperitas & processus, quo id transversam respicit lineam, cuneiformi ossi & occipitis ossi communem, & n notatam.  
z Octauo capitis ossis processus, seu septimum cavitatem narium intercedens. Reliqui characteres ostendendis superioris maxillae ossibus priuatim conferunt.



SEXTA SEPTIMI CAPITIS FIGURA, INTER-  
NAM CALVARIAE BASIS SEDEM OCULIS SUBICI-  
ens. Hic namque calvariam delineauimus, in qua superior ipsius pars, subsequenti  
figura exprimenda, ad eum modum ablata est, quo cerebri fabricam  
ostendi, caput ferra diuidere consueuimus.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
SEPTIMA SEXTI CAPITIS FIGURA, RE-  
LIQVAM INTERNÆ SEDIS CALVARIÆ PAR-  
tem commonstrans, figura sexta non expressam.




CHARACTERVM SEXTAE ET SEPTI-  
mae figurarum index.

DEAE proximè præcedentes figura pluribus ornantur characteribus, verùm huc potissimum seruiunt  
maiusculi Græcorum, capitis ossium suturas indicantes: quæ in interna calvaria sede, quæ cerebrum continetur,  
etiã spectandas offerunt. Reliqui autem characteres in his figuris conspiciuntur, calvaria foraminibus ostenden-  
dis conducent.

- ΠΓ 7 Coronalis sutura, non ad eam exactam suturæ compagem, ac in externa calvaria sede, exprimens.  
ΔΔ Sutura Λ litteram referens, notatur in septima. Verùm & in sexta Δ eam quoq; indicat suturam.  
ΘΘ 7 Sagittalis sutura.  
ΛΛ 6 Squamosa sinistri temporis conglutatio.  
ΞΞ 6 Additamentum sinistri lateris suturæ Λ imitans, quod per calvaria basim contendit.  
Π 6 Linea cuneiformi ossi & occipiti ossi communis, quæ duo suturæ Λ imitantis latera additamenta ue iungit.  
ΣΣ 6 Sutura os cuneiforme circumscribens intervallum, illi & temporis ossi commune.  
ΥΥ 6 Sutura cuneiforme os circumscribens intervallum, commune illi & frontis ossi, & octavo capitis ossi. Si itaq; a  
Π ad Σ, & hinc ad aliud Σ, hinc uero ad primum Υ, ac inde ad secundum Υ perrexeris, cuneiforme os in sinis-  
tro latere interna calvaria sede circumscribes. Unde si eosdem characteres in dextro latere ad suas suturas po-  
nifixeris, eodem modo ut in sinistro latere, per characteres pergens, uniuersum cuneiforme os completæris.

OCTAVA





OCTAVAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum index.

Quamvis modo tabularum frequentia lectori minime molestus esse uelim, eoq; potissimum nomine singula capitis ossa priuatis insuper figuris non exprimam: tamen quia os cuneo comparari, & dein octauum capitis ossis circumscriptio, non ita prompte ac ceterorum capitis ossium intelligitur, praesenti figura cuneiforme os cum octauo capitis osse, à ceteris omnibus liberum, ea facie exprimitur, qua internam caluariæ superficiem respicit. quod ideo maxime praestitimus, ut cauerna in cuneiformi osse plerumq; occurrentes, in conspectu essent, uti characterum ostendet index.

- A, B, C, D  
C, D Octauum capitis os. uerum B priuatim septum insignitur, os factus organorum sedes interstinguens.  
C, D Dna praecipua cuneiformis ossis cauerna.  
E Septum indicatas modo cauernas interdiuidens.  
F Alterius cauerna seu antri foramen, in narium amplitudinem pertinens.  
G Casitas in humiliori sede septi posita, quod duo potissima antra intersepi.  
H Cuneiformis ossis processus, uel pertilionum alio similes.



EREBRVM rationis sedem (quæ instar regis in altissimo corporis sita, duabus concupiscibilibus animis dominatur ac praest) tuto quodam munimento custodiri magnopere expedit. Quocirca etiam prouidus rerum Opifex, non soli cuti, carnosisque partibus, ut in abdomine: aut per interualla à se inuicem remotis ossibus, ut in thorace, cerebri commisit custodiam, sed undiq; os ipsi instar galeae circumposuit. Verum etsi nulla occasione galea hæc, totam qua cerebrum continetur cavitatem constituens, uarijs extrui debuit ossibus, quæ inuicem articulata, motu pollerent uoluntario: nihilominus ipsa octo peculiaribus constat ossibus, quæ futurarum, aut alio ualido prorsusq; immobili & tenaci contextu mutuo, & dein alijs insuper duodecim maxillæ superioris ossibus compinguntur, & unà cum illis caluariam, uti in cœmiteris occurrit, constituunt. Quum enim illa galea differetibus admodum sedibus necessario efformatur, quumq; ideo osseam ipsius substantiam & naturam insigniter in duritie, crassitie, in sinibus processibusq; & magnis intus cavitatibus effingedis uariari oportuit, non unico tota potuit effingi osse. ut taceam nos uulgo arbitrari, illam minus iniurijs esse exposita, si pluribus extruatur partibus: quum scilicet ossium fracturæ, aliaq; nonnulla illorum uitia, cum ipsis ossibus terminentur, neq; per totam galeam, perinde ac fictiliū uasorum fissure, procedant. Dein frequens hic ossium

Cur uinuer-  
sum cerebrum  
ossibus ambia-  
tur, et quam-  
obrem illa uar-  
ietas sit, & fu-  
turis maxima  
ex parte com-  
missa.

a. Me aduo-  
tabimus,  
quæ in capi-  
tis contextu  
seriatim de-  
scribentur.  
b. Suturae,  
ut & alios  
contextus,  
suo loco  
describe-  
mus.

contextus, ad uaporosum quoq; & fuliginosum excrementorum purgationem conducit. quippe quum caput tectum quoddam calidae domus referat, excrementa ea quae sursum conscendunt excipiens, ac proinde copiosiore indigens euacuatione, necessum fuit duram solidamq; non uero intus ac foris cauernosam, & foraminulis instar spongiae aut pumicis obstitam, & ideo prorsus infirmam, & conterninis partibus nimium asperam & inimicam ossium substantiam, illi excremento alicubi egressum praebere, quem praestant uariae ossium futurae. Quanquam galea haec, seu caluaria, non dictis tantum occasionibus futuras obtinuit, sed praecipue, ut per illam membranæ transirent<sup>a</sup> fibræ, quæ præter<sup>e</sup> uasorum quorundam fines, duram cerebri membranam ipsi caluariæ committerent: & huius dein interuētu ac beneficio, cerebrum quod promptè aliàs ob molliciem concideret, suosq; met<sup>u</sup> uentriculos & cavitates comprimeret, admodum cōcinne, uti septimo docebimus libro, sustinerent, ac ueluti suspensum seruarent. adeo ut duræ cerebri membranæ, fibrarū quæ futuras transeunt caula, futuras potissimum parari, easq; pro cerebri formæ, capitis ossium cavitatem imitātis, ratione digeri arbitremur. Quandoquidem igitur oblongum corpus uinculis & apprehensionibus secundum longitudinem ipsius, & dein transuersim ductis, opportunè subleuatur, ac ueluti suspensum continetur, naturalis uocata capitis figura primū tres futuras obtinet: duas quidem transuersas, quarum<sup>e</sup> altera in syncipite est, in occipitio<sup>h</sup> altera: tertia à medio posterioris, seu eius quæ in occipitio consistit, per capitis longitudinem ad medium usq; anterioris extenditur. Anteriorem coronalem uocant, quandoquidem coronæ potissimum in ea capitis parte collocantur: posterioriorem à literæ  $\Lambda$  imagine,  $\lambda\mu\beta\delta\epsilon\zeta\eta\theta$  nominant: tertia per uerticē capitisq; longitudinem procedens,  $\beta\epsilon\lambda\alpha\alpha$  Græcis nuncupatur, quod uerū sagittæ<sup>i</sup> ue instar rectā incedit. unde etiā à uirgæ ductu,  $\rho\acute{\alpha}\delta\epsilon\lambda\epsilon\delta\iota\varsigma$  fuit appellata. Hæc interdum, & in primis quibus lata angulosaq; admodum frons obtigit, per<sup>k</sup> frontis mediū ad nās usq; summum, at non adeo insigni atq; in ipso uertice complexu, exquīta<sup>l</sup> ue adeo futurae compage, prorepat. Atq; id nonnulli uiris omnibus, alij autem mulieribus peculiare esse, falso contendunt: quum rarissimè in uiris, atq; adhuc multo rarius, aut uix unquam in mulieribus illud accidere, non obiter animaduertimus. Et hoc uel inde conijcias, quod ex uiginti quæ in cœmiterijis occurrūt caluarijs, uix duas, cui frontis os diuidatur, reperiās: neque ulla, etsi fecus tradiderit Aristoteles, in futurarum enarratione prorsus aberrans, uiris ac mulieribus hac in parte uniuersim uidetur differētia. Ceterum quadrupedibus à posteriore futura:  $\Lambda$  referente, sagittalis futura ad superciliorum usq; medium protenditur: id quod canum caluariæ, equorum, boum, & id genus animalium, quibus cum fronte maxilla admodum protenditur, manifestè ostendunt. Non enim audiendus est Aristoteles, qui canib. continuam, nullisq; futuris distinctam ascribit caluariam: quum canum caluariæ commemoratas hactenus futuras, & quæ hoc toto Capite enumerabuntur ferè omnes, eleganter expriment. Non desunt etiam, qui infantibus hanc futuram per medium occipitij ossis ad<sup>m</sup> foramen usq; dorsali medullæ uiam porrigens descendere, totumq; occipitij os diuidere asserant: quod sanè & nos quoq; obseruauimus. uerū potius ea diuisio ad unionem coalitumq; quā ad future speciem referenda est: quum hæc cartilaginis beneficio in pueris perficiatur, & in ætate prouectioribus nullū eius diuisionis rudimentū occurrat. Vnde etiam eiusmodi diuisionis ratio non hic in futurarū sermone, sed potius in occipitij ossis

Naturalis figura capitis futura.

Coronalis futura.

À literæ referens.

Sagittalis, & uariis ipsius ductus.

Præterea capita à mulieribus non perpetuo uariare. 7. cap. lib. 3. Hist. an. et 2. de Part. an. et 2.

Lib. 3. cap. 7. de Hist. an. et 2.

e Cuiusmodi ex carnis caluarie se dis sit substatia. 2. fig. ostendit. d. 1. fig. lib. 7. G, H, I. e. cuiusmodi fig. F. f. Petre hos, si lubet, seruiam ex 4. 5. 6. 7. 10. 11. fig. lib. 7.

g. 3, 4. fi. A. B. in 7. T. h. 3, 4. fi. C. D. in 6. 7. Δ. Δ. i. 3. fig. Δ. D. per E ad B. in 7. Θ. Θ.

k. tale quid ostendunt 2, 4. fi. 5. ca.

l. Canina caluaria 1. fig. cap. 9.

©

m. 6. fig. e.

osis descriptione enarranda uenit. Quòd autem Herodotus, ac præter illum pleriq; etiam alij, in Persia caluarias reperiri scribunt, nullis prorsus futuris interstinctas, ipsiq; Aristoteles suo tempore uiri caluariâ absq; futuris repertam tradit, neutiquam miror: quum ualde senum caluariæ nobis futurarum situm duntaxat, idq; perquam obscurè, referant, nulla interim futuræ conspicua imagine. Neq; profectò mirum est, senibus futuras con crescere, siquidem illis uertebrae uniri connasci q; cernamus: & osiû quoq; supercilia processusq; ita ipsis excrescere constet, ut consuetis motibus illorum ossa aginequeant. Cæterum tres iam enarratæ futuræ, caluaria in latus cubante, literâ H, aut potius « (propter ipsius extrorsum obliquatas suis apicibus columnas) exprimunt. In capitum autem formis à naturali structura euariantibus, futuræ ad hunc modum se habent. Vbi anterior capitis eminentia perit, futura coronalis aboletur, seruata ea quæ Δ exprimit, unâ cum sagittali, quæ tunc ad medium usq; superciliorum porrigitur. At posteriori eminentia deficiente, futura Δ referens deperditur, manetæ coronali, & sagittali interim per occipitiū mediū ad caluariæ usq; basim ducta. Quapropter si hanc capitis figuram occipitio inniti finxeris, utraq; remanentium futurarum effigies T literæ similis erit: quemadmodum & primæ quoq; non naturalis figuræ, quum illa fronti innititur, futuræ T, aut magis fortè Y referunt. Anteriori uerò posterioriq; eminentia simul concidentibus, binæ quæ tunc uidentur futuræ, ad rectos angulos se inuicem interfecantes, X literam repræsentant. Vna namq; transuersa ab unius auris regione, ad alterius auris regionem, per medium caput deducitur: altera autem à foramine in occipitis osse, dorsalis medullæ gratia inciso, per capitis longitudinē ad summum usq; nasi pertingit, illius ritu, quam sagittalem uulgo dicimus. Hæc siquidem semper in tribus prioribus capitis figuris à naturali differētibus seruatur: duæ autem transuersæ cum totius capitis figura uariè intercidunt. Quinta capitis figura, ut prorsus naturali est contraria, sic quoq; omnino pugnantes cum ipsa futuras nanciscitur. Coronalis enim, & illa quæ Δ refert, secundum capitis procedunt longitudinem, recta interim seu sagittali transuersim lata. Verum nunc & ad reliquas capitis commissuras sermonem dirigamus. estq; primum una utring; à sagittali futura quodammodo æquè distans linea, per capitis longitudinem supra aurem porrecta. Huic<sup>e</sup> principium ab humillima futura Δ imitantis sede pendet, qua hæc propter occipitiū inferiora uix amplius in tegram futuræ refert effigiem. Hinc nonnihil præfens linea quodammodo recta fertur: & mox sursum ascendens, quasi instar semicirculi ad coronalis futuræ terminum perrept. Hæc maxima ex parte duobus ossibus constat, mutuo sibi incumbentibus, connexisq;: non per futurâ quidem, sed paulatim uerticis os descendens, instar squamæ attenuatur, atq; in os infra ab auribus ascendens, similiterq; in squamam attenuatū subintrat, utrisq; ossibus, quâ inuicem compinguntur, asperitatem quandam mutuam obtinentibus. Vnde etiam neque Hippocrates, neq; aliquis eorum qui accuratè corporis fabricam expendebunt, futurarum nomine eas lineas dignatus est: sed à squamæ similitudine, eas λεπίδες, ἢ προσηλλήματα, hoc est, squamosas cōglutinationes appellarunt. Non enim cum plerisq; arbitrandum est, has conglutinationes minus quàm tres futuras prius enarratas, in caluariæ cavitae qua cerebrum reponitur apparere, ob idq; futurarum nomine neutiquam donari. Quamuis interim tres futuræ, ipsaq; potissimum coronalis, non tam futuræ, quàm harmoniæ effigiem mihi exprimant. Cæterum squamosarum conglutinationum, de quibus hic sermo est, pars coronali futuræ proxima, etiam uerticis<sup>o</sup> osi, & illi quod cuneo asimilabimus,

L. b. o.  
Capita futuris  
destituta.

uarias huius generis

Non naturalis  
capitis figura  
rum suam a.

Squamosa tem  
porum com  
missura.

Suturas capi  
tis etiam in u  
terna caluariæ  
sede conspic.

a 2. fi. ca.

b 3. fi. ca.

c 4. fi. ca.

d 6. fig. e.

e 3. fi. ca.

f 3. 4. fig.

F. 6. fig.

A. A.

g 3. 4. fig.

ad G.

h 3. 4. fig. a

G per F, H

ad A.

i 3. fig. I. C.

4. fig. K.

h 3. 4. fig. N.

l 3. fi. A, A.

m 7. fi. F, F.

Δ, Δ, E, O.

n 3. 4. fig.

ab H ad A.

o 3. fig. I.

p 3. 4. fig. O.



milabimus, communis censenda est. quemadmodum etiam maximè antica  
 conglutinationum<sup>a</sup> sedes,<sup>b</sup> ad frontis os & cuneiforme referetur: perinde sanè  
 ac si Natura ipsas potius, quàm futuras hic constituisset, quòd caluariæ sedes  
 temporali<sup>c</sup> musculo, tanquam strato quoquam & puluinari tecta, non æquè  
 crassa (ne scilicet frustra pòdere nimium grauaret) esse debuit, ac excarnes cal-  
 uariæ regiones, & ipsius basis, quam multarum<sup>d</sup> cavitatum & foraminum oc-  
 casione insigniter uarièq; crassam esse oportuit: uti illæ, ne nimium breuis uia  
 uulnerantibus aut alioquin lædentibus occurrerent, crassæ spectantur: quam-  
 uis tamen non prorsus duræ & solidæ, at inter duas densas squamas, ponderis  
 potissimum uitandi causa,<sup>e</sup> cauernosæ. Quum itaq; tota ea caluariæ sedes, qua  
 conglutinationes illæ excurrunt, tenuis fieri potuit, futurarum còpositio am-  
 pliores crassioresq; ossium sedes requirens, hic fuisset inualida. præterquàm  
 quòd<sup>f</sup> ossa à basi còscendentia, duriora sunt<sup>g</sup> descendentibus, adeò ut hac quo-  
 que gratia conglutinationes sic effingantur, ut duriorū ossium squammæ me-  
 ritò exterius confcendant, molliorum uerò intorsum dimittantur, ac ueluti  
 à solidioribus in plana alioquin superficie obtegantur. Quòd uerò temporalis  
 musculus præcipua harum conglutinationum sit causa, ipsarum ostendit<sup>h</sup> se-  
 des, futuræ & referenti contermina, quæ tanto intervallo futuræ exprimit ima-  
 ginem, quæta excarnis qua incedit caluariæ est portio, quantoq; intervallo ipsa  
 ossa crassa existunt. Quinetiam ad anteriorem conglutinationum<sup>i</sup> sedem, fu-  
 turæ illic speciem cernimus, ubi<sup>j</sup> ossa superiorem maxillam còstituentia, cum  
 capitis ossibus crassa euaferunt, adeò ut toto ipsorum ductu conglutinationes  
 istæ non prorsus squamosæ occurrant. Præter dictas hæcenus futuras & con-  
 textus,<sup>k</sup> alia in capitis cavitare cerebrum ambiente potissimū spectatur, fron-  
 tis ossi, illiq;<sup>l</sup> ossi communis, quod<sup>m</sup> olfactus organorum sedes constituit, ac in-  
 fltar cribri peruium cernitur. Id enim os ueluti frontis ossis basi insertum, hac  
 futura ipsum ambiente in capitis cavitare obscure circumscribitur, aliam quo-  
 que futuram obtinens, ipsi & superioris maxillæ ossibus communem. Præfens  
 enim os,<sup>n</sup> osseum septum, foramina narium interdiuidens producit, quod<sup>o</sup> fu-  
 tura quadam per humiliorem sui sedem, ipsiusq; longitudinem ducta à maxi-  
 mis superioris maxillæ ossibus, quæ dentes continent, & \* ijs quæ ad palati uer-  
 sus fauces terminum habentur, & sexta superioris maxillæ numerabuntur of-  
 sa, dirimitur: perinde ac ab osse cuneum referente<sup>p</sup> inibi etiam separatur, quæ  
 narium foramina in fauces pertinent. Cuiusmodi autē hoc cribri modo perfo-  
 ratum sit os, postquam alias in super futuras expressero, in cæterorum capitis  
 ossium enarratione persequar. Sunt enim & aliæ adhuc futuræ capiti cum alijs  
 ossibus communes, nimirum cum superiori maxilla, & eo osse quod à cunei-  
 formi<sup>q</sup> uocant, quod similiter unicum, ac, ut permulta corpo-  
 ris ossa, coniugis expers est ab aliquibus inter capitis ossa, ab alijs inter maxillæ  
 superioris ossa connumeratum. Quamuis tamen capitis ossibus longè rectius,  
 quàm superioris maxillæ ascribetur, quum haud minimam caluariæ cavitatis,  
 qua cerebrum reponitur, sedem cum cæteris ossibus constituat, quæ ab omni  
 bus Anatomicis capiti attribuuntur. Quibus uerò id circumscribatur futuris,  
 recensere nunc conabimur. Suture & imitantis<sup>r</sup> extrema, quæ iuxta occipiti  
 humiliora, non amplius exactam futuræ compagem exprimunt, uersus capitis  
 inferiora basim<sup>s</sup> ue protenduntur, ac per mediam basis sedem (quæ præruptæ  
 rupi & imagine & duritia similis est) & quæ caput primæ ceruicis uertebrae ar-  
 ticularur, in anteriora prorepunt, mutuo sensim appropinquantia. Quum au-  
 tem iuxta narium foramina oris amplitudinem spectantia pertigerint,<sup>t</sup> trans-  
 uersa

Quamobrem  
 in temporibus  
 squamosæ po-  
 tius occurrant  
 conglutinati-  
 ones, quàm fu-  
 turæ.

Sutura ossi-  
 num capitis os  
 circumscriben-  
 tes.

Sutura capitis  
 ossibus et alijs  
 communes.

Sutura & imi-  
 tantis addita-  
 menta.

Cuneiformis  
 ossis circum-  
 scriptio.

q 3, 4 fig. 5  
 sub A.  
 r 3, 4 fig.  
 ad L. & O.  
 s 4 musc.  
 tab. F.  
 t Hæc pro-  
 ponent tem-  
 poris ossis  
 et cuneifor-  
 mis histo-  
 riæ.

u 2 fig. 4  
 còstitit in-  
 ter e & e.

x 3 fig. N.  
 O.  
 y 3 fig. L.

a 3, 4 fig. 2  
 C ad G.

b 3, 4 fig. 2  
 b uersus g.  
 c 3, 4 fig.  
 Q 2 Q ad  
 L.

d 6 fig. ad  
 caracte-  
 res u, L, V.  
 e 8 fig. A,  
 B, A.  
 f 13 fig. 7 lib.  
 L, dein D.  
 g 2 5 fig. de-  
 lin O 1 fig. 9  
 capitis.

h 1 fig. 9 ca-  
 pitis g.  
 i 2 fig. ca.  
 9 P, P.  
 m 2 fig. 12  
 capitis se-  
 cundum u,  
 u, 2, 5.

n 3, 4, 5 fig.  
 O. P, 10  
 ta ferè 8 fig.

o 5 fig. C, C.  
 dein utrin-  
 que n, m.  
 Sed potissi-  
 mum si in-  
 dici chara-  
 cterum in-  
 fertur hæc  
 cit.

p 5 fig. n.  
 6 fig. P.

uerſa linea ſimul iunguntur, quæ nec futura nec harmonia meritò dici poteſt, ſed ad coalitum proriſus eſt referenda. In pueris enim cartilagine in eum modum oppletur, quo in illis appendicum cum ſuis oſibus unio committi uiſitur: in natu uerò grandioribus præſens linea omnino latet, perinde ac unio appendicum in ætate prouectis obſcureſcit. Vt cunq; ſit, hæc linea & occipitis oſi, & oſi cuneum inuitanti cõmunis eſt. &<sup>a</sup> ab hac utrinq; in latera,<sup>a</sup> futura per temporum caua obliquis anfractibus furſum ducitur, uerſus<sup>a</sup> anteriore ſquamolarum cõglutinationum ſedem. Vbi uerò futura hæc<sup>a</sup> anteriorem illarum ſedem attingit (quod notabili interuallo à coronalis futurę in cauis temporum extremo eſt) in priora modicè deorſum ad coronalis extrema ducitur.<sup>a</sup> Hinc ruriſus parumper deorſum repit, quouſq; ſuperioris maxillæ cõtingat oſ, quod externum oculi ſedis angulum conſtituere docebitur.<sup>a</sup> Hinc decliuſ per caua quoq; temporum incedit: inde ad poſteriorem intimorũ dentium ſedem ducta,<sup>a</sup> per totam narium amplitudinem tranſuerſum fertur. Hæc futura à tranſuerſa linea, quam futuræ  $\Lambda$  referentis extrema committere diximus, in hunc modum furſum ad caua temporum utrinq; ducta, & deorſum ad palatum uſque ab utroq; latere, eo quo ſcriptum eſt modo, ruriſus deſcendens, cuneiforme os exterius circumſcribit.<sup>a</sup> Interius uerò in capitis cauitate, huius oſis circumſcriptio leuiori negotio, quàm externa ſede deprehenditur: ſi modò quis accuratè diſtæ iam futuræ progreſſum expendere. nam hæc paſſim ac pluribus locis ſedibusq; ſeſe offert. Linea enim primũ oſi occipitis & cuneiformi communis, pariter &<sup>b</sup> exterius, &<sup>c</sup> interius apparet: quemadmodum & futuræ etiam interuallum, à linea oblique furſum ad caua temporum uſq; ad anteriorem cõglutinationum ſquamæformium ſedem pertinens, etiam<sup>d</sup> interius &<sup>e</sup> exterius cernitur, & commune eſt oſibus temporum & cuneiformi, ac demum ueræ futuræ, non autem ſquamarũ nexus, ſpeciem oſtendit. Quod autem ab hac ſede antrorſum ad coronalis extrema ducitur, ſquamofam reſert cõglutinationem, uerticis oſi & cuneiformi communem. Interuallum uerò à futuræ coronalis extremis ad oſſa externos oculorum ſedium angulos conſtituentia procedens, etiam ſquamofæ cõglutinationis formã commonſtrat, eſtq; frontis oſi & cuneiformi commune. Præſentis futuræ interuallum ductus<sup>f</sup> ue cõglutinationi ſquamofę reſpondens, exterius tanto elatius, quàm in interiori caluariæ ſuperficie, apparet, quanto interuallo cuneiforme os inſtar ſquamæ attenuatum, frontis & uerticis oſibus committitur. Cæterũ futuræ cuneiforme os circumſcribentis<sup>f</sup> interuallum, quod per caua temporum deorſum fertur, in interna caluariæ ſede non conſpicitur, ſed tantum in cauis temporum &<sup>g</sup> oculorum ſedibus, in externis ſcilicet earum ſedium angulis. Atq; hoc futuræ interuallum commune eſt cuneiformi oſi, & oſibus externos oculorum ſedium angulos occupantibus.<sup>h</sup> Interuallum autem eius quam modò proſequimur futuræ, iuxta poſteriore intimi dentis ſedem propens, exterius apparet, & in narium etiam amplitudine eſtq; commune cuneiformi oſi, & ſuperioris maxillę utrorumq; laterum maximis oſibus. Interual lum uerò eius futuræ in ſuperiori narium amplitudinis ſede conſpicuũ, in interna caluariæ ſede melius quàm in<sup>i</sup> externa, ſpectanti occurrit: & commune eſt ipſi oſi cuneiformi, & illi oſi quod cribri modo perforatum dicitur. Porro interna caluarię ſede, non ſolum præſentis futurę interuallum illi oſi & cuneiformi cõmune obuim eſt, uerũ etiam utrinq; ad id interuallum, aliud eiusdem futuræ interuallum ſeſe offert, quod cuneiformi & frontis oſi commune cenſetur. atq; id etiam<sup>m</sup> in oculi ſedis radice liquidd cernitur, iuxta eminentiorem

*Quibus ſedibus ſutura occurrat, cuneiforme os circumſcribens.*

q in ſi. ab  
n per o  
p in dextro  
latere: in ſi  
niſt. per a  
a ad A.  
in ſi. a fig.  
per a, a uer  
ſus H.  
r ſi. a fig. ab  
H ad A.  
s ſi. a fig. ab  
A ad b.  
t ſi. a fig. ſi.  
a b per d  
ad c.  
u ſi. q. q.

a in ſi. ſe  
cundum r.  
s, s, y, v.

b ſi. n. n.  
c ſi. r.

d ſi. r.  
per s, s.  
e ſi. ab n  
per a, a  
A. lu ſi. a fig.  
a, a ad H.

Confer et  
4 figuras  
hic ſextæ.

f ſi. a fig. ab  
per d ad c.

g ſi. g.  
cap. Q.

h ſi. a, r fig.  
g. r. c.

i ſi. v ad  
ſiniſt. latus  
L poſitum.  
k ſi. q. q.

l ſi. v. ad  
dextr. latus  
L poſitum.

m ſi. g.  
cap. s, T.

nentio rem illius regionem. Adeò, ut si ad amussim oculorum sedes expendere, radicem ipsarum, & magnam externi earum lateris iuxta interiora portionem, à cuneiformi ossè constitui spectabis, si modò in hominis fabrica huiusmodi etiam duxeris intuèda, illisq; caperis, quæ & si ad artis usum non magnopere còducant, immensè tamen Creatoris admirabilem arguant in dustriam, & proculdubio à ueteribus Anatomis professoribus sedulo ac studiose fuerunt examinata. Cæterum hoc futuræ interuallum, quod & cuneiformi & frontis ossi commune existit, magna pars alterius futuræ est duarum, quas capiti cum alijs ossibus Galenus communes esse retulit: tunc scilicet, quum unius loco illam enumerat, quæ cuneiforme os inibi circumscribit, quæ id occipitis ossi, & temporum ac uerticis ossibus contiguum esse narrauimus: alteram uerò, à cauis temporum per medium oculorum sedem ad nasi summum, seu supercilio tempus medium, pertingere ait. quemadmodum etiam pertingit, illic incipiens, ubi cuneiforme os circumscribens futura, per caua temporum deorsum uersus intimum dentem primùm descendit. Atq; hæc futura primo ipsius interuallo, frontis os à superioris maxillæ ossè externum oculi sedis angulum constituentem se iungit: dein magno interuallo cuneiformi ossi & frontis ossi communis efficitur, toto nimirum ductu, quo cuneiforme os frontis ossi in oculorum sedibus & caluariæ interna superficie contiguum esse uisitur. Vnde etiam id interuallum in futuræ cuneiforme os circumscribentis dimensione, non autem in frontis ossis à cæteris maxillæ ossibus separatione, habendum uenit. Vti sanè subsequens futuræ transuersum per oculorum sedem ductæ interuallum, frontis os à secundo, tertio, quarto, & quinto maxillæ superioris in altero latere ossibus dirimens, frontis ossi & illis maxillæ ossibus commune existit, tota nimirum sede, qua præfens futura internum sedis oculi angulum, & superciliolum medium occupat. Verùm de superioris maxillæ ossibus futurisq; nono agemus. Capite, illic necessariò rursus futuræ huius sermonem instituturi. nunc autem octo capitis ossa, dictis hætenus futuris circumscripta, priuatim sunt agredienda. quorum duo uerticis sunt, utrinq; nimirum unum: duo item infra hæc, ad utranq; scilicet aurem unum, quæ temporum uocantur ossa. quintum frontis est os, ut sæpius, unicum. sextum occipitis, similiter unum. septimum cuneiforme, unum quoq; octauum id est, quod ad cribri aut spongiæ refertur imaginem. Verticis itaq; ossibus in superiori parte ea futura peculiaris est, quæ recto tramite secundum capitis longitudinem ducta, hæc ossa inuicem dirimit. In anteriore autem sede uerticis ossa coronali futura, & posteriore Λ imitante, ab alijs discernuntur. Inferioribus uerò sedibus, squamosis conglutinationibus circumscribuntur: quo fit, uerticis ossa quadrilatera uideri, undique sibi quodammodo similia, præterquam ubi instar squamæ attenuantur, temporumq; ossa subeunt. Hic enim tenuissima sunt, sed solida, & neutiquam fistulosa: quemadmodum<sup>b</sup> reliqua ipsorum sede, qua temporalibus musculis non obtinentur, fistulosa, fistulosaque inter suas squamas cernuntur, eandem crassitiem undiq; ea sede obtinentia. quanquam interim qua frontis ossi committuntur, tenuiora, quam iuxta occipitij os appareant. Si uerò aliquibus donantur finibus, aut foraminibus, illa duodecimo Capite ipsis dedicatio percurram. Frontis os circumscribitur coronali futura, & ea quæ octauum capitis os terminat. & illa quæ à temporum cauo incipiens, ac per medium oculorum sedium ducta, ad superciliolum usq; congressum fertur, ac frontis os à maxillæ superioris ossibus separat, inq; futurarum numero ultimum locum sibi uendicauit. Frontis itaq; os quodammodo orbiculare est, nullibi tenuius, quam<sup>c</sup> ubi superiorem oculorum

*Galenus locum in libro de ossib. explicatur, & futura frontis os à maxillæ ossibus, &c. dirimens.*

*Verticis ossis circumscriptio*

*Frontis ossis circumscriptio.*

*n. fig. 9 cap. N.*

*o. s. 4. h. 4. b. ad g. g. D. c. u. h. o. c. 4. R. S. T. V. X. Z. u. de c. huius future interualla p. tes.*

*a. 3. f. i. f. 4. K. In utraque autem os circumscribitur B. D. A. B. C. D. C. G. F. H. A.*

*b. Supra R. R. 3. 4. fig. Internæ uero ipsius substantiam ostendit figura ex inter a. & c.*

*c. 3. 4. f. L. Circumscribitur uerò B. A. A. b. g. g. In c. f. secundum, & extra n. L. v.*

*d. Ad latus n. et L. f. 6.*



oculorum sedis regionem constituit, & octauo capitis ossi committitur. Hic enim ueluti duobus tenuibus efformatur squamis, in medio uacuis, & aere op-  
 e 6, 7 fig. K. pletis, quemadmodum & ipsius<sup>c</sup> cavitatis, quam inter suas squamas ad supercilia natiq; summū haberi audies. Vbi etiam hoc os cavitatis ergò, reliqua ipsius sede crassius est, ac ueluti protuberat. Verum altera illarum squamarum, quæ oculi sedem respicit, exteriorq; est, læuis uisitur: quæ autem internam capitis spectat amplitudinem, inæqualibus nubis ferè forma tuberibus eminet, quæ cerebri reuolutionibus mutuò correspondent. In temporibus, ubi temporales muscoli consistunt, frontis os tenue etiam est, ac solidum, minimeq; intus ca-  
 f Tale quid ostendit 12 uernosum,<sup>g</sup> præterquam ubi cum uerticis osse inibi iungitur. Natura enim il-  
 g 6 fig. ad latus 3. lic aliquo interuallo utrunque os uersus interiora priuatim crassius effecit, ne fortè nimia ossium tenuitas caluariam ibidem plus æquo infirmam redderet. Cæterum frontis os in fronte, paulo supra supercilia, & reliquam dein ipsius sedem, quæ excarnis est, nullam inter suas squamas cavitatem ostendit notabi-  
 b 3 fig. B. lem, & multo crassius spissiusq; quàm uerticis ossa sentitur. Quà tamen illud his committitur,<sup>h</sup> & sagittalis futura in coronalem incidit, frontis os tenuius infirmiusque est, quàm in ipsa fronte. Hæc sedes, qua dictæ iam futuræ inui-  
 cem committuntur, totius caluariæ pars mollissima rarissimaq; occurrit: est enim illa, quæ in nuper natis infantibus adhuc membranea, ac recenti casco si-  
 milis tangentibus sentitur, & quæ in puerulis manducantibus respirantibusq; mouetur. Quoniam uerò hæc sedes Arabibus Zeudech nuncupata, inter ex-  
 carnes capitis partes tenuissima est, & futuræ nusquam laxius hærent, medici huic cauteria uulgò dicta, uel candefcente auro, uel ferro, uel urente quopiam medicamine, pro affectus ratione (sed parum tutò interim, exiguoque adeò commodo) adhibent. Locus autem iste in nobis, apice medij digiti promptè conijcitur, si brachialis principium superciliorum medio quis accommoda-  
 uerit, ac medium digitum ad capitis uerticem rectà deprefferit. Occipitis os futura  $\Delta$  simili, & eiusdem futuræ additamentis, & linea hæc iungente termi-  
 nat. Vnde etiam quinq; quodammodo lateribus constat, duobus quidem à  $\Delta$  imitantis futuræ cruribus efformatis: & alijs duobus, quæ ab eiusdem fu-  
 turæ additamentis sepiuntur, ac demum quinto à linea quæ occipitis ossi & cuneiformi communis habetur, descripto. Hoc os in crassitie admodum inæ-  
 quale est, neque omni ex parte sibi respondet. Quicquid enim ipsius in occipiti excarne, ac à musculorum exortibus insertionibusq; liberum est, insigni-  
 ter crassum cernitur, tanto scilicet ossè frontis crassius, quanto illud uerticis ossium crassitiem uincit. Neque etiam occipitis os tota excarni sede parem adipiscitur crassitiem, uerum ad eius sedis radicem<sup>i</sup> in medio longè crassissi-  
 mum apparet, illa nimirum regione, qua duos maximos duræ cerebri mem-  
 branæ sinus, sanguinem & spiritum uitalem uenarum arteriarumq; modo continentes, iungi, aliosq; duos sinus educere, in cerebri uasorum enarratio-  
 ne audies. Videtur enim Natura ossis crassitie huic sinuum concursui prospe-  
 xisse, tum quòd ex ipsius læsione extremum homini impenderet periculum, tum quòd hanc occipitij sedem oculis destitutam, subinde percutiendam, ac crebrò in terram uarijs casibus illidendam, haud ignoraret. Crassissima hæc occipitij ossis sedes, similiter atque tota excarnis ipsius ossis pars, intus cauer-  
 nululis constant, utrinque ualida obductis squama: quemadmodum uerticis & frontis ossa, ubi excarnia sunt,<sup>m</sup> constare retulimus. Verum reliqua occipitij ossis sedes, cui posteriorem colli regionem sibi uendicantes muscoli partim inferuntur, & à quo partim principium ducunt, solida, admodumq; densa, sed  
 e perquam

Mollissima-  
 rarissimaq;  
 calua-  
 ria pars.

Occipitis ossis  
 circumscriptio.

Occipitis os  
 ubi crassissi-  
 mum.

i 3, 4, 5 fig.  
 M, M. Cir-  
 cumscribi-  
 tur autè in  
 3 C, D. de-  
 in in 5 m,  
 m, m, m. C  
 n, n.

h 6 fig. h.

i 7 fig. 7  
 lib. R.

m quem-  
 admodū ui-  
 dere est in  
 a figura.

perquam tenuis, neq; cauernulis donata, cernitur. Est autem hæc sedes, quam cerebellum implet. Ne uerò ob insignem illam tenuitatem, osis robori malè consuleretur, in huius sedis, qua os tenue est, medio, <sup>a</sup> oblongum, & instar lineæ exprofectum eminet tuberculum, osis robor inibi plurimum adaugens. Porro quia id in internam caluariæ amplitudinem uergit, duos quasi sinus, utrinque uidelicet unum efformat, quos cerebellum infarcit. Hoc tuberculum, quemadmodum & tenuis ista occipitij osis pars, pertinet à radice excarnis partis occipitij osis, ad posteriorem usque regionem foraminis dorsali medullæ parati. <sup>b</sup> Ab anteriori enim parte foraminis dorsalem transmittentis, & quæ occipitis os maximè in angustum cogitur, id sensim ita crassescit, ut insigniter etiam crassum, sed appendicis modo rarum uideatur, quæ cuneiformi osi committitur. Hoc os in externa sede ad latera foraminis medullæ dorsalis gratia exculpti, <sup>c</sup> duo proponit capitula, quæ primæ ceruicis uertebrae articulantur, quorumq; beneficio caput proprio motu flectitur & extenditur. Hæc capitula in puerulis, appendicibus constant: quarum coalitus in senioribus, uti & reliquarum appendicum, latet. Præterea puerulis id os tribus extruitur partibus, quæ lineis tribus cartilagine oppletis dirimuntur. Atque harum una à sagittalis futuræ termino ad foraminis dorsali medullæ parati posteriorem pertingit sedem. aliæ duæ à foraminis lateribus transfuserim, in futuræ  $\Lambda$  referentis additamæ pertinent. Adèò, ut admodum pueris in occipite duo habeantur occipitis ossa, & unum in basi capitis, cuneiformi osi commissum. Occipitis os intus læue, minimeq; asperum est: perinde ac exterius tota ipsius sede excarni, etiam læue cernitur. Sede autem huic subiecta, & ubi occipitis os non minimam capitis basis portionem constituit, id egregie asperum in aqua leq; se offert, ut commodius ab ipso ligamenta & musculi quidam pronascerentur, & rursus quidam alij tutius firmiusq; illi infererentur. <sup>d</sup> Temporū ossa circumscribuntur squamosis conglutinationibus, & futuræ quæ  $\Lambda$  refert additamētis, itemq; futuræ cuneiforme os terminātis in teruallo, quod utrinq; à transversa linea, quæ occipitis osi & cuneiformi communis est, sursum per caua temporum ad squamosas conglutinationes obliquè contendit. Hæc ossa non perperam dicerētur circularia, nisi extra circuli descriptionem ea osium pars promineret, quæ  $\Lambda$  referēti futuræ proxima est, capitisq; <sup>e</sup> mammillarem educit processum, qui in utroq; temporis osse unus habetur, non solum ad opportunitatem caput mouentium musculorū, qui à pectoris osse & clauiculis principium ducunt, insertionem protuberans, uerū ut auditus organo apta hic constitueretur sedes, magna cauitate indigens. Ac proinde etiam temporis os, non hic modò māmillari processu extuberat, <sup>f</sup> sed etiam in capitis cauitatem, ut ampla uacuāq; sedes in ipso constitueretur, qua auditus organum tum suo neruo dilatādo, tum etiā sinibus efficiendis, & peculiaribus ossiculis reponendis, opportunū locum adipisceretur. Cuiusmodi uerò hæc sint ossicula, secūdo ab hoc Capite exequar, nunc tēporis osis historia absoluitur: cuius iam recens sui processum, qui à uaccini uberis papillæ forma Græcis quidē *μαστοειδής*, nobis autem māmillaris nūcupatur. maior enim est, quàm ut aptè teneris muliercularū papillis uel maximè etiā turgidulis asimilarī possit. Deinde tēporis os <sup>g</sup> alio donatur processū, qui non lōgè à māmillaris processus interno latere initiū dicens, oblongus, tenuisq; & perquam solidus est. unde etiā ab acus imagine illum Græci *βελονοειδής* uocāt, à styli uerò scriptorij specie *χαρσοειδής* & *στυλοειδής*, ac dein à galli calcaris imagine *πυγγοειδής*. Hic et si solidus uideatur, quū tamē tenuis existat, & admodū promineat, leuīq; occasione abrūpatur, in caluarijs è terra effossis

rarò

occipitis osis  
capitula.Temporum os-  
sum circum-  
scriptio.Mammillaris  
processus.Temporis osis  
cauitas.Processus scri-  
ptorio stylo si-  
milis.a In 6 fi.  
h ad for-  
men e no-  
tatum. aut  
expende  
hec in 5 fi.  
lib. 7.b In 6 fi.  
ab e ad v.c 4, 5 fig.  
h.d 3, 4, 5 fi.  
alterū os N  
notatur, et  
in 3, 4 cir-  
cūscribitur  
à C per G,  
F ad H. de-  
in in 5 à C  
per m, m  
ad n, & il-  
line per d, d  
ad H. figu-  
ra 4, 3.e 3, 4, 5 fi.  
h. cui inferi-  
tur ③ 4 mu-  
scul. tabul.  
f Inter T  
& i 6 fig.  
aut 8 fi. lib.  
7 Z.g 3, 4, 5 fi.  
h.

b 1, 3 fig. ca. rarè occurrit. Ex hoc processu ad os *v* referens, & ad linguam<sup>b</sup> musculi porri-  
 guntur, quemadmodum & ad inferiorem maxillam,<sup>i</sup> illi nimirum, quorum  
 beneficio ea deorsum trahitur. Deinde *v* referens os, aut<sup>k</sup> oblongorum tereti-  
 umq; ofsculorū, aut ualidi teretisq; ligamenti interuentu huic processui com-  
 mittitur. His<sup>l</sup> alius adhuc in temporis osse accedit processus neutiquam infi-  
 mus, qui mediam osis iugalis partem effornat: quod proximo Capite nihil  
 aliud esse audies, quàm duorum ossium processus, obliqua<sup>m</sup> sutura inuicem ne  
 xos. Ad huius processus radicem ante auditorium<sup>n</sup> meatum<sup>o</sup> sinus osi in scul-  
 pitur, transuersum oblongus, cui inferioris maxillæ<sup>p</sup> capitulum inarticulatur.  
 & hic auditorij meatus initium, quod impenfe crassum est, ueluti<sup>r</sup> futura qua-  
 piam exigua obscuraq; à reliquo temporis osse alicubi, & potissimū anteriori  
 inferioriq; sede discernitur. Cætera osis amplitudo, uerticis spectans os, am-  
 pla & tenuis admodum, sed solida & cauernulis destituta cernitur, exterius læ-  
 uis, intus uerò inæqualiter extuberans, secundum cerebri<sup>s</sup> reuolutionum quæ  
 intestinorum gyris comparantur effigiem. Ad basim uerò capitis, hoc os alpe-  
 rum & insigniter inæquale est, & potissimum<sup>t</sup> ubi processus ritu transuersam  
 respicit lineam, occipitis osi & cuneiformi communem. Hac enim parte inæ-  
 qualiter extuberat, pumicisq; modo asperum occurrit, transuerso foramine  
 peruium, quo soporalis arteriæ<sup>u</sup> præcipuam sobolem in caluariâ ferri audies.  
 Cæterum quibus futuris<sup>v</sup> cuneiforme os circumscribatur, superius abundè di-  
 ximus. Hoc, si quod aliud, insigniter uarium est: unde etiam non iniuria à mul-  
 tiplici forma Græci id quoq; *πολύμορφον* nūcupauere. Ad latera enim, & in tem-  
 porum cauis, tenue & perquàm solidum est, et densum. In sui autem medio, ca-  
 pitisq; ad eò basi, omnium totius capitis ossium longè spectatur crassissimum,  
 quamuis sanè non simul densissimum & durissimum. In suâ enim crassitie  
 medio, inter ipsius nimirum superficiem cerebro, seu duræ cerebri membra-  
 næ conterminam, & eam quæ oris cavitatem respicit, quodammodo instar ca-  
 uarum imaginum, quas è cera fundi cernimus,<sup>w</sup> uacuum cauum<sup>x</sup> ue existit, ad  
 eam ferè rationem, qua frontis os<sup>y</sup> ad superciliorum sedem, & quarta maxillæ  
 superioris<sup>z</sup> ossâ, ubi narium latera constituunt, inania creantur: idq; tum uocis  
 gratia, tum, ne si tota sua crassitie, quam necessario, uel communis ossium usus  
 occasione nanciscûtur, essent solida, nimio pondere hominem grauarent. Ca-  
 uita itaq; hunc in modum osis cuneiformis sedes, duo insignia ostendit<sup>aa</sup> antra,  
 tenui quodam osseo<sup>ab</sup> septo interfecta: in cuius inferiori etiam sede, qua ueluti  
 bipartiti, exiguum cõsistit<sup>ac</sup> antrum, non secus quàm si septum illud in hac  
 caua sede ad totius ossis robur, instar mediæ alicuius in domo parietis condu-  
 ceret. Cautas hæc undiq; continua obducitur squamma, neq; usquam est per-  
 uia, quàm in narium amplitudinem, ad quam duobus pertinet<sup>ad</sup> foraminibus  
 aerem admittentibus. Nihil enim præter aerem in hac cavitare cõtinetur, cum  
 molli quadam medulla, magnitudine suis quibus amplectitur sedibus non re-  
 spondente. Si quando uerò in quibusdam caluarijs antra hæc non occurrunt,  
 Natura huius ossis crassitie ea<sup>ae</sup> ratione prospexit, qua talus, & calx, aut appen-  
 dices ipsæ ossium formantur. Ipsum namq; tum intus cauernosum ad solidio-  
 ris compactiorisq; pumicis ac spongiæ formam effingitur, & eius compositio-  
 nis superficiebus continuæ, quamuis non crassæ, obducuntur squammæ. Siue  
 enim hoc pacto, siue antris illis, crassities cuneiformis osis consistet, interna ip-  
 sius<sup>af</sup> superficies, quæ cerebrum spectat, nunquam in integris, & carie non ui-  
 tiatis ossibus mihi aspera & cauernosa, foraminulis ue plena occurrit, at læuis,  
 perinde ac reliqua ipsi cõtèrmina capitis superficies. Interior hæc cuneiformis

hyndor.

Temporis ossis  
 processus, iuga-  
 lis ossis portio-  
 ne constitutus.

Cuneiforme os.

πρὸς μίσην

Media osis cu-  
 neiformis sedes  
 qualis.



Pars, quod  
adipiscitur vena

osis sedes, <sup>1</sup> sinu quodam donatur amplo, & glandem continente, cui cerebri pituita instillatur. Sinus huius eminentissimæ partes, ueluti quatuor constant processibus, quibus dura cerebri membrana ualide committitur, quique inferiori leſtica menſa<sup>2</sup> ue partem utcunq; exprimunt, & κλωδὸς inde uocatur. Ab ipſo dein ſinu, utrinque duo diducuntur oblongi<sup>3</sup> ſinus, quibus ſoporales incumbunt<sup>4</sup> arteriæ, & per quos pituita uidetur ad<sup>5</sup> foramina deſluere, quæ priuatis uenis, ſeu arterijs, ſeu neruis tranſmittendis primariò exculpuntur, & ad rimas quasdam cuneiformi oſi & temporalibus oſibus communes. Verùm de totius caluariæ foraminibus ſinibusq; duodecimo agam Capite: hic autem oſis cuneiformis hiſtoriæ gratia, leuis hæc quorundam neceſſariò incidit mentio, ut conſtaret, id oſi mihi in ſua ad cerebrum ſuperficie non uideri cauernulis obſitum, aut citra ſquamæ læuis<sup>6</sup> ue oſis obductionem, pumicis aut ſpongiæ talem reſerre ſpeciem, qualem proponit<sup>7</sup> effracta appendix, aut uerticis oſis inter ſuas ſquamas, quum interim nonnulli autorum potius placitis, quàm ueritatibus addicti, ne cuiuſmodi foraminula non uelle conſpicere nugentur, exiſtantes pituita debere per cauernulas & foraminula ſpongiæ fabricæ reſpondentia (uti Galenus docuit) tranſcolari. quumq; inſuper aliqui, dum meam de repurganda pituita ſententiam expendunt, Galenum ita non ſenſiſſe arbitrantur, quòd libro de Partium uſu nono uocem ὁ μω, quod eſt cribro aut colo, pro οκλω, quod eſt cuneo, à librarijs aut ſcriptoris illic poſitam ſibi perſuadeant: ubi Galenus pituitæ ad palatum egreſſum docens, inquit, glandem cui cerebri pituita inſtillatur, ab oſſe cribrũ referente excipi. perinde ac ſi Galenus per tortuoſa, & non recto ductu peruia foraminula cauernulasq; pituitam in cuneiformi oſſe tranſcolari, ne per ſomnium quidem (ut ipſi aiunt) cogitaſſet, ſi ſcilicet legeretur, ab oſſe cuneum referente glandem eam excipi. Verùm hic in cuneiformis oſis deſcriptione, uti neq; unquã aliàs, unius aut alterius diſtinctionis, quæ fortè deprauata eſſet, occaſione, à Galeno non diſſentio. Vtcunq; enim dicta nuper uox immutetur, non tamẽ totius libri ſeries, ita ut Galeni ſententiam non aliquo adhuc modo aſſequamur, poterit uitari. Galenus namq; quum in octauo de Uſu partium, olfactus<sup>8</sup> organa proceſſus neruis ſimiles, ab anterioribus ſedibus priorum cerebri<sup>9</sup> uentriculorum enaſci, & meatuum duorum inſtar pituitæ, quum paulo amplius uulto excedit, ad<sup>10</sup> foraminula odoribus tranſmittendis exculpta diffundere (at non uerè interim) docuiſſet, ac illam per ea tranſcolari dicens, ſedulo tranſcolandi moram, à tranſitus tempore diſtinxiffet, quo per cribrum recta pertuſum aliquid tranſfunditur: in nono inquam de Partium uſu libro ſermonem uniuerſum de excrementorum cerebri purgatione abſoluturus, primùm cauſam perquirat, cur uerticis, frontis, occipitij, & temporum oſſa ad fuliginoforum adeoq; tenuium excrementorum purgationem debuiffent eſſe cauernoſa & foraminulenta. dein quum cuiuſmodi, utpote aſperam, conſtructionem inibi fieri non potuiſſe deducit, futuras ad eam expurgationem auxiliari reperit: & ſenſim rationes texuit, quamobrem in capitis baſi ad pituitæ expurgationem oſſa oportuerit eſſe cauernoſa & foraminulis plena, non uerò continua ſquama interius & exterius inſtruta. Atque ita quum eius compoſitionis neceſſitatem, ut ipſe quidem exiſtimat, admodum callide inuenit: mox, ut pituitam ad illam uſq; compoſitionem deducat, ſubiungit, ſe in octauo libro meatus duos (ipſa nimirum olfactus organa) quibus ad nares pituita educitur, tractaſſe, hicq; alios duos inſuper enarrandos, qui in cerebri ſubſtantia exculpti, & ſuis ſinibus mutuo<sup>11</sup> coeuntes, pituita in<sup>12</sup> cyathum & in fundibulum à tenui cerebri membrana pronatum deferunt, per quod illa deinceps

l 3 fig. ca.  
12 M.  
m 16, 18  
ſi. lib. 7. A.  
n quatuor  
anguli cir-  
ca M fig. 3  
cap. 12.  
o 3 fig. ca.  
12 O, P.  
p 16 fig.  
lib. 7. E, F.  
q 3 fig. ca.  
12 G, H, Q,  
R, S, Y.  
r 2, 3 fig.  
cap. 12. N.  
s figura 1  
capiti inſer-  
ta A.  
t ut eo in-  
ter a & v.

u 12 ſi. lib.  
7 C, D. 13  
ſi. L. L. ue-  
riam non  
ſunt caua  
meatum  
modo.

x 4 ſi. lib.  
7 L M, L  
M.

y 3 fig. ca.  
12 1 ſupra  
L. 13 ſi.  
lib. 7 D, D.  
G, G.

z 6 ſi. lib.  
7 Q. 7  
ſi. 1 unius, al-  
ter uerò 7  
fig. K.

a 14 ſi. lib.  
7 D.

b eiufdẽ ſi.  
C, C. 15  
fig. E ad F.

c 16, 17 ff. lib. 7 A. deinceps in<sup>e</sup> glandem quandam defluit. Galenus itaq; hæc commemorans, pituitam usq; ad ossæam illam deducit fabricam, quam pituitæ occasione cauernosam & foraminulentam debere esse, suis argumētis collegit. Dein rursus de transcolandi modo ita agit, ut sermonem octauæ libri cum nono communem reddat, neq; aliam descensus pituitæ ad palatū, quàm per foraminula odororum nomine cæ lata, rationem describat. Quum igitur cauernularum, quam toto hoc contextu Galenus proponit, substantia, pumicis & spongiæ imagini respondeat, quumq; tam studiose colandi per spongiosum corpus modum (quem in Venetorum uocatis cisternis fieri uidemus) ab eo qui per cribrum fit, discernit, ueteresq; quasi illius usum ignorassent, arguit: cuiq; constare debebat, quæ Galeni sit sententia, & qui per magna & recta, seu utrinq; per uia foramina, quæ nobis in cuneiformi ossæ occurrit, pituitam citra ridiculam, & prorsus inartificiosam moram deduci non existimauerit: quouis tandem pacto illa dictio, cuius prius memini, legeretur. Quòd autem Galenus in libro de Partium usu undecimo, ubi os cuneiforme, quod aliàs in illis libris palati os (et si palatū uix contingat) undique uocauit, quodq; ex ipsius sententia uulgus medicorum os colatorij nuncupat, cuneo assimilians, densum ac durum esse tradidit, & nihilominus foraminulorum suorum pituitam expurgantium inibi non est oblitus, eiusmodi censetur, ac permulta in Galeno occurrunt. Vt enim taceam, quàm pulchrè sibi consentiat, ossis cuneiformis uacua inanità u<sup>e</sup> sedes, & antra, totiusq; adeò ossis hic fabrica attestantur, quàm sua ueritati sint consona, qui propter robur sibi confectum, & in cerebri substantia, & infundibulo, tenuiq; membrana, & glande pituitam excipiente, et alijs partibus innumeris potius quàm in ossæ statuendum, hic quædam rara & peculiaria imaginatur, non expendens occipitis os, quæ cuneiformi coalescit, nullibi quàm illic rarius & minus densum & durum euasisse, & appendicum quodammodo substantia iccirco extrui, quòd inibi crassum, non tamen ideo quoque durum & densum esse debuerit. Verum quum hic sermo ijs quæ mihi à quibusuis tandem obijciuntur diluendis, non sit dedicatus, neq; hic de pituitæ expurgatione seriò ueniat pertractandum, reliquam adhuc cuneiformis ossis historiam modò absoluemus. In humiliori itaq; ipsius superficie, ubi tunice narium cavitatem succingentis potissimum nomine asperum est, & osseo narium septo committitur, quatuor insignes educit<sup>e</sup> processus, utrinq; binos, & uespertilionum alarum modo tenues & prominentes: unde etiam ab illarū imagine, *πτερυγοειδής* *os* *processus* *alijs* *similes*. nuncupantur. In duarum alarum medio sinus cavitatsq; occurrit, à qua ualidus enascitur<sup>h</sup> musculus, qui sui lateris maxillam inferiorem mouentium tertius numerabitur. Adeò ut huius præcipuè musculi exortus causa, processus isti extuberent, cum ut is aptum ex illis duceret principiū, tum etiam ut principium ab ipsis tutò muniretur. \* Octauum capitis os in frontis ossis basi comprehenditur, futura illa circumscribitur, quæ id à frontis ossæ & cuneiformi terminat, & illa insuper, quam in humiliori narium septi regione incedentem, hoc os à maxillæ superioris ossibus dirimere, antea diximus. Præsens os, præter narium septum ab ipso eductum, & in mediam nasi cartilaginem anteriori in sede terminatum, olfactus etiam organorum sedes in caluariæ cavitare constituit, & multis inibi foraminulis odorū & aeris ad cerebrum ingressus causa, peruium est. quæ quum pueros Anatomen docentium quidam cribri aut coli foraminulis cōtulerunt, id os à cribri uel coli imagine, *πλοκοειδής* appellarunt. Alij autem hæc foraminula spongiæ potius, quàm cribri foraminibus assimilantes, ipsum *σπογγώδης* uocandum putarunt, quamuis interim tenue, substantiaq; densum, ac

*Cartilago aut  
in cerebro.*

*Lib. 4. de Ad-  
ministrandis  
dissectionibus.*

ueluti solidum sese offerat, non uerò, ut<sup>1</sup> interna crassorum ossium sedes, fungosum & laxum. Dein in caluarię cauitatem oblongum exierit<sup>2</sup> processum, septi cuiusdam modo sedes interdiuidentem, quibus olfactus organa reponuntur. Quinetiam processui illi, quem gallorum cristę nonnulli cõtulerunt, durę cerebri<sup>3</sup> membranę processus ualidẽ connascitur, qui dextram cerebri partem à sinistra dirimit. Quandoquidem uerò Galenus alicubi cartilagineę ac ossę cuiusdam substantię meminit, quę iuxta cerebri<sup>4</sup> glandem nucis pineę<sup>5</sup> imagini à dissectionum peritis asimilatam consisteret, hincq; forsitan aliquis in mea capitis ossium historia quidpiam ueluti à me prætermissum desideraret, studiosos admonitos uelim, in canis caluaria, secus quàm in hominis, latum tenueq; admodum os spectari, ab occipitis osse pronatum, ac toti superiori cerebelli<sup>6</sup> sedi non secus infratum, quàm durę cerebri membranę<sup>7</sup> processum in hominibus cerebello obductum cernimus, qui id à cerebro, quã cerebello innititur, disiungit ac separat, quiq; ea<sup>8</sup> parte est durissimus ac crassissimus, qua in anteriores cerebri uentriculos<sup>9</sup> iuxta dictam nuper glandem, ex proprio ipsi sinu uafa<sup>10</sup> educit. Cuius partis sedis<sup>11</sup> ue durities quibusdam tanta in nonnullis animalibus uisa est, ut cartilagineam, aut etiam osseam, illam appellauerint. nisi fortassis tenue illud latumq; canis os, de cerebri cartilagine aut osse disputãtes subaudierint, etiamsi in homine neutiquam occurrat: quum scilicet ad eò confusam multorum animalium anatomum plerosque ueteres, perinde ac Galenum, proposuisse, neminem latẽre debeat.

*1 figura  
cap. 1. im-  
pote L.  
m 6 fig. v.*

*n 3 fl. lib.  
7 D, D  
N. de 12  
fl. lib. 7 H.  
o 7 fl. lib.  
7 M.*

*p 8 fl. lib.  
7 R, R, R.  
q 7 fl. lib. 7  
O, O, O. et  
5 fig. lib. 7  
V, V.  
r iuxta V  
fig. 7 lib. 7.  
s 7 fl. lib.  
7 T.  
t 6 fig. lib.  
7 H.*

#### DE OSSE IUGALI, ET OSSIBVS PRÆ- ruptę rupi asimilatis. Caput VII.

*H r i c* Capiti nulla præfigitur figura, quòd iugale os in præcedentis Capiti tertia & quinta figuris U & X notatum fuerit: quemadmodum & ipsius futura in tertia quidem Z, in quinta autem T indicabatur. Offa uerò quę rupi præruptę asimilantur, seu quę lapideę uocamus, etiam quinti a præcedentis Capiti figura ostenduntur, tota scde, quę C, G, M, M, m, m, k, & huiusmodi in caluarię basi characteres occurrunt.

*Quibusdã of-  
sium sedibus  
perinde ac si  
iugis circum-  
scriueretur, no-  
tata imponi.*



*Os iugale.*

*Iugale os  
iugis.*

*Qui Natura  
temporalibus  
musculis pro-  
spexerit.*

**N T E R** corporis ossa, quædam proprijs circumscriptionibus terminisq; destituta, non secus quàm si pecularia essent ossa, dissectionum professoribus describuntur, inq; ossium numerum cum ceteris referuntur. Huius generis est os iugale Latinis, Græcis uerò ζυγωμα ob hoc nuncupatum, quòd utraq; ossa (sunt enim utrinque singula) bouum equorum<sup>1</sup> ue iugis comparentur. Constat autem os iugale, aut potius caluarię sedes hoc nomine dicta, ex duorum ossium processibus inuicem<sup>2</sup> obliqua futura coeuntibus.<sup>3</sup> ac posterior quidem eius pars, temporis ossis processus est: anterior autem pars, illius ossis processus existit, quod uniuersum oculi sedis externum angulum efformans, maxillę superioris ossium primum numerabitur. Vterq; processus, seu sedes, quam iugale os dicimus, medullę est expers, & solida, suaq; duritie pellendis iniurijs apta, quò<sup>4</sup> idoneum temporali musculo efficeretur propugnaculũ, foris quidem gibbum, intus autem cauum. Quamuis interim Natura non sic solum temporalem muniuerit, uerum insuper ipsum in capitis ossibus magna ex parte occultauit, sinum ossibus insculpens, illo recipiendo apprimẽ idoneum, & eum undiq; uicinarum partium tuberibus promontorijsq; circumsepientem. Atq; id meritisimò Natura molitur, quandoquidem temporum musculi malè affecti, conuulsiones, febres, sopores, amẽtias inferant, quòd neruorum principio proximè accedunt, & tan-

*a 3 fig. ca.  
6 Z.  
b 3, 5, 6  
cap. 2.  
c 3, 5 fig. 6  
cap. V.  
d 4 muscu-  
lorum tabu-  
la primum  
D, de 12 r,  
post 2.*



e. fi. ante 2  
ca. lib. 4 po  
sitæ Q, R,  
b, c, d.

& tantum os eos à cerebro ipsiusq; membranis dirimit. Adde<sup>e</sup> quinos nervorum cerebri furculos (præter tres enī alijs notos Anatomici, duos adinueni) singulis musculis exporrigi: ob idq; nō iniuria diuū Hippocratem pronunciauissē, plagas præcipuas, ac stuporē inducentes, esse temporales. Sed horum musculorum præstantiam in secundo libro cum reliquis ad unum omnibus abundē prosequemur. ubi etiam docebitur, iugale os in hoc præcipuē formatum, ut ab ipso maffeter, siue manforius musculus (quem inferiorē maxillam mouentium secundum describemus) opportunē principium ducat. Veteribus

f. Hec in s  
fi. s. ca. bafi  
sunt obuia.

g. 1, 4, 5 fi.  
cap. 6 h.

h. eiusdem  
fig. i.

λυσσδδσ, ossa uocabantur, quæ petram & effractam rupem non duritia modo, uerū etiam imagine referunt. Huiusmodi autem est inferior capitis pars, qua dorsalis medulla ē caluaria delabitur, ac ubi<sup>u</sup> mammillares & stylium referentes temporum ossium processus exoriuntur. Eius enim regionis ossa omnium uniuersi corporis durissima & solidissima (auditus organi, uti arbitror, occasione) existunt, commodi musculorum exortus ac insertionis gratia, præruptæ asperæq; rupi quā simillima. Vnde etiam hanc partem meritō ita nominandam arbitror, nullumq; in corpore os propria finitum circumscriptione petrosū lapideū<sup>ue</sup> à ueteribus fuisse appellatum reor. Quanquam rursus non ignorem, plurimos temporum ossa hoc nomine priuatim tantumq; indicauissē, non quidem adhuc uniuersa, uerū illam ipsoꝝ portionem, quæ dictos antē processūs educit. Per me igitur ita temporum ossa nominare licebit modō neminem lateat, dictam nobis caluariæ basis regionem, creberrimē petrosū os nuncupari: & dein interdum ossa quædam cōmemorari, ac si propria donarentur circumscriptione: quum tamen nihil aliud uerē censenda ueniant, quā duorum ossium mutuō coeuntium (ut iam diximus) fines, & aliquādo unius alicuius ossis una sedes: quemadmodū euenissē audies in ossibus, quæ sacri ossis lateribus coarctata, triplex nomen pro sediu ratione assumunt.

Ossa prærupta  
rupi similia.

i. Tres figu  
re cap. 29.

## DE OSSICVLIS, AVDITVS ORGANI constructionem ingredientibus. Caput viii.

### OCTAVI CAPITIS FIGURA, VARIIS EFFORMATA PARTIBVS.



### OCTAVI CAPITIS FIGURAE, AC eiusdem characterum Index.

HÆC figura, auditus organi ossicula exprimit. Præcipua enim illius figure effigies, portionem ex dexteri temporis osse exactam demonstrat: quæ dein per medium diuisa, duas quæ in illius ossis cavitare reponuntur, membranas, una cum ossiculis ob oculos ponit: uti characterum index hunc in modum explicabit.

A. A. Foraminis portio, quod ab aure introrsum ad membranam B notandam pertinet.

c 4

B Mem-

*B* Membrana transuersim foramini obducta, quod ab aure in cavitatem fertur, in temporis osse auditus organi nomine excipitur.

*C* Unum auditus organi ofsculum, malleolo assimilatur.

*D* Quinti nervorum cerebri paris nervus.

*E* Quinti paris ramus, per cæcum foramen ad ofsculum temporalem potissimè digestus.

*F* Quinti paris ramus, per foramen procedens, quo uena auditus organum petens excipitur.

*G* Series nervi quinti paris ad planam cavitatis sedem hic auditus organi occasione calata.

*H* Sedes orbicularem circumferens, cuius anteriori sedi auditus organi ofsculum iam l. notandum committitur.

*I* Alterum auditus organi ofsculum, quod incudi & molari denti comparatur.

*K, K* Caernulae indicantur, quibus cavitatis auditus organo parata, intus scatur.

*L* Mallei ab omnibus conterminis partibus liberi anterior facies.

*M* Mallei ab omnibus partibus liberi posterior facies.

*N* Incudis, seu molaris dentis ab omnibus partibus liberi anterior facies.

*O* Incudis seu molaris dentis ab omnibus partibus liberi posterior facies.

*P* Incudis ac mallei, ita ut in aure committuntur, simul nexorum anterior facies.

*Q* Incudis ac mallei una iunctorum posterior facies.



*Cavitas audi-  
tus organi pa-  
rata, & for-  
amina ab ipsa  
educta: ac de-  
mum quinti  
paris nervorum  
cerebri in il-  
lam series.*

**T** I A M S I in septimo libro cum reliquorum sensuum organis, auditus instrumenti fabricam sumus pertractaturi, nihilominus tamē ipsa ofsculorum quorundam illam subeuntium occasione, nunc obiter uenit describenda, ne forte in septimum usque librum ea ofscula prorsus asseruantes, in uniuersa alioquin ofsium historia, illa præterijisse uideamur. Quanquam neq; Galenum, neque ante illum

quemuis alium hæc, uti & alia sanè non pauca, obseruasse, hinc cōiicitur, quod illorum nusquam incidit mentio. Temporis itaq; ofsi magna admodumq; uaria insculpitur<sup>a</sup> cavitatis, quatuor à se producēs foramina, quorum<sup>b</sup> primum utcumq; amplum, sed anfractuofum, in capitis sedem, qua cerebrum continetur, spectat, alterius lateris quinti paris nervorum cerebri<sup>c</sup> neruum admittēs.

<sup>a</sup> Secundum foramen iam dicto breuius, sed multo amplius, ad aurem pertinet. Tercium foramen angustum est, uarièq; implexum: & cæcum, uti suo dicemus loco, appellatum, nerui quinti paris<sup>d</sup> rami transmittit. Quartum nunc dicto nonnihil amplius occurrit, & neutiquam perinde tortuosum. dein antrorsum, uti illud antrorsum, procedens, præter alium nerui quinti paris<sup>e</sup> ramum, cui iter præbet, uenam transmittit, auditus organū petentem. Verum quinti paris nervus haudquaquam totus in binos illos ramos absorbetur, sed insigniori sua<sup>f</sup> portione, cavitatem temporis ofsi incisam, membranæ quodammodo ritu succingit & oblinat: non quidem uniuersam, sed nonnullas tan-

tum ipsius sedes, haud secus quàm si insignior nerui portio in plures diducere-  
tur membranas, aliquot eius cavitatis regionibus obductas. Inter cæteras au-  
tem cavitatis sedes, quarum quædam planæ sunt & læues, quædam uerò laxio-  
ris pumicis & spongiæ modo cauernosæ, admodumq; profectò uariæ, sibiq;  
dissimiles, una est orbicularis & plana, osseq; circulo lineæ in modum extu-  
berante, septa, ac demum præcipua quinti nerui<sup>g</sup> portione tanquam membra-  
nula quapiam obducta. Ad circuli huius exteriorem, auriq; proximam sedem,

<sup>g</sup> ofsculum reponitur, duobus tenuibus & acutis processibus, seu cruribus fir-  
matum, altabilitumq; horum exterius, ac auri uicinius, est breuius & crassius,  
latiusq; ac in acutum desinit apicem. Alterum crus, quod interius consistit, &  
membranæ orbicularem illam cavitatis sedem succingenti magis, quàm exte-  
rius crus, innascitur, longius nonnihil & tenuius est, ipsiusq; extremum quasi  
in unculum cessat, quo membranæ illi implicatur, firmiusq; innectitur. Ofsi-  
culi

*Ofsculum in-  
cudi aut mola-  
ri denti compa-  
ratum.*

*a* in præci-  
pua effigie  
et in penult-  
ima fi. con-  
textui cap.  
12 in f. ca.  
*b* 3 fig. ca.  
12 a.  
*c* 1, 2 fi. ca.  
2 lib. 4 a.  
2 fig. ca.  
12 a.  
*d* 2 fig. ca.  
12 a.  
*e* 2 fig. ca.  
12 b.  
*f* 1, 2 fi. ca.  
2 lib. 4 c.  
*g* 2 fi. ca.  
12 v.  
*h* 1, 2 fi. ca.  
2 lib. 4 b.  
*i* fi. ca. 14  
lib. 3 n.  
*k* 1, 2 fi. ca.  
2 lib. 4 d.  
*l* h.  
*m* g.

*n* 1, n. o.

culi huius pars extra membranam prominens, superius partim plana, partim rotunda cernitur: quemadmodum minores nonnulli incudes effingi solent, quorum amplior pars plana est: altera, quæ ueluti in mucronem desinit, instar con rotunda. Grandiores enim incudes penitus plani depressi<sup>o</sup> ue & quadranguli sunt. Cæterum si hoc ofsiculum, quia tantum binis donatur cruribus, incudi assimulare minus placuerit, nihil profectò obstitit, ° molari denti duabus tantum radicibus prædito id conferre. ° Alterum ofsiculum, à iam commemorato plurimum uariat, alteriq; innascitur membranæ. Foramen enim cauitatis, seu antri in temporis osse incisi, quod aurem spectat, ea parte qua uuitatis amplitudini uicinum est, ° membranula tenuissima & prorsus pellucida in eum modum obtegatur, quo uas suo fundo obturari dicimus. Huic itaq; membranulæ transuersim id ofsiculum innascitur, itaq; ipsi intus transuersim infernitur, ac in tympanis fidem unam atq; alteram crassioremem membranæ, seu asinorum pelli, obtendi conspiciamus. Vt uerò ofsiculum ualidius firmaretur, longum tenuemq; habet processum, quo membranæ secundum illius latitudinem innascitur. Hunc processum liceret<sup>7</sup> femoris ossis parti comparare, quæ ab ipsius processibus, quos rotatores uocamus, ad inferiora usq; femoris capita pertinet. imò si hæc inferiora capita à reliquo femore resecta finxeris, uniuersum ofsiculum femori opportunè assimilabitur. Quemadmodum enim femur iuxta ipsius ceruicem duos asciscit processus, sic etiam ofsiculum hoc eadem sede processulos aliquot sibi uendicat, quorum beneficio membranæ suæ firmitus innascitur. Dein, ut femoris ossis ceruix obliquè uersus corporis interiora, ad coxendicis ossis sinum uergens, in caput ad amulsim rotundum cessat: ita etiam ofsiculum à membrana introrsum abscedit, in rotundum caput definens, quod læue minimeq; asperum est, & superiori parti alterius ofsiculi, quod molari denti, aut incudi assimilaui<sup>8</sup>mus, ita tenuissimarum membranarum interuentu<sup>8</sup> committitur, ac si malleus incudi laxè alligaretur: non secus, quàm si ofsiculum postremò enarratum, malleoli præstaret munus, alterum uerò incudis uicem gereret, sed pro mallei mole nimis quàm parui. Num autem ofsicula incudis & malleoli officio ita fungantur, atque formam referunt, & leuissimo afflatu secundum ofsiculum cum membrana cui innascitur, inter dissecandum mouetur, primo ofsiculo interim quodammodo quiescente, à me haudquaquam assertum uelim, quandoquidem auditus rationem non satis ex sententia percipiam. Non quòd mihi animo exciderit, commune illud medicorum ad partium temperiem, ac formam demum essentialem, asylum, & aeris gyri, quos ex huius percussu in aurem ferri, & quandam membranam ferire, uulgò nobis è lapillorum in aquam iactu persuademus, inter organa huius constructionis prorsus ignari. Longè enim diuiniorem Opifex callidissimo artificio hic machinatur, quorum fabricam satis dilucidè in scholis quidem commōstro, usum autem & operandi modum non magis quàm oculi ipsius assequor. Verum quia de auditus organo postea pertractabitur, hic sat sit ofsicula recensuisse: quæ si hoc sermone non fueris affectus, uituli, aut agni, aut alterius animalis capite in mensam posito, temporum os nunc hoc, nunc illo modo diuides. Quanquam multo satius sit, hæc in crudo capite, quàm in cocto aggredi: idq; in homine potius, quàm alio quouis animali. Neque solum hac administratione, spectatu iucundissimam ofsiculorum constructionem adinuénies, uerum insuper omnium penè musicorum instrumentorum fabricæ rationem ex auditus organi compage desumptam perinde admiraberis, ac uel hoc in primis nomine, auditus organi harmoniam

ofsiculum malleo non admodum dissimile.

Secundū ofsiculi ad femoris os comparatio.

Auditus organi ofsiculorum usus.

summa

o fig. ca. 11  
K rale pro  
ponit den-  
tem.  
p C, L, M.

q B.

7 figuræ  
cap. 30.

8 P, Q.




Marcus Antonius  
Genus, et  
Vulphangus  
Heruort, hu-  
ius operis &  
inchoandi &  
absolendi au-  
tores praeipui.

summa uoluptate intueri solitus est, non modò musicorum absolutissimus, uerùm & nostræ ætatis philosophorum exinium decus, Marcus Antonius Genua, cui rerum naturalium studiosi tantum debebunt, quantum frugis ex hoc meo conatu ipsis accedet: quippe qui ad hunc inchoandum primus auctor, ac sedulus monitor haud minus extitit, quàm rarum uirtutis exemplar Vulphangus Heruort, patricius Augustanus, ob incredibilem erga literas earumq; cultores amorem, immortalitate dignissimus, ac mihi dum uiuam unicè colendus, quòd ad huius operis absolutionem, quantum in ipso fuit, nihil fecit reliqui.

DE DVODECIM SUPERIORIS MAXILLAE  
ossibus, in quorum classẽ nasci ossa etiam referuntur.  
Caput 1X.

PRIMA NONI CAPITIS  
FIGVRA




PRIMAE NONI CAPITIS FIGVRAE,  
eiusdemq; characterum Index.

HÆ c figura anteriorem calvariae sedem exprimit, maxillæ superioris ossa, quàm datum est accuratissimè, ostensura. Humana autem calvaria caninam subiicimus, ut Galeni superioris maxillæ ossium descriptio, leuiori negotio à quouis intelligatur. Præterea, ut oculorum sedes, ac in ijs apparentes sutura ossaq; apertius spectarentur, hominis caluariam occipitio inniti, & anteriori sede super caninam erigi oportuit. Præsentis autem figura characterum indicem ita digeram, ut masculi Græcorum, maxillæ superioris ossibus (quæ sex utrinq; erunt) primùm adhibeantur: reliquis autem ossibus & suture, ut fors fert, omnes accommodentur. Ceterum priores aliquot characteres ostendendis for omnibus capitis inuabunt, quare etiam illi ad Caput huc dicendum opportunè referuabuntur. Sunt autem illi A, B, usq; ad L. 1. f. 4. 1. 1.

1. Frontis os. I etiam ponitur in oculorum sedibus, eam frontis ossis partem notans, quæ superiorem oculorum sedium regionem constituit.

K Verticis

- K* Uerticis os finistrum.  
*L* Sinistri temporis os.  
*N* Alammillarum processus finister, iuxta quem processus stylum referens etiam occurrit.  
*N* Cuneiforme os, in finistri temporis cavo & in dextri oculi sede *N* insignitur. In finistri autem oculi sede *G* & *H* reponuntur, idem os indicantia. quanquam illi characteres huius sedis foraminibus ostendendis peculiariter sibi seruiant. Ad hec, *N* quoq; reponitur ad intimum finistri lateris dentem, notans cuneiformis ossis particulam, & dein suturam, id os a superiori maxilla hac in sede diuidentem.  
*ΓΓ* Hoc os nobis primum maxille superioris numerabitur. ac *Γ* in oculi sede positum, huius ossis partem notat, in oculi sede conspicuam. T. os. 1. 1. 1. 1.  
*Δ* In finistri oculi sede *Δ* tantum apparet, superioris maxille secundum os indicans. 2. os. f. 11  
*Θ* In finistri quoq; oculi sede *Θ* tantum occurrit, tertium maxilla superioris os indicans. 3/  
*Λ, Δ* Quartum maxille superioris os. *Λ* in oculi sede positum, huius ossis partem notat, quæ inferiorem oculi sedis regionem magna ex parte constituit. 4.  
*Ξ* Quintum maxille superioris os. Sextum uero in secunda figura *Π* notandum, hic nullibi sese offert. 5.  
*O* Narium septum, quod octauum capitis ossis cribri modo perforati processus habetur.  
*P* Sutura duos ossium processus committens, quibus iugale os efformatur.  
*Q* *Q* ad *S* sutura notatur, cuneiforme os a primo maxille superioris osse dirimens, ac hic in oculi sede conspicua, in dextriq; oculi sede ad characterem *Q* clarius fere, quam in finistri, apparet.  
*R, S, T, U, X, Y, Z.* Sutura frontis os a maxilla superiori & cuneiformi diuidens. Ab *R* enim ad *S* sutura interuallum notatur, frontis ossi & primo maxille ossi commune. Ab *S* ad *T* sutura huius interuallum indicatur, frontis ossi & cuneiformi commune. *A* *T* ad *U* interuallum metitur, tertio maxille ossi & frontis ossi commune. Ab *U* ad *X* interuallum insignitur, commune frontis ossi & secundo maxille ossi. Inter *X* & *Y* interuallum consistit, quarto maxille ossi ac frontis ossi commune. Ab *Y* uero ad *Z* significatur interuallum commune frontis ossi, & quinto maxille ossi.  
*a* Maxille sedes aspera, inaequalisq; Verum ab *a* ad *b* sutura indicatur, primo & quarto maxille ossibus communis, ubi haec in anteriori caluaria sede est conspicua.  
*b* Ab *b* ad *Q* sutura primum os a quarto diuidentis pars indicatur, quæ in oculi sede est conspicua, quæq; in huius figura sinistra oculi sede characteribus paucioribus occupata, est manifestior.  
*c* Ab *U* ad *c* sutura notatur, secundo ossi & tertio communis. Quicquid autem sursum per anteriora iuxta *C* & *Δ* ad *X* usq; ducitur, secundum os a quarto dirimit.  
*d* *d* serui describendo tertio maxille ossi. *T* enim ad *U* superiorem eius ossis sedem describit, *U* ad *c* anteriorem, *T* ad *d* posteriorem, *c* uero ad *d* inferiorem.  
*e* ad *Y* suturam notat, quarto maxille ossi & quinto communem.  
*f* fac *Z* suturam insinuat, quinto unius lateris ossi & quinto alterius lateris ossi communem.  
*g* In narium amplitudine *g* ponitur, suturam indicans, quæ septum narium a quartis maxille superioris ossibus disiungitur.  
*h* Sutura, aut harmonia potius, quartis maxille superioris ossibus communis, cuius beneficio illa inuicem in musculis uocata regione dirimuntur.  
*i* Ad superiorem foraminis *B* notati sedem, *i* ponitur, indicaturum quarti ossis suturam, quæ elatius quam id foramen consistit, ipsiq; quarto ossi dumtaxat peculiaris est.  
*k* Ab hoc characterē, eorum qui in canis caluaria occurrunt primo, ad *l* usq; sutura notatur a mala sursum ascendens, ad medium usq; inferioris ambitus sedis oculi.  
*l, m* Ab *l* usq; ad *m* sutura notatur, a medio inferioris regionis ambitus sedis oculi, ad supercilia usq; iuxta internum oculi angulum ascendens.  
*n* Sutura ab illa quæ externum nasi ossium latus circumscribit, inter caninum dentem & incisivum ipsi proximum delata.



SECVNDÆ FIGVRAE, EIVSDEMQUE  
characterum index.

SECUNDA figura, calvaria basim palatumq; exprimens, eam maxille superioris ossium sedem proponit, qua pracedete figura non fuit obvia. Quamquam uero hæc pluribus insignitur characteribus, eos tamen hic tantum explicabimus, qui ad maxilla superioris ossium spectant historiam.

L Hic modica ossis frontis portio in conspectum uenit.

O O P P Cuneiforme os.

Q, Γ Primum superioris maxille os.

S, Λ Quartum superioris maxilla os.

U, X Calvaria sedes, quam os ingale Anatonies peritis uocari, iam antea dictum est.

Y Sutura, qua duos processus os ingale efformantes committit.

d Hic latuit sutura, primo maxille superioris ossi & cuneiformi communis. dein sutura primo ossi et quarto communis sedes, in temporis cauo conspicua.

e Sutura quarto maxille ossi & cuneiformi communis.

f Sutura primo maxille ossi & quarto communis pars, in anteriori maxilla regione apparsens.

g Sutura frontis ossi & primo maxille ossi communis.

Π Sextum maxille superioris os.

q Ab e uersus q sutura sexto maxilla ossi & cuneiformi communis indicatur.

Σ Septimum narium, & sedes qua id a cuneiformi osse dirimitur.

1. u A t ad u transversa notatur sutura, sexto maxilla ossi & quarto communis.

x Ab x ad t sutura indicatur, duobus sextis maxille superioris ossibus communis.

y Sutura notatur recta per palatum ducta, & quartis maxilla ossibus communis.

z Primum indicatur foramen in anteriori palati sede, posterioriq; dentium incisiorum regione apparsens: ad cuius latus interdum obsecra occurrit sutura, transversim aliquosq; in quarto superioris maxille osse prorupens,

α. & α insignita.





VPERIOREM maxillam in ofsium historia appellamus, eam caluariæ partē, quæ post octo capitis ossa, sedem qua cerebrum continetur, simul efformantia, & duo utriusq; auditus organi ossicula, nobis adhuc commemoranda superest: quæq; inferiorem oculorum sedis partem, & latera, magnamq; illam narium cavitatem, & altiorem nasi regionem, & palatum constituit, superioremq; dentium seriem complectitur. Hanc non unico quidem, sed pluribus extrui credimus ossibus, ut pellendis iniurijs reddatur promptior, noxasq; minori sustineat incommodo: quum scilicet partis suæ alicuius vitium simul cum ipsius circumscriptione terminetur, neque in totam maxillam, ueluti per fictile uas, pertingat. Verum alia insuper copiae ossium habetur ratio, ipsa nimirum maxillæ sedium uarietas, quæ non undique ossa pariter aut densa, aut dura, aut crassa, aut mollia exigit: ut cunq; interim hæc maxima ex parte duris constet, sed ijs admodum leuibus. nam præter narium, quam efformat, cavitatem, illa intus ad eius cavitatis latera impense existunt caua, insigniaq; antra sic continent, ut maxillæ superioris compositionem imaginibus pulchrè assimilaues, quas intus cauas è cera fundimus: quo scilicet necessaria ipsius magnæ moli peculiaris raraque accedat leuitas, quæ pondere non grauans, etiam producendæ uoci miris modis sit opportuna. Haudquaquam enim Galeno est assentiendum, qui superiorem maxillam medullæ expertem, durisq; ossibus, nec leuitate indigentibus, efformatam docet, quòd hæc perinde ac inferior non moueatur. Quum interim hæc illa multo sit ualidior, & osse cõstet iniurijs propellendis longè promptiori. Cæterum maxillæ superioris ossa (præter superiores dentes, & tenuia quædam, fungosa, & quodammodo membranea, cartilagineaq; ossicula, in narium cavitatis summo occurrentia) duodecim sunt, ab utroq; latere sena. quorum<sup>a</sup> primum, sedis oculi externum constituit angulum.<sup>b</sup> secundum & tertium, ad oculi sedis internum referuntur angulum.<sup>c</sup> quartum omnes sui lateris suscipit dentes.<sup>d</sup> quintum è duobus quæ naso ascribimus ossibus, alterum censetur.<sup>e</sup> sextum cum suo coniuge ad palati finem collocatur, quæ narium<sup>f</sup> foramina in oris amplitudinem pertinent. Hæc inuicem & conterminis ipsis capitis ossibus, per futuras & harmonias compinguntur. at quum harmoniæ istæ magna ex parte, si quando effringuntur, intus mutuum quandam contextum referant, quem futuræ quodammodo comparare queas, illæ futurarum etiam nomine in superioris maxillæ historia à dissectionum peritis donantur. Vt uerò has omnes cum circumscriptis ab ipsis ossibus opportunè expendas, quiq; Galeni hic obscuræ alioquin, parumq; sibi consentientes descriptiones, canibus & simijs potius, quàm hominibus quadrent, obserues, perinde atq; ego in scholis facere consueui, omnes humanæ caluariæ, quæ tibi undiq; occurrunt, futuras, quantumuis leuiter conspicuas, & harmoniæ etiam speciem referentes, in altero latere atramento obliterabis: ita enim promptius sic ueluti in crassatæ & tinctæ obuiam ueniēt, leuioriq; negotio uniuersam ossium circumscriptionem, nostra, quam modò subijciam, accommodata historia, comprehendes, canis & simiæ dein fabricam consideraturus. <sup>a</sup> Primum itaq; superioris maxillæ os, alteram ossis iugalis partem cõstituit, & nonnihil temporis, supercilijq; ac sedis oculi, totum uidelicet exteriorem angulum, in se comprehendit, non minimā malæ etiam portionem efformans. Coniungitur autem hoc os, temporis ossi, interuentu<sup>b</sup> futuræ, quæ duos processus os iugale efformantes iungit. Dein committitur ossi cuneiformi,<sup>c</sup> eius futuræ beneficio, quæ per

Quæ caluaria pars superior uocetur maxilla

Cur pluribus constet ossibus, & ijs canis & leuioribus.

Lib. xx. de vitiis parium.

Breuis maxillæ ossium enumeratio.

Primi maxillæ ossis historia.

f caua

a 1, 2 fig. r, r.  
b 1 fig. Δ.  
c 1 fig. Θ.  
d 1, 2 fig. Λ, Λ.  
e 1 fig. Ξ.  
f 2 fig. Π.  
g 2 fig. cd.  
h 2, a.

a 1, 2 fig. r, r.

b 1 fig. p. 2  
figura γ.  
c 3, 4 fig. δ  
capitis d.

caua temporum decliuſ ducta,<sup>d</sup> etiam in oculi ſede conſpicitur, huiꝰq; primo <sup>d</sup> f. Q. maxillæ oſi & cuneiformi communis eſt. In ſuperiori parte<sup>e</sup> neſcitur frontis <sup>e</sup> f. R. oſi, ea ſede, qua ſupercilij habetur extremum. Fit uerò hæc commiſſura illius <sup>f</sup> f. R. S. futuræ beneficio, quæ à cauis temporum per oculorū ſedes ad ſuperciliorum <sup>T, V, X, Y, Z.</sup> medium fertur, frōtiſq; os à maxilla ſuperiori & cuneiformi diſcernit. Inferio-  
ri autem parte inſigni amplitudine primum os quarto ea futura compingitur, <sup>g</sup> f. 6. quæ tribus locis in conſpicuo eſt:<sup>h</sup> in cauo ſcilicet temporum ſub oſſe iugali, <sup>cap. ſſ.</sup> in anteriori maxillæ regione iuxta malam,<sup>i</sup> & in oculi ſedis inferiori parte. Su-  
turæ pars in cauo temporum conſpicua, ab inferiori ſine futuræ, os cuneiforme à primo maxillæ oſſe diuidentis incipit, obliquè deorſum nonnihil in prio-  
ra tantisper descendens, quouſq; ad<sup>k</sup> inſimam malæ ſedem, ubi hæc aſpera in-  
æqualisq; eſt, pertingat. Pars autem in anteriori maxillæ ſede occurrens, à mala  
obliquè ſurſum contendit, ad median regionem inferioris ambitus hîc oculi  
ſedem circumſcribentis. Pars uerò in oculi ſede apparens, à medio inferioris  
ambitus ſedis oculi, per humiliora eius ſedis retrorſum obliquè ad inſimam<sup>l</sup> f. Q. futuræ, cuneiforme os à primo maxillæ oſſe dirimentis regionem conſcen-  
dit. Hunc igitur in modum primum os circumſcribitur, quatuor (uti dixi-  
mus) oſibus commiſſum: temporis ſcilicet oſis proceſſui alteram oſis iuga-  
lis partem efformanti, dein cuneiformi oſi, frontis oſi, & quarto maxillæ oſi.  
<sup>Secundum ma-</sup> <sup>xillæ os.</sup> <sup>a</sup> Secundum os cæteris omnibus longè miſus, & ſquamæ quaſi modo ten-  
ſi, in interno oculi ſedis angulo conſiſtit, ubi<sup>b</sup> foramen habetur, cui<sup>c</sup> carun-  
cula præeſt, internum oculi angulum occupans, & in hoc creata, ne quid pi-  
tuitæ ad oculi ſedem à cerebro expurgatum, in genas deſluat, ſed totum per  
id foramen in narium amplitudinem procumbat. Oſſiculum hoc ſuperiori  
parte,<sup>d</sup> modico interuallo futuræ terminatur, frontis os à ſuperiori maxilla  
diſtinguentis. unde etiam futuræ illius interuentu, oſſiculum id frontis oſi  
committitur. Ab hac futura,<sup>e</sup> alia ſecundū poſtერიorem oſſiculi regionem  
deſcendit, quæ ſecundū oſſiculi inferiora dein repens, per anteriorem illius  
regionem ſurſum in eam futuram denuò aſcendit, quam frontis os à ſuperio-  
ri maxilla dirimere diximus. Cæterū futura, quæ ad eum modum in orbem  
penè fertur, in poſtერიore oſſiculi regione (quæ oculi ſedis conum reſpicit) ſe-  
cundo oſſiculo cōmunis eſt, & illi quod tertium maxillæ nobis enumeratur.  
Ad inferiorē uerò oſſiculi partem, & ſecundū anteriorem iplius regionem,  
futura hæc communis eſt ipli oſſiculo, & quarto maxillæ ſuperioris oſi. Vn-  
de etiam præſens oſſiculum ſuperiori parte frontis os, poſtერიore tertium ma-  
xillæ os, inferiori uerò anterioriq; quartum maxillæ os contingit. quod quia  
laxè hæret, anterioriq; parte quarto oſi harmonia uerius quàm futura iungi-  
tur, in caluarijs è terra effoſis raro occurrit: potiſſimum quum inſuper tenue  
ſit, & humida hac ſede poſitum, facile putreſcat. In coëtiſ uerò caluarijs, & ar-  
te ad oſium diſciplinam paratiſ, abſque negotio ſeruatur. <sup>Tertium ma-</sup> <sup>xillæ os.</sup> <sup>a</sup> Tertium os ſi-  
militer ſerè ac ſecundum tenue, & ſquamæ inſtar pellucidum, ſi quando ef-  
fringitur, intus amplis ſinibus aere oppletis ſcatere cernitur, paulo minus to-  
to quadrangulum, & in interno latere ſedis oculi repoſitum. <sup>b</sup> Superius e-  
nim terminatur futura frontis oſi, & ſuperiori maxillæ comuni. <sup>c</sup> ante-  
rius communem futuram cum ſecundo maxillæ oſſe adipiſcitur. <sup>d</sup> Poſterius  
communem cum cuneiformi oſſe futuram obtinet. <sup>e</sup> inferiori parte, cum  
quarto maxillæ oſſe, comuni futura donatur. Vnde etiam quatuor oſibus  
tertium hoc os connectitur, ſuperius ſcilicet frontis oſi, anterior ſecundo ma-  
xillæ oſi, poſterius cuneiformi, inferior quarto maxillæ oſi. Interius uerò,  
quā

d f. Q.  
e f. R.  
f f. R. S.  
T, V, X,  
Y, Z.

g f. 6.  
cap. ſſ.  
h f. 6.  
i f. 6.  
k f. 6.  
l f. Q.

f. Q.

a f. 6.  
b f. 6.  
c f. 6.  
d. lib. 7, 2.

d f. 6.  
V ad X.  
e f. 6.  
V ſecundū  
d. & c de-  
orſum, ac il-  
line rursus  
ſurſum ad  
X.

a f. 6.  
b f. 6.  
c f. 6.  
d f. 6.  
e f. 6.  
f. 6.

quà narium spectat amplitudinem, cum inordinata ofsium compage intus in  
 a 1, 2 fig. narium summo reposita, coit. <sup>2</sup> Quartum superioris maxillæ os, reliquorum  
 A, A. ipsius ofsium longè maximum, omnes sui lateris dentes excipit, uarijsq; futu-  
 ris circumscribitur: quem admodum & ipsum quoq; uarium est, huc atq; illuc  
 in plura loca pertingens. Primùm itaq; futura illa terminatur, quæ primum os  
 b 4 fig. ca. ab ipso discernit: eam dico, quæ simul in <sup>b</sup> cauo temporis, & in anteriori ma-  
 6 f. f. xillæ regione, & <sup>d</sup> in oculi sede conspicitur. Deinde quartum os terminatur fu-  
 c 1 fig. ab turis, secundum maxillæ os & tertium ab ipso dirimentibus: <sup>e</sup> quæ secundum  
 d 1 fig. a b totam sedis oculi longitudinem in inferiori eius sedis parte, & in anteriori re-  
 ad D. gione secundi maxillæ ofsis, ducuntur. Ad hæc, iuxta superciliorum medium,  
 e 1 fig. ab x quartum os, futuræ superiore maxillæ à frontis ossè disiungentis finitur <sup>f</sup> in-  
 ad c, de in teruallo, quod ab anteriori sede secundi ofsis, ad exterioris quinti nobis enume-  
 ad d. f randi ofsis laterus pertinet. à quo quartum dirimitur, <sup>g</sup> futura à nasi summo  
 f 1 fig. ab x iuxta ipsius externum latius, deorsum ad quinti eius ofsis longitudinem porre-  
 ad Y. g cta. Secundum narium uerò à facie ad oris usq; amplitudinem incessum, quar-  
 g 1 fig. ab tum maxillæ os ab illorum septo <sup>h</sup> futura interstinguitur, per humillimam se-  
 X ad e. pti sedem prorepente. In posteriori sede quartum os à cuneiformi dirimitur, <sup>i</sup>  
 b 1 fig. g tum in oculi sede, <sup>k</sup> tum etiam iuxta intimum dentem, ubi futura cuneiforme  
 occurrens os à superiori maxilla terminans consistit. In palati fine, uersus interiora,  
 in O. i 1 fig. D quartum os <sup>l</sup> transuersa futura ab illo ossè se iungitur, quod sextum maxillæ ap-  
 ad H. k 1 fig. N. pellamus, quodque hic ad narium foramina cum suo coniuge reponitur. At-  
 2 fig. e. i 1 fig. ab u que has omnes futuras quartum os cum alijs sibi conterminis ofsibus habet  
 ad t. m 2 fig. a communes: ijsque <sup>m</sup> alia accedit quarto ofsi dextri lateris, & quarto sinistri la-  
 t per x ad teris ofsi propria, quæ per palati longitudinem prorepens, non solum in pala-  
 z. to, uerùm & in narium amplitudine est conspicua. <sup>n</sup> uti & in anteriori maxil-  
 u 1 fig. b. læ sede sub naribus illic cernitur, ubi superioris labri sulculus consistit: etsi in-  
 terim illic linea potius, quàm futura censeretur debeat. Quartum itaq; os septem-  
 decim conterminum est ofsibus, primò uidelicet, secundo, tertio, quinto, &  
 sexto maxillæ superioris: deinde frontis ofsi, cuneiformi, & octauo capitis  
 ofsi, ipsi uidelicet foraminum narium septo. ac demum quartum maxillæ os  
 suo coniugi, seu alterius lateris quarto ofsi iungitur: quemadmodum & octo  
 dentibus sibi ipsi infixis, quoties superior maxilla sedecim dentibus decora-  
 tur. Præfens os magna ex parte latera & inferiorem sedem foraminum na-  
 rium constituit: & ad hæc latera, non uulgari sanè ad uocis productionem  
 usu, cauum est, & cereis imaginibus intus uacuis perquàm simile, neutiquam  
 uerò solidum. Huic ofsi, præter alia ipsius foramina, <sup>o</sup> unum accedit, quod ab  
 o 1 fig. A in oculi se- de posuit, de in B. inferiori oculi sedis regione incipiens, deorsum in anteriorem maxillæ par-  
 tem porrigitur. Istud ubi primùm in oculi sede inchoatur, notabili interual-  
 lo superius, ueluti ossæ constat squama: ubi autem in anteriorem maxillæ  
 partem pertinet, iam penitus in ossè exculptum uisitur: atque etiam inter-  
 uallum notatu dignum apparet inter oculi ambitum & superiorem forami-  
 p 1 fig. i. nis sedem. Hoc intervallum creberrimè non continuum est, sed <sup>p</sup> futura do-  
 natur, quæ huic quarti ofsis particulæ (ubi foramen consistit) propria pecu-  
 liarisque est. Quis uerò huius foraminis usus censeatur, in communi omni-  
 um caluariæ foraminum sermone exequar. in præsentia autem obiter in il-  
 lius mentionem incidi, quò aptius futuram quarto ofsi propriam hic recen-  
 serem: ne quis fortè, quum ipsam obseruaret, illam plura constituere ossa, ac  
 altius quàm ab oculi sedis ambitu ad foramen usque ferri arbitraretur. Præ-  
 terea in anteriori palati sede, ad posteriorem incisiorum dentium regio-  
 nem,



nem, aliud<sup>a</sup> foramen se offert, quartis maxillæ superioris ossibus commune, q<sup>a</sup> fig. x. & ex palato in narium amplitudinem spectans. Ad huius foraminis latera interdum<sup>a</sup> futura apparet, aut potius linea, in pueris cartilagine oppleta, quæ r<sup>a</sup> 2 fi. a. a. quasi ad caninorum dentium antèrius latus pertingit, nusquam tamen adeò penetrans, ut huius futurae beneficio, quartum maxillæ os in plura diuisum censi queat: quod (ut paulo post dicam) canibus & simijs porcisq; accidit, s<sup>a</sup> 1 fig. ca. in quibus futura quartum os in duo diuidens, non solum in palato, uerùm ex- nina calua- ria n. terius in anteriori maxillæ sede, etiam conspicuè cernitur, nullam appendi- d<sup>a</sup> 1 fig. x. cum cuni suis ossibus coalitus speciem referens. Quintum maxillæ superio- ris os, ex duobus nasi ossibus alterum est, osiculum uidelicet durum, solidum, latum, tenue, oblongum, & quadrangulo potius quàm triangulo simile. b<sup>a</sup> Su- b<sup>a</sup> 1 fig. ab periori enim parte non in acutum definit angulum: uerùm adeò obtusum est, X ad Z. ut inibi duobus donetur angulis, ea ibidem finitum futura, quæ frontis os à su- c<sup>a</sup> 1 fig. ab periori maxilla illic terminat. Y ad c. Externum uerò ossis latus communem futu- ram nanciscitur cum quarto maxillæ osse, quæ secundum nasi latus, tantum decliuus pertingit, quanta quinti huius ossis est longitudo, quæ in homine lon- gè breuior quàm canibus & simijs uiuitur. d<sup>a</sup> Internum uerò ossis latus, quo con- d<sup>a</sup> 1 fig. 2 iugi suo committitur, futuram obtinet harmoniæ non admodum dissimi- Z ad f. lem, ac utrisque nasi ossibus communem. Hæc à medio superciliorum ex fu- c<sup>a</sup> 1 fig. ab tura frontis ossi ac superiori maxillæ communi incipiens, decliuus secundum f<sup>a</sup> 4 muscu- ossium nasi longitudinem porrigitur. Inferiori autem parte, quintum os fu- lorum tabu- le, K, L. tura haud intercipitur, neque alteri ossi iungitur: uerùm hoc unà cum suo con- iuge asperum inæqualeq; est, & in cartilaginem finit deorsum procedentem, eòq; molliorem, quo longius ad nasi apicem deferitur. Hanc cartilaginem cum reliquis nasi & totius corporis cartilaginibus priuatim post ossium enarratio- nem prosequemur. a<sup>a</sup> Sextum os, cum suo pari non minimam palati & na- rium amplitudinis portionē constituit. Reponitur enim ad palati extremum, quæ nares in fauces pertinent estq; os tenue, sed solidum, latumq; Id<sup>b</sup> postero- ri sede partim cuneiformi committitur ossi, partim liberum est, semiparen- thesis (formam referens. Vbi cuneiformi ossi committitur, illa circumscri- ptum est futura, quæ iuxta posteriorem intimi dentis sedem fertur, maxillamq; superiorem à cuneiformi osse dirimit, ea potissimum parte, ubi os cuneiforme suos educit<sup>a</sup> processus, uespertilionum alis similes. d<sup>a</sup> Anteriori parte & ex- terno latere sextum os futura terminatur, ipsi & quarto maxillæ ossi commu- ni, ac transuersim in palato ducta. f<sup>a</sup> Interiori autem latere, quo se cōiugi suo iun- g<sup>a</sup> git, futura quadam terminatus, quæ ambobus sextis ossibus communis est, portioq; illius existit, quæ per palati longitudinem prorepens, quarta maxillæ ossa inuicem separat. Contingit igitur sextum os, cuneiforme os, quartum ma- xillæ, & suum cōiugem, & postremò narium septum: quod etiam à sexto osse, quemadmodum à quarto, ea dirimitur<sup>b</sup> futura, quam per septi humiliorem sedem duci, antea commemoratum est. Haec tenus itaq; sex alterius lateris de- scripsi ossa, quæ si senis oppositi lateris connumerentur ossibus, omnia supe- rioris maxillæ ossa confurgunt duodecim, quibus nullum octo capitis ossium adieci. Cæterum si ad amussim singula quæ hoc Capite persecutus sum, ex- cussis, ac demum nō perfunctoriè Galeni superioris maxillæ descriptionem euolueris, permulta iam occurrerunt, in quibus ab illius placitis declinem. quæ etsi omnia in præsentia (tuæ fidens indultriæ) non commemorauero, non- nulla tamen subijciam, è quibus meæ diligentiae specimen aliquod animad- uertere queas. Galenus itaque in libro de Ossibus, futuras maxillæ peculiare descri-

Quintum ma-  
xilla os.

Sextum ma-  
xilla os.

in uersa supe-  
rioris maxilla  
ossa esse duode-  
cim.  
Nō omnia præ-  
senti Capite ha-  
bitum tradita,  
Galeni placitis  
respondere, quo-  
rum quædam ad  
Capitis nō fi-  
nē referuntur.

d<sup>a</sup> 1, 2 fi. P.

e<sup>a</sup> 2 fig. a t  
ad u.

f<sup>a</sup> 2 fig. a t  
ad x.

g<sup>a</sup> 2 fig. t,  
2, 2.

b<sup>a</sup> 1 fig. g.

descripturus, earum seriem à malæ infima & extima sede aggreditur, quam ego asperam inæqualemq; esse recensui, quòd<sup>d</sup> masseter musculus sui principij ualidisimā nerueanq; admodum portionem illinc educat. Hic igitur Galenus futuram describit, primum maxillæ os à quarto dirimentē: ac primam appellat eius futuræ partem, quæ<sup>b</sup> in cauo temporis est conspicua. Secundam uerò numerat, huius futuræ partem in anteriori maxillæ sede occurrentem, quæ ab illa malæ asperitate sursum ad medium inferioris ambitus sedis oculi pertingit. Hanc postmodum tripartitò ait discindi, ac<sup>c</sup> primam huius secundæ futuræ partem prope magnum seu internum oculi sedis angulum exteriori in parte ad medium superciliorum, & communem frontis & maxillæ futuram inquit procedere. Hac futuræ parte homines destituuntur, uerum in canibus caudatisq; simijs est manifestissima.<sup>e</sup> quamuis interim non exactè ad superciliorum feratur medium, sed ad eam tantum sedem, in qua quartum maxillæ os à secundo dirimitur. Vt itaq; Galenum assequaris, hanc partem ex canis petes caluaria. Porro de secundā partem secundæ futuræ, inquit Galenus,<sup>f</sup> per concuum sedis oculi sub magno angulo ad cōmunem capiti & maxillæ futuram pertinere, hancq; eundem angulum comprehendere. Hæc pars ea esset futura, quam secundum & tertium maxillæ ossa in inferiori ipsorum sede, à quarto dirimere docuimus. Verum hæc in homine nequaquam secundæ Galeni futuræ committitur: multoq; minus primam partem secundæ futuræ contingit, quum hæc in canibus tantum & simijs, non autem hominibus cernatur. Porro<sup>g</sup> foramen, quod huic secundæ parti Galenus subijci scribit, id esse opinor, quod in oculi sede oblongum, admodumq; patulum est, inter quartum maxillæ os & cuneiforme conspicuum.<sup>h</sup> Tertiā partem secundæ futuræ Galenus appellat portionem futuræ primum os à quarto diuidentis, quæ in oculi sede spectatur, unā cum illa quæ cuneiforme os à primo maxillæ ossē disiungit, atq; in oculi sede etiam spectatur. Galeni enim est sententia, sub dictis duabus futuris (quæ duæ primæ partes sunt ipsius secundæ futuræ) tertiā eiusdem partem inferiorem in sede oculi ambitum inscendentem, interius ad inum contendere, ibiq; cōmuni futuræ capiti & maxillæ superiori iungi. His futuris Galenus tria maxillæ superioris ossa circumscribi, postea subiecit, quibus hæc capiti cōmittitur. <sup>i</sup>Primum esset, quod ego primum maxillæ statui.<sup>k</sup> secundum, ea quæ mihi secundum & tertium numerabantur: duo enim illa unius ossis loco ex Galeni placito recenseretur. <sup>l</sup>Tertium, pars esset nostri quarti ossis, quicquid scilicet ipsius in oculi sede consistit, ea nimirum pars, in qua<sup>m</sup> foramen incipit, ab oculi sede in anteriorem maxillæ regionem pertinet. Quòd uerò Galenus peculiaria constituat ossa, quibus incisorij dentes infiguntur, hinc accidit, quòd suis nimium fauens simijs, eas homini similes esse, plus satis sibi persuadebat. In canibus enim & simijs, porcisq; ac alijs animalibus, quibus canini dentes ualidi exertiq; obtigerunt,<sup>n</sup> duæ (uti prius dixi) occurrunt futuræ, aut harmoniæ potius, admodum conspicuæ, quibus homo destituitur. A futura enim quintum caninæ maxillæ os à quarto distinguente, alia pro dit futura, oblique deorsum inter caninum & incisorium canino proximum delata, & cum illa communis euadens, quæ in palati extremo iuxta incisorios dentes transuersim in illis animalibus fertur. Hæc futura citra omnem cartilaginis interuentum aded insignis est, ut quartum à me enumeratum maxillæ os, canes in duo diuisum commonstrent. Verum non arbitrandum est, futuram hanc, inter dentium præsepiola in canibus aut simijs ductam, à superciliorum medio deorsum continuo progressu (etsi Galenus ita doceat) ferri: quum, uti iam admonuimus,

ex medio ferè ductu illius futuræ incipiat, quæ externum quinti osis latus terminat. Quod ubi in cane sumia ue inspexeris, accuratè expendito, quàm impossibile sit, hanc futuram porrigi inter dentes hominis, maxillam adepti breuissimam, & dentibus caninis prorsus exiguis donati. Insuper animaduertito, quid in libris de Partium usu Galenus sibi uoluerit, quum duodecim superioris maxillæ esse ossa obiter scripsit: uti & Introductorij seu Medici autor, duodecim tantum maxillæ ossa, è Veterum indubiè placito, enumerat: aut quum Lib. II. Galenus hæc ossa prolixius cōmemorans, nouem tantum recenset, nullumq; os priuatim incisorij dentibus tribuit, in eo etiam numero cuneiforme os haud complectens.

DE MAXILLA INFERIORI.  
Caput X.



VTRARVMQVE DECIMI CAPITIS FIGURARUM, & earundem characterum Index.

*PRIOR*, seu dextra huius Capitis figura, inferiorem maxillam unà cum suis dentibus anteriori facie exprimit. Posterior figura, inferiorem maxillam simul cum humiliori dentium serie, posteriori sede delineatam exhibet. Figura autem tertio huius libri Capiti præposita, & C insignita, maxillam à latere delineatam ostendit.

A 1, 2 Alterum maxilla inferioris capitulum, quo illa temporis ossi dearticulatur.

B 1, 2 Cervix, seu collum capitis A insigniti.

C 1, 2 Alterius lateris acutus processus, cui temporalis musculus inseritur.

D 2 D in umbra latitat, sinistra figura amplum indicans sinu, cui tertius maxillam mouentiu inseritur musculus.

E 1, 2 Asperitas ad posteriorem inferioremq; maxillæ sedem conspicua, ad quam manusius inseritur.

F 2 Foramen, tertij paris neruorum cerebri sobolem admittens.

G 1 Foramen, quo dicti nuper nervi furculus in humilior labrum procidit.

H 2 In hæc tubercula maxilla detrahentes musculi implantantur, & quidam lingue subseruietes ab ipsis oriuntur.

Homini breuissimam oblique inferiorem maxillam.



**NIMALIVM** omnium homo inferiorem maxillam, pro totius corporis mole, breuissimam adipiscitur. Huic enim facies obtigit rotunda, non autem longa, ut reliquis animalibus, quæ cibum assumptura inclinantur. Duram uerò hominibus maxillam fieri deuit, quòd sola mobilis sit, & uarios atq; fortissimos motus in mordèdo mandendoq; sustineat. Cæterum ne sic dura solidaq; nimio pondere ipsam mouentibus musculis incommodo foret, sinus & cavitates notatu dignas, medullaq; infarctas ostendit, interim appendicis undiq; expers. Sinus hi non adeò in posteriori maxillæ parte homini ac quadrupedibus exculpuntur, sed antrorsum magis, uersus menti regionem, & ad maxillæ latera. Plurimis animalium maxilla duobus constat osibus in summo mento, per unionem connexis. Homini autem, unico cōformatur osse, ac in summo mento lata & crassâ,

Maxillam homini ferè unico esse extrui.

6 musculo- rum tabula maxillæ per medium sectionem pro- pont.



crassa, non uerò, ut in cæteris animalibus, acuta cernitur. Nulla enim parte maxilla difficilius quàm hîc discinditur. & coctione, aut carie in terra illam dissolui, nondum animaduerti. Canum uerò, boumq; & asinorum maxillæ, etiam citra coctionis beneficiû, inuicem paruo conatu interdum diuelluntur. Quamuis interim Galenus, & alij pleriq; post Hippocratem dissectionum periti, maxillam non unicum esse os asseruerint, sed coctum in summa menti extremitate laxari, ob idq; ipsum coaluisse, manifestum indicium esse. Vt cunq; sit, hæc tamen mihi nulla gemino constructa ossæ occurrit. Et licet fortè inter tot hominum myriades, in canino aliquo homuncione, aut puerulo, talem quampiam maxillam aliquando obseruarem, non tamen ideo mox asseram, hominis maxillam duplici ossæ costare: quin Celfo potius, aut illi Græco auctori, ex quo Celsus, quicquid de ossibus prodidit, mutuatus est, accedam, qui cum Galeno canes (nam de simijs tandem alia ipsi fuit in libro quarto de Administrandis sectionibus sententia) parum curans, maxillam simplici ossæ componi docuit. Et quamuis hæc in pueris duobus ossibus per unionem commissis efformaretur, non ideo tamen simpliciter duplici ossæ maxillam constare, rectè dicemus, nisi etiam occipiti os, uertebras, & ossa quæ sacri ossis lateribus coarctantur, pluribus effingi ossibus donaremus. siquidem hæc in pueris compluribus ossibus mutuo per unionem coeuntibus extrui, nemo negauerit. Inferior maxilla utrinq; in duos definit processus, quorû alter in mucronem productus, musculi temporalis insertionem excipit, totus ab illius tendine cõplexus. <sup>b</sup> Alter, qui posterior est, in capitulum transuersim oblongum finit, sibi correspondenti sinui inarticulatum, qui ad iugalis ossis radicem & anteriorem auditus organi sedem temporis ossi insculpitur. Huic sinui, ut & maxillæ capitulo, cartilago crustæ modo obducitur. uerum præter hanc cartilaginem omnibus articulis pariter communem, inter sinum capitulumq; aliareponitur cartilago læuis, tenuis, & mollis, ligamentiq; naturæ, quod ad substantiam spectat, nonnihil compos. Hæc ligamentis articulum in orbem continentibus, non autem ossibus, connata, durorum præsentis articuli ossium impetus exoluit, & quo minus mutuo affricu in ualidis assiduissq; maxillæ motibus ossa rumpantur, scitè unâ cum cartilaginibus sinui & capitulo obnatis præstat. Dein maxilla duobus

utrinq; donatur foraminibus, quorum <sup>a</sup> alterû in interiori ipsius regione, non procul à nunc commemoratis processibus, <sup>c</sup> alterum uerò in exteriori sede ad labri inferioris radicem latusq; cernitur. Interius, quod & amplius, & in æquale, seu asperum est, uiam præbet <sup>f</sup> portioni nerui tertij paris neruorum cerebri ad dentium radices dispersæ, unâ cum uenula & arteria, quæ dentibus & maxillæ nutriendis hoc foramen subeunt. Exterius uerò, eius nerui <sup>e</sup> sobolem ex maxilla in humiliori labrum finit procidere, estq; longè minus interiori. Porrò si setam exiccate maxillæ interno foramini indideris, eam ab hoc foramine ad externum usq; leui opera protrudes. & si maxillam effregeris, continuum iter ab uno foramine in alterum canalis modo cælatum obseruabis. Præter hæc foramina, in maxillæ externa superficie, alia prorsus nulla reperias: nisi fortè & al uelos præsepiolaq; illis annumerare lubeat, quibus dentes instar clauorum infigi, mox trademus. Quòd uerò horum quoq; sinuum alueorumq; gratia, inferior maxilla etiam crassior euaserit, hinc potissimum constat, quòd in uetulis, illisq; quibus dentes eruti sunt, ac in quibus ipsi dentium alueoli succreuerunt, maxilla ab imo sursum multo tenuior & angustior efficiatur. Maxilla, ubi dentes ipsi non infiguntur, eaq; sede, qua commemoratos nuper educit processus,

Duo utrinq;  
maxillæ pro-  
cessus.

Peculiaris in ma-  
xillarum articulo  
cartilaginis ef-  
figies.



Maxillæ fora-  
mina.

Dentium al-  
ueoli.

Maxillæ in po-  
steriori sede am-  
plitudo, tenui-  
tas, sinus, aspe-  
ritates.

f 4 latissima,

a 1, 2 fig. C.  
c 3 musc.  
tabul. A. B.  
b 1, 2 fig.  
A. B.  
c 3 fig. G  
cap. h.

d 1 fig. F.  
e 1 fig. G.


f 1 fig. e. aru  
que 2 ca. 4  
lib. prepo-  
nuntur T.  
g 1 fig. si  
gure V  
h musculo-  
rum tab. G.

latissima, & si latera spectes, tenuissima, <sup>a</sup> intusq; ac <sup>c</sup> exterius quasi amplo & in <sup>b</sup> 2 fl. D.  
superficie tantum cauato sinu insculpta uisitur, quò aptius musculi maxillam,  
præter temporalem muscolum attollentes, insertionem molirentur, <sup>i</sup> isq; qui <sup>h</sup> 2, 2 fl. E.  
illorum in ore delitescit, minus sua crassitie ac mole faucium angustiam infar-  
ciret: adeò, ut intus magis quàm foris, maxilla meritò insinuetur. Quinetiam  
huic latiori maxillæ sedis id separatim accidit, quòd aspera inæqualisq; cerni-  
tur, idq; potissimum iuxta sedis illius <sup>l</sup> 1, 2 fl. E.  
inferiorem posterioremq; regionem. quod etiam musculorū insertionis occasione rerum Opifex machinatur, non  
ignorans asperis inæqualibusq; locis promptius aliquid adhærere, & adnasci,  
quàm planis & glabris. Pari etiam ratione interior maxillæ sedes ad mentum  
<sup>m</sup> aliquot tuberculis asperitatibus ue extuberat, ut <sup>n</sup> musculi (quorum ope ipsa  
deorsum trahitur) suam insertionem ualidius conficerent, ac deniq; nonnul-  
li linguæ peculiare musculi hinc aptius enascerentur. Tale quid etiam usuue-  
nit in externa inferioris maxillæ sede, ad summi menti regionē, <sup>p</sup> ut nimirum  
labri humilioris musculi commodius illinc pronascerentur. <sup>q</sup> 2 fl. H.  
<sup>r</sup> 5 musc.  
<sup>s</sup> 1, 2 fl. 19  
<sup>t</sup> 4 lib. 2 H.  
<sup>u</sup> 4 musc.  
<sup>v</sup> 1, 2 fl. N.

## DE DENTIBVS. CAPVT XL

## VNDECIMI CAPITIS FIGVRA,

ALIQVOT CONSTANS  
partibus.

VNDECIMI CAPITIS FIGVRAE, IPSIVSQUE  
partium & characterum Index.

H & c figura tam superioris maxille, quàm inferioris dentes, in altero tantum latere, quum scilicet utrius-  
que lateris eadem sit ratio, exprimuntur. Si uerò dentes maxillis adhuc infixos contemplari uisum sit, superio-  
ris Capitis figura inferiorem commonstrant seriem, quem admodum tertia & quinta sexti Capitis figura supe-  
riorem, ubi & quarta eius Capitis figura alueolos promptè ostendat, quibus dentes imbi euulsi insiguntur.

A A Dextri lateris octo superiores dentes.

B B Dextri lateris dentes octo inferiores.

1, 2 Duo dextri lateris incisori.

3 Dens caninus dexter.

4, 5, 6, 7, 8 Quinq; molares dextri. Porro numerum hunc tam inferiori quàm superiori dentium classi accommodare inte-  
grum est.

C Basis notatur molaris dentis.

D Acies dentis incisori.

E Media molaris dentis pars hic delineatur, finem in dentibus conspicuum ostensura.

*Dentes sentire.*  
*Libro quinto*  
*de Medicamen-*  
*torum compo-*  
*sitione secun-*  
*dum locos.*

*Dentium à ce-*  
*teris ossibus*  
*differentia.*

*Dentium nu-*  
*merus.*

*Incisori.*

*Canini.*

*Molares.*

*Qui dentes ma-*  
*xillis insi-*  
*stunt.*

*Dentium ra-*  
*dices.*



**S**SI V M solos dentes sentiendi uim obtinere, Galenus non perfunctoriè attestatur, alferens se dentium dolore uexatum, diligenter expendisse, num dentes ipsi doleant: sensisseque manifestò, dentem non modò dolere, uerùm etiam pulsare, carnibus inflammatione obfessis non dissimiliter. Applantantur enim dentium radicibus<sup>a</sup> molles quidam neruuli, à tertio neruorum cerebri coniugio propagati, quorum gratia dentes duntaxat euidenti inter ossa sentiendi facultate donatos credimus. Nouerat namq; rerum Opifex, hos crebrò occursuros ijs quæ secant, uel frangunt, uel rodunt, uel ualidè excalefaciunt, aut refrigerant, uel alia quauis occasione alterant: quibus omnibus dentes multo aliter, quàm reliqua ossa, nudi exponuntur. Verùm hi non solum sensu, & quia nudi sunt, ab alijs ossibus distinguuntur: at etiam quia illos plus cæteris ossibus enutrirì, & longiori uitæ tempore incrementū accipere, ideo præcipuè arbitramur, quòd dentes illis quos exemimus oppositi, subinde in eruti dentis locum extra reliquam dentium seriem succrescant: ob hoc uidelicet, quòd contrarijs dentibus non amplius atterantur. Reliqui enim dentes tantum augentur, quantum læuigandis cibis comminuuntur. Sunt autem dentes plurimùm numero triginta duo, una serie in utraque maxilla sedecim, instar iustissimæ choreæ siti.

**Quatuor** priores, aduersi<sup>b</sup> ue, quia secant, incisori<sup>j</sup> uocantur: sunt enim lati & acuti, quò oblatum ipsis cibum mordendo cultri modò promptè abscindant, diuidantq;. Deinceps<sup>c</sup> canini utrinq; singuli constituntur, ampli quidem sua basi gingiuis proxima: ipforum autem fine à gingiuis remoto, acuti: ut si quid propter duritiem ab incisorijs non præcinderetur, hoc illi confringerent. Porro ipsis id nomen inditum est, quòd exerts canum (qui hos habent multos, & hac ferè sede insignes) dentibus correspondent. Post hos<sup>d</sup>, maxillares seu molares quini ab utroq; latere habentur, asperi, ampli, duri, & magni, quòd incisa ab incisorijs, effractaq; à caninis in læuorem exactum terere possint. Si enim prorsus leues crearentur, idonei ad proprium munus minimè existerent: si quidem ab inæqualibus asperisq; omnia melius terantur. quare & molas, quibus fruges moliuntur, temporis processu, diuq; minuendo læuigatas, rursus incidi atque exasperari uidemus. Neq; si asperi quidem essent, non autem omnium ossium durissimi, plus commodi ex ijs esset, ut qui prius contererentur, quàm cibos in læuorem comminuerent. Quinetiam, si asperi & duri facti, non essent unà & ampli, neq; tales plus illis concedito accommodarent muneri, si modò quæ leuissimè atteri debeant, in amplis firmari basibus oporteat. Incisorijs enim & caninis nisi lōgissima mora quicquam, propter ipforum strictam & angustam aciem, comminuitur. Dentes ad unum omnes in maxillarum sinibus clauorum ritu insiguntur, qui propter imaginem, quam cum brutorum præsepibus habent, Græcis *πρæσέπια*, Latinis autem præsepia nuncupantur. quemadmodum & à fouearum specie *βόθραι*, ac ueluti alueoli & fossulæ quibusdam uidentur ap-

*Dens mola-*  
*ris C insi-*  
*gnitur.*

*In ea initio*  
*em quæ se*  
*pius occur*  
*rit radicū*  
*seriem ex-*  
*presimus.*

pellati, ita sanè dentes ipsi infertos, adamussim stringentes continentesq;, ut non promptè uel tantillum hi commoueantur. Cæterum dentes omnes non paribus radicibus, dictis iam insiguntur sinibus. quandoquidem paruis una radix, duæ uerò maioribus, tres autem & quatuor maximis obtigerunt. Incisorijs enim singulis immittuntur radicibus. Canini quoque radices habent singulas, quæ incisoriū radicibus multo altius inseruntur: tantoq; maiores sunt, quantum caninorum robur excedit. unde & inter incisorios duo medij altioribus hærent radicibus, quàm duo laterales, caninis proximi: nimirum quòd medij latiores



latiores grandioresq; sint. Molares radicibus inter se uariant. nam qui maxillæ inferiori sunt infixi, binis radicibus: qui superiori, ternis subinde infiguntur. Differunt tamen & hi interdum. qui namq; supra sunt, quaternis: qui infra, ternis radicibus immitti aliquando deprehenduntur, præsertim duo denti intimo proximi. Dein frequentissimè duos molares superiores, canino denti succedentes, duobus tantum immitti radicibus spectabis, tres reliquos ternis: sic & duos inferiores canino proximos, una radice, tres reliquos duabus. Præterea obseruabis quoq; omnium intimos minoribus infigi radicibus, quam illis attiguos. Incisoriorum & caninorum numerus, rarè in hominibus, ut molarium, mutatur. Interdum enim in utroq; latere quinque molares occurrunt, interdum quatuor: nonnunquam quatuor à sinistris, quinque uerò à dextris: uel contrà in sinistris quinque, ex dextris quatuor: uel infra quatuor, supra autem quinque.

*Dentium numerus aliquando uariare.*

*Genuini dentes.*

quam differentiam potissimum pariunt postremi dentes, quos pleriq; genuinos uocant, etiam si Cicero ita molares uocauerit. Sunt autem illi, qui primum post pubertatem, uenerisq; usum, hominibus cum maximis subinde cruciatibus prodeunt: id quod medici parum obseruantes, aut alios dentes euellunt, aut humorum uitio eos infestari sibi persuadentes, ægros catapotijs atq; id genus pharinacis obruunt: quum dolore affectis nullum leui gingiuarum ad postremum dentem scarificatione, ac interdum ossis pertusione, præsentius remedium adferri possit. id quod ipse etiam modò experior, cui hæc scribenti trigessimus secundus dens ætatis meæ uigesimo sexto anno succrescit. Atque id etiam arguunt permultæ caluariæ in cœmiterijs occurrentes, in quibus posteriore illi dentes ueluti in cauea quapiam adhuc reponuntur ac latitant, quibusdam suæ basis apicibus os tenuissimum perforantes. Cuiusmodi caluariam nuper mihi exhibuit humanæ fabricæ quam studiosissimus ac ualde peritus iuuenis, Ioannes Paulus Guiricius Vrbinas, mihi amicissimus. Cæterum Aristoteles, alijq; complures, uidris copiosiores dentes quam mulieribus ascribunt. quod cuius, num ueritati cõsentiat, non minus promptum est experiri, quam mihi falsum id esse dicere, quum nulli non dentes numerare liceat: ex quorum frequentia pleriq; etiam uitæ longitudinem breuitatemq; arguunt. Dentes non solum dictos nunc præstant usus, uerum etiam ad uocis modulationem iuuant, quum dura lapideaq; conformentur substantia, exiguas, sed notatu dignas cavitates intus obtinente: quæ ut dentes leuiores sint, commodiusq; enutrientur, occasionem præbent. Huius cavitatis causa, si quando dentibus foramina ex humorum acrium erodentiumq; influxu oboriuntur, quæ ad eam cavitatem usque pertingant, ocyssimè dentes ad radicis usque extrema eroduntur.

*Dentium cavitates.*

*e dens insignitus.*

*Dentium appendices.*

Deinde puerorum dentes imperfectis & mollibus, & quasi medullosis consistere radicibus, non prætereundum est: quemadmodum & pueris dentium partem extra gingiuas conspicuam, dentis radici appendicis quasi modo committi. Atq; id quidem uel septennes pueri didicimus, quum uacillantes nobis focijsq; dentes, & præcipuè incisorios, unguibus, aut filo denti circumdato, eximere consueuimus. Quin & in mulis quoq; ac multis canibus, dentium reueruatis radicibus, ipsorum appendices procidere indies obseruamus. Atq; id sanè accuratissimè expendendum est, ne pueris reliquam effracti alicuius ex casu dentis portionem unquam eruamus, sed duntaxat appendicem, in cuius locum alia (modò radix seruetur) promptè succrescet. Dein plurimum id quoque in pueris animaduertisse conducit, quibus mox ab ineunte ætate molares dentes erodi uitariq; solent. In his namq; operæ precium est, molarium dentium appendices (quæ non ita ut incisoriorum procidere in ipsis solent) auferre, quò

nouæ

riouæ earum loco succedant, dentesq; integri seruentur. Si enim appendicum unio, ætatis progressu firmabitur, appendix nunquam decidet. quinimò uel pubertatis tempore aliquot dentes cum radicibus, ob erosionis uitium, plerunque eruendi uenient.

DE OSSIVM CAPITIS ET MAXILLÆ SUPERIORIS FORAMINIBUS, & multis in interna caluariæ sede occurrentibus ossium sinibus.

Caput XII.




VANDO QUIDEM in uenarum, neruorum & articularum descriptionibus, foraminum caluariæ ignorantia non modicum obscuritatis adferret, quumq; in illis enarandis (quum cogniti sint difficillima) Anatomicorum præcipui multum aberrarunt, operæ precium fore duxerim, hoc Caput omnibus illis foraminibus dedicare. Ut uerò id fiat compendiosius, quatuor figuras præsentī negotio famulantes, huc reponam, unumquodq; foramen cum ipsi præfixo charac-

*Cur foramina  
descriptis insi-  
tuatur.*

tere seorsum ita enarraturus, ut sermo characterum simul Indicis & Capitis contextus uices opportunè suppleat. Inde, si casu, aut industria aliquis sinus uel processus eorum quæ hæcenus descripta sunt ossium, fuerit omissus, illum etiam nunc describam.


PRIMA DUODECIMI CAPITIS FIGURA.

ANTERIOREM CALVARIÆ SEDEM EXPRIMENS, ac proinde omnia etiam foramina in oculi sede, maxillaq; superiori, in hac superficie apparentia, ostendens. Caninum autem caput humanæ caluariæ subiectum, iam prius maxilla superioris ossibus futurisq; indicandis unctæ, perinde ac tota hæc figura, innuit.




SECVN-

SECUNDA DUODECIMI CAPITIS FIGU-  
 RA, EXTERIOREM CALVARIAE BASIS  
 faciem, quā palatum respicit, proponens.




TERTIA DUODECIMI CAPITIS FIGU-  
 RA, INTERNAM CALVARIAE BASI-  
 sis sedem demonstrans.



QUARTA



QUARTA DUODECIMI CAPITIS FIGURA  
SUPERIOREM INTERNÆ CALVARIÆ  
sedes partem spectandam offerens.



Age igitur characterum indicem aggrediamur, singulis characteribus eius  
A 1 figuræ, cuius sunt peculiares, numerum subiicientes. Atq; ita A in prima figura foramen, frontis ossi proprium notatur, ad medium supercilij incisum, quo ramus minoris tertij paris nervorum cerebri radice ex oculi sede ad frontis musculosam cutem dispergitur. Hoc in utroq; latere non semper perfectum orbiculareq; existit foramen, sed subinde sinus duntaxat semicirculi ritu exculptus apparet. Aliquando in uno quidem latere foramen, in altero autem semicircularis tantum sinus, perinde atque hic, cernitur.

B 1 Foramen, quo dictæ minoris tertij paris nervorum cerebri radice<sup>b</sup> foboles, ex oculorum sede in genas ad superioris labri & alarum nasi musculos procidit. Præfens foramen instar oblongi meatus in quarto superioris maxillæ ossis sculpsitur: & in anteriori maxillæ sede, ubi in prima figura B ponitur, foraminis huius ductus penitus in osse cælatur. per oculi verò sedem, ubi A in ipsa occurrit, tenui tantum ac squamæ simillimo osse tegitur.

C 1 Foramen nunc cōmemorato amplius, quod ex magno interno<sup>c</sup> ue oculi angulo in narium cavitatem rectā deorsum pertinet, secundo superioris maxillæ ossi & quarto pariter commune. Istud<sup>c</sup> portiunculæ minoris tertij paris nervorum cerebri radice viam præbet, & nonnihil pituitæ ex cerebro ad oculi sedem confluentis, ad nares transmittit. Cæterum præter id foramen, aliud quoq; grandius pituitæ ex oculi sede in narium amplitudinem, hincq; magis ad fauces quā nāsū defluxui præparatur. Quod quum profundius latitet, neq; ullo pacto prepositis iam figuris indicari possit, quartā sexti Capitis spectā figuram, à qua iugale os (quod cauū temporis exactius oculis subijceretur) excipimus, illi figuræ φ ascribētes, ut saltē foraminis huius in cuneiformi osse incisi sedes indicaretur. Quo autē id magis in caluarijs cōspectum fugit, eo minus

g quoq;

Præcipuū excolande in nares pituitæ paratum foramen.

a 2 fi. 2. ca.  
lib. 4. N. et  
4 musculo-  
rum tab. H.

b 2 fi. 2. ca.  
lib. 4. O. et  
4 musculo-  
rum tab. I.

c 2 fi. 2. ca.  
lib. 5. P.

quoq; mirandum est, hoc quacunq; etiam dignum sit animaduersione, hæc-  
tenus dissectionum peritos latuisse.

D 1,2 Præfens foramen cuneiformi osi & quarto maxillæ superioris osi com-  
mune, omnium quæ in oculi sede conspiciuntur, faciliè maximum est, ac instar  
patentis rimæ oblongum, commemoratæ iam sæpius minoris tertij paris ner-  
uorum cerebri radice<sup>a</sup>, ramulo uiam dat in<sup>b</sup> temporalem muscolum, & man-  
forium ex oculi sede digesto. Dein<sup>c</sup> neruulo euidam paratur, quem iuxta quin-  
ti paris neruorum cerebri radicem exoriri nos primò reperimus. Simulatque  
enim neruulus ille proprio ductus<sup>d</sup> foramine, ex caluariæ amplitudine in ocu-  
li sedem procidit, foramine nunc D indicato in nuper dictos exporrigitur mu-  
sculos, & illum qui in ore delitescens, maxillam inferiorem mouentium tert-  
tius numerabitur. Quinetiam foramen hoc, præterquam quòd externo suo la-  
tere musculi temporalis hinc quoq;educti initio comòdam unde id prodeat  
sedem offert, pulchrè unà quoq; iter præbet pituitæ hæc defluenti ad insigne  
in narium cavitatem pertinens foramen, quod in quarta sexti Capitis figura  
Φ notauimus.

E 1,3 E in tertia figura posito, & E in utrisque oculorum sedibus primæ figuræ  
obuiò, foramen indicatur, in sedis oculi radice seu uertice elatissimum, & in cu-  
neiformi ossè incisum, quod foris, quæ oculi sedem spectat, prorsus orbiculare  
cernitur,<sup>e</sup> neruo uisorio (cuius gratia exculptum est) amplitudine respòdens.  
Verùm interius, ubi cerebro propius accedit, iuxta externum ipsius latus, exi-  
guum eundemq; acutum obtinet angulū, qui uenulæ cum uisorio neruo hac  
γ. excidente paratur. Angulum hunc γ notat. Is namq; inter E & γ in tertia hu-  
ius Capitis figura consistit.

F 3 Huic sinui cuneiformi osi hac in sede inciso, uisiorum neruorum<sup>b</sup> coi-  
tus innititur.

G 1,3 G in primæ figuræ sinistra oculi sede occurrit: in tertia autem figura, G de-  
xtrum eius figuræ latus ideo occupat, quòd in sinistro latere foramen G indi-

*Quoniam præfens foramen obscurè in hu-  
ius Capitis figura cernitur, hic forami-  
nis dextri lateris effigiem  
delineauit, atq; humiliorè  
ipsius partem, q̃ superio-  
rem uerò, seu eiusdem fa-  
ramini angulum & insigniuit. Quan-  
quam utriusque lateris foramen etiam  
pulebrè in octaua sexti Capitis figura  
in conspectu sit.*

Lib. 6. de visu  
partium.

catur, nusquam obuium sit, eo quòd huius figuræ cal-  
uaria in latus uel istius foraninis aliquo modo uiden-  
di causa inflexerimus. Insculpitur autem cuneiformi  
osi, ac humiliorè sui parte paulo minus toto orbicu-  
lare est, elatiore uerò in acutum longumq; & angu-  
stum definit angulum. Foramen hoc, etiam si Galeno  
secus uisum sit, nerui uisorii foramè amplitudine uin-  
cit. & si similiter atq; illud prorsus orbiculare esset, fa-  
cilè è triplo aut quadruplo efficeretur amplius. Verùm interim humilior ipsius  
pars (quam paulo minus toto orbicularem esse diximus) uisorii nerui forami-  
nis amplitudinem adhuc longè superat. Præfens foramen cæatur<sup>i</sup> secundi pa-

ris neruorum cerebri, in oculi sedem progrediētis gratia; dein<sup>k</sup> minoris etiam  
tertij paris neruorum cerebri radice, quæ frontis & totius ferè faciei cuti, & oc-  
currentibus sub illa musculis, ac insuper ad nares & musculos inferiorem ma-  
xillam attollentes digeritur. Hæc quidem per humiliorè foraminis sedem  
procidunt, unà cum insigni soporalis arteriæ ramo, ex interna caluariæ ampli-  
tudine elabente. Verùm per elatiorem foraminis sedem,<sup>m</sup> uena ex oculi sede,  
duræ cerebri membranæ hic distribuitur, & suæ distributioni in caluariæ basi  
sinus exculptos habet, uenularum tuberibus congruentes, & in ea caluariæ se-  
de conspicuos, cui in tertia figura ζ inscribitur. Neq; profectò neruis hic dun-  
taxat, & uenæ, & nuper dictæ insigni arteriæ, amplum id foramen excauatur:  
uerùm

a 2 fig. ca.  
2 lib. 4. Q.  
b 4 musc.  
tab. 1.  
c 4 musc.  
tab. 3.  
d 1, 2 fig.  
cap. 2 lib. 4.  
d iuxta 4.  
e paulo  
post in sua  
serie nota-  
bitur H.  
f 6 musc.  
tab. D.

g 13 fi. lib.  
7 N. O.

h 13 fi. lib.  
7 M.

i 14 fig. 7  
lib. G.  
h eadem fi-  
gura H.

l fi. ca. 14  
lib. 3. X.  
m eadē fi.  
G. 13 fi.  
lib. 7 H.

uerum etiam pituitæ ex cerebro in oculi sedem, & hinc in narium amplitudinem promananti. adeo ut non iniuria foraminis huius insignis amplitudo, uenæ & arteriæ & nervis ipsam transeuntibus impar conspiciatur.

H 1,3 Foramen istud adamuſſim orbiculare, multo quàm duo proximè commemorata arctius est, ac in cuneiformi osse, cui etiam inſculpitur, longius procedit, <sup>a</sup> *neruulum transmittens*, quem quum haud procul a quinto pari neruorum cerebri oriatur, minorem eius paris radicem uocabimus, unaq; cum quinto pari describemus. Quia uerò foramen hoc nonnunquam amplius, & ueluti oblongius sese offert, & simul cum dicto neruulo <sup>b</sup> graciliorem tertij paris neruorum cerebri radicem, cum <sup>c</sup> secundo aliàs pari excidentem complectitur, ipsum in sinistro tertiæ figuræ latere sub G, aliter quàm in dextro expressum conspici.

I 3 Hac sede in octauo capitis osse <sup>a</sup> multa, sed exigua spectantur foramina, odorum & aeris in inspirationibus ad cerebrum ingressus nomine incisa. Hæc non ut hætenus dicta, ipso ductu in cessu uel recta sunt, & utrinque peruia, sed obliqua, & anfractuosa, spongiarumq; foraminibus similia. Inter reliqua tamen utrinque unum est rectum, & grande satis, quod primum quodammodo est, & anteriori frontis ossis sedi proximum, <sup>b</sup> uenam ad duram cerebri membranam ex narium amplitudine ex porrectam transmittit. Verum cætera interim huius sedis foramina, etiam recta & utrinque pertusa uiderentur, si modò interiora narium ossicula in ipsorum summo non pari semper numero reposita, & insigniter fungosa, & non nihil membranea cartilagineaq; eximeretur. Num uerò hæc foraminula pituitæ cerebri expurgandæ secundariò efformentur, se primo libro pertractabimus. In præsentia tamen addendū duxi, his nunquam nisi oppletò, ac præter naturam affecto cerebro, pituitam excolari, & leuissima pituitæ copia hac defluente, ea foramina obturari, aliq; grauedinis symptomata induci. Insuper admonendus es, in omnibus caluarijs non æquè frequentia hic apparere foramina: quemadmodum & <sup>c</sup> sedes, quibus <sup>d</sup> olfactus respondent organa, non pariter amplæ in singulis conspiciuntur. Cæterum canis animal minime pituitosum, at exactissimo odoratu præditum, ut has sedes habet amplissimas, ita quoq; permulta, admodumq; patentia in illis cernuntur foramina, antroꝝsum, non autem ut homini deoꝝsum, spectantia.

K 3,4. Cavitas inter duas frontis os constituentes squamas, ad superciliarum regionem in fronte & in superiori parte sedium oculorum reposita, & quibusdam reconditis foraminibus in narium amplitudinem pertinens, quam nonnulli olfactus organum esse asserunt, propter aerem in illa còclusum, quem odoratui mirificè necessarium esse non ambigimus. Quàm uerò hæc cavitas capax sit, promptè obseruabis, si frontis os in supercilioꝝ regione fregeris: est enim amplissima, & molliusculum corpus membranula obductum còplectitur, quod medullæ quodammodo respòdet: uniuersum tamen eiusmodi est, ut nullum simile in toto corpore reperias, præterquàm in <sup>e</sup> cauernis antris uel in cuneiformi osse conspicius. Præterea quibus Gallico morbo anterior frontis ossis squama eroditur, aut uulnere perfringitur, tanto impetu in expiratione aerè ex cavitatè illa propelli cernimus, ut is etiam candelæ lumen promptissimè exufflet.

L 3 Foramen, aut rima potius, talis formæ, qualem unguis apice quis ceræ impri meret, quæ <sup>f</sup> duræ cerebri membranæ hic firmadæ extruitur. Necessum quippe erat, non hic solū, ubi ea membrana multis foraminibus est peruia, uerum alijs compluribus locis caluariæ alligari, & duram membranā fibras uinculaq; per caluariam transmittere. quamuis etiam rimas has aeri in cerebrum ducendo



aliquid auxiliari intueberis, si illas intrusa feta, in nuperrimè dictam frontis of-  
fis cavitatem, nariumq; amplitudinem definire expenderis, ac deniq; in ofsis  
cuneum imitantis antra pertinere animaduerteris.

M<sub>3</sub>

*Meatus pur-  
gande cerebri  
puncta parati.*

Sinus in cuneiformis ofis medio incisus, ac glandulam continens, cui pituita ex cerebro defluens insillatur. Ab hoc sinu, qui lævis est, ac planus, & quodammodo quadratus, utrinq; duo deriuntur ad fetus, sinuum modo exculpi: quorum prior ad secundum foramen nobis in oculi fedis radice enarratum, ac G insignitum tendit, & pituitam in oculi sedem, & hinc per foramina, quæ prius C &  $\Phi$  expressimus, deferit. Posterior sinus ad asperum inæqualeq; foramen, seu rimam potius deorsum porrigitur, qua pituita ori palato ve potissimum influit, & aer quoque inter spirandum caluariam petit. Rimam hanc temporis ofsi & cuneiformi

N. ofsi communem, N notaui<sup>1</sup>mus in sinistro latere secundæ figuræ, & in dextro  
tertiæ. Ductus uerò & sinus non adeò commodè (quum non admodum caui

O.P.

finum O, posteriore uerò P in eadem figura indicauerimus: ut his adiutus characteribus, sinuum sedem in ueris caluariæ oculus adinuenias. Processibus, qui orbiculatim circa sinum M insignitum apparent, ac inferiori mensæ aut leſticæ sedi ueteribus comparabantur,<sup>a</sup> dura cerebri membrana firmissimè adnascitur, ac ueluti ea sede sustinetur, qua hîc à caluariæ basi abscedit, insignio resq; foporalium arteriarum ramos sibi subditos habet, qui cômémoratis nuper pituitam deducētibus uisq; seu sinibus perinde inniuntur, ac si illorum potissimum nomine essent exculpti, ipsaq; pituita secundum arterias diffuieret. Cæterùm mediam ossis cuneiformis sedem, in qua quadratus ille sinus M notatus consistit, simul cum sinibus ramos foporalium arteriarum continentibus, non esse extrema sua superficie cauernosam, & spongiæ modo foraminibus oblitam, multoties; minus pituitam ipsi influentem tanquam per spongiam longiori mora (uti Galeni est sententia) colare, in sexto Capite cum totius cuneiformis ossis historia comprehendimus.

Lib. 9 potissimum, de Partium usu.

Q<sub>23</sub>

Adlatus inæqualis afperæq; rimæ feu foraminis N notati, uerfus anteriora magis, aliud occurrit foramen, in cuneiformi offe incifum, quod læue eft, & non ad amufim orbiculare, fed circulo refpondet utrinq; modicè in longum compreffo. Hac enim effigie foramen in finuari decuit, quod duo teretia corpora in uicem membranæ connexa, fimul erat tranfmiffurum.<sup>b</sup> Tertij namq; paræs neruorum cerebri craffiori, præcipuæq; radici fimul cum<sup>c</sup> quarto pariam præbet.

R<sub>2,3</sub>

Rurfus ad externum foraminis **Q** indicati latus, aliud multo minus illo, & exaetè orbiculatum, in cuneiformi offe cernitur, quo internæ iugularis uenæ<sup>4</sup> portio à forali abscedens arteria, caluariam subintrat. Aliquando exiguum foramen ad internum latus foraminis, duo nuper commemorata neruorum paria transmittentis, obferuatur, eiuſdem uenæ ramulo paratum. Verùm id in uno caluariæ latere rarò uiſitur, atq; adhuc multo rarius in utroq;. Nos tamen id foramen ſiniſtro lateri hic quoq; appinximus, ac S in ſecunda & tertia figuris inſigniuimus, quod una caluaria cæteris quas unquam uidi elegatior, uirg; mediæ ætatis longè formoſiſimi, id foramen proponat.

 $T, T_{3,4}$ 

Sinus à foramine R, indicato, per interiora calvariae uenarum quasi serie ascen-

a 15 fig. 7  
lib.

b, c 14 fig.  
lib. 7 I, K.  
et 2 fig. 1  
cap. 4 lib.  
M, Z.

d. fi. ca. 14  
lib. 3 F.

ascendentes, & conuexo dimidiatæ uenæ correspondentes, inque hoc cælati, ne caluariæ os<sup>a</sup> finis in dura cerebri membrana uenarum modo ductos pre-  
mat, constringatq;.

V<sup>2</sup> Foramen hoc in externa tantum infernaq; caluariæ basis sede (idq; non ad-  
modum promptè) est obuiū: hinc enim obliquè uersus exteriora protensum,  
in auditorij organi cavitatem temporis ofsi insculptā definit. Quare etiam id  
a paulo post cum aliquot eius cavitatis foraminibus delineatū, rursus subiiciam.  
Efformatur autem, ut uiam porrigat quintæ coniugationis neruorum cere-  
bri<sup>b</sup> ramulo, ab auditus organi cavitatē hanc ad musculos inferiorem maxillam  
c attollentes excurrenti. Insuper hoc etiam foramine iugularis internæ<sup>c</sup> foboles  
auditus organum petit: ac aer etiam in temporis ofsis antrum auditus organo  
propriū, per id foramen fertur. Id quod faciliè perceperis, si attracto in os æ-  
re, illum quasi per aures propellere conaberis, in auribus sonum percepturus  
uentorum, aut aquæ turbinum sonis parum ab similem.

X<sup>2,3</sup> Insigne foramen, maiori foporalis arteriæ<sup>a</sup> ramo caluariam ingredienti ex-  
cauatum, quod non rectā caluariam perforat, sed instar oblongi meatus, ex po-  
sterioribus obliquè introrsum in priora temporis ofsi insculpitur. Ofsis pars hoc foramine peruia, ubi de-  
orsum ad fauces spectat, ac in secunda figura æ notatur, instar pumicis aspera inæqualisq; uisitur. Cæte-  
rum huius foraminis progressum commonstrant X in secūda & tertia figuris positū, & deinde hæc quam  
modo adijcimus figura, in qua utraq; X, ut & in maio-  
ribus figuris, situ inuicem minimè respondent. Hunc  
uero obliquum, & in osse longo tramite procedentem  
ductum, Natura fortassis effinxit longioris obliquo-  
risq; arteriæ foporalis inaccessus gratia: nimirum ut ui-  
talis spiritus hoc errabundo ductus itinere, cerebro  
exquisitus præpararetur. Quare etiam Galenū in pri-  
mis admiror, quem cum plerisq; alijs foraminibus grande hoc foramen latuit  
& qui per foramen tertij & quarti paris neruorum cerebri Q indicatum, fo-  
porales arterias caluariam ingredi, in suo de Simiæ uenarum arteriarumq; dis-  
sectione libro scriptum reliquit. Et quemadmodum de hoc foramine, neq; ca-  
nes, neque simias hinc etiam intuitus, falsa posteris tradidit: ita non mirum est,  
ipsum mirabilem illum reticularem plexum sua imaginatione in hominibus  
quoque confinxisse, ac uasorum cerebri seriem non undiquaque ueram poste-  
ris prodidisse.

Præfens figura foraminibus X & T  
notatis, promptius ostendendis mutat.

æ.



Completitur e-  
nim utriusq; la-  
teris foraminis  
ductus, ea serie  
positos, qua illi  
in caluariā im-  
missis fectis, aut  
ex plumbo filis  
ferri cerniuntur.  
Præterea, igitur

X sinistrum foramen notat, maximo si-  
nistre foporalis arteria ramo paratum.  
Præterea, uero T foramen indicat, foporalis  
arteria ramulum in narium am-  
plitudinem excurrentem transmittens.

Y<sup>3</sup> E regione foraminis nunc dicti, ac X insigniti finis, qui caluariæ cavitatem  
respicit, aliud foramen cuneiformi ofsi propriū inchoatur, rectā antrorsum  
a in narium usq; amplitudinem, meatus oblongi modo protensum, & arteriæ<sup>a</sup>  
ramo uiam exhibens, qui à foporalis arteriæ maiori portione caluariam ingre-  
diente, ad nasum usq; exporrigitur, inibi cum alijs eò porrectis arteriæ surculis  
pullum edens sensibilem.

a Meatus<sup>a</sup> quinto neruorum cerebri pari adaptatus, auditorius<sup>a</sup> ue porus, cu-  
ius principium interius in caluariæ amplitudine occurrens, a notatur in tertia  
figura posito. Exteriorem autem ipsius partem, quæ ab aure excipitur, ac auri-  
culæ quodammodo imagine respondet, aspera q; uisitur, & scaphus nonnullis  
est nuncupata, secundæ figuræ a indicat. Meatus iste, et si intus admodum am-  
plus cauusq; sit, ad eò tamen tortuosus & anfractuosus, ac impense uariis inue-  
nitur,

nitur, ut non nisi rarissimè, magnòq; casu, impulsam transmittat setam. licet quo minus seta transmittatur, non ipsius meatus gyri anfractus uè in causa tan-

Hanc rudem figuram in hoc apposui, ut foramen ductus in conspectu esset, quia V & a & b notamus. Si



Lib. 1. Hist. animal. cap. 11.

gnificet igitur rudem diuersum, ut trunç a auditorius meatum. V foramen, superius V notatur. b autem, id quod mox sub litera b explicabitur.

tum sint, uerùm etiam quòd is ad aurem, & dein quà cerebrum respicit, arctior euaserit, quàm in medio, ubi admodùm amplus latusq; & impenfe uariis occurrit. Verùm interim haudquaquam audiendus est Aristoteles, quum ab aure ad cerebrum nullum asserit pendere meatum. at in oris palatum usq; semitam pertingere, & uenam de cerebro eòdem descendere inquit. In caluariæ enim amplitudinem auditorius meatus pertinet, & uenam quoq; admittit: non quidem illam à interna iugulari caluariam ingrediente, à qua au-

cerebro assumens, uerùm ab interna iugulari caluariam ingrediente, à qua auditus organo ramus exporrigitur, per foramen iam antea u expressum, & quinti quoq; paris neruorum cerebri furculo uiam præbens. Præterea si setam auditus meatui exterius indideris, hancq; modicè in anteriora introrsumq; oblique protruferis, in foramen V notatum, illam multo facilius quàm in caluariæ amplitudinem ferri conspicias.

- b 2 Foramen ex auditus organi cavitatis in temporis ossè incisæ medio, retrorsum ad hanc externæ caluariæ sedis iuxta<sup>a</sup> mammillarū processum regionem pertingens, inq; internam caluariæ sedem nusquam pertinens. Hoc quia anfractuū & sui inaccessus labyrinthorū occasione impulsam ipsi setam aut plumbeum filum, non promptè ad auditus usq; organi cavitatem transmittit, πφλδρ Græcè, & cæcum Latine nuncupatur, ramulo nerui quinti paris neruorum cerebri præparatum: quem quum Natura indurescere uoluit, admodum calidè per durissimi siccissimiq; ossis anfractuosum foramen illum deduxit.

- c 2,3 Foramen occipitis ossi & temporis ossi còmune, ac<sup>a</sup> sexto pari neruorum cerebri, &<sup>b</sup> maiori internæ iugularis uenæ ramo, minori q; soporalis arteriæ soboli paratum. Istud, quia hac transeuntia organa crassa sunt, amplum uisitur, transeuntium corporum formæ respondens. Non enim examusim circularè est, sed quodammodo geminū intortumq; & ipsius una pars (quæ interior est) neruo ex caluaria antorsum quodammodo elabenti paratur: altera uerò (quæ exterior est) uenæ



Hic scissum quod modo describitur foramen expressimus, interiori qui de ipsius parti b, exteriori autem a ascribentes.

& arteriæ caluariam ad posteriora ingredientibus subseruit.

- d 2,3 Foramen in occipiti ossè gratia<sup>a</sup> nerui septimi paris neruorum cerebri incisum, quod quidem orbiculare est, sed ductu oblongum, obliquumq; Ex posterioribus enim, interna q; caluariæ sede antorsum descendit, quò citius septimi paris neruus hoc ductus foramine, sexto pari committeretur: amboq; simul coherentes, tutius aliquousq; proroperent.
- e 2,3 Foramen unicum, cæterisq; omnibus facile maximum, quod occipitis ossis medio<sup>b</sup> dorsalis medullæ gratia insinuat.
- f 2 Non insigniter amplum foramen, quod ab externa caluariæ sede, ex posteriori nimirum sede<sup>c</sup> capitis occipiti ossis, quod primæ ceruicis uertebrae articulatur, incipiens, in internam caluariæ sedem longo ductu per os fertur, in clatiori sede foraminis, quod septimum trāsmittit par, & d notatur, cessans. Hoc uenæ & arteriæ gratia calatur, per transuersos uertebrae ceruicis processus sursum conscendentium. Cæterum in quibusdam caluarijs id foramen in altero latere aliquando deesse reperies, interdum etiam in utroque: uerùm

tunc



tunc huius foraminis uices gerit septimi paris neruorū cerebri foramen, quod tunc non ad amulsim orbiculare cernitur, sed oblongum, & neruo simul cum uena arteriaq; transmittendo idoneum.

g 2,3 Foramen id ad posteriorē regionem processus mammillaris, iuxta futurę  $\Lambda$  referentis<sup>a</sup> latus, in temporis osse cælatur, & transuerfim caluariā ingrediens, uiam externę iugularis uenę<sup>b</sup> ramo hac caluariam petenti offert. Animaduerti quoq; interdum id foramen, modò in altero latere, modò in utroq; defuisse.

In tertia figura, non oscitanter sinus in interna caluarię amplitudine, qua cerebrum continetur, animaduertendus uenit, in quem tria foramina c & f & g insignita, & uenis arterijsq; transmittēdis parata subeunt. A foramine enim c notato, & interna parte foraminis f insigniti, in dextra sinistraq; caluarię sedes sinus incipit, quem in sinistro latere h, h & h indicauimus, in dextro autem h, h, h. tribus i. Sinus isti obliquē instar quartę circuli partis sursum in posteriora tantisper cōscindunt, dum dexter sinistro inibi committatur, ubi k reposuimus. Huius enim coitus sedes in media regione occipitis osis uisitur, quę inter elatissimam futurę  $\Lambda$  exprimentis<sup>d</sup> regionem, & posteriorem foraminis dorsalem medullā transmittentis, ac e insigniti regionem, media cōsistit, & k inscribitur, ubi occipitis os crassissimū denissimumq; esse, in eius osis historia retulimus. Ex hoc duorū sinuum cōgressu, alius rectā sursum fertur, sub eminentissimā parte futurę  $\Lambda$  similis, & sub tota sagittali futura, & frontis osse, usq; ad olfactus organorū sedium septum, & quodāmodo in tertia figura insignitū. Hunc

sinum quarta figura aliquot l notatum gerit: tertia autem in frontis osse, litera m eundem indicat. Cæterum sinus hi exculpantur durę cerebri membranę gratia: cuius uasis ipsos, ne illa caluarię osibus premerentur, cedere tunc audies, quando cerebri uasorum non minus elegantem, quā parum ab alijs dissectionis professoribus animaduersam seriem, in tertio libro exequar.

n, o 2 Animum accommoda secundę figurę palato, in quo his caracteribus am x. planarium foramina septo quodam insigni x notato, ab inuicem interlinctā, & in faucium amplitudinem a naso tendentia, n ac o indicantur. quę etsi homini ad plurima conducant, præcipuē tamen naturali inspirationi uociq; censentur idonea.

p 2 Foramen hoc iuxta posteriorem dentium incisiorum sedem ex palato in narium amplitudinem definit, quartisq; maxillę superioris osibus communē habetur. Deinde hominibus unicū adest, equis uerò & canibus geminum. Paratur autem gratia cōnexus, consensusq; tunicę palatum succingentis, cum illa<sup>e</sup> quę narium amplitudini obducitur. Portiuncula enim illius tunicę simul cum uenula, & item arteriola, id pertransit.

q 2 Ad palati finem, iuxta maxillę superioris sexta ossa, utrinq; duo uisuntur foramina: unum quidem altero prius, & amplius. prius enim anteriús<sup>f</sup> ue, ac  $\lambda$  insignitum, notatu dignę est amplitudinis, ex palato sursum in posteriora ad oculi sedis uerticem radicem<sup>g</sup> ue properans. Inibi enim definit, ubi foramen occurrit, quod alterum pituitam in nares expurgantium esse retulimus, & sub litera x.  $\phi$  iam antea descripsimus. Posterius autem, & notatur, estq; exiguum omnino, & sursum ascendens, aliquando in idem foramen cum anteriori  $\lambda$  insignito terminatur: interdum uerò peculiarem terminum, in futura cuneiformi ossi & quarto superioris maxillę communi adipiscitur. Præter foramina hætenus commemorata, si caluariam in manus sumpseris, alia quamplurima (sed exilia) obseruabis, uenis transmittendis & membranarum nexibus exculpta. Visuntur uerò huius generis aliqua è directo maioris interioris<sup>h</sup> ue anguli

Caluarię sinus  
durę membra  
na uasis ceden  
tes.

h, h, h.  
i, i, i.


Foraminula  
per caluarię su  
perficem sparsim obuia.

sedis oculi, iuxta futuram secundo & tertio maxillæ superioris osi & frontis osi communem. Hæc in cavitatem pertingunt, inter frontis osis squamas comprehensam, & K prius indicatam. Horum quoque sedes in prima præsentis Capitis figura, T & V indicatur: quibus characteribus nuper dictam futuram suo loco expressimus. Deinde in frontis quoque osse iuxta superciliorum sedem huiusmodi quoque occurrunt foraminula: quemadmodum & in utroque nasi osse, quod quintum superioris maxillæ recensuimus. Insuper in primo maxillæ osse, quod externum oculi sedis angulum constituit, unum aut alterum huius generis foramen inuenitur. Præterea osis cuneum referentis latera, quæ temporum caua cum alijs osibus constituunt, tali quoque foramine donantur. Ad hæc, in lateribus sagittalis futuræ in uerticis osibus, & potissimum iuxta futuram Δ similem, talia etiam apparent, quorum sedes in quarta f. f. figura aliquot f in umbra latitantibus indicantur. Verum præter commemorata, unum notatu dignæ magnitudinis habetur interiùs in frontis osse, quæ octauum capitis osis anterior pars ipsi committitur, & anterior septi olfactus organorum sinuum pars cernitur, nimirum inter tertiæ figuræ m & n conspicuum. Pertingit autem hoc foramen in frontis osis cavitatem, superius K indicatam. In quarto quoque superioris maxillæ osse, iuxta magnū interiorem uel oculi sedis angulum, dicti iam ordinis foramen etiam se offert. In basi uerò osis cuneum imitantis, extrinsecus, quæ id septo narium committitur, subinde μ, ν, ξ. quina numero uisuntur, ac tria quidem μ, ν, ξ insignita posterius consistunt, utrinque nimirum unum, & in horum medio tertium, quæ antrorsum instar arctissimorum meatuum producta, in narium amplitudinem definūt. quamuis interim medijs foraminis ν indicati finis, setam rarius admittat. Alia autem duo, quæ ω & ω insigniuimus, anteriùs incipiunt, & recto tramite antrorsum quoque conscendentia, in oculi sedis uerticem radicemque terminantur. Cæterum horum foraminum termini hic commodè delineari nequeunt. quare etiam eo uehementius hortor, ut ex hominum caluarijs potius, quam ex nudis osium picturis, hæc discas, foraminis cuiusque sedis coniecturam hinc à characteribus sumens, & cōsideratè, an me aliquod foramen notatu dignum præterierit, expendens. Superfunt adhuc in tertia figura & quarta Græci maulculi characteres, quibus in futuris caluariæ indicandis, iam pridem usi sumus: aded ut nullus præter Ω in quarta occurrens, ueniat enarrandus. Illo enim sinus quidam in uertice notantur, quibus<sup>a</sup> duram cerebri membranam innasci audies. Atque horum sinuum non eadem semper est series: quippe modò nulli, modò pauci, modò plures, atque hi uarij, cernuntur: profectò (si quis me audit) illis animaduertēdi, qui nimis promptè hanc uerticis sedem urunt, aut in osium fracturis nimium intrepide ac confidenter terebrant. Huc quoque referrem<sup>b</sup> sinus duos cuneiformis osis, in ipsius medio antrorum modo repositos, nisi iam antè in eius osis historia ipsos descripsissem, perinde ac amplas cavitates in quartis maxillæ superioris osibus ad narium amplitudinis latera repositas.

<sup>a</sup> fig. lib.  
<sup>7</sup> K.

<sup>b</sup> s. fi. ca.  
<sup>6</sup> G. D.

PRIMA  
DECIMI-  
tertij Capitis  
figura.



SECUNDA  
FIGURA.



DECIMITERTII CAPITIS FIGVRARVM,  
earundemq; characterum Index.

PRIMA figura anteriorem faciem exprimit ossis v imaginem referentis, unâ cum minoribus elati-  
bus vae ipsius lateribus, & ossiculis, quae his usq; ad temporũ ossium processum in styli modũ exertos connectuntur.

ALTERA figura posteriorem ossis v referentis regionem commonstrat, simul cum elatiorebus costis:  
uerum interim illis ossiculis non delineatis, quae ad processum styli speciem exprimentes pertingunt.

A, B, C I Grandius mediumq; ossis v referentis ossiculum, anteriori sede conspicuum. Verum A & B gibbam  
huius sedis regionem indicant. In horum characterum medio peculiare huius regionis apparet tuberculum, \* no  
tatum. C autem indicat sinum transuersim oblongum, & in superiore medij istius ossiculi sede obuium.

D 2 Posterior grandior ossiculi sedes, sinuata & cana.

E, F, 1, 2 Humiliora ossis v referentis latera, quae cum medio ossiculo figuram v similem repraesentant.

G 1, 2 Connexus humilioris lateris, cum latiusculo grandioris ossis v referentis ossiculo.

H 1, 2 Humilioris lateris apex, qui laryngis cartilaginis scutum exprimentis processui alligatur.

I, K, 1, 2 Superiora ossis v referentis latera, humilioribus longè tenuiora, magis teretia.

L, M, N 1 Tria ossicula, superioribus lateribus utrinq; ut plurimum commissa. Ceterum ad ossis v referentis in-  
spectionem etiam faciunt, prater quintam scutulum tabulam ad characterem L, priores aliquot figuræ duo-  
decimi Capitis libri secundi ad A, B, C, D.



MINENTISSIMAE laryngis parti os unitatis nomi-  
ne comprehensum, sed uarijs multiplicibusq; ossiculis ex-  
structum, praenonitur, quod nonnulli à literæ v figura ὤ-  
λαδες, alij succinctius ὠαδες appellant: qua uoce dissectio-  
num rudes delusi, in Galeno os suum referens uerterunt.  
Alijs rursus id os à Λ imagine λαμβανωδες nuncupatur: quo  
etiam nomine interpretes decepti, futuram capitis Λ lite-  
rae similem uertere consueuerunt. eiusmodi tamen mendas pro nostra uirili  
nuper ex Galeno, in Italia & Germania latinè edito, subduximus. Herophylus  
quoq; id os ὤασατ'λω appellasse dicitur, fortè quòd lingua, aut laryngi, aut fau-  
cibus apponatur, uel adsitet: quemadmodum ipsi in organis generationi famu-  
lantibus quædam ὤασατ'λως ὠσφ'δ'ις, & ὤασατ'λως ὠσφ'δ'ις uocantur. Non de-  
sunt etiam, qui quum in faucibus consistat, id φαρυγγεσσιον nuncupauere. Nos ue-  
rò passim, os v referens, aut uoce contractiore, hyoides nominare instituimus.  
Homo igitur hoc os longè aliter quàm quadrupeda, quæ hætenus aggressi fu-  
mus, exstructum obtinet, ac maximum ossis v referentis ossiculũ est latiuscu-  
lum, & foris gibbum, priuatoq; tubere prominens: intus autem, seu posteriori  
sede,

Ossis v referen-  
tis situs & no-  
mina.

a 1. 4 fig.  
6 ca. C. D.  
et 3 inter-  
gratum B.

b 22, 23 fi.  
lib. 5. 2. ad  
1, etia f.  
c cistern fi-  
guris f. &  
4 fig. cap.  
49 lib. 2 R.  
d 1 fi. A. B.  
2, 2 fi. D.

Medium ossis v  
referentis ossi-  
culum.



sede, cauum. in anteriori etiam sede superius quasi in oblongum sinum depri-  
nuitur, pro figuræ nimirum ipsi idoneæ, & musculorum ligamentorumq; illi  
commissorum ratione. Superiori enim sinui implantantur<sup>e</sup> tertius & quar-  
tus huius ossis peculiares musculi: ad tuberis uerò in hac sede conspicui latera,  
quæ quodammodo in gibba sede sinuantur, insertionem tentant<sup>f</sup> duo primi  
huic ossi peculiares musculi. Ex posterioris autē sedis cauo, musculi<sup>g</sup> duo prio-  
res linguam mouentes, præcipuè enascuntur. Præterquàm quòd gibba extror-  
sum, caua uerò introrsum, atque ab iniurijs extrinsecus occurrentibus remo-  
tius opportunè collocetur. Grandius id ossiculum paulo supra laryngem con-  
sistens, tangentibus occurrit, ipsius interim lateribus penitus ferè latitantibus.

Latera ossis *v*  
referentis hu-  
miliora.

Huic enim latiori ossiculo utrinque<sup>h</sup> alia duo uniuntur, quæ ossis *v* referentis  
latera cum Auicenna in Capite de Guttura appellamus: quorum alterum hu-  
milius est, alterum superius. Humilius ossiculum nonnihil breuius latiusq; su-  
periori est, nulliq; alteri ossi committitur, quàm lateri medijs ac latiusculi ossis  
*v* referentis ossiculi, ad quod cartilaginis ligamenti<sup>i</sup>; cartilaginei interuentu  
ualidè, & notatu digna amplitudine nequitur. Verùm<sup>k</sup> finis ipsius<sup>l</sup> superiori sui  
lateris processui cartilaginis laryngis, quæ scuti imaginem exprimit, colligatur.  
Humiliora hæc ossis *v* referentis latera, musculis aliquot admittendis educen-  
disq; apta, simul cum medio grandiori<sup>m</sup> ue ossiculo, *v* imaginem pulchrè expri-  
munt. Porro superiori ossiculo seu lateri, quod magis teres uisitur, & elatori  
fedi lateris medijs ossis *v* referentis ossiculi, tanquam ex puncto committitur,<sup>n</sup>

Superiora late-  
ra, & commissa  
ipsi ossicula.

alia rursus oblonga tereti<sup>o</sup>q; ossicula tantisper continua serie uniuntur, quous-  
que ipsorum finis, temporis ossis compingatur<sup>p</sup> processui, scriptorij styli ima-  
ginem proponenti. Ossicula hæc non pari semper obseruatur numero, ut plu-  
rimùm tamen terna quaterna<sup>q</sup> ue utrinq; cernuntur. quanquam etiam inter-  
dum, idq; maximè in mulieribus, illa uiderimus simul cum superioribus ossis  
*v* referentis lateribus omnino deesse, & ipsorum uicem teres quoddam, uali-  
dum & oblongum ligamentum gerere, quod ab ossis *v* referentis medio ossi-  
culo ad stylium imitantem usque processum pertinebat. Os itaque *v* referens,  
rarè liberum, neque nulli contiguum esse ossi, indicant superiora ossis latera,  
temporum ossibus connexa: & inferiora, cartilaginis scuto similis processibus  
commissa. Cartilagine enim laryngis, ut & costarum cartilagine, ossium præ-  
bent usum: & quod ad contiguitatem spectat, in ossium quoq; classem recen-  
sentur. At quum os *v* referens non adeò firma, atque reliqua ossa, nititur basi,  
proprijs id musculis in omnem positionis differentiam ita trahi, in secundo li-  
bro narrabimus, ut neque in latera, neque sursum aut deorsum, neq; prorsum  
aut retrorsum, secus quàm homini ex usu est, sua sede dimoueri queat, maxi-  
mos sanè plurimosq; usus, etsi minimum sit, præstans: quos tunc recensebi-  
mus, quum<sup>r</sup> aliquot linguæ musculos ab ipso enasci, illudq; linguæ fundamen-  
ti, ac tutissimæ basis modo subijci, & musculorum laryngis quædam princi-  
pia porrigere ostendemus.

Qui hyoides os  
formetur.

Ipsius usus.

e 4 muf.  
tabula R.

f 4 muf.  
tab. S, T. et  
alij eius of-  
fis musculi  
Q, V.  
g 1, 2 fig.  
cap. 19 lib.  
2 D, D.

h Vñ 1, 2  
fig. E, F. Al-  
terum L, K.

i 1, 2 fig.

k 1, 2 fig. H.

l 3, 4 fig.  
ca. 3, A, B.

m 1 fig. L,  
M, N.

n 3, 4 fig.  
6 cap. i.

o 1, 2 fig. 19  
ca. lib. 2 D,  
D & E.  
p 1, 2 fig.  
cap. 21 lib.  
2 F. deinde  
2, 3 fig. K.

## DE DORSO. CAPVT XIII.


### DECIMIQUARTI CAPITIS FIGVRÆ, AC ipsius characterum Index.

*H* & *c* figura uniuersi dorsi ossa ex latere expressimus, ut primùm integer illorū cernatur contextus, ac  
postmodum singule dorsi partes primarijs Capitis delineentur.

*A, B* Collum septem constans uertebrijs, quæ numerus internæ ipsarum sedi appositis sigillatim notantur.

C, D

DECIMIQUARTI  
CAPITIS FIGURA.



C, D Dorsi pars, thoracem constituens, & duodecim formata uertebis.

E, F Dorsi pars, quing<sup>a</sup> completens lumborum uertebas.

G, H Os sacrum, sex ossibus seu uertebis efformatum.

I, K Os coccyx, quatuor extructum ossiculis.

L, L Aliquot uertebas L insignimus, nimirum in tota dorsi compage secundam, nonam, decimam, octauam, & uigesimam quartam: ita indicaturi uertebrarum partem, seu sedem, quam ipsarum corpus nuncupamus.

M, N In iisdem uertebis M uisitur, in quibus L occurrit, uertebrarum processus notans in latera exporreptos, atq<sup>ue</sup> ideo transversos, aut laterales nobis appellatos.

N, N In octava totius dorsi fabrica uertebra N obseruabis, dein in decima septima, & uigesima uertebra. Notantur autem N quidam uertebrarum processus deorsum nutantes, quibus superiores seu incumbentes uertebrae subditae articulantur uertebis. Hos processus ab ipsorum ductu, descendentes nominabimus.

O, O In uertebis quae postremo commemoratis subiunguntur, O uisitur, indicans uertebrarum processus sorsum spectantes, quibus superpositae subiacentibus articulantur, quosq<sup>ue</sup> ascendentes processus recte nuncupabimus.

P, P Illis uertebis P inscribitur, quas prius L, & O insignimus. Notantur autem uertebrarum processus in corporis posteriora exerti, & aculeo ac spinae comparati.

Q, Q Prope easdem uertebas Q reperis, quibus postremo enarratis characteres inscripsimus. At Q nullam uertebrae notat partem, sed foramen in uertebRARUM consistens lateribus, & nervos a dorsali medulla pronatos transmittens.

R, R Cartilagineum ligamentum, uertebRARUM corpora interueniens. Ceterum quum tres figurae, & earum praecipue tertia, ad praesentis libri calcem posita, dorsum pariter commonstrent, non abs re illas etiam obiter hic intueberis, una cum tertijs libri figuris, nervorum a dorsali medulla originem ducentium seriem exprimentibus, & ad undecimi eius libri Capitis initium repositis.



ERV M parēs  
Natura homi-  
ni dorsū, quod  
Græcis πᾶσις &

ὠστρον dicitur, carinae cuiusdam instar, & fulcri, machinata est. Illius enim operecti ambulamus, & erecti cōsistimus.

Verūm Naturam hoc duntaxat dorsum nō fabrefecit, sed perinde atq<sup>ue</sup> aliās subinde membrum aliquod ad uarios simul usus aptum reddidit, ita nec hic quoque industriae suae est oblita. Dorsi enim ossibus, ne tantum

Dorsum, ut cō-  
mode cōmuni  
ossis usui susti-  
neat, extructū,

susti-

et dorsali medulla aptū paritur iter.

Dorsū ossū co-  
pia causa.

Dorsū ossū non  
par magnitudi-  
ne.

sustinerent, corpusq; communi ossium usu solum stabili-  
rent, magnum insculpsit<sup>a</sup> foramen, quo idoneum<sup>b</sup> dorsali medullæ per dorsum descensuræ iter, ac ueluti sacra quædam fistula, Græcis *ισοὶα σπύης* nuncupata, adaptaretur. Atque hoc foramen sic est cælatum, ut eius gratia dissectionum periti à uerticulorum quibus fusi aggrauantur imagine, ossa dorsū uertebras appellauerint. Dein Natura non ex uno simpliciq; ossē dorsum cōstituit, etsi ita ad stabilitatem, & magis à luxationibus distortionibusq; tutam dorsalis medullæ sedem, fuisse, fuit modum: at uariorum motuum, quibus hominem necessariū agi oportuit, occasione, pluribus ossibus dorsum extruxit, ut cunq; etiam sic luxationibus magis reddatur expositum. Quamobrem uerò id non ex duobus aut tribus ossibus tam longis, ac in toto brachio est humerus, & ulna cum radio, in crure autem femur & tibiæ os cum fibula, sed quatuor ferè & triginta efformetur<sup>c</sup> ossibus (quorum septem ad ceruicem, duodecim ad thoracem, quinque ad lumbos, sex ad sacrum os, & quatuor ad coccyx os referimus) ipsa potissimum dorsalis medulla in causa est: quam, quum<sup>d</sup> triginta parium neruorū debebat esse origo, quumq; instar cerebri, partibus sub capite locatis, erat futura, ab omni fanē cōpressionē ac distortionē muniri seruariq; decuit liberam, ne omnes mox partes eiusmodi cuiuspiam dorsalis medullæ uitio inferiores, sensu careant, motuq; destituantur uoluntario. Quam promptè autem dorsalis medulla contunderetur, alias<sup>e</sup> uē grauiissimis noxiis esset exposita, si dorsum duobus aut tribus tantum ossibus constaret, ex angulari cubiti genuq; flexione, & cuiusuis articuli magno laxoq; motu præditi ossium transpositione discimus, acedē, ut necessum fuerit, dorsum tot paruis ossibus construi, quæ inuicem succedentia, sensumq; simul ad motum aliquid conferentia, dorsum moueri permetterent, & interim nullum prorsus in acutum angulum conficerent motum, dorsali medullæ ob compressionem non leuiter noxium. Hinc itaq; solers Natura in omnibus animalibus, tam auibus, quàm piscibus, & reptilibus, & quadrupedibus, tantam eiusmodi paruorum ossium semper instituit seriem, quanta colli & totius reliqui corporis est pars, quæ dorsalem complectens medullam, moueri debuit. Ossium namque illa parciat multitudinē, & magis adhuc laxæ ipsorum compositioni, quam medulla sede quapiā continetur, quam moueri non erat necesse. quemadmodum testudines pulchrè ostendunt, quæ in collo tantum & circa caudæ initium uertebras obtinentes, in immobili ipsarum testa uiam nanciscuntur longam, quæ dorsalem amplectens medullam, nullis constat uertebris. Dein aues quoq; id ipsum, ne quid de hominis sacro dicam ossē, attestantur, quum illis thorax, secus ac collum, paucis constet uertebris: tantaq; ossis sacri appareat in illis lōgitudō, simplici ferè unico<sup>f</sup> uē ossē fabricata. Mirum namque est, quàm Natura omnibus animalibus, ut ipsis ex usu erat, dorsū ossa cōstituerit. quod uel in cōordinatione magnitudinēq; ossium insuper discimus, quum natantium animalium & serpentium ossa mox à capite ueluti à basi sensim diminui cernimus: & gressilium animalium ossa ad eam corporis trunci sedem, quæ femoribus firmatur, ipsis<sup>g</sup> uē aliàs proxima est, maximum ipsorum os habere expendimus: à quo, tanquam à basi, amplissimaq; qua ueluti suffulciuntur sede, reliqua ossa ad caput ascendentia, paulatim redduntur minorā. perinde ac illa etiam, quæ à basi ea, maximoq; illo ossē, à quo ueluti dependent, deorsum uersus caudam, aut aliquid caudæ proportionatum, pertingūt, redduntur arctiora. Sic itaq; in homine, maximum dorsū ossium, sacrum est os, quod suis lateribus illis committitur ossibus, quæ unā cum ipso corpus cōcinne firman, & femorum ad coxendicem articulationes suscipiūt. Neq; sanē sacrum

a In quatuor subsecuentiū Caputū figuris id est obuium.  
b Tres fig. capiti uulnari 4. proposita.

c Seriatim in figura huius Capituli occurrunt numeris insignita.  
d Spectanda sunt in tribus fig. cap. 11 lib. 4.

e G, H, & fig. ca. 18 A, B, C, D, E, F. & integratū si. M. cui eam mittitur, & illi rursum A.



sacrum os ideo duntaxat, quòd sex ueluti peculiaribus ofsibus seu uertebis ex-  
truitur, & perinde ac si simplex unum' ue os tantū esset, nominatur, magnum  
esse dicimus: uerū etiam quòd sex ipsius ofsium supremum, & dein illi sub-  
ditum, singula dorfi ossa seorsum magnitudine uincunt, ipsūq; supremum  
ueluti basis etiam in mole est statuendū. Viginti autem quatuor uertebrarum  
ipsi in cubentium,<sup>1</sup> ea occurrit maxima, quæ sacro osi proximè coarticula-  
tur. & reliquæ dein, quantum posito ab illo discedunt, tanto etiam spectantur  
minores. Hæc q; diminutio usq; ad ipsum perficitur caput, præterquam si quan-  
do uertebra interueniat paulo maior subiecta. quod sanè non absq; magna oc-  
cassione fieri, primæ ceruicis uertebrae ostendit historia, quæ illam reliquis cer-  
uicis uertebis latiore esse docebit, gratia commodæ<sup>2</sup> quinti &<sup>3</sup> sexti caput  
mouentium musculorum insertionis, &<sup>4</sup> secundi scapulam attollentium mu-  
sculi exortus. Quemadmodum &<sup>5</sup> secunda ceruicis uertebra, articulationum  
causa, aliquot sibi subditis ualidior crassiorq; esse docebitur. Ossa uerò sex, qui-  
bus sacrum os compingitur, & quatuor ofsicula, quibus coccyx os cōstituitur,  
ita in magnitudine se habent, ut continua serie ueluti in mucronem à lata basi,  
adeoq; primo secundoq; sacri osis ofsibus<sup>6</sup> imminuantur. Cæterum etsi dorfi  
ofsium moles tam sit in æqualis, neq; illa à capite sensim minora reddantur, ni-  
hilominus foramen dorsalis medullæ causa exculptum, non ofsium magnitu-  
dini, sed dorsalis medullæ proportioni respondet. quum enim illa gignendis  
neruis sensim<sup>7</sup> attenuatur, iure in superiorib. ofsibus ampliora foramina, quam  
in demissioribus se offerunt. Præterea ab hac dorsalis medullæ in dorfi ofsibus  
uiua, omnibus neruis ab illa pronascentibus iter patet per<sup>8</sup> foramina inter ipsa  
ossa sic insculpta, ut duo semper ossa ad unius foraminis cōstitutionem aliquid  
conferant, quamuis interim non in iisdem undiq; sedibus. Nam etsi quamplu-  
rima ossa in suis lateribus hæc obtineant foramina, in<sup>9</sup> osse tamen sacro, &<sup>10</sup> su-  
premis ceruicis uertebis, illa anteriùs & posteriùs cōsistunt. idq; potissimum  
(uti suo dicemus loco) ofsium dorfi tum inter se, tum ad alia contermina ipsis  
ossa cōtextus occasione. quem Natura, totius dorfi roboris, & motuum ipsius  
pariter rationem habens, admodum profectò studiose molitur. Amplissimis  
namq; ofsibus<sup>11</sup> sedibus, quæ uertebRARUM appellamus corpora, tanquam latis  
basibus illa inuicem, ac si unum simul essent os, unaq; series, commisit, non qui-  
dem leuibus & lubricis<sup>12</sup> superficiebus, uti aliàs ferè semper in articulis fieri cer-  
nimus: uerū bases illas, amplas<sup>13</sup> ue sedes exasperans, cartilagineum ipsis in-  
teriecit ligamentum, quod illis sedibus connatum, uertebRARUM corpora uali-  
dissimè connectit. & quum impense crassum sit, molliorisq; cartilaginis tem-  
periem sibi uendicet, hacq; ratione comprimi & attenuari à prementibus, &  
musculorum ui aliquo allectis ofsibus queat, & quum rursus non cōpressum,  
in pristinam crassitiem promptè exurgat, in causa sanè est, ut uertebRARUM cor-  
pora eius interuentu cōstricta, illis quibus indigent motibus agi possint: qui  
leues sunt, & circulares potius, admodumq; obliqui, quàm quouis tandem pa-  
cto in rectum angulū inclinati. Porro præter rarum hunc, & nullis ferè quàm  
dorfi ofsibus communem cōtextum, qui ad anteriorem foraminis dorsalem  
transmittentis sedem, adeoq; ad totius corporis interiora<sup>14</sup> consistit, iuxta po-  
steriorem foraminis eius sedem, Natura utrinq; unum extruxit<sup>15</sup> articulū, qui  
lubricis & leuibus cæterorum corporis uniuersi articularum modo fit super-  
ficiebus. Ex elatiori enim uertebRARUM sede, hîc duo sursum educuntur<sup>16</sup> pro-  
cessus, quos ideo ascendentes nuncupamus: & ex humiliori sede<sup>17</sup> alij totidem  
deorsum exerūtur, descendentes processus iccirco appellati. Hisq; processibus

Dorsalis me-  
dulle uia pro-  
porcio.

Foramina ner-  
uos transmi-  
tentia in dorsi  
ofsibus etiam  
calari.

VertebRARUM  
corpora, &  
quæ eorundem  
contextus.

Cartilaginè  
ligamentum,  
corpora uerte-  
brarum mucro-  
cedens.

Articulū ascen-  
dentibus &  
descendentibus  
processibus pa-  
rati.

f F aut  
char. 2.4.

g 14 musf.

tab. 1. H.

h eiusdem

tab. K. L.

i 13 musf.

tab. Q.

h Confer

in figura hu-

ius Capitis

secundæ uer-

tebræ cum

subditis, aut

id speciatim

10 & 11 si

gur. cap. 15.

l G, H, I,

K. & tota

1, 2, 3, 4, 10.

m 1 fig. ca.

11 lib. 4.

n Q, Q.

o 1, 2 fig.

ca. 10. char.

2, 3, 4, 5, 6.

p 11 fig. ca.

15 Y, m, r.

aut speciatim

2 fig. ca.

11 lib. 4.

q L, L, L.

r figurarū

cap. 16 &

17 A.

s R, R, R.

& figuræ

capiti 40 li-

bri 2 infer-

te char. 3.

t uti spec-

iatim in 8

muscul tab.

u N cū O.

x O, O, O.

& fig. ca.

15 char. 5.

4. & 1 fig.

cap. 16 T.

V. & 2 fig.

X, Y. & 2

fig. cap. 17

1, K.

y N, N, N.

& 8 fig. ca.

15 char. 5.

6. & 2, 3 fi.

cap. 10 a, b.

& 1 fig. ca.

17 N, O.

uertebrae posteriori hac fede articulantur, uerum non undiq; paribus sinibus & tuberibus, eodemq; , ut sequentibus iam docebitur Capitibus, ingressu. ubi etiam audies, <sup>1</sup> primam ceruicis uertebra, quam supra secunda peculiari mo-  
tu circumagi oportuit, tribus his cōtextibus à ceteris uertebis uariare. & quia sacri ossis ossa non debebant reliquarum uertebraꝝ modo moueri, ideo ipsa simul undiq; <sup>2</sup> connata coalita ue esse intelliges. <sup>3</sup> Ofsiculorum autem ofsis coc-  
cygis contextum (qui simplex & unicus est) illi respondere scribam, quo uer-  
tebrarum corpora ligamenti cartilaginei interuentu attextutur. Porro quem-  
admodum Natura dorsi ofsium motibus, quoad fieri potuit, ualidis, luxatio-  
niq; minus obnoxijs contextibus (ne quid de reliqua ligamentorum adferam  
serie) prouidit: ita quoque dorsalis medullæ inter hos contextus descendens  
gratia, quo scilicet ab extrinsecus occurrentibus melius muniretur, alij adhuc  
dictis nuper insigniores processus, ab ofsibus illam continentibus educuntur.

Dorsi ofsium spi-  
nas, seu postero-  
res processus.

Transuersi  
processus.

Ex posteriori enim illorū sede, longi enascuntur in posteriora <sup>a</sup> processus, quos  
spinas appellamus, ab illis etiam totius dorsi compagem, spinam uocitantes.  
Præterea ex transuersis lateralibusq; sedibus alius utring; promitur <sup>a</sup> processus,  
quem transuersum nuncupamus, in suo mucrone perinde ac posteriores pro-  
cessus cartilagine eo usu donatū, quo ofsium extremis alteri ofsi non attextis,  
cartilagine obnasci scimus. Cæterum hi processus, non tantum ut dorsali me-  
dullæ & subditis partibus instar propugnaculi sint, creatur: uerum insuper edu-  
cendis frequentium musculorū exortibus, & admittendis eorundem insertio-  
nibus unicè conducunt, & transuersi præterea thoracis uertebraꝝ <sup>e</sup> proce-  
ssus, costarum articulationibus sunt accommodi. quemadmodum sacri ofsis  
transuersi processus contextui famulantur, quem id os cum ofsibus ex latere  
ipsi commissis <sup>f</sup> molitur. Quamobrem uerò prima ceruicis uertebra priuatim  
spina <sup>g</sup> destituatur, & cur <sup>h</sup> spinæ ceruicis uertebraꝝ, ut & earundem trans-  
uersi <sup>i</sup> processus, spectentur bifidi, & cur thoracis uertebrae (in primis uerò su-  
periores) longissimas educant <sup>j</sup> spinas: contrà autem, quæ in <sup>k</sup> lumbis sunt, &  
ofsis sacri <sup>l</sup> ossa, & <sup>m</sup> demum quàm processus hi omnes ductu formaq; uariant,  
& quibus priuatim appendices obtigerunt, & quæ corporum uertebraꝝ in  
singulis sit forma, & quæ appendices supra infraq; peculiariter obtinent, qua-  
tuor sequentibus Capitibus enitar persequi, unum Caput singulis maioribus  
dorsi sedibus tribuens. Breui namq; & succincto sermone completi nequit,  
quàm multa, rara, peculiariaq; Natura in dorsi ofsium cōstructione moliatur.

2 Specta  
10, 11 fig.  
cap. 15.

a Specta  
2 fi. ca. 18.  
b 3 fig. ca.  
18 G, H, I,  
K.

c P, P, P.  
d M, M,  
M.

e 1, 2 fi. ca.

f 2 fig. ca.

g L, M, N,

O, P cōm-

tuntur cum

3 figure ca.

29 A, B, C,

D, E, F,

g 3 fig. ca.

15 X,

h 8 fi. ca.

15 m. f.

i eiusdem

fig. char. 8,

7 & 9, 10.

k 1, 2 fig.

cap. 16 N,

O, P.

l 2 fig. ca.

17 C, D, E,

F, G.

m 2 fi. ca.

18 d, d, d.

n si lubet

has spectare

differe-

ntias, consp-

icuat

quatuor

subsequen-

tium Cap.



figuras in-

ter se.


## DE COLLI VERTEBRIS. CAPVT XV.

### PRIMA XV CAP. FIGURA.

### SECUNDA.



### TERTIA.



### QUARTA.


QUARTA.



QUINTA.





SEXTA.



SEPTIMA.

OCTAVA.

NONA.



DECIMA.

UNDECIMA.

### VNDECIM CAPITIS DECIMIQUINTI figurarum, & earundem characterum Index.

*P R I M A* figura, occipitis ossis partem ab alijs ossibus liberam, & in externa calvariae basis sede conspiciam, proponit.

*Secunda*, primam colli cervicis, seu vertebrae anteriori superiori<sup>q</sup>, facie expressam continet.

*Tertia*, primae cervicis vertebrae superiorem posteriorem<sup>q</sup>, faciem oculis subijcit.

*Quarta*, primam cervicis vertebrae inferiori posteriori<sup>q</sup>, facie delineatam exhibet.

*Quinta*, secundae cervicis vertebrae anteriorem commonstrat faciem.

*Sexta*, secundae cervicis vertebrae posteriorem faciem designat.

*Septima*, secundam cervicis vertebrae inferiori facie spectandam offert.

*Octava*, tertiae cervicis vertebrae anteriorem superiorem<sup>q</sup>, faciem ostendit.

*Nona*, tertiae cervicis vertebrae posteriori superiori<sup>q</sup>, facies delineatur. Quoniam vero huius cervicis vertebrae inferior sedes secundae vertebrae inferiori sedi respondet, illam hic non apponimus, ne forte praesenti Capiti nimius tabularum acervus praeposatur. Atq; hac etiam ratione, ceteras cervicis vertebrae tertiae subiectas singulatim non depinximus, praecipue quum illarum descriptio ex trium superiorum vertebrae figuris prompte desumi queat.

*Decima*, trium primarum cervicis vertebrae compago anteriori parte depicta cernitur.

*Undecima*, trium primarum cervicis vertebrae contextus posteriori facie exprimitur.

*A* in 1 Foramen in occipitis osse, dorsalis medullae gratia excisum.



- B 1 Dextrum occipitis ossis capitulum, quod primæ coarticulatur cervicis vertebrae. Sinistrum uerò capitulum, C, D, E & F insignitur. Si quidem C & D capituli notant longitudinem, seu ductum, quo longitudinem in E, F 1 horum capitulorum descriptione metimur. Dein E insinuat internum latus capituli, quod magis deorsum, quam externum F insignitur protuberat.
- G 1 Anterior foraminis dorsalem transmittentis sedes, quæ ob teretis cuiusdam ligamenti insertionem aspera & inaequalis est.
- H 1 Sinus in posteriori sede utrorumq. capitulorum occipitis ossis incisus, ac uiam primo dorsalis medulla nervorum pari porrigit.
- I 2, 3, 4 Foramen transmittenda dorsali medulle in prima cervicis vertebra exculptum.
- K 2, 3 Hæc primæ vertebrae corpus exculptum, secundæ vertebrae dentem, qui I notabitur, suscepturum.
- L 3, 4, 10 Sinus in posteriori sede corporis primæ vertebrae incisus, ac cartilagine incrustatus.
- M 2 Processus & tuberculum, in anteriori corporis primæ cervicis vertebra sede prominens.
- N 2, 3, 10, II Dexter primæ vertebrae sinus, quo dextrum occipitis ossis capitulum excipitur. Sinistrum sinum in secunda O, P, Q, da & decima latere sinus primæ vertebrae indicatur, qui cum occipitis ossis sinu H notato communem efficit ductum, quo primum dorsalis medulla nervorum par elabitur.
- O, P, Q, da & decima latere sinus primæ vertebrae indicatur, qui cum occipitis ossis sinu H notato communem efficit ductum, quo primum dorsalis medulla nervorum par elabitur.
- R, num latus, longe ipso exteriori R insignito, declinatus.
- S 2, 3, 4, 10, II Transversus primæ cervicis vertebrae processus dexter, cui sinister respondet.
- T 2, II Foramen transversæ primæ vertebrae processus insculptum.
- U 3, II In dextro tantum latere sinus primæ vertebrae indicatur, qui cum occipitis ossis sinu H notato communem efficit ductum, quo primum dorsalis medulla nervorum par elabitur.
- X 3, 4, II Hæc aspera, sede primæ cervicis vertebra posteriori destituitur processo.
- Y 4 Dexter primæ cervicis vertebrae sinus, dextrum secundæ vertebrae tuber c signandum excipiens.
- a, b Sinistrum autem sinum a & b notauimus: a quidem internum ipsius latus, b autem externum indicantes.
- c 5, 6 Dextrum secundæ vertebrae tuber, seu insigniter depressum capitulum, commemoratum iam prius primæ vertebrae sinum I insignitum subingrediens. d, e, f, sinistrum ostendunt capitulum. uerum d priuatim latus ipsius notat internum, elatusq. e uerò externum, & depressus. f autem eam capituli partem, quæ ad posteriora ueluti extra circuli circumferentiam educitur.
- G 7, 10, II Secunda cervicis vertebrae processus, quem à dentis imagine dentem uocabimus, qui etiam in quinta figura & sexta conspicitur, pluribus notatur characteribus, priuatim aliquid significantibus. g enim in quinta, tuberculum ipsius notat cartilagine obductum. h in sexta, notat posteriorē dentis sedem, quæ crassior est, magisq. quam i. dentis radix in posteriora extuberat. i sinum indicat, ad quem transversum ligamentum aduoluitur, quod dentem in prima vertebra constringit ac continet. k & l utrinq. sinus insignitur, ad dentis principij radices uel latera incisus, atq. anteriori secundæ nervorum dorsalis medulla paris propagines admodum exiguas transmittens. Ceterum foramen, hoc sinu & primæ vertebrae sinu efformatum, in undecima figura m signatur. Postremo n in quinta figura a dentis notat mucronem.
- o 3, II Sedes dextri lateris notatur aspera, inter primæ vertebrae superiorem sinum N indicatum, & inferiorem Y indicatum consistens, ubi foramen non peruium conspicitur.
- p 6 Sinus ad posteriorem secundæ vertebrae tuberis c insigniti sedem exculptus, & cum sinu mox q notato commune foramen constituens, quo secundum nervorum dorsalis medulla coniugium in posteriora profilit.
- q 4 Primæ vertebrae sinus, quo dicti iam foraminis pars efformatur.
- r 10, II Uia, seu foramen, dextram portionem secundæ coniugij in posteriora transmittens.
- s 5, 6, 7 Posterior processus, seu spina secundæ cervicis vertebrae.
- t 9 Tertiæ cervicis vertebrae spina.
- u 5, 6, 7 Dextri lateris transversus secundæ cervicis vertebrae processus, cui sinister correspondet.
- x 5, 6, 7 Foramen transversæ secundæ cervicis vertebrae processus.
- y 5, 6, 10 Transversus sinistri lateris processus, tertiæ cervicis vertebrae. Verum y internam partem, z autem externam notant.
- α 8, 9 Foramen transversæ tertiæ cervicis vertebrae processus.
- β 6, 7, II Dexter descendens secundæ vertebrae processus, cuius sinus formam septimæ figura indicat.
- γ 9, II Dexter descendens tertiæ cervicis vertebrae processus. uerum γ in nona & undecima posteriorē ipsius indicat sedem. Inferior autem ipsius sedes, seu sinus, imagine sinui respondet in septima β insignito.
- δ 9, II Dexter ascendens tertiæ cervicis vertebrae processus, ac nona quidem figura ipsius tuber ostendit.
- ε 5, 6, 7, 10 Sedes, quæ secundæ vertebrae corpus deorsum porrigitur.
- ζ 9 Sedes, quæ tertiæ cervicis vertebrae corpus declinatus fertur.
- η, θ, κ, 9 Superior tertiæ vertebrae corporis sedes sinuata. & η quidem sinum indicat, θ uerò & κ utrinq. prominentem ipsius processum.

λ, μ, ν 10 Anterior secunda uertebra corporis sedes, in qua λ prominens indicat tuber, μ uerò & ν uirging depressatur  
beris latera.

ξ, ω 8 Duo apices spinæ tertiae cervicis uertebrae.

ρ 8 Inferior corporis tertiae cervicis uertebrae sedes. Superior autem numeris 1, 2 insignitur.

ς 8, 9 Sinus inferiorem partem constituens foraminis, quo tertium dorsi nervorum par exiit.

τ, τ 7 Sinus superior em ducti iam foraminis partem efformans.

ι, 2, 3 Hic characteres in octava figura, processuum tertiae cervicis uertebrae numerū indicant. Quandoquidem 1, 2 no

tantur duae eminentes partes superioris sedis corporis uertebrae. 3, 4 duo ascendentes processus. 5, 6 duo descen-  
dentes processus. 7, 8, 9, 10 transuersi processus. 11 spina.



a Hæc offe-  
dit fig. 1. ca.  
38. V. a. f. au-  
tem per col-  
lum repen-  
tia, et pul-  
mones, fig.  
c. 41. 3 lib.  
apposita, ut  
et illa qua  
4 lib. fini  
insistunt.  
b 2, 3 fig. ca.  
piti in præ-  
posita 3, 4,  
5, 6, 7, 8, 9,  
10, 11, 12,  
13, 14, 15,  
16, 17, 18,  
19, 20, 21,  
22, 23, 24,  
25, 26, 27,  
28, 29, 30,  
31, 32, 33,  
34, 35, 36,  
37, 38, 39,  
40, 41, 42,  
43, 44, 45,  
46, 47, 48,  
49, 50, 51,  
52, 53, 54,  
55, 56, 57,  
58, 59, 60,  
61, 62, 63,  
64, 65, 66,  
67, 68, 69,  
70, 71, 72,  
73, 74, 75,  
76, 77, 78,  
79, 80, 81,  
82, 83, 84,  
85, 86, 87,  
88, 89, 90,  
91, 92, 93,  
94, 95, 96,  
97, 98, 99,  
100, 101, 102,  
103, 104, 105,  
106, 107, 108,  
109, 110, 111,  
112, 113, 114,  
115, 116, 117,  
118, 119, 120,  
121, 122, 123,  
124, 125, 126,  
127, 128, 129,  
130, 131, 132,  
133, 134, 135,  
136, 137, 138,  
139, 140, 141,  
142, 143, 144,  
145, 146, 147,  
148, 149, 150,  
151, 152, 153,  
154, 155, 156,  
157, 158, 159,  
160, 161, 162,  
163, 164, 165,  
166, 167, 168,  
169, 170, 171,  
172, 173, 174,  
175, 176, 177,  
178, 179, 180,  
181, 182, 183,  
184, 185, 186,  
187, 188, 189,  
190, 191, 192,  
193, 194, 195,  
196, 197, 198,  
199, 200, 201,  
202, 203, 204,  
205, 206, 207,  
208, 209, 210,  
211, 212, 213,  
214, 215, 216,  
217, 218, 219,  
220, 221, 222,  
223, 224, 225,  
226, 227, 228,  
229, 230, 231,  
232, 233, 234,  
235, 236, 237,  
238, 239, 240,  
241, 242, 243,  
244, 245, 246,  
247, 248, 249,  
250, 251, 252,  
253, 254, 255,  
256, 257, 258,  
259, 260, 261,  
262, 263, 264,  
265, 266, 267,  
268, 269, 270,  
271, 272, 273,  
274, 275, 276,  
277, 278, 279,  
280, 281, 282,  
283, 284, 285,  
286, 287, 288,  
289, 290, 291,  
292, 293, 294,  
295, 296, 297,  
298, 299, 300,  
301, 302, 303,  
304, 305, 306,  
307, 308, 309,  
310, 311, 312,  
313, 314, 315,  
316, 317, 318,  
319, 320, 321,  
322, 323, 324,  
325, 326, 327,  
328, 329, 330,  
331, 332, 333,  
334, 335, 336,  
337, 338, 339,  
340, 341, 342,  
343, 344, 345,  
346, 347, 348,  
349, 350, 351,  
352, 353, 354,  
355, 356, 357,  
358, 359, 360,  
361, 362, 363,  
364, 365, 366,  
367, 368, 369,  
370, 371, 372,  
373, 374, 375,  
376, 377, 378,  
379, 380, 381,  
382, 383, 384,  
385, 386, 387,  
388, 389, 390,  
391, 392, 393,  
394, 395, 396,  
397, 398, 399,  
400, 401, 402,  
403, 404, 405,  
406, 407, 408,  
409, 410, 411,  
412, 413, 414,  
415, 416, 417,  
418, 419, 420,  
421, 422, 423,  
424, 425, 426,  
427, 428, 429,  
430, 431, 432,  
433, 434, 435,  
436, 437, 438,  
439, 440, 441,  
442, 443, 444,  
445, 446, 447,  
448, 449, 450,  
451, 452, 453,  
454, 455, 456,  
457, 458, 459,  
460, 461, 462,  
463, 464, 465,  
466, 467, 468,  
469, 470, 471,  
472, 473, 474,  
475, 476, 477,  
478, 479, 480,  
481, 482, 483,  
484, 485, 486,  
487, 488, 489,  
490, 491, 492,  
493, 494, 495,  
496, 497, 498,  
499, 500, 501,  
502, 503, 504,  
505, 506, 507,  
508, 509, 510,  
511, 512, 513,  
514, 515, 516,  
517, 518, 519,  
520, 521, 522,  
523, 524, 525,  
526, 527, 528,  
529, 530, 531,  
532, 533, 534,  
535, 536, 537,  
538, 539, 540,  
541, 542, 543,  
544, 545, 546,  
547, 548, 549,  
550, 551, 552,  
553, 554, 555,  
556, 557, 558,  
559, 560, 561,  
562, 563, 564,  
565, 566, 567,  
568, 569, 570,  
571, 572, 573,  
574, 575, 576,  
577, 578, 579,  
580, 581, 582,  
583, 584, 585,  
586, 587, 588,  
589, 590, 591,  
592, 593, 594,  
595, 596, 597,  
598, 599, 600,  
601, 602, 603,  
604, 605, 606,  
607, 608, 609,  
610, 611, 612,  
613, 614, 615,  
616, 617, 618,  
619, 620, 621,  
622, 623, 624,  
625, 626, 627,  
628, 629, 630,  
631, 632, 633,  
634, 635, 636,  
637, 638, 639,  
640, 641, 642,  
643, 644, 645,  
646, 647, 648,  
649, 650, 651,  
652, 653, 654,  
655, 656, 657,  
658, 659, 660,  
661, 662, 663,  
664, 665, 666,  
667, 668, 669,  
670, 671, 672,  
673, 674, 675,  
676, 677, 678,  
679, 680, 681,  
682, 683, 684,  
685, 686, 687,  
688, 689, 690,  
691, 692, 693,  
694, 695, 696,  
697, 698, 699,  
700, 701, 702,  
703, 704, 705,  
706, 707, 708,  
709, 710, 711,  
712, 713, 714,  
715, 716, 717,  
718, 719, 720,  
721, 722, 723,  
724, 725, 726,  
727, 728, 729,  
730, 731, 732,  
733, 734, 735,  
736, 737, 738,  
739, 740, 741,  
742, 743, 744,  
745, 746, 747,  
748, 749, 750,  
751, 752, 753,  
754, 755, 756,  
757, 758, 759,  
760, 761, 762,  
763, 764, 765,  
766, 767, 768,  
769, 770, 771,  
772, 773, 774,  
775, 776, 777,  
778, 779, 780,  
781, 782, 783,  
784, 785, 786,  
787, 788, 789,  
790, 791, 792,  
793, 794, 795,  
796, 797, 798,  
799, 800, 801,  
802, 803, 804,  
805, 806, 807,  
808, 809, 810,  
811, 812, 813,  
814, 815, 816,  
817, 818, 819,  
820, 821, 822,  
823, 824, 825,  
826, 827, 828,  
829, 830, 831,  
832, 833, 834,  
835, 836, 837,  
838, 839, 840,  
841, 842, 843,  
844, 845, 846,  
847, 848, 849,  
850, 851, 852,  
853, 854, 855,  
856, 857, 858,  
859, 860, 861,  
862, 863, 864,  
865, 866, 867,  
868, 869, 870,  
871, 872, 873,  
874, 875, 876,  
877, 878, 879,  
880, 881, 882,  
883, 884, 885,  
886, 887, 888,  
889, 890, 891,  
892, 893, 894,  
895, 896, 897,  
898, 899, 900,  
901, 902, 903,  
904, 905, 906,  
907, 908, 909,  
910, 911, 912,  
913, 914, 915,  
916, 917, 918,  
919, 920, 921,  
922, 923, 924,  
925, 926, 927,  
928, 929, 930,  
931, 932, 933,  
934, 935, 936,  
937, 938, 939,  
940, 941, 942,  
943, 944, 945,  
946, 947, 948,  
949, 950, 951,  
952, 953, 954,  
955, 956, 957,  
958, 959, 960,  
961, 962, 963,  
964, 965, 966,  
967, 968, 969,  
970, 971, 972,  
973, 974, 975,  
976, 977, 978,  
979, 980, 981,  
982, 983, 984,  
985, 986, 987,  
988, 989, 990,  
991, 992, 993,  
994, 995, 996,  
997, 998, 999,  
1000.

e fig. 1. A. B. C. in  
tribus in-  
gris ab i ad  
K.  
d tota 1. fi.  
e 1 fig. A.  
f dextrum  
v. si. B. ostendit.  
g uersus G  
2 fig.  
h 1 fig. C.  
i 1 fig. D.  
k 1, 2 fig.  
cap. 30 A.  
l 1 fig. E.  
m 1 fig. F.

n tota 2.  
3, 4 fig. A.  
o 2, 3, 4 fig.  
gur. 1.

p 2, 3 fig. K.

q 7, 10, 11.  
fig. F.

r 3, 4 fig. L.

V L M O N I S, qui in thoracis cauitate reponitur, occasio-  
ne, homini collum dari, hinc potissimum cōstat, quòd hoc  
perpetuò cum illo deperditur. Quum enim<sup>a</sup> asperam arte-  
riam, qua in spirantes, aerem attrahimus, & expirantes, eun-  
dem rursus efflamus, ab ore in pulmonem ferri oportuit,  
necessariò quoq; spaciū aliquod inter hunc & fauces in-  
tercedere debuit. siquidē homo opportuna per longum  
canalem, seu fistulam potius, efflatione (quæ uocis est materia) donandus fue-  
rat: qui tantam colli nanciscitur longitudinem, quanta asperæ arteriæ ad uo-  
cis generationem ex usu est. Præterea quum partes scapulis cōterminas, & bra-  
chia, & septum deniq; transuersum,<sup>b</sup> nervos à dorsali medulla collum perpe-  
tante adipisci oportebat, illorum quoq; propagationis causa, necessum fuit, in  
spacio inter caput & thoracem medio uertebrae reponi, quibus collum cer-  
uix<sup>c</sup> ue hominis texeretur. Non enim hic auium quadrupedūmq; quibus long-  
ga obtigerunt crura, colli usum recensere propositum est: quamuis interim  
collectu promptū sit, Naturam illis, quòd manibus carent, colli maxillarumq;  
longitudine ad cibum assumendū prospexisse, hacq; ratione illis pluribus uer-  
tebris quàm homini collum extrui. Constat autem humana cervix<sup>d</sup> uertebri-  
septem: in quarum historia eam quoq; occipitis osis<sup>e</sup> partem cōplectar, quæ  
primæ articulat<sup>f</sup> uertebrae, quæq; ad ambo<sup>g</sup> foraminis sui, quo dorsalis me-  
dulla in dorsum procidit, latera, unum obtinet<sup>h</sup> capitulum, magis ad<sup>i</sup> antero-  
rem foraminis sedem, quàm posteriorem uergens. Capitula hæc, si<sup>j</sup> priorem  
posterioremq; ipsorum sedem spectes, oblonga sunt, & arcuata, sicq; prorsus ex-  
structa, ac si rotundū aliquod osis caput (quale femoris est exocidicis osi<sup>k</sup>  
articulatulum) in duas partes discinderes, ac utrinq; ad foraminis in occipitis osse  
cælati latera, unam illius capitis partem reponeres. Si enim utraq; occipitis of-  
sis capitula internis lateribus iuncta fingeres, ex ambobus rotundū quodam-  
modo caput tibi confurgeret, adeò ut constet utrunq; capitulum esse oblon-  
gum,<sup>l</sup> interioriq; latere magis quàm<sup>m</sup> exteriori ad eum modū protuberās, quo  
rotundū alicuius capitis in tota ipsius superficie media, magisq; prominens pars,  
procerius, quàm partes in orbiculo positæ, exeritur. Hæc capitula, uti mox di-  
cemus,<sup>n</sup> primæ articulantur uertebrae, quæ reliquis omnibus dorsi ofibus un-  
diq; solidior est, & densior, formaq; à cæteris omnibus plurimū differt.<sup>o</sup> Fo-  
ramen namq; ipsi, dorsalis medullæ gratia incisum, obtinet amplissimū, quòd  
hæc etiam inibi reperiatur crassissima. Deinde ipsius corpus posteriori sua se-  
de, qua dorsalis incedit medulla, admodū<sup>p</sup> excuatur, ut insignis secundæ uer-  
tebrae<sup>q</sup> processus, quem dentē appellabimus, axis alicuius modo in primæ uer-  
tebrae reponatur corpore, hæcq; (uti postea docebimus apertius) unā cum ca-  
pite ad illum circumuertatur. Quod ut fieret commodius, anterior excuata<sup>r</sup>  
in primæ uertebrae corpore regionis sedes<sup>s</sup> sinum obtinet leuiter incisum, &

Homo pulmo-  
nis occasione  
collo donatur.

fig. 1. ca. 38. V. a. f. au-  
tem per col-  
lum repen-  
tia, et pul-  
mones, fig.  
c. 41. 3 lib.  
apposita, ut  
et illa qua  
4 lib. fini  
insistunt.

Cervix uerte-  
bra septem.  
Occipitis osis  
capitula, quæ  
primæ articu-  
lantur uerte-  
brae.

Prima uerte-  
brae foramen,  
dorsale trans-  
mittens medul-  
lam.

Quæ ipsius cor-  
pus excuatur,  
ut secundæ  
uertebrae den-  
tem excipiat.

Corporis ipsius  
finis.

Tuberculum.

sinus, quibus  
occipitis os in-  
articulatur.

Transuersi pri-  
ma uertebrae  
processus.

prae primi pa-  
ris nervorum  
dorsalis medul-  
lae.

Prima uerte-  
brae spinae ca-  
rect.

cartilagine in crustatum, cui<sup>r</sup> anteriorem dentis illius sedem extuberantem, cartilagineq; oblitam, congruere audies. Cæterum ne prima uertebra in suo corpore sic excavata, & corpore propemodum hac occasione destituta, plus æquo imbecillis in ualidaq; redderetur, processu quodam & tuberculo in anteriori sede augetur, cuius beneficio illa extra reliquam anteriorem uertebra- rum sedem crassescit, robustiorq; efficitur: præterquam quod ipsum etiam accom- modum sit suscipiendæ insertioni, primi dorsum mouentium musculo- rum paris. Galenus uerò in quarto de Administrandis dissectionibus, tubercu- lum id in hoc exertum docet, ut nimium capitis flexum prohiberet, caputq; in flexione sustineret: aut in causa esset, ut flexum caput, alacrius de uo in po- steriora sursum reflecteretur. quum interim nulla ratione caput in ullo ipsius motu tam laxè inclinari possit, ut tuberculum illud cōtingat: tantum abest, ut tuberculum ipsi à Galeno ascriptum usum præstet. Quanquam etiam quousq; is capitis motus sit assecutus, ad Capitis finem non leuibus occasionibus subij- ciam, reliquo toto Capite orationis contextum dissentientibus mihi Galeni placitis alioquin non inturbaturus. Prima itaq; uertebra ad latera<sup>x</sup> cauita- tis, quæ secundæ dentem admittit, est ualidissima, & pro sua proportionem cras- sissima, & utrobique<sup>y</sup> unum ostendit sinus, quo sui lateris occipitij ossis capitu- lum excipitur. Vt uerò sinus capitulis exquisitè respōderent, ipsi (si<sup>z</sup> priora<sup>z</sup> po- sterioraq; spectes) oblongi sunt, &<sup>b</sup> exterioribus lateribus assurgunt, interioribus uerò cauantur, non secus profectò, quàm si ambo sinus ex uno rotundo profundoq; sinu essent discissi. Si enim coxendicis ossis<sup>a</sup> sinum diuideres, & u- trinq; in prima ceruicis uertebra unam ipsius partem collocares, isti primæ uer- tebræ sinus tibi constituerentur, in quibus occipitis ossis capitula flectuntur & extenduntur, seu antrorsum retrorsumq; rectissimo, nulloq; pacto in latus in- clinantur motu agūtur. Ad exteriora horum sinuum latera, prima ceruicis uer- tebra<sup>c</sup> transuersos suos educit processus: quorum unus utrinq; est, multo pro- cerius, quàm cæteri transuersi uertebra<sup>d</sup> ceruicis processus, exertus, & cras- siusculus: non tamen æquè in hominibus, ac in canibus caudatisq; simijs instar alæ cuiusdam amplius. Educuntur autem transuersi primæ uertebra<sup>e</sup> processus insigniùs, ut ex abundanti, & præter reliquos ceruicis transuersos processus, commodam duorum musculorum insertionem singuli acciperent. Illis enim priuatim<sup>f</sup> quinta &<sup>g</sup> sexta musculorum caput mouentium paria inseruntur. & non leuis portio<sup>h</sup> musculorum ab ipsis enascitur, qui scapulas attollentium secundi numerabūtur. Processus isti magno perforantur<sup>i</sup> foramine, per quod<sup>j</sup> arteria & uena hæc caluariam petentes feruntur. Ad posteriorem quoque si- nuum, quibus caput inarticulatur, sedem, sinus utrinq; in prima uertebra ex- culpitur, cui<sup>k</sup> alius in occipitis osse correspondet, ad posteriorem utriusq; capi- tuli sedem cælatus, & unà cum primæ uertebra<sup>l</sup> sinu uiam præbens<sup>m</sup> primo neruorū dorsalis medullæ pari. Canibus uerò in prima ceruicis uertebra non sinus tantum neruo cedens, sed integrum foramen utrinq; inciditur, quod il- lis prima uertebra, quum insigniter ampla altaq; sit, cōmodè perforari queat. Quamuis interim in homine maior uiæ neruum transmittentis portio in uer- tebra, quàm occipitis osse exculpitur. Hæc uiæ portio in uertebra occurrens, etiam ad posteriorem<sup>n</sup> foraminis sedem pertinet, quo trāuersus processus est peruius: ut is non neruo duntaxat, sed<sup>o</sup> uenæ etiam & arteriæ iter porrigat cal- uariam subeuntibus, per<sup>p</sup> foramen ad radicem capituli occipitis ossis, postero- ri in sede exculptum. Prima ceruicis uertebra, posteriori processu ob hoc inter reliquas uertebra<sup>q</sup> sola<sup>r</sup> destituitur, quòd is, quum nullius musculi occasio- ne procul

5 fig. 8

1, 10 fig. M.

8 musc. tab. A, B.

3 fig. K.

2, 3, 10 fi. dextrarū no- tant O.

2 fig. O.

2 fig. P.

2 fig. R.

2 fig. Q.

2 fig. S.

2 fig. T.

2 fig. U.

2 fig. V.

2 fig. W.

2 fig. X.

2 fig. Y.

2 fig. Z.

2 fig. A.

2 fig. B.

2 fig. C.

2 fig. D.

2 fig. E.

2 fig. F.

2 fig. G.

2 fig. H.

2 fig. I.

2 fig. J.

2 fig. K.

2 fig. L.

2 fig. M.

2 fig. N.

2 fig. O.

2 fig. P.

2 fig. Q.

2 fig. R.

2 fig. S.

2 fig. T.

2 fig. U.

2 fig. V.

2 fig. W.

2 fig. X.

2 fig. Y.

2 fig. Z.



s 12. musc.  
tabul. A, B.

procul educi debuit, tertium musculorum caput mouentium par aculei modo uulnerasset, & aptum quo id duceretur iter, ac sedem occupasset. Ea tamen parte, qua aliæ uertebæ in posteriorem processum spinam uel definunt, hæc aspera est, & ueluti acuta linea extuberat, quo facilius quartum caput mouentium musculorum par hinc principium sumeret. In inferiori primæ ceruicis uertebæ regione, sub duobus, quibus caput excipitur, sinibus, alij totidem insculpuntur, leuiter ac in superficie tantum caui, ob idq; etiam *γλωσσίδης* appellati. Horum circumferentia orbicularis est, in medio uix aliquid, quod dijudicari possit, caui obtinens, sed exteriora sinuum supercilia longè inferius quàm interiora descendunt. His sinibus cartilagine obcrustratis, duo secundæ ceruicis uertebæ excipiuntur capitula, quæ ad latus corporis eius uertebæ habentur minimùm prominentia. Horum circumferentia sinuum quoq; modo orbicularis est, quamuis interim nonnihil posteriori parte extra circuli conuexum deduci uideatur. Ad hæc, internum latus capitulorum elatiùs exteriori latere assurgit. Verùm hæc laterum altitudo depressioq; non adèò insignis est, atq; superciliorum primæ ceruicis uertebæ sinuum. Deinde capitula in medio seu centro non æquè prominent, ac primæ uertebæ sinus inter supercilia cauantur: non secus sanè, quàm si capitulorum latera procerius quàm ipsorum medium exurgerent. Vnde etiam fit, in nudis ossibus inuicem adaptatis, sinus non aduulsum capitulis respondere, & in illorum sinuum medio spaciū non prorsus oppletum dehiscere. quod hominibus priuatim accidit: canibus autem & equis, alijsq; animantibus plurimùm caput circumducentibus, unum continuum amborum secundæ uertebæ laterum est caput, & sinus quoque in prima ceruicis uertebra continuus apparet, capiti illi concinnè respondens. Hanc in hominibus inæqualitatem Natura subinde peculiari cartilagine corrigi, quæ præter cartilagine ossibus crustæ modo obnatas, sinum & capitulum intercedit, ac ligamentis in orbem articulum continentibus duntaxat adnascitur, & superius inferiusq; admodum uisoso humore, tanquam inegmate, oblinitur. In medio duorum secundæ uertebæ capitulorum, ex superiori corporis

Sinus prima  
uertebra, capi-  
tula secunda  
excipientes.

Capitula se-  
cunda.

Hic peculiare  
utrinq; lateris  
cartilagine non-  
nunquam à no-  
bis obseruatum  
depinximus.



f 5 fig. 11.  
C 6 fig. 12.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fig. 13.

sui regione, processus quidam insignis & altus, admodumq; solidus enascitur, quem quòd denti, ac potissimùm hominis canino assimiletur, *ὀδοντοειδὴς* & *ὀδόντης* Græci uocant: quo etiam nomine Hippocrates secundam uertebra nuncupauit, non autem (ut Iulius Pollux, & Cælius, dissectionum prorsus imperiti malè recensent) primā. Verùm alij hunc processum à turbinis, seu nucis pinei imagine, *κωνοειδὴς*, alij, quòd cuspidis pyramidis uel, aut etiam oliuæ nuclei modo extuberat, *πυρροειδὴς* & *πυρροειδὴς* appellarunt. Processus hic primæ uertebæ cavitatem subit, quam illic haberi scripsimus, ubi primæ uertebæ corpus deberet consistere, & ubi sinum illi insculpi scripsimus, qui cartilagine oblitus, anteriorem dentis partem læui & lubrico tubere capitulo uel prominulam excipit. Posterior dentis pars, è regione eius capituli posita, magis extuberat, crassiorq; est, quàm ubi primum is à secunda uertebra producitur. Hic enim utrinq; ad latera singulos sinus, & tertium in posteriori sede obtinet. Qui in dentis lateribus consistunt, unà cum primæ ceruicis uertebæ sinibus, qui ipsi respondunt, foramen utrinque parant, neruulo transmittendo aptum, quem interdum hæc in musculos collum flectentes procidere uidimus, secundiq; paris neruorum dorsalis medullæ furculum censemus. Sinus uerò in posteriori dentis sede conspicuus, in hoc exculpitur, ut ligamentum insigniter


Secunda uer-  
tebra dens.

Libro de Ar-  
ticulis.

Dēti cum pri-  
ma uertebra  
contextus.

validum ipsi firmitus obuoluatur, quod ab uno primæ uertebrae latere, in<sup>a</sup> interna ipsius sede, ad aliud transuerſim procedit, dentem accuratè in cauitate

Quamvis preſenti figura priuatim ſecundo libro ſit propria, illam tamen huc reſpoſui, quòd q̃ quæ hic traduntur intelligendus non mediocriter iuuet. Significatur itaq; abiter A, B, C, prima ceruicis uertebra. D & D ſecunda uertebra. G ſecunda corpus. H ſecunda uertebra dens. I teres ligamentũ a dens accipit uſq; inferius. K tranſuerſum ligamentum, dentem in prima uertebra ſtringens.



prima uertebra ſtringens.

mentum, quod occipitis ofſi ad<sup>a</sup> eam ſedem inferitur, quæ in anteriori parte foraminis dorſalem medullam tranſmittentis, aſpera leuiterq; extuberans cernitur, modiceq; inſertionis finem admittit<sup>e</sup> primi dorſum mouentium muſculorum paris. Eiufmodi itaq; primæ uertebrae cum ſecunda contextus perſicitur, qui uniuerſus capitis ſubſeruit motui, quo id ueluti ad axem unà cum aſſirmata tunc ipſi prima uertebra, ſupra ſecundā circũagimus. quæ in poſteriori præcipuorum capitulorũ, quibus primæ uertebrae articulatur, ſede leuiter<sup>r</sup>

exculpitur, ut cõmune cum prima uertebra<sup>r</sup> foramen utrinq; conſtituat, quo ſecundum dorſalis medullæ neruorum par primaria ſua portione in poſteriora labitur. Verũ maiorẽ huius foraminis partem prima efformat uertebra, inſigniter ſatis ad poſteriorem ſedem ſinum, quibus ſecundæ articulatur uertebra<sup>b</sup>, inſinuata. Reliqua in ſecunda ceruicis uertebra commemoranda, cæ

teris etiam quinque inferioribus uertebriſ magna ex parte ſunt cõmunia. Hæc enim ſimiliter atq; \* illæ, ſpinam obtinet: quæ hoc præuiatim in ceruicis uertebriſ ſibi uendicat, quòd ſuo mucrone<sup>e</sup> bipartitur, ac præcipuè ſecundæ uertebrae, triumq; ipſi ſubiacentium ſpinæ. Sexta enim uertebra admodum obſcuræ ſuæ ſpinæ diuiſionem oſtendit, atq; adhuc multo minus ſeptima. quæ priuatim hoc cum ſexta ſortitur, quòd ipſius ſpina plerunq; donetur appendice, ac procerius educatur, quodammodoq; ad ſuperiorum thoracis uertebRARUM<sup>e</sup> ſpinarum imaginem ſuo mucrone accedat. Superiorum uerò ceruicis uertebRARUM ſpinæ appendicibus carent, & latæ, inæquales, aſperæ, & (ut ita dicam) ramofæ, & inferiùs cauæ, & ſuperiùs gibbæ cernuntur. In ſuperiori dein ſede ſecundum ſpinæ longitudinem longa extuberrat linea, quemadmodum & ſede inferiori, ut ambæ educendo admittendoq; ſeruiant ligamento, quod ſpina

rum occupat interualla, dextroſq; ſpinis commiſſos muſculos à ſiniſtris dirimit. Cæterum diuiſionis in proceſſulos potiſſima occaſio, muſculi cenſentur, in poſteriori ceruicis ſede reſpoſiti. ut enim hi promptius principium ducerẽt, & ualidiſ quoq; in uertebRARUM ſpinas inſertionem noliſerent, ſpinæ etiam in proceſſulos dirimũtur. Atq; id Natura in his colli uertebrae peculiariter machinatur, quòd non adeò lōgas ſpinas à paruiſ illis uertebriſ, atq; à thoracis lumborumq; uertebriſ producere tutum fuerat. Deinde maior muſculorum copia, eaq; admodũ uaria, in ceruicis poſteriori ſede, quàm in alijs dorſi partibus collocatur: quemadmodũ ubi muſculos ſcapulas, thoracem, caput & dorſum mouentes perſequar, auditurus es fuſiſſimè. Porrò muſculorum etiam gratia, ſecundæ uertebrae ſpina proceriùs, quàm aliquot ipſi ſuccedentes ſpinæ, exierunt, cæ-

Foramen, ſeu ſedem par dorſalis medullæ neruorum in poſteriora tranſmittens. Spina ſex huiusmodi ceruicis uertebRARUM.

q 3 fig. K.

r 3, 11 fig. O, O.

s 5, 6 fig. n.

t 10, 11 fig. r.

u 1 fig. G.

x 1 muſc. tab. A, B.

y 6 fig. P.

z 11. r.

a 3 fig. e. d. 11 lib. 4. l.

b 4 fig. q.

c 5, 6, 7 fig. g. i. r. f.

n 9 fig. t.

o 8 fig. cha.

d 8 fig. m.

e 1 fig. e. d.

16 N, O, P.

Hee erunt

obuia, ſi 7

fig. ſpina

cum ſpinis

cæterarũ ſi

gurarũ con

tuleris. aut

N. O. P. ob

ſerues 1, 2 ſi

gura capiti

16.

f 14. mifc.  
tabul. A, B.  
g eadē tab.  
bulā, K. L.

tur, cæterisq; latior & crafsior uifitur, quòd fcilicet hæc priuatim<sup>1</sup> tertio mufculorum caput mouentium pari, &<sup>2</sup> fexto quoq; principium præbeat. Ne tamen Natura iniuftè ex gracili uertebra prolixiorē latioremq; educeret fpinam, ipfa fecundam aliquot fibi fubditis grandiorē effecit. quanquā id non tam fpinæ producendæ gratia, quàm ut fecunda articulationi abundè fufficeret, quam cum prima molitur uertebra. Atque hoc illud eft, quod antea innuimus, Naturam femel ac iterum fuperiorem uertebra in inferiore maiorem creaffe. Secunda enim crafsior, & maior ualidiorq; eft tertia: dein primam uel tranfuerforum proceffuum occafione, omnibus ceruicis uertebreis latiorē effe, fuprà docuimus. Cæterum tranfuerfi proceffus in reliquis colli uertebreis non admodum exporriguntur,<sup>3</sup> & in primis fecundæ uertebre, cui breuis & simplex utrinq; tranfuerfus obtigit proceffus. Videtur autem is in fecunda uertebra minus quàm in alijs prominere, breuiorq; effe, propter huius uertebre capitulorum, quæ primæ finis fubeunt, amplitudinem, crafsitiemq;. Insuper ea capitulorum amplitudo in caufa etiam eft, foramen quo tranfuerfus fecundæ uertebre proceffus perforatur, non rectè, fed obliquè exculptum uideri, fexus atq; in prima ceruicis uertebra,<sup>4</sup> & quinq; fecundæ fubiectis, quarum tranfuerfus proceffus recto amplitudine; foramine peruius eft, à quo folè ceruicis ornantur uertebre, ut uenam arteriamq; furfum ducant, quæ dorfali medullæ, ac tandem ipfi cerebro fanguinem fpiritumq; deriuant. Præterea quatuor uertebre, quæ ftatim fecundam fequuntur, hoc etiam peculiariter fibi uendicant, quòd illorum<sup>5</sup> tranfuerfi proceffus ampli & bifidi funt: non tamen, ut earundem fpinæ, afperi & inæquales. Tranfuerfi enim proceffus, forma inuicem refpondent, & interior ipforum pars femper latior eft, elatiusq; ipfa pofteriori effertur. Spinæ autem partium impar in omnibus quafi uertebreis eft forma, & illæ perpetuò uarijs modis protuberant & exafperantur. Quamuis interim hæc tranfuerforum proceffuum amplitudo ac bipartitio eadem ratione accidat, qua fpinæ bifidas effe, prius relatum eft, nimirum mufculorum in primis ortus infertionisq; gratia. Vt enim alios huius fedis præteream mufculos, utrinq; tranfuerfis uertebrearum proceffibus priuatim<sup>6</sup> duos cõmitti, in fecundo libro fcribemus, quorum beneficium collum, & pofttea fecundario motu caput in latera ducuntur. Hi mufculi in utroq; latere ita collocantur, ut unus anteriori tranfuerforum proceffuum fedi, alter uerò pofteriori afcribatur. Septima interim ceruicis uertebra tranfuerfos proceffus (qui canibus & fimijs rarò perforantur) latos quidem obtinet, at admodum obfcure bipartitos. Quum enim ampli proceriq; funt, nulla incumbit neceffitas, eosdē quoq; bifidos fieri, præcipuè quando mufculi collum in latera ducentes, non ad eò ualidè feptimæ ac cæteris committantur: quòd hæc obfcure, non fecus quàm thoracis uertebre, in latera moueatur. ° Afcedentes<sup>7</sup> defcendentesq; proceffus, quibus uertebre mutuò articulantur, in omnibus ceruicis uertebreis fecundæ fubiectis fibi fimiles funt: & fecunda quoq; defcendentes proceffus obtinet, aliarum proceffibus non difsimiles. Qui itaq; deorfum fpectant, & fubditā admittunt uertebra, orbiculari finu ab anteriori fede infigniter obliquè deorfum in pofteriora ducto, & nihil minus quàm altè cælato incifo ue, ornantur. Afcedentes uerò proceffus, qui incumbenti immittuntur uertebre, capitulum orbiculare habent, quod ad eò leuiter fuperficietenusq; extuberat, ut ignoret finuum ne id, an capitum numero afcribere debeas. Hoc capitulum afcedentium proceffuum finui congruit: & cartilagine perinde ac finus incruftatum, ab anteriori fede deorfum in pofteriora admodum

Secundam uertebra aliquot fibi fubditis maiorem effe.

Tranfuerforum ceruicis uertebrearum proceffus natura.

Foramē tranfuerforum proceffuum.

n 8 mifc.  
tab. alter C  
notatur. 14  
autem tab.  
alter N.

o 9, 11 fig.  
12, 13, 14  
p 6, 7, 9  
11 fig. 7.

Afcedentium & defcendentium proceffuum natura.

Retire obliquum ductum ab a ad b.



admodum etiam oblique fertur. id quod non obiter cōsiderandum est. Nam obliquus ille ductus in ceruicis uertebreis, quæ thoraci propiores sunt, minor semper, ac secundum corporis longitudinem rectior euadit, quod illæ uertebre non ad eodē laxè ac superiores moueri, atq; ob id etiā non tam laxè articulari debeant. Verum Natura non solum his uertebreis laxiores communicauit articulos, sed ut collum promptius omnino quàm reliquæ dorsī partes, insigni usu moueri possit, ipsa aliud insuper colli uertebreis priuatim elargitur. Quum enim uertebrearum thoracis & lumborum corpora inuicem planis minimeq; extuberantibus committantur superficiebus, ad eum modum, quo duo ampli asseres mutuo incumbunt, Natura inferiorē ceruicis uertebrearum corporis partem oblongam, capitūq; alicuius articuli ad motum euidentem facti ritū, extuberare uoluit, ac superiorē corporis uertebrearum partem aniplo sinu ita excauauit, ut oblongum superioris uertebre corpus in hunc subditæ uertebre sinum ingreditur, uertebrearumq; cōpago ad motum, potissimum uerò lateralem, & qui uersus humeros fit, promptior cōsurgat. Atq; hæc compago, quæ etiam, ut in thorace & lumbis, cartilaginei, & impese crassi, pulchreque uicissim cedentis & assurgentis ligamēti perficitur interuentu, in secundæ uertebre cum tertiæ, & deinde in aliquot subiacentium uertebrearum corporibus magis est conspicua. Colli autem septimæ, primæ thoracis quasi omnino plana innititur superficie, ac etiam ipsius corpus elatiori sedē non ad eodē atq; superiorum uertebrearum excauatur: idq; præcipuè accidit, quod superiores laxius inferioribus moueri, ex usu sit. Quod uerò secundæ uertebre corpus in anteriore sede non planum reliquorum ceruicis uertebrearū corporum modo uisitur, at tubere secundum longitudinem ducto, amplioris lineæ forma eminet, & utrinq; ad eius tuberis latus deprimitur, musculi illi in causa censendi sunt, qui collum flectentes, & hac sede coeuntes, in istam uertebre corporis formam ualidius inferuntur. Verum quum tertia ceruicis uertebra secundæ subiacet, & utriusq; lateris collum flectēs musculus supra hanc etiam inferatur, non mirum est, anteriorem corporis tertiæ uertebre faciem secundæ uertebre non nihil esse cōsimilem: imò dictorum musculorū occasione anteriore omnium ceruicis uertebrearum sedem ueluti compressam, non autem ut thoracis lumborumq; uertebrearum, semicirculi, aut potius nostri C instat, protuberantem uideri. Quæ quum ita se habeant, neminem latet, omnibus ceruicis uertebreis non eundē processum obtigisse numerū. Ne autē aliquid hic prætermisissē uidear, necessum fuerit uel Galeni nomine, alicuius uertebre ceruicis processus ita recēdere, ut undecim numero in illis processus adinuenias: totidē namq; his uertebreis à Galeno ascribuntur. Assumito itaque tertiam, aut quartam, aut quintam, aut sextam colli uertebream, ac primum duos numerato processus in superiori corporis sede, utrinq; uidelicet unū ad latus cavitatis, cui incumbentis uertebre oblongū corpus infidet. tertium autem & quartum recense duos ascendentes processus, qui incumbentem subeunt uertebream. quantum uerò & sextum, duos descendentes, quibus subditæ uertebre ascendentes processus excipiuntur. Porro septimum, octauum, nonum & decimū, numerabis transuersos processus: qui quum utrinq; sint singuli, ac illi rursus gemini bifidiq; cerantur, quatuor cōstituunt processus. undecimus erit ipsa spina. Verum quum uertebre, quibus geminus utrinq; transuersus accidit processus, spinam quoq; bipartitā gerant, nihil obstitit, cur minus hic duodecimū quoq; singas, Galeni numerū aucturus. Itē quia oblongū uertebre corpus inferiori sede processu modo quoq; educitur, quid prohibebit, & id pariter decimū tertij processus loco,

Corporum ceruicis uertebrearum cōtextum.

Hic confer ceruicis uertebreas, thoracis et lumborum uertebreis fig. cap. 14.

q. 9 fig. 1. et 9 fig. 1. r. 9 fig. 4. l. n. Nonne autē figuræ numeri 1, 2.

\* fig. cap. 14. R. R.

1, 10 fig. 2, 4, 4.

t. 8 musc. tab. A, B.

Processuum numerus.

Lib. 13. de rsu partium.

Observato hic 8 figuram, cuius numeri processus seriatim denotant.

u. 8 fig. 3, 4.

x. 8 fig. 5. et 8 fig. 6.

loco, cæteris adijcere? Quodd autem in prima cervicis uertebra, & secunda, septimaq; alius processuum obseruetur numerus, isq; adhuc uariis, citra negotium ex his quæ hæcenus scripsimus, promptè colligitur. Foramina in uertebRARUM lateribus, nervus à dorsali medulla transmittendis, & uenis quoq; ac arterijs ad illam admittendis parata, eadem serie sub secunda cervicis uertebra ad sacrum usq; os cõstituuntur. Inter latus enim posterioris sedis corporis uertebrae, & ascendentes descendentesq; processus, sinus quidam<sup>a</sup> supra<sup>a</sup> infraq; in ambobus lateribus exculpitur, qui cum proximæ uertebrae sinu commune foramen efformat, quo nervus profilit. Verùm sinus isti in omnibus uertebRIS non pari se habent modo: in cervicis enim uertebRIS semicirculus in superiore uertebra, & semicirculus in inferiore exculpitur, utraq; uertebra parè operam ad foraminis constitutionè præstante. Aut si quis adamussim singula excutiat, inferior uertebra in ceruice paulo maiorem portionem foraminis constituit, ipsa superiore.<sup>b</sup> Sinus enim in superiore uertebrae parte, inter processum ascendentem, & processum quem elatior corporis uertebrae pars producit, exculptus, profundior est<sup>c</sup> sinu qui<sup>d</sup> inter descendentem processum & corpus uertebrae cælatur. In lumborum uertebRIS contraria est ratio: superior enim uertebra superiorem foraminis sedem lateraq; efformat, inferiore interim uertebra duntaxat inferiore foraminis partem, seu ueluti tertiam solum circuli portionè, constituente. Sinus enim in illis uertebRIS inter corpus ac descendente processum exculptus, multis numeris eius cauitatem superat, qui in superiore uertebrae parte inter corpus ipsius & ascendente processum occurrit. Thoracis autem uertebrae medio se habent modo: quæ enim ex illis collo propius accedunt, colli uertebRIS hoc neruorum foramine respondent: quæ iuxta lumborum uertebRAS consistunt, lumborum etiam uertebRIS in foraminis forma alsimulantur. Quamobrem uerò Natura, in alia sede neruorū foramina<sup>e</sup> inter occipitis os & primam uertebRAM, ac rursus<sup>f</sup> inter hanc & secundā cælauerit, quàm in reliquis uertebRIS, cuius obuiū esse arbitror, qui primæ uertebrae cum capite, & eiusdem uertebrae cum secunda, articulorū compagem sedesq; intellexerit. Hæc namq; liquidò cõmonstrant, in lateribus articulo occupatis, uertebRAS illas insculpi ne uiquā potuisse, nisi prorsus infirmum inualidumq; Natura hic fecisset contextū, & mutuo ossium in alsiduis motibus affrictu, neruos rumpi uitariq; cupiuisset. Qua uerò providentia hæc foramina<sup>h</sup> in sacro osse exculpsit, in eius ossis historia percurrā. Cæterum quod ad præsens Caput adhuc spectat, colli uertebrae aliud nihil sibi priuatim asciscunt. Nam etsi illarum uertebRARUM secundam sequentiū corpora superius inferiusq; & ipsius etiam secundæ corpus infra appendices in minoribus natu ostendant, id quoq; omnibus thoracis & lumborū uertebRIS commune est. Quemadmodum & uertebRAS non uno osse in puerulis efformari, omnibus commune est uertebRIS. Prima enim cervicis duobus constat ossibus, inuicem appendicū more commissis, ubi primæ<sup>i</sup> anterior pars consistit, &<sup>k</sup> quæ aliæ in spinam exacuntur. Reliquæ autem cervicis & thoracis & lumborum uertebrae, præter appendices, tribus extruuntur partibus. Vna enim linea cartilagine oppleta, à foramine dorsali medullæ parato ad spinæ usq; apicem pertinet. Aliæ autem duæ ab eodem foramine productæ, corpus uertebrae à duobus transuersis processibus, reliquisq; uertebrae posterioribus partibus dirimūt. Cæterum in ætate paulo prouectioribus, hæc ossium frequentia aboletur: appendices tamen etiam uigoris tempore aliquando non ita difficulter distinguuntur. In senibus autem non solum appendicum connexus obliteratur, uerum uertebRARUM corpora aliàs

Foraminū neruos in latera transmittentia natura.

In colli uertebRIS.



In lumborum uertebRIS.



In thoracis uertebRIS.

VertebRARUM appendices.

VertebRAM in pueris pluribus constare ossibus.

VertebRARUM in senibus nexu.

7 fig. cap.  
14 Q. Q.

z 8. 9. 10. 11.

a 7 fig. r.

b 8. 9. 10. 11.

c 9 fig. in-

ter d 7 fig. r.

d 7 fig. r.

e 7 fig. in-

ter f 7 fig. r.

f 2 fig. ca.

11 lib. 4. H.

7 fig. F.

g 2 fig. ca.

11 lib. 4. N.

7 fig. l.

h 2 fig. ca.

11 lib. 4. chd

rad. 25. ad

30 48. 7.

3 fig. B. ad

50.

i 2 fig. M.

3. 4 fig. L.

rad. 25. ad

30 48. 7.

l prima li

nea, in 7 fi.

à foramine

illico p̄s du

cretur. se-

cūda autem

7 teria à

foramine

per 7 et 7.

magno intervallo ob<sup>m</sup> cartilaginei ligamenti interuentum difsita, adeò coale-<sup>117 fig. cap.</sup>  
fcunt, ut modò tres, modò quatuor uertebras in illis ita còcreuiffet, ac fimul in  
cœmiterijs effodi uideas, ut inuicē diuelli nequeant. Coalitus ifte quorundam  
tempore pronafcentium proceffuum fit interuentu, quos corpus unius uerte  
bræ ab externa ipfius fuperficie in aliud producit. Cæterùm coalitum hunc in  
caufa effe, cur minus dorfum moueant fenes, & quòd nequaquam dorfum ex  
tendant, ipfìq; magis incuruentur, neminem ambigere reor, præcipuè fi quis  
aliquando gibbofi uertebras infpexerit, hafq; incuruatas, quodammo dōq; lu  
xatas, fuisq; corporibus pertinaciffimè unitas. Quamquam ad hæc, difficilem in  
fenibus motum augment offium fuperciliorum mira afperitas, & offium tubercu  
la, quæ capita in fuis finibus moueri prohibēt. Poftremò & infignis ligamen

*Qua hoc Capiti  
te Galeni scri  
ptis paria con  
uenerunt.  
Lib. 11. de Ufu  
paruum. 4. de  
Adminiftr. dif  
feft. lib. de Offi  
bus, cap. 8.*

torum durities prompto uertebrarum motui obftat. Huic Capiti modò finem imponerem, fi in ceruicis uertebrarum hiftoria mihi proffus cum Galeni fcriptis conueniffet. nam ut pleraq; taceam, quibus Galenum ex primæ uertebræ tranfuerforum proceffuum amplitudine, ex uijs ramos primi paris & fecundi dorfalis medullæ neruorū tranfmittētibus, ex feptimæ uertebræ tranfuerfi proceffus perforatione, eiufmo dique non paucis, fimias potius & canes, quàm hominem in illis uertebris defcripfiffe, leui negotio oftenderem, ne utiquam prætereundum eft, Galenum de capitis fupra primam uertebram, & primæ uertebræ fupra fecundam, & dein reliquarum ceruicis uertebrarum motibus, longè fecus ac ego fentire. Quinimò id tanto diligentius uenit expendendum, quāto maiori ftudio Galenus, diligentem & eruditum folertemq; & induftrium requirit auditorem, qui ea capere poffit, quæ in duodecimo de Partium ufu libro, de capitis motibus pertractat. Quid multa? tam paucos quæ inibi docentur aflequuturos contendit, ac uelut rei difficultate lectorem, eumq; in primis qui in Mathematis & demonftrandi methodo parum eft exercitatus, ita deterret, ut nemo non conari debeat ipfius fensa eruere, ac deniq; num ex merito ab illis tantopere declinem, hunc in modum mecum obferuare. Galenus capiti duos motus afcribens, unum in annuendo renuendoq; alterum in latera fieri docet. ac prioris quidem loco eum habet, quo caput antrorfum fleftimus, inclinamus, annuimusq; , ac deinde quo caput retrorfum reflectimus, & reclinamus, ea proffus functione, qua Thraces & Cretenfium plerique hac etiam ætate abnuunt. Illi enim abnuètes, in pofteriora caput rectà remouent, fubleuant ue: non autem ut nos, id circumagunt, feu circumducūt. Cæterùm altero motu Galenus illum fubaudit, quo caput in latera inclinamus, ac ueluti humeris feu fcapulis admouemus. Quòd autē hæc de laterali motu, atq; adeò de renuendo annuendoq; ipfius fit fententia, ex quarto de Adminiftrandis fectionibus libro doceberis, fi modò accuratè expendas, quo fitu Galenus occipitis offis capitula, quæ primæ uertebræ inarticulantur, locari, affurgere, innitiq; afferit, quum in hoc illud ue latus caput agitur, & quum ex Galeni placito renuimus annuimus ue: qui priorem motum, qui annuendo renuendoq; fit, fecundæ ceruicis uertebræ beneficio, aut fupra fecundam perfici affirmat: pofteriorem uerò, quo caput in latera ducitur, fupra primam ceruicis uertebræ fieri ait: quemadmodum cū ex pluribus ipfius locis, tum præcipuè ex quarto de Adminiftrandis fectionibus libro colligere promptiffimum eft. Vt enim illos libros omnium poftremos fcripfit, ita quoq; fuam fententiam & breuius & apertius in illis, quàm aliàs, explicuit. Num uerò hoc eius placitum ueritati fit confonū, ipfe nunc mecum inquirito: aliter multo quàm Galenus, capitis motus conftituens. Caput itaque aut primario motū quiefcente collo mouemus, aut fe-

*Galeni de capiti  
motibus fententia.*



aut secundo, quoniam scilicet caput colli motum sequitur, etiam si id in aliam partem, quam collum mouetur, ducere coneris. Proprii capitis motus duo sunt. priore id antrorsum flectimus, retrorsumque inclinamus, extendimus uel: quem motum conficis aut rigido immotoque collo, aut collo etiam simul moto, siue id pari motu cum capite agas, siue contrario. Quamuis enim in anteriora collum ducas, caputque necessario collum insequatur, nihilominus tamen caput proprio motu in posteriora possis reflectere, & unâ promptè obseruare, collum & caput seorsum proprios & priuatos in flexu reflexuque motus obtinere. Alter proprius capitis motus, is censendus est, quo caput ita quodammodo circumducimus, in gyrum uel agimus, ac rota ad axem reuoluitur, quemque etiam quiescente collo obibis, si modò dextra, modò sinistra uicissim intueri studueris, caput uel circumueneris. Præfens motus capiti omnino est proprius, & collum illo destituitur. unde etiam quocumque modo collum moueris, hic capitis circumactus commodè perficitur. Flexo enim collo, capiteque cum illo inclinato, id faciliè in gyrum ducis. sic etiam, si collum fuerit extensum, aut in latus humero admotum, caput promptè circumagis. Cæterum ut caput uno motu, qui circumactu fit, priuatim donatur: ita collum quoque peculiarem motum, quo in latus ueluti ad humeros ducitur, sibi uendicat. Caput enim nullum proprium obtinet motum, quo in latus inclinatur, sed colli tantum beneficio, motuque secundo illuc fertur. Nobisque denegatum est, caput huic illi uel scapulæ uel minimum, nisi collo illuc ducto, ad mouere. Duobus itaque propriis motibus caput donatur: quorum priorem, qui flexione ac reflexione perficitur, capitis cum prima ceruicis uertebra, articulorum beneficio, celebrari diximus: uti posteriore motum, quo caput in gyrum agit, supra secundam ceruicis uertebam, uelut ad axem confici, relatum est. Mea itaque sententia duplicibus capitis cum prima uertebra articulis caput flectitur & extenditur, seu antrorsum retrorsumque rectissimo motu ducitur. Nulla autem ratione illorum articulorum ope in latera fertur, quamuis id Galeno tot locis sit proditum. Immo toto namque collo, caput ne tantillum quidem in latera mouere possumus. Et, si caput supra primam uertebam in latus ageretur, quis ambigit, in eo motu primam uertebam debere immotam seruari? si modò in motu alterum articuli os oportere quiescere, Aristoteles in libro de Communi animalium gressu, rectè demonstrauerit. Præterea, quoniam primæ uertebæ cum capite articulationes sint eiusmodi, ut ne minimo quidem temporis momento paruum exarticulationem ac luxationem sustineant, quin homo mox respirationis expers, mutus, & absque motu & sensu, tanquam affecta neruorum radice, reddatur, qui poterimus cum Galeno Naturæ tantam imponere oscitantiam, ut fateamur eam in dignissimis totius corporis articulis ita dormitasse, ut necessum sit, ossis quod mouetur caput, ex sinu, cui aliàs inarticulatur, ita debere subleuari, ut sinum non amplius cōtingat, ipsique non aliqua ex parte ita firmetur & insistat, ut reliqua omnia ossa penitus ex suo sinu neutiquam in concreditis ipsis motibus abscedere dehiscere uel nouimus? Galenus namque caput supra primam uertebam in latus duci arbitratus, in quarto de Administrandis dissectionibus asserere coactus est, capite in dextrum latus ducto, dextrum tunc occipitij ossis capitulum in dextrum primæ uertebæ sinum stringi, sinistrum uero capitulum ex sinistro sinu assurgere: & contrā, si quando caput in sinistrum latus inclinatur. Non igitur huic gemino capitis cum prima uertebra articulo motum in latus, sed simplicem flexum & reflexum tribuamus: & in Galeni excusationem haudquaquam studeamus hic comminisci, ab illo motum in latera

*Alia quæ  
Galenus de capi-  
tis motibus sen-  
tentia.*

*Caput supra  
primam uerte-  
bram flecti &  
reflecti, non au-  
tem in latera,  
aut aliter duci.*

intellectum, quem ego in gyrum & circumactu fieri dico: neque etiam illum motum supra primam uertebam fieri, cum Iulio Polluce concedamus. Præter id enim quod Galenus illum motum minimè lateralis motus loco habuit, quis adeò stupidus est, ut duo oblonga occipitis ossis capitula mutuò distantia, & duos primæ uertebre sinus altos, seu profundos, & similiter oblongos, ac ab inuicem lato intervallo diductos subeuntia, circumagi posse autemet? Quis enim unquam circumum utriq; cruribus asseri infixum, circumduci animaduertit? Neque est quod quis Galeno patrocinator, occipitis capitula sibi depressa plana; cōfingat, hacq; ratione caput supra primam uertebam circumagi posse contendat. quum Galenus inter reliqua ossium capita, *κροτάριον* nomine uix ulla unquam dignatus sit, præter hæc occipitis ossis capitula, quæ passim *κροτάριον* (sed non rectè admodum) uocat, eo nomine raros, qui in canibus potius quàm hominibus occurrunt, ossis occipitis capitulorū mucrones. Quod uerò ad primæ uertebre cum secunda contextum attinet, neutiquam cum Galeno annuere possum, caput quouis tandem pacto illius auxilio flecti, & in posteriora reclinari. Quandoquidem si singula in horum ossium fabrica perquisiueris, secūda ceruicis uertebra tibi trabem referet, cui terræ infosso axem infigimus. Ipse autem dens, axis erit: prima uerò uertebra (cui caput in hoc circumactus motu, ac si cum illa unum idemq; esset corpus, iungitur) trabi assemilabitur ad axem reuoluto. Dein ligamētum denti transuerlim obductum, abundè commonstrat primam uertebam nequaquam super secundam flecti, si modò quieto dente, prima uertebra antrorsum retrorsumq; in flexu mouenda esset. Quis enim ambigit, ligamentum id dentem in primæ uertebre cavitare cōtinere? & illi non tantam laxitatem (etsi Galenus ipsi eam tribuat) ascribi posse, ut primam uertebam adeò à dentis contactu in anteriora ferri sinat, ut caput iustum experiatur flexum? Porro iam duo apud Iulium Pollucem nomina mihi succurrunt, quorum unum primæ accomodat uertebre, alterum secundæ. ac prima quidem *ὠδιστορεὺς*, secunda uerò *ἄξων* ipsi nuncupatur. Hæc nomina proculdubio à ueteribus manarunt, qui pueros in Anatome exercebant, hoc quidem nomine uertebram uolentes innuere, ad quam uelut ad axem alia circumuertitur: illo autem uertebam, quæ tanquam ad axem circumuoluitur. Quod uerò à ueteribus ante Galenum hæc nomina usurpata existimem, præter poetas, Celsus mihi autor est, qui, tamen si ipsius codex, ubi ceruicis explicat uertebbras, uitiatus sit, ipseq; minimè à se intellecta uerterit, at tamen à ueterum quopiam eam sententiam assumpsisse uidetur, quæ meæ ac ipsi deniq; ueritati est proxima. Quod autem Natura flexum tantum & reflexum, non uerò insuper alios duos motus, quorū alter in latera, alter in gyrum circumactus; sit, supra primam uertebam perfici uoluerit (quemadmodum brachium & femur triplici motuum differentia aguntur) hinc potissimum factum ducito, quod primam uertebam magis ampliusq; quàm reliquas omnes, dorsalis medullæ causa, perforari operæ precium fuerit, quodq; ob id unduntaxat rotundus ampliusq; sinus in illa efformari nequiuert, neq; etiam occipitis os foraminis sui occasione in unum tantum grande caput extuberare potuerit. quod in illo primæ uertebre sinu, perinde ac femur in coxendicis ossis sinu, omni motus specie ageretur. Quum itaque duplici articulo, dextro nimirum & sinistro, caput iungendum erat, omnisq; propemodum duplex articulus simplici solum motui (quum ille insignis est) famuletur, meritò Natura caput supra primam uertebam flecti ac reflecti uoluit. Nam supra hanc in latus moueri haud potuit: nisi Natura hic sui oblita, unum occipitis ossis capitulum

Non semel in libro de Ossib. et 4. de Admin. digest.

Supra secundam uertebam caput cum prima uertebra circumagi, neutiquam uerò flecti & reflecti.

Lib. 1. de Usu partium.

Non potuisse caput supra primam uertebam in latus duci, neq; etiam circumagi.

pitulum in uno uertebrae sinu stringi, aliud uerò capitulum egregiè attolli, ac à prima uertebra prorsus disiungi cupiuisset: quæ aliàs semper studet, ut articuli ossa mutuò sint contigua, neq; ab inuicem abscedant, & nescio quam uacuum à Galeno confictam sedem statuant. Præterea minus adhuc caput in gyrum supra primam uertebra[m] moueri potuit, nisi Natura acutum processum in capitis amplitudinem, qua cerebrum cõtinetur, à prima uertebra produxisset, ad quem caput perinde ac ad axē uolueretur, ac deinceps alia quàm plurima nunc concinnè efformata, uitare proposuisset. Super secundam itaq; uertebra[m] caput summo artificio in gyrū mouetur. si enim flecteretur, dens dorsalem frangeret medullam. Quum enim quiescente dente, prima uertebra deorsum duceretur, posteriori sede sursum eleuata: tunc dorsalis medulla in primæ uertebrae foramine prorsus coarctata, compressaq; abrumperetur. Dein prima uertebra supra secundam retrorsum nullo modo reflecti posset, nisi prima in anteriori sede, qua dentem continet, prorsus exculperetur: primaq; tunc uertebra à dente non præpedita, retrorsum liberè duceretur. Adde, caput neutiquam in latus supra secundam moueri potuisse: eadem ratione qua probauimus, lateralem motum supra primam nequiuisse fieri. Aliàs enim necessum esset, primam uertebra[m] in altero latere à secunda plurimū attolli, quod periculum nunc in circumactu non impendit. Lateralem itaque motum Natura non uulgari industria omnibus ceruicis commisit uertebra[s], quæ singulæ seorsum in latus moueri nequeunt: uerū simul omnes succedentibus motibus illuc adedò concinnè inclinantur, ut caput secundo motu in latus citra omnem noxam ipsarum auxilio commodè feratur.

Lib. 4. de Ad-  
missis. dissect.

Non potuisse ca-  
put super secun-  
dam uertebra[m]  
flecti, et refle-  
cti, neq; etiam  
in latus incli-  
nari.

Quibus uerte-  
bris motus late-  
ralis commissa  
tur.

## DE THORACIS VERTEBRIS.

Caput xvi.

PRIMA XVI CA. SECUN-  
DÆ FIGURA.

TERTIA.



12 QUARTA.



## QUARTA.



QUATVOR DECIMISEXTI CAPITIS FIGURARUM, & earundem characterum Index.

*DE DECIMA* thoracis vertebrarum eas hic delineauimus, quas ostendenda illarum descriptioni sufficere duximus. Prima enim figura unam ex medijs thoracis uertebreis anteriori parte delineatam ostendit, cui decem superiores thoracis uertebrae fere correspondent.

Secunda, eandem uertebra, quae prima explicatur figura, posteriori facie spectandam offert.

Tertia figura, thoracis undecima uertebra posteriori facie ostenditur.

Quarta, duodecimam thoracis uertebra posteriori facie expressam continet.

*A* 1, 2, 3, 4 In omnibus figuris *A* obseruatur, superiorem corporis uertebra partem notans, cui inferior imagine corporis respondet. *Φ* uero in tertia figura positum, appendicem notat superiorem corporis uertebrae, quae adhuc post ossum coctionem & emundationem fere relinquitur, & in humiliori corporis sede aliam habet sibi similem.

*B* 1 Medium eius sinus, quem duabus uertebrae corporibus communem esse dicimus, cuius costa radix inarticulatur.

*C* 1 Eiusmodi sinus pars in inferiori uertebrae corporis sede sculpiuntur, quae tanto minor est superiori parte *B* insignita, quanto communis sinus costa articulanda paratus, ad subiacentem uertebra magis quam ad superpositam pertinet.

*D* 3 Sinus undecimae uertebrae, cui undecima dextri lateris costa inarticulatur.

*E* 4 Sinus duodecimae uertebrae, cui duodecima dextri lateris costa coarctatur.

*F* 4 Sinus asper & profundus, ex quo ligamentum producit, duodecimam costam suae connectens uertebra.

*G* 2, 3, 4 Asperum foramen, posteriori uertebrae corporis sedi, quae dorsalem medullam respicit, incisum.

*H* & *I* 1, 2, 3, 4 Transuersi processus uertebrae thoracis.

*K* 1 Sinus in apice transuersi processus, cui costa articulatur, conspicuus.

*L* 1 Sedes transuersi processus, quam gibbam esse dicimus.

*M* 1 Sedes transuersi processus caua.

*N*, *O*, *P* 1, 2 Spina, seu posterior processus, ac in secunda quidem figura superior spina exprimitur sedes, in qua *N* & *O* & *P* tres lineae notant, triangularem figuram simul constituentes. & interuallum inter *N* ac *O* una est superficies superior, & aliud interuallum inter *N* & *P* altera est superficies superior. Verum prima figura tertiam spinae superficiem notat, quae inferior est, ac inter *O* & *P* consistit. Quod autem iuxta *N* in prima figura non umbratum cernitur, alterius superiorum superficialium est portio.

*Q* 1 Linea in tertia superficie extuberans, quae aspera & inaequalis est.

*R* 3 Spina undecimae thoracis uertebrae.

*S* 4 Spina duodecimae thoracis uertebrae.

*T*, *U* 1 Uertebrae thoracis, quae supra duodecimam consistunt, ascendentiū processuum anterior sedes.

*X*, *Y* 2, 3 Ascendentiū thoracis uertebrae processuum posterior sedes, quae illi processus extuberant, & cartilagine inculantur.

*a*, *b* 2, 3 Descendentiū thoracis uertebrae processuum exterior sedes.

*c* 1 Hic uidetur dextri descendentis processus anterior sedes, quae cartilagine obdusa sinatur.

*e*, *f* 4 Ascendentes duodecimae thoracis uertebrae processus, undecimam subeuntes uertebra.

*g*, *h* 4 Descendentes duodecimae thoracis uertebrae processus, qui ascendentiū primae lumborum uertebrae processuum, sibi inarticulantur.

THORA-

a fig. cap.  
12 C, D. in  
tegra fi. K  
ad L. Dein  
totius uerte  
brarū con  
textus 1, 2  
fig. cap. 19.



HORACIS uertebrae numerantur<sup>a</sup> duodecim, prae-  
terquam quod aliquando, tametsi raro, aliquibus uel deest  
una, uel superest. Sed deesse rarius, quam superesse, inueni-  
tur. Non semel namque tredecim thoracis uertebrae mihi  
occurrerunt, quum interim haecenus undecim tantum  
nunquam uiderim. Neq; etiam lumborum ceruicisq; uer-  
tebrarum numerus tam crebro, atq; thoracis, excedit, quę

Plurimū duodecim thoracis  
esse uertebrae.

etiam omnibus suis partibus inuicem minimē correspondent. Primū enim  
ipfarum corpora tantum magnitudine inter se<sup>b</sup> discrepant, quantum una, alia  
collo est uicinior. atque ita primae thoracis uertebrae corpus magnitudine ad-  
modum duodecimae corpori cedit. <sup>c</sup> Deinde corpus primę, superiori suae sede,  
qua septimae ceruicis cōnectitur, non omnino planum est, sed modicē utrinq;  
ad latus extuberat, ceruicisq; uertebra<sup>d</sup>rum corpora obscurē imitatur. Inferior  
autem sui corporis pars, plana constat superficie, uti & inferior superiorq; om-  
nium thoracis uertebra<sup>e</sup>rum corporum superficies. Nullum enim thoracis uerte-  
brarum corpus inferiori parte, uel leuissimē deorsum exeritur, inq; subsequen-

Qui carū se ha-  
bent corpora.

b c Hanc  
molis diffe-  
rentia ostē-  
dit 1 fig. in  
tegrarum,  
ac fi. ca. 14.  
d 9 fig. ca.  
15 7, 11, 16.  
e 1, 2, 3 fi.  
A.

f 8 fig. ca.  
15 f. 7 9  
fig. f.

tis uertebrae corporis sinum<sup>f</sup> (ceruicis uertebra<sup>g</sup>rum ritu) definit. Vt cun-  
que etiam aliter Galenus attestetur, parem quasi articulationē thoracis uertebri-  
tribuens, quam praecedente Capite ceruicis uertebra<sup>h</sup>rum corpora moliri do-  
cuimus. Ad haec, primae secundaeq; thoracis uertebrae corpus non adeo ante-  
riori parte orbiculatim prominet, ac reliquarum thoracis uertebra<sup>i</sup>rum cor-  
pora, quae multo magis quam supremarum corpora ad femicirculi, seu potius  
literae C conuexi imaginem accedunt, proceriusq; in thoracis cauitatem pro-  
tuberant. Videntur enim duae superiores thoracis uertebrae, ceruicis uertebra-  
rum modo, in anteriori corporis sui sede depressae, multoq; magis conuexum  
semiparenthesis (, quam C exprimere. Quod ipsis priuatim cum articulatione  
laxo motui aptae gratia, tum<sup>g</sup> musculorum collum flectentium occasione  
euenit: qui ita primarum thoracis, omniumq; ceruicis uertebra<sup>h</sup>rum corpori-  
bus utrinq; inferuntur, ut liquidō ea corpora ab illis in planum cōprimi con-  
stet. Præterea omnibus thoracis uertebra<sup>i</sup>rum corporibus hoc commune acci-  
dit, quod utrinq; sinus habeant, costarū capitibus inarticulandis aptos. Verū  
ut hæc in illo articulo uariant, ita etiam iisdem omnino sinibus non omnes uer-  
tebrae decorantur. Vbi enim prima thoracis uertebra secundae committitur,

Lib. de osib.  
cap. 9.

g e musc.  
tab. A, B.

h 1 fig. B.  
C. Sed ma-  
nifestius 3  
fig. cap. 19  
25, d.  
i 1 fig. ca.  
14 Q, R.

k 4 fig. 19  
cap. L.  
Hæc petes  
ex 4 fig.  
E, F.

& secunda tertiae, atq; ita deinceps ad nonā usq; cum decima connexum,<sup>h</sup> si-  
nus quidam in ambobus lateribus iuxta<sup>i</sup> foramina neruos transmittentia in-  
sculpitur, utrarumque inuicem colligatarum uertebra<sup>j</sup>rum corporibus com-  
munis, ac partim in superioris uertebrae corpus, partim in inferioris excisus.  
quantum interim grandior ipsius portio ad inferiorē potissimum pertineat  
uertebra<sup>k</sup>m. Sinus iste cartilagine incrustatus, obtusi anguli penē forma cæla-  
tur, quemadmodum & costarum<sup>k</sup> capitulum sinum subiens, anguli obtusio-  
ris modo extuberat. Cæterū prima thoracis uertebra cū undecima & duo-  
decima hoc habet proprium, quod utrinq; peculiare offerat sinum, proximis  
ipsi uertebri non communem, in ipsiusq; duntaxat corpore incisum. Ad supe-  
riorem enim sedem corporis primae thoracis uertebrae, sinus utrobique exculpi-  
tur rotundus, & satis insigniter cauus, ac deniq; cartilagine oblitus, cui primae  
thoracis costę radix rotundo capitulo inarticulatur. Deinde ad inferiorem hu-  
ius sinus sedem alius insigniter profundus conspicitur, asper, & foraminibus  
quibusdam inaequalis, nullaq; cartilagine inunctus: à quo ualidissimum prodi-  
ligamentum, costam in suo sinu robustissimē stringens. Pari ratione rotundus

Sinus, quibus  
costae ad uerte-  
brarum articu-  
latur corpora.

sinus in duodecima tantum uertebra, duodecimæ costæ gratia insculptus, ad inferiorem ipsius sedem, alium quoq; asperum, sed minus inæquali primæ uertebrae sinu, profundum adipiscitur, ligamenti duodecimam costam firmius uertebrae adnectentis nomine cælatum. Postremò thoracis uertebRARUM corporibus etiam substantiæ ratione quædam accedit differentia. quanto enim cuiusq; uertebrae corpus grandius maiusq; est, tanto etiam minus apparet solidum, sed fungosum, & multis inæqualibus uarijsq; foraminibus incerta serie punctum, in quæ uenæ arteriæq; corpus uertebRARUM enutrituræ subintrant. Nisi enim uasorum furculi crassiorū ossium substantiæ insinuarentur, impossibile esset, mediam intimamq; & à superficie remotissimā ossis sedem, sibi nutrimtum (quandoquidem ita à uasis ossa perperantibus distat) allicere. Inter cætera huius generis foramina, nullibi insigniora se offerunt, quàm in posteriori corporis uertebRARUM regione, dorsalem medullam respiciente. in qua plurimis uertebRIS unum peculiare cernitur foramen, pro uertebrae mole magnum, & asperum, & in multa cæca definens foraminula. Et quamuis Galenus hæc priuatim lumborū uertebRIS uideatur ascribere, si tamen quis singula studiosè rimabitur, conspiciet primam lumborū & thoracis duodecimam, & undecimam, aliquotq; uertebRAS ipsis superpositas, ea foramina pro illarū magnitudine insigniora, plura & altiora nascisci, harumq; uertebRARUM corpus illorum foraminū occasione fungosius quàm cæterarum omnium esse: quòd scilicet magnæ sint uertebRæ, & cauæ uenæ<sup>m</sup> caudicè promptuarij cuiusdam modo sibi innitentē non fortiantur, ac duntaxat<sup>n</sup> uenę pari carentis propaginibus hic ferè exhaustis & cessantibus implicetur. Omnibus thoracis uertebRIS transuersi obtigerūt processus, qui in nouem superioribus uertebRIS uix quicquam magnitudinē differunt, costarum quę ipsis articulantur, subseruientes cõtextui. Decimæ uerò uertebrae processus minus quàm superiorū uertebRARUM extuberant ut etiam decimæ costæ, quæ ipsis articulantur, admodū paruæ sunt, & spuria. Undecimæ autē uertebrae transuersi processus, minores sunt decimæ processibus: & duodecimæ processus, undecimę cedunt processibus. quòd scilicet undecimæ & duodecimæ thoracis costæ uertebRARUM duntaxat articulantur corporibus. Ad<sup>n</sup> apices itaq; transuersorum processuū, nouem superiorum thoracis uertebRARUM sinus cartilagine incrustati occurrūt, quibus quoddam costarum articulat<sup>n</sup> capitulū. In transuersis autem decimæ uertebrae processibus eiusmodi sinus aut nulli, aut interdū obscuri conspiciuntur: in duarū uerò infimarū processibus nulli penitus occurrūt. Præterea sinus in transuersorum processuū apicibus sculpti, omnes quidē anteriore processuum sede habentur: uerū alij eius sedis mediū magis occupant, alij regionē ipsius superiorem, alij inferiorē. Primæ enim uertebrae transuersorū processuum sinus deorsum spectant, nonæ uerò sursum, mediæ autē medio se habent modo. Quod Galenus quidem parū animaduertisse uidetur, quum costarū nexus explicās, huiusmodi sinus omnes deorsum spectare, ac inferiori apicis transuersorū processuum sedi insculpi arbitratur. qui decimā thoracis uertebRAM, & duas huic subiectas nequaquam transuersis processibus in 13. de Partium usu, ob id debebat priuare, quòd illi totius dorsi in latum motū essent præpedituri. Si enim motus illius ratione Natura transuersos processus illis uertebRIS abesse uoluisset, non magis uertebRAS decimę (quam Galenus ascendentibus suis ac descendētib; processibus, ut paulo post dicemus apertius, à proximis illis uertebRIS excipi tradidit) subditas, quàm superpositas, debuisset illis processibus priuare. Nam si inferiorum uertebRARUM transuersi processus motui laterali obstaculo erant futuri,

profectò

Cæca foramina  
in uertebRARUM  
corporibus.

Libro de Ossibus, cap. 10.

Transuersi pro  
cessus eunim  
di.

Libro de Ossibus, et octauo  
de Administrat.  
dissert.

In lib. de Ossib.

l. 2, 3, 4. fi.  
G.

m. fi. 6. ed.  
lib. 2. prepo  
sitæ & uer  
sus o.  
n. ciusd. fi.  
F. decim. G.  
o. 1, 2, 3, 4.  
fig. H. I.

p. 1. fig. K.  
et 3. fig. ca.  
10. c. b.  
q. 4. fig. ca.  
19. M.



perfectò superiores nò minus illi motui, quàm inferiores obstitissent. Quin-  
admodum enim dorſi pars, quæ uertebrae suprà infraq; exceptæ subijcitur, sur-  
sum in illo motu ducitur: ita etiam superiacentem partem deorsum ferri ne-  
cessum est, si modò ueluti in semicirculū dorsum in latus duci debeat, cuius se-  
micirculi circūferentiæ medium punctum uertebra illa meritò censetur, quæ  
suprà infraq; (quæcunq; ea tandē sit) suscipitur. At quid opus est huic sermoni,  
adhuc propter uertebra utrinq; susceptā intellectu difficili, immorari? quum  
decima, & duæ ipsi succumbentes thoracis uertebrae, tam insignes transuersos  
processus habeant, quàm illorū usus in musculorum exortu insertioneq; expe-  
dit. Quinetiā Galenus sui nescio quàm memor, passim omnes costas duobus  
internodijs articuli prodidit, uno scilicet uertebrae corpori, altero autē trans-  
uerso processui, quod si esset (uti sanè nō est) nunquid & decima thoracis uer-  
tebra, & duæ ipsi subditæ, necessariò transuersis donaretur processibus? Quo  
autem ductu illi aut sursum aut deorsum porrigātur, tunc dicemus, quum tho-  
racis uertebrarum spinas sermoni quoq; addiderimus. Natura enim omnibus  
thoracis uertebris spinā toto incessu simplicē, minimēq; bifidam largitur, etsi  
interim in omnibus uertebris nō sibi forma similē. Superiores namq; nouem  
uertebrae longissimas educunt spinas, non admodū amplas, attamen ex ampla  
basi in mucronē sensim definentes, trianguliq; imaginē ita referentes, ac si tri-  
angulari constarent pyramide. Superiorem enim sedē rectā acutamq; ostendunt  
lineam, secundum ipsarum longitudinē exporrectam, & deinde utrinq; ad la-  
tera iuxta inferiorem ipsarū sedem, cōsimilem etiam obtinent lineam. ad eò ut  
spinæ unius, tres longē acutæq; lineæ, ternas superficies efforment: quarū duæ  
superiorem spinę sedem cōstituunt, tertia autem inferiorē. Tres istę eiusdem  
spinę superficies, in nouem superioribus uertebris ut plurimum pares & æquē  
amplæ cernūtur, & duæ superficies exactē leues sunt: tertia autem & inferior  
aspera est, & ueluti linea secundū ipsius longitudinem ducta interdiuiditur.  
Ab hac tertiæ superficiei linea ligamentū prodit, quod lineæ duabus reliquis su-  
perficiibus cōmuni inseritur, quodq; inuicem spinas colligans, interuallumq;  
earundem opplens, dextros spinę musculos à sinistris dirimit, illi respondens li-  
gamento, quod inter ulnam & radium, ac inter tibiam os & fibulam cōsistere  
dicam. Interdū superiores superficies inferiori ampliores apparēt, ipsaq; spinæ  
à lateribus magis (quemadmodū in quadrupedibus occurrit) sunt depressæ.  
Decima thoracis uertebra non ita prominentem, atq; superiores uertebrae, spi-  
nam exerit, neq; hæc triangularē illam imaginem ad eò scitē cōmonstrat. Duæ  
enim superiores superficies amplæ admodū sunt: tertia autem inferior ue-  
angusta cernitur, eaq; non depressa, minimēq; æqualis. Præterea spinæ huius mu-  
cro obtusus amplusq; est, non, ut superiorū uertebrarū spinæ, acutus & stri-  
ctus. Vndecimæ uertebræ spinā adhuc minus quàm decimæ exporrigitur, &  
utrinq; magis deprimitur, ampliorq; (si latera inspexeris) efficitur. Deinde in-  
ferior ipsius superficies in lineā insigniter extuberrat, arctaq; & aspera uisitur,  
huiusq; spinæ mucro admodum obtusus est, ac spissus. Duodecimæ spinā ad-  
huc magis à superiorum uertebrarū spinis uariat, ad lumborum uertebrarum  
spinæ imaginem magna ex parte accedens, quæ utrinq; admodū depressa est,  
& lata & ampla. Cæterum ut omnibus uertebris non eadem spinarū forma  
accidit, sic etiā spinę inuicem ductū discrepāt. Nouem namq; superiorū thora-  
cis uertebrarū spinæ, ut & cervicis, insigniter decliues ferūtur, seu à summo ad  
imū tendunt. Decimę autē thoracis uertebræ spinā minus quàm superiorū spi-  
næ deorsum cōiuet, magisq; rectā retrorsum fertur. Vndecimæ spinā adhuc  
rectius

Tum alibi sa-  
pius, tum ma-  
ximè citato de  
Admin. dif-  
fict.

Thoracis uer-  
tebrarū spina.

Spinarum  
ductus.

rectius erigitur, & huius rectitudinem duodecimæ spina uincit. Verùm interim harum nulla adeò recta fertur, quin ipsius mucro semper magis deorsum quàm sursum uergat. quod etiam omnium in lumbis uertebraum spinis accidit, deorsum magis quàm sursum spectantibus. Atq; hæc in hominis dorso subaudienda sunt. Canibus enim, simijs, leporibus, & alijs ferè quadrupedibus prorsus contraria est ratio, Galeni dogmatibus pulchrè quadrans. His enim decimæ thoracis uertebrae spina neq; deorsum neque sursum uergit: & duæ deinceps, quæ statim decimæ subiiciuntur, spinam habent obscurè superiora suo mucrone spectantem. Reliquæ uerò has adhuc subsequentes, spinas obtinent ab imo sursum porrectas. Transuersi colli uertebraum processus, quemadmodum & nouem superiorum thoracis, ex Galeni sententia, decliues, seu à summo ad imum deberent porrigi: uerùm id adeò obscurè leuiterq; fit, ut uix mentione dignum uideatur. Quandoquidem si transuersos colli uertebraum processus non perfunctoriè consideraueris, illos dices<sup>f</sup> externo seu posteriori eorum latere deorsum respicere:<sup>g</sup> interno autem, seu anteriori latere, quod posteriori latius est, sursum tendere. Transuersi autem nouem superiorum thoracis uertebraum processus, toto ipsorum corpore retrorsum sursumq; magis, quàm deorsum feruntur. Verùm<sup>h</sup> superior eorundem pars gibba uisitur,<sup>i</sup> inferior caua, & non nihil sinuata, quasi hac ratione descensus ad inferiora speciem processus illi referrent. Transuersi autem duodecimæ thoracis uertebrae processus non solum sursum conuiuent, uerùm etiam egregiè retrorsum ducuntur, quemadmodum & undecimæ & decimæ processus non nihil sursum spectant. Transuersi uertebraum in lumbis consistentium processus admodum obscurè sursum ducuntur: quanquam uertebra sacro osi commissæ, paulo manifestius ceteris, suos processus sursum efferre cernitur. Porro in paulo antè commemoratis animalibus, transuersi processus colli uertebraum perquam conspicuè & manifestò deorsum tendunt. Thoracis autem uertebraum processus, aut non deorsum feruntur, aut admodum leuiter. Lumborum uerò uertebraum processus insigniter in altum obliquè porriguntur, & Galeni descriptionibus adamussim conueniunt. Quòd uerò spinarum & transuersorum processuum ductu ea animalia tantopere ab homine discrepent, musculi dorsum mouentes in causa sunt, secus longè in hoc quàm illis occurrètes, uti quoque admodum impar in utrisq; dorso motuum spectatur ratio. Quandoquidem uerò musculorum historia in secundum usq; librum nobis est differenda, qui ascendentes descendentesq; thoracis uertebraum se habeant processus, modò non inopportunè aggrediemur. Vertebraum omnium quæ supra sacrum os habentur, articulationum, quæ istis constant processibus, ea est ratio, ut succumbens uertebra supra iacentem subintret, & ab illa suscipiatur, aut succumbens superiorem in suos sinus ita excipiat, ut uniuersæ, duabus tantum demptis, una parte suscipiant, altera suscipiantur. Prima enim cervicis uertebra, & superiori & inferiori sede suscipit. Superiori quidem occipitis ossis capitula,<sup>m</sup> inferiori autem secundam cervicis uertebra. et si interim hi ad primam pertinentes uertebra articuli, ascendentibus descendentibusq; nobis uocatis processibus (quum nimirum hæc illis destituatur) non sint ascribendi.<sup>n</sup> Duodecima uerò thoracis (nisi alia quæpiam interdum eius uices subeat) utrinque, seu suprâ infraq; suscipitur, nullam interim admittens. Omnium itaque hac uertebra superiorum, ad primam usq; cervicis, elatior, inferiorem ac substratam excipit, ut decima thoracis undecimæ, & nona decimam. Quæ autem sub utrinque suscepta locantur, superiori quidem sui parte superiacentem excipiunt, inferiori

Lib. de ossib.  
& libro 13. de  
fusu partium.

Transuersorum  
processuum des-  
criptio.

Item alibi, ut  
in lib. de ossib.

Differentia ab  
ascendentibus  
& descenden-  
tibus processibus,  
eorundem  
articulationum  
ratio.

f 8, 10 fig.  
cap. 15. x.  
g eorum  
dem fig. 2.

h 1, 2 fig. L.  
i 1 fig. M.

k 1, 2, 3 fig.  
cap. 17. H.

l 2 fig. 15  
cap. N. susci-  
pit. 1 fig. B.  
m 4 fig. 16  
cap. X. susci-  
pit. 5 fig. 2.  
n fig. 14. 4.  
E. & 3 in-  
tegratæ ad  
12 costam.

o 7 fig. 15  
cap. B. de in  
9 fig. A. C.  
11 fig. B. A.

Lib. 19.

p 1 fig. T.


V.

q 2, 3 fig.

X, Y.

r 1 fig. C.

feriori uerò subiacentem ingrediuntur. atq; ita prima lumborum uertebra à secunda, & hæc à tertia suscipitur. Thoracis uertebrae supra utrinq; susceptam repositæ, eandem in ascendentibus descendētibusq; processibus speciem cum colli uertebri obtinent. Sunt porrò hæ thoracis uertebrae, secundum Galeni sententiam in libro de Ossibus, nouem superiores: aut alicubi in libris de Vsu partium, decem. Is enim hic undecimam, illic uerò decimam thoracis utrinq; suscipi tradidit, uti in simijs & canibus cernebat. Mihi autem nunquam in homine decima utrinque excipi uisa est, sed plurimum duodecima. Aliquando enim cum sacrum os quinq; tantum ossibus efformatum reperi, undecima mihi utrinq; suscepta occurrit. Verùm Bononiæ Galli cuiusdam sacerdotis ossa contexamus, in quibus prima lumborum utrinq; suscipitur, & illa transuersos suos processus perinde sibi articulatos gerit, ut duodecima thoracis uertebra duodecimas costas. Quum igitur frequentissimè duodecima thoracis utrinq; suscipi appareat, ab hac sequentem modò orationem instituemus. Vndecim thoracis uertebRARUM ascendentes<sup>p</sup> processus sursum extuberant, & in<sup>q</sup> exteriori posteriori<sup>r</sup> ue sede, notatu digna orbiculariq; circumferentia cartilagine incrustantur. quæ adeò leuiter ac plana superficie eminet, ut num sinus, num capitulum censenda sit, uix internoscas. Descendentes autem processus<sup>r</sup> interna anteriori<sup>r</sup> ue ipsum sede, qua foramen dorsalis medullæ gratia cælatum respiciunt, sinum adipiscuntur quodammodo orbicularem, & leuiter ac superficietenus tantum exculptum, & cartilagine incrustatum, nuperq; dicto capitulo adamusim correspondentem. Hi sinus & capitula, à colli uertebRARUM processuum sinibus capitulisq; in ductu solum uariant. Colli enim uertebRARUM sinus & capitula obliquè ab anterioribus sursum porriguntur, aut contrà obliquè deorsum tendunt. Nihil enim refert, siue sursum, siue deorsum porrigi dixeris, modò obliquitatem illorum intelligas, & cum thoracis uertebRARUM sinuum capitulorumq; ductu eam conferras: qui quadatenus recto perficitur tramite, quo firmior, minusq; ad motum sequax thoracis uertebRARUM esset còtextus. Quum igitur thoracis uertebRARUM, ut & colli, ascendentes processus posteriori sua sede protuberent, descendentes uerò interna sede cèlentur, meritiò ascendentes inferioris uertebrae processus, subintrant descendentes superioris uertebrae processus, inferioriq; uertebra à superiori excipitur. Cæterùm lumborum uertebrae alia ratione coordinantur. Ascendentes enim illarum processus interno latere, quo se inuicem illi respiciunt, sinum habent oblongum, & ampliter satis cauum & rectum. Descendentes autem processus, latere suo externo (modicè interim uersus anteriora) oblongo & ueluti recto protuberant capitulo, quod in inferioris uertebrae ascendents processus sinu aptè excipitur. Adèò, ut in lumborum uertebri inferior uertebra suis sinibus superioris admittat capitula: secus quàm in ceruice & thorace, ubi superior suis sinibus inferioris uertebrae capitula excipit. Duodecima autem thoracis uertebra<sup>u</sup> ascendentes processus similes gerit ascendētibus superiorum illi thoracis uertebRARUM processibus, quos posteriori sua sede extuberare diximus. Atq; ideo duodecima illis processibus undecimæ thoracis uertebrae descendentes subit, ipsaq; ab undecima excipitur.<sup>x</sup> Descendentes etiam duodecimæ processus extuberant, non quidem ipsius ascendentium processuum modo, uerùm ut descendentes uertebRARUM in lumbis occurrentium processus. Quum igitur hi, ascendentium primæ lumborum uertebrae processuum sinus subintrent, quid promptius colligi



Ab a ad b col li uertebRARUM processuum ductus incutitur. à c uerò ad d thoracis.

s 2 fig. C. d.

17 K, L, M.

t 2, 3 fig.

cap. 17 O.

u 4 fig. f.

x 4 fig. b.

Quo modo lumborum uertebrae in tuo de articulantur.



colligi possit, quàm suprà infraq; duodecimam fuscipi? Verùm interim non ita multum refert, an hæc, an undecima, an alia quæpiam utrinq; fuscipiat: modò nos singularis Naturæ hic non lateat indultia, quæ in dorli medio uerteboram effinxit stabilem, & utrinq; ita fuscipit, ut in cameratis & arcualibus ædificijs architectòs inter utriusque lateris lapides unum locare cernimus, qui utrinque fuscipitur, ipso interim nullum fuscipiente: quemadmodum cæteri omnes unum lapidem fuscipiunt, & ab alio excipiuntur, sustinenturq;. Vt enim dorsum sibi dicatis ageretur motibus, hanc uerteboram utrinq; fuscipitam quiescere, quodammodoq; firmari necessum fuit, reliquis interim omnibus ab hac & à se inuicem leuiter secedentibus. Illa enim quiescente, quum dorsum flectimus, superiores deorsum ducimus, inferiores autem aliquo pacto sursum incuruamus. In tēsiōe uerò rursus opposito motu uerteboras agimus: si quidem hi dorli motus, & alij quos antea commemorauimus laterales, circulari, non autem prorsus angulari figura celebrentur. Quàm parum uerò hæc cum Galeni in decimoter tio de Partium usu, placitis conueniant, si mutuò loca contuleris, promptè animaduertes. Hic autem in thoracis uertebreis, ad radicē ascendentium descenditumq; processuum, adeoq; ad posterioris earundem processus seu spinæ exortum, insignes adhuc<sup>7</sup> obseruadæ sunt asperitates, in æqualiterq; extuberantes processul, in hoc parati, ut ualida hinc pronascerentur ligamenta, tanto robustius firmiusq; thoracis uerteboras inuicē colligantia, quanto obscuriori motu thoracis uerteboras, quàm cervicis moueri, ex usu fuit. Quæ quum ita sint, omnes thoracis uertebre septem donantur processibus: <sup>a</sup> duobus nimirum transuersis, <sup>b</sup> & totidem descendētibus, <sup>c</sup> unoq; posteriori, seu spina. Quæ autem foramina neruos transmittentia, in thoracis se habeant uertebreis, superiori Capite expressimus.

Quamobrem  
unam uerte-  
bram in dorli  
medio utrinq;  
fuscipi oportet.

Thoracis uer-  
tebrarum pro-  
cessuum nune-  
rui.

Figura hu-  
ius Operis  
fronti adhi-  
bita, neruos  
arcus ostendit.

7 23. figr  
circa G.



z 1, 2, 3, 4  
fig. H. 1.  
a 1 fig. T.  
v. 2, 3 fig.  
X, Y.  
b 2, 3 fig.  
a, b.  
c 1, 2 fig.  
N, O, P.

## DE LUMBORVM VERTEBRIS.


Caput xvii.

PRIMA XVII CAPIT  
TIS FIGURA.

SECUNDA.



TERTIA.



TRIUM

## TRIUM DECIMISEPTIMI CAPITIS FIGURARUM, &amp; earundem characterum Index.

QVONIAM omnes lumborum uertebrae eadem forma constant, unam duntaxat ipsarum triplici facie hic expressimus: Prima quidem figura anteriorem uertebrae faciem, Secunda latus, Tertia posteriorem faciem proponentes.

A 1, 2, 3 Appendix superior corporis uertebrae.

B 1, 2 Appendix inferior corporis uertebrae.

C, D, E, F, G His characteribus non in eadem figura obuijs, spina simul notatur, ac singuli priuatim in spina aliquid hunc in modum indicant.

C 1, 2, 3 Indicatur spinae lumborum uertebrae superior pars, seu lata aspera, ipsius linea.

D 2 D latiat in umbra, sub spina secunda figura, notans lineam inferiorem spinæ.

E 2 E non procul à D distat, notans alterius lateris sinum, ad latus lineæ D insignitæ consilientem.

F, G 2, 3 Appendix spinæ, triangulum referens, qui in basi G notatur, in acuto autem angulo F insignitur.


H 1, 2, 3 Alterius lateris transversus processus.

I 1, 2, 3 Ascendens alterius lateris processus. Verum K, L & M in secunda figura & tertia expressus alterius lateris ascendens notatur processus. K enim sinus insignitur. L uero anteriorius eiusdem sinus labrum, seu supercilium. M M autem posterius supercilium indicatur.

O 2, 3 Descendens alterius lateris processus. O in tertia figura positum, eius processus caput notat.

## QUARTA DECIMISEPTIMI CAPITIS FIGURA.

QVO leuiori opera processuum hoc Capite priuatim describendorum sedem formamq. assequaris, praesenti figura caudatæ simie lumborum uertebrae dextra facie expressimus. in qua A & A uertebrae illius notant corpus. B transversum processum hic manifestum sursum spectantem. C spinam, quæ etiam sursum uergit. D & E duos indicant ascendentes processus. F uero & G duos descendentes processus insinuat. Postremo H indicatur processus, quo humane lumborum uertebrae priuatur.



a fig. cap.  
14 E, F, tres  
integre L  
ad M.

b 1 fig. ca.  
11 lib. 4 E,  
F.  
c fig. cap.  
14 Q.

d 1, 2, 3 fi.  
H.  
e 1, 2 fig.  
ca. 16 H, I.  
f ostēdit  
id e fig. in-  
tegrarum.  
g 1 fig. inte-  
grarū Q, 2.

ERE omnia quæ ad lumborum uertebras spectant, antea recensuimus: ac proinde illarum descriptioni modò prolixius non immorâtes, obiter prius commemorata resumemus: dein ea quæ hoc Caput priuatim sibi uendicabit, subiecturi. Sunt itaque lumborum<sup>a</sup> uertebrae numero quinque, omnium quas hæcenus descripsimus maximæ & crassissimæ: ob quod etiam ipsarum corpora multis foraminibus opplentur, quæ non peruia sunt, at duntaxat uasorum nutrimentum afferentiū occasione parata. Foramen uerò dorsali medullæ in his exculptum, tanto minus est incumbentium uertebrarum foraminibus, quanto iam toto progressu dorsalis medulla gignendis nervis<sup>b</sup> tenuior graciliorq. euasit.<sup>c</sup> Foramen emittendo neruo & admittendæ uenę arteriæq. in ambobus uertebarum lateribus cælatum, ferè uniuersum ad superiorem refertur uertebra, quæ eius foraminis superiorem sedem ac latera constituit, quum interim subiecta inferior<sup>d</sup> ue uertebra duntaxat humiliorē foraminis sedem efformet.<sup>e</sup> Transuersi harum processus utrinq. singuli, longè tenuiores sunt thoracis uertebrarum<sup>f</sup> transversis processibus. At interium admodum procerè educuntur, quasi costarum usum in lumbis nonihil præstarent. ac proinde etiã prima & quinta lumborum uertebrae breuioribus transversis<sup>g</sup> donantur processibus, quàm mediæ, non secus quàm si superius infimæ thoracis costæ, & inferius illi<sup>h</sup> ossa eos pro-

Cuiusmodi sint  
lumborum uer-  
tebrarum cor-  
pora.

Foramina.

Transuersi  
processus.

eos processus longius exeri prohibuissent, neque eosdem inibi costarum uices adeo obire necessum fuisset. Præterea nullius uertebrae transuersi processus sursum manifestò assurgūt, præter quintæ uertebrae processus, quibus quo minus transuersim aliorum modo porrigantur, ilium quoq; ossa obstant, illius uertebrae corpori uicinius accedentia, quàm mediarum in lumbis uertebrae trans-

*Spina.*

uerforum processuum est longitudo. <sup>a</sup> Spina his est ualida & crassa, at pro ipsarum mole non admodum procera aut longa. Si dextrum sinistrumq; in spina spectes, ipsa tenuis est: si autem superiora inferioraq; consideres, latissima. <sup>b</sup> superius quidem acuta, & in asperam definens lineam: inferior uerò crassior, & quasi duobus donata sinibus. in quorum medio linea educitur, à qualigamentum ad superiorem spinæ inferioris uertebrae lineam pronascitur, quod spinarum interuallum opplens, dextros musculos à sinistris dirimit. Spinæ <sup>c</sup> mucro appendice, ut & thoracis uertebrae spinae, constat: & ualde obtusus, ac quodammodo triangularis uisitur. si modò utrinque ad latera unam trianguli costam, & tertiam (quæ alijs longè breuior est) in spinæ appendicis basi consti-

*Ascendentes  
processus.*

tuas. <sup>d</sup> Ascendentes processus interno latere, quo se inuicem è regione spectant, <sup>e</sup> sinum adipiscuntur profundum, & si animum superiori & inferiori sinui par-

*Descendentes  
processus.*

tibus accommodaueris, rectum & oblongum. <sup>f</sup> Descendentes processus insigniter decliues feruntur, & externo ipsorum latere in <sup>g</sup> oblongum rectumq; capitulum definunt, quod magis uertebrae anteriora quàm posteriora respicit. Capitula hæc in subiectæ uertebrae ascendentes subeunt processus, quemadmodum etiam antea fusius exequutus sum. Constat itaq; lumborum uertebrae septem duntaxat exerere processus, unum scilicet posteriorè, seu spinam, duos transuersos, & totidem ascendentes & descendentes. adeò ut huic Capituli hæcenus, quod prius non recensui, nihil ferè adiectum sit. Neq; etiam aliud

*Processus, quæ  
Galenus ex a-  
bundanti lum-  
borum uertebra  
scribit lib. 13.  
de usu part. et  
lib. de ossibus  
cap. 10.*

subnecterem, nisi Galenus lumborum uertebrae ex abundanti unum utrinq; tribueret processus, quem ad inferiora uergentem, iuxta foramen situm scribit, quò neruus à dorsali medulla principium ducès prolabitur. Ego hunc processum in humanis uertebrae nunquam reperi. unde etiam in hoc obseruando eadem uia & ratione mihi utendum duxi, quæ ea indagare soleo, quæ à Galeno descripta, in homine haudquaquam mihi occurrerèt, quæ uel secus quàm ipse tradidit, habere cernerem. Consueui enim hæc omnia mox in brutis animantibus examinare, quæ Galeni descriptionem persèpe mihi ostenderunt: aut ueluti manu ducentia, quid sibi uoluerit, edocuerunt. Hic itaq; processus me tantisper latuit, donec omnium partium dissectionem Bononiæ in simia illa aggrederer, cuius ossa præter humanum sceleton, Ioanni Andreæ Albio, Hippocraticæ medicinæ apud Bononienfes professori clarissimo, compegi: quum is, ut uir est splendidissimus, omni humanitate, admodumq; liberaliter in ipsius ædibus me Bononiam Anatomes docendæ gratia uocatum, secundò excepisset. In simiæ igitur lumborum uertebrae ad radicem transuersi processus in inferiori ipsius sede, <sup>h</sup> acutus conspicitur processus, rectà deorsum protensus, & sinus qui nerui nomine illic incisus est, externum latus quodammodo constituens, ac ueluti interuallū cum descendēte processu efformans, in quod ascendens inferioris uertebrae processus subintrat. Quamquam is præcipuus huius processus non sit usus, ut neq; etiam in hoc potissimum creatur, quo hæc proci- dentem neruum ab iniuria uindictet, illiq; instar propugnaculi existat. Peculiari enim cuidam extruitur <sup>i</sup> musculo, quem simiæ cum canibus communem obtinent, & quo homines inferiorem dorsi partem non æquè ac illa animalia in circulū flectentes, non minus destituuntur, quàm omni præsentis processus signo.

*b* 2 fig. c.  
D, E, I, G.

*i* 2 fig. d. c.  
ad D.

*k* 1, 2, 3 fig.

*C.*

*l* 2 fig. D

*linea, E. au.*

*tem alterū*

*sinu notat.*

*m* 2, 3 fig.

*E. G.*

*n* 1, 2, 3 fig.

*I. K.*

*o* 2, 3 fig.

*K.*

*p* 2, 3 fig.

*N. O.*

*q* 1 fig. O.

*r* 4 fig. H.

*t* 4 fig. H.

*u* Peter

*hunc ex si-*

*mia aut ca*

*nis sectio-*

*ne.*



figno. Enascitur uerò hic musculus nerueo & utcunque lato principio ex coxendicis ossis sede, qua primarij femur flectentes muscoli deorsum conuoluuntur. Hinc obliquè ascendens, & in lumborum regione primùm carneus euadens, omnibus sui lateris acutis uertebrae inferitur processibus, superiori què insertionis suae extremo in uertebra cessat, illi quæ utrinque suscipitur, mox subditam. Inferiori extremo non pariter in canibus ac simijs descendit, quum in plures lumborum uertebras his, quàm illis inferatur. uti etiam simiarum plures lumborum uertebræ hunc obtinent processum: qui tanto semper est manifestior, longius què è uertebis exeritur, quo hæ illi quæ utrinque suscipitur uertebræ sunt uiciniores, musculus què iste ualidiorem in illas molitur insertionem. Adeò ut thoracis etiam uertebræ inferius quàm utrinque susceptæ, quæ illis animalibus plurimum est decima, collocatæ, hunc processum sibi perinde uendicent, ac lumborum uertebræ superiores. nam sacro ossi proximæ, & musculi huius insertionem non plenè excipientes, processu illo priuantur. Quod à Galeno uenerat obseruandum, quum sibi primùm hunc processum innotuisse scribit, & quum alibi musculos in lumbis positos, dorsi què motibus inibi famulantes, parum rectè ueteribus cognitos fuisse iactitat, suas undique proponens nobis simias, ubi accuratius, ac ueluti studio quidpiam persequitur. Verùm interim omnes à me hætenus dissectæ simiæ, quæ potissimum fuerunt caudatæ, non secus quàm canes, in lumbis plures quinque obtinuerunt uertebras: neque fat scio, num aliqua simiarum genera breuiori corporis trunco, quàm nostræ hæc donata, casu reperiantur, quibus tantum quinque in lumbis, quemadmodum hominibus, consistunt uertebræ. quum Galenus quinque tantum passim enumeret, reliquum nihilominus suum sermonem simijs (uti iam ostendimus) potius, quàm homini accommodans. nisi etiam fortè posito hîc à ueteribus simul omnibus numero, ita acquieuerit, ut: pauciores uertebras, quàm ipsi in simijs offerebantur, posteris tradiderit: forsân in humanis ipsi ruri oblatis, at sanè, ut uerisimile est, domum non allatis sceletis, quinarium obseruans numerum: & in reliqua interim fabrica, plenior què ossium historia, hominis uertebras simiarum uertebris similes pares què esse, citra diligentius examen, sibi (quemadmodum aliàs sæpe) persuadens.


*Lib. 13. de resu partium.*

*Lib. 5. de Admiss. dissect.*

*simijs & canibus pauciores quinque in lumbis esse uertebras.*

PRIMA XVIII CAP-  
TIS FIGURA.

SECUNDA.



TERTIA.

TRIVM DECIMIOCTAVI CAPITIS FI-  
gurarum, & earundem characticum Index.

*PRÆSENTES figura universum dorsi osium, quæ lumborum vertebri subijciuntur, contextum exprimunt. ac prima quidem figura, quæ dextrum latus occupat, anteriorem horum osium faciem spectandam proponit. Secunda uero in sinistro consistens latere, posteriorem ostendit faciem, modice in latus delineatam, sinus monstrandi gratia, cui dextrum ilium os coarctatur. Tertia autem figura in dextrarum medio reposita, integrum coccyx os ea forma magnitudinēq; oculis subijcit, quæ id in uetere ætatis hominibus plurimum obseruatur.*

- A, B, C, D, E, F, G, H, I, K* Hi characteres in prima figura decem denotant ossa, quintam lumborū vertebriam subsequētia: quorū sex superiora, sacri ossis loco in homine habiturus sim: quatuor uerō inferiora (quæ etiam *G, H, I, K* in tertia figura insinuantur) mihi coccyx, seu (ut interdum loquimur) coccygis os appellabuntur.
- L, L, R* In prima figura notantur transversus osium sacrum os constituentium processus. uerum hic *L* & *L* priuatiim indicant amplitudinem processus secundi ossis. *R* autem, & in hac, & in secunda figura, ostendit processus transversus quinti ossis tuberculum, cui nonnulla implantantur ligamenta. In secunda itaq; figura *L, R, L* & *R* transversos processus ossis sacri osium insinuant.
- N, N,* deinde *O, O,* postremo *P, Q* & *Φ* in secunda figura ossis sacri dextrum sinum notant, cui dextrum ilium os connectitur, & qui postmodum in plures sinus & tubera subdividitur. N enim & *N* notatur ipsius oblongus sinus, & anterior. *O* uerō & *O* tuberculum indicant, instar ample cuiusdam lineæ prominens, ac anteriorem sinum *N* & *N* notatum, à posteriori *P, Φ* & *Q* insignito dirimens. *P* enim superiorem sinus posterioris sinum notat, *Q* autem inferiorem. *Φ* uerō tuberculum designat, superiorem sinum ab inferiori interduidens.
- S* In prima & secunda figura, primi ossis dexter ascendens notatur processus.
- T, U, X* Hi characteres in secunda figura tantum apparent. ac *T* quidem notat sinum ascendentiū processus, cui capitulum descendenti dextri processus quintæ lumborum vertebri articulat. *U* uerō & *X*, sinus huius anterioris posteriorisq; notant supercilium, quanquam interius etiam supercilium in secunda figura ascendente sinistri lateris processu, *X* insignimus.
- Y* In secunda figura connexus frequenter apparens significatur, quo primi sacri ossis descendentes processus, ascendentibus

dentibus secundi ossis ad eum modum committuntur, quo hac sede lumborum uertebras articulari, iam multo antea didicisti.

*Z* In prima secundaq; figuris cōnexus notatur transversus processus primi ossis, cum transversus secundi ossis processus.

*a* In prima figura & secunda, indicatur inferior extuberantiq; sexti ossis pars, quæ primo coccygis ossis ossi coarticularur.

*b, b* In tribus figuris insinuatur cartilago sum ligamentum, coccygis ossis commissuras intercedens.

*c* In secunda & tertia insignitur cartilago, mucroni coccygis ossis adnata.

*d, d* In secunda, sacri ossis ossium spina, posteriores ne processus ostenduntur.

*e, f, g, h, i, k* Hi characteres in secunda figura admodum latitant, notantes dorsalis medulla in osse sacro ier, foramina hic inter spinarum intervalla subinde conspicua.

*1, 2, 3, 4, 5, 6* His numeris in prima & secunda, inscribuntur foramina, nervorum à dorsali medulla in sacro osse complexa originem discentium, quæ sex constituunt paria, quorum quinque inferiora in anteriori ac posteriori sacri ossis sede excidunt.

QUARTA XVIII  
CAP. FIGURA.



QUINTA.



#### QUARTAE ET QUINTAE DECIMIOCTAVI Capitis figurarum, & earundem characterum Index.

QUONIAM in presentis Capitis contextu, Galeni gratia, simiarum & canum sacri ossis & coccygis mentio incidet, non ab re duximus, & hic quoq; ea ossa, uti in simijs observantur, exprimere: quarta quidem anteriorem sedem sacri ossis & dein coccygis explicantes, quinta uero eorundem ossium posteriorem sedem proponentes. Numerus igitur ille 1, 2, 3, 4, 5, 6 indicat ossa, quorum sexto cartilago priuatim subnascitur.

1, 2, 3, 4, 5, 6.

*a* fig. cap.  
14 E, F.  
*b* fig. cap.  
14 G, H, et  
1, K, dein in  
tegrariū si.  
M, N, et hu  
ius Capitis  
figurarū to  
ta 1, & 2.



*c* fig. cap.  
14 charact.  
14, 15, 16, 17,  
18, 19, 20,  
et huius Ca  
pitis fig. 1  
A, B, C, D,  
E, F.  
*d* latissime  
portiones fi  
gurarū ca.  
20. integr.  
fig. o.

*V B* lumborum<sup>a</sup> uertebris<sup>b</sup> decem reponuntur ossa, quibus reliqua dorſi pars, à lumbis ad anum usque pertinet, constituitur. horumq;<sup>c</sup> sex superiora inuicē ita coalescunt, ut instar unius ferè ossis ex sepulchris simul omnia effodi soleant, quod *πλατὺ* Græcis, latum uerò & amplum Latinis ideo uidetur appellatum, quòd eius latitudo, idq; potissimum in homine, cui illud ad proportionem præ cæteris animalibus, non secus quàm uniuersum aliàs dorsum, obtingit latissimum, faciliè reliquarum uertebrarum amplitudinem elatiori sua sede superat, ijs basis turissimiq; fulcri modo subiectum. Non enim arbitror ueteres id amplitudine omnibus corporis contulisse ossibus, quum ilium<sup>d</sup> ossa ipso longè sint ampliora. Vnde uerò id etiam *ισχὺς*, seu sacrum uocarint, non satis mihi constat, nisi à rara quadam effigie formaq; id acciderit, aut quòd adeò egregij, & cuius (qui uel obiter illud suæ basi innitens spectat) uarijs modis obuij propugnaculi imaginem referat: aut quòd diuinitus, citra musculorum auxilium, in partu illius cum ilium ossibus connexus referari, dehiscereq; ac denuò committi plerisq; (at falso interim) persuasum sit: aut fortè quòd grande magnumq; uisitur, quemadmodum apud Poetas Ilium, mare, famem, & alia quædam, sacra nuncupari credimus. Verùm & tunc (uti de amplitudine dictum est) sacrum os

Deci ossa ad  
huc in dorſo  
enarranda.

Quid sacrum,  
seu ampli os.



uertebis duntaxat esset conferendum, quum ossa ipsi utrinque coarctata, & fe-  
mora, & interna tibiaria ossa, illo graviora existant, & tamen unico tantum  
osse efformentur, sacro ex senis interim copactio. Alij huius nominis rationem  
solicite indagantes, nescio quid de ueterum sacrificijs comminiscuntur. præ-  
terquam quod nonnulli alia insuper ipsi indant nomina, cum omnibus cæte-  
rorum ossium nomenclaturis ad huius libri calcem ideo subiicienda, ne hic aut  
alibi etiam ineptis barbarisq; uocibus orationis cõtextum plus æquo inturtur-  
benus. \* Quatuor itaq; ossicula sacro ossi succedentia, à quadam coccygis, seu

Quid as coc-  
cy.

Sacri ossis de-  
scriptio.

Ipsius ossis in-  
ter se cõnexio.

cuculi auis nostri figura, ac ueluti colore, non secus quam si unū aliquod etiam  
essent os, Græcis, uti & Latinis, *ὀστέον* præcipue appellatur, quemadmodum nunc  
in uniuersa decem horum ossium hystoria constabit apertius. Sex igitur supe-  
riora ossa, sacrum os efformantia, inuicem ita construuntur, ut anterioris suæ  
sedis medio talem ostendant<sup>h</sup> connexum, qualem uertebrae proponerent  
corpora, si eousq; coaluissent, ut nihil amplius cartilaginei<sup>i</sup> ligamenti inter ipsa  
conspiceretur. quamuis interim pueris, quibus hæc ossa nondū plenē, aut æquē  
ualidē, ac in prouectę ætatis hominibus, coaluerūt, non secus quam in illorum  
appendicum nexu, cartilago quædam in hac unionē occurrat. In latēribus ue-  
rò anterioris sedis, ubi transuersi sex horum ossium uocati processus (qui non  
minus quam ossium corpora lati sunt) mutuò compinguntur, longē adhuc  
obscurior, quam in medio, connexus apparet species. \* In posteriori autem se-  
de unio prorsus aboletur, unumq; ueluti os ex illis sex efformatum cernitur.  
Nulla enim hic unionis se offert linea, nisi interdum in primi ossis cum secun-  
do coalitu. Primum namq; os nonnunquam secundo, posteriori sede ea articu-  
li forma<sup>i</sup> cõmittitur, qua ascendentes descendentesq; in lumbis uertebrae  
processus mutuò solent articulari. Verū et si illi sacri ossis processus ita iun-  
gantur, transuersi tamen primi ossis processus omni ex parte secundi ossis<sup>o</sup> co-  
alescunt processibus: & omnes isti cõnexus adeò sunt ualidi, ut primum os ne  
tantillum quidem ad secundum moueri queat. Memini tamē, sacrum os non  
semel in cæmiterijs nūhi obuium fuisse, cui primum os abruptū erat, quodq;  
ac si lumborum penē esset<sup>o</sup> uertebra, seorsum inueniebatur. & nisi primum il-  
lud os crassius & amplius donatum fuisset processibus, à lumborū uertebrae for-  
ma uix discerni potuisset. Porro in pueris, sex horum ossium coalitus, etiam in  
posteriori sede est conspicuus, quemadmodū in ijs anteriori quoq; parte illum  
insigniter manifestum esse diximus. Præterea ut nullis hominibus in anterio-  
ris sedis medio, coalitus species locus<sup>o</sup> ue omnino penitusq; obliteratur, ita e-  
tiam perpetuò in posteriori sacri ossis sede, coalitus imago se offert, qui ossium  
corporibus perficitur. Si enim<sup>o</sup> foramini dorsali medullæ in omnibus simul sa-  
cri ossis ossibus inciso, anumum accommodaueris, per foraminis progressum,  
ossium corpora ita liquidò inibi cõmitti cernes, atq; in anteriori sede. Vniuersa  
sex horum ossium<sup>o</sup> series ex ampla basi deorsum in mucronem ducta, est eiuf-  
modi, ut singula ossa tanto reddantur minora, quanto humiliorē in sacro osse,  
ipsaq; adeò serie, locum sibi uendicant. Quamquam nihilominus<sup>o</sup> secundum  
os, inter reliqua ossis sacri ossa, priuatim amplioribus, crassioribusq; & antror-  
sum retrorsumq; magis prominentibus transuersis extruatur<sup>o</sup> processibus. Pri-  
mi seu eminentissimi ossis superior<sup>o</sup> pars, superiori cuiusvis lumborum uerte-  
bræ<sup>o</sup> sedi forma correspondet. In sui enim medio orbiculari protuberat<sup>o</sup> cor-  
pore, appendice donato, & inferiori quintæ lumborum uertebrae corporis se-  
di in amplitudine congruente. Hoc enim illi perinde<sup>o</sup> cõmittitur, ac uerte-  
brarum corpora in lumbis mutuò<sup>o</sup> crassi ligamēti cartilaginei interuētū con-

e integ.  
fig. A.  
f integ. fi.  
o.

g fig. cap.  
14. chara-  
cteris 31.  
32, 33, 34. et  
35 fig. hu-  
ius cap. G.  
H, I, K.

h in medio  
A, B, C, D,  
E, F fig. 1.  
i fig. cap.  
14 R.

k in a fig.

l 2 fig. Y.  
m infimū  
N et O fi.  
cap. 14.  
n 2 fig. Z.

o figura  
cap. 17.

p 2 fig. 4.  
fig. b, i, k.  
q hæc pro-  
ponit 1, 2 fi.  
r 1 fig. B.  
s 12 fig.  
L, L.  
t suprema  
sedes 1, 2 fi.  
u superior  
sedes 1, 2 fi.  
cap. 17.  
x supra A  
fig. 1.  
y fig. cap.  
14 et com-  
mittitur G.  
z fig. cap.  
14 R pro-  
ximū h.

Foramen dor-  
sali medullæ pa-  
ratum.

Superior sacri  
ossis sedes en-  
in medio.

necti

a 1, 2 fig. neſti cernimus. Dein poſterior primi oſis ſedes duos aſcendentes educit<sup>a</sup> pro-  
 ceſſus, pari modo exculptos, quo aſcendentes uertebrarum in lumbis proceſ-  
 ſus<sup>b</sup> excauantur. Hiq; ſacri oſis proceſſus admittunt deſcendentes quintę lum-  
 borum uertebrę proceſſus, eadem penitus ratione, qua lumborum uertebrę  
 c 1, 2 fig. d. inuicem eiufmodi proceſſibus coarctantur. Sexti uerò oſis humilior<sup>c</sup> pars ad-  
 modum gracilis (uti & ipſum os exiguum occurrit) nullos deſcendentes adi-  
 piſcitur proceſſus, quibus ſibi ſubdito oſi coarticularetur: uerùm duntaxat in  
 orbiculare, ſed paulo latius, deſinit tuberculum, aut corpus, quod primo oſis  
 d 1, 2, 3 fi. coccygis<sup>d</sup> oſiculo non aliter committitur, quàm uertebrarum corpora inter  
 ſe ampli cartilagineiq; ligamenti medio cōſtringuntur. Tranſuerſis oſis ſacri  
 e 2 fig. N. oſium proceſſibus in externo latere, parumper uerſus poſteriora, ſinus excul-  
 pitur, cui alterius lateris ilium<sup>e</sup> os ualidiſſimè coarctatur. Eſt autem hic ſinus  
 f quod eſt ſupra S, N. admodum aſper & inæqualis, ac primum quidem per ipſius longitudinem in  
 c fig. 1, cap. medio extuberantem habet<sup>f</sup> lineam, aut amplioris lineę inſtar prominens tu-  
 berculum. quod ſinum ipſum rurfus ueluti in unum<sup>g</sup> anteriorem ſinum, & al-  
 g 2 fig. O, terum<sup>g</sup> poſterioreſ dirimit. Anterior utcunq; ſimplex eſt, aſper tamen, & in-  
 h 2 fig. N. æqualiter admodum inciuſus cernitur. Poſterior altius cauatur: at in medio<sup>h</sup> pro-  
 i 2 fig. P. ceſſum oſtendit tranſuerſum extuberantem, qui ſinum hunc poſterioreſ de-  
 nudo in unum<sup>i</sup> ſuperiorem & alterum<sup>i</sup> inferiorem interdiuidit. His ſinibus tu-  
 k 2 fig. Q. beribuſq; conueniunt ilium oſſa<sup>k</sup>, mutuiſ tuberibuſ ſinibuſq; donata. Verùm  
 l 2 fig. P. interim ſinus iſti & tubera, leui lubricaq; cartilagine aliorū ſinuum capitumq;  
 m 2 fig. Q. ad articulationem fabricatarum modo haud obducuntur: quum nihil præter  
 n 3 fig. C. cartilaginea educant ligamenta, ſacrum os robuſtiſſimè ilium oſibus citra lu-  
 c, d, d, e, b, r, g. bricum planumq; contextum ita ferè adneſcentia, ut appendices ſuis compin-  
 guntur oſibus. Sinus iſti tranſuerſis ſacri oſis proceſſibus inſculpti, & poſte-  
 riori ſede non peruijs foraminuliſ ligamētorum educendorum gratia exaſpe-  
 rati, ad tria potiſſimum ſuperiora ſacri oſis referuntur oſſa. quippe inferiora  
 o 11 muſ. proceſſus habent tenues, at amplos tamen, & mutuo cōtinuos, ex quibuſ<sup>o</sup> muſ-  
 tab. 9. ſculus pronalcitur, quem femur mouentiū quartum ſtatuemus. Verùm tranſ-  
 uerſus quinti oſis proceſſus ea parte, qua tranſuerſo ſexti oſis unitur proceſſui,  
 p 1, 2 fig. tuberculum utcunq; craſſum & prominens in hoc educit, ut opportune duo  
 q 10 muſ. ligamenta hic ſacro oſi implantarentur: quorum alterum ab acuto coxendi-  
 tab. 7, c, d. cis oſis<sup>q</sup> proceſſu enaſci docebitur, alterū ab elatiori poſterioriq; ſede appen-  
 r 2 fig. C. dicis, qua coxendicis os donari audies. Cæterum<sup>r</sup> ſpinæ, poſteriores<sup>r</sup> uel pro-  
 s 20, d. ceſſus, etiam oſis ſacri oſibus obtigerūt, tanto in ſinguliſ oſibuſ proceriores,  
 s cuiuſſimè fig. l. quanto oſi ipſum, unde prodeunt, grandius ſuperiuſq; eſt. Sextum tamen os, &  
 t 2 fig. d. quintum ferè, ea<sup>t</sup> ſede, qua ſpinam alia educunt, quaq; dorſaliſ medullę porri-  
 d, d. gitur terminus, dehincunt, uarięq; & non omnibuſ pari ſemper modo, aperta  
 u 2 fig. i. ſunt, & ſpinis deniq; deſtituuntur. Vtcunq; uerò ſit, nulla ſacri oſis ſpina, ſi mo-  
 h. dō quid rectè aſſequor, ne minimum quidem ſurſum conniuet, at deorſum  
 omnes potiſſus ſpectant. & non aliter quàm in cæteriſ uertebris, cum tranſuer-  
 ſiſ proceſſibuſ interuallum quoddam & ſedem conſtituunt, in quam nonnul-  
 li dorſum mouentes<sup>x</sup> muſculi aptè reponuntur, & à qua illi iuſtiſſimè cum alijs  
 x 13 muſ. hinc initium ducentibuſ muſculiſ enaſcuntur. Vnde etiam poſterior hæc ſacri  
 tab. 7, c, d. oſis ſedes inſigniter aſpera, ac ueluti cariola eſt, ut muſculorum ſcilicet princi-  
 tab. 7. pia commo diuſ ab illa cum ligamentiſ educātur. Tota dein gibba & curua ſpe-  
 y 10 muſ. ctatur, quo ita tutiuſ propugnaculi ritu ijs quaſ ſacri os continet partibuſ præ-  
 tab. 7. muſ. eſſet. Anteriori uerò ſede id leue ac latiuſ eſt, non autem aſperum, ſed ſinum ca-  
 z integra- uumq; quo aptiorem illiſ organiſ, quæ cum alijs ipſi commiſiſ<sup>z</sup> oſibuſ inſtar  
 rum fig. 9 committi-  
 tur M.

Inferior cuiuſſi-  
modi.Lateralis cuiuſſi-  
modi.Poſterior ſedes  
cuiuſſi-  
modi.

Anterior.

Foramina ner-  
uus emittendis  
parata.

peluis cuiusdam complectitur, sedem efformet. ac infimam dorſi regionem, ueluti ſemicircularem, non autem rectam cum ſubdito ipſi coccyge oſſe conſtituat. Interdum, neq; id infrequenter, os ſacrum quinq; tantum extruitur oſſibus, in tota ferè ipſius fabrica nihil aliàs peculiare oſtendens, quàm in forami- num neruus ipſius tranſmittentiũ, uti paulo poſt dicam, ſerie. A' dorſalis enim medullæ<sup>a</sup> parte in ſacro oſſe reſpoſita, ſexplerunq; neruorum pullulant paria, eorumq;<sup>b</sup> primum inter quintam lumborum uertebra, & primum ſacri oſſis os perinde egreditur, ac nerui in lumbis & thorace è uertebraſũ proſiliunt lateribus. A' tergo namq; corporis primi oſis, & ante priorem aſcendẽtis eiufdem oſis proceſſus ſedem,<sup>c</sup> ſinus utrinq; cauatur, qui cum quintę lumborum uertebrae ſinu commune foramen conſtituit, quo ſui lateris neruus elabitur, & uena arteriaq; dorſalem medullam hic petentes ingreditũr. Porro reliquis neruorũ paribus, foramina non parantur in ſacri oſis lateribus ſuperiũs ilium oſium connexu occupatis, & inferiũs ita per tranſuerſum tenuibus, ut in late- ra nimis longo ductu perforari nequiuerint. adeò, ut quando ſacrum os ſex ef- formatur<sup>d</sup> oſſibus, in anteriori & poſteriori ipſius ſedibus, decem orbicularia ſpectentur foramina, in utroq; nimirum earum ſedium latere<sup>e</sup> quina, quæ in- ter oſſa, quæ inuicem illa coaleſcunt, exculpta, tanto arctiora reddũtur, quo hu- miliorem in ſacro oſſe ſedem obtinent. uti &<sup>f</sup> nerui, quibus uiam præbẽt, non pari mole inferiũs & ſuperiũs conſtant. Pari etiam occasione, foramina in po- ſteriori ſede cælata, illis ſunt minora, quæ in anteriori ſpectantur: quòd hac ſe- de craſſiores nerui, quàm illa elabuntur, quodq; plures inſignioresq; uenæ & arteriæ per anteriora foramina, quàm poſteriora, ſacrum os ſubeunt. Forami- nibus itaq; hunc in modum ſe habentibus, ſecundum ſacri oſis neruorum par- duos antrorſum, & totidem retrorſum educit ramos, per quatuor inter pri- mum os & ſecundum appaſata illis foramina. Dein alia inſuper paria eum in modum proſiliunt, ut excidens par ad ſubditum os, quemadmodum & in uer- tebris, numero referatur. Præter hæc autem foramina, neruorum occasione inciſa, in poſteriori ſacri oſis ſede,<sup>g</sup> alia ſubinde occurrunt, inter oſium ſpinas, in uiam, qua dorſalis medulla ducitur, pertinentia, & ligamenti perinde op- pleta, ac interualla foramina<sup>h</sup> uel inter ſpinas reliquarum uertebraſum conſpi- cua. Cæterum ſi quando ſacrum os quin ſtantum conſtat oſſibus, tunc in an- teriori ipſius ſede duo deſunt foramina, ſextoq; pari in poſteriori tantum ſede (at uerſus latera magis) iter exculpitur, alia tunc etiam obuia inferioris ſedis ſa- cri oſis cum coccyge oſſe articuli ſpecie. Supremum enim coccygis oſis oſſi- culum, tum ſinu elatiori ſuæ ſedi exculpto, quinti oſis ſacri corpus nõ tantum excipit, uerũm duos etiam inſuper exerit proceſſulos, qui ſurſum eduçti, quin- ti oſis ſacri oſis proceſſulis deorſum ſpectatĩbus coaleſcunt: & exigua admo- dum ligamẽti cartilaginei portio, reliquo nexui interuenit, propemodum oſſis ſacri oſium mutua ſtructure reſpondenti. quum interim, quando ſex ſacri oſis ſeſe offerunt oſſa, coccygis oſis<sup>i</sup> elatiſſimum oſſiculum proceſſulos nul- los poſteriori in ſede extollat, & laxè ſexti oſis ſacri oſis<sup>j</sup> corpori dũtaxat, idq; cartilaginei<sup>k</sup> ligamenti medio, committatur. Oſſiculum hoc ad ſinus ſui late- ra utrinq; tranſuerſim ſurſumq; extuberat, & hinc ſenſim uerſus inferiora an- guſtum redditur, & ſecũdo coccygis oſis<sup>l</sup> oſſiculo perinde ut ſexto oſis ſacri oſis<sup>m</sup> firmatur. Secundo oſſiculo dein tertium & quartum ſuccedunt, eodem penitus modo inuicem commiſſa, tantoq; arctiora breuioraq; quanto unum- quodq; in ipſa ſerie humiliorem locum obtinet. Quartum<sup>n</sup> oſſiculum ſuo mu- crone, quo recti inteſtini poſticam, infimamq;<sup>o</sup> ſedem contingit, in<sup>p</sup> cartilagi- nem ter-

a 2 fig. ca.  
11 lib. 4. F.  
G, W char.  
24, 30.  
b 2 fig. ca.  
11 lib. 4.  
char. 25.  
c 12 fig.  
char. 21.

d ut in om-  
nib. noſtris  
figuris.  
e 12 fig.  
char. 25.  
3, 4, 5, 6.  
f Specta-  
cos in 2, 3  
fig. cap. 11  
lib. 4.

g 2 fig. f.  
h b.

i 1, 2, 3 fig.  
G.  
j 1, 2 fig. a.  
k 1, 2 fig. b.

l 1, 2, 3 fig.  
H.  
m 3 fig. b.  
n 3 fig. k.  
o 1 tab. fi.  
cap. 49 lib.  
2 M.  
p 3 fig. c.

Quid eneniat,  
oſſe ſacro tantũ  
quinq; oſſibus  
exiſtũs.

Coccygis oſis  
deſcriptio.



nem terminatur, eiusdem usus gratia, qua uertebrarum spinis, reliquorumq; ossium extremis cartilagine obnasci retulimus. Præterea his quatuor ossiculis nullū inciditur foramen, quo dorsalis medulla incedat, aut ex quo ulli exiliant nervi. Horum dein ossiculorum substantia, appendicum substantiæ correspondet. fungosa namq; est, & rara, & in pueris admodum cartilaginea. Ipsorum insuper uniuersus contextus ex ampliori basi in mucronem definit, introrsumq; insigniter obliquo flexu incuruatur: & laxi nexus occasione, in partu, ac interdum in magna ani apertione, est mobilis. Quum itaq; is quatuor illorum ossiculorum contextus ueluti ex basi quadam sensim in arctū cesset, incurueturq; & quodammodo pectoris ossis modo, priusquā exarescit, obscure rubeat, uerisimile est, ueteres, qui pueros artem resecandi corpora docebant, hunc ad oculi rostri contulisse speciem: hincq; *κόκκυγας* præcipue, uti prius diximus, appellasse, ut & *ὀστέον*, quodd contextus ille, mobilibus in auiū cauda ossiculis, non uerò quadrupedum caudæ initio, magna ex parte conueniat. Quam uerò nostra hæc sacri ossis & coccygis ossis historia, Galeni congruat descriptionibus, promptè expendes, si illas (quum nimirum sibi undiq; haud respondeant) prium mutuo, & dein cum nostris contuleris. In libris namq; de Partium usu, sacri ossis non semel incidit mentio: idq; inibi quatuor ossibus extrui docetur, nullo interim uerbulo de coccyge esse ascripto. Et præterquam quod coccygis ossis Galenus ijs libris non meminerit, haud ambigendum est, hoc ipsi illos libros scribenti, & iustum neruorum numerum neutiquam tradēti, fuisse incognitum. Quatuor enim ossis sacri ossa esse docens, talem illorum extremo cartilaginem adnasci subiungit, qualem nos coccygis ossis mucroni obtingere diximus, & in quam ossium fines alteri ossi non commisi, perpetuò ferè degenerant. Præterea in duodecimo de Partium usu, trasuerfos sacri ossis processus tenues & subtiles esse asserit: quum in libro de Ossib. eos (uti mehercule sunt) crassos & amplos esse doceat. Dein hoc libro, sacrum os tantū tribus efformari ossibus percenset, ijs alia tria subijci scribens, quæ coccygis nomine donauit. In libris quoq; de Administrandis sectionibus, sacri ossis & coccygis subinde meminit, quemadmodū nonnunquam in Commentarijs in Hippocratis librum de Articulis: uerū ea prorsus (quoad ipsius sententiā assequor) ratione, qua in libro de Ossibus plenius quā alibi illa describuntur. Ut autem accuratius modò iudices, num illic simiæ potius, quā hominis ossium tradatur constructio, lubens nunc enarrabo, qui ossa sub lumborū uertebris reposita, in simijs & canibus occurrant. quod uel ideo faciendum est diligentius, ut illorum modis omnibus execranda constet impudentia, qui quum Galenum homines magis quā simias descripsisse contendunt, ipsius libros ita indies turpissimè deprauant, & nescio quid non tandem librarijs scribisq; imponentes, magis magisque præstant, ut illi tandem Chimæræ cuiusdā modo, neq; simijs, illis uel quæ Galenus potissimum secuit brutis, neque hominibus accommodari possint.

In simia itaq; & cane, sub infima lumborū uertebræ, os quoddam reponitur, tribus efformatū ossibus, ita inuicem iunctis, ut in anteriori sede, iuxta eorum medium, talem connexus ostendant speciem, qualem uertebrarū corpora mutuo cōpacta exhiberent, si quando sic coaluissent, ut ne tantillum quidem moueri possent, & in ipsorum medio omnis cartilago temporis successū iam euaniisset. quamquam & in catulis, trium illorum ossium unio, cartilagine etiam aliqua, perinde ac appendicum connexus, repleatur. In lateribus anterioris diætæ nunc sedis, hæc ossa in ætate prouectis uix aliquā coalitus exprimunt imaginem, quemadmodum & posterior ipsorum sedes, omnino (nisi fortè in ad-

Qui Galenus  
sacrum os &  
coccygis descri-  
psit.

Lib. 12. 13. 15.  
& alibi.

Cap. 11. & 12.

Lib. 2. 6. post illi-  
mum.

Lib. 3. Comen-  
tariorum.

Os tribus in si-  
mia & cane  
efformatū ossi-  
bus, quod sa-  
cris uocamus.

q. 4. si. cha-  
ract. 1. 2. 3.  
& figura 5  
posteriorē  
ostendit se-  
dem.

modum catulis) continua conspicitur. Primum os superiori sua sede, non secus ac quæpiam lumborum uertebra, orbiculare obtinet corpus, infimæ lumborum uertebrae ita commissum, ut lumborū uertebrae mutuò compinguntur. Dein primum id os ascendētes processūs exerit insinuatos, quibus infimæ lumborum uertebrae descendentes excipiuntur processus. Inferior tertij osis sedes inferiori cuiusvis lumborū uertebrae sedi in hoc respondet, quòd orbiculari corpore & descendētibz processibus, quemadmodū & illa, donetur, quibus subdito sibi cuida' osiculo haud aliter coarticulatur, ac uertebrae in lumbis inuicem cōponuntur. Trium istorum osium latera, quæ transuersis ipsorum constant processibus admodū amplis & latis, sibiq; inuicem continuis, sinum quoq; uersus posteriorem eorundem sedem habent insculptū, qui asper & inæqualis, sui lateris illiū osis ad hæc ossa nexui famulatur. Sinus iste ad proportionem tanto humani osis sacri sinu breuior est, quanto illiū os in homine multo latius quàm in quadrupedibus cernitur. Deinde transuersi processūs secundi osis in his magnitudine non excedunt primi osis processūs, secundūq; os modis omnibus minus est primo, ut & tertium secundo. Tribus his osibus continuum etiam insculpitur foramen, quo dorsalis medulla prorepat, & posteriori sua sede singula spinā posteriorem uel processum educūt, fursum potius, quàm deorsum, etli tamen non insigniter, spectantē: & tanto minorem, quanto os à quo exoritur, in serie minus existit. In spinarū interuallis nulla occurrunt foramina, neq; ossa quicquā inibi dehiscunt, imò spinæ instar unius lineæ inuicem continuæ simul plerunq; protuberāt. Foramina tamen neruis emittēdis parata, in anteriori sede & posteriori, quatuor se exhibent, utrinq; nimirū bina, quibus secundi & tertij parium neruorū, qui ad hæc ossa referuntur, ramis antrosum retrorsumq; iter præbetur. Primo autē pari foramen eo pacto, quo in lumborum uertebis, paratur, ad tergum uidelicet corporis primi osis, & humillimæ lumborū uertebrae. Dorsalis medulla his animalibus neutiquam in tertij osis extremo finitur, sed deorsum per alia insuper' osicula incedit, uiam neruis, lumborum uertebraarū modo offerētia, ad posteriorem nimirum suorum corporum sedem, non uerò etiam anteriùs, quo secundū & tertium osis sacri osiū paria præcipuos ipsorū educunt ramos. Nerui itaq; sub tertio ossē exilientes, ac primū dorsalis medullæ in subditis illi osiculis contentę neruorum par constituentes, foramina' inter tertiu os & primū id osiculū perinde obtinēt, ac nerui è lumborū uertebis egredientes, à tergo nimirum corporū uertebraarum. Sub tertio igitur osis sacri ossē, alia tria, interdumq; in caudatis simijs & quibusdam canibus plura succedunt osicula, lumborū uertebis cōformatione simillima. In nullo namq; ab illis imagine discrepant, nisi quòd transuersos processūs latiores, quàm lumborū uertebrae, obtinent, & eosdem magis deorsum, quàm fursum coniucentes: dein quòd spinā aut nullam, aut perquam pusillam à se porrigunt. Corporū enim forma penitus illis respondet uertebis, nisi fortē pro osiculorū mole, hæc aliquis, minima quęq; expendens, ampliora esse astrueret. In ascendētibz uerò et descendētibz processibus ne minimum quidem uariant; pariq; articulatione cōtextu' uel illorū supremum cum infima sacri osis parte, & ipsa dein inuicem cōmittuntur, quo lumborū uertebrae inter se. adeò, ut in horum osiculorū quoq; corporum nexu, cartilaginis, aut potius cartilaginei ligamenti notatu digna occurrat portio. Præterea haud secus quàm in lumborū uertebis, uia dorsali medulla in his osiculis paratur, illaq; tribus neruorū paribus iter perinde ac lumborū uertebrae accomodant, post tergum nimirū (uti & prius diximus) suorum corporum, & ante ascendentes descen-

r 4 fig.  
charact. 4.

*Cuiusmodi osicula in simia et cane sub sacro ossē occurrant, adeoq; ipsorum cœcægis osis descriptio.*

s 4 fi. cha  
ract. 45, 6.  
Speñantur  
tamē & in  
5 fig.

t 4 fig. in  
ter char. 3  
& 5.  
u 4 fi. cha  
ract. 45, 6.

descendentesq; eorum processus. Infimum<sup>7</sup> ofsiculum, è quo dorsalis medulla  
 quodammodo inconiugata simplexq; profilit, non caudatis simijs aliorum of-  
 sium extremis similiter, in cartilaginem fortè cessat. Canibus uerò & caudatis  
 simijs, quibus hæc ofsicula sunt impense laxa & mobilia, infimo ofsiculo alia  
 permulta continuo ordine adnectuntur ofsicula, dorsalis medullæ gratia non  
 perforata, sed solida & oblonga, & superius inferiusq;, quæ inuicem cartilagini  
 ligamenti beneficio, quemadmodum uertebrarum corpora cõpinguntur, cras-  
 siuscula: in medio autè tenuia, caudamq; ut semel dicam, constituentia. Quan-  
 doquidem igitur in simia & cane, mox sub lumborū uertebris unum occurrit  
 os, ex tribus<sup>8</sup> ofsibus, tanquam è uertebris quibusdā sic coalitum, ut ipsorū ne-  
 xus à uertebrarum cõmissura potissimum differat, quod in illo nullum cartila-  
 ginofum ligamentum, perinde ac<sup>9</sup> inter uertebrarum corpora reponatur: &  
 quum os istud spinas sursum magis quam deorsum uergētes profert, quumq;  
 secundo & tertio suorum neruorum paribus (ut hic Galeno aliquid conceda-  
 mus) foramina anteriùs & posteriùs exculpta habet, arbitror inquam, illi id os  
 in libro de Ofsibus sacri ofsis loco descriptū. Item quia in simijs & canibus sub  
 isto tria ut minimū succedunt<sup>10</sup> ossa, quæ dorsalem medullam quoq; transmit-  
 tentia, in corporū suorum nexu, ligamentū cartilagineum secus quàm tria eor-  
 um animalium ofsis sacri ossa, adipiscuntur: & quum ideo citra multam lon-  
 gam<sup>11</sup> ue decoctionem, aut magnam aliàs uim, haud aliter quàm lumborū uer-  
 tebræ inuicem promptè diuellantur, quumq; hæc ossa neruos duntaxat à ter-  
 go suorum corporum, non uerò antrosum quoq;, emittant, mihi persuadeo,  
 Galenum illa coccygis ofsis nomine donasse. existimoq; ipsum inter sacri sui  
 ofsis cum coccyge ossē, in nexu & neruorum educatione ac foraminibus, præci-  
 puas statuisse differēcias. Quippe quum ofsis coccygis ofsibus plus cartilaginis,  
 quàm sacro ofsi tribuit, eam subaudiendam ducō<sup>12</sup> cartilaginem, quam ueteres  
 præcipuum corporum uertebrarū esse uinculum, secus atq; Galenus, affirma-  
 bant, quanquam ego subinde cartilaginofum (uti reuera est) appello ligamen-  
 tum. Nequaquam enim cum nonnullis sibi admodū peritis Galeni librorum  
 corruptoribus existimo, illum hic de ea loqui cartilagine, quæ ofsium adnace-  
 retur lateribus. quum plus eius cartilaginis, ac cartilaginei etiā ligamenti, ilium  
 ossa excipientibus<sup>13</sup> sinibus, idq; potissimum posteriori ipsorū sede, qua ilium  
 ossa nonnihil à sacro ossē dehiscunt, obtingat, quàm ofsibus quæ mox ilium of-  
 sium cum sacro connexui, siue in<sup>14</sup> simia, siue in<sup>15</sup> homine subsunt. Quod uerò  
 corruptores illi, ne Galenus<sup>16</sup> sena humanorū ofsium præterisse aut ignorasse  
 uideretur foramina, in Capite ipsius de coccyge ossē adijciunt, neruos illius of-  
 sis & anteriùs quoque educi, hoc à librarijs omissum, intrepidè contententes,  
 ideo uenit improbandū, quod, uti antea in ofsium nexu coalitū ue, sic modò  
 in neruorum ductu egressuq; omnem secludant differentiā, qua Galenus coc-  
 cygis sui ossa à sacri ofsibus peritè admodumq; anatomicè ex siniarū canumq;  
 fabrica distinxit, cui posthac Galeni descriptiones neutiquam accõmodari po-  
 terunt. Cæterum qui uel sic etiam adauctæ, aut deprauatę potius, uitiatęq;, ad  
 hominis decem ossa lumborū uertebris succumbentia referātur, nequeo latis  
 colligere. Vt enim sex primorum ofsium, quæ sacri ofsis loco mihi describun-  
 tur, inter se coalitum, & in una serie ex ampla basi quodāmodo in mucronem  
 contextum, & neruorum parem antrosum retrorsumq; productionē, & spi-  
 nas haud sursum eminere, taceam, nescio quam obrem quatuor<sup>17</sup> ossa, quæ coc-  
 cygis ofsis loco à me sunt pertractata, nullamq; dorsali medullę uiam præbent,  
 Galenus neglexisset, quum duo horum superiora tam sint insignia, & illa con-  
 stent fa-

Galeno sacri  
 os coccygis  
 os ut in simia se  
 habent descri-  
 pta.

In fine capituli  
 11. ubi etiā pri-  
 mo pari uide-  
 tur eundem e-  
 gressum cum 2  
 & 3 parvis ex-  
 quisiue præbe-  
 re.

Cap. 8. lib. de  
 ofsibus.

Talis est Gale-  
 ni liber, cum  
 Sylui edius  
 commentarijs.

π 4 f. cha  
 rad. 6.

γ 4 f. cha  
 rad. 1, 2, 3.

ζ fig. cap.  
 14 R, R.

α 4 f. cha  
 rad. 4, 5, 6  
 quos confi-  
 res cū eius-  
 dem figura  
 char. 1, 2, 3.

β fig. cap.  
 14 R, R. et  
 figure capiti  
 ti 40 lib-  
 1 inferte cha  
 rad. 1.

c 2 fig. N,  
 N, O, O, P,  
 Q.

d 4 f. cha  
 rad. 4, 5, 6.  
 E, F.

f 1 fig. no  
 tantur sora  
 mina alteri-  
 us lateris,  
 cha. 4, 5, 6.

g 1, 3 fig.  
 G, H, I, K.



stent fabrica, tantumq; cum reliquis suppeditent usum, ut ab humanum corpus secante non debeant facile præteriri. Verùm illi librorum Galeni euerfores aiunt, nostrum coccyx os ab ipso dedita opera præteritum, quòd è monumētis cum sacro osse non effodiantur. aut quòd Galenus illa perinde ac os *u* referens, & cordis os, & ofsicula sesamo femini comparata, tyronibus non uoluerit in libro de Ossibus proponere. aut quòd omnia quatuor ossa, unius cartilaginis loco habuerit. Postremumq; istud in primis approbat, ne in libris de Vsu partium Galenus alijs suis scriptis minus coaptari possit. ut scilicet tria sui ossis sacri ossa trium loco, & tria ossa sui coccygis ossis unius tantum uice enumerarentur. & nostrum coccyx os cartilago ea esset, quam quarti ossis, sacri ossis extremo adnasci, in ijs libris prodidit. Hæc quum referuntur, ac meæ sententiæ obijci sentio, illos mihi audire uideor, qui Galenum & Auicennam, aut nescio quos tandem medicos & philosophos, aut pugnantia eiusdem autoris scripta, inter se non dissentire, conantur admodum ridiculè magnoq; supercilio ostendere: eaq; autoribus ipsis imponunt, quæ ne per somnium quidem cogitarunt, quæq; ab illorum sententia sunt prorsus aliena. Si enim Galenus nostrum coccyx os in Capite libri de Ossibus undecimo & duodecimo, idcirco omisisset, quòd illius tractatio ad eos qui introducuntur, haud pertinere: indubiè in libri de Ossibus fine, nostri coccygis perinde meminisset, ac aliorum ofsiculorum, quæ alibi plenius descripsit. quum tamen in nullis Galeni libris, istius nostri coccygis incidat mentio. Quod autem id è monumētis aut sepulchris à sacro osse dissolutum occurrit, ipsiusq; ofsicula uertebraꝝ modo disuncta spectantur, argumēto est, Galenum ueterum descriptiones suis simijs accommodasse, quòd nimirum ossa ipsarū sacro osi succedentia inuicem, marcescentibus ligamentis dissoluantur, secus quàm tria nostri sacri ossis humiliora. Necesse namq; est cum his hominib. de nullo sacro hominis osse, quàm quod senis extructum sit ossibus, sermonē instituere. Nam quum quinque aut quatuor tantum in homine reperiuntur ossa, nostrum sacrum os cōstituentia, tunc illa nullo penitus modo Galeni sex ossibus accommodari queunt, quum ne numerus quidem ossium respondeat, dorsali medullæ uiam offerentium. Dein si dissolutorum ab inuicem in cœmiterijs ossium habenda esset ratio, quid de uertebꝝ, costis, manus, pedis, pectoris, & omnium ferè partium censendū esset ossibus? quum hæc secus quàm nostri sacri ossis ossa sese offerant dirempta & diducta? Porro quum fingunt Galenum coccyx nostrum os meritò cartilaginis loco habuisse, quòd ipsius ossa in pueris mollia & cartilaginea spectētur, & ut ipsi aiunt, quatuor tantum cartilagines esse appareant, est eiusmodi, ac si Galenus puerorum potius, quàm mediæ ætatis hominum, aut brutorum historiam texuisset. At hi nimis obiter expendunt, hanc in multorum ossium substātia, in tota appendicum ratione, & numero in primis, in costarū cartilaginibus, & alibi ferè centies, simijs & canibus, utpote siccissimis, maximeq; ossis, ut sic dicam, animalibus, elegantius cōgruere, quàm homini, præ cæteris ferè humidissimo & molli. At per me integrum est, quiduis ab illis hominibus comminisci, ac cum Galeni ab ipsis deprauata sententia suis auditoribus imponere, modò pro mea uirili ueram hominis exhibeam studiosis fabricam. qui tunc maxime Galeni libros, tanquam sacrosancta, non duxerim emutandos, quum in magno infinitoq; hominis cum simijs & ijs brutis, quæ Galenus potissimum aggressus est, discrimine, Galeni historia illis quàm homini est cōformior: præcipuè si quando discrimen illud, quantumuis insigne, à Galeno non uideatur fuisse animaduersum, uel alioquin expressum. Quinimò ipse audiendus est initio tertij libri

Commen-


Commentariorum in Hippocratis librum de Articulis, quum ait se de Ossibus librum conscripisse, cum sigillatim quale unumquodque os esset, præcipuè quidem in ipsis hominum aridis cadaueribus, sin minus, in simijs certè, diligenter inspexisset: ita pulchrè indicans, se omni studio saltem simias enarrasse, hasque homini in ossium constructione esse simillimas. Vnde etiam nullus omnium Anatomicorum Galeni librorum mihi magis, quàm hic de Ossibus, illi uidetur ascribendus: isque sanè est, quem toties prædicat, grauiterque dignum censet, qui subinde legatur, totusque, quum ita succinctus sit, memoriæ commendetur. Et quamuis ille exactius simijs quàm hominibus respondeat, paucioribus tamen falsis scatet descriptionibus, & mendis profectò, quàm cæteri omnes: ut in scholis apertè, & sanè (ita mea secudent Superi) citra omnem prorsus affectum, candidè solitus sum in rerum præsentia ostendere. utcunque interim quorundam senum maleferiatorum, & inuidia (quod hæc nimirum ipsos lateant) tabescentium calumnias, falsissimasq; obrectationes nequeam subterfugere.

*Pro cæteris  
Anatomicis  
Galeni libris,  
librum de ossi-  
bus ipse tri-  
buendum.*


## DE THORACIS OSSIBVS.

## Caput XIX.


PRIMA DECIMIONI CAPITIS FIGURA, QUÆ  
THORACIS OSSIVM INTEGRÆ COMPAGO ANTERIORI  
facie exprimitur, duodecim nimirum thoracis uertebrae, & duodecim utrinq; costae,  
unà cum pectoris osse pluribus efformato ossibus.



SECUNDA DECIMIONI CAPITIS FIGURA,  
POSTERIOREM INTEGRÆ THORACIS  
ostium compagis faciem proponens.



TERTIA FIGURA EX MEDIIS VERTEBRARUM THORACIS, TRES CONTINET VERTEBRAS, DEXTRO latere expressas, unâ cum mediâ eiusdem lateris costa. Atq; huius figura beneficio, costarum ad vertebrae articulatione, dein & costarum quoq; ductus ostenditur.



QUARTA FIGURA EXPRIMITUR COSTÆ POSTERIOR ET VERTEBRIS PROXIMA portio, ut capitula exacte in conspectum venirent, quibus novem superiores costae vertebrae articulantur. Præterea huius costae partem effregimus, ut ossæ costarum interiori in sede ostenderetur substantia, & indicata.

Φ.



QUINTA FIGURA PORTIONEM EXHIBET DUODECIMÆ COSTÆ POSTERIORI facie, & qua duodecima thoracis vertebrae coarctatur, depictâ. Hanc quoq; ubi Φ positum cernis, à reliqua sua portione effregimus, ossæam costae substantiam ostensuri.

SEXTA



## SEXTA FIGURA,

ANTERIOREM PECTORIS

ossis à cartilaginibus costarum  
liberi partem pro-  
ponens.

## SEPTIMA, PECTO-

RIS OSSIS CARTILAGI-

nibus costarum liberi postero-  
rem commonstrans  
faciem.

- B, B 1, 3 Cartilaginea costarum substantia principium. Linea enim B & A intercedens, eius substantia cum ossa coalitum notat.
- C 1 Prime costae cartilaginis cum pectoris osse coalitus.
- D 1 Secundae costae cartilaginis cum pectoris osse articulatio, à qua etiam prompè subsequentiū quinq; costarum articuli species colligitur.
- E 3 Cartilaginis capitulum, quo secunda costa ac quinq; subsequentes, pectoris ossi inarticulantur.
- F, F 1 Terminus cartilaginis illegitimarum costarum, qui acutus spectatur.
- G 1 Sedes, qua undecima costa cartilago à decime cartilagine frequenter dehiscit.
- H 1 Sedes, qua duodecima costae cartilago ab undecima perpetuò dirimitur.
- I, I 1 His sedibus costarum cartilagine inaequaliter protuberant, sua intervalla plerumq; opplentes.
- K, K 1, 4 Hac regione interna mediarū costarum sedi sinus oblongus exculpitur, cui uena, arteria & nervus insidet.
- L 4 Capitulum, quo costae uertebrarum corporibus articulantur.
- M 4 Capitulum, quo costae transuersorum processuum apicibus articulantur.
- N 5 Species capituli, quo undecima & duodecima costae uertebris articulantur.
- O 4, 5 Tuberculum, in costarum posteriori sede iuxta apicem transuersi uertebrae, cui costa articulatur, processus consistens, ad quod undecimus dorsum mouentium musculi complentur.
- Q 4 Intervallum, inter L & M apprens, quod asperum ligamenti producendi gratia efficitur.
- R 4 Haec quoq; sedes, infertionis musculi thoracem mouentium quarti gratia potissimum exasperatur.
- S, T, U 3 Tres simul contextae uertebrae.
- X 3 Sinus duobus uertebrarum corporibus communis, cui costae capitulum inarticulatur.
- a 3 Costae ad uertebrae corpus articulus.
- b 3 Sinus in transuerso uertebrae exculptus processus, cui costa etiam articulatur.
- c 3 Costae ad transuersum processum articulus.
- d 3 In suprema uertebra S insignita, etiam d talis sinus indicatur, qualem inter mediam & infimam uertebrae X expressimus.
- e 3 Sinus articulandae costae in transuerso processu celatus, uertebrae S insignita.
- f 3 Costae regio in posteriora maxime exporrecta. Ab a igitur & c ad f costae à uertebris deorsum oblique in posteriora fertur: ab A uerò & B ad E, sursum in anteriora circulatim reflectitur.
- g, h, i, k 1 His characteribus in prima figura pectoris os notatur. ac g quidem ad h, primum pectoris indicatur os. h uerò ad i usq; secundum. i ad k usq; tertium. k autem mucronatam pectoris ossis notat cartilaginem. Verum iam exathus pectoris os in sexta & septima aggrediemur.
- l 6 In anteriori primi ossis sede protuberans instar trianguli pars, quae t, q, & r posset circumscribi.
- m, n 6 Sedes utriusq; ad partem eam protuberantem depressa.
- o 7 Posterior primi ossis sedes, quae utcumq; caua cernitur.
- p 6, 7 Sedes primi ossis, cui primae costae cartilago innascitur.
- q, r 6 Sinus primi ossis, quibus claviculae capula articulantur: ac r etiam in septima figura dextrū indicat sinist.
- s 6, 7 Sedes inter duos claviculae nomine insculptos sinus consistens, quae lunae modo excavatur.
- t 6, 7 Hac sede primum os secundo committitur.
- u 6, 7 Communis primi & secundi ossis sinus, cui secundae costae cartilago coarctatur.
- x, y, z 6, 7 Sinus secundi ossis, quibus cartilagine tertiae, quartae, quintae, sextae & septimae costarū inarticulatur.
- y, d, e 6, 7 His sedibus interdum in pueris secundi ossis distinctiones apparent, perinde ac si ex pluribus efformaretur ossibus, per unionem mutuò coalescentibus.
- z 6, 7 Hoc tertium pectoris ossis os censetur, quod in cartilagine ensus mucroni non ab simile, ac n in sexta & septima notatam

notatam, finitur. Foramina, quibus interna pectoris ossis sedes abundat, etsi notis non indicentur, sese facile demonstrant. Inuenit modo, tres quoque figuras obiter inspicere, quibus ad presentis libri calcem totus ossium contextus triplici facie proponitur. Deinde non mediocriter inuenit, octauæ musculorū tabulæ, & decimæ quartæ tabulæ thoracem hic contueri. quod illa ueriores thoracis formam, costarumq; ductum ostendant, quam ex illis ossibus delineari queunt, quæ nostra industria rursus copinguntur. Et non satis obliquum costarum ductum commonstrant. unde etiam maius quam deceat interuallum, inter humillimæ costæ apicem & ilium ossis spinam referunt.

Quid thorax.  
Lib. 1. Histor.  
animal. cap. 7.

Pectus.  
Pectoris os.



Opificis rerum  
in thorace cre-  
ando industria.

**T**HORACEM opportunè uocabimus, quicquid costis interceptum circumscriptumq; est: non autem cum Aristotele, uniuersum corporis truncum, quem à iugulo ad pubem usq; metimur. Anteriorem uerò thoracis sedem, Pectus: & latum in ea sede consistens os, cui costæ coartulantur, Pectoris os ritè nominabimus. quò minus tres Græcorū, & in primis Galeni uoces, *θώραξ*, *στήθος*, & *σάκος*, olcitanter uideamur confundere. Pectoris itaq; os, & costæ, itemq; duodecim dorfi uertebrae, quas thoraci hæcenus ascripti, thoracis sunt ossa. Est autem admirabilis summi rerum Opificis industria, quæ totus thorax neq; osseus, neque carnosus efficitur, uerum os cum musculis uicissim alternatimq; cõmutatur. quanquam interim caluaria quidem uniuersa ossea, abdomen uerò musculosum magna ex parte extruat. Cæterum decet hæc accuratè præcipuoq; studio expendere. quum enim tria sint principia hominem dispensantia, os quidem immobile, ac nullis interstinctū musculis, primo principio circundatur, musculi uerò tertio: at secundo ex ossibus musculisq; medium quid circumtextitur. Cerebrum namq; in nullos usus musculis eguit, quum nulla caluariæ pars aut dilatatione, aut compressione indigeat. Quare etiam meritò caluaria, ueluti galea & murus immobilis ipsi circumponitur. Porro si organis iecori fa mulantibus, uentriculo scilicet, & intestinis, & uesicæ, ac demum ipsi utero, non minimo sanè generationis instrumento, aliquod tale septum circumponeretur, ubi cibum & potum uenterculus susciperet? quorsum utero gestantium tumor emineret? quæ educerentur excrementa, aut quomodo partus felici conatu propelleretur? nullo hic opem ferente musculo? Thoracis autem motus, quem maximè ad aeris inspirationē requirimus, omnino aboleretur, si solis duntaxat ossibus thorax constaret. Si uerò is solis musculis motuum opificibus cõformaretur, ij pulmoni & cordi, nulla etiam re externa eos urgente, inciderent. Vt igitur aliqua thoracis capacitas intus fiat, ac thorax etiam motu agatur uoluntario, musculi alternatim ossibus sunt interpositi. Mox autem & hoc ad securitatem non parum cordi pulmoniq; conducit: magis enim nunc muniuntur, quàm si solis musculis thorax fabricatus esset. Quinetiā ossea thoracis moles firmandis sustinēdisq; scapulis (quibus dein brachia coarctantur) mirificè confert. has enim solis inniti costis, & clauiculas nullo osse, quàm scapulis & pectoris ossè firmari, docebimus. Præterea si nullis ossibus thorax constaret, nullus esset locus, unde scapulis & brachijs & abdomini, ac alijs quibusdam membris musculi pronascerentur: neq; ullis fundamentis musculi hærent, aut consistenter. Atque hanc sanè ossi thoracis necessitatem, si quid aliud, profectò testudines pulcherrimè edocent: quæ etsi tam tuto sepiantur domicilio, tamen in pectoris & thoracis laterum sedibus elegantissimum & iucundissimum spectatu ossium demonstrant textum, in hoc duntaxat incredibili artificio creatum, ut illi priora crura innitatur: utq; musculi testudinis humerum mouentes, commodè originem sumant. Quum igitur neq; respiratio,

Omnium  
thoracis  
ossium stru-  
ctura & os-  
sig. osten-  
dunt.  
a. integre  
figur. ab O  
ad r.  
b. 1 fig. 3  
b. i.

Hæc ostē-  
dunt 7  
& musc. 14.

Hæc com-  
monstrant  
piores 6  
lib. figure.

c. 6 musc.  
14. S. T. V.  
X. 11.  
14. T. T. V.

Hæc inte-  
græ figuræ  
Q. R. S. T.  
V. Z. r. a.

ratio, neq; uox absq; thorace fieri possit: quumq; cor, insuperq; cum ipso pulmo, thorace muniri debeant, ad quatuor uelut scopos rerum Opificem in thoracis fabrica potissimum attendere oportuit: uocem nimirum, respirationem, cordis & pulmonis magnitudinem. Thorax enim, qui quodammodo ouali constat figura, tam amplus est,<sup>d</sup> quantam pulmonis molem esse oportuit. At pulmo interim thoracis sequitur formam, non autem thorax pulmonis. In pulmonis enim historia ipsum discas nulla peculiari eguisse forma, ut neq; iecur, neq; lienem, neq; quodammodo cerebrum. Porro iam tempestuum erit, thoracis ossa seriatim describere: & cum duodecim eiusdem uertebras prius

<sup>e</sup> enarrauerimus, à costis sermonem auspicari, quæ uiris & mulieribus ab utroq; latere<sup>e</sup> duodeno constant numero: à quo si quando uariant, tredecim sæpius quàm undecim solum sese offerunt: quemadmodum tredecim quoq; thoracis uertebras sæpius quàm undecim tantum occurrere, supra retulimus. Singulis enim thoracis uertebris, singulæ in ambobus lateribus articulatur conste.

Quod autem uiros costa quapiam in altero latere destitutos, ac uiros unius costarum numero à muliere superari, uulgus opinatur, ridiculum planè est: etiam si Euam ex Adæ costa à Deo procreatâ, Moyses prodiderit. Quamuis enim forsitan Adæ ossa, si quis ea in sceleton cõpegisset, ex altero latere una caruissent costa: non ob id tamen omnibus quoq; uiris unam deficere necesse est. Aristoteles homini octo costas tantum tribuit: concessurus etiam, quosdam gentis Turdulorum septenis costis creari, si modò id alicuius idonei auctoris testimonio ipsi cõstitisset. Verùm ut hîc Aristoteles aliorum duntaxat suffragijs suum dogma firmaret, ita quoq; non dissimile uero est, illic octo costas homini ex aliorum relatu eundem ascripisse, hacq; ratione rem ipsi non uisam parum rectè nobis tradidisse. Quanquam interim dum memoratum iam Aristotelis locum aliquando Patauij enarrarem, à summæ (propter singulare literarum ac Iuris ciuilibus cognitionem) spei adolescentibus, Iacobo Nigro, & Ioanne Centurione, patricijs Genuensibus accepi, generosissimos Ligures in ueterum monumentis *ἱερὰ πόντος* fuisse appellatos: quum tamen is populus, ut est naualis terrestriq; pugna strenuus, optima quoq; membrorum symmetria ac numero sit spectatissimus. Sunt itaq; plurimum utrinq; duodecim costæ: ac septem superiores pectoris ossi & uertebris, ut postea dicemus, articulantur: quinque autem humiliores solis compinguntur uertebris, & ad pectoris usque os non pertingunt, sed in thoracis desinentes lateribus, suarum cartilaginum finibus

<sup>g</sup> inuicem committuntur: duodecima duntaxat excepta, quæ ab undecima penitus<sup>h</sup> dehiscit, neq; aliqua ex parte ipsam cõtingit. id quod & undecimæ non raro usuuenit, decimæ cartilaginem tunc non<sup>i</sup> attingenti. Quinq; istæ humiliores, quod pectoris ossi non articulantur, *ὀστέα*, quali dicas spuria & illegitimæ, Græcis appellantur. Omnibus costis commune est, quod<sup>k</sup> ossæ simul<sup>l</sup> cartilaginosaq; consent substantia, quodq; appendicem ea sede sibi uendicent, qua uertebrarum connectuntur corporibus. Ossæ costarum substantia non omni ex parte sibi similis est. ubi enim costæ uertebris coarticulantur, & ubi dorsum constituunt, solidiores multo durioresq; sunt, quàm in thoracis lateribus, & iuxta pectoris regionem, ubi magis fungosa extruuntur substantia, quæ tenui squama, seu lamina obducitur: hæc q; illic demum tenuissima est, ubi in cartilaginem degenerat. Cartilago etiam non parem undique ostendit speciem: inferiorum enim costarum cartilago mollior est. unde etiam fortassis nonnulli illegitimas costas priuatim *χόνδρος*, quasi cartilagineas dicas, uocari tradunt. Superiorum uerò costarum cartilago durior est, solidiorq; ac in ualde

Costarum numerus.

Uiris ac mulieribus idem costarum numerus. *In cap. Genes.*

*Lib. x. Histor. animal. cap. 15.*

Corporis in Lib. x. Histor. animal. cap. 15.

Costarum substantia & appendicem. *Ossæ substantia.*

Cartilaginea substantia.



senibus intus ossæ efficitur: quemadmodum in ouibus & bobus, alijsq; ferè omnibus eius generis animâibus mediocris etiam ætatis fieri cernimus, quorum cartilago intus friabili constat ossæ, exterius tantû cartilagine ueluti membrana quapiam obuoluto. Atque id etiam in simijs & canibus, utpote sicciori temperie quàm homines constantibus, adèd est manifestum, ut haud mirum sit, Galenum illorum præcipuè animalium fabricam docentem, uerarum costarum cartilagine, ossæ: spuriarum autem cartilagine, exquisitas esse cartilagine scripsisse. Huius cartilaginis moles in omnibus costis non eadem est, ut etiam omnium costarum non par est longitudo. prima namq; & duodecima breuissimæ sunt, mox secunda & undecima, quæ omnes breuib; donantur cartilaginibus. Sexta uerò, septima & octaua, longissimæ sunt, ac longissimas etiam obtinent cartilagine. Primæ costæ cartilago amplissima est, quemadmodum & prima costæ teras quoq; amplitudine superat: mox hanc secunda, & deinde tertia in amplitudine subsequuntur. duodecima uerò & undecima omnium sunt tenuissimæ, & in tenuissimas quoq; terminantur cartilagine. Mediæ autem medio se habent modo: quamuis harum quandoq; cartilagine in progressu, ossæ suarum costarû substantia efficiantur latiores. Quum enim sex superiorum costarum cartilagine dehiscencia efforment interualla, totoq; ductu ab inuicem æquè distent: sextæ tamen, septimæ, octauæ, & interdum nonæ costarum cartilagine uariè in progressu lateſcunt, inuicemq; continuatæ interualla ipsarum suamet substantia<sup>n</sup> implent. Ad hæc, quinq; spuria<sup>n</sup> rum costarum cartilagine in acutum<sup>o</sup> mucronem desinunt, uerarum autem cartilagine non item. Primæ enim costæ cartilago<sup>p</sup>, suo fine qui pectoris ossi ualidè cónascitur, amplior fit, quàm qua primû ab ossæ costæ educitur substantia. Secundæ ac tertiæ, triumq; subsequen-<sup>q</sup> tium costarum cartilagine modicè in progressu arctantur, & singulæ in<sup>q</sup> capitulum finiunt, quo has pectoris<sup>q</sup> ossi coarticulari postea docebimus. Costis non omni ex parte eadem adest læuitas. interna enim sede, qua membranam ipsas simul omnes succingentè spectant, uniuersæ læues minimèq; asperæ apparèt. tertia tamen, & quæ illam ad<sup>r</sup> decimam usq; subsequuntur, in interna ipsarum sede uersus humiliora<sup>r</sup> sinum ostendunt, iplis secundum earum longitudinem exculptum, non quidem per uniuersam costæ longitudinem cõspicuum, sed maxime ea sede, qua primû à uertebis abscedunt, & in thoracis latera ferri incipiunt. Sinus iste paratur<sup>s</sup> ramio, quem uena coniuge carens, costæ exporrigit: deinde etiam illò uehitur<sup>t</sup> arteriæ magnæ<sup>t</sup> soboles, &<sup>u</sup> neruus à dorsali medulla pronatus. Verû quia hæc uasa in medijs costis grandia sunt, ac pari semper incedût serie, in tribus autem<sup>u</sup> superioribus minima, eademq; sparsim ducta occurrunt: non mirum est, medias costas his sinibus magis quàm superiores ornari. Porrò tres costæ humiliores, etiam si magna illis attendantur uasa, quum tamen tenues & interna sede depressæ cernantur, etiam citra magnam huiusmodi sinuum operam, illis uasis tutum iter præbent. Sinus iste ualis deducèdis cælatus, inferiorem costæ partem acutiorem tenuioremq; efficit, quàm sit superior, quæ obtusior magisq; teres cernitur. Externa, eademq; gibba costarum sedes, non omni ex parte læuis est. ea enim<sup>x</sup> parte, qua costæ uertebis alligantur, præterquàm quòd capitula efformant, quibus uertebRARUM inarticulantur sinibus, etiam asperæ inæqualesq; sese offerunt, quo aptius hinc ligamenta educantur, costas uertebRARUM corporibus & transuersis earundem processibus colligãtia. Præterea in hac externa costarum sede, simulatq; à transuersis uertebRARUM abscedunt processibus<sup>y</sup>, tuberculum quoddam alperum inæqualeq; uisitur, tendinibus<sup>y</sup> unde-

Lib. 2. de Ad-  
minis, sect. 2.  
partim in lib.  
de Ossib. ca. 13.  
Costis omnium  
non par longi-  
tudo.  
Non par am-  
plitudo.

Costarum læ-  
uitas & aspe-  
ritas.

Costarû sinu.

Costarum aspe-  
ritum tubercu-  
lum.

n 1 fig. 1. 1.  
o 2 fig. F.  
p 1 fig. C.

q 1 fig. D.  
dein 3 fig. E.

r 1, 4 fig. K.

s fig. 6. ca.  
lib. 3. G. G.

t fig. ca. 11.  
lib. 3. h. h.  
u 2 fig. ca.  
11, libri 4.  
precipui  
rami costæ  
rum ductû  
seruantes.

x 4 fig. 1.  
11, sed præ-  
cipuè Q.

y 4, 5 fig. O.

<sup>z</sup> 13 *musc.* <sup>u</sup> undecimi dorsum mouentis muscoli excipiendis paratum: qui partim in apices transuerforū processuum, & partim in hæc costarum inferuntur tubercula. Deinde, quæ costæ adhuc magis à transuersis uertebraŕū recedunt processibus, in hac posteriori externaq; ipsarū sede, \* asperæ inæqualesq; sunt, ac etiam ueluti tubere quodā modicè prominenti donantur, ut in illas apta insertionis sedes eius<sup>u</sup> muscoli efficeretur, quem in homine thoracem mouentium quartum numerabimus. Dein hæc asperitas non duntaxat illius muscoli insertioni idonea est, imò etiā<sup>b</sup> externi intercostales musculi hinc enasci docebuntur, qui hac iuxta uertebraŕum regione non solum ab inferiori sede superioris costę in elatiorē humilioris costę partē pertinent, uerūm etiā ab externa unius costę sede ad externā alterius hic exporrigūtur. Reliqua uerò regione costæ leues æqualesq; sunt, nisi fortè quispiam eas modicè asperas in superiori & inferiori sede esse cōtenderet, à qua intercostaliū musculorum pendet origo, in quamq; eorundem etiam insertio perficitur. Prima tamen costa superiori sede, qua latissima est, priuatim aspera inæqualisq; cernitur, ut<sup>c</sup> musculus dorsum mouētium quartus hinc principiū opportunè sumat. Costis omnibus non par ad uertebraŕum obtigit articulatio. nouem enim superiores<sup>d</sup> duplici coarctātur articulo, undecima autem & duodecima simplici, quemadmodū & decima quoq; rarissimè duobus articulis suæ cōmittitur uertebrae: utcunq; etiā secus Galenum uisum fuerit, qui singulas costas duplici articulo uertebraŕum coarctari docuit. Cæterūm costæ duobus nodis articulatæ<sup>e</sup> duo ostendunt capitula: unum quidem, quo<sup>f</sup> sinui uertebraŕū corporibus inciso inarticulātur: alterum autem, quo<sup>g</sup> internæ sedi apicis transuersi processus firmātur. Atq; hæc capitula sinibus illis respondent, quos uertebraŕum, quum earum recenseretur cōstructio, insculptos retulimus. Prima igitur costa rotundo capitulo primę thoracis uertebrae corpori inarticulatur: ac deinde transuersum eiusdē uertebrae processum tantisper ascendit, quousq; ipsius apici alio capitulo inarticuletur. Secunda uerò costa, & septem subsequentes, cōmuni semper duarum uertebraŕū corporum sinui, non rotundo, sed instar obtusi anguli protuberante capitulo inarticulantur: transuersis autem processibus perinde ac prima coarctantur costa. quanquam & hic quædam in articulis, propter sinus non eadem sede in transuersis processibus exsculptos, consurgat differentia. Superiorū enim uertebraŕum transuersi processus, suos sinus in humiliori parte internæ illarū sedis incisos gerunt, inferiorū autem (uti suprà etiam contra Galeni suffragiū admo- nuimus) in superiori parte: mediarum uerò uertebraŕum sinus medio se habent modo. Cæterūm quòd costarū articulatio, quæ ad uertebrae corpus efficitur, tanto elatior sit illa quam costę ad transuersos processus molitūtur, quanto apex transuersi processus demissior est, sinu uertebrae corpori exsculpto, hic etiam non uenit negligendū. Porro trium inferiorū costarum articulatio, quę ad uertebraŕū duntaxat corpus perficitur, sinibus quoq; non admodum altè cauatis, neq; ualde protuberantibus<sup>h</sup> capitulis perficitur. Atq; hac ratione costæ uertebraŕum committuntur. quam autem articuli speciem cum pectoris osse moliantur, & quo ductu à uertebraŕum antrorsum cōtendant, tunc primū oportunè explicabimus, quum pectoris ossis constructionem sermoni addiderimus: quæ profectò enarratu esset facilis, si humanum os, siniarum & canum & uitorum, eiusq; generis animantium ossi responderet. In his namq; animalibus (ut etiam inter edendum uidere est) pectoris os septem constat ossibus, non admodum inter se forma differētib. In canibus enim, porcis, & ouibus, inuicem cōueniunt: in simijs uerò, & sciuris, propter clauicularū articulationem,

Costarum ad uertebraŕum articulationem.

Tum alius scapulum, tum maxime os de Ad ministr. scilicet.

Quadrupedū pectoris ossis descriptio.

nem, primum supremumq; os aliquantulo cæteris amplius uidetur. Septem hæc ossa latiora, quàm profunda crassâ ue sunt: & qua inuicem cōmittuntur, latiora nonnihil, quàm in ipsorū medio existunt. Horum connexus cartilaginis interuentu interdum tam laxè perficitur, ut à uertebrarū corporibus suis compage modicū differat: est tamen is cōnexus ad symphyis seu unionem ita referendus, ut appendicū cum suis ossibus cōnexus. nisi quod hunc connexum etiam in admodum decrepitis bobus est cernere. Vnde etiam Galenum in libro de Ossib. miror, qui pectoris ossa synarthrosi scripserit cōmitti: quum tamen neq; harmonia, neq; futura, multoq; adhuc minus gomphosi componantur, quas cōpositionis species in eius libri initio sub synarthrosi complectitur. In harum commissurarum lateribus sinus utrinq; exculpitur, cui cartilaginis alicuius, in quam costæ degenerant, capitulū inarticulatur. Ad primi enim ossis cum secundi contum, secundæ utriusq; lateris costæ cartilago immittitur. Ad secundū ossis cum tertio cōmissuram, tertię utriusq; lateris costæ cartilago (ut & reliquæ succedētes quatuor utrinq; cartilagine sua serie suorum ossium cōmissuris) coarctatur. Verūm primi ossis lateribus, primæ costæ cartilago non articulatur, sed prorsus adnascitur. Septimum os, quod reliquis gracilius, magisq; teres est, in cartilaginē exacuitur, ipso ossē latiore, ensisq; mucroni quàm similimam. Huiusmodi sanè pectoris ossis in canibus & simijs est ratio. quæ Galenū spectasse annues, quum ipsius de pectoris ossē historiam, his quæ modò prælibauimus, contuleris. \* Verūm si humanum pectoris os (quod, ut generatim dicam, amplum, & si cum aliorum animalū ossibus conferatur, longè breuissimum est) intuitus fueris, multo aliter id habere animaduertes: uti etiam homini pectus meritò obtigit breuissimum, & simul latissimum. Nunquā enim, quod certò affirmare possum, in humano pectoris ossē mihi septena occurrerūt ossa, neq; etiam hæc in homine eodem semper numero cernuntur. In adultis enim tria ferè conspiciuntur, prorsus inter se uaria. ac primum quidē insigniter amplum est, & nonnihil etiam crassum: ita tamen, ut ipsius crassities ab amplitudine plurimū uincatur. Os id<sup>o</sup> posteriori sede, qua thoracis respicit cauitatem, modicè cauum est in anteriori autem gibbum, & in medio secundū ipsius longitudinē longè crassius, quàm in lateribus. uide tur enim in anterioris sedis<sup>o</sup> lateribus depressum, atq; ut aptè primæ costæ cartilaginis crassities<sup>o</sup> responderet, extenuatū. In medio autem, roboris gratia,<sup>o</sup> tri anguli modo protuberat. <sup>o</sup> Superior etiam ossis pars multo crassior ampliorq; est inferiore, & utrinq; unum finum longum, ac uersus posteriora in cissum, & cartilagine incrustatū obtinet, cui clauiculæ caput inarticulatur. In horum finuum medio, propter extuberantia illorum interiora latera, primum istud os in superiori hac sede<sup>o</sup> lunatum cernitur, & ueluti foueam ostendit, quam σφαγις<sup>o</sup> & iugulum uocamus. Inferior ossis pars utcunq; aspera est: & secūdo, quod iam describam, ossi cartilaginei ligamenti interuentu adeo laxè cōmittitur, ut nunquam horum ossium lateat cōnexus, imò & ipsius quoq; motus in magnis respirationibus interdum animaduertitur. Secundum os multo amplius est, quàm crassum: <sup>o</sup> superiori sede, qua primo connectitur ossi, strictius est, quàm prope inferiorē. At nullibi interim æquè amplum cernitur, ac elatiori primi sedes. Quā secundum os primo cōmittitur, in utroq; cōnexu latere<sup>o</sup> sinus instar obtusi anguli inculpitur, ambobus ossibus cōmunis, & cartilagine incrustatus, cui secundæ costæ<sup>o</sup> cartilago instar obtusioris trianguli uerticis protuberans inarticulatur. Præter hunc finum præfens os utrinque<sup>o</sup> alios multos sibi uendicat, instar obtusioris anguli cauos, & paribus interuallis

Humanū pectoris ossis descriptio.

i fig. cap. 14 R, R.

k tota 6, 7 figur.

l i. si. a. g. ad h. 6 autem fig. 7 ab f. ad. m fig. 7 o.

n 6. si. m. n. o 6, 7 fi. p. p 6 fig. q. r. l. q 6, 7 fig. q. r. f. r 6, 7 fig. t. u.

s 6, 7 fig. q. r. i fig. cap. 22 A.

u 6, 7 fig. f. x 6, 7 fi. t.

y i fig. ab b ad l. z 6, 7 fi. t. a 6 fig. ur. iuxta e.

b 6, 7 fi. u.

c i fig. D.

d 6, 7 fi. x. y, z, a. b.

ab in-



ab inuicem nequaquam distantes. Primus enim in altero latere huic osi proprius sinus, qui tertiæ costæ cartilagini paratur, à sinu secundæ costæ gratia inciso longius distat, quàm secundus huius osis peculiaris sinus, quartæ costæ gratia cælatus, à sinu remouetur tertiæ costæ cartilaginem suscipiente. Rursus, plus interualli consistit inter secundum sinum & tertium, quàm inter tertium & quartum: adeò ut sinus sextæ & septimæ costarum nomine in hoc osse sculpti, se inuicem cõtینگant, & non tam altè, atq; superiores, excauentur. Suscipit itaq; hoc os priuatim tertiæ, quartæ, quintæ, sextæ & septimæ costarum cartilagines, secundæ costæ cartilaginis modo protuberâtes. Secundum os in pueris ex plurimis efformatur ossibus, inuicem unione per cartilaginis interuentum contextis. Verùm hæc unio, ne utiquam canis aut simiæ ossium compagi uenit conferenda, quum longè magis lateat, inferioraq; ossa multo breuiora superioribus cernantur. Et in cœmiterijs secundum os integrum, & à primo disiunctum ferè semper effoditur, quemadmodum uertebrę mutuò diremptæ eximuntur. & si fortuitò in secundo osse aliquam compaginis speciem, ac si ex pluribus id constaret, obseruabis, ea potissimum apparebit, ubi tertiæ costæ cartilago osi articulatur, & deinceps<sup>b</sup> ubi quartarum costarum cartilagines pectoris osi iunguntur. Tertium uerò os exiguum est, & inferiori secundi osis sedi interna ex parte eadem ratione cõmittitur, qua primum secundo iungi relatum est: illicq; secundo osi necitur, quâ septimarum costarum cartilagines infimæ secundi osis sedi articulatur. Hoc os modicè amplum est, ac tenue, humilioriq; sede in mucronatam cartilaginem degenerat. Verùm id non infrequenter, & potissimum in minoribus natu, deesse reperies, & mucronatam cartilaginẽ in de nasci cõspicies, ubi septimarum costarum cartilagines mutuò ferè coeunt, secundoq; osi pectoris osis articulantur. Tria hæc pectoris ossa simul iuncta, manubrij alicuius gladij imaginem referunt. primi namq; ossis superior, admodumq; lata sedes, illi manubrij parti respondet, quę sub paruo digito in apprehensione consistit. Secundum autem os, illi parti congruit, quam manus tota intus complectitur, in qua sinus costarum cartilaginibus parati, eum præstant usum, quem in gladijs ex manubrij asperitate quaerimus, quoties intortis nodosisq; funiculis, aut scabra piscis cute, illud obducimus. Tertium os, unà cum cartilagine, (nisi hæc nonnunquam suo mucrone bifida geminaq; occurrat) reliquę gladij parti assimilatur: adeò ut nonnulli uniuersam hanc ossium struem, & quod sit, ab ensis imagine uocarint. alij, qui canes potius ac simias, quàm homines spectarunt, mucronatam cartilaginem duntaxat illo nomine dignantur: quòd hæc scilicet gladij mucronis formæ accedat: ipsumq; canum pectoris os, ensis imagini non ita aptè, ac humanum os cõferri possit. Hæc imaginum collatio attestatur, ueteribus illis hominum cadauera, Galeno autem simiarum, dissectioni fuisse adhibita. cui sententiæ, Celsi quoq; oratio, qua ille pectoris os utrinq; lunatum esse, ex ueterum quopiani transcripsit, suffragatur. id enim de simijs & canibus falso protulisset, quum tale quid in illis nihil appareat. in homine uerò primũ pectoris os superius, & secundũ inferius, multo latiora sunt, quàm ubi hæc inuicem cõmittuntur. Pectoris osis substantia admodum fungosa mollisq; est, & anteriori sede magis continua squama, quàm posteriori obducitur. Posterioris enim sedis squama multis inæqualibusq; donatur foraminibus, quę haud peruia sunt, sed uasis solum uiam præbent, id os enutriētibus. Hęcq; foramina in primo osse tanto magis sunt cõspicua, quāto huius osis crassities secundi osis crassitiem excedit. Quòd itaq; pectoris os, illis costis quę orbiculatim thoracis amplitudinem

e s fig. E.

f 6 fig. 7.

g 6 fig. 7.

h 6 fig. 7.

i 1 fig. ab

i ad h. 6, 7

fig. 1.

k 1 fig. h.

6, 7 fig. 7.

Pectoris ossis  
ad ensis com-  
paratiu.Pectoris os  
utrinq; lunatũ.Pectoris osis  
substantiaPectoris osis  
uasis.1 secundum  
A, A fig. 2.  
lib. 6.

*Discretio  
cartilagine  
visus.*

efformant, stabiliendis procreatum sit, neminem latere arbitror: quemadmodum neque, quod propugnaculi etiam vicem secundario gerat, eosque; usus homini præstet, quos generatim thoracis ossa præbere, in huius Capitis initio retulimus. Cartilago, in quam pectoris os exacuitur, subditarum quoque; illi partium est propugnaculum, & malum granatum uulgo appellatur, quod (ut arbitror) unius balaustij apicis imagini illa accedat. A qua etiam forma, uulgo ipsam epiglottalem appellat cartilagine, ab imagine uidelicet laryngis<sup>m</sup> operculi, pectoris ossis cartilagini speciem non admodum absumilis. Verum huiusmodi nominum copiam ad præsentis libri calcem, unâ cum cæterorum ossium nominibus subiiciemus. modo autem nihil in thoracis ossium historia addendum superest, nisi fortè costarum ductus, qui longè in costarum ossibus, quàm in cartilaginibus est alius. Costarum enim ossa<sup>n</sup> quum primum à uertebreis abscedunt, egregiè in posteriora deorsum obliquantur, & hinc ad thoracis latera deorsum semper oblique uersus anteriora declinant, quousque; in cartilagine definunt, oblique ac circulatim sursum in anteriora descendentes: adeò ut costæ, ubi cartilagine primum educunt, arcuatim & in angulum quodammodo sursum reflectantur.<sup>o</sup> Iste costarum ductus non in illis solum, quæ pectoris ossi committuntur, euidens est: uerum & in reliquis omnibus, si fortè duodecimam exceperis, cuius cartilago admodum obscurè sursum spectat. quanquam etiam hic inflexus potissimum in medijs, quinta nimirum, sexta, septima, octaua & nona uisitur.


*Costarum  
ductus.*

*m 12, 13, fi.  
cap. 18.*

*n 3 fig ab a  
per c ad f,  
o 3 fig ab f  
ad A.  
p eadè fig.  
d B ad E.*

*q Hæc in-  
tegra, &  
potissi-  
mum secun-  
da.*

### DE CARTILAGINEA QVÆ CORDIS BASI ascribitur substantia, seu cordis ossē. Caput xx.



*Hæc c figura magnæ arteriæ & arterialis uenæ radices personæ ex-  
primit, ab omnibus connatis corporibus partibus ue diuisas, & duobus circulis si-  
milimas. Ac A quidem arteriæ magnæ radicem notat, B uerò arterialis ue-  
næ radicem. C autem connexum, quo uas a c a inuicem in ipso exortu connas-  
cuntur. Verum conduxerit hæc ex sexti libri figuris, potissimum autem octaua &  
decima, petere: quas huic Capiti præponerem, si non ipsæ figuris paginas occupare uererer.*

*Lib. 8. de Ad-  
ministr. scil.*



*Emmanen cor-  
nero ossē desin-  
turi.  
Cartilaginea  
cordis sub-  
stantia.*

E FORSITAN hoc libro os aliquod prætermisisse ui-  
deamur, iam ossæ cordis substantiæ faciendæ est mentio.  
Galenus namque; ab elephantis corde, à quopiam suorum fa-  
miliarium os exiniæ magnitudinis excectum prodidit: &  
grandiū quidem animalium cordibus os, minorum ue-  
rò cartilagine ascribit. Ego autem hætenus, uti in nullo  
corde, itaneque; in humano (quod humida admodum, si re-  
liquis animalibus conferatur, est constitutione) exquisitum os reperi: eaque; se-  
de, qua Galenus cordis os constituit, substantiam obseruo cartilagineam, quæ  
mea quidem sententia nihil est aliud, quàm<sup>a</sup> magnæ arteriæ &<sup>b</sup> uenæ arteria-  
lis radices, à corde principiū ducentes. Quippe radices hæ, in quibus membra-  
narum bases consistunt, quæ materierū è duobus illis uasis in cor refluxui præ-  
ficiuntur, multo duriore sunt, quàm reliqua illorum uasorum substantia, adeò  
ut radices cartilaginis natura participare nonnihil uideantur: quæ in bobus, &  
magis adhuc in ceruis, siccissima ossæque; temperie donatis, ita tempore indu-  
rescit, ut quadrupedū costarum cartilagine in albū & friabile os, extrinsecus  
cartilagine tanquam membrana obductū, degenerare scripsimus. Hæ itaque; ua-  
sorum radices<sup>c</sup> perinde ad se mutud sunt conterminæ, ac si<sup>d</sup> duos circulos in  
puncto inuicem cōmitteres, cōtinuareque; ita ut dexter circulus uenæ arterialis  
esset

*a 10 fi. lib.  
6 sub B,  
c, d.  
b 8 fig. lib.  
6 sub E, F,  
G. quibus  
charact.  
membrane  
notantur.*

*c C.  
d A, B.*

esset radix, sinister uerò (qui amplior existeret) magnæ arteriæ. Vbi autem circuli mutuo cõmitterentur, is locus esset, quo hæc uasæ suis orbibus simul conascuntur, uniunturq; ac ubi præcipua ossæ cartilaginis confisteret portio, quæ oblonga & uelut teres esset: tota nimirum sede, qua illæ radices inuicem committuntur, & reliquæ interim circulorum portiones essent resectæ. Ac proinde per melicebit radices has, pro animalis in quo incidet temperamento, & magis adhuc ætate, aut cordis cartilaginem, aut os uocare, modo accuratè ipsarum naturam quis intueatur, neq; unà cum Galeni sectatoribus, ipsius sensa admodum oscitanter eruëtibus, tam stolidus sit, ut cordis os instar  $\Delta$  aut  $\nu$  efformatum sibi persuadeat. Qui enim post Galenum humani corporis historiam scribere aggressi sunt, in humani cordis basi os quoddam extructum recensent, quod laryngi præposito, & ab  $\nu$  imagine *voq̄dis* nuncupato ossi assimilant. Neq; fat fuit illis hominibus, ad hunc modum os in humani cordis basi cõfingere: quin imò sermoni adiecere, cordis basim, atq; ideo etiam uniuersum cor, ab ipso non secus firmari, quàm linguæ radix illo osse quod laryngi præponitur. Arbitratur namq; cor eiusmodi osse firmatum, moueri: non expendentes, cor etiam tali osse donatum, ipso non minus suffulciri posse, quàm ferreus palus lectum in aere sustineret, quãdo is lecto alligatus, simul cum ipso deorsum ex alto projiceretur. Quamuis interim quatuor cordis uasorum ad conterminas sedes cõnexum non nihil cor sustinere, haud inficiari possumus. uti etiam ex uniuerfa Galeni de cordis osse historia, in qua ueteres, suiq; temporis medicos, qui id in homine reperiri negabant, præter meritum arguit: nobis quoq; fatendum est, Galenum id quod pertractat os, in humano corde, præ cæteris, uti monuimus, humido & molli, nunquam esse aggressum.

Anatomicorum lapsus.

Potissimum s. de Administr. dissecti.


## DE SCAPVLIS. CAPVT XXI.

## PRIMA FIGURA

XXI. CAP.

## SECUNDA.

## TERTIA.

TRIVM VIGESIMI PRIMI CAPITIS  
figurarum, earundemq; characterum Index.

PRIMA figura internam, seu anteriorem scapulae dextrae sedem exprimit.

Secunda, dextrae scapulae externam posteriorem ue sedem ostendit.

Tertia, scapulam dextrae lateris in latius depictam continet, ut sinum gibbe exteriorisq; scapulae sedis proponeret,



neret, qui inter elatiorem scapulae costam, & scapulae spinam consistit.

*A, B* 1, 2 Scapulae sinus, cui humeri caput articuletur.

*C, D* 1, 2 Cervix seu collum scapulae.

*E, f* *F* in prima figura, & *E, F* in secunda, interiorem insinuant processum scapulae, in quo *F* protuberantem notat partem, cui clavicula alligatur, & penè innititur. *E* uero, processus huius appendicem, *f* autem, asperam commo-  
nstrat partem, a qua ligamentum pronascitur, hinc in superiorem scapulae processum pertinet.

*G, H* 2 Radix spine scapulae, seu ipsa scapulae spina, quae in homine superiorem scapulae educi processum, in quo *K* & *L* in prima figura & tertia, & *L* in secunda quoque, occurrunt, priuatim aliquid indicantia.

*I* 2, 3 Scapulae spine pars crassior, interdum appendice decorata.

*K* 1, 2, 3 Ubi *K* in prima & tertia consistit, coaliuit incedit appendicis processus superioris scapulae, cuius mediae sedi *K* secunda figura insistit.

*L* 2, 3 Sinus superioris processus scapulae, leniter calatus, & articulanda clavicula accommodus.

*M, N, O* 1 Instar obliquoarum linearum tubercula, quae sinus perinde in scapula cauo constituunt, ac silli à costarum  
convexis essent impressi.

*N, O* 1 Sedes in interna scapulae regione magis caua, quae secunda figura literis *G* & *H* respondent.

*P* 1 Protuberans crassiorq; inferioris costae pars, quae in internam scapulae sedem prominet.

*p* 1 Hac sede inferior scapulae costa latius ne efficitur acutius, ideoq; magis prominet, ut tertius brachii mouentium  
musculus hinc promptius exoriretur.

*Q* 1 Scapulae inferioris costae asper sinus, unde interior cubitum extendentium pronascitur musculus.

*S* 2 Ad scapulae externam sedem protuberans inferioris costae pars.

*T* 2 Impressio & amplitudo inferioris costae, unde tertius brachium mouentium musculus nascitur.

*U, U* 2 Hic externa scapulae sedes propter crassitiam inferioris costae insigniter caua cernitur.

*X* 1, 2, 3 Appendix basis scapulae, ad principium ipsius spine coacta.

*Y* 1, 2, 3 Appendix inferioris anguli basis scapulae.


*Φ* 1 Superioris anguli sedes, in internam scapulae regionem modicè protuberans.

*Z* 1, 2, 3 Superior basis scapulae angulus.

*a* 1, 3 Semicirculare foramen, seu sinus, in superiore costa scapulae conspicuus.

*b, c* 3 Sedes in externa scapulae regione, inter spinam & elatiorem scapulae costam consistens. Verum *b* priuatim sca-  
pulae sedem hic notat tenuissimam, & quodammodo pellucidam. *c* autem foraminulum indicat hic frequenter  
apparens, & uenula inibi scapulam nutritur a uiam praebens.

#### QUARTA VIGESIMI PRIMI CAPITIS FIGURA.



*P R A E S E N T I* figura externam seu posteriorem canis scapulae sedem in hoc delineauimus, ut prom-  
ptè expendereetur hominis scapulae ad canis, aut ouis differentia, quam in summo humero, aut superiori scapulae  
processu notabimus. Significet igitur *A* & *B* scapulae gibbum, seu dorsum, ac *A* quidem ipsius inferio-  
rem sedem, *B* autem superiorem, & animantis collo capiti ne propinquiores. *C* &

*D* spinam scapulae notent, super scapulae cervicem non exceden-  
tem. *E* scapulae cervicem.

a trium in  
tegerris.

b 9 musc.  
tab. 7, d.

c 12 musc.  
tab. G.

d 10. id. F.

e 5 tab. F.

f 7 tab. L.

g 5. id. R, S.

h integra  
rū Q. ad A.  
i integra-  
rum fig. S  
ad R.

k 4. musc.  
tab. 3, 7. id.  
M, C, L, et  
1, 11. tab. L  
C, T, C, G.  
7. tab. L. 6  
id. C, M, M.  
11. tab. S, f.  
5. tab. R, S.

l 1, 2, 3. fig.  
ad Z per X  
ad X.

m 1, 2, 3. fi.  
una Y. ad te  
ra X.

n 2. fig. G.  
H. 3. fig. G.

o 1, 2. fig.  
ad B ad X.



CAPVLARVM, utrinq; una, posteriori thoracis re-  
gioni uersus superiora<sup>a</sup> innititur: & occipitis ofsi, ceruicis  
thoracisq; uertebreis, costis ac ofsi<sup>v</sup> referenti, musculorum  
duntaxat interuentu copulatur. Occipitis quidem ofsi, be-  
neficio<sup>b</sup> secundi scapulam mouentiū, qui etiam hanc plu-  
rimarum ceruicis & thoracis uertebra<sup>rū</sup> spinis commutit,  
quemadmodum &<sup>c</sup> tertius illam transuersis uertebra-  
rum ceruicis necit processibus. &<sup>d</sup> quartus ipsam aliquot thoracis & ceruicis  
uertebra<sup>rū</sup> spinis firmat. Costis uerò scapulam nectunt<sup>e</sup> primus illam mo-  
uentium musculus, & thoracem mouentium<sup>f</sup> secundus. Ofi autem<sup>g</sup> referen-  
ti scapula<sup>h</sup> septimi eius ofsis peculiarium musculorum ope hæret. In homini-  
bus præterea, & simijs, & sciuris, & si quæ alia clauiculis donantur, scapula liga-  
mentorū auxilio clauiculæ<sup>h</sup> contextitur, illiq; est contermina. In omnibus ue-  
rò animalibus brachij os seu humerus scapulæ<sup>i</sup> inarticulatur. Ac proinde si ho-  
minem scapula destitutum finxeris, nusquam uocatum humeri articulum op-  
portune constitues. Ad eius namq; fabricam, necessum est, humeri caput alicui  
ofsis sinum subire, ac ut moueatur, in aliquo ofse ueluti in basi quapiam sta-  
biliri: adeo ut hunc scapulæ usum censerī oporteat præcipuum. cui alius mox  
subsequitur, non sanè pœnitendus, partium nimirum thorace contentarum  
custodia. Posteriori enim thoracis sedi Natura scapulas tanquā duos clypeos  
& scuta obiecit. hinc rursus alium usum homini accessurū minimè ignorans,  
quo<sup>k</sup> cōplures musculi motuum brachij ac thoracis & cubiti autores, sedem  
qua suffulciantur, & à qua originem ducant, commodè adipiscuntur. Magnæ  
igitur singularisq; indutrie est, scapulas tam uarijs prorsusq; necessarijs uisibus  
adaptare, & unde quaq; non fecus eas extruere, quàm si priuatim ad singulos  
usus, uti nunc describemus, confingerentur. Scapula enim inæqualis est admo-  
dum, omniq; ex parte sibi dissimilis. præter uarios namque ipsius processus, si-  
nus, tubera, appendices, eiusq; generis reliqua, è quibus ofsium discrimina pe-  
tinuis, scapula trianguli differētib; costis lateribus<sup>l</sup> uel efformati imaginem  
quodammodo exprimit. Primum enim ipsius latus, quod scapulæ basim per-  
petuò uocabimus, ea scapulæ sedes est, quæ secundum dorsi longitudinē, tho-  
racis uertebra<sup>rū</sup> spinis proximè exporrigitur, obliquaq; constat linea, supe-  
rius & inferius ad exteriora corporis uel latus obliquè tanquam in circuli con-  
uexum inclinata, in medio autem paululū lunata & caua. Verū interim sca-  
pulæ basis nōnunquam continuo ductu, hunc ferè in modum (, homini, per-  
inde ac cæteris quasi animantibus, gibba est. Deinde basis hæc admodum te-  
nuis spectatur: quamuis inferiore tamen parte & superiore nonnihil quàm in  
medio crassior appareat, inferiorisq; partis crassities, partis superioris crassi-  
tienti adhuc uincat. Huic basi plerunq;<sup>m</sup> duæ adnascuntur appendices: una qui-  
dem, quæ grandior crassiorq; & longior est, ad basis inferiorem consiluit an-  
gulum, insigniter obtusum, ac ueluti orbicularem: altera autem appendix ali-  
quantulum sub superiore habetur angulo, illiq; basis sedi coalescit, à qua uoca-  
tam nobis scapulæ<sup>n</sup> spinam principium ducere audies. Præter has appendices,  
basi insuper mollis quædam adnascitur cartilago, eius cartilaginū generis,  
quo ofsium extrema nulli commissa ofsi, augeri solent. Verū in hominibus  
hæc cartilago longè breuior minorq; est, quàm in ouibus & bobus, alijsq; qua-  
drupedibus, quorum scapulæ thoracis potius incumbunt lateribus, quàm, ut  
in homine, posteriori thoracis sedi uertebreis proxima. Atq; ita primum scapu-  
læ latus se habet: duo autem reliqua inter se uariant.<sup>o</sup> Inferius enim, ab humi-  
liore

scapularum s-  
tus & nexu.

Scapularum  
us.

Scapule forma  
triangularis.  
Basis scapula.

Basis appen-  
dici.

Basis car-  
tilago.

Superioris in-  
feriorisq; late-  
rum differen-  
tia.

Tres scapule  
anguli, ac late-  
rum plenior  
descriptio.

Cervix sca-  
pula.

Sinus humero  
exicipiendo pa-  
ratus.

Cartilago sca-  
pulae sinum pre-  
cipiente auget.

liore basis sede admodum obliquè sursum in exteriora ducitur: <sup>p</sup>superius uerò (quod tanto breuius est inferiore, quanto inferior est ipsa basi breuius) nonni-  
hil deorsum in exteriora fertur, quodammodo transuersim procedens. Duo  
hæc latera in <sup>q</sup>angulum coeuntia, latiusculam scapulæ partem suis externis fi-  
nibus complectuntur, quam scapulæ ceruicem dicimus, cuiq; sinus insculpitur  
articulando humero apparatus. Cæterum duo hæc latera suis finibus tertium  
eum scapulæ angulum constituentia, non solum ductu & breuitate inter se di-  
screpant, uerum etiā crassitie. Inferius enim latus, quo altius à basi sursum con-  
scendit, eo <sup>r</sup>crassius & multo spissius efficitur. non aliter quàm si Natura huius  
lateris beneficio, scapulæ alioquin tenui & infirmæ magnum robur additum  
uoluisset, ac deinde secundariò quibusdam musculis commodi exortus locum  
præparasset. Præter id enim, quod musculorum quorundam gratia (ut mox  
subijciam) huius lateris crassities internam scapulæ sedem <sup>r</sup>cauiorem reddit,  
& in externa sede seu gibbo, ueluti <sup>s</sup>sinum efformat, ipsum quoq; in sua exter-  
na sede prope inferiorem basis scapulæ angulum <sup>t</sup>compressione obtinet, de-  
orsumq; quadantenus educitur, ut <sup>u</sup>musculus illinc principium fumeret, cuius  
ope brachium ueluti à pectore retrorsum flectimus. Quinetiā interna huius  
lateris sede, iuxta elatiorē ipsius partem, qua scapulæ ceruicē terminat, oblon-  
gus quoq; spectatur <sup>x</sup>sinus, aliquantulū asper & inæqualis, <sup>tab. K. & 13. S.</sup>musculoq; princi-  
pium porrigens, quem cubiti extensionis autorem statuemus. Porro superius  
latus, tenue minimeq; crassum est, ad eam usq; sedem, qua scapulæ ceruicis <sup>y</sup>fu-  
rior pars consistit. illic enim impense crassescit, ipsiq; priuatim iuxta interio-  
ris scapulæ, quem hinc enasci audies, <sup>z</sup>processus radicem, <sup>z</sup>sinus quidā seu me-  
dium foramen instar semicirculi insculpitur, uiam porrigens quinti paris ner-  
uorum dorsalis medullæ <sup>c</sup>furculo, hæc unā cum uenula arteriaq; posteriorem  
scapulæ sedem adeunt. Scapulæ <sup>d</sup>ceruix crassa est, ipsaq; scapula ex ampla te-  
nuiq; basi ad hanc coarctata, & secundum latitudinē in crassata cernitur. Cer-  
uicis tamen <sup>f</sup>longitudo seu interuallum, quod à superiori corporis parte ad in-  
feriorem metior, admodum ceruicis crassitiem superat, quæ ab anteriori par-  
te in posteriorem pertinet. Cervix hinc magis adhuc extrorsum ducta, dilata-  
tur: & ut ipsa oblonga est, ita etiam oblongum efformat <sup>g</sup>sinum, inferiori qui-  
dem parte circulari circumferētia terminatum, superiori autem parte in acu-  
tum quodammodo exporrectum. Atq; id propter <sup>h</sup>impresionem accidit, hic  
internæ ceruicis sedi factam, tendinis eius <sup>i</sup>musculi ducendi gratia, qui intrò  
antrorsumq; brachium circumuertit. Præterea sinus ceruicisq; scapulæ <sup>l</sup>supe-  
rior pars, in hoc procerius extuberrat, quò aptius hinc <sup>l</sup>duo ualidissima huius ar-  
ticuli pronascerentur ligamenta, & <sup>m</sup>externum quoq; caput eius musculi com-  
modè hinc principium duceret, qui cubitum flectentium est anterior. Hic sca-  
pulæ sinus cartilagine reliquorum articuli sinuum modo in crustatus, non ad-  
modum altè cælatur. neq; etiam ipsius longitudo & amplitudo respondet,  
humeri <sup>n</sup>capitis quod ipsi inarticulatur, longitudini & amplitudini, propter ua-  
rios eosq; admodum laxos motus, quibus humerus ad hunc sinum agi debuit.  
Quamquam interim Natura, quum scapulæ sinum ita leuiter non sine maxi-  
ma occasione exculpisset, illumq; non ualde amplū longumq; creasset (præ-  
ter peculiaria huius articuli ligamenta, quæ in secundo libro unā cum muscu-  
lis prosequemur: & quosdam scapulæ processus, paulo infra explicandos) carti-  
laginem quandam ligamenti substantiæ compotem, in hoc sinu crebrò effin-  
git, qua ipsum auget, profundiorēq; efficit, nimiamq; luxandi promptitudi-  
nem impese corrigit. In huius enim sinus ambitu ea cartilago ponitur, scapulæ  
interim,

p 1, 2 fig.  
d Z per F  
ad A.

q 1, 2 fig.  
inter A, B.

r ad prima  
fig. P. ad 2  
fig. S.

s inter s. fi.  
N. O. P. p.  
t inter s. fi.  
G. H. S. T.  
u 2 fig. T.  
x s musc.  
tab. K. &  
tab. 13. S.

y 1 fig. Q.  
z 12 musc.  
tab. T.  
d 2 fig. C.

b 1, 2 fig. F.  
c 1 fig. 4.

d 3 fig. cap.  
11. lib. 4. l.  
e 1, 2 fig.  
C, D.

f 1, 2 fig. d  
C ad D.

g 1, 2 fig.  
A, B.

h 1 fig. C.

i 7 musc.  
tab. P. & 8  
tab. H.

k 1 fig. 4.  
l 5 musc.

tab. 11. l. c.  
13 tab. alle-  
rū V notat.  
m 6 musc.  
tab. m.

n 1, 2 fig.  
23 cap. A.  
B, C.



interim, neq; etiam humero connata, sed tantum ligamenti articulum in orbem amplexantibus adnexa, illisq; cartilaginibus proximè respondens, quæ instar crescentis lunæ in genu articulo semper occurrunt. Huius itaq; cartilagini externa sedes crassa est, sensumq; ad sinus centrum ducta gracilescit, ac multo ante centrum definit: quasi quis sinum in ambitu anulo augetet, cuius corpus instar trianguli esset contusum: & istius trianguli externum latus, anteriorem articuli ambitum respiceret: inferius uerò latus sinui incumberet: superius autem, humeri caput spectaret. adeò ut istius cartilaginis beneficio, quotiescunq; reperitur, sinus scapulæ profundior euadat, & interim cartilago impetui compressioniq; ossium facile cedens, laxum huius articuli motum minimè cohibeat. Processus uerò, qui-



Hæc figura cartilaginis scapulæ sinum aduersionem uicunque expræsimus.

Duo scapulæ processus.

Interior processus.

super præsentia articulo Natura etiam prospexit, duo censentur: quorum alter<sup>p</sup> superior est, paulo post latus describendus: alter uerò interior & minor, qui ampla radice ex superiori sede ceruicis scapulæ principium ducit, & hinc ut-  
cunq; latus antrorsum fertur, anteriori articuli parti, at magis uersus superiora, oppositus. Inferior huius processus pars, instar antiquæ Græcorum literæ C, nostro C non admodum ab similibus, caua est: unde etiam in *ορυζοειδης* appellatur. Alij uerò à quadā imagine, quam cum altera obtinet anchoræ parte, quæ terræ infigitur, & *αγκυροειδης* ipsum uocarunt. Nonnullis quoq; à corniculæ rostri specie, *κωρακοειδης* dicitur, inferna sede cauus, & insigniter leuis, ne munus institutionemq; musculi impediatur, brachium in anteriora circumuertentis. Superiori parte processus iste asper & inæqualis occurrit. in elatissima namque sui principij sede, crassior quàm reliquo incessu cernitur, & inæquali prominet<sup>u</sup> tubere, cui clauicula ferè innititur, ualideq; alligatur. In<sup>\*</sup> apice uerò, ubi appendicem sibi uendicat, & interno suo latere, altera asper est, ut aptius internum anterioris cubitum flectentiū musculi<sup>v</sup> caput ab ipso exoriretur, & ligamentum, quod peculiarium humeri articuli ligamentorū primum recensebimus, hinc principium obtineret. Inter apicem quoq; suum, & tuberculū, superior ipsius sedes exasperatur, ut<sup>t</sup> ligamentum hinc promptius educeretur, ab interiori processu in superiorem scapulæ processum pertinēs, utq; in totam ipsius longitudinem commoda foret insertio<sup>b</sup> musculi scapulam ad pectus mouentis, cuius sanè potissimum gratia (si accuratè singula expendimus) processum hunc à Natura homini datum esse fatebimur. Cæterum nunc tempestiuum erit, superiorem scapulæ processum aggredi, & cum ipsius historia anteriorem posterioremq; scapulæ sedes persequi. Scapula itaq; anteriori sede si-  
ma & caua est, ut commodè costarum conuexis respondeat, ac super ipsas stabilita, debitè moueatur. Deinde etiā, ut opportuna hic sedes adaptaretur musculo, qui totam anteriorem scapulæ sedem implens, intrò antrorsumq; brachium circumuertit. Caua hæc scapulæ sedes læuis quidem est, sed non omni ex parte æqualis. nam iuxta inferiorem ipsius sedem tubercula quædam ob-  
net, modicè instar obliquioris lineæ extuberantia, quæ quodammodo sinus constituunt, ac si thoracis costæ, quibus scapula hac sede incumbit, temporis successu in scapulam comprimeretur, ipsaq; scapula illarum effigiem cedendo assumeret. Hi enim sinus tuberaq; in senibus apparent magis, quàm in iuuenibus, quibus omnia minus adhuc cōspicuè excrescūt. Ad hæc, scapulæ anterior sedes<sup>z</sup> ad radicem elatioris anguli basis scapulæ nonnihil protuberat, aptamq; regionem efficit, cui<sup>i</sup> alter scapulam attollentium musculorum ualide inserta  
tur. Præterea scapulæ anterior sedes, quæ processui, quem ex posteriori scapulæ

Anterior seu costis proxima scapulæ sedes.

fede educi, illiq; sedi instar spinæ cuiusdam esse audies, correspondet, insignius quàm alibi excauatur: non secus quàm si Natura, quum processum illum finiret, anteriorem scapulæ partem in posteriora extraxisset, sicq; ipsius cavitatem dictorū iam usuum gratia adauxisset. Inter reliquas tamen anterioris scapulæ sedis regiones, ea maximè caua se exhibet, quæ ipsius ceruici est proxima. præter id enim, quod in posteriora inibi uidetur extracta, scapulæ etiam ceruix hic impense crassa, antrorsumq; protuberās, hanc cavitatem non læuiter auget: quemadmodum & inferior scapulæ latus, quod quum crassum sit, illam quoq; profundiorē reddit.<sup>k</sup> Posterior scapulæ sedes, gibba est, quòd hanc figuram iniurijs citra noxam ferendis accommodatiorem esse, Natura haud ignorauerit. Verum si prescius hanc sedem contemplanur, duæ in ipsa occurrunt cavitates, musculis suscipiendis aptissimæ, & processū quodam insigni, qui instar spinæ ex hac sede educitur, diremptæ.<sup>m</sup> Vna enim sub eo processu inter inferiore ipsius sedem, & extuberantiorem crassioremq; inferioris scapulæ lateris partem consistit.<sup>n</sup> Altera uerò inter superiore processum sedem, & superius scapulæ latus habetur. Atq; hanc quidē<sup>o</sup> musculus occupat, quem brachium circumuertentium primum statuemus: illam autem,<sup>p</sup> qui eiusdem muneris opificum tertius numeratur. Porro et si hæc externa posterior uel scapulæ sedes, cum illius scapulæ processus, tum suorum laterum gratia, duas has quasi cavitates ostēdit, nihilominus uniuersa (quoniam extuberare cernitur) scapulæ dorsum à ueteribus fuit appellata, similitudinem à uero hominis dorso sumentibus. Processum autem, qui ab hoc scapulæ dorso enascitur, superiorisq; scapulæ processus radix existit, spinam uocarunt, ad posteriorum uertebraarum processum spinarum uel imaginem. Summus humerus uerò nobis dicitur, quod illis *κεφαλαιον* nuncupabatur: quanquam non adeò promptum sit diuinare, quid quisq; hac uoce intellexerit. Neq; etiam uel Hippocratis causa nomen id negligendum, aut de ipso obiter statuendum est, si modò diuina illius de ossium fracturis & luxationibus, idq; genus malis oracula, ad nos quoq; pertinere duxerimus. Quare etiam non ab re fuerit, scapulæ spinā, summumq; humerum, uti uisum erit, describere, atq; tunc demum Hippocratis & Galeni sententiam sermoni adijcere. Ex tota igitur propemodū latitudine dorsi scapulæ ualidus crassusq; enascitur processus, non quidem è dorsi longitudinis medio, uerum nō procul à superiori ipsius sede. Processus iste (qui scapulæ spina est) sensum magis magisq; augetur, ac tandem iuxta scapulæ ceruicem à scapulæ dorso abscedens, teresq; quodammodo apparens, modicè antrorsum fertur, insigniter supra scapulæ cum humero articulum latefcens, & ampla donatus appendice, quæ in pueris pluribus ossiculis cōformatur, cartilaginis interuentu coalescentibus. Huius processus pars omnis anterior, & posterior, & humilior, læuis minimeq; aspera cernitur: superior autem ipsius sedes neutiquam læuis est, sed rudis, & foraminulis quibusdam non peruijs decorata, idq; potissimum in superiori sui appendicis sede, & ubi non procul à scapulæ basi processus iste crassior apparet, ac subinde appendicem quoq; nascitur. Neq; has sanè asperitates frustra machinatur Natura, quum maximus scapulæ sursum ducens musculus illis implantetur, & principium præbeant dignissimo brachium mouenti musculo: quem, quòd brachij cum scapula articulum eleganter integit, *κεφαλαιον* (quemadmodū & hunc ipsum aliquando processum) dissectionū periti uocarūt. In anteriori processus sede, iuxta ipsius extremum, sinus adeò leuiter & superficietenus insculpitur, ut num capitulū, num sinus sit, ægrè diiudices. Huic modicè prominens clauiculæ capitulum articulat,

Posterior scapulæ sedes, seu dorsum.

Superior processus, seu summus humerus, cuius iam diligens instituitur descriptio.

b 1 fig. c.

i 1 fig. p.

k 2 figura.

l 2 fig. g.

m 2 fig. in.

n 3 fig. in.

o 6 musc.

p 1 musc.

q 2 fig. g.

r Nō in me.

s ab Huc.

t 1, 2, 3 fig.

u fig. cap.

x 2, 3 fig.

y 9 musc.

z 10 musc.

aa 1, 2 fig.

bb 3 fig. cap.

cc 2, 3 fig.

dd 1, 2 fig.

ee 3 fig. cap.

ff 2, 3 fig.

gg 1, 2 fig.

hh 3 fig. cap.

ii 2, 3 fig.

jj 1, 2 fig.

kk 3 fig. cap.

ll 2, 3 fig.

mm 1, 2 fig.

nn 3 fig. cap.

oo 2, 3 fig.

pp 1, 2 fig.

qq 3 fig. cap.

rr 2, 3 fig.

ss 1, 2 fig.

tt 3 fig. cap.

uu 2, 3 fig.

vv 1, 2 fig.

ww 3 fig. cap.

xx 2, 3 fig.

yy 1, 2 fig.

zz 3 fig. cap.

aaa 2, 3 fig.

bbb 1, 2 fig.

ccc 3 fig. cap.

ddd 2, 3 fig.

eee 1, 2 fig.

fff 3 fig. cap.

ggg 2, 3 fig.

hhh 1, 2 fig.

iii 3 fig. cap.

jjj 2, 3 fig.

kkk 1, 2 fig.

lll 3 fig. cap.

mmm 2, 3 fig.

nnn 1, 2 fig.

ooo 3 fig. cap.

ppp 2, 3 fig.

qqq 1, 2 fig.

rrr 3 fig. cap.

ualidissimisq; ligamentis constringitur. interueniēte hīc peculiari cartilagine, illi prorsus simili, quam in maxillē inferioris cum capite articulis obseruari retulimus, quæ scilicet utrinq; quā ossa spectat, læuis & lubrica est, ligamentisq;

e 2 fig. G.  
H.  
d 4 fig. C.  
D.  
e ab H uer  
sus K fig. 2.

articulum amplectētibus duntaxat continuatur. Dicti itaq; modō processus pars, quæ scapulæ dorso proxima est, Spina, uti iam scripti, opportunē nominatur: quæ etiam in<sup>a</sup> canibus, ouibus & equis cernitur. Processus uerō<sup>e</sup> partem, quæ à scapula antrorsum uersus exteriora abscedit, ac sensim dilatescit, inq; solis hominibus, & animalibus clauicula donatis, obseruari potest, summum humerum appellamus: id nomen à Græcis mutuantes, qui proculdubio brachij osis cum scapulis articulum, *ὤμιον* nuncuparunt. ac proinde *ἀκρόμιον* hanc

Peculiaris cartilago clauiculae cum superioris scapulae processu articuli.



f integra  
rū Q. ad n.

processus partem uocarunt, quod articuli superiores extremamq; cōstituat sedem, ac ueluti illius tutissimum habeatur propugnaculum. Atq; ita sanē ab Hippocrate perpetuō accipitur, cū aliās sapius, tum præcipuē quando humerum (quem ipse *βραχίονα* uocat) nequaquam ad superiora (impediente nimirum summo humero) luxari docet, & quum de effracto summo humero pertractat. Quanquā & hīc Galenus etiam libro de Ossibus audiendus est, qui compaginem præsentis processus cum clauicula *ἀκρόμιον* nonnullis dissectionum professoribus uocari asserit. Vbi etiam subiungit, hīc quosdam tertium os præter processum hunc, & clauiculam in solis hominibus ponere, idq; acromion & *κατακλῆδα* uocare. Tertiū hoc os Galenus decimotertio de Partium usu, in hominibus recenset, & sumias illo priuat: quemadmodum & in libris de Administrandis sectionibus, & in suis in Hippocratis de Articulis librum commentarijs. Scribit enim, præter hunc scapulæ superiorem processum, & clauiculam, tertium quoddam os esse cartilagineum, quod clauiculæ ad illum scapulæ processum contextui insternitur, & à quo membranæ ligamentaq; pronascuntur, quorum beneficio contextus iste ualidius cōmittitur. Galenus in quinto de Administrandis sectionibus libro, huiusmodi os Hippocrati *ἀκρόμιον* uocari ait, ipseq; eo nomine ibidem id appellat: quemadmodum in libro de Ossibus testabatur, quosdam hīc tertium quoddam os collocare, idq; ab illis *ἀκρόμιον* nuncupari. quum interim Galenus subinde in libris de Partium usu, & in libris de Administrandis sectionibus, ac ferē in omnibus in Hippocratem commentarijs, hunc scapulæ processum, aut saltem huius scapulæ processus cum clauicula compagem, *ἀκρόμιον* uocitauerit. adeo, ut non parum Galeni inconstantia hīc admirer, multoq; magis tantisper admiraturus sim, dum in homine tertium id cartilagosum os mihi occurrat. Neutiquam enim arbitror, Galenum peculiarem superius commemoratam huius articuli cartilaginem osis loco habere, quum eius generis cartilagine ad ligamenti naturam à uera cartilagine plurimum recedant, multoq; minus ossæ ullo pacto sint: præterquam quod hæc in simia perinde ac in homine reperiatur. Et si fortē osis loco habenda esset, præterquā quod Galenus aliter huius meminisset, & articulum interuenire, non autem ipsi insterni scripsisset: etiam reprehensione non care

Tertium os à Galeno in superioris scapulae processu cum clauicula nexu recenseri.

g Gradior  
pars 4. figu  
re cap. 22.  
h fig. in ar  
guit cap.  
10.  
i s figur.  
cap. 34.

ret, quod peculiare os in clauiculæ cum pectoris ossē articulo, & rursus in inferioris maxillæ ad temporum ossa<sup>h</sup> articulis, & in genu non statuisset, quum interim illic huius generis cartilagine manifestius quàm hīc in summo humero apparent, etiam si illæ Galeno prorsus incognitæ & prætermisæ uideantur. Hactenus itaq; mihi hīc nunquam, quantumuis diligēter secanti, tertium os animaduertere licuit. Satisq; perspectū habeo, Galenum id nunquā etiam uidisse: & si ausim eousq; in ipsum impietatis progredi, affirmarem illum hu-




Quibus tantū  
animalibus su-  
perior scapulæ  
processus obti-  
nerit.

Summi lu-  
meri usus.


iufmodi os confinxisse à quadam cum<sup>h</sup> ossium quæ sesami semen referunt, si-  
militudine, quæ quibusdam musculorū capitibus uel tendinibus firmata, alio-  
rum ossium articulis cōtextibusq; præponi audies. Dein nullum unquam ani-  
mal, præter hominē, simiam, & sciurum, & si rectè memini, glirem, mihi oc-  
currit, superiorem hunc scapulæ obtinens processum: adeò ut uix ambigem,  
eum qui primus hominem duntaxat <sup>h</sup> <sup>25</sup> <sup>et 2</sup> <sup>33</sup> <sup>h</sup> <sup>in 8</sup> <sup>tab.</sup> donari scripsit, intellexisse solum  
hominem hunc processum obtinere: quando illum in canibus, ouibus, capris,  
leporibus (qui etiam interiorem scapulæ processum separatim nanciscuntur)  
& alijs quæ mensē apponi solent quadrupedibus, nullum superiorem scapulæ  
processum (at duntaxat spinam) spectaret, parum de simijs cum Galeno soli-  
citus. Porro cuius usus gratia is homini & alijs animalibus clauiculas nascen-  
tibus detur, tum demum melius explicabimus, ubi clauicularū historiam ag-  
grediemur. Præter hoc enim, quòd humeri articulo propugnaculum sit, & quòd  
musculorum insertioni & exortui eleganter famuletur, in hoc potissimum iu-  
uat, ut accedat clauicula, humeri articulū à thoracis lateribus & costis quàm  
longissimè remoueat, illumq; in eo situ referuet, quo maximè ad suos motus  
indiget. Cæterum Galenus etiam si passim interiorē scapulæ processum <sup>l</sup> <sup>integrarum figur.</sup> <sup>Q & A.</sup>  
appellet, in decimotertio tamen de Vsu partium, superiorem processum  
eo nomine donauit: quemadmodum & is <sup>h</sup> <sup>25</sup> <sup>et 2</sup> <sup>33</sup> <sup>h</sup> <sup>in 8</sup> <sup>tab.</sup> ab illo quoq; nonnun-  
quam est perinde appellatus, ac sibi undiq; Galenū cōstare cernimus. At iam  
opportunum fuerit, scapularū sermoni modum imponere: præcipuè quum  
nihil narrandum super sit, quàm basim scapulæ, quā appendicibus decoratur,  
ut cunq; fungosam fistulofamq; uideri, & nonnulla foraminula in scapulæ spi-  
nam porrigi, quæ ipsi (quum crassā sit) uenas deducunt, nutrimentū illi sup-  
peditaturas. Cernitur autem<sup>m</sup> unum subinde in illa amplitudine, quam supe-  
rior scapulæ costa cum ipsius spina efformat: ac etiam in interna scapulæ sede,  
qua hæc impensius cauatur. Deinde & in cervicis<sup>n</sup> ambitu, eiusdem usus, pro-  
ducendorumq; ligamentorū gratia, huius quoq; generis occurrūt foraminula.

## DE CLAVICVLIS. CAPVT XXII.

PRIMA VIGESI-  
MI SECVNDI  
Capitis figura.



SECUNDA.



TERTIA.



TRIVM VIGESIMI SECVNDI CAPITIS  
figurarum, & earundem characterum Index.

PRIMA præsentis capitis figura, dextri lateris clauiculam anteriori externæ uel & superiori sede ex-  
pressam habet.

Secunda,

Secunda, posteriorem interiorem uel clavicula faciem, unâ cum superiori ipsius sede ostendit.

Tertia, inferiorem clavicula sedem demonstrat.

A 1, 2, 3 Clavicula capitulum, quod pectoris ossi articulat.

B 1 Capituli huius primus angulus.

C 1, 2, 3 Secundus capituli angulus.

D 1, 2, 3 Capituli nuper commemorati tertius angulus. In prima tamen figura, uniuersa triangularis capituli circumscriptio est conspicua literis B, C & D. perinde ac in figura, manifestioris doctrinae gratia, indicii characteris D hic superposita.

E 1, 2 In anteriori clavicula sede protuberans notatur linea, è directo primi anguli B insigniti consistens.

F 2, 3 F & G in tertia figura, protuberans linea inferioris sedis claviculae indicatur, quam F & G in secunda figura, utriusque etiam ostendunt.

G 2, 3 G priuatim indicatur asperitas, ad lineam F insignitae posteriora apparet.

H 1, 2 Claviculae longitudinis medium, quod teres esset, nisi linea F insignita, inferiori ex parte protuberaret.

I 1, 2 Hac sede clavicula ad superiorem scapula tendens processum, dilatescit, superiorisq; sede (quae etiam I ad K usq; notatur) gibba est.

K 1 Asperitas in ea clavicula sede conspicua, ubi haec anteriori sui parte maxime caua cernitur.

L, M 3 Latiuscula sedis claviculae inferior pars, leuiter sinuata, & aspera, non autem superioris partis modo gibba.

N 3 Hac sede clavicula etiam aspera est, perinde ac iuxta N, ex qua ligamentum ad internum scapulae processum fertur.

O 2, 3 Claviculae sedes maxime retrorsum introrsum uel protuberans, & huius sedis peculiare tubus.

P 3 Locus insigniter asper, in inferiori clavicula sede conspicuus, quae superiori scapulae processui coarticulat.

Q 1, 2, 3 In tertia figura Q capitulum insignitur, quo clavicula superiori scapulae processui committitur. In prima uero figura & secunda, Q sedes indicatur, quae id capitulum consistit.



#### QUARTA XXII. CAPITIS FIGURA.

HANC figuram integrum erit praesentis Capitis quartam constituere, in qua pars R insignita, cartilaginem exprimit articulo claviculae cum superiori scapulae processu peculiarem. Altera autem pars, S indicata, cartilago est peculiaris claviculae cum pectoris ossi articulo.



a integrum  
rum Q ad  
O & A.



b 7 fig. c. d.  
a p r.

c 1, 2, 3 fig. A.  
gur. A.

d 1 fig. B.

e 1, 2, 3 fig. C.  
gur. C.

f 1, 2, 3 fig. D.  
gur. D.

g 1 fig. d.  
B ad C.

h 1, 2, 3 fig. d.  
C ad D.

i 1 fig. d.  
B ad D.

k 4 fig. S.

N VTRISQUE lateribus claviculae (quae Graecis *κλαβικουλα* des nominantur) singulae consistunt, pectoris ossi & superiori scapulae processui coartatae. Pectoris ossi in illis articulantur<sup>b</sup> sinibus, quos in primo ipsius ossis summæ sedis lateribus exculptos diximus. ac quemadmodum sinus illi oblongi sunt, ab anterioribusq; partibus deorsum in posteriora ducti, & antica sede quàm postica latiores, internoq; latere altiores quàm externo cernuntur: ita quoq; se habent clauicularum<sup>c</sup> capita, pectoris ossi connexa. Haec enim sinuum (in quibus deorsum & sursum praecipue uoluuntur) modo oblonga sunt, ac depressa: & si quis accuratius eorum circumscriptionem animaduertaret, illam quodammodo triangulam iudicaret. <sup>d</sup> Vnus enim angulus in anteriori capitis parte ad humiliora consistit, utcuq; obtusus. Secundus etiam obtusus est, in superiori capitis parte nonnihil uersus posteriora conspicuus. Tertius acutior longiorq; est, in posteriori sede repositus, deorsumq; declinans. Porro ut praesentes anguli obtusi sunt, ita etiam trianguli lineae inaequales, extrorsumq; obliquatae occurrunt. <sup>e</sup> Quae enim à primo angulo ad secundum ducitur, breuissima est: à secundo autem angulo ad tertium<sup>f</sup> procedens, illa multo longior uisitur. quae uerò à primo ad tertium fertur, omnium longissima, maximeq; curua est. Caput hoc claviculae multa cartilagine incrustatur, laeueq; est: cartilagine tamen unâ cum tenuissima appendice effracta, caput asperum ac inaequale cernitur. Verum etsi clavicula hic cartilagine non minus quàm & pectoris ossis sinus abundet, nihilominus tamen Natura huic articulo<sup>g</sup> cartilaginem interiecit, illi similem,

Clauicularum numerus.

Eandem ad pectoris os articulationem.

Peculiaris car-  
tilago articu-  
lationis clavicu-  
lae cum pectoris  
osse.

Dira clavicu-  
la curuata.

Curuata  
vna.

Humeri artien-  
tus cur à costis  
remouetur,  
& clavicula  
superiorisq; sca-  
pulae processus  
vna.

quam priuatim in inferioris maxillæ ad temporum ossa articulis reponi com-  
memorauimus. Inter pectoris enim ossis sinum, clauiculæq; caput, cartilago  
quædam adeò ampla interuenit, atq; capitis & sinus est amplitudo. Hæc q; te-  
nuis undecunq; est, ac æqua omni ex parte constat crassitie: & quæ sinum & ca-  
put articuli respicit, admodum læuis est, & unctuofo humore perfusa, & pe-  
ctoris ossi & clauiculæ nusquam connata, sed tantum ligamentis, articulum  
in orbem amplexantibus. Clauicula hinc non recto tramite, ad alterū ipsius  
porrigitur articulum, quo scapulæ superiori processui connectitur, uixq; ma-  
nifestum motum experitur. "A" pectoris enim osse procedens, extrorsum sen-  
sim curuatur, & anteriori parte gibba, posteriori uerò concaua efficitur. "Ve-  
rū" ilico post medium ipsius longitudinis, contrario ductu procedit. intror-  
sum namq; curuatur, & gibba fit, anteriori autem sede concaua uisitur: in an-  
teriora rursus insigniter prominens, ubi superiori scapulæ processui proxima  
est: adeò ut bis gibba, bisq; caua reddatur. Pars enim ipsius pectoris ossi conter-  
mina, & *ἡστροφύς* à iuguli uicino dicta, retrorsum, seu ad thoracis interiora  
magis pertinet. quæ aut superiori scapulæ articulatur processui, ac quia hume-  
ri articulo infertur, *ἐντρίψ* quibusdā nuncupatur, antrorsum uergit, & ab  
interna thoracis sede extrorsum remouetur, clauicula interim in medio du-  
ctu etiā obliquata. Iuxta ipsius igitur cum pectoris osse articulū, anteriori par-  
te gibba est, posteriori aut caua. non procul uerò à superiori scapulæ processu,  
anteriori parte insigniter breuiq; flexu caua cernitur: posteriori aut, gibba &  
conuexa. Atq; ut res sedulo propter crebras clauicularum luxationes fractu-  
rasq; expendenda breuiter dicatur, clauiculæ ductus huic nostro *s* respondet,  
præcipuè si id in medio ductu paulo magis maiusculi *s* ritu in hunc modū *S*  
obliquari fingeremus. Neq; horum ullum temerè & frustra à rerum Opifice  
factum est ubi enim clauicula iugulum spectat, meritò posteriori seu interio-  
ri parte caua est, quum hæc præter uenas & arterias quamplurimas, aspera ar-  
teria, stomachus, sextum par neruorum cerebri, & in primis insignium neruo-  
rum series à dorsali medulla axillam petens, ferri debebat: quibus potissimum  
neruis clauicula uiam exporrigit, & propugnaculi etiā loco præfigitur. Quia  
uerò à iugulo, aut potius à suæ longitudinis medio clauicula in posteriora por-  
rigitur, neq; alicuius usus gratia hic in anteriori sede gibba esse debuit, necessa-  
rio rursus iuxta superiorem scapulæ processum antrorsum uergit, quousque  
processus illius<sup>o</sup> partem cōtingat, cui aptè coarticulari posset. Tantum autem  
inibi antrorsum fertur, quantum retrorsum ante hunc inflexum<sup>o</sup> abscesserat.  
Si enim clauicula à suæ longitudinis medio ad colli latera prorsum, duntaxat  
in posteriora tenderet, neq; elatiori scapulæ processui apice articularetur, nihil  
profectò inhiheret, totam scapulam, clauiculæ beneficio non firmatam, super  
thoracem cadere, thoracisq; lateri proximè applicari, articulumq; humeri  
costis uicinisimum fieri, hæc q; occasione quamplurimos brachij motus abo-  
leri. Brachium namq; ob id potissimum in homine & finia, & alijs quæ clavi-  
culis donatur animalibus, tam uarijs differētibusq; motibus duci potest, quòd  
ipsius cum scapula articulus à thoracis latere plurimum distet. Si enim articu-  
lus ille thoracis costas contingeret, uel quauis ratione ipsis proximè, quemad-  
modum in alijs quadrupedibus, locaretur, ipsas manuum circulationes & ia-  
ctationes ad pectus, dorsum, collum, & ilia, nequaquam moliremur: perinde  
ac euenire nouimus, quum luxatus humerus in costas procidit, uel scapula in-  
star alæ ob effractam clauiculam dependet. Ne igitur adeò necessarijs destitue-  
remur munijis, Natura humeri articulū à thorace plurimum seiunxit, id præ-  
stans

1 ad Q. 1,  
2, 3 fig.

m 2, 3 fig.  
ab A uer-  
sus H.  
n 2, 3 fig.  
ab H uer-  
sus Q.

Hæc orge-  
na fere si-  
mul ostendit  
ultima  
fig. lib. 3.  
dein ulti-  
ma quart.

o 1 fi. cap.  
21 L.  
p 2, 3 fig.  
O.

q Hæc pe-  
tes ab inte-  
gris fig ubi  
articulus  
ex R cum  
S compa-  
ritus, à co-  
stis remoue-  
tur, pro-  
pter nexū  
Q ad A.



stans superiori scapulæ processui, qui ita educitur, ut claviculæ beneficio à pectore detrusus, sustentetur ac stabiliatur, ipseq; articulus hac occasione procul à thorace abscedat. Articulatur uerò clavicula huic processui minimum extuberanti<sup>r</sup> capitulo, eoq; latiore, quàm longo: talisq; hic confurgit articulatio, ut quod<sup>r</sup> nam os suscipiat, suscipiatur<sup>r</sup> ue, diiudicare uix queas: interueniente hîc etiam peculiari cartilagine, quam superiori Capite propter eos descripsimus, qui huic articulo tertium quoddam os, præter superiorē scapulæ processum & claviculam, parum rectè ascribunt. Claviculæ pars, quæ superiori scapulæ processui connectitur, latiuscula est, quemadmodum & processus quoq; latus ampliusq; cernitur. Præterea hæc claviculæ pars, ut & illa quæ pectoris ossi committitur, intus fistulosa, magisq; rara est, quàm reliqua claviculæ portio, quæ in suæ lōitudinis<sup>r</sup> medio solidissima est, quòd etiam sit tenuissima, quodammodoq; teres. non enim prorsus teres est, quum in humiliori ipsius parte ueluti in<sup>r</sup> lineam protuberet, quæ non procul incipit à claviculæ capite, pectori articulo, iuxta medium scilicet posterioris & anterioris eius capitis angulorum. Pertingit autem hæc linea paululum ultra claviculæ longitudinis medium, in hoc parata, ut<sup>r</sup> musculus thoracem mouentium primus ab ipsa principium duceret. Iuxta huius lineæ principium, propter caput claviculæ, asperitas sinuosa conspicitur, unde ualidum pronalcitur ligamentum, claviculam pectoris ossi illic colligans, qua ipsi primæ thoracis costæ cartilago connascitur. Quinetiam ad aliud huius lineæ extremum, altera occurrit asperitas, & ueluti asper quidam sinus, quo clavicula<sup>r</sup> tuberculo radicisq; interioris scapulæ processus penè incumbit, ac à quo ligamentū promitur, claviculam illi tuberculo pertinaciter colligans. Porro inferior hæc claviculæ sedes, ubi linea illa definit, claviculaq; ampla uisitur, sinuosa fit, & aspera, idq; potissimum iuxta connexum claviculæ ad superiorem scapulæ processum, ubi ligamenta articulum hunc continentia, ualidiora quàm superiori sede enascuntur. Superior totius claviculæ regio læuis omnino est, præterquàm iuxta ipsius articulos, ubi ligamentorum producendorum occasione, quemadmodum & musculo rum gratia, nonnihil exasperatur. A claviculæ enim superiori parte, iuxta pectoris os, musculus ille enascitur, qui etiam à pectoris osse pronatus, in<sup>r</sup> mammillarem capitis processum implantatur, caputq; mouentium musculorum septimi paris alter numerabitur. Superiori uerò claviculæ parti, scapulæ superiori commissæ processui, musculus ille inseritur, qui scapulam fursum ducentium primus recensetur. In anteriori etiam claviculæ parte, ad radicem primi sui capitis anguli, linea quoq; protuberat, ante medium longitudinis claviculæ definens, à qua non minima pars<sup>r</sup> musculi brachium pectori adducen-  
tis principium ducit. Ad hæc, in anteriori claviculæ sede, ubi retrorsum inflectitur, & ubi non procul ab ipsius cum superiori scapulæ processu articulatione caua uisitur, etiam asperitas notatu digna consistit, musculo brachium attollenti parata, cuius principij magna pars hinc pronascitur. In posteriori claviculæ sede, nihil quod non dictum sit, inæquale occurrit, præter quoddam tuberculum, hîc protuberans, ubi clavicula inibi maximè gibba est; idq; tuberculum ueluti illius gibbæ sedis angulum constituit, ligamentumq; ad anteriorem scapulæ processum educit. Præterea, in maximè solida claviculæ parte, idq; potissimum in posteriori ipsius regione, duo, & interdum tria non peruia spectantur foramina, in hoc cæata, ut uenulas admit-  
tant, claviculam enutrientes.

Clavicula ad  
superiorem sca-  
pule processum  
nexu.


Clavicula sub-  
stantia, tuberosi-  
tates, asperitates, la-  
minæ, & for-  
amina.

AND. VESALII DE CORPORIS  
DE HUMERO, SEV BRACHII  
osse. Caput xxiii.

PRIMA UL-  
GESIMI TER-  
tij Capitis figura, dextri  
humeri anteriorem fa-  
ciem referens.



SECUNDA HU-  
IUS CAPITIS FI-  
gura, dextri humeri postero-  
riorem faciem proponens.



CHARACTERVM DVARVM VIGESIMI  
tertij Capitis figurarum Index.

- A, B, C, D, E, F, G, H* Horum characterum alij in prima figura, alij uero in secunda obuij sunt, indicantes humeri appendicem, uti modo subiiciam, ualde uariam.
- A, B, C* In ambabus figuris rotundum humeri caput circumscribitur, quod scapulae inarticulatur.
- D, E* His characteribus in prima figura externum a sperumq; humeri appendicis caput notatur, cui ligamenta articuli inferuntur. Verum *D* rursus externi huius capitis anterioris caput tuber' ue indicat. *E* uero posterius, quod in secunda figura magis quam in prima est conspicuum.
- F, G* Duo istij characteres in prima, & *G* tantum in secunda, sinum indicant parulum, qui interius humeri appendicis caput ab exteriori dirimit.
- H, I* Sinus externum caput in duo diuidens, ac externo capiti anterioris musculi cubium flectentium paratus. *Ac* *H* quidem ipsius sedem in humeri appendice notat, *I* uero eam que in humeri ceruice consistit.
- K, L, M* *1, 2* Humeri rotula, ad quam ulna flectitur & extenditur. ac *K* quidem sinum rotule notat, *L* uero internum sinus laus, *M* autem externum.
- N* *1* Sinus ad superiorem rotule partem in humeri anteriori sede incisus.
- O* *2* Sinus ad superiorem rotule partem in humeri posteriori sede admodum alte excavatus.
- P* *1, 2* Humeri caput, cui radius articulatur, cuiq; exterioris humeri tuberi nomen tribuimus.
- Q* *1, 2* Hac sede humerus ad magnum usq; sue longitudinis interuallum plurium musculorum exortus occasione, inflectat acuta linea protuberat.
- R* *2* Sinus in exteriori humeri tubere, quarti manum petentium nervi gratia exculpus.
- S* *1, 2* Interioris nobis appellatum humeri tuber, quod musculorum educendorum nomine potissimum eminet.
- T* *1* Interioris tuberi sinus, tertio nervo manum aduentum paratus.
- U* *2* Sinus interioris tuberi, quo quintus brachium petens nervus uehitur.
- X, Y, Z* *2* Posterior humeri secundum suam longitudine sedes. ac *X* quidem notat partem superiorem, que sinuata est: *Z* uero in inferiore, quae gibba cernitur. *Y* impressione indicat, ad quam quartus nervus brachium accedens reuoluitur.

a, b, c, d, i

a, b, c, d 1 Anterior sedes humeri, in qua b insinuat prominentem eius partem: a uero & c locum, qui utrinq; ad illam partem deprimitur. Deinde tres isti characteres simul notant inferiorem anterioris humeri sedis partem sinuatam: d uero superiorem, quæ gibba uisitur.

e 1, 2 Asperitas paulo supra medium longitudinis humeri conspicua, & præcipuam portionem educens musculi cubiti flexentium anterioris.

f 1 Asperitas in anteriori humeri sede, potissimum uero ad latus ipsius externum appars, cui brachium attolens musculus præcipue inseritur.

a integratū  
rū S ad R,  
et ad T, V.



Confer hic  
integratū  
S cum A,  
dēum cum  
& f. insinuatū  
per cum O.

V M E R V S Celfo, atque alijs compluribus, id os uocatur, quod scapulæ & cubito articulatū, Græcis (uti & Latinorum non paucis) *βραχιον* nuncupatur. Ut uero totam osis & musculorum molem, cum nervis, uenis, arterijs, cute, & alijs quæ brachij constructionem fortē ingrediuntur, ab ipso ossē in sermōnis contextu distinguamus, quum solius osis mentio incidet, id Humerus, aut inter-

Humerus.

Brachium.

dum Brachij os appellabitur: quum autem reliquis membri partes unā cum ossē indicabimus, Brachij uoce, clarioris doctrinæ studio, utemur. Humerus itaq; Galeni in libro de Ossibus sententia, omnium totius corporis ossium, femore tantum excepto, maximum est: licet tamen in homine fibula & tibiæ os, humerum longitudine insigniter uincant. dein tibiæ os crassitie ac grauitate, perinde atq; ossa sacri osis lateribus coarticulata, pondere, humerum longe superant: adeo ut pleraq; nobis præter femur occurrant ossa, quibus humerus magnitudine cedit. Verum id cum alijs permultis Galeni concedemus autoritati, quum quorundam uenia nobis non liceat ipsius placitis contraire, & neutiquam uel hic innuere, quæ homini cum simia in femoris, tibiæ, humeri & cubiti longitudine spectetur differentia. Humeri igitur summa pars, qua

Humerum post  
femur non esse  
omniū ossium  
grandiorem.

b 1 fig. A.  
B, F, H.  
c 1, 2 fig.  
A, B, C.  
d 2 fig. cap.  
21 A, B.

is scapulæ articulatæ, admodum magna constat appendice, quæ in duo dirimitur capita. quippe hæc interna ipsius sede amplum, & in ambitu orbiculare, & paulo minus quàm medij globi modo protuberans efformat caput, quod læue, æqualeq; & cartilagine incrustatum, scapulæ sinui articulat. Hoc caput, appendicis internum latus constituens, superioris etiam appendicis sedis aliquantulo plus quàm mediam regionem occupat. Cæterum appendicis externum latus, in aliud asperum & inæquale protuberat caput, non quidem articulationi cuiuspiam erectum, sed duntaxat collis modo prominens, in quem ualida multaq; ligamenta, humerum scapulæ nec tentia, opportunè implantentur. Ad externum interioris capitis latus, quod in eminentiori & summa appendicis sede habetur, & deinde in anteriori, posterioriq; illius capitis sedibus amplus quidam patulusq; sinus orbiculatim ducitur, interius caput ab exteriori dirimens, & idoneam quoque ligamentorum insertioni sedem parans. In hunc namq; sinum in anteriori humeri sede magis quàm in posteriori patulum, seu amplum, profundumq; tanquam in uallem, ligamenta inferuntur, perinde ac illa in exterius caput, ueluti in collem & promontorium aliquod implantari dicebam. Et quemadmodū omnium ossium sedes, in quibus aliquid inseritur, aut principium ducit, asperæ inæqualesq; sunt: sic quoque & præfens sinus, unā cum exteriori capite, asper merito inæqualisq; cernitur. Porro præterquam quòd exterius caput inæ-

Superioris hu-  
meri partis de-  
scriptum.

e 1 fig. D.  
1, 2 fig. E.

f 1 fig. G.  
F, 2 fig. G.

g 1 fig. H, I.  
b 1 fig. D.  
i 1, 2 fig. E.

qualiter prominet, uariumq; est, alio quodam sinu ueluti in duo rursus capita diuiditur, in anterius nimirum, & posterius, quod anteriori multo est grandius. Sinus enim iste paululum uersus exteriora in anteriori appendicis sede celatus, insigniter profundus, longus, & secundum cavitatē seu concauū ad amussim



amufsim teres perinde uisitur, ac corpus secundum connexum teres est, cuius gratia inculpatur, quod\* externum caput est musculi cubitum flectētium anterioris. Cæterum hic sinus non tantum ad appendicem pertinet, uerum etiam per eam humeri ossis<sup>1</sup> sedem protēditur, cui appendix coalescit, & quæ humeri ceruicem perquam breuem & impenſe crassam constituit. Inferior humeri pars, quæ<sup>m</sup> duobus in cubito existentibus ossibus, ulnæ nimirum & radio articulatur, & obscura appendice in pueris quibusdam constat, longè magis adhuc uaria est, tum sinuum, tum capitum ac tuberum copia & imagine. In medio enim inferioris humeri sedis,<sup>n</sup> sinus primùm cum suis tuberibus talis prorsus conspicitur, qualem in trochleæ rotula est cernere, ad quam funes uoluuntur. Nam ut rotula hæc rotunda orbicularisq; in ambitu est, in lateribus autem plana & lata: sic etiam in ista humeri sede orbicularis rotundaque conspicitur pars, quam nullæ imagini propiùs quàm rotulæ assimilaueris. Dein, quemadmodum rotula in ambitu, cui chorda aduoluitur, sinu quodam (ut sic dicam) tereti, & læui, ac lubrico exculpitur, & sinus huius latera utrobique protuberant, funemq; in se, quo minus aberret, æquè amplexantur: ita etiam hæc humeri pars in medio sinuata est, & utrinque protuberat. In hoc tamen ab exquisitæ rotulæ tuberibus differt, quod rotulæ sinus latera equaliter ferè exporriguntur: hæc uerò humeri pars interno quidem latere admodum insigniter prominet, & ad amufsim rotulæ respondet:<sup>p</sup> externo autem latere, multo minus educitur. idq;<sup>q</sup> capitis humeri occasione, cui radium articulari audies, quodq; ad externū humeri orbitæ latus positum, citra eminentem ualde sui productionem, elegāter unā cum radio obstat, quo minus ulna extrorsum promptè luxetur. Cæterum in superiori orbitæ seu rotulæ huius sede, Natura duos insignes exculpsit sinus: unum quidē anteriori in parte, alterum uerò in posteriori, qui multo amplior, profundior, & quouis modo insignior est anteriori. Sinus hi quasi squama duntaxat dirempti, processus ulnæ in superiori ipsius parte cōspicuos excipiunt. Atq; horum anteriorem, quum cubitus flectitur, anterior sinus admittit: quum uerò cubitus extenditur, posterior sinus posteriorem ulnæ processum recipit. Sunt enim hi sinus extremæ flexionis extensionisq; termini, tanta prouidentia facti, ut cubitum in acutissimum angulū flecti sinant, & uix ultra rectam lineam eundem extēdi permittant: quod scilicet nulla prorsus in angulum extensione, sicuti sanè flexione, indigeamus, præcipuè quum humerus ad scapulam admodū laxè circumueri, & in posteriora insigniter duci queat. Quia uerò præſentes sinus in cubiti motibus ueluti bases & obstacula sunt, quæ ulnā non ultro ferri sinunt, Hippocrates eos *βαθυστάς* nuncupauit, cui etiam humeri orbita à quadam<sup>a</sup> cardinum imagine *γυγλιμοειδής* appellatur. Ad externū humeri orbitæ latus, uti iam prius obiter monuimus,<sup>s</sup> rotundum & oblongum quodammodo habetur caput, quod similiter atq; orbita, cartilagine incrustatum & læue, superiorem radij<sup>7</sup> sinum subintrat, radiusq; (ut aliàs fusiū exequar) ad id caput in pronū supinumq; agitur. Deinde capitis longitudo, quam à superiori ipsius parte ad inferiorem secundum humeri longitudinem metior, in causa etiam est, quod in cubiti flexione ac tensione, caput id à radij sinu (qui rotundus, non autem oblongus est) haud elabatur, aberret<sup>ue</sup>. Atque hac etiam occasione, tota capitis pars cartilagine obducta, anteriorem tantum humeri spectat sedem, quod scilicet in nulla cubiti extensione radius posteriorē humeri sedem adeat. Veruntamen ad externū huius capitis latus, humerus insigniter protuberat, montis rupis<sup>ue</sup> imaginē ostendēs, in hoc paratæ, ut quāplurimi musculi hinc opportune

Inferioris humeri partis descriptio.

Humeri orbitæ, cui ulna articulat.

Externum humeri tuber, cui radius articulat.

k 6 musc. tab. muscu  
lus 3 nota  
tur, caput  
autem m.  
l 1 fig. l.  
m Quatuor  
prioris cap  
sequēti  
tis figuræ.

n 12 fig.  
K, L, M.

o 1, 2 fig. L.

p 1, 2 fig. M.

q 1, 2 fig. P.

r 1 fig. N.

s 2 fig. O.

t 1, 5 fig.

u 24 cap.

C, D.

u prime figure cap.

4 inferie

A.

x 1 fig. P.

y 9 fig.

cap. 24 O.

tunè principium ducant. Ab hac enim humeri sede (quam in musculorū, ue-  
 narum, arteriarū & neruorum historia externū humeri tuber appellabimus)  
 & acuta linea, ab illa sursum aliquouſq; per externū humeri latus conſcenden-  
 te, ſex enaſcuntur muſculi, quorum primus & altiffimus, cæteris latior eſt, &  
 inter radium mouentes facilè longiffimus, illum in ſupinum ducit. Secundus  
 ſub primo exoritur, bicorni tendine brachiale extendens. Tertius iſt eſt, cuius  
 ope index, medius & anularis extenduntur. Quartus, quem præcipuum par-  
 ui digiti extenſionis authorem ponemus. Quintus, qui ulnæ exporrec-  
 tus, extenſionis quoque brachialis opifex eſt. Sextus, radium in ſupinum agen-  
 tium alter numerabitur: qui etiam ab infima externi huius humeri tuberis ſe-  
 de, magna ex parte initium ſumit. Poſterior autem tuberis regio \* muſculis cu-  
 bitum extendentibus inſecta, ſinum quendam obtinet, illi iuxta externum  
 latus orbitæ humeri inſculptum, quo quartus brachium adeuntium neruus  
 uehitur. Quemadmodum uerò externum humeri latus inferiore ipſius ſede  
 protuberat, ita quoq; ab interno orbitæ humeri latere, muſculorum neruo-  
 rumq; ratione inſignis acutusq; exoritur proceſſus, internum humeri tuber  
 merito nobis appellandus, quod nullius articulationis gratia, perinde ac ex-  
 ternum, radio inarticulatum, prominet. Ab ipſius itaq; apice, nonnihil ampla,  
 muſculus enaſcitur, qui lato tendine internā manus cutem adit: deinde duo  
 flexus brachialis authores. Ex infima uerò tuberis huius ſede, portio eius mu-  
 ſculi exoritur, qui radium in prouum mouentium ſuperior habetur, cum ob-  
 ſcura quorundam digitos ſectentium muſculorum principij parte. Cæte-  
 rum neruorum occaſione, quibus tuber iſtud commodam ipſorum inceſſus  
 ſedem exporrigit, ac ueluti propugnaculum iſſdem efficitur, in anteriori ſua  
 ſede, iuxta humeri orbitam, ſinum leuiter exculptum oſtendit, quo tertius  
 brachium petentium neruus dirigitur. In poſteriori autem ipſius ſede, alio  
 ſinu, quintum brachij neruum deducit. Porro utcunque internum hume-  
 ri tuber grande ſit, & in uiuentibus tactu promptè deprehēdatur, non tamen  
 ob id Galeno credendum eſt, qui id externo grandius eſſe prodidit, quum ex-  
 ternum multo maius interiore ſit. nam quod tactui non ita atq; internum ſe-  
 fe offert, non ipſius quātitas in cauſa eſt, uerū radius, cui id articulatur, quiq;  
 quo minus tactu ipſum diiudicari poſſit, prohibet. Nihilominus, ſi ſumiarum,  
 & magis adhuc canum, & inſuper quadrupedum (quibus craſſus inſigniter  
 obigit radius, ad tenuiſſimam ulnam non mobilis) humerum expendes, Ga-  
 leni ſententiam illi aptius multo, quā hominis humero coaptabis. Cæte-  
 rum humerus, ut & medias ipſius ſedes unā deſcribamus, per longitudinem  
 teres quodammodo eſt: uerū poſteriori ſede amplior, magisq; depreſſus,  
 quā anteriori. Huius namque ſedis medium, utcunque ſecundum longi-  
 tudinem tereti forma extuberat, quæ dein in lateribus nonnihil comprimi-  
 tur. Latera autem humeri magis, ut & anterioris ſedis medium, extuberare,  
 quā deprimi conſpiciuntur. Hæcque accumbentium muſculorum ratio-  
 ne accidunt, qui, quum ipſorum fabricam rationemq; habueris perſpectam,  
 ſuo uoto eleganter os compreſſiſſe tibi uidebuntur. Ex abundanti autem, in  
 poſteriori humeri ſede, iuxta ſuæ longitudinis medium, quædam apparet  
 compreſſio, ad quam neruus brachium adeuntium quartus, ab interno bra-  
 chij latere in externum latus obliquè deorſum repit. Qui uerò anteriores  
 quidem & exteriores humeri ſedes gibbæ, poſteriores autem & interiores  
 ſimæ Galeno in libro de Oſibus uiſæ fuerint: & cur in ſecundo libro de Par-  
 tium uſu, humerum exterius gibbum eſſe, interiūs autem ſimum prodiderit,  
 non ſatis

Internum tuber  
 inferioris  
 ſedis humeri.

Tum alibi,  
 tum etiam li-  
 bro de oſib.  
 cap. 16.

Medium hu-  
 meri partium  
 deſcriptum.

non satis assequor. Nam nisi humerum statuerimus rectum esse, gibbus profecto censerebatur. Anteriori superiori quæ parte, simus uero posteriori ac superiori: rursus anteriori inferiori quæ; simus, posteriori & inferiori gibbus. Deinde, ni fallor, interius, & potissimum ad inferiora, gibbus, exterius uero simus. Atque hanc formam musculi potissimum inducunt, cubiti flexionis & extensionis opifices: quâuis interim minor humeri sit obliquitas, quàm quæ in disensionem uocari debeat. Asperitas autem, quæ in anteriori humeri sede, supra medium suæ longitudinis, uersus exteriora consistit, in hoc paratur, ut ualidior musculorum brachium mouentium hic succedat insertio, & posterior cubitum flectentium musculus hinc idoneum educat principium. Hæc quæ asperitas tanta est, ut in admodum senibus hinc insignis processus nasci conspiciatur, in primis ad musculi brachium attollentis insertionem paratus. Præter hanc asperitatem, alia occurrit iuxta sinum, quo externum musculi caput uehitur, qui cubitum flectentium anterior est: cuius interioris capitis carnosa pars, huic asperitati connascitur. Foramina notatu digna in humero nulla occurrunt, præter pauca iuxta sinuum & capitulum supercilia, in hoc incisa, ut hinc ligamenta ualidius educerentur, aut eadem hic implantarentur. Sunt etiam nonnulla, sed rara foramina, secundum humeri longitudinem conspicua, & uenis admittendis potissimum in interno ipsius latere (quâ maxima scilicet uasorum fertur series) cæcata, & in amplum sinum medullæ afferuandæ gratia, & humeri læuitatis occasione paratum, pertinentia.

b 1 fig. d.  
c 2 fig. x.  
d 1 fig. b.  
e 2 fig. z.

f 1, 2 fig. c.

g 8 musc.  
tab. f, de cin  
L.

h 10 musc.  
tab. a, de cin  
11 tab. p.  
i 1 fig. f.  
h 6 musc.  
tab. o, ubi  
musculus  
notatur.

l figura 1.  
capiti in-  
feria.


DE CVBITI OSSIBVS, VLNA, ET  
radio. Caput xxiiii.

PRIMA VIGESIMI  
QUARTA CAPITIS FI  
gura, sinistri cubiti duo exprimens ossa,  
anteriori facie delineata. Quod uero in  
hac, uti & in subsequentibus fere huius  
Capitis omnibus figuris, sinistri lateris  
ossa sint obuia, quum tamen aboquin  
quodammodo semper dextra potius,  
quàm sinistra explanentur, fortuito  
& casu hinc accidit, quod in lignis seu  
formis, pro sinistris dextra hic depinxe  
rimus. quamuis interim in ossibus, de-  
xtrum ne an sinistrum propo-  
natur, nihil intersit.



SECUN-






SEPTI-  
MA.

OCTA-  
VA.

NONA.

DECI-  
MA.

UNDE-  
CIMA.



QVID DECEM FIGURAE, QVAS SERIATIM  
 primæ huius Capituli figuræ subieciimus, denotent, ac omnium chara-  
 cterum quæ undecim figuris inscribuntur, Index.

SECUNDA vigesimaquarti Capituli figura, utrumq; sinistri cubiti os, radius nimirum & ulna, exte-  
 riori facie proponitur. Tertia, solus radius interna sede: quarta autem, radius externa sede delineatur. Quin-  
 ta internam ulnæ sedem, sexta uero externam exprimit. Septima sinistri radij inferiorem ostendit portionem,  
 cui brachiale inarticulatur: atq; hanc partem ueluti ex inferiori, seu aliâ ulnâ spectante facie, ita delineavi-  
 mus, ut sinus in conspicuo sit, quo ulnæ capitulum hic iuxta brachiale excipitur. Octava figura, ad dextrum cu-  
 bitum, perinde ac tres ipsam sequentes, pertinens, inferiorem radij portionem exteriori facie sic delineatam con-  
 tinet, ut sinus pateat, cui brachiale inarticulatur. Nona superior em radij portiunculâ indicat, in qua sinus ob-  
 seruatur, quem humeri caput subintrat. Decima inferiorem ulnæ portiunculâ exhibet, partem quæ brachiale  
 spectat ostendens. Undecima superiorem ulnæ partem expressam offert, in qua sinus tuberaq; & processus oc-  
 currunt, quibus humeri orbita seu rotula adaptatur.

A, B 1, 2 Internallum his characteribus inclusum, Cubitus uocatur. ac A superiore ipsius notat partem, quæ  
 humero coarctatur: B uero inferiorem, quæ brachiale spectat.

C 1, 5, 11 Anterior processus ulnæ, humeri sinum subiens, in elatioris humeri rotula sedis anteriori parte calatum. Et C  
 7 quidem

quidem in prima figura internam processum notat sedem, cartilagine incrustatam: in quinta uero & undecima externam sedem indicat, asperam & inaequalem.

D 1, 2, 5, 11 Posterior ulnae processus, sinum intrans, in humeri posteriori sede ad elatiorem ipsius rotulae regionem exculptum. Ac D in prima quidem, & secunda, & quinta, internam processum sedem indicat: in undecima autem externam, seu posteriorem.

E 1, 2, 5 Ulna sinus, humeri rotulam excipiens. Hunc sinum undecima figura exactius, ut modo subijciam, notat. F & F. F. tubus, quod secundum sinum huius longitudinem fertur. G & G, latus tubus internum. H & H, latus tubus, seu, si mauis, sinus ulnae, externum. I & K, sinus huius sedes, quae in suis lateribus infima ipsius parte à leui circumfrentia nonnihil intermittitur, ligamentorumque producendorum gratia aliquantulum asper & mollior foret cernitur.

L 1, 5, 11 Processus, seu magna asperitas in radice anterioris ulnae processus C insigniti conspicua, & quorundam musculorum exortui & insertioni aptam sedem parans.

M 1, 2, 3, 4, 9 Cervix seu collum radij.

N 1, 2, 3, 4, 9 Radij capituli, cui sinus insculpitur, quæ humeri caput ingreditur. Sinu hunc O in nona figura indicat. O.

P 1, 2, 5, 6, 10 Ulna cervix.

Q 1, 2, 5, 6, 10 Ulna appendix notatur.

R 1, 2, 5, 6, 10 Ulna appendicis processus, quem stylo scriptorio comparamus.

S 10 Sinus appendicis ulnae, cui cartilago iam T notanda adnectitur, seu potius innascitur.

T 1, 2, 3, 4, 7, 8 Cartilago, quæ ulnae appendicis maximam portionem à brachiali dirimit. ac T quidem in prima & octaua, cartilaginis sedem indicat, quæ primum à radij appendicis sinu, x, y & z indicando, pronascitur. In secunda uero sedem notat, quæ cartilago radij appendicis adnascitur. In tertia, cartilaginis sedes indicatur, brachiale respiciens. In quarta, cartilaginis sedes, ulna incumbens, occurrit.

U 2, 6 Sinus in ulnae appendice, & ossis ulnae, cui appendix adnascitur, sede, in hoc paratus, ut alterius brachiale extendentium musculi tendinem deducat.

X, Y, Z Hæ tres characteres in sexta, & X ac Z in secunda, triangulum circumscribunt, qui in ulnae excarnis gibbusque est. Verum Z priuatiuè trianguli notat uerticem.

a, d 1, 2, 6 Prima protuberans ulnae linea.

b, b 1, 2, 5 Secunda protuberans ulnae linea. Verum B priuatiuè in prima & quinta figuris, huius lineæ sedem indicat, B. oblique secundum uerticem ulnae ductam.

c, c 1, 2, 5 Tertia protuberans ulnae linea.

d 1, 6 Ulna latus, prima linea & secunda circumscriptum.

e 2, 6 Ulna latus, prima & tertia linea circumscriptum.

f 1, 5 Latus ulnae, inter secundam lineam & tertiam consistens.

g, g 2, 6 Linea illi ulnae lateri peculiaris, quod prima linea tertiæ continetur.

h, i 1 Duo hi characteres sedem utranque notant, quæ radius ulnae coarctatur. ac h quidem sedes indicatur superior, & humero proxima. i uero inferior, & brachiali contermina.

k, k 1 Tota hac sede (eo quod radius arcuatim obliquatur) duo cubiti ossa inuicem dehiscunt.

l 1, 11 Sinus ulnae incisus, in quo radij capitulum uoluitur.

m 3, 4, 9 Radij capituli sedes, quæ ulnae sinui, l insignito insidet.

n 1, 3 Inferior radij appendicis interior sedes notatur: in reliquis autem figuris, secunda nimirum, quarta, septima & octaua, exterior sedes extenditur, alijs characteribus ornata.

o 7 Sinus in radij exculptus appendice, in quo ulnae appendix excipitur.

p 5, 10 Protuberans ulnae appendicis pars, radij sinum o indicatum ingrediens.

q 1, 2, 3, 4, 9 Amplius abruptusque radij processus, cui tendo musculi cubiti flectentium anterioris inseritur.

r, r 1, 2, 3, 4 Acutus radij linea, ipsius inferna sede, quæ secundum cubiti longitudinem ulnam respicit, extuberans.

s, s 1, 3 Internum lineæ r prius insigniti latus.

t, t 2, 4 Externum lineæ r indicat latus.

u 2, 4 Hac sede radius asper est, ut duo ex quatuor ipsi peculiaribus musculis, hic ualidius infererentur.

x, y, z 1, 8 Sinus in radij appendice, articulando brachiali incisus. Et z quidem notat sinus tuberculum nonnihil prominens, & sinum ipsum ueluti geminum constituentem, cuius partes x & y indicari possunt.

α 1, 3, 4, 6, 7, 8 Radij appendicis maxime eminens portio, quæ sinui cui brachiale articulatur, interiori sede adanger.

γ, δ, ε, ζ, η Hæ characteribus in secunda & quarta figuris gibba externaque, inferioris radij appendicis regio, cum ipsa ossis cui appendix coalescit sede, notatur. & singuli characteres aliquem huius sedis sinum priuatiuè indicant. γ qui

θ dem primum sinum, δ secundum, ε & ζ tertium, η quartum. In secunda autem figura θ sinum indicat, radio ulnaeque communem. Sinus isti uelutini feruunt tendinibus.

a 1, 2 fi. A.  
B. integra-  
rū fi. T. V.



b tota fi. 5  
et 6 aut 2  
fig. integrū  
rum Y.

c tota 3, 4  
fi. aut 2 fi.  
integrū  
rum X.  
d 1, 2 fig.  
cap. 23 K,  
L, M.  
e 1, 2, 5, 11  
fig. Canter-  
rior, D po-  
sterior.  
f 1 fi. cap.  
23 N.

g 2 fi. cap.  
23 O.

h 1, 2, 5 fi.  
C, D. de in  
E.

i 11 fi. F, G.

k eadē fig.  
G, G. de in  
H, H. que  
conferes cū  
K, L, M 1, 2  
fig. cap. 23.

N I V E R S A <sup>a</sup> pars inter brachium & brachiale posita, Græcis *πῆχυς*, Latinis uerò Cubitus appellatur. Hæc duobus constat ossibus, inuicem incumben-<sup>b</sup>tibus & dearticu-<sup>cub. int.</sup>latis: quorum <sup>b</sup>inferius, quod & longius est, *πῆχυς* quoq; ac Cubitus uocatur. Ne autem homonymia sermoni aliquid obscuritatis pariat, quoties integræ duobus illis ossibus extructæ partis mētio incidet, Cubiti uoce utendum

duximus, inferius quidē os ulnam, <sup>c</sup>superius uerò, quod *ῥαδιος* Græcis dicitur, <sup>ulna.</sup>Radium nuncupantes. Duo hæc ossa, longa sunt, & omni propemodum ex parte inter se uaria. Vlna enim ad humeri <sup>rad. int.</sup>orbitam, rotulam <sup>ulna ad hume-  
rum articula-  
tio, et ipsius  
hic processum  
et sinu deseri-  
ptio.</sup>ue, apto in hoc exculpta sinu, & idoneis donata pro-<sup>d</sup>cessibus articulatur. In superiori namque ipsius sede, admodū crassā & solidā, <sup>e</sup>duos insignes adipiscitur pro-<sup>f</sup>cessus: quorum quum unus altero prior anterior <sup>g</sup>ue est, hunc quidem anteriorem, illum uerò posteriorem haud inopportunè uocabimus. Anterior itaque <sup>h</sup>sinum in priore humeri sede ad elatiorem rotulæ ipsius regionem exculptum respicit, suisq; tuberibus illi sinui adamussim coaptatur, respondetq; amplius enim est, & obtuso angulo similis, & perquam durus, ac solidus. Posterior autem pro-<sup>i</sup>cessus, anteriori forma quodammodo correspondens, <sup>k</sup>sinum subintrat, qui in posteriori humeri sede ad elatiorem rotulæ regionem cælatur. cum tamen sinus iste anteriore sinu multo profundior ampliorq; existit, processus etiam posterior anteriore crassior ampliorq; meritò euasit, & anguli magis adhuc obtusi speciem referet. Processum hunc Athenienses quidem *ὠλέκρανον*, Dores autem *ῥαδιον*, Hippocrates uerò *ἄγκυον*, Galenus porro iam *ὠλέκρανον*, iam *ἄγκυον* uæ appellarunt. Quæ uoces magno eorum qui Latina legunt incommodo, ab interpretibus confunduntur, non has solum unico cubiti nomine crebrò uertentibus, sed & ulnam, & totam partem inter brachium ac brachiale sitam, & humeri cum ulna ac radio articulū, & internam eiusdē articuli sedem, ipsiusq; flexum. Cæterum <sup>l</sup>in horum ulnæ processuū medio, quā se inuicem ē regione spectant, grandis exculpitur sinus, humeri rotulam excipiens, illiq; omnino respondēs. Primū enim instar semicirculi, aut paulo etiā profundius quā semicirculus, cælatur: nostriq; C, ac Græcorū *Γ* imagini accedit. unde etiam ab eius characteris forma, Veteres hunc sinum *συμμοειδῆς* appellarunt. Deinde ut ad amussim humeri rotulæ congrueret, in ipsius medio, <sup>m</sup>tubere obtuso am-<sup>n</sup>ploq; protuberat, quod secundum sinus illius longitudinem fertur, & utrinq; ad <sup>o</sup>latera ita cōprimitur, sinuaturq; ut funi chordæ <sup>p</sup>ue ad trochleæ rotulam conuolutæ, possit conferri. Quemadmodum enim teres chorda, rotulæ sinui pariter secundū concuum tereti inuoluitur, ita quoq; hoc ulnæ sinus tuber <sup>q</sup>sinui rotulæ conuenit: & depressa sinuataq; rursus tuberis latera, rotulæ sinus extuberantibus æquantur lateribus. Quod ut fiat exactius, internū ulnæ sinus <sup>r</sup>latus altiūs ipso externo cauatur: quum internū rotulæ latus multo procerius externo promineat, extuberetq; Vniuersus hic ulnæ sinus læuis est, & cartilagine incrustatus, & unā cum suis processibus rotulæ humeri, ut semel dicam, sic coaptatus, ut eius beneficio cubitus duntaxat, citra luxationis periculū, flectatur & extendatur. ad quod non solum spectatu iucundissimus ille, qui mutuo ingressu perficitur, ossium contextus opitulatur, uerū etiam ligamentorum articulum stringentium robur. Ut enim ualida articulum ambirent liga-  
menta, processuum sedes sinum non respicientes, asperæ inæqualesq; sunt.



Quamquam denuò non ligamentorum tantum, sed & musculorum nomine processus asperi cernantur. Posterior enim posterioris processus sedes, quæ interdum in puerulis appëdice constare uisa est, ac gibbi & gibberi nomen apud nonnullos meretur, admodum inæqualiter protuberat, quodammodoq; sinuata conspicitur, ut cubitum extendentium<sup>m</sup> musculorû insertionem fortius exciperet. Ita & anterior prioris cubiti proëssus pars, in hoc aspera existit, ut ualidior<sup>n</sup> musculi cubitum flectentium posterioris insertio efficeretur, & musculi<sup>o</sup> secundos ac<sup>o</sup> tertios digitorû articulos flectentes, hinc promptius originem ducent. Neq; solum hæc anterior prioris processus regio exasperatur, uerum & iuxta eius processus radicem, eorum musculorum nomine asperis<sup>p</sup> quibusdam tuberculis Natura ulnam decorauit. Ad hæc, ut ualidioribus ligamentis hic articulus amplexaretur, in infima ulnæ sinus C literam referentis fede<sup>q</sup>, utrinq; ad latera sinulus instar anguli cuiusdam imprimi cernitur, & ipse sinus C similis à sua circumferentia inibi definit, asperq; redditur: non alia sanè occasione, quam ut ex hac ulnæ parte foraminulis non peruijs obfita, ligamentorum fortium penderet exortus. Atq; in hunc modum ulna humero articulatur: radius autem, quâ humero iungitur, utcumq; tenuis est, & ex<sup>r</sup> oblonga tenuiq; ceruice, quodammodo in amplum orbiculatumq; porrigitur capitulum, quod ea parte, qua humerum spectat, sinum obtinet rotundum, & non impenfè cauum, quem humeri<sup>x</sup> caput, ad externum orbitæ suæ latus exertum, subintrat. Ad hoc caput radius, quiescente ad humerum ulna, in prorum supinumq; agitur: & interim, quo minus cubitus flectatur, extendaturq;, radij cum humero articulus, nequaquam obstat. Tanta enim est humeri capitis longitudo, tantaq; id sede læui & lubrica cartilagine incrustatur, ut radij sinus in illo quoque motu ab ipso nõ abscedat, ulla<sup>u</sup> ex parte dehiscat. Cæterum ulna à suo cum humero articulo deorsum<sup>v</sup> recta penè uersus brachiale fertur, sensum gracilescens, tenuiorq; tantisper facta, dum ad brachiale usque pertingat. illic enim ex<sup>u</sup> tenui longaq; ceruice, rursus nonnihil aucta, appendice donatur instar capituli cuiusdam rotunda, sed interim uaria. Hæc namque inferiori ipsius parte<sup>b</sup> processum obtinet, quem, quia in acutum procedit, Græci dissectores à scriptorij styli imagine *στυλοειδής* & *στυλοειδής* appellant: in hoc formatum, ut sinum adaugeat, quo brachiale ad cubitum articulari docebimus, utq; ab ipso<sup>c</sup> ligamen articulum hic continens pronascatur. Verum huius processus usum paulo post, uel Galeni nimirum illi tribuentis nomine, explicatius aggrediar. Inferior hæc ulnæ appendice sedes brachiale respiciens, ad internum latus acuti istius processus inæqualem nanciscitur<sup>d</sup> sinum, in quem<sup>e</sup> cartilago firmatur, quam à radio pronatam, magna ex parte ita inter brachiale & ulnam reponi audies, ut neq; brachiali, neq; ulnæ adnascatur, eiusq; generis cartilago sit, quam priuatim in maxillæ inferioris ad temporum ossa articulis, & in clauicularum cum conterminis ossibus nexu, contineri dudum retulimus. Porro si hunc appendicis ulnæ sinum & acutum ipsius processum exceperis, tota illius sedes brachiale spectans, obtusi depresi q; capitis superficiei refert, ad eumq; modum cartilagine incrustatur, quo sinus capitaq; articularum obduci læuigariq; solent. Ad hæc, ulnæ appëdix in externa ipsius sede<sup>h</sup> sinum quoq; sibi insculptum gerit, qui oblongus, & secundum cauum teres est, tēdini paratus eius<sup>i</sup> musculi, qui post brachiali ante paruum digitum insertus, brachialis extensionis autor habetur. Cæterum præter hanc appendicē, ulnæ per ipsius longitudinem forma & impressiones quædam, & ipsius instar linearum tubera, adhuc obseruanda ueniunt. Humilior enim ulnæ sedes ad posterioris ipsius iuxta humerum processus radicem, quâ cu-

Radij ad humerum articulus.

Ulna ad brachiale ductus, & inferiori ipsius sedis historia.

m 13 musc. tab. b, c, d.

n 8 musc. tab. f.

o 5 musc. tab. g.

p 6 musc. tab. h.

q 5, 11 fig. L.

r u fig. i, k.

s 3, 4, 9 fig. M.

t eisdem fig. N.

u 9 fig. O.

x 1 fig. P.

y 1, 2 fig. Q.

z 1, 2, 5, 6, 10 fig. R.

a eisdem fig. S.

b eisdem fig. T.

c 12 musc. tab. i.

d 9 fig. S.

e 1, 2, 3, 4, 7, 8 fig. T.

f in margine cap. 10.

g 4 fig. cap. 22 R, S.

h 1, 10 fig. V.

i 9 musc. tab. A.

k 6 fi. X. quā cubito innitimur, aliquousq; \* gibba est, sua amplitudine triangulum refe- *Quā ulna secun-*  
 Y. Z. C. 9. rēns, qui excarnis, & musculis non intectus, mox adempta cute conspicitur, *dum ipsius lon-*  
 mus. 14. v. duntaxat nervosam tenuitatem<sup>1</sup> musculorū excipiens, quorum beneficio cu- *gitudinem se-*  
 l eadē tab. bitus extenditur. Huius trianguli<sup>m</sup> uertex deorsum exporrigitur, & lineā mo- *habeat.*  
 S. T.  
 m 2, 6 fig. do ob hoc maximē ultra medium longitudinis ulnæ protuberat, quōd huius  
 à Z per d. lineæ latera à musculis duobus comprimantur, ipsa<sup>1</sup> ue ulna musculis illis ce-  
 a. uti et pri mus. 14. d. dat, quorum<sup>n</sup> alter exteriori lineæ lateri exporrigitur, postbrachiali ante par-  
 n 9 musc. uum digitum insertus, ac brachiale extendens.<sup>o</sup> Alter, qui interno lineæ lateri  
 o eadē tab. A. exporrigitur, & cui ulnæ os impensius cedit, brachiali ante paruum digitum  
 tab. 3. inferitur, idq; flectit. Præter hanc lineam, aliæ adhuc duæ cernuntur, cum nuper  
 p 1, 2, 5 fi. dēns, non teres, sed triangularis quodammodo uideatur.<sup>1</sup> Secunda igitur protu-  
 b, b. berans lineam, ab interiori latere radice anterioris processus ulnæ rectā deducit,  
 q 1, 6 fi. d. & commune<sup>n</sup> latus cum prima lineā cōstituit, quod ab illo musculo im-  
 r 2, 6 fi. c. pressum est, quem modō brachiale flectere diximas.<sup>1</sup> Aliud autem ulnæ latus  
 t 1, 2, 5 fi. cum secunda lineā,<sup>1</sup> tertia efformat lineam, quæ trium linearū acutissima asper-  
 c. c. rimaq; est, & ab externo latere radice anterioris ulnæ processus lōgissimē pro-  
 t 7 musc. cedit: inq; hoc educitur, prominet<sup>1</sup> ue, ut ab ipsa ualidum pronasceretur<sup>1</sup> liga-  
 tab. V. mentum, quod radium ulnæ secundū cubiti longitudinē robustioris mem-  
 u 1, 5 fi. f. branæ instar connectit.<sup>1</sup> Latus hoc inter secundam lineam & tertiam reposi-  
 tum, musculorum gratia comprimitur, qui internam cubiti sedem occupant,  
 x 6 musc. quibusq; hīc ab ulna & radio apta paratur sedes. Horum autem præcipuus est,  
 tab. 3. quem tertium quatuor digitorū articulum flectere audies. Verū quia mus-  
 y 7 musc. culi secundum istud latus occupantes, in ipsorum per ulnam progressū, etiam  
 tab. Q. sui exortus portionem ab illa assūmunt, ipsum magis asperum occurrit, quā  
 z 2, 6 fig. latus inter secundam lineam & primam cōspicuum: à quo nullus pronalcitur  
 8. 3. musculus, nisi iuxta ulnæ cum humero articulum, ubi<sup>1</sup> is principiū ducit, qui  
 a 10 musc. radium in prouum ducentiū superior est. Latus tertia & prima lineis circum-  
 14. A, 2, 11. scriptum, reliquis duobus minū est compressum, & priuatim<sup>1</sup> lineam obtu-  
 sam, sed longam, & modicē prominentem, ac uiciniū tertiæ lineæ, quā primæ  
 deductam, adipiscitur. Hanc Natura<sup>1</sup> trium musculorū gratia produxit,  
 qui ab ipsa triplici principio originē ducunt. Ac primum quidem eius muscu-  
 li est, qui radium in supinum ducentium breuior habebitur. secundum autem  
 & tertium pollicis ac indicis famulari motibus, in secundo libro docebimus:  
 quem eo leuiori negotio intelliges, quo cōsideratus ea quæ modō narramus,  
 in osibus spectaueris. Sunt enim hæc non minus uisu cognituq; iucunda, quā  
 cerebri & aliarum, quas hodie solum miramur, partium sectio. ut interim de  
 summo in artis nostræ operibus usu nihil dicam, dum ad has lineas scopum fi-  
 gentes, fractum ac luxatum os ritē nos reposuisse, certissimō cognoscimus. Ad  
 hunc itaq; modum ulna multum etiam ultra medium ipsius longitudinis se  
 habet. Vbi uerō brachiali propinquiū accedit, teres omnino esset, nisi secūda  
 b 1, 5 fi. B. lineam insigniū inibi<sup>b</sup> protuberaret, ac obliquē deorsum protensa, sedē adapta-  
 c 7 musc. ret<sup>o</sup> quadrāgulari musculo, qui radij in pronū motus opifex, hinc principium  
 tab. X. fumere docebitur. Porro si quid de ulna adhuc dicendum super sit, id iam unā  
 cum radij historia persequar, qui obliquus est, quatenus ulna recta. Radius nāq;  
 d 1 fig. b. suprà<sup>a</sup> infraq; ulnæ committitur: in medio autem, ac per reliquam longitu-  
 e 1 fig. i. dinem ita arcuatim obliquatur, ut admodū ab ulna dehiscat. quod parū sit,  
 f 1 fig. m. ut radius obliquo ductu ulna suffultus, in prouum supinumq; promptē agere-  
 uer h C. h. tur: partim, quō apta sedes musculis constitueretur, quos necessariō internam  
 n 3 exter-

*Radj obli-*  
*quid.*

externamq; cubiti regiones occupare oportuit. Quanquam magis obliqui sui motus occasione, quam musculorum gratia radium obliquari, plurimumq; in medio ductu duo cubiti ossa inuicem abscedere, illa nos doceant animalia, quibus neq; radius, neq; radij beneficio manus in prouum supinumq; ducitur. Equus namq; ouis, eiusq; generis animalia, solidis aut bifulcis donata unguibus, tota cubiti longitudine radium ulnæ ad eodè connotum a stabilitumq; obtinent, ut ne tantillum quidem citra ulnam radius moueatur. In canibus uerò, & felibus, & ijs animalibus quibus pedes in digitos dirimuntur, radius mouetur quidem, sed tanto obscurius ac difficilius, quāto nos manuum motus perfectiores obimus. Distat igitur in his quoq; animalibus radius ab ulna, uerum longè minus quā in homine: & non ad eodè laxam articulationis speciem in illis, atq; in homine cernimus. unde etiam haud miror, Galenum nō accuratius radij ad ulnam explicuisse articulos, inter se admodum uarios: suprà enim ulna radium excipit, infrà uerò hæc à radio excipitur. Ad externum namq; latus anterioris ulnæ iuxta humerum processus, sinus quidam instar quartæ circuli partis transuersim exculpitur. Ieuis, & cartilagine incrustatus. Huic sinui<sup>h</sup> internum latus capitis radij, cui sinus insculpitur, humeri externum caput excipiens, appositè congruit, ac læue & orbiculatum hîc factum, in illo ulnæ sinu uoluitur. Infrà autem iuxta brachiale, ubi radius crassescit, dilataturq;, & insigni<sup>i</sup> appendice donatur, huius appendicis humillimæ sedi<sup>k</sup> sinus insculpitur, illi nō ab similibus, quem paulo antè in ulnam incisum retulimus. In hunc sinum cartilagine incrustatum, superior appendicis ulnæ<sup>l</sup> sedes, capituli modo protuberans, cartilagineq; obducta, reuoluitur: hacq; ratione radius utriusq; articuli beneficio tantummodo in prouum supinumq; agitur. Non procul à superiori articulo, ubi radij<sup>m</sup> ceruix consistit, radius<sup>n</sup> asperum abruptumq; educit processum, qui internā cubiti sedem respicit, & insertioni anterioris cubiti flectentium<sup>o</sup> musculi aptam sedē parat. Rursus reliquo ab humero uersus brachiale ductu, radius non omnino teres & læuis est: uerum per ipsius longitudinem humiliori sua sede<sup>p</sup> acutā & insigniter extuberantē producit lineam, quæ tertiam ulnæ lineam respiciens, ligamentum admittit, membranæ ualidissimæ ritu ambo cubiti ossa, quæ inuicem dehiscunt, colligans. Externum huius lineæ latus, perinde ac<sup>q</sup> internum quoq;, compressum sinuatumq; est: ut hoc internam cubiti sedem occupantibus musculis, illud uerò ijs qui in externam habetur, cedat. Porro internum latus externo asperius est, quod<sup>r</sup> musculus tertium pollicis os flectens, non infimam sui exortus portionem ab illo latere priuatim obtineat. Superior radij sedes è directo dictæ nuper lineæ cōsistens, penè teres est, & iuxta medium suæ longitudinis aliquousq; aspera occurrit, ut in hanc duo musculi ualidiorem molirentur insertionem: quorum<sup>s</sup> alter radium in supinum agendum breuior est, alter uerò radium in prouum ductum superius, cuius potissimum occasione asperitas illa celatur, quod ipse nerueam potius quā carnē insertionem efficiat, longiusq; in osse producat. In radij<sup>t</sup> sede, brachiali contermina, pleraq; examulsum inquirenda ueniunt. Primū enim hanc partem augeri, ac dilatari, in crassariq; oportuit, ut apta cōstitueretur sedes, cui<sup>u</sup> brachiale articulari queat. necessum etenim erat, brachialis cum cubito articulum, in hominibus paulo minus toto ad radium referri: si modò quiescente ad humerum ulna, manus radij beneficio, & uelut secundario, in prouū supinumq; agi debuit. Si namq; sinus brachiale excipientis par portio, in ulna & radio exculperetur, & ipse interim sinus superiorem brachialis sedē imitans, necessariò transuersim oblongus esse deberet, prorsus foret

Radij ad ulnæ articulationem.

Radij per ipsius longitudinem lenitas & asperitas.

Inferioris radij partis historia.

g f. 11. fig. 1.

h 1. 4. 9 fig. m.

i 1. 3. fig. n. Verum in alijs figuris radij illa appendix quoq; est obuia.

k 7 fig. o.

l 5. 10. fig. p.

m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. fig. m.

n eisdem figuris q.

o 6 musc.

p 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

u 2. 3. 4 fig. u.

x 12 musc.

tab. A. C.

dein d. e.

y 7 musc.

tab. Q.

z tota 7 C 8 fig.

a 5 prima-

rium si cap.

25 charact.

1. 2. 3.



foret impossibile, radius & manum simul in pronom supinum ue ferri, ulna ad humerum quiescente, ac ueluti huius motus basi ac fulcimento. Pars enim brachialis, quæ tunc ulnæ sinui inarticularetur, clauī modo obstaret, quo minus uel tantillum radius, immota ulna, moueri posset. Operæ precium igitur fuit, inferiorem radij partem sinus cui brachiale inarticularetur occasione, admodum crassescere. Verum quia tenue os nimium augeri, nequaquam expediebat, Natura etiam brachialis portionem ab ulna sustineri uoluit: ita ut, ut ulna expuncto, suoq; adeo acuto processu, brachiale uix contingeret. Ne enim ulna, reliqua sui appendicis sede, brachiali citra alterius corporis interuentum cōmitteretur, Natura ab inferiori sede sinus in radij appendice brachialis gratia exculpti cartilaginem deduxit: quæ ulnæ appendicem ascendens, illam à brachiali dirimit, itaq; articulū hunc aptat, ut ulna brachiale quidem sustineat, uerum proximè non contingat, totusq; sinus (uti sanè oportuit) ad radius spectet. Atq; hæc sanè tanto uelim inquiri diligentius, quò magis cum Galeni dogmatibus pugnat. non enim lubet in hoc negotio, alioqui satis prolixo, passim Galeni loca, à quibus prudens dissentio, subnectere, rationemq; cur aliter sentiam subijcere, quum diligens lector etiam non admonitus, hæc abundè animaduersurus sit. Verum ne nimium ipsius interim placita, eaq; potissimum quæ à studiosis in publicis sectionibus, ut expendatur, requirere soleo, iam præterisse uidear, in radij ulnæq; Galeni historia, portionem & particulam modò assumam, prolixius sæpiusq; ab ipso inculcatā. est autem hæc, acutus ulnæ processus, quem stylo comparamus. Vt itaq; præteream, quòd magnam, & (quantum ex ipsius scriptis assequor) dimidiā sinus cui brachiale inarticulatur portionem, ulnæ ascribit, acuto huic processui priuatum ad brachiale contextum inibi tribuit, ubi ulnam radiusq; in libro de Ossibus pertractat. Vbi autè paulo post brachialis ossa recenset, contextus illius speciem exprimit, quando scilicet tertium superioris brachialis ossiū ordinis os, quod paruum digiti spectat, sinuatum esse, atq; in illud acutum ulnæ processum ingredi commemorat, ac ueluti duos brachialis cum ulna & radio articulos proponit: quorum unum quidem ad radius & ulnam simul refert, alterū uerò ad acutum ulnæ processum. atq; ad hunc quidem articulum pertinere asserit, brachiale in obliquum ducere: ad illum uerò, in rectum, cuius opera manum extendimus, inflectimusq;. Arbitror autem Galenum per obliquū motum, illum intelligere, quo manus in utroque latus ducitur, pari nimirū motu, quo digitos inuicem adducimus & reducimus: ita enim obliquum lateralem ue motum aliàs ferè semper Galenus intelligit. Quod si est, quid dici posset absurdius, quàm hunc motū acuti illius processus munere celebrari? quum is, si brachiale altiùs subingerederetur, eum motum haud secus impediret, quàm longus aliquis baculus secundum ulnam ad cubitum ligatus, & ad externum usque postbrachialis latus suo apice pertingens, pulchrè obstaret, quo minus in externum latus manus abduci posset. Porro si Galeni locum in secundo de Partium usu excutere uoueris, inibi illum quoq; duplicem articulū recensere, ac eum qui acuto fit processu, in hoc factū dicere, animaduersurus es, ut manus illius ope in pronom supinumq;, & deinde etiam in latus duceretur. Hanc sententiam, re ad amussim perpèsa, non minus quàm priorem ueritari repugnare fateberis. idq; tunc potissimum, quando omnem ferè brachialis articulationem, ad radius ob hoc præcipuè referri disces, ut radij motum, qui in supinum & pronom fit, manus secundariò sequeretur: & insuper colliges, illos motus debere impediri, si acutus ille processus, ex Galeni sententiā, brachiali articularetur. quod oues,

b 1, 2 f. R.

c 9 fig. x.

d 1, 2, 3, 4.

7, 8 figura

tota T.

Cartilago brachiale ab ulna durmens.

Libro de Ossib.  
Primo de Ad-  
minis differt.  
Secundo de  
Pis part.c 1, 2, 3, 4, 5  
fig. cap. 15.  
charact. 3.

bouesq; liquidò ostendunt. nam ipsorū brachialis ad cubitum articulatio, Galeni descriptionibus, quantum ad acutum spectat processum, respōdens, neq; in latera, neq; in prouum, neq; supinum aptè moueri potest. Illis namq; animalibus acutus ulnæ appendicis processus oblongus est, & sinum priuatim in brachialis ossibus sibi uendicat, nullaq; cartilago peculiaris ulnam ac brachiale interuenit, præter eam quæ ossibus crustæ modo obducitur. cuiusmodi tamen cartilago in homine spectatur, in quo etiam processus ille non tantum cartilaginis illius altitudinem excedit, quantum<sup>f</sup> superior illius qui in radij appendice sculpsitur sinus pars porrigi educiq; cernitur. Eminent autem illa radij pars eadem cum acuto illo processu ratione, ut scilicet sinum efformaret brachiali aptum,<sup>g</sup> hincq; ualidiora articulum continentia producerentur ligamenta. Quum uerò huic radij sinui non unicum tantum brachialis articuletur os, uerum inter tria brachialis ossa, quæ radium ulnamq; spectare docebimus,<sup>h</sup> duo ad solum radij sinum referantur, & tertium cartilaginem illam à radio peculiariter pronatā, & acutū ulnæ appendicis processum respiciat, radij sinus<sup>i</sup> geminus esse apparet, eo quòd sinus modicè<sup>j</sup> inibi protuberat, ubi secundū brachialis os primo committi, Capite quod subsequitur dicturi sumus. Nunc uerò in super considerandum uenit, radij partem, cui appendix sua hīc coalescit, ipsamq; appendicem<sup>m</sup> interna parte sinuatam & leuiter cauam uideri, cū ut<sup>n</sup> musculo cederent radium in prouum ducentium inferiori, tum ut exactum iter<sup>o</sup> tendinum ferici adaptaretur, qui cubito exporrecti, digitorum flexui famulantur. Externa autem huius radij sedis pars, quemadmodū & externa brachialis regio, gibba est, quòd ita (quum extrā ponatur) iniurijs ferendis pertinacior reddatur. Ne tamen musculorum tendines, manum hāc petentes, & gibba illa sede deducti, hinc inde aberrarent, sinus multi huic sedi insculpsuntur, quibus tendines<sup>p</sup> transuersis obducti ligamētis, tanquam per anulos trajici, in secundo libro describemus. Sunt autem huiusmodi sinus numero quatuor. ac<sup>q</sup> primus quidem amplius est,<sup>r</sup> tendinibus paratus, qui indicem, medium & anularem extendunt. Secundus<sup>s</sup> tendinem transmittit, indicem & medium à pollice in latus abducentem. Tertius quodāmodo geminus est,<sup>t</sup> bicornem transmittens tendinem alterius musculi brachiale extendentiū, unā cum tendine<sup>u</sup> musculi pollicem uersus indicem euertentis, extendentis<sup>v</sup> ue.<sup>z</sup> Quartus sinus leuiter admodū exculptus est, uixq; sinus nomen meretur: asper tamen locus est, qui ligamentum transuersum<sup>x</sup> tribus tendinibus obuolutum educit: quorum unus brachialis ossi pollicem sustinēti inseritur, secundus primo pollicis ossi, tertius autem secundo & tertio pollicis ossibus. Verū quarti sinus sedes, ligamēti illius gratia, nō duntaxat aspera est, protuberatq; uerū etiam ut<sup>y</sup> tendo illi ualidius implanteretur musculi radium in supinum agentium longissimi. Præter hos sinus, etiam in externa articuli, quo radij appēdix iuxta brachiale appendicis ulnæ articulum sede,<sup>z</sup> sinus etiam confistit, qui ulnæ & radio pariter communis, tendinum uehit<sup>a</sup> musculi, cuius potissimum beneficio par uis digitus extenditur. Notatu digna foraminula, præter ea quæ neruorum & musculorum exortibus subseruiunt, neq; ulnæ, neq; radio obtigerunt: & undiq; præterquā ubi appendices sibi uendicant, solida impensq; dura continent substantia. quamuis interim<sup>b</sup> sinum, perinde ac humerus, femur & tibiæ ossa, secundum ipsorum longitudinem intus exculptum obtineant, medullæ reponendæ paratum, & ossium leuitati accommodum.

*Sinus radij, de  
ducendis locan  
dis, musculus  
& ipsorū ten  
dinitus apti.*

*f 1, 3, 4, 5  
fig. m.*

*g 12 musc.  
tab. k. & i.*

*h 1, 2, 4, 5  
fig. cap. 2. s.  
charac. 1, 2.  
i eandem  
figur. cha-  
ract. 3.*

*j 8 fig. x. y.  
l 8 fig. z.*

*m 1, 3 fig. n.*

*n 7 musc.  
tab. X.*

*o in manu*

*s & e mu-  
scul. tab.*

*p 1, 2 musc.  
tabule nu-  
meri hac se  
de possit.*

*q 2, 4 fig. r  
r 9 musc.  
tab. Z.*

*s 2, 4 fig. d.  
t 10 musc.  
tab. p.*

*u 2, 4 fig. v, f.*

*x 11 musc.  
tab. A.*

*y 10 musc.  
tab. o.*

*z 2, 4 fig. n.*

*a 10 musc.  
tab. h, m, n.*

*b, c. & 2 tab.*



*b, c. b 13 musc.  
tab. e, b.*

*c 2 fig. d.  
d 9 musc.  
tab. o.*

*e qualis ap-  
paret in fi-  
gura capiti  
inferia.*

PRIMA VIGESIMI QVIN-  
TI CAPITIS FIGVRA.


SECUNDA.



TERTIA.

QUARTA.

QUINTA.



SEXTA.



SEX VIGESIMI QVINTI CAPITIS FI-  
gurarum, & earundem characterum Index.

*D* R *AE* priores figura non praesenti tantum seruiunt Capiti, verum etiam tribus ordine iam subsequenti-  
bus, quibus manus partes quoque explicantur. Prima enim figura internam manus ossium sedem proponit. Se-  
cunda vero, eorundem ossium externam ostendit faciem. Quatuor autem figurae, has seriatim subsequentes, huic  
Capiti sunt propriae, ac duntaxat octo brachialis ossa varia facie exprimunt. Illa namque, quae tertia inscribitur,  
octo brachialis ossium simul in sua sede commissuram internam faciem commonstrat. Quarta, eadem ossa ex-  
terna facie delineata complectitur. Quinta superiorem brachialis ossium partem continet, quae cubito articulan-  
tur. Sexta, brachialis ossium infernam ostendit sedem, cui primium pollicis os, quatuorque, post brachialis ossa coar-  
ctantur. Characterum vero index erit huiusmodi.



I, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Octo his numeri characteribus, octo brachialis ossa in omnibus sex figuris insiguntur, si modo in illa superficie, in qua brachiale se offert, omnia in conspectum ueniant.

I, II, III, IIII In prima & secunda figura notantur quatuor postbrachialis ossa.

A, B, C, I, 2 Tria pollicis ossa.

D, E, F, I, 2 Tria indicis ossa, atq. eadem ratio in ceteris est digitis.

G 3, 6 Quinti brachialis ossis sinus, sedesq. cui primum pollicis os articulat. Sinus huius longitudinem transuersim a, b. in sexta figura ab a ad b metimur. Internam uero sedem c, externam autem d notat. ac d quidem in quarta, c, d. ta figura etiam est conspicuum.

H 3, 4, 6 Sedes sexti brachialis ossis, cui postbrachialis os indicem suffulciens coartatur. h uero in quinto ossis sedem indicis, quam idem quoq. postbrachialis os contingit.

K 3, 4, 6 Sedes septimi brachialis ossis, cui postbrachialis os, medium digitum sustinens, coartatur. k uero in eisdem figuris sedes indicatur, qua idem postbrachialis os, sextum brachialis os contingit.

L 3, 4, 6 Sedes octauis brachialis ossis, cui postbrachialis os, anulari praepositum, coartatur.

M 3, 4, 6 Sedes octauis brachialis ossis, cui postbrachialis os, paruorum digitum sustinens, coartatur.

N I, 2 Osiculum subinde accumbens externo lateri articulationis octauis brachialis ossis, ad postbrachiale os, quo paruorum digitum sustinetur.

O 2, 3, 6 Processus octauis brachialis ossis, in internam brachialis sedem protuberans.

P 2, 3, 6 Processus quinti brachialis ossis, ex quo transuersum pronascitur ligamentum, quod in octauis ossis processum O notatum in sectionem tendens, tendinibus obducitur, ex cubito internam manus sedem aduentibus.

Q 2 Appendix postbrachialis ossis indicem sustentis superior, quae brachiali coartatur.

R 2 Appendix postbrachialis ossis indicis praepositi inferior, quae capitulum constituit, primi indicis ossis sinum subiens, quaeq. longe manifestior est superiori.

S I, 2 Intervallum occurrens inter postbrachialis os indicis praepositum, & id quod medium sustinet. In ceteris autem postbrachialis ossibus eadem appendicis intervallorumq. est ratio.

T I, 2 In prima figura, ex duobus sesaminis ossibus interna secundi pollicis articuli sedi praepositis, internum os notatur: in secunda uero figura, externum.

U, U I Duo sesamina ossiculorum, primo indicis articulo praeposita.

X, X I Inferiori X ossiculum notatur sesaminum, secundo indicis articulo praepositum. Superiori uero, ossiculum tercio indicis articulo attributum. In ceteris digitis eadem quae in indicis horum ossiculorum est ratio.



IPPOCRATI, quemadmodum & Galeno subinde, manus (aut  $\chi\alpha\rho$  potius) uocabatur, quod uulgò brachium appellamus, quum hominem cruribus & brachijs donari dicimus, id scilicet uniuersum, quod à scapula ad extremum usq. digitorum, unguiumq. terminos pertinet. quod uero Latinis ferè omnibus manus nuncupatur, & ab infima cubiti fede, laxoq. illo manum cubito iungente articulo, ad digitorum usq. summum metimur. Hippocrati  $\chi\alpha\rho\chi\epsilon\delta\epsilon$ , ac si extremam summam ue manum dices, appellabatur. quae distinctio, etsi Græcis fortè sit commoda, latinè tamen scribentibus non undiq. potest esse usui. Manum itaq. in brachiale tantum, & postbrachiale, & digitos diuidentes, singulis ipsius partibus sua tribuimus Capita, praesente eam partem descripturi, quae cubito articulat, & à Græcis  $\lambda\alpha\varphi\tau\omicron\varsigma$ , à nobis uero Celsum imitantibus, brachiale uocatur, octoq. ossibus duplici ordine distinctis constituitur: quae in natu grandioribus dura sunt, & paruula, intusq. parum fungosa, modicaq. medulla appendicis modo oppleta: non autem prorsus medullæ, uti quibusdam uisum est, expertia, & potissimum quae horum occurrunt maiora. Haud parem enim omnia fortiuntur magnitudinem, ut nec forma, nec situm: quum ex omnibus nullum sit, quod alteri omnino respōdeat, & singula priuatim aliquid adipiscuntur, quo ab inuicem discerni queant. Porro utcunq. sint uaria, nihilominus mutuo tam concinnè adaptantur, ad tantamq. compositionis accedunt harmoniam, ut eorum numerus non admodum inuentu facilis sit. Nisi enim ualidissima cartilagineaq. ligamenta, quibus obducuntur, simul cum mem-

Brachiale octo ossibus constituitur, inter se forma differentium.

a tota figura cap. 2 lib. 3.

b tota & 2 fig.

c integrarum fig. V. cui iunguntur Z, Z. dein I, I, & A, A.

d integrarum Z, Z. & omniu huius cap. figurarum charact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

e 8 mufe. tab. C. & 12 tab. h.

branis

branis refecueris, & accuratè abraferis, unum effe tibi omnia uidebuntur, aut cum Celso ipsa incerto constare numero, & inter se connata effe opinaberis.

*f. confer. figuram 2. dein tertiā quartā.* Cæterum cuncta nerueis his cartilaginosisq; nexibus simul constricta, duas integras superficies unā efformat, exteriori quidem regione, quantum manui ex ulu est, gibbam, interiori autem sinuatam, quantumq; & hoc manui expedit, concauā. Hæc tantum superficies ligamenti obuiocuntur.<sup>8</sup> superius enim, quā ossa cubito committuntur, læuia sunt, & cartilagine incrustata: quemad-

*g. 7. figura.* modū & <sup>h</sup>inferius, quā postbrachialis ossibus, & primo pollicis ossi coarctantur.

*h. 6. figura.* Quin etiam ubi ossa se inuicem contingunt, læuibus & lubrica cartilagine incrustatis donantur sinibus & capitulis, quibus inuicem coarticulātur. In mu-

tuo enim nullorum brachialis ossium contactu, ligamenta membranæ uer-

terueniunt, nisi in inferioris ordinis ossium inter se connexu, ubi non nihil, sed

uix animaduersione dignum, ligamenti cartilaginei ueluti in puncto intercedit:

uti inferiora etiam ossa non ad eodē conterminē inuicem, atq; superiora, con-

stringuntur. Quod etiam meritō Natura molitur, in hoc potissimū duos brachialis ossium ordines confingens, quod <sup>i</sup>superior cubito, <sup>k</sup>inferior autem alia

prorsus ratione postbrachiali & primo pollicis ossi debuerit committi. His namq; ut distinctis diremptisq; coarticulatur ossibus, cubito autē unius ossis

instar. ad eodē ut hoc articulationis discrimen, potissima insuper censenda sit ratio

copiæ brachialis ossium. cui dissectionum periti secundarij addunt patien-

di difficultatem, existimantes brachiale iniurijs ferendis pertinacius fieri, quia

multis componitur ossibus, occurrentiū uim articulorum causa cedēdo exol-

uentibus, eo modo, quo hastam sagittam uel difficilius laxa quā tensā penetrare

conspicimus. Quanquam rursus & ad innumeras manus motuum differe-

rentias, hanc ossium uim & copiam à Natura non postremo loco extructam

esse animaduertimus. Quatuor in superiori brachialis ordine, qui cubitū spe-

ctat, repositis ossibus, ex ipsorum qua ordinantur serie, nomina non ab re im-

ponemus: <sup>l</sup>primum perpetuò uocantes, quod superioris ordinis internum

constituit latus: <sup>m</sup>secundum uerò, quod huic subsequitur, atq; magis ab inter-

no abscedit latere: <sup>n</sup>tertium, quod secundo ad externum latus proximum est:

<sup>o</sup>quartum uerò, quod externum latus iam omnino occupat. Quatuor pariter

inferioris ordinis <sup>p</sup>ossa, quintum, sextum, septimum, & octauum nuncupabi-

mus, atq; in hunc modum singulorū historiam aggrediemur. Primum itaq; <sup>q</sup>secundum

& tertium, inuicem ualidissimè proximeq; committūtur, & uno ordine iuncta, superiorē brachialis sedem ita efformat, ut instar unius alicuius

ossis lati, & transuersum oblongi capitis, in radij sinum concinnè articulentur.

Ac primum quidem & secundum, in <sup>r</sup>sinu radij appendici insculpto reponun-

tur: tertium uerò <sup>s</sup>cartilagini innititur, quam à radio pronatam, magna ex par-

te ulnam à brachiali dirimere scripsimus. Quanquam externum tertij ossis la-

tus etiam <sup>t</sup>acutum appendicis ulnæ processum tunc contingit, quum in exter-

num latus manum inclinamus. Verum interim tertium id os, sinum cartilagi-

ne oblitum, qui uisu dignosci queat, in homine nequaquam adipiscitur, quem

processus ille sibi propriū haberet, quum etiam processus ipse nisi secundum

sinum, quo brachiale arctatur, latus perinde extuberet, ac reliquorum sinuum

superficia, ipseq; radij appendicis in interiori sinu latere <sup>u</sup>apex. Atq; id uel tactu

leuiter dijudicatur, si manu in latus internum ducta inter brachiale & ulnam,

alterius manus pollicis apicē inferere quis fuerit adnissus. <sup>v</sup>Quantum brachia-

lis os ulnam haudquaquam contingit: at superiori sua sede eam huius articuli

ligamenti portionē admittit, quæ ab acuto ulnæ appendicis processu enascitur.

Dein

Brachialis ossi-  
gibus sedi-  
bus, ligamen-  
tis, ex quibus  
cartilagine ob-  
ducantur.

Cur duo bra-  
chialis ossium  
ordines.

Brachialis ossi-  
um nomina.

Brachialis ad  
cubitum arti-  
culus.

Quæ quartum  
os sibi specula-  
ria uendicet.

*i* omnium  
ferè figur.  
charact. 1.  
2, 3, 4.  
*k* omnium  
fi. charact.  
1, 2, 7, 8.

*l* quinque  
primarum  
figur. cha-  
ract. 1.  
*m* earun-  
dem figur.  
charact. 2.  
*n* earun-  
dem figur.  
charact. 3.  
*o* earun-  
dem figur.  
charact. 4.  
*p* seriatis  
in omnibus  
fi. charact.  
5, 6, 7, 8.  
*q* 1, 8. fig.  
ca. 24. 2, 9.  
*r* 1, 2, 3, 8  
fig. cap. 24.  
*T.*  
*s* 1, 2, 5, 10  
fi. ca. 24. R.  
*t* 1, 2, 7. fi.  
cap. 24. u.  
*u* Non est  
quod post-  
hac ossi in  
margine ad-  
notem, quū  
numeri cha-  
racteres in  
omnibus se-  
re cap. figu-  
ris sint ob-  
uij.

Dein superiori quarti ossis sedi\* tendo musculi inferitur, qui brachiale flecten-  
 tium est inferior. Ex humiliori autem ipsius sede<sup>r</sup> musculus pronascitur, cuius  
 beneficio paruum digitum à reliquis abducimus. Præterea &<sup>r</sup> musculus suæ  
 originis portionem hinc assumit, qui duorum primum parui digiti os flecten-  
 tium habetur exterior. ad eò ut quartum hoc os neq; inferiori, neque superiori  
 ipsius sede, neq; etiam externo ipsius latere, alteri ossi cõmittatur: sed tantum  
 interno ipsius latere, depresso admodũ capitulo, tertij ossis externo lateri (ma-  
 gis tamẽ ad manus uolam) in eum modum coarticulatur, quo ossa per planas  
 omnino superficies, cartilagine interim lubrica oblitas, construi diximus. Hoc  
 itaque quartum brachialis os, id peculiare sibi uendicat, quòd uni tantum bra-  
 chialis ossi iungatur, quodq; omnium brachialis ossium minimũ sit, reliquisq;  
 minus protuberet, sinueturq;. Est enim quodammodo sphaericum, sed paulo  
 longius quàm crassum: quia scilicet inferiùs musculos e ducit, superiùs autem  
 ualidissimi tendinis infertionẽ, uti diximus, excipit, eaq; ratione sursum deor-  
 sumq; magis quàm in latera protuberare debuit. Vnde etiam ueteres dissectio-  
 num professores, id (uti conijcio) Rectum appellarunt, ambigentes quem in  
 ordinem ipsum referret. nos autem superiori ordini ascripsimus, quòd tertio  
 huius ordinis ossi coarticuletur, ac reuera in eo ordine cõsistat. Nuncuparunt  
 etiam Anatomici præfens os, cartilaginofum: non secus quàm Marinus<sup>a</sup> os ge-  
 nu articulo præpositum, eo nomine donauit, quod molam patellamq; uoca-  
 mus. Non sanẽ (quantum reor) quòd id os molle, omninoq; cartilagineũ esse  
 arbitrati sint, quum omnium brachialis ossium faciliẽ durissimum & solidissi-  
 mum sit: at quòd coctum exteriùs cartilagine obductum uisatur, propter mu-  
 sculorum principia, tendinumq; fines, qui post elixationem cartilaginis mol-  
 lusculæ speciem referunt. Galenus hoc os, octauum brachialis os uidetur re-  
 censuisse, id proprium ipsi tribuens, quòd propugnaculũ nerui cuiusdam sit,  
 qui ab interna manus sede ad externam secundũ id brachialis os reflectitur.  
 Hic neruus me non latet, uerũ ad hoc ossiculum in hominibus non reuolui-  
 tur. est enim<sup>b</sup> ille neruus, quem à quinto brachium petentium, paulo pòst cu-  
 biti longitudinis medium, ab interna cubiti sede in posteriorem porrigi, atque  
 duos furculos paruo digito, totidemq; anulari, unum autem medio deriuare,  
 in quarto libro audies. Porro præter quartum brachialis os, nullũ penitus oc-  
 currit, non pluribus adnexum cõtiguũq; ossibus. Primũ enim, præterquàm  
 quòd radio articulatur, etiam secundo brachialis iungitur ossi, amplo utcunq;  
 capitulo in secundi ossis sinum subiens. Deinde alio capite multo ampliore, &  
 ab inferiore ipsius sede educto, cõmunem sinum ingreditur, quem quintum  
 brachialis os cum sexto efformat. Verũ Natura præcauens, ne primũ os un-  
 diq; aliorũ ossium sinus ingrederetur, & ipsum interim tyrãni more nullum  
 fulciperet, insignẽ in ipso cælauit sinum, quo unã cum secundo brachialis offe-  
 (ui is sinus quoq; cõmunis est) septimi ossis omnium faciliẽ maximi grande  
 rotundumq; admitteret caput. atq; ita primum os radio, & secundo brachialis  
 ossi, & quinto, sexto, ac septimo committitur. Secundum os (quod tanto mi-  
 nus est primo, quanto ipsum maius est tertio) connectitur primo ossi, & septi-  
 mo, uti iam diximus. tertio autẽ, amplo connexu planis superficiebus construi-  
 gitur: ad eò ut secundum os radio, & tribus brachialis cõmittatur ossibus, pri-  
 mo uidelicet, septimo & tertio: neq; etiam multũ ab octauo remouetur. Ter-  
 tium os, cui quartum articulari, iam prius diximus, modicẽ protuberante, sed  
 amplo capitulo sinum subit octauis ossis: hincq; faciliẽ constat, id os & ulnẽ ma-  
 gisq; adhuc<sup>c</sup> peculiari huius articuli cartilagini, dein & secundo ossi brachialis,  
 & quarto

Cui ossi com-  
mittatur.Cui ordini ad-  
scribendum ue-  
niat.Lib. 2. de vñs  
part.Primum os quot  
ossibus con-  
tinnum sit.

Quot secundũ.

Quot tertium.

x 4 musc.  
tab. A.  
y 3 musc.  
tab. r.  
z 4 tab. f.d 1, 2 fig.  
cap. 32. et  
integrari  
z.b 2 ff. cap.  
11 lib. 4. cha  
raff. 46.Si istum fu-  
erit, hic fi-  
guras cõspi-  
cies, quot  
ossibus  
quodq; os  
committa-  
tur ex ami-  
naturus.c 1, 2 fig.  
cap. 24. T.



& quarto & octauo conterminum esse. Quintum brachialis os, quod inferioris ordinis primum recensuimus, superiori sua sede in sinum sibi exculptum primi brachialis ossis capitulū excipit, & externo latere etiam sinuatum, sexti ossis capitulum admittit. Verūm præterea id<sup>4</sup> primum quoq; pollicis os sustinet. inferiori namq; sua sede<sup>5</sup> sinum adipiscitur patulum & oblongum, ac in<sup>8</sup> interna<sup>6</sup> externaq; regione magis quā in lateribus ac medio exculptum, cui primi pollicis ossis capitulum ea articulationis specie committitur, quæ motum edit omnibus manifestum: aliter multo quā brachialis ossium inter se connexus, cuius motus ita latet, ut uix dijudicari queat. Atq; hac etiam articuli

Primi pollicis ossis & postbrachialis ossis ad brachiale contextus.

specie, obscurissimo motu prædita, quatuor postbrachialis ossa, quatuor inferioris ordinis ossibus adnectuntur. Primum enim postbrachialis os indicis præpositum, magna ex parte<sup>7</sup> sexto brachialis os coartatur, communis sinus utrique ossi exculpitur, cui capitis primi postbrachialis ossis pars articulat. adeo ut quintum brachialis os, præter primum sextumq; brachialis ossa, etiam primum pollicis os, unā cum primo postbrachialis osse contingat. Porro secundum postbrachialis os, medium suffulciens digitum, depresso, sed obliquo, capite<sup>9</sup> septimi ossis brachialis sinui leuissimè, at obliquè interim, exculpto articulat, acutior sui parte, latereq; interno, sextum brachialis os modicè etiam contingens. Duo autem reliqua postbrachialis ossa, ea scilicet quæ anularem & paruum sustinent, duntaxat octauo brachialis ossi<sup>10</sup> læuibus, ac in

Quot ossibus sextum os conterminum sit.

superficie tantum excauatis sinibus coartantur. Sextum itaque brachialis os duobus committitur postbrachialis ossibus, illi nimirum quod indicis præponitur, & obscurè illi quod medio subijcitur digito. brachialis autē tribus committitur ossibus: primum enim os suo sinu excipit, & suo capite in quinti ossis sinum subintrat. dein septimo ossi leuissimè protuberante capitulo, aut potius plana superficie articulat: estq; inferioris ordinis minimum, quæ admodum septimum maximum. quintum autem & octauum medio se habent modo, quanquam octauum quinto paulo grandius cernatur. Septimum os suo capite rotundo, ac impenitus protuberante, in communem primi secundiq; ossis sinum subit, hacq; ratione duobus illis ossibus committitur. ab interno autem latere sexto ossi articulat: ab externo uerò articulat octauo ossi, ampla admodum articulatione, quæ depresso sit capite, sinuq; in superficie tantum cælato. Hanc articulationem aliqua ex parte cartilaginei ligamenti interuenit portio: quæ etsi septimum os ualidè octauo ossi committat, attamen id omnium brachialis ossium creberrimè uersus interiora luxatur: tum quod grandius sit, neq; ita facile, ac cotermina, occurrentium impetum sustineat: tum etiam, quod ligamentum interna sede hoc os uicinis colligās, non æquè crassum sit, atq; in reliqua brachialis regione. Atq; id hinc potissimum accedit, quod Natura ligamenti mole crassitieq; tendinibus iter præpedire noluerit, qui frequentia multitudine, hac ad digitos flectendos ab interna cubiti sede prorepunt. Vtunque uerò sit, septimum os quatuor brachialis osses, medium digitum sustinent. Octauum os, cunei quodammodo ritu septimum & tertium subin-

Quot septimū.

Quot octauum.

trat, illisq; duobus committitur: septimo quidem, ut paulo antè retulimus. tertium autem, in sinum sibi exculptū admittit: dein duobus etiam postbrachialis coartatur ossibus, quæ anulari & paruo preponuntur: adeo ut quintum os quatuor ossibus conterminum sit. quibus subinde paruulum accedit<sup>11</sup> ossiculum, ex illorū numero, quæ sesami seminis imagini assimilatur. Ad externum

o enim

d 1, 2 fig. A.

e 3, 6 fig. G.

f 6 fig. A, B.

g 6 fig. C.

h 6 fig. D.

i 1, 2 fig. I.

II, III, IIII

cū charact.

5, 6, 7, 8.

k 5, 4, 6 fig.

gur. II.

l 1, 4, 6 fig.

gur. B.

m 3, 4, 6 fig.

gur. K.

n carum-

dem fig. h.

o 3, 4, 6 fig.

L. de m. B.

p 5 musc.

tab. 6 & 6

tab. 2.

q 1, 2 fig. N.

r 1 fig. V.

V, 25.

osficulum ad  
nexum quarti  
postbrachialis  
osis cum bra-  
chiali repositum.

enim latus coarticulationis postbrachialis osis paruum sustinentis cum octauo brachialis osse, eius generis reponitur osficulum, sedem quasi oppleturum. quæ ideo hic quodammodo uacua relinquitur; quod hoc postbrachialis os sua superiori parte totum octauo brachialis osi inniti nequeat, atq; in externum latus paululum abscedat. Videtur itaq; id osficulum hanc articulationem firmare, ac postbrachialis os, paruum sustinens digitum, nonnihil suffulcire. nisi etiam communi ferè sesaminorū munere ac usu, tendini subseruiat, qui huic postbrachialis osi insertus, à musculo brachiale nouentium tertio educitur. Quotiescunq; igitur osficulum istud se offert, octauum brachialis os ex abundanti illi quoq; quemadmodum & prius commemoratis osibus, cōtiguum uiuitur. Quinetiam & hoc adhuc octauum os sibi proprium uendicat, quod ipsius interna sede, qua manus uolam spectat, notatu dignum educit processum, ab externo latere uersus internum latus inclinantem, & interno suo latere C modo exculptum, ut aptam constitueret sedem, qua tendines musculorum digitos flectentium (qui ex cubito procedunt) opportunè uehi contineriq; possent. Vt uerò tanti tendinum moli sedes hæc aptior redderetur, etiam quintum brachialis os interna sua sede processum educit, uersus externum latus uergentem, & in externo latere pariter exculptum, eiusdem omnino usus, quo octauo osis processus gratia, nimirum ut tendinibus illis uia exhiberetur, ac postmodum ex processuum illorum apicibus ualidissimum ligamentum enasceretur, quod transuersum tendinibus circumdatum, ipsos, ne à sua sede aberrerent, exurgant, ue, contineret, amplectereturq; Hæc sedes tendinum nomine excauata, & ligamentis obducta, utcunq; læuis est: quemadmodum & reliquos quoq; sinus, quibus tendines tanquam in anulis uehuntur, læues & lubricos esse nouimus. Quam tamen ligamenta ex hoc sinu prorsus euellimus, osfaq; illis omnino libera spectantur, is quoq; subasper educendorum ligamentorum occasione existit: quemadmodum & reliqua brachialis osium pars, extra hunc sinum, easq; sedes, quibus ossa articulantur, inæqualis, & insigniter satis aspera est, ut fortiora educat ligamenta, eademq; ualidius excipiat, quibus ossa obuinciri, ac inuicem colligari, iam antea retulimus.

Octauo osis  
processus.

Quinto osis  
processus.

s. 9. muse.  
tab. d. mu-  
sculi A.

t. 2, 3, 6 f.  
gur. O.

u. 2, 3, 6 f.  
gur. P.

x. 4. muse.  
tab. d.  
y. fig. capi-  
ti. i. lib. 2.  
inserta.

## DE POSTBRACHIALI. CAPVT XXVI.

POSTBRACHIALIS delineatio sumenda est ex duabus prioribus figuris iam præcedentis Capituli, quibus quatuor postbrachialis ossa I, II, III, IIII inscribuntur. Verum subsequenti Capituli prima figura ad A postbrachialis os indicem sustinens exprimit, omni osse liberum.



Postbrachialis  
uoce utendum.

Quibusdam post-  
brachialis ossa  
quatuor, qui-  
busdam quinq;  
enumerari.

A R S manus, à brachiali ad radicem usq; digitorum pertinens, Græcisq; μετὰ βραχίον appellata, Celso, & alijs Græcorū interpretibus permultis, palma dicitur: quibusdam autem pectus & pecten (uti & Græcorū nonnullis σῆμα, & ἄλεις, ac ἄλγειον) nuncupatur. Quandoquidem uerò in palma pleriq; etiam brachiale complectuntur, ac alijs rursus palma idē quod uola denotat, quumq; pedis pedio, pectinis & pectoris nomen etiā accomodatur, ego μετὰ βραχίον modò, uti & hæcenus feci, postbrachiale appellabo. quod Galeno quatuor conformatur osibus: Eudemo autē, Celso & Aristoteli, quinq; prout nimirū pollicis os, quinto brachialis osi articulatū, hi quidē postbrachiali, Galenus uerò digitorum osibus adnumerant. Porrò nonnulli id postbrachiali adscribunt, quod non ut primæ reliquorum digitorum ossa nudum exeratur, sed quodāmodo postbrachialis osium

d. 1, 2 fig.  
ca. 25 I, II,  
III, IIII. O  
integrarum f.

b. 1, 2 fig.  
cap. 15 A.  
ad chad-  
rad. s.

c. 1, 2 fig.  
cap. 25 D.

d 1, 2 fig.  
ca. 25 B, C.

osium ritu lateat, uulguſq; ob id pollicē duobus tantum donari<sup>a</sup> osibus exiſti met: quodq; primum pollicis os tota ipſius forma poſtbrachialis osibus mul to magis, quā primis aliorum digitorum osibus reſpōdeat. Galenus autem id os inter digitorum oſſa recenſet, quod ſuprà infraq; per *σύνερθωσις*, hoc eſt, la xam, & quæ manifeſtum motum edit, articuli ſpeciem articuletur: ſuprà qui dem brachiali, infra uerò ſecundo pollicis oſi: quum interim quatuor poſtbra chialis oſſa, infra tantum, quā digitis committuntur, ea articuli ſpecie coniun gantur. Suprà enim, uel Galeni ſuffragio, brachiali per *σύνερθωσις* coarticulan tur: hoc eſt, differentia articuli, qui per quā obſcurum, & quem ſentire uix queas, motum oſtēdit. Ita namq; arbitror Galenum ſynarthroſeos nomine in Capite libri de Oſibus decimonono uſum. Haudquaquam enim exiſtiman dum eſt, ipſum adeo perfunctoriè poſtbrachialis oſſa uel in ſinia, uel cane in tuitum eſſe, ut aut futura, aut clauu ritu, aut harmonia, hæc brachiali coarctari uoluerit. quamuis ea Galeni eſſet ſententia, ſi illum ſui dogmatis non oblitum hic dixerimus, quo in libro de Oſibus ſynarthroſeos ſpecies diſſuſe exequi tur. Vt ut uerò ſit, quò rectiùs nos ipſius placito accōmodemus, quatuor qui dem poſtbrachialis, quindecim autem digitorū oſſa, ſemper enumerabimus. Sunt itaq; poſtbrachialis oſſa reliquis digitorum osibus longiora, & magna ex parte teretia. Longiſſimum & craſiſſimum indici præponitur, atq; ita ſenſim ſiunt breuiora & tenuiora, ut omnium facile breuiſſimū tenuiſſimumq; par uo præponatur digito. At quia os indicem ſuſtinentes, magis<sup>c</sup> ſuperius brachiali articulat, ſuo<sup>e</sup> uel inibi nexu ad cubitū uiciniſ accedit, quā os medio præ poſitum digito, hoc illo in manu adhuc integra meritò lōgius eſſe apparet, & deorſum, adeoq; ad digitos magis deducitur. Cæterum omnia poſtbrachialis oſſa, digitorum quos ſtabiliunt numero pulchrè correſpōdentia, & longo in tus ſinu, quo medulla in ipſis reponatur, quemadmodū brachij os, donata, ſu perius &<sup>b</sup> inferiùs appendices obtinent: quorum ſuperiores, quæ ipſorum ad reliquum os coalitum in pueris nonnunquam ægrè oſtendunt, brachialis oſi bus, uti antea diximus, coarctantur: ipſaq; oſſa hic externa ſede nōnihil latiora quā interna occurrunt, ut poſtbrachiale unā cum brachiali ſuperficiem exte riùs gibbam, intus uerò cauam, aptius hic cōſtitueret. Quin etiam appendices hæ lateribus ſe inuicem contingunt, & cartilaginei ligamenti interuentu inui cem alligantur. Inferiores appendices cōſpicio nexu osibus coaleſcunt, gran desq; ſunt admodum, & in rotundum, ac ab externa manus ſede in internam oblongum caput deſinunt: quod cartilagine obductum, primi digitorū oſis ſinum ſubintrat. Hæ etiam lateribus ſe contingunt, ſed non adeo uicinè, ac ſu periores. nihilominus tamen quā inuicem reſpiciunt, ſinuatæ ſunt, ligamen taq; cartilaginea educunt, quorum opera ualidè mutuò connectuntur. In me dio autem ductu, & ſecundū poſtbrachialis longitudinem, & digno notatu<sup>h</sup> interuallo dehincunt, idq; magni cuiuſdā uſus gratia. in quolibet enim trium interuallorum, quæ quatuor poſtbrachialis oſſa cōſtituunt, duo reponuntur muſculi illorū octo, qui prima quatuor digitorū oſſa ſectunt: quorum etiam unus ad internum latus poſtbrachialis oſis indicem ſuſtinetis habetur, & ex terno lateri oſis paruo digito præpoſiti unus quoque exporrigitur. Verūm quum hi muſculi uix ipſius osibus ſint longiores, oſiumq; interuallā non tan tum hient, diducantur<sup>i</sup> uel, ut ſufficiens muſculorum moles in ipſis collocari queat: poſtbrachialis oſſa meritò, quā uolam cōſtituunt, omnia ſimul cāua ap parent, dictiſq; iam muſculis aptam exporrigūt ſedem, quā præcipua ipſorum reponatur portio. In externam uerò oſium ſedem muſculi nihil prominent

In initio libri.

Quatuor poſtbrachialis oſſa cuiuſmodi ſint. In longitudine.

In appendicibus.

In mutuo nexu.

Postbrachialis oſium interualla.

Qui poſtbra chialis oſſa mu ſculi cedunt et adaptantur.

e Expēde hanc diuer ſam articu lorū ſcilicet oſium productio nem in 1, 2 fig. cap. 25 ad chara cteres 5, 6, 7, 1, 11. f 2 ſic. cap. 25 Q. g eadē ſi. R. atq; ſua reliqua deinceps il linc pete, primum ſi guram ſe cūle com parant.

h 1, 2 fig. cap. 25 S. i Intere 8 muſc. ta bulā ſub A, & 12 ta. m.




& parem inibi cum ossibus superficiem constituentes, illorum gibbum, quod depressum magis, ac planum, quàm teres cernitur, ne minimum quidem excidunt. adeò, ut quemadmodum ulnam & radium attensis ipsis cedere ostendimus musculis, sic quoq; postbrachialis ossa secundum longitudinem angulosa, & lineis quibusdam pulchrè extuberantia spectentur, pro musculorum uide licet, qui ipsis exporriguntur, ratione. uti etiam postbrachialis os, indicem sustinens, in internâ manus sedem, quâ brachiali articulatur, notatu dignum educit processum, cui musculus brachiale mouentium secundus inseritur. Deinde postbrachialis os, paruo præpositum digito, quâ brachiali committitur, externo suo latere, ueluti à brachiali protuberat, ut comodè tendinis insertionem admitteret musculi brachiale mouentium tertij. Insuper ossa indicem & medium digitos suffulcientia, ipsorum externa sede ad brachiale ampla quoq; & aspera sunt, ut bifidum excipiant tendinem musculi brachiale mouentium quarti, qui ideo potissimum uidetur bipartiri, & dein latefcere, quòd simplex & teres unialicui processui parû aptè infereretur, qui extra brachialis & postbrachialis exteriorem gibbamq; sedem extuberasset.

h. i. fi. cep.  
25 supra  
charact. 6  
& 7.  
l. 3 musc.  
tab. A.  
m. 12 fig.  
cap. 25 supra N.  
n. 9 musc.  
tab. 3.  
o. 2 fi. cap.  
25 supra  
charact. 5,  
6, 7.  
p. 11 musc.  
tab. A.

## DE OSSIBVS DIGITORVM MANVS.

Caput xxvii.

### FIGURA VIGESIMI SEPTIMI CAPITIS, TRES CONTINENS tabellas.



PRIMA TABELLA. SECUNDA. TERTIA.  
bella.

### TRIVM TABELLARVM HVIVS CAPITIS figura, & earundem characterum Index.

Ossium digitorum seriem duæ priores figurae, ad initium vigesimi quinti Capituli repositæ, commonestrant: quemadmodum & tres integrum ossium contextum exprimentes figurae, ad huius libri calcem locandæ. Figura autem hic occurrens, ac in tres uelut tabellas digesta, digitorum articulos oculis subijcit. Harum enim prima, duo exprimit ossa: quorum alterum A insignitum, estq; postbrachialis os, indicem sustinens. alterum B. B indicatur, estq; primum indicis os ab externa sede, quemadmodum & illud postbrachialis os, delineatum. C. Præsentit itaq; tabella, primi digitorum articuli effigies proponitur. C enim caput rotundum notat postbrachialis ossis. D uero sinum primi ossis, quo caput C insignitum excipitur.

E. F. Secunda tabella primum indicis quoq; os notat, E notatum, & secundum pariter F insignitum: ut horum G, H. ossium delineatio secundi quatuor digitorum articuli speciem proponeret. G itaq; & H duo indicant capitula I, K. primi indicis ossis. I uero & K sinus secundi ossis, quos duo primi ossis capitula subintran. L autem sinum significat, in medio capitulorum primi ossis consistentem, ac in quem tuberculum secundi ossis inter duos sinus I. M. & K notatos prominens, & N insignitum subingreditur.

N. O. Tertia tabella secundum indicis os N insignitum, & tertium O notatum proponit, tertij cuiusq; digiti articuli

ticuli speciem ostensura, quam quia penitus secundo quatuor digitorum articulo respondet, alijs characteribus non obliterauimus. Verum istas articulorum imagines etiam ex duabus primis uigefimiquinti Capitis figuris petere, integrum est. Varias autem digitorum appellationes, cum ceteris ossium nominibus ad huius libri calcem reperiēs.

a 1, 2 fig.  
capas pol-  
licis ossa A,  
B, C. indi-  
cis uero D,  
E, F indi-  
catur. qua-  
lis ratio re-  
li-  
quorū est.  
b Hanc spe-  
ciem, quum  
simul om-  
nia ossa in  
sua serie oc-  
currunt.



MNES manus digitos<sup>a</sup> ternis constare ossibus, instar<sup>b</sup> a-  
ciei cuiusdā & agminis, optima serie positis, superiori Cap-  
pitate recensuimus. Quòd uerò neq; pluribus, neq; pauciori-  
bus extrui debuerint, uel hinc promptè colligitur, quòd si  
ossa illum excederēt numerum, perfectam ualidamq; ex-  
tensionem, qua, tanquam manu unico tantum cōposito  
osse, utimur, uitirēt, hanc minus firmam, quàm nunc sit,  
efficientia: quòdq; si paucioribus ossibus digiti efformarentur, in tam uarias  
pugnantesq; figuras illos agere nequiremus. Quia autem prælocatum os post-  
posito, aut uehens uectō, maius fieri operæ precū est: Natura quoq; primum  
cuiusq; digiti os grandius secundo, & id rursus maius tertio, iurē fabrefecit, in-  
feriora ossa non solum lōgitudine, sed & crassitie & latitudine minuens, hacq;  
potissimum ratione digitos ex ampliori basi sensim in mucronem coarctans.  
Ipsa enim non leuiorem digitorū ossium numeri, magnitudinisq; rationem  
habuit, quàm integrorū digitorum, quos merito quinos exijs quibus fungun-  
tur munijis extrui uidemus: horumq; quatuor uno ordine collocatis, unū ma-  
gnum quodammo do opponi, & instar promanus cuiusdā (unde etiam ἀντί-  
χρῆς Græcis, ut nobis à pollēdo pollex, uocatur) illis existere. Sic pariter digitos  
ad eò mole ac robore inuicem differre cernimus, atq; illorū officia mutuò ua-  
riant. uti quam obrem longitudine inæquales sint, spectamus, quoties rotun-  
dum aliquod corpus amplectimur, aut commissis inter se digitis, in manu a-  
quam, uel eiufmodi quid continemus, aut cōiunctos simulq; extensos digitos  
aliquò ui inferimus. Cæterum quo diligentius manuum usus unā cum disse-  
ctione expēderimus, eo etiam magis constabit, non eandem penitus formam  
digitorū ossibus, & integris obtigisse digitis, adhuc cute & unguibus obiectis,  
adipemq; habentibus duriusculam, qui neruis oppletus, in digitorū lateribus,  
& maiori insuper copia, in internis eorundem sedibus, cuti subijcitur.<sup>c</sup> Integri  
enim digiti paulo minus toto teretes efformantur, quòd eiufmodi figura, nul-  
lis eminentijs uariè protuberans, iniurijs minus sit obnoxia. Non ita autem ac-  
curatè adamuissimq; interna ipsorum sede, atq; externa teretes occurrūt, quòd  
in hac duntaxat propellendarū iniuriarum habenda fuerat ratio: illa uerò digi-  
ti molliunt, subigunt, terunt & apprehēdunt: quæ omnia deterius præstarent,  
si hic redderentur teretes. Ad hæc, quum digiti in lateribus minus sint noxis  
expositi, quumq; inuicem adducti, uarijs occasionibus cōstringi, in ipsorumq;  
medio nullam sedem uacuum relinquere debeant, illos in lateribus teretes fie-  
ri, haudquaquam ex usu erat. unde etiam pollex ambo latera, sed internum ma-  
gis, teretia adipiscitur: paruus autem externum duntaxat, index uerò contrā  
internum, teres obtinet: quòd his sedibus illi digiti alios non contingant, exter-  
næq; propemodum digitorum fedi, quantum ad abigendas pertinet iniurias,  
respondeant. Cæterum nullum digitorum os se offert, quòd non suprā infraq;  
crassius & amplius sit, quàm secundum ipsius longitudinē: id quod omnibus  
ferè etiam longis ossibus commune cernitur, ad articulationē perpetuò cras-  
sescitibus, auctisq;. Si enim undiq; pari atq; in articulis cōstarent crassitie, ho-  
mini pondere moleq; admodum incommodarent. & ipsi articuli, nisi amplio-  
ribus concinnè adaptarentur basibus, & non magis quàm reliqua aliàs ossium

Singulos digi-  
torū ossibus  
merito ef-  
formari.

Decens illorum  
mole.

Quæ integro-  
rum digitorum  
sit forma.

c Hos sana-  
ter obfusca-  
proponit  
manus.

Quæ digitorum  
ossa supra et  
infra ab inte-  
gris digitis for-  
ma uariant, et  
cuiusmodi os-  
sium sit sub-  
stantia.

Lib. de v'su  
partium. a

Articularum,  
quibus digito-  
rum ossa inui-  
cem cō con-  
minis ossibus  
comminuuntur,  
ratio.

Primi pollicis  
ossis ad bra-  
chiale con-  
textus.

Qui primus  
pollicis os secun-  
do articuletur.

Qui secundum  
tertiu.

Qui secūdi &  
tertij quatuor  
digitorum ar-  
ticulti.

Quorum  
primus.

longitudo augetur, penitus essent infirmi. Hac igitur ratione, etsi digitorum ossa dura sint, & densa, non tamē, ut Galenus arbitratur, medullæ prorsus sunt expertia. Præter id enim, quod supra in fraq; appendicum ferè modo nonnihil fungosa existunt, etiam singulis sinus contigit grandior, medullæ afferuandæ gratia, ut & in postbrachialis ossibus, paratus. Porro quibus nam articulo- rum formis digitorum ossa articulentur, modò enitar persequi, suo dein loco quam hæc per ipso- rum longitudinē referant imaginem, explicaturus. Quinti itaq; brachialis ossis sedes, quæ primi pollicis articuli gratia, læui & lubrica cartilagine incrustatur, transuersim oblongo amploq; prominēt tubere, & antèrius posteriusq; (sed lōgè magis antèrius) insinuatur. Primum uerò pollicis os suprà transuersim, seu ab interno latere ad externum, oblongo amploq; sinu insculpitur, & antèrius posteriusq; (at magis antèrius) extuberat, dictæ quinti brachialis ossis sedi, mutuo ingressu cōgruens. quamuis tamē non adeo insigni, ut hic articulus unico tantum agatur motu, reliquorum ferè articulo- rum eo ingressu nexorum ritu. Is namq; etsi potissimū laterali polleat motu, quo pollicem indici admo- uemus, & ab eodem rursus abducimus, ipseq; articulus ad hunc præcipuè motum extructus uideatur: nihilominus tamen aliquantulum flectitur & extenditur, tantoq; magis flectitur, quàm extenditur, quanto articulus ipse in anteriorem manus sedem, seu uolam, magis quàm in posteriorem externam ue sedem producit. Primum pollicis os secundo ue luti inarticulatur: inferior enim ipsius pars in unicum definit caput, unicum simplicemq; secundi ossis sinum subiens. Verum id caput non adamus- sim rotundum est, nec pariter in orbē undiq; deprimitur. In posteriori namq; ipsius sede, & magis adhuc in lateribus non minus ferè, quàm mediæ ipsius sedis uertice extuberat, & ad interi- orē tantum sedem educ- tum, inibi deprimitur, itaq; cartilagine obductum adaptatur, ut secundū pollicis os, supra id caput magis flectimus, quàm extēdimus, ac in latera ducimus. Tertius pollicis articulus, & à primo & à secundo constructionis specie admodum uariat: quippe infe- rior secundi ossis pars in duo oblonga bipartitur capitula, ab externa sede in internā procedentia, & in hanc priuatim edu- cta & orbiculata. Hec sinu quodam oblongo dirimuntur, non minus quàm ipsa capitula cartilagine incrusta- to, & in internam sedem magis quàm in externam pertinente. Superior uerò tertij ossis sedes, duos obtinet sinus, tubere quodam oblongo disiunctos, & duo secundi ossis capitula excipientes. ipsum autem tertij ossis tuber sinū sub- ingreditur, in secundi ossis capitulorum medio cauatum. Hac igitur ratione, secundum os in tertium subit, & uicissim tertium excipit, amboq; ossa mutuo ingressu tam scitè coarctantur, ut tertium os duntaxat extendi flectiq; queat: nequaquam autem, uel minimum etiam, in latus ducatur. Quandoquidē ue- rò secundi ossis capitula cum eorundem sinu in internam sedem adeo atq; di- ximus pertingunt, consistunt ue, tertium os in angulum flectitur, & interim uelut à flexione tantum erectum, non ultra rectam lineam bene articulatis ui- ris extenditur. Pari prorsus articulationis specie, reliquorū digitorum secun- di tertijq; compinguntur articuli, solamq; acutam flexionem, & rectam tan- tum extensionē, citra omnem in latera motum, experiuntur. Cæterum pri- mus quatuor digitorum articulus, unico perficitur capite, & unico item si- nu. Postbrachialis enim ossa in unum singula desinunt caput, ab externa ossis sede in internam multo longius, quàm ab uno latere ad aliud, transuersim ue latum & amplum. Dein caput hoc in internā manus sedem lōgè magis, quàm in externam pertinet, longiori- q; inibi interuallo cartilagine incrustatur. Sinus

tamen

d Hæc pe-  
te ex uariē  
fractis ossi-  
bus.

e figurarū  
cap. 25 cū  
rad. r.

f 3, 6 fig.  
cap. 25 G.  
g 6 fig. cap.  
25. ab a ad  
b.

h eiusdem  
fig. c.

i eiusdem  
fig. d.

k 12 fig.  
cap. 25 H.

l Hic arti-  
culus non.  
nihil respo-  
det i tabe-  
le ad C &  
D.

m hic pror-  
sus respo-  
det secūde  
tabelle.  
n 2 tab.  
G, H.

o 2 tab. L.

p 2 tab. I, K.  
q 2 tab. M.

r ut secun-  
de ta. G &  
H in I &  
K. ac M in  
L.

s ut 3 ta-  
bet tabella.  
t 1 tab. A  
cum B.

u 1 tab. C.  
x 1 tab. D.



tamen in superiori sede primi quatuor ossis digitorum cælatus, utcunq; orbicularis est, primumq; os supra caput illud flectitur & extenditur, ac in latera utrinque agitur: non uerò, capitis formæ, quam ita oblongam esse diximus, occasione, etiam circumuertitur. Præterea huius articuli extensio, & laterales motus, non æquè ac flexio sunt insignes, aut in acutos pariter celebrantur angulos, quòd caput postbrachialis ossiù adeò modicè exteriùs & in lateribus deprimitur. Quàto tamè id caput magis exteriùs, quàm secūdi & tertij articulorū capita, cartilagine obducitur, tanto etiā magis extra rectā lineā primi articuli, quàm secūdi & tertij extenditur, perinde ac index in internū latus, & parvus digitus in externū latus magis quàm cæteri digiti inclinātur: quòd primi ipsoꝝ articuli capita in ea latera exporrigūtur, et ueluti in orbē dilatētur. adeò sanè, ut undecunq; singularis occurrat Naturæ industria, tam sollicitè partium robori cōsulentis, ut primos articulos circūuerti noluerit, quū manus radij ue in pronū & supinū motus, abūdè digitorū circūductui accōmodent. Quēadmodū insuper motus illi, simul cum humeri ad scapulā circūactū, præstāt, quo minus æquè digitorū extensione ac flexione indigemus: sic quum primos digitorū articulos in latera agere possimus, nihil opus est secūdos & tertios tam laxè cōponi, ut eodē quoq; pollerēt motu. Atq; ita, quo diligētius hæc, unū profectò Naturæ artificij ex alio mox proponentia, expendo, eo etiam magis Galenū miror in libris de Partiū usu, omnes digitorū articulos ad mutuum ferè ingressū cōparasse: & in libro de Ossibus eandē articuli speciem omnibus ossibus tribuere, quum ait, superioris ossis caput in subsequētis sinum ingredi, non secus quàm si in articulatione omnes simul articulos cōmitti arbitratus fuisset. Deinde in libris de Administ. sect. ita musculorum undiq; contra ueterum placita instituit historiā, ut tēdines digitos in latera ducētes non minus fecundis & tertijs, quàm primis digitorū tribuat ossibus. Vtcūq; uerò sit, uel articulorū ratione digitorū ossa ab integrorū digitorū imagine plurimū uariāt. & insuper tertij os inferiori suā<sup>r</sup> sede, qua nulli coarctatur ossi, etiā protuberat, asperūq; capitulū duobus quasi uinculis donatū obtinet, ut toti internæ huius ossis sedi<sup>r</sup> tēdo, qui ipsum flectit, adnascatur, ac demū suo fine, ueluti in ossis apicē, qui nōnihil suo extremo cartilaginosis euadit, ualidissimè inseratur.<sup>a</sup> Atque huius etiam tēdinis occasione tertij os tota interna sua sede, qua modicè protuberat, asperū inæqualeq; occurrit. Cæterum interna primi pollicis ossis sedes secundū ipsius longitudinē internæ respōdet sedi ossium postbrachialis, quæ paulo acutiùs quàm teres forma, extuberat. quum tamē prima quatuor digitorū ossa, uti & eorū secunda, & secundū quoq; pollicis tota regione inter articulos ipsorum cōspicua deprimātur, & potius in plana superficie sinuantur, quàm extuberēt: idq; tendinū qui ipsis exporrigūtur causa, qui quum teretes sint, tereti etiā corpori nequiuissent inniti. Quinimò non tantū eiusmodi tendines ossibus illis exporrigūtur, at ligamēta etiā ab ossibus educūtur, in quibus tendines ueluti in anulīs repunt, quibusq; ad depressā ossium sedem continentur, ab illaq; exurgere haud permittuntur. Consistit autem in secundo pollicis ossē<sup>b</sup> tendo, tertium ipsius os flectens. in primis uerò quatuor digitorū ossibus, duo se offerunt tendines, quorum<sup>c</sup> unus secundū suū digiti flectit os,<sup>d</sup> alter tertij, qui etiam secundo deducitur ossē, quum interim primo pollicis ossi nullus eiusmodi alligetur tendo, quod similiter ac postbrachialis ossa externa sede latū depressūq; magis est, quàm gibbū: quantūuis tamē reliquorū ossiū digitorū externa sedes sit prorsus gibba, & teres, hisq; sedib. instar membranarū expansi dilatatiq; inseratur<sup>e</sup> tēdines, neq; ulli teretes ipsis uehātur. At tertia

*Natura in digitorum articulo scipi.*

*Libro 2.*

*Tertij digitorum ossis extremum & apex cuiusmodi.*

*Interna ossium sedes cuiusmodi secundum longitudinem.*

*y apices, 2 fig. ca. 25.*

*z omisc. tab. 8 musculi u. et y musculi z. a Cōstribie undiq; primā fig. ca. 25 secūda, & ossa inter se.*

*b 6 musc. tab. 8 musculi u. c 5 musc. tab. 8 musculi d. & 6 muscul. tab. 8 musculi e. d 6 musc. tab. y musculi z. & 6 musculi musculi c. e 9 musc. tab. 2 tēdines musculorū z. & f.*

Latera cuius-  
modi.

interim digitorum ossa, et si externa sede teretia sint, ab articulatione tamen, quo secundis committuntur ossibus, ad ipsorum extremum ducta, non æquæ ac reliqua eminent: sed unguibus cedētia, tanto minus protuberant, quantam sedē unguis occupant, ne scilicet integer digitus in tertio osse procerius quàm in reliquis ossibus exurgat. Latera primi pollicis ossis, uti & tertiorum ossium latera, sunt quodāmodo teretia. Primorum uerò ossium, qui in quatuor sunt digitis, & secundorum ossium quinque; digitorum latera dimidiæ partis lateri respondent, quæ à tereti corpore per medium esset resecta: quòd nimirum ea ossa sede interna debuerint esse plana, & externa gibba. neque hinc quicquam pollicis, & indicis, & parui digiti ossium latera, priuatim (ut integri aliàs digiti) sibi uendicant: adeò ut Galenus parem integrorum digitorum, & eorundem ossium formam, minus rectè uideatur proponere.

DE OSSICVLIS, QVAE SESAMO SE-  
mini comparantur. Caput xxviii.

*Hic Capiti præcipue famulatur prima figura, trigésimo quinto Capiti præposita, & internam manus sedem unā cum ossiculis hoc Capite describendis commonstrans: ad characteres nimirum N, T, U, X & X. quorum etiam N & T, in secunda eius Capitis figura cernuntur. Item huc impendē facit secunda figura, trigésimo tertio Capiti prælocanda, ad characteres µ, λ, ω & \*. Quin etiam figura integram ossium compagem referente, & ad primi libri calcem posita, hæc ossicula k notata proponunt.*



Ceterum priuatim hac tabella duo delineantur ossicula, primo pollicis in pede internodio subiecta, ac in secunda trigésimo tertii Capitis figura ω & λ insignita. ac A quidem hic notat interioris ossiculi inferiorem sedem, terræ innitentem: B eiusdem ossiculi superiorem sedem, quæ caput spectat pedis ossis pollicem sustententis. C exterioris minorisq; ossiculi superiorem sedem indicat: D uerò humiliorē.



Cuiusmodi sesa-  
mina sint ossi-  
cula.

**P**RAETER ossa tribus iam proximè præcedentibus Capiti explicata, alia quædam exigua in manu occurrunt, sesamo semini à dissectionū peritis comparata. Cuiusmodi tamē ea sint, & quibus sedibus, quoque numero in homine, ut etiam simia reponatur, neminem obseruasse descripsisse uescio. atque adhuc minus illorum ossiculorum usus à quoquam exactè uereque est pertractatus. Opportunè igitur quot huius generis ossicula diligenti musculorum tendinumque examine hætenus inuenerim, hic persequar. Musculorum namque magis quàm ossium inspectione, præsentium ossiculorū non pœnitendum numerū, tam in pede, quàm in manu comperi: quum scilicet maxima ex parte, ac tota ferè, tendinibus innascantur, unaque tantum superficie, læui & lubrica cartilagine incrustata, alterius cuiusdam ossis lubricam læuemque sedem contingant, peculiaribus ligamentis illi ossi nusquam commissa. perinde sanè ac os genu articulo præpositum, ac patella nobis appellatū, tendinibus quibusdam tibiæ extendentibus innatum cernimus. Imò non aliunde sesaminorū ossium constitutionem promptius, quàm ex patellæ fabrica petas. uidentur namque hæc ossicula tendinibus immersa, innataque, ut sua duricie in quibusdam motibus impetum ossis sustineant, excipiantque, cui tendo cuiusmodi adauctus munitusque ossiculo, prætenditur. Atque quum impetū illum ossis reprimunt, unā quoque in hoc ipsa conferre quis haud immeritò putauerit, ne cui præponitur os, facile ex sua articulatione profiliat: adeò ut patella, utpote os sesaminis longè grādius, horum naturam scitè ostendat. Spectantur autem hæc tanto insigniora, ac quodāmodo plura, quo senioris, magisque ossuosi hominis corpus sectioni adhibes. In pueris namque adhuc sunt cartilaginea, & non admodum in suis, quibus continentur, tendi-

a 1 fi. cap.  
25 T, V,  
X, X.

b figura  
cap. 32. de  
in specula 6  
musc. tab.  
\*. & 8 mu  
scul. tab. k.

Patella fabri-  
cam se, amino-  
rum naturam  
docere.

tendinibus conspicua. unde etiam in canibus & simijs, & alijs ferè quadrupedi-  
bus, magis quàm in homine, animali uidelicet humidiorè, minusq; duris ofsi-  
bus prædito, sese offerunt. Homo itaq; , qui iustum attingit incrementum, bina  
in anteriori sede secūdi pollicis manus articuli habet ofsicula, capitū primī pol-  
licis ofsis, quod secūdi pollicis ofsis sinum subit, præposita, tendinibusq; mu-  
sculorum innata, qui principium ex uola ducētes, secundum pollicis flectunt  
articulum. Consistunt uerò hæc ofsicula, sœnugræci seminis molem uix exce-  
dētia, ad anterioris articuli sedis latera, tendinēq; per ipsorū medium con-  
scendere sinunt, qui tertij pollicis articuli flexionis autor habebitur. Ac quem-  
admodum hæc ofsicula ad secundum pollicis cernuntur articulum: ita quoq;  
ad primos quatuor digitorum articulos, alia duo spectantur, dictis nuper mi-  
nora, sed pari interim cum illis modo breuib⁹ musculorum tendinibus in-  
nexa: qui à postbrachialis ofsibus pronati, primos quatuor digitorum flectunt  
articulos. Insuper in anteriore tertij pollicis articuli sede unicum inuenitur of-  
ficulum, articuli medio præpositum, ac læui sua superficie sinui cōgruens, qui  
inter duo secūdi pollicis ofsis cernitur capitula, tertij ofsis sinus ad articulatio-  
nem subeuntia. Innascitur autem id ofsiculum tendini tertium pollicis os flectēti,  
hicq; ad articulum latefcenti. Hoc ofsiculo aliud minus multo, & quasi  
prorsus cartilagineum, in secundo & tertio quatuor digitorum occurrit, situ  
cum pollicis articulo res pondēs, & tendini innatum, cuius beneficio articulus  
ad quem ofsiculū refertur, flexionem obtinet. In pede omnia cum manu sunt  
paria, præterquàm quòd in quatuor pedis digitis hæc ofsicula tanto sunt mi-  
nora, minusq; conspicua, quanto magis manus digiti pedis digitos magnitudi-  
ne superant. Vt autem pedis pollex amplioribus quàm manus pollicis obtigerunt of-  
sibus, ita quoq; multo grandiora ipsi, quàm manus pollicis obtigerunt of-  
ficula. Ac duo satis insignia primo subiiciuntur pollicis articulo, capiti apposi-  
ta pedij ofsis, quod primo pollicis ofsi inarticulatur. Horum interius dimidio  
ferè maius est exteriori, ac indici pedis uiciniori, adeò ut dimidiam maiusculæ  
pifæ iam cortice emundatæ molem quodāmodo æquet, uti etiam forma illi  
non admodum est dissimile. Innascuntur autem hæc duo pollicis ofsicula ner-  
ueæ musculorū iuxta insertionem parti, qui primum pollicis os flectit. Of-  
ficulum uerò, secundo pollicis subditum articulo, innectitur tendini secun-  
dum pollicis os flectenti: multoq; etiam minus est exteriori eorum quæ ad pri-  
mum pollicis referuntur articulum. Ofsiculorum quæ hoc Capite tractamus,  
classi, quis fortè adnumerabit ofsiculum, quod subinde in manu cōspicimus,  
iuxta connexum postbrachialis ofsis, paruum digitum sustinētis, ad octauum  
brachialis os, quod ad tendinem ferè spectat, hic postbrachialis inserto, & bra-  
chialis extensionis opifici. Deinde bina recensabit in poplite occurrentia ofsi-  
cula, quæ duorum primorū pedem mouentium musculorū innascuntur capiti-  
bus, mox in illorum ex femoris osse principio. Ofsicula enim hæc læui sua  
& lubrica superficie, qua extra musculorum substantiā prominent, elatiorem  
spectant sedem posterioris regionis inferiorū femoris caputem, quorum im-  
petum illa soluunt & sustinent, hoc priuatim sibi uendicantia, quòd musculo-  
rum exortibus, non uerò aliorum ferè omnium ofsiculorum sesamo compa-  
ratorum modo tendinibus innectantur. Præterea his forsan adijcietur ofsea  
pars, in senum tendine occurrens, qui ad os tesseram referens, singulari Natu-  
ræ industria reflexus, septimi pedem mouentium muscoli tendo existit. Insu-  
per his accedit ofsiculum, non semel repertum ad externum latus articulatio-  
nis pedij ofsis paruum digitum sustinentis, cum pedio, ad insertionem nimi-  
rum

Quot in manu  
occurrant ofsi-  
cula.

Quot in pede  
occurrant ofsi-  
culamina.

Quotmodi of-  
sicula sesaminis  
adnumerari  
possunt.

c unum  
fig. cap. 25  
T. alterū  
fig. ca. 25 T.  
d 7 musc.  
tab. 1, 2, 3.

e 6 musc.  
tab. 6 mu-  
sculi 2.

f 1 fig. cap.  
25 V, V.  
g 8 musc.  
tab. 2.

h 1 fig. cap.  
25 X, X.

i Offen-  
ditur 2 fig.  
cap. 33.

k 2 fig. cap.  
33 1/2, 1/2. C.  
figura præ-  
fenti capiti  
præposita.

l 14 musc.  
tab. 3.  
m 2 fig.  
cap. 25 1/2.  
n 14 musc.  
ta. 1/2, 1/2. A. mu-  
sculi 1 A.  
o 12 fig.  
cap. 25 N.  
p 9 musc.  
tab. p mu-  
sculi 1 A.

q 12 musc.  
tab. 10, 11, 12, 13.  
r 9 musculo-  
rum 1/2, 1/2.

r 1 fig. cap.  
30 B, B.

s 15 musc.  
tab. XX mu-  
sculi V.  
t ad n fi-  
gura 2 ca-  
pitulis 33.



rum\* tendinis octauipedem mouentium muscoli. Horum tamen omnium nullum æquè magnum durumq; est, ac interius ofsiculū duorum quæ ad primum pollicis pedis spectatur articulum. unde etiam suspicor magos & occultæ philosophiæ sectatores huius ofsis meminisse, quum in homine durum quoddam, & nulli corruptioni obnoxium, & ciceri imagine respondens ofsiculum esse tradunt: id post mortem in terra reconditum, instar feminis, hominem extremi iudicii die producturum affirmantes. Illud enim pedis ofsiculum in infima hominis sede collocatur, insigniter durum: quamuis tamen detibus duritia cedat, neq; minus ipsis dentibus corruptioni obnoxium sit: ipsumq; etiam\* octauum brachialis os ciceris imaginem melius, quàm hoc pedis ofsiculum exprimat. Num tamen Arabes, & uerè occulti illi tenebricosi; philosophi, ex hoc ofsiculo, ipsis Albadaran nuncupato, hominem rursus propagandum rectè sentiant, Theologis disceptandum relinquo, qui liberam sibi de resurrectione, animarumq; immortalitate ac euentu, disputationem & sententiam uendicant.

\* 13 muse.  
tab. b mus-  
sculi a.

\* 13 fig.  
cap. 35 B.

Albadaran  
ofsiculum.


DE OSSIBVS, SACRI OSSIS LATERIBUS commissis. Caput xxix.

PRIMA XXIX.

SECUNDA.

TERTIA.

CAP. FIG.



OS COXAE

TRIVM VIGESIMI NONI CAPITIS FIGurarum, & earundem characterum Index.

H 1 s tribus figuris os delineatur, dextro sacri ofsis lateri commissum. ac prima quidem anteriorem ofsis sedem eo situ exprimit, quo id in flecto ab anteriori regione inspecto se offerret. Secunda figura, huius ofsis sedem undecunq; exprimit, quæ externa est, corporisq; interiora non spectat, eo nimirum situ, quo id integram ofsium compagem ex dextro latere intuenti occurreret. Tertia figura opposito situ internam huius ofsis sedem oppositissime ostendit. Caterum etsi omnes harum figurarum notæ priuatim aliquid, ut mox persequar, indicent, ipsis tamen obiter integrum quod hic delineatur os, in ilium os, & coxendicis, pubisq; tanquam in peculiare ipsius sedes, subdividere licebit. ut nimirum in secunda figura à c, per b, ad S: ac rursus in tertia, ab S, per N, ad c lineam duci fingeres, ilium os à coxendicis ofse quodammodo terminantem. Quicquid enim supra hos habetur characteres, ilium os nuncupabitur. Quod autem inter hos characteres, & in secunda figura a inter U, per f, & h, ad

Φ. ad Φ. & in tertio inter U, per O, & ad Φ intercluditur, coxendicis ofsis loco nobis erit. Reliqua uerò totius ofsis sedes, pubis os appellabitur: quæ scilicet in secunda figura ad sinistrum latus characterū U, s, h, & Φ consistit: in tertia autem ad dextrum latus U, O, s, & Φ.

A, B, C, C, D, D, E, F, G in 3 Sedes ilium ofsis notatur, quæ sacri ofsis transversis necellitur processibus, ac A quidem & B priuatim indicantur sinus, quos anterior trium superiorum ofsis sacri ofsium transversorum processuum protuberans pars subit. Et B rursus ofsis ilium pars indicatur, instar cultri acutæ, tenuisq. C & C oblongum tuber ilium ofsis, processuum sacri ofsis oblongo sinui congruens. D & D longus ilium ofsis sinus, qui sacri ofsis tuber dorsi spina modo protuberans admittit. E & F & G sedes ilium ofsis, non ad amissum sacri ofsis sinibus tuberibusq. respondens, quanquam E & F duo ueluti tuber a indicentur, sinu sacri ofsis obscure ingredientia. G autē sinus notatur, qui ofsis sacri tuber admitteret, transversum duos illos sacri ofsis sinus intercedens.

H, I 2, 3 Quicquid ad dextrum H & I in secunda figura habetur, & in tertia ad sinistrum, portionem ilium ofsis indicat, posterius quàm transversorum sacri ofsis processuum amplitudo eductam.

L, R, P in prima: Q uerò, H, R, R, P in secunda: & P, L, H, Q in tertia, appendicium ilium ofsis indicatur. Ceterum L internum appendicis latus priuatim notatur. R uerò & R externum appendicis latus, interno minus compressum. P anterius appendicis extremum, Q posterius appendicis extremum.

K, K 3 Sedes ad horum characterum sinistrum latus, in ilium ofsis interna regione consistens, nono dorsi mouentium musculo principium præbet.

M, N, O 3 Tuber, à quo principium decimi femur mouentis musculi pendet. Amplitudo autem, quæ P, L, K, K, M, N, S in tertia figura circumscribitur, principium offert septimo femur mouenti musculo.

T, I, 2, 3 Sinus in elatiori coxendicis ofsis sede calatus, & sexto ac septimo femur mouentibus musculis, unâ cum primo cruris petente nervo, uiam præbens.

S, I, 2, 3 Tuber externum latus dextri nunc sinus constituens, iliumq. ofsi & coxendicis pariter commune.

X, I, 2, 3 Tuber internum dextri nuper sinus latus efformans.

Z, Y 2 Prima in ilium ofsis dorso admodum obscure apparens linea.

a, b 2 Secunda dorsi ilium ofsis linea.

e, f, g, I, 2 Sinus, acetabulum uel coxendicis ofsis, cui femur inarticulatur. Porro g separatim huius sinus sedem notat, læti cartilagine non incrustatam, altiusq. quam reliqua sinus superficies insculptam.

i, i, 2 Superilia acetabuli in coxendicis ofse calati.

h, I, 2 Sedes ubi superilia intercedunt, ac ueluti sinu quodam insigni donantur.

c 2, 3 Sedes, quæ nervus cæterorum corporis maximus, atq. ex pluribus nervis conflatus porrigitur.

d 2, 3 Processus coxendicis ofsis, à quo ligamentum ad sacrum os enascitur.

k, I, 2, 3 Sinus coxendicis ofsis, ad quem decimus femur mouentium musculus, ueluti ad rotulam reflectitur.

l, m, n, o, p, q in secunda figura, l autem duntaxat in prima, coxendicis ofsis appendix notatur. ac l quidem posterior appendicis terminus insignitur, q uerò anterior: m autem prima appendicis impressio, o secunda, n tertia, p ad q usq. quarta. quæ singulæ peculiarium musculorum parantur initus.

u, I, 2 Sedes, quæ dextrum pubis os, cartilaginis interuentu sinistro coalescit. Sed u in prima figura priuatim notat ofsis asperitatem, à qua cartilago abscedit: in secunda uerò, externa eius ofsis sedes uisitur, quæ musculorum educcendorum occasione aspera est.

r, I, 2, 3 Pubis ofsis foramen, omnium ofsium foraminum patentissimum.

U, I, 2, 3 Sinus superiori pubis ofsis sedi incisus, quo maxima cruris petens uena & arteria, ac in uiridis seminaria uasa deducuntur.

f, I, 2, 3 Sinus in elatiori foraminis pubis ofsis sede insculptus, ac uena ciuidam & arteria, tertioq. cruris petenti nervo, uiam porrigens.

t, I, 2, 3 Hac sede pubis os nō nihil, ne nimium extenuetur, crassefit, & in uiridis secundum penis musculum, & alterum ipsius corpus, educit.

a 2 si cap.  
10 a super-  
riori L per  
M ad L. Si  
nus autē tu-  
beris pro-  
cessus, N,  
O, P, Q Φ  
indicatur.  
b tota I, 2,  
3 fig. inte-  
graturis uerò  
figurat. O.  
Quomodo



RANSVERSIS trium superiorū ofsis sacri ofsium  
\* processibus, utrinq. unum cōnectitur<sup>b</sup> os, cui integro nul-  
lum nomen Galenus inditum affirmat: unde & *ἀνίσχυρον*, Lib. de ofsi-  
cap. 20.  
ac si dicas innominatum, quidam id appellarunt. Verūm  
lata ipsius, & superior, ac posterior, sacroq. ofsi commissa  
pars, Ilium os uocatur: anterior autem ofsis pars, quæ in pu-  
bis regione cum alterius lateris ofse<sup>c</sup> committitur, ampli-  
terq. perforatū est, Pubis os: media uerò eiūdem sedes, ad femoris ingressum  
posita,  
rabi.

autem horum ofsium sedes circumscribenda sunt, ex characterum indice petendum est. e integrat. fig. 2

Coxendicis.

In lib. de Ar-  
ticulis.Ossis sacri ossis  
lateris com-  
missuram usque.Illi ossis sedes  
sacro ossi com-  
missa qualis.

posita, Coxendicis os appellatur. aded ut unius lateris os sibi continuum, non  
secus denominetur, quam si tribus propria circumscriptione terminatis ex-  
trueretur ossibus: posteriori scilicet, anteriori, & medio: seu ilium osse, pubis  
osse, & osse coxëdici. Cæterum Celso uniuersum os, coxæ os: auctori uerò In-  
trodutorij, seu Medici, quemadmodum & Hippocrati, nonnunquam *ioxlop*  
(quod est coxendix) dicitur. quamuis interim & latiore posteriori; hu-  
ius ossis partem, ilium: anteriorem uerò, pubis os uterq; aliorum dissectionis  
professorum modo nuncupet. His ossibus non parua in usu cum scapulis est  
affinitas. ut enim scapulæ potissimum articulandis humeris formantur, ita sa-  
nè hæc ossa in hoc præcipuè sunt accommoda, ut femora ipsis articulentur,  
horumq; ope homo erigatur & sedeat. Dein, ut scapulæ cernuntur amplæ, ua-  
rijsq; processibus donatæ, quo musculis pluribus educendis aptiores essent: sic  
hæc ossa omnem ferè constructionis rationem in eum modum fabricatam  
ostendunt, ut ab ipsis omnes propemodum femur mouentes muscoli pronas-  
cantur: præter alios, qui ab illis principium ducentes, tibiæ & thoracis &  
dorsi motibus famulantur, & peni in uiris peculiare existunt. At qui nam mu-  
sculi & ligamenta, penisq; corpora ab his ossibus enascantur, orationis series,  
ossium partes enarrans, sensim edocebit. Nunc autem minimè prætereundus  
est ipsorum usus nequaquam infimus, quo multis corporis partibus instar ful-  
crorum subiunguntur, & pleraq; continent & amplexantur. Duo enim hæc  
ossa simul cum sacro osse ueluti peluum quandam efformant, quæ intestina  
concinne sustinet, & uescicam, & in foeminis uterum elegatissimè comprehen-  
dit, ac demum eas quas amplectitur partes tutò munit. Ilium itaq; ossis<sup>e</sup> se-  
des, sacro ossi commissa, egregiè uaria est: quemadmodum sacri ossis transuer-  
sos processus ea sede, qua illi ossi cōnectuntur, admodum uarios multiplicesq;  
esse retulimus. Singulis namq; illorum processuum sinibus, ilium ossis tubera,  
& eorundem processuum tuberibus, ilium ossis sinus ita correspondent, ut mul-  
tis partibus in tuo ingressu ilium os sacro cōmittatur: non quidem connexu  
ad motum instructo arbitrarium, aut sinibus tuberibusq; læuibus, & cartila-  
gine lubrica instructis: uerum connexu uadissimo, & in symphyis seu unio-  
nis classē quasi referendo: quæ cartilaginosis ligamenti, aut potius puræ carti-  
laginis interuentu perficitur. Ilium ossis sinuum, & tuberum, quibus id sacro  
ossi committitur, forma, ex sacri ossis descriptione læui negotio petitur. Vt e-  
nim transuerfos sacri ossis processus primum oblongo sinu donari dictum est,  
ita etiam ilium os,<sup>h</sup> oblongum tuber sinui congruens obtinet. & quia proces-  
suum sinus anterior pars, sinus<sup>i</sup> uel supercilia, satis insigniter extuberant, porri-  
gunturq; ilium etiam ossi ad anteriorem oblongi sui tuberis sedem<sup>j</sup> sinus in-  
sculpuntur, quos extuberantes illæ processuum partes subeunt. Vbi autem hu-  
millima eorum<sup>k</sup> sinuum sedes conspicitur, ilium os quasi in cultri aciem exa-  
cuitur, ut eandem cum quarti ossis sacri ossis<sup>l</sup> transuerso processu constituat  
superficiem. Rursus oblongo sacri ossis tuberi, quod instar latioris lineæ in pro-  
cessuum sinibus eminere relatum est,<sup>m</sup> oblongus etiam ilium ossis sinus conue-  
nit, tuber id ad amplexum suscipiēs. Porro duobus processuum sinibus ad poste-  
riorem dicti nunc tuberis sedem consistentibus, & tuberi transuersim in illo-  
rum sinuum medio prominenti, ilium os non æquè accurate<sup>n</sup> respondet, quum  
sacrum os ilium ossi non admodum hac sede sit cōterminum: sed plurima car-  
tilago ligamenti natura participans, hæc ossa intercedat, totam amplitudinem,  
qua inuicem ossa inibi dehiscunt, infarciens. Vniuersa igitur ilium ossis sedes sa-  
cro commissa, aspera est, ac inæqualis, & insigniter crassa: quemadmodum &  
reliqua

d integra-  
rum fig. A  
in c.e 1, 2 integ.  
fi. cū M.  
f Petiū  
hæc ex 5 li.  
figuris præ-  
cipuè autē  
22, 24, 25.  
g 3 fig. A,  
B, C, D, E,  
F, G.h 3 fig. C.  
i de in se-  
riatim cō-  
fer eum 2  
fig. cap. 18.  
j 5 fig. A, B.  
k 3 fig. B.  
l 5 fig. ca 18  
humilius. Lm 3 fig. D,  
D.n 3 fig. E,  
F, de in G.



reliqua ossa illis sedibus, quibus inuicem compinguntur, ampla crassâq; ideo esse nouimus, ut ualidiorem amplioremq; connexu efficerent. Atq; hæc crassa ilium oſis pars<sup>o</sup> in posteriora longè magis quàm transuerſorū sacri oſis processuum amplitudo, porrigitur, prominetq;: tum quòd illi os amplissimum latissimumq; scapulæ modo esse oportuit, ut femur mouètes, & alios plerosq; musculos, paulo pòst enarrandos, à se pronaſci ſinat: tum ut ad posteriorem sacri oſis sedem aptum conſtitueret locum, à quo<sup>p</sup> quartus hominis thoracem mouentium musculus principium duceret: unà cum dorſum mouentium<sup>a</sup> undecimo, qui ſimul cum illo thoracis musculo, ab interno latere oſis ilium (qua id in poſteriora ferri diximus) & ab oſis ſacri poſteriori ſede, originem nanciſcitur: ſimiliter ac<sup>r</sup> musculus dorſum mouentiū decimustertius, ab hac etiam oſis ſacri, & ilium oſis ſede, initium ſumit. Tota ilium oſis amplitudo planæ ſemicirculari figuræ non admodum abſimilis, ſuperiori ſua ſede ſecundum totam ſemicirculi circumferentiâ, appendicem obtinet, quæ ueteribus Spina ilium oſis dicebatur. Ipſi namq; dorſum ilium oſis uocârūt, externam ſuæ amplitudinis ſedem: quia hæc ampla eſt, & ſi cum interna cõferatur, quodammodo gibba. Appêdicis autem ſedes extrorſum prominet, ac ueluti illius dorſi cenſetur ſpina. Verum etſi ueteres hæc nomina rectè inſtituerint, & Galenus etiam eorum nominum, ut & oſis ſedium quoq; differētiam, apud illos fuiſſe animaduertit: nihilominus is ſubinde Dorſum cum Spina in tibia & femur mouentium musculorum deſcriptione conſudit. quod nos, quoad licebit, euitantes, Dorſum oſis ilium ſuæ amplitudinis externâ regionem appellabimus: Spinam uerò, ſemicircularem ipſius appendicem, quæ aſpera, inæqualisq; & interno<sup>a</sup> externoq; latere ſuperius compreſſa uiſitur. Comprimitur quidem interna ſede, ut inibi amplior reddita, carnoſam<sup>\*</sup> tranſuerſi abdominis muſculi partem, illinc aptius educat. Externo autem latere appendix comprimitur, ampliorq; fit, ut potiſſima oblique<sup>r</sup> aſcendentis abdominis muſculi carnea pars hinc principium ſumat, & oblique<sup>r</sup> deſcendens abdominis muſculus illic inferatur. His enim tribus muſculis uniuerſa ſuperior appêdicis ſedes occupatur. atq; ut illi ampliores carnoſioresq; in ilium lateribus, quàm iuxta dorſum, aut in abdominis anteriori ſede ſunt: ita quoq; appendicis pars, quæ abdominis latera reſpicit, anteriorq; eſt, unà cum illi oſis ſede, cui appendix cõmittitur, craſſior eſt, quàm<sup>b</sup> pars uertebriſ & dorſo proxima. Anterior uerò appendix extremum, anterior<sup>r</sup> ue ſpinæ ilium oſis pars ideo eſt craſſiſſima, ac ueluti antrorſum educitur, quòd præter abdominis muſculos ipſi commiſſos, duobus muſculis principium porrigat: quorum<sup>a</sup> alter tibiæ motorum primus, alter autem ſextus cenſebitur. Cæterum ab ilium oſis dorſo<sup>c</sup> tres potiſſimum enaſcuntur muſculi, ſuis principijs id uniuerſum occupantes. Quam tam uerò ipſius ſedem ſinguli oppleant, duè admodum obſcure in hoc dorſo utcunq; aſpero eminentes indicant lineæ, quæ inſtar ſemicirculi ductæ, totius dorſi amplitudinē in tres ſedes diſterminant: quarum primam, quæ extra poſtteriorem lineam in poſteriori potiſſimum dorſi regione conſiſtit, muſculus ſibi uendicat femur mouentium primus. Secundam uerò ſedem, inter duas lineas conſpicuam, muſculus obtinet femur mouentium ſecundus. Ex tertia ſede, à priori breuioriq; lineâ, ad coxendicis uſq; articulum pertingente, principium porrigitur muſculo femur agentium tertio. Ab interna autem ilium oſis ſede, primum<sup>b</sup> muſculus enaſcitur, qui dorſi motorum nonus erit, quiq; ex læui, ſed utcunq; ampla ilium oſis impreſſione, ad regionem tranſuerſi quintæ lumborum uertebre processus conſpicua, exortus ſui portionē adipiſcitur.

ilium oſis pars  
retroſum ma-  
gis quam ſacri  
oſis tranſuerſi  
processus ex  
porrecta.

ilium oſis  
appendix.

Spina.  
Dorſum.

Lib. 2. de Ad-  
miſſiſſi diſſiſſi.

Quibus muſcu-  
lus appendix  
occupetur.

ilium oſis dor-  
ſi lineæ, & qui  
bus id occupa-  
tur muſculis.

Quibus inter-  
na ilium oſis  
amplitudo.

Dein præter hanc ilium oſis compreſſionem,\* alia inſignis in ipſius interna ſede eſt amplitudo caua,& minimum aſpera,<sup>a</sup> muſculoq; occupata femur mouentium ſeptimo, quem carneo amploq; principio inſtar ſemicirculi ex hac amplitudine pronalcis, ac deinde ſenſim arctari, ſimulq; cum<sup>b</sup> ſexti femur mouentium muſculi tendine,<sup>c</sup> primoq; crus petente neruo, per<sup>d</sup> finum ferri docebimus, ſibi priuatim in coxendicis oſſe, ſeu media uniuerſi quod hoc Capite proſequimur, oſis parte exculptum. In elatiori enim coxendicis oſis ſede, ſinus inciditur amplus, qui in mundato oſſe foraminulis quibuſdam in hoc oppletus cernitur, ut iſ ligamentum educat, cuius beneficio os inibi læue, lubricumq; ac ueluti oleo munetum cernitur, ut rectè ad hunc ſinum ſeptimum ille femoris muſculus, unà cum ſexti muſculi tendine, reflekti conuoluïq; poſit. Vtrinque ad ſinus iſtiſ latera,<sup>e</sup> unum inſigne prominet tuber, ſinum augens, ac quo minus hæc deſcendentes muſculi ex ipſo declinent, æ commodum. Dein tuber ad externum ſinus latus conſiſtens, illumq; oſi & coxendicis oſi pariter cõmune, priuatim<sup>f</sup> nonum tubif mouentium producit muſculum, cuius etiam uſus gratia utcunque amplum inæqualeq; uiſitur, paruū ſinulum inſtar ſciſſuræ ſibi uendicans, à quo muſculus ille fertur enaſcitur. Interius uerò tuber, plurimùm ad coxendicis oſis robur conſert, quod neceſſariò crasſum ualidumq; eſſe oportuit, tum articulationis roborisq; nomine, tum etiam quòd id totius corporis, uti mox dicemus, altiſſimo ſinu, cui femur articulatur, cælandum fuerit. Atque huius etiam uſus cauſatione, ilium os interna ipſius ſede ad elatiorem fui cum ſacro oſſe connexus regionem,<sup>g</sup> crasſum ualidumq; redditur, & ueluti ad interni tuberis internam ſedem continuo tubere porrigitur: quod non ſolum coxendicis oſis robur adauget, uerùm etiam principium offert<sup>h</sup> muſculo femur mouentium decimo, qui internam pubis oſis ſedem occupans, & ex tota interna coxendicis oſis ſede etiam pronatus, femur extrorſum circũuertit. Externa itaq; coxendicis oſis ( cuius robori tam folicitè Natura proſpexit) ſedi<sup>i</sup> amplus rotundusq; & omnium corporis ſinum, cui oſſa articulantur, profundiffimus ſinus inſculpitur, non omni ex parte læuis, lubricaq; cartilagine incruſtatus. In anteriori enim ſede, non modica ipſius<sup>k</sup> portio altius quàm reliqua illius circumferentia inciditur, ac aſpera, cæcisq; foraminulis quibuſdam oppleta cernitur,<sup>l</sup> ligamenti producendi gratia, quod teres in uerticem capitis femori inferitur. Deinde præſentis ſinus<sup>m</sup> ſupercilia, quæ nonnullis puerulis appenedice efformata uidimus, in anteriori ipſius ſede leuiùs quàm in poſteriori protuberant, quòd ſcilicet femur ſedentibus magis in angulum flekti oportebat quàm ſtantibus, aut aliud quid agentibus extendi, aut in poſteriora duci. Prætereā in<sup>n</sup> humiliori coxendicis ſinus, acetabuli<sup>o</sup> ue ſuperciliorum ſede, animaduertendum quoq; eſt, ſupercilia non continuo ductu orbiculatim ferri, ſed incidi, ac intermitteri, ac ueluti iter parare<sup>p</sup> uenulæ hac in aſperam & cartilaginem non obductam acetabuli ſedem exporrectæ, articuloq; alimentum ſuppeditanti, à quo uiſcidus adaptetur humor, cuius auxilio articulus promptè mobilis euadat. Ne tamen ſinus huius in ſupercilio in ciſi ratione, articulus nimirum luxationi obnoxius redderetur, Natura ualidum cartilagineumq; ligamentum orbiculatim ſupercilijs adnexit, quod nullibi intermiſſum appareret, acetabulumq; adhuc magis quàm ſupercilia adauget, & uenulæ illi uiam præbet inter os & poſteriorem ipſius ligamenti ſedem tutò proprepenti. Cæterum nunc quoq; perpendicularia ueniunt cæca foraminula, paſſim in coxendicis oſis acetabuli ſuperciliorum externa ſede in hoc parata, ut ualidiſſimum ed

Sinus coxendi,  
cis ossis superio-  
ri sedi inscul-  
ptus.

*Sinus eius tu  
bera.*

*Quomodo co-  
xendicis ofsis  
robori sit pro-  
spectum.*

*Acetabulum  
femori articu-  
lando paratū.*

k inter P,  
L, K, K,  
M, N, S fi-  
gur. 3.  
l s musc.  
tab. A.  
ni eiusdem  
tab. C.  
n = fi. cap  
12 lib. 4.  
charac. 57  
o 1, 2, 3 fi  
gur. T.

p 1,2,3 fl.  
externū tu  
ber s in si-  
gnitur, in-  
ternum ue-  
rò X.  
q 4 musc.  
tab. φ.  
r s in pri-  
mæ figuræ  
sinulo po-  
nitur.

s 3 fig. M,  
N, O.

f 16 musc.  
tab. F, G. cl  
13 tab. r.

u 1,2 fig.  
c,f,g.

x 1,2 fig.g.

y 2 fi. cap.  
 49 lib. 2 P.  
 2 1, 2 fi. i, i.

4 1,2 fl.b.

b fig. cap.  
6 lib. 3 præ  
positæ a.

e fig. cap. 1.  
lib. 2. P. P.  
d. 23. fig.

e 2, 3 fig. d.  
11 lib. 4.  
charac. 71.  
f 2, 3 fig. d.  
g 13 musc.  
tab. o.

b 1, 2 fig.  
cap. 18. R.  
i 13 musc.  
tab. x. aut  
12 tab. b.  
ubi deci-  
mus musc.  
a insigni-  
tur.

k Hic spe-  
cia 13 mu-  
scul. tab. 7.  
f. 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8, 9, 10,  
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

l 2 fl. l. po-  
steriorem,  
q autem an-  
teriorē ap-  
pendicis se-  
dem notat.  
m 2 fi. pri-  
ma impres-  
sio m. secū-  
da o. tertio  
n. quarta a  
p ad q.  
o 10 musc.  
tab. o.  
o eiusdem  
eius. v. c.  
11 tab. 12  
dein vo.  
p 11 tab. v.  
q 11 ta. cha-  
ruct. v. ac  
12 tab. 13.  
r integra-  
rum fig. 1.

s 1, 2 fig. d.  
13 G. H. J.  
K.  
t 1, 2 fig. L.  
U. 1, 2 fig.  
R. R.

cant<sup>e</sup> ligamentum, orbiculatim femur coxendicis ofsi colligans. Quinetiam modò<sup>s</sup> sedes animaduertenda est, quæ inter anteriorem ilium ossis partem, quæ sacro committitur ofsi, & posteriorem coxendicis regionem exculpitur, ut<sup>e</sup> nervo uiam præbeat, qui crus adeuntium quartus, omniumque corporis nervorum ex pluribus compositus maximusque existit. Est quoque hic obseruandus coxendicis ossis<sup>t</sup> acutus processus, qui<sup>s</sup> ligamentū educit, in<sup>t</sup> transuersum processum quinti sacri ossis pertinens, & qui<sup>t</sup> musculo principium porrigit, quem aut decimo femur mouentium musculo ascribemus, aut priuatim undecimum femur mouentium numerabimus.<sup>k</sup> Neque etiam prætereundus est sinus, coxendicis ossis posteriori externæque regioni sub dicto nuper processu exculptus, ad quem mira Naturæ solertia, ueluti ad trochleæ rotulam, decimus femur mouentium musculus reflectitur. Insuper non perfunctoriē coxendicis ossis<sup>t</sup> appendix indagabitur, toti infimæ ipsius sedi, cui sedentes innotimur, adnata, & ossis, cui coalescit, amplitudinem seruans: quod cum roboris gratia, tum musculorum exortus causa, insigniter crassum uisitur. Ab hac enim appendice, ut minimū quatuor grandes exoriuntur musculi, quorum singula capita<sup>m</sup> priuatim in appendice impressione sedemque sibi uendicant, in emundato integræ ætatis hominis osse satis conspicuam.<sup>n</sup> Primus horum musculorum, tibiam mouentium tertius erit, qui ab elatiore, & maximè postica eius appendicis sede principium ducit.<sup>o</sup> Secundus, tibiam mouentium quartus habebitur, cuius principium minus quàm primi musculi latum est, magisque uersus anteriora, iuxta extimum primi musculi latus, pronascitur.<sup>p</sup> Tertius, tibie motorum quintus numerabitur.<sup>q</sup> Quartus uerò, maxima portio est eius musculi, quem femur mouentium quintum statuemus, quiq; maximam præsentis appendicis sedem suo principio occupans, totius corporis musculorum facile crassissimus est. Sic itaque posterior, lata<sup>ue</sup>, & dein media eius quod describimus ossis partes se habent. Anterior uerò, quæ Pubis os dicitur, tenuis utcunque cernitur, & dextrum os sinistro<sup>r</sup> cartilaginis interuentu, quasi unionis modo committitur. quo enim homo ætate fit prouectior, eo semper connexus iste minus cartilagine oppletur, minus<sup>ue</sup> offendit cartilaginis. Atque id uiris pariter ac mulieribus commune est. neutiquam enim cum plebeijs medicis arbitrandum est, pubis ossa uiris esse continua, mulieribus autem in hoc cartilaginis interuentu compacta, ut partus tempore remittit, inuicemque disungi queant. Parturientibus namque mulieribus (uti neque quadrupedibus) hæc ossa inuicem non disjunguntur: uerum id mulieres in hoc ossium coalitu peculiare sibi uendicant, quod ipsis non tam longa linea, atque in uiris, committuntur. Deinde coxendicum ossium infimæ partes (dextram dico & sinistram) in mulieribus mutuo longè magis distant, quàm uiris. Præterea infimæ pubis ossium partes mutuo sub ipsorum connexu diremptæ, nullo etiam magis mulieribus quàm uiris seiunguntur, ac ueluti sinuatæ, tenuesque redditæ, inuicem distant. adeò ut in mulierum ossibus uacua sedes inter coccyx os & internas regiones infimarum partium coxendicum ossium, multo amplior quàm in uiris occurrat. Hæcque differentia tam est insignis, ut uel ipsa abundè doceret, pubis ossa in partu non recludi: etiamsi tactus interpariendum, idem non leui opera attestaretur. Hac itaque ratione (ne id quod de<sup>s</sup> coccyge osse suo loco proditum est, adijciam) Natura fortui excludendo prospexit. Quo autem minori negotio leuiusque mulieres uterum gererent, ilium ossa illis multo ampliora sunt, ipsorumque<sup>t</sup> spina in latera longè magis quàm in uiris educitur, & etiam illa ossa extrorsum insignius cauantur: &

Sinus, qui erig-  
sionis corporis  
nervus ser-  
tur.

Coxendicis ossis  
acutus pro-  
cessus.

Sinus, ad quē  
decimus femur  
mouentium mu-  
sculus uoluitur.

Appendix co-  
xendicis ossis.

Pubis ossis  
hystoria.

Ossa sacra  
ossis necorum  
in uiris & mu-  
lieribus diffi-  
rentia.



ut semel dicam, hæc commodam gestando foetui sedem efformant. Quod autem nuper natis puellis, partus facilius gratia, apud nullas gentes pubis ossa aut comprimantur, aut dislingantur, neminem dissectionis studiosum latere arbitror: quantum uis id pertinaciter uulgus nunc de his, nunc illis nationibus affirmet.

*Cur pubis os  
maximo forami-  
ne peruium,  
& dein ipsius  
sinu & tube-  
ra.*

Quamobrem uero pubis os maximo totius corporis ossium<sup>a</sup> foramine (quod etiam propter magnitudinem, ab ostij imagine *hygoeides* nuncupatur) peruium sit, illi demum cognoscunt, qui ad amussim inter secandum didicere, qui nam musculi à coxendicis & pubis ossibus pronascentur: illi enim arguunt, pubis os amplam & aptam educendis musculis sedem necessarium oportuisse fieri. Ne uero interim frustra animal grauaret, sed ut leue esset, eo quo diximus foramine donatur. Neque est quod hæc aliquis<sup>a</sup> uasa seminaria, aut maximas crurum<sup>a</sup> uenas & arterias, aut etiam<sup>a</sup> neruos deduci arbitretur: quemadmodum nemo non credit, qui Anatomes rudis, nudam ossium compagem intuetur. Illa enim organa aliam nanciscuntur uiam: quippe maxima crus petens uena, arteriaque, simul cum<sup>b</sup> secundo crus adeunte neruo, proprium<sup>c</sup> sinum obtinent, in superiori pubis ossis sede insinuatam, è regione elatioris sedis nuper dicti<sup>d</sup> foraminis. Porro seminarijs uasis etiam elatius quam pubis os prominet, in abdomine iter paratum esse audies. Deinde ingens illud pubis ossis foramen ualida<sup>e</sup> membrana oppletur, quæ<sup>f</sup> musculum internæ foraminis sedi proximum ab illo dirimit<sup>g</sup>, qui externam foraminis sedem occupat. Neque profecto aliquid, foramen hoc transit, præter<sup>h</sup> uenam, & arteriam, neruumque, non ad genu usque ramorum serie digestos. Præterea hæc uasa non per foraminis medium feruntur: sed in elatiori foraminis sede<sup>i</sup> sinus cælat<sup>j</sup>, illis uasis deducendis paratus. Cæterum superior pubis ossium<sup>k</sup> pars, qua inuicem committuntur, idcirco exasperatur, quod<sup>l</sup> rectos abdominis musculos hinc enasci, Naturæ uisum fuerit. Deinde anterior quoque ossium sedes inibi aspera est, ut neruosum caput<sup>m</sup> secundi tibiam mouentium musculi hinc ritè pronasceretur. Ad hæc, in anteriori pubis sede<sup>n</sup>, à coxendicis ossis acetabuli interno latere, ad pubis ossium usque commissuram, tubi, & quædam ueluti prominentia conspicitur, à qua<sup>o</sup> octauus femur mouentium musculus principium ducit. Quemadmodum uero hæc anterior pubis ossis sedes protuberat, ita quoque posterior<sup>p</sup> acutum ostendit lineam, à qua musculus femur mouentium decimus sui etiam exortus<sup>q</sup> portionem assumit. His omnibus accedit pubis ossis<sup>r</sup> crassities, iuxta infimam pubis ossium connexus sedem, & magni illius foraminis internum latas, ubi pubis os quodammodo teres crassumque ob hoc in uiris uisitur, ut ipsius ossis robur adaugeatur: utque hinc præter quosdam penis<sup>s</sup> musculos, alterum corpus<sup>t</sup> eorum quæ penem constituunt, originem duceret. Atque in hunc modum ossa se habent, sacri ossis lateribus connexa, quorum utrumque in nuper natis pueris, tribus constat ossibus, quæ ternis lineis cartilagine oppletis distinguuntur. Hæc lineæ à coxendicis acetabuli centro, ubi inuicem sunt conterminæ, porriguntur: una quidem ad superiorem acetabuli sedem, secunda ad externum acetabuli latus: tertia autem ad latus internum, quæ etiam per pubis os procedit, ubi id quodammodo teres est, adeo ut lineæ alterius lateris os neutiquam in ea sedes interfecent, quas

ilium os, & coxendix os, & pubis os nuncupabimus.


*Ossa sacri ossis  
lateribus com-  
missa, in pueris  
lis uisus effor-  
mari ossibus.*

*u 1, 2, 3, 4  
fig. 1.*

*x 20 fi. lib.  
5 c. & iuter  
sue u. aut 21  
fig. 7 ad f.  
2 fig. cap.  
6 lib. 3 r.  
2 fig. cap.  
12 lib. 3 p.  
a 2 fi. cap.  
11 lib. 4  
charac. 7 u.  
b eiusdem fi.  
charac. 10.  
c 1, 2, 3 fi.  
gur. V.  
d 1, 2, 3 fi.  
gur. r.  
e 2 fi. cap.  
49 lib. 2  
o. o.*

*f 10 musc.  
tab. 2, G.  
g 8 musc.  
tab. v.  
h 1 fi. cap.  
6 lib. 3 e.  
i fi. cap. 12  
lib. 3 r.  
k 2 fi. cap.  
4 lib. 4  
charac. 66.  
l 1, 2, 3 fi. f.  
m ad dex-  
trâ latus u  
secunde fig.  
n 5 musc.  
tab. A.  
o 10 musc.  
tab. A.  
p ab h 2 fi  
guræ ad u.  
q 7 musc.  
tab. e.  
r 5 fig. o.  
s 10 musc.  
tab. G.  
t 1, 2, 3 fi. f.  
u 1, 2 fig.  
cap. 49  
lib. 2 L. K.  
x caruicem  
fig. A, B.*

PRIMA TRI-  
GESIMI CAPI-  
tis figura, dextri femoris os  
posteriori facie deline-  
atum referens.



SECUNDA FI-  
GURA, FEMORIS  
dextri anteriorem fa-  
ciem ostendens.

CHARACTERVM, QVI DVABVS TRI-  
gesimi Capitis figuris adhibentur, Index.

- A<sub>1,2</sub> Caput femoris, acetabulum ossis coxendicis subiens.  
B<sub>1</sub> Sinus femoris capiti insculptus, & ceteris ligamenti insertionem à coxendicis osse excipiens.  
C<sub>1,2</sub> Appendicis, rotundum femoris caput efformans, cum reliqua femoris portione coadunatum.  
D<sub>1,2</sub> Cervix femoris.  
E<sub>1</sub>, F<sub>1,2</sub> Inferiora femoris capita, ac E quidem internum, F uero externum notat.  
G<sub>1,2</sub> Hac linea coadunatum indicat appendicis, duo inferiora femoris capita constituentis.  
H<sub>2</sub> Sinus, qui utriusq. capitibus E & F insignitus est communis, ac quem patella subit.  
I<sub>1</sub> Sinus ac interuallum, duo inferiora femoris capita inuicem diuimens.  
K<sub>1</sub> Ab hac sede interioris capitis primus pedem mouentium musculus initium ducit.  
L<sub>1</sub> Hinc secundus & tertius pariter pedem mouentes muscoli exoriuntur.  
M<sub>1</sub> Huic interni capitis sedi, quini femur mouentium musculi tendendo inseritur.  
N<sub>1,2</sub> Sinus in externo inferiori femoris capite exculptus latere, quo quartus tibiae mouentium musculus uehitur.  
O<sub>1</sub> Hac sede internum latus interioris femoris capitis compressum est, ut hac tendines primi, secundi, tertij & quinti tibiae mouentium musculorum aptius porrigerentur.  
P<sub>1</sub> Hac regione idem interioris capitis latus insigniter protuberat, & dictorum iam tendinum reflexui est accommodum.  
Q, R, S, U, X, Y Exterior femoris processus, uerum singuli characteres non in utraq. figura simul obuij, aliquid pri-  
uatum,

uam, ut modo subiiciam, indicant. Quidem in prima & secunda coactum appendicis huius processus ad reliquos. R. autem in prima, sinum internæ præsentis processus sedi calatum. S. uero in prima figura, primam T. T. exterioris processus impressionem. Ceterum T, T. in prima, insignitur aspera linea, deorsum à prima impressione ducta: U. autem in secunda, exterioris processus secunda impressio: X. uero, tertia impressio. At Y. in am-  
 b. 1, 2. babus figuris quarta indicatur impressio.

a, b. 1, 2. Interior femoris processus. Verum b. pruinatim in secunda, hic appendicis indicat coactum.

c, c. 1. Linea aspera, à radice interioris processus deorsum oblique gratia oclausi femur mouentium musculi procedens.

d, d. 1. Linea secundum femoris longitudinem protuberans, & quanti femur mouentis musculi inflectione admittens.

e. 2. Hac sede femur amplum, ac ueluti compressum est, quum interim reliqua ferè longitudine teres sit.

f. 2. Aspera sedes, à qua oclausi tibiam mouentium musculus sui exortus initium ducit.



Femoris superius caput.

Duo inferiora femoris capita, & eorundem sinus.

Lib. 3. de resu part. 2. de Admin. diff.

MEMORIS os, quod  $\mu\epsilon\mu\omicron\rho$  Græci uocant, magnitudine cunctis humanæ fabricæ ossibus præstat: in auiibus autem & omnibus ferè quadrupedibus, tibiæ ossi & fibulæ, longitudine cedit, suprâ quidem coxendicis ossi, infrâ autem tibiæ ossi, diuersa articuli ratione, omnibus pariter coarctatum. Superiori enim parte, quæ similiter atq; inferiori appendice donatur, rotundissimum caput obtinet, proli-

xæ<sup>a</sup> ceruici ad interiora inclinata adnatum, coxendicisq; ossis acetabulo exquisitè congruens. Vniuersum hoc caput, cuius gratia femur flecti & extendi, & in latera duci, & deniq; circumuerti potest, læue, cartilagineq; incrustatum uisitur: at nonnihil inferius, quàm ipsius uerticis medium cõsistit, angustum, profundumq; & inæqualem obtinet sinum, cui teres<sup>b</sup> ligamentum, à cox-

endicis ossis acetabulo enatum, robustissimè implantatur. Inferiori autem sede femur insigniter crassum est, & in duo oblonga<sup>b</sup> capita, omnium totius corporis ossium capitum maxima, dirimitur, quæ in posteriorē femoris sedem longè magis quàm in anteriorem porriguntur, & in lateribus non minus ferè quàm ipsorum medio extuberant, lateribus<sup>c</sup> uel uix deprimuntur, quemadmodum etiam ipsorum cum tibiæ ossis articulo ex usu fuerat. Hæc namq; ossi tibiæ mutuo ingressu ad eum modum articulantur, ut tibia duntaxat flecti extendiq; possit: nequaquam uerò in latus, uel tantillum quidem, duci. utcunq;

etiam id Galeno uisum fuerit, qui in tibiæ motu examine, femoris ad coxendicis os motu deludebatur. Cæterum ista femoris capita retrorsum ideo producuntur, quòd tibiæ in angulum flecti, & non extra rectam lineam extēdi, aut antrorsum erigi satius erat: adeò ut motus illius ratione, femoris capita in anteriori femoris sede nequaquam promineant. Et quamuis hæc, in anteriori eorumdem sede, sinum ostendant utrisq; capitibus communem, & impen-

patulum, læuiq; cartilagine cinctū, is tamen aliquo tibiæ ossis tubere excipiendo non paratur: uerum os orbiculare, & breui scuto non ab simile, apto tubere sinum illum subire, altero ab hoc Capite audies. In posteriori femoris sede capita hæc magno<sup>m</sup> interuallo inuicem dirimuntur, atq; in ipsorum medio amplum profundumq; sinum, utcunq; asperum, & cartilagine nequaquam ob-

ditum habent, qui asperum inæqualeq; tibiæ ossis<sup>n</sup> tuber excipit, quod in tibiæ ossis sinuum medio protuberat, ligamentumq; educit, quod ualidissimè illi finis inseritur, unâ cum alio admodum robusto ligamēto, à posteriori tibiæ ossis sede pronato. Iuat etiam sinus iste, deducēdo totius corporis maximo<sup>n</sup> uero, hæc simul cum<sup>q</sup> uena & arteria in tibiæ contendenti. Humiliora enim femoris capita, quum tibiæ flexus gratia adeò in posteriora ducantur, etiam id præstant, ut in illorum medio neruum illum simul cum uasis tutissimè deorsum repere sinant: atq; etiam processuum modo, aliquot musculorū pedem

mouentiū principia porrigant. In posteriori enim femoris regione, ab latiore interni

a tota, 1, 2  
fi. & inter-  
grum A,  
superius cū  
os, inferius  
cum o. arti-  
culatum.  
b. 1, 2. fig.  
supra C, in  
fig. G.  
c. 1, 2. fig. A.  
d. 1, 2. fig. D.  
e. 1, 2. fig. C.  
29 e. 1, 2.

f. 1. fig. B.  
g. 2. fig. C.  
49 lib. 2. P.  
h. 1, 2. fig.  
E, F.

i. lunge E.  
F. 1, 2. fig.  
ad G, F, I  
7 fig. cap. 14.

h. 2. fig. H.

l. 2. fig. cap.  
32 A, B, C.  
D.  
m. 1. fig. I.

n. 7. fig. cap.  
31. I.  
o. fig. cap. 1  
lib. 2. X.

p. 10. musc.  
tab. 7. d. 10  
n. 8.  
q. uultus R  
gur. lib. 8  
r. 11.



v 1 fig. K. interni capitis<sup>1</sup> sede primus pedem mouentium<sup>1</sup> enascitur musculus, cuius ca-  
 s 12 musc. piti haud procul ab exortu sesaminum<sup>1</sup> innectitur ofsiculum, quod læui sua &  
 tab. Φ. lubrica superficie, qua ex musculi substantia prominet, læuem interni femoris  
 capitis regionem spectat, durumq; ipsius contactum excipit, & citra musculi  
 noxam, communi sesaminorū usū, illius impetum dissoluit. Ab externi autem  
 1 1 fig. L. capitis superiori<sup>1</sup> sede, secundus pedem agentium<sup>1</sup> educitur<sup>1</sup> musculus, cui perin-  
 u 12 musc. de ac primo sesaminum obtingit ofsiculum. adeo ut bina ad poplitem eius ge-  
 tab. Ψ. neris referēda ueniant ofsicula, in ceruis, canibus & leporibus, utpote siccis ani-  
 malibus, admodum, ut & in senio cōfectis hominibus, cōspicua. Insuper ab ex-  
 23 tab. Φ. terno femoris capite<sup>1</sup> is quoq;<sup>1</sup> musculus prodit, quem tertium pedis motibus  
 7 14. d. Γ. praeceptorum statuimus. Præterea si<sup>1</sup> musculus in poplite latitans, ab osse ali-  
 quam sui exortus portionem sumit, hanc sanē ab externo hoc femoris capite  
 2 11 cap. 1. in utuatur. præcipua enim ipsius origo ex<sup>1</sup> ligamento pendere docetur, di-  
 lib. 2. T. ctum nunc femoris caput tibiæ potissimum colligante. Dein de in elatiorem  
 4 1 fig. M. capitis interni<sup>1</sup> regionē modicē uersus eius capitis in ternum latus<sup>1</sup> tendo in se  
 b 12 musc. ritur, quinti femur mouētis musculi, cuius etiam insertionis occasione hoc fe-  
 tab. 3. 1. e- moris caput inibi cōpressam ostendit<sup>1</sup> sedem, tendini excipiendo aptari. Atq;  
 in 4. f. ita anterior & inferior, posteriorq; horum caput sedes se habent: latera ue-  
 c 1 fig. N. rō eorundem, nulla cartilagine incrustata, multis cæcis foraminulis opplētur,  
 ut ualidissima genu articulum continentia ligamenta hinc aptē pronascātur.  
 d 1, 2 fig. N. Porro externum exterioris capitis latus, priuatim<sup>1</sup> sinum nanciscitur, obliquē  
 e 10 musc. ipsi iuxta posteriorem eius lateris regionem insculptum, ac<sup>1</sup> quarti tibiā mo-  
 tab. Ψ. uentium musculi tendini paratū. Quo minus enim tendo ille hac obliquē re-  
 flexus, à suo ductu aberret, Natura ipsi hunc sinum, lubrico & læui ligamento  
 obductum, preparauit. Internum uerò latus interioris capitis femoris, etiam si  
 f 16 musc. ad ipsum plures conuoluantur reflectantur<sup>1</sup> ue<sup>1</sup> tendines, nullum tamen eius-  
 tab. tenai- modi manifestum adipiscitur sinum. At osse ligamentis emundato, iuxta po-  
 nes muscu- lori<sup>1</sup> U, Δ, R, V, V, aut-  
 2 tab. q, γ, 2. prefio, qua tutò tendines deferri queant, à sua sede tuberis beneficio non reclī-  
 8, 4, 4. nantes, quod in medio dicti nunc lateris latē<sup>1</sup> protuberat, atq; secūdum ipsius  
 g 1 fig. O. posteriorem sedem tēdines opportunē deferri sinit. Tendines autem hac de-  
 b 1 fig. P. ducti, trium primorum & quinti tibiā mouentium musculorum censēbun-  
 tur. Ad femoris osis ceruicē, cui superius femoris caput adnascitur, duo con-  
 i 1, 2 figur. spiciūtur processus: quorum<sup>1</sup> alter externū femoris latus occupat, omniumq;  
 Q, Υ. corporis processuum, nulli alteri osi commissorum, facile maximus est,<sup>1</sup> insi-  
 h femora si- gni etiam donatus appendice.<sup>1</sup> Alter minor est, & quod ad magnitudinem spe-  
 gior. e. d. 3. ctat, priori neutiquam cōparandus, multoq; inferius in interno femoris latere  
 hic aut Q. l 1, 2 fig. d. nonnihil uersus posteriora conspicuus, &<sup>1</sup> appendice similiter adactus. Græ-  
 m 2 fig. b. ci ambos *ῥοχαιτίδας*, quasi rotatores dicas, nuncupant: hunc anteriorem, illum  
 uerò exteriorem appellantes. quum tamen simpliciter *ῥοχαιτίδα* dicunt, per-  
 petuò externum subaudiunt: quem etiam propter amplitudinē, & quandam  
 cum nate imaginem, *γλαρυ* uocarunt. Horum processuum idem usus cum re-  
 liquis ferē ofsium processibus est: in hoc enim parantur, ut collis ritu musculo-  
 rum insertionē probē admittant, alijsq; musculis eleganter principij sui sedem  
 præbeant. Interior namq; femoris processus, qui modicē oblongus, neq; admo-  
 dum inæqualis est, in hoc prominet, ut illi<sup>1</sup> sexti & septimi femur mouētium  
 musculorum tendines inserātur. Ad huius processus radicem in posteriori fe-  
 moris sede, aspera quædam ducitur<sup>1</sup> linea, obliquē deorsum in posteriora ali-  
 quousq; ducta, & octauī femur mouentis<sup>1</sup> musculi insertioni aptata. Exterior  
 p 4 femoris

Duo femoris  
 processus, seu  
 rotatores.

femoris processus interna sede, qua femoris caput respicit, asperum inæqualemq; commonstrat<sup>a</sup> sinum, cui<sup>a</sup> nonus & decimus femur mouentes musculli inferuntur. Externa autem sedes gibba est, in ossisq; hominibus & ætate prouectis quatuor impressiones sedesq; proponit, quatuor musculorum insertionibus excipiendis paratas. Ac<sup>a</sup> prima quidem ampla est, & gibba in posteriori processus sede apparet, cui primus femur mouentium musculus lata insertionem implantatur. Ab huius compressionis radice, aspera quædam<sup>a</sup> linea deorsum per femoris posteriora nonnihil obliquè deducitur, cui primus ille femur mouens musculus ualidissimè etiam inseritur.<sup>a</sup> Secunda compressio in anteriori processus consistit latere, magis quàm prima inæqualis & aspera, & utcunq; sinuata, ac demum secundi femoris motuum auctoris musculi feruiens insertioni.<sup>a</sup> Tertia ad superiorem processus regionem uisitur, inter primæ & secundæ elatiores consistentes sedes. Hæc gibba est, & insertionem tertij femur mouentis musculi admittit.<sup>a</sup> Quarta, in apice processus se offert, reliquis tribus longè arctior, & quarti femur mouentis musculi tendinem excipiens. Horum sanè musculorum insertionem exterior processus assumit: ab ipsius uerò radice in anteriori externaq; ipsius sede<sup>b</sup> musculo principium præbet, qui tibiæ motorum septimus recensèbitur.<sup>a</sup> Quod uerò ad reliquam femoris formam spectat, uiuersum femur anteriori ipsius sede, & in lateribus teres & utcunq; læue est, undiq; ab<sup>a</sup> octauo tibiæ mouentium musculo circumdatum: cuius gratia anterior femoris sedes iuxta ipsius ceruicis radicem nonnihil ampla est, & aspera, quo ualidiùs & ampliori principio musculus ille enasceretur. In posteriori autem sede femur in acutum quodammodo fertur, & lineam insigniter protuberantem, & asperam inæqualemq; ostendit, quæ à femoris processuum radice aliquouſque ultra medium longitudinis femoris prorepat. Huic lineæ<sup>b</sup> quintus femur mouens musculus pertinaciter inferitur:<sup>a</sup> ipsaq; duntaxat ex reliqua femoris amplitudine, ab octauo tibiæ mouente musculo non circumdatur. Porro ad inferiorem huius lineæ<sup>c</sup> sedem, ac iuxta inferiorū femoris capitum radicem, femur amplum depressumq; non autem teres cernitur, quo tutius hæc maxima tibiæ petens uena, cum arteria & neruo feratur: ac ne, si femur hîc gibbum esset, à femore errabunda declinet. Quamuis & leuitatis occasione, Natura hanc femoris partem, quæ necessariò in latera, inferiorum ipsius capitum educendorum gratia, lateſcere debuit, non uoluerit posteriori in sede esse teretem & prominentem, quum scilicet nullorum musculorum productioni aut insertioni ibidem subseruauit, & iniurijs non sit exposita, inferioribusq; femoris capitibus in posteriora ductis, quodammodo sepiatur. ad eò sanè, ut spectatu iucundissimum sit, quî Natura præter partium functionem, præcipuumq; usum, roboris simul & leuitatis rationem undiq; habuerit, quæ etiam femori secundum illius longitudinem<sup>k</sup> sinum communicauit longum & amplum, qui medulla oppletus, maximum istud corporis os pro sua mole admodum leue efficit. Præterea femoris<sup>l</sup> ductus, non recto tramite à coxendicis ossis acetabulo deorsum tenditur: sed femoris ceruix à capite ipsius ualde extrorsum obliquè, & quasi transuersim fertur, & hinc femur rursus reliquo ipsius corpore obliquè uersus interiora ad genu descendens procedit. Quam sanè figuram non obiter Natura excogitauit: quum omnes quibus à prima conformatione femur rectius quàm homini ex usu est, contingit, uari & claudi in genu reddantur. Hoc autem quàm non modò ad cursum, sed ambulationem, firmamq; stationem noxium sit, quotidie uidentes discimus. Dein si utriusq; femoris ceruix non statim à coxendicis articulo,

Femoris secundum ipsius longitudinem formam.

q. 1 fig. R.  
r. 13 musc.  
tab. x. 8. 12.

y.  
s. 13 musc.  
tab. r. x. y.  
z.

t. primus 9  
musc. tab.  
v. secūlus

10 tab. x.  
tert. 11 ta.  
x. quart. 11

tab. o.  
u. 1 fig. d.  
x. 1 fi. T. T.

y. 2 fig. V.  
z. 2 fig. X.  
a. 13 fi. Y.

b. 9 musc.  
tab. A. 10  
tab. n.

c. ab f. ad  
G. figura 2.  
d. c. ad G.

figura 3.  
d. 7 musc.  
tab. 7. c. 11

tab. d. h.  
c. 2 fig. f.  
f. 1 fig. d. d.

g. 12 musc.  
tab. 2. z.  
h. 13 musc.

tab. 13.  
i. 1 fig. e.


k. Pete illi  
ex fractio  
aliquo fe-  
more.

l. Progres-  
sus cū ab A  
per D. f. c.  
d. d. ad f.  
gure. Aut  
per D. f. ad  
H. figura 2.  
Aut expen-  
de integra-  
rum fig. a.

ticulo, uti diximus, foràs porrigeretur, quæ nam sedes internis femur ample-  
xantibus musculis reliqua esset? quæ rursus nervis, uenis, ac arterijs in uniuer-  
sum crus distributis? quæ item glandulis, horum uasorum propagationi præ-  
fectis? Non enim per externas cruris regiones hæc descendere decebat, quum  
ita omnibus foris occurrentibus, leui quaque occasione lædenda, exponeren-  
tur. Cæterum posterior femoris pars, summa cauaq; uisitur: anterior autem gib-  
ba, quod ad sensiones is femoris ductus admodum sit idoneus: uti etiam ad mul-  
ta quæ sedentes obimus munia, quando scilicet unum femur alteri iniicimus.  
ut modo taceam, quàm eleganter femur musculis cedat, posteriorem ipsius  
sedem occupantibus.


DE DVOBV IN TIBIA REPO-  
sitis ossibus. Caput xxxi.

PRIMA CAP. SECUNDA. TERTIA. QUARTA.  
xxxI FIGVRA.



QUINTA.





NONA. DECIMA. XI.

TRIGESIMIPRIMI CAPITIS FIGV-  
rarum, & earundem characterum Index.

UNDECIM huius Capituli figura ad dextram spectant tibiam, ac prima utrumq; in tibia locatum os anteriori facie exprimit, crassius nimirum, interiusq; quod tibiæ os vocabimus: & gracilius, quod exterius positum, fibula nobis potius quam sura nuncupabitur. Secunda figura, tibiæ os simul cum fibula posteriori facie appositissime delineatur. Tertia, solius tibiæ ossis anterior sedes commonstratur. Quarta, tibiæ ossis posterior facies oculis subijciuntur. Quinta, fibulam anteriori facie exprimit. Sexta, fibulam posteriori sede delineatam exhibet. Septima, tibiæ ossis superiorem ostendit sedem, cui femur articulat. Octava, duas continet cartilagineas, quæ sinus adaugent, quibus femoris capita in tibiæ ossis sinibus excipiuntur. Nona, inam tibiæ ossis & fibulæ sedem anteriori parte proponit, ut cavitās in conspectum veniret, tali cum tibia articulationi parata. Decima, solam tibiæ ossis infimam sedem posteriori ex parte delineatam offert, qua talus excipitur. Undecima, internum latius inferioris fibulæ sedem commonstrat, quod talo articulat. Characterum autem index erit huiusmodi.

A, B Hæ duobus characteribus in prima figura, superior tibiæ ossis appendix notatur. In tertia uero & secunda, indicatur linea coalitum commonstrans appendicis cum reliqua ossis portione.

C Appendix superior fibulæ in prima figura indicatur, in quinta aut coalitum appendicis cū reliquo osse insignitur.

D In prima appendix tibiæ inferior, in tertia appendix illius coalitum indicatur.

E In prima appendix fibulæ inferior, in quinta coalitum appendicis ad os notatur.

F, G 2, 4, 7 Sinus tibiæ ossis, quibus inferiora femoris capita articulantur.

H, I, K 7 Tibiæ ossis tuber, sinus, quibus femoris capita excipiuntur, divimens, ac H quidem ipsius anterior sedes indicatur, I uero media, & impensius prominet. K autem posterior. Atq; hi characteres in eius tuberis sedibus, quæ sinuantur, obuij sunt. & horum K & I in secunda figura, tertia & quarta, idem quod in septima, indicant.

L 8 Cartilago, externum tibiæ ossis sinum adaugens, quo externum femoris caput excipitur.

M 8 Cartilago, internum tibiæ ossis sinum augens, cui internum femoris caput articulat.

N 8 Hac sede cartilagineas, tibiæ ossis sinus augentes, videntur crassissime.

- O 8 Hac sede nuper dictæ cartilagine sum tenuissima, ac ante sinuum centrum deficiunt.
- P, P 8 His sedibus ille cartilagine in apices terminantur.
- Q 5 Fibula sinus leuiter cælatus, cui tibie ossis capitulum iam R indicandum coarticulatur.
- R 4 Tibie ossis capitulum, quod fibule superius coarticulatur.
- S 4, 10 Sinus tibie ossis, quo id inferiorem fibule sedem excipit.
- T 5, 6, 11 Internum fibule latus, quod tibie ossi inferius committitur.
- U 2 Contextus superior fibule ad tibie os.
- X 2 Contextus inferior fibule ad tibie os.
- Y 2 Internallum, quo fibula à tibie osse inter suos articulos dehiscit.
- Z 1, 2 Hac sede fibula non rectè ducitur, sed introrsum nonnihil obliquatur, exterioriq; latere sima fit.
- a, b 1, 3, 7 Anterior tibie ossis sedes, in quam musculi tibiæ extendentes inferuntur.
- c 5, 6 Superioris fibule appendicis processus, cui tendo quarti tibiæ mouentis musculi inferitur.
- d, e, f, g, h 9 Sedes, cui superior tali pars lateraq; articulantur. ac d quidem, e, & f superiorem huius sedis regionem in nona & decima figura monstrant. Deinde rursus d notat eius regionis tuber. e uero & f partem huius regionis utrinq; ad tuberculi d notati latus alius quàm ipsum tuber insinuatam. Porro g sedis huius internum latus indicat, quod ab externo latere constituitur processus inferioris appendicis tibie ossis, quem  $\Phi$  in prima figura indicat. Ceterum h in nona & undecima externum huius sedis, que talo aptatur, latus ostendit, ab interno constitutum latere appendicis inferioris fibule, in prima figura E notata.
- $\Phi$  i In prima figura  $\Phi$ , processus indicatur inferioris appendicis tibie ossis, qui exterior est malleolus. Ceterum i in secunda, tertia, nona & decima, eundem appendicis processum notat.
- k 4, 10 Sinus interioris malleoli, ex quo cartilagineum ligamentum talo inferitur.
- l 1, 3, 9 Sinus asper & inæqualis in anteriori sede inferioris appendicis tibie ossis conspicuus, à quo ligamentum cartilagineum ad tali ceruicem pronascitur.
- m 2, 4, 10 Hac sede sinus spectantur, qui tres tendines ad pedis inferiora protensus deducunt.
- n 2, 5, 6, 9 In prima figura E externum notat malleolum. is namq; aliud nihil est, quàm inferior fibule appendix, qui in plerisq; figuris n indicatur.
- o, p 1, 5 Umbrata hæc fibule sedes, ab o ad p usq; pertinet, ea fibule pars est, quæ nuda, nullisq; musculis tecta, ante sectionem se offert.
- q, r 2, 6 Hac sinuata fibule sede septimi & octauæ musculorum pedem mouentium tendines reflectuntur.
- r 2, 6, 11 Sinus inferioris fibule appendicis, à quo ligamentum in talum fertur.
- s, f 1, 5 Prima fibule linea, seu primus eiusdem angulus.
- t, t 1, 2, 5, 6 Secunda fibule linea.
- u, u 1, 2, 5, 6 Tertia fibule linea.
- x, x 1, 5 Primum fibule latus. Verùm x & x primum huius lateris lineam indicant, inibi gratia musculi pollicem extendentis modicè prominentem.
- $\alpha$ ,  $\alpha$  1, 5 Secundum fibule latus.
- $\gamma$ ,  $\gamma$  1, 3 Prima tibie ossis linea.
- $\epsilon$ ,  $\epsilon$  1, 2, 3, 4 Tertia tibie ossis linea.
- $\eta$  1, 3 Secundum tibie ossis latus.
- $\kappa$  2, 4 Aspera tertiæ tibie ossis lateris linea, cui musculus in poplite latitans inferitur.
- $\beta$ ,  $\beta$  2, 6 Tertium fibule latus.
- $\delta$ ,  $\delta$  1, 2, 3, 4 Secunda tibie ossis linea.
- $\zeta$  1, 3 Primum tibie ossis latus.
- $\theta$  2, 4 Tertium tibie ossis latus.

a tota &  
2 fig. inte-  
grarum  $\Phi$   
c v ad A  
& n.  
b tota 3, 4  
figure.  
c tota 5, 6  
figure.



N TIBIA, perinde ac in cubito, bina reponuntur<sup>a</sup> ossa, quæ Hippocrates perpetuò tibie ossa appellat. ac horu<sup>b</sup> alterum interius est, & crassius, quod totius mebrini nomine  $\lambda\upsilon\gamma\mu\eta$  & tibia nuncupatur:<sup>c</sup> alterum uerò exterioris locatur, & interiori admodum crassitie cedit, Græcis quidem  $\pi\omicron\pi\omicron\nu$ , Latinis autem fura & fibula uocatum. Ego euidentioris doctrinæ studio, crassius os, tibie os appellabo: id à tibia, hoc est, toto membro distinguens, quod his ossibus, musculis, uenis, arterijs, nervis, & cute hæc omnia ambiente formatur. Gracilius autem os, fibula opportunè dicitur: ne, si id furā uocarem us, eam quis subaudiat musculorum posteriorem tibie sedem occupantium & pulpam, quæ etiam fura nobis appellatur, quamq; Græci, quia ueluti tibie uenter est,  $\gamma\alpha\varsigma\sigma\omicron\nu\mu\iota\alpha\upsilon$  nuncupant.

Tibiæ ofis  
fibula appen-  
dices.

sedes cui fe-  
mur ad tibiam  
articulatur.

Cartilagine  
quibus tibiæ  
ofis sinus an-  
gentur.  
Lib. 3. de vsu  
part. & in cõ-  
mentarijs in  
Lippoc. librum  
de Fracturis.

Lib. de Com-  
muni anima-  
lium gressu.  
Fibula ad ti-  
biæ os nexu.

cupant. Tibiæ itaq; ofis, & fibulæ, quibus longus sinus, asseruandæ medullæ pa-  
ratus, ad ofisumq; leuitatem accõmodus, secundum ipforum longitudinem  
insculpitur, supra infraq; appendix coalescit ac superior quidem tibiæ ofis' ap-  
pendix admodum crassa lataq; est, & anteriori sede magis quam posteriori de-  
orsum ducitur. Huic \* duo oblongi insculpuntur sinus, inuicem \* aspero inæ-  
qualiq; tubere distincti, & lubrica cartilagine incrustati, quibus inferiora femo-  
ris' capita excipiuntur. Tuber autem sinus distinguēs, grandem<sup>o</sup> sinum subit,  
femoris capita inferiori ac posteriori in sede dirimentem. Dein tuber ex supe-  
riori<sup>h</sup> mediāq; ipsius sede, quæ aspera & sinuata, neq; ulla cartilagine inuncta  
uisitur, ualidissimum emittit<sup>i</sup> ligamentum, nuper dicto femoris capitum in-  
teruallo sinui<sup>ue</sup>, in posteriori potissimum ipsius sede, insertum. ad eò sanè, ut  
media huius tuberis sedes in hoc aspera sinuataq; sit, quò foelicius ligamenta in  
femur porrigat, hæc è maximè protuberante sua sede, ac deinde ex<sup>o</sup> posteriori  
ipsius regione educens. Ab<sup>o</sup> anteriori namq; tuberis regione, quæ minimum  
prominet, etiam si illa similiter aspera sit, ac latè sinuata, nullum tamen ligamen-  
tum femori inseritur: sed ligamenta inibi producuntur, quæ<sup>m</sup> cartilagine an-  
teriori huius tuberis sedi colligant, quas nunc tibiæ ofis sinus augere dicam.  
Quum enim duo tibiæ ofis sinus, femoris capita admittentes, quodammodo su-  
perficietenus duntaxat insculpantur, neq; ad amussim femoris capitum gibbis  
(etiā si Galeno secus uisum fuerit) suis cavis respõdeant, Natura mirabili artifi-  
cio sinuū profunditatè adauxit. quippe præter lubricas cartilagine tibiæ ofis  
sinibus & femoris capitibus crustæ modo obductas, utriq; sinui unam adhi-  
buit cartilaginem, neq; femori, neq; tibiæ ofsi aliter quam ligamentorum be-  
neficio connexam. Hæc namq; orbiculatim ligamenti interuentu, anteriori po-  
steriori<sup>q;</sup> sedi tuberis connectitur, quod tibiæ ofis sinus, femoris capita exci-  
pientes, dirimit. Istæ cartilagine, exactè simplici cartilagine molliores sunt, &  
quasi ligamēti naturæ participes. Dein quæ ofisibus applicatur, impenſe æqua-  
les, lubricæ, læues, ac deniq; inunctuoso humore oblitè spectantur. Ad hæc, in ar-  
ticuli ambitu<sup>o</sup> crassæ sunt, & multo ante sinuū centrum<sup>o</sup> extenuatę definunt.  
Harum siquidem figura lunaris est, quemadmodum interioris sinus internum  
latus, & exterioris sinus externum. Præterea nullibi crassiores, quam ad lateris  
sui medium cernuntur.<sup>p</sup> quæ enim anteriori posteriori<sup>q;</sup> tuberis tibiæ ofis si-  
nus distinguētis sedibus appropinquant, tenuissimæ sunt, & in acutos apices  
finiunt: quorum qui anteriori eius tuberis sedi committuntur, inuicem pro-  
ximi sunt, dextrāq; cartilago sinistræ ibidè alligatur. Apices uerò posteriorem  
tuberis sedem accedentes, magis mutuo distant, neq; inuicem, ut anteriores,  
committuntur. Ligamentum enim crassissimū, ex tubere in femur insertum,  
posteriores cartilaginū apices distinguit. Quæ quum ita sint, leui negotio col-  
ligitur, quàm concinnè harum cartilaginum auxilio, ofis tibiæ sinuum cau-  
itas adaugeatur, non solum quidem in hominibus, uerum in omnibus quæ ha-  
ctenus uidi quadrupedibus & auibus. His namque in genu articulo eiusmodi  
quoq; cartilagine reponuntur. unde etiam in mensa cuius harum naturā con-  
tueri promptissimū est, si modò exactè genu articulum quis inspexerit: neq;  
pessim cum Aristotele, & Galeno in tertio de Partium usu, quadrupedum ge-  
nu illic esse existimauerit, ubi tibiæ inferior pars illorum talo coarctatur. Atq;  
hoc sanè modo tibiæ os femori articulatur. Fibula autem non ad eò altè con-  
scendit, ut femur contingat: uerum superior ipsius appendix interno suo late-  
re<sup>o</sup> sinum gerit amplum, & leuiter admodum insinuatū, cui minimum pro-

d tibiæ of-  
sis appen-  
dices pri-  
mum A, B  
1, 3 fl. dcm  
D 1, 3 fl. fi-  
bula autem  
C 1, 5 fig.  
insuper E 1  
F 1, 3 fl. B.  
\* 2, 4, 7 fl  
8 ur. F, G.  
e 7 fig. H.  
1, K.  
f 1, 2 fl. 30  
cap. E, F.  
g 1 fig. 30  
cap. I.  
h 2, 3, 4, 7  
fig. I.  
i 1 fig. cap. 1  
lib. 2. 2.  
h 2, 4, 7 fl.  
gur. K.  
l 7 fig. H.  
m tota 8 fl.  
gura tibi  
dextra l.  
sinistra m  
tem m m-  
signitur.

n 8 fig. N.  
o 8 fig. O.

p 8 fig. P.  
R.

q 8 fig. Q.

tuberans



4 fi. R. tuberans tibiæ ofsis appendicis' caput coarticulatur, quod ad externum tibiæ  
 ofsis latus uersus posteriora cōsistens, cartilagine, similiter atq; sinus fibulæ, in-  
 crustatur. Porro' ima sede fibula tibiæ ofsi diuersa articuli ratione, quàm' suprà  
 coarctatur. externum enim tibiæ ofsis latus, oblongum ostendit' finum, cui  
 protuberans internum fibulæ' latus immittitur, quod asperum nonnihil est:  
 quemadmodũ & tibiæ ofsis sinus asper quoq; , & læui cartilagine neutiquam  
 in crustatus cernitur. Sinus enim ille fibulam lubrico contactu excipit: uerũm  
 quā hæc ossa inuicem committuntur, ualidum intercedit ligamentum, non  
 quidem duntaxat in circuitu ipsa connectens, at etiam ubi mutuo se contin-  
 gunt. Per reliquam tibiæ longitudinem, fibula à tibiæ ossẽ plurimum dehi-  
 scit. non quidem quod hæc radij' modo obliquẽ ducatur, ac ueluti à tibiæ ossẽ  
 foràs obliquetur: sed quod tibiæ os suprà infraq; adeo crassum sit, & in reli-  
 qua ipsius longitudine gracile, ut fibula illis tibiæ ofsis sedibus, quibus crassum  
 cernitur, commissa, faciliẽ à tota graciliori tibiæ sede multũ distet. quamuis  
 tanto adhuc minus fibula à tibia dehiscat, quanto minus recta conspicitur. Fi-  
 bula enim paulo sub medio longitudinis tibiæ, introrsum ac uersus tibiæ os  
 nonnihil curuatur, externoq; ipsius latere sima, seu concaua redditur. Cæte-  
 rum tibiæ ofsis fibulæq; ductum, & per ipsum longitudinem extuberantes  
 lineas, impressionesq; , tum demum opportuniũs describam, ubi supernas in-  
 fernasq; illorum partes, quibus alijs coarctantur ossibus, plenẽ exprefsero. Su-  
 perior itaq; tibiæ ofsis appendix, ad eum quem dixi modum femori fibulæq;  
 coarctatur. ac' anterior proceraq; eiusdem sedes, unā cum tibiæ ofsis anteriori  
 sede, appendici proxima, & à plerisque Græcorum *ἀντινέμιον* uocata, ut-  
 cunque aspera & foraminulenta cernitur, ut ualidissimos' musculorum ti-  
 biam mouentium exciperet tendines: quorum etiam tendinum gratia, supe-  
 rior fibulæ appendix insigniter externo ipsius latere & superiori parte' pro-  
 tuberat, robustissimum' quarti tibiam mouentis musculi tendinem exceptura:  
 præterquā quod hæc fibulæ sedes caput educat' septimi pedem mouen-  
 tis musculi. Inferiores tibiæ ofsis & fibulæ appendices, simul' finum sedemq;  
 efformant, cui' talus mutuo quasi ingressu articulatur. In infima enim appen-  
 dicis tibiæ ofsis sede, sinus insculpitur amplus, & quodammodo' geminus. me-  
 dia namque sua sede, amplo, sed modicẽ prominente' tubere interfinguitur,  
 liquidoq; altiũs ad tuberis eius latera excauatur. Ad internum huius sinus la-  
 tus, inferior tibiæ ofsis appendix, ualido magnoq; processu deorsum fertur,  
 qui externo ipsius' latere, quo finum respicit, cauus, & similiter ac sinus ipse,  
 læuis & cartilagine in crustatus est: interno autem' latere, alterum crus respi-  
 ciente, gibbus est ac quum' excarnis sit, nullisq; musculorũ partibus obiectus,  
 in nobis tactu faciliẽ percipitur, estq; interior malleolus. Processus hic in infi-  
 ma ipsius sede uersus posteriora' finum obtinet asperum, ex quo' ligamen-  
 tum prodit cartilagineum, tibiæ os talo colligans. Atque eiusmodi etiam liga-  
 menti producẽdi gratia, anterior appendicis inferioris tibiæ ofsis' sedes, in hu-  
 millima ipsius parte, etiam finum proponit transuersim oblongum, & aspe-  
 rum, & inæ qualẽ: à quo ligamentum prodit, tibiæ ofsi' ceruicem tali nectens.  
 Posterior etiam huius appendicis sedes, ubi primum internum educit malleo-  
 lum, depresso est, sinusq; ostendit, qui transuersis obducti ligamentis, muscu-  
 lorum tendines hæc pedem adeuntes, tutò, ne suis finibus aberrẽt, ferri sinunt.  
 Sunt autem illi numero tres, quintus scilicet pedem mouentium, & duo pe-  
 dis digitorum flexui famulantes. Porro externum inferioris appendicis tibiæ  
 ofsis latus, nullum educit processum interno malleolo respondentem: uerũm

Pbi fibula a ti-  
 biae ofse de-  
 hiscat.

Tibiæ ofsis fi-  
 nus & tibe-  
 ras, quibus tale  
 articulus.

Interior mal-  
 leolus.

Fibula cū talo  
 articulata.

\* appendix fibulæ externo tibiæ ossis lateri adnexa, impenſe hîc crasseſcit, deorſumq; magis quàm interior malleolus fertur. ac in cauſa eſt, ut rarius in externum pedis latus, quàm in internum, talus luxetur. Tanto enim fibula hîc decliuius ipſo tibiæ oſſe deſcendit, quanto altius tibiæ os ad femur ſuprà porrigitur: adeò ut fibula ne minimum quidem longitudine à tibiæ oſſe uincatur. Inferior hæc fibulæ appendix, externum<sup>a</sup> latus ſinus conſtituit, talum excipientis. Verùm appendix interno ipſius latere adeò protuberat, & cartilagine in-cruſtatur, ut eam à talo uerius ſuſcipi, quàm eundem excipere, meritò quis dixerit. etiamſi externum tali latus appoſitè tegat, atque in eum modum unà cum interno malleolo talum comprehendat, ut nuſquam in integris hominibus talus contingi queat.<sup>a</sup> Tibiæ enim oſſis appendix ſuperiore ipſius intēgit ſedem, & internum quoque ipſius latus. fibula autem inferiori ſua appendice externum tali latus occupat: anterior tali ſedes, quæ in nuda oſſium compage oculis ſubijcitur, tēdinibus occultatur, per pedis ſuperiora ad digitos deductis. ita etiam poſterior ipſius ſedes, quæ non minus in nudis ſceletis eſt conſpicua, tendinibus obtegitur in calcem inſertis, & quibuſdam hæc pedis inferiora ſubeuntibus. Ima hæc fibulæ pars, talo commiſſa, externoq; ſuo latere gibba, & nulla prorſus muſculi parte<sup>b</sup> obteſta, exteriorem conſtituit malleolum, quem ſimul cum interiori malleolo à quibuſdam talum perperam appellatum fuiſſe, Galenus teſtatur. Atqui is error ad nos uſque manauit. Nam, ut cæteros taceam, Eraſmus noſter Roterodamus in ſuo de talorum luſu Dia-  
logo, malleolos in hominibus talos ſimul cum Plinio uocari innuit. quod nonnullis Galeni interpretibus adeò arrisit, ut *σφυρα*, hoc eſt malleolos, ſubinde talos reddiderint. Poſterior itaque exterioris malleoli ſedes amplum oſtendit ſinum, qui tranſuerſo obductus<sup>c</sup> ligamento, ſexti & ſeptimi pedem mouentium muſculorum tendines deducit, illos, quo minus à ſua ſede reclinent, continens. Internum eiufdem malleoli latus in infima ipſius ſede uerſus poſteriora, profundum aſperumq; oſtendit ſinum, ex quo<sup>d</sup> ligamentum prodiit cartilagineum, hîc fibulam talo ualidiſſimè connectens. Cæterum ex uniuerſa fibulæ amplitudine, nulla ipſius pars nuda excarnis<sup>e</sup> ue eſt, præter infimæ ipſius partis externum<sup>f</sup> latus, quod etiam aliquouſq; ſupra appendicem fibulæ inferiorē excarne cernitur. quum interim reliqua ipſius amplitudo muſculis obtegatur, ita fibulam amplexantibus, ut hæc paſſim ipſis cedere, ab illisq; ueluti in angulos comprimi uideatur. Si enim fibulam examinaueris, eam ſecundum ipſius longitudinem triangulam eſſe conſpicias, atq; id potiſſimum iuxta ſuæ longitudinis medium. In anteriori enim fibulæ ſede, acuta & inſigniter protuberans apparet<sup>g</sup> linea, primum fibulæ angulum conſtituens. In poſteriori autem ſede, fibula deprimitur, plana q; eſt, ac utrinq; unam egregiè extuberantem obtinet<sup>h</sup> lineam: quarū interna ſecundū fibulæ angulū, externa autem tertium conſtituit: hiſq; tribus angulis, lineis<sup>i</sup> ue, tria fibulæ cōtinentur<sup>k</sup> latera. ac unum quidem inter primam & ſecundā conſiſtit, quod ſimul cum tibiæ oſſis externo<sup>l</sup> latere aptam ſedem præbet illis muſculis, qui à tibiæ anteriori ſede in pedis ſuperiora feruntur. Sunt autem illi, pedem mouentiū<sup>m</sup> ſextus, deinde quatuor pedis digitos<sup>n</sup> extendens, ſimul cum<sup>o</sup> nono pedem mouentiū, & illo qui pollicem<sup>p</sup> extendit, ac priuatim in primo hoc fibulæ latere<sup>q</sup> lineam quandam ſibi uendicat, modicè protuberantē, à qua illi muſculo principiū offertur. Secundum latus, prima linea & tertia terminatur: & amplum, egregièq; ſinuatuū<sup>r</sup>, ſeptimo ac<sup>s</sup> octauo pedem mouentibus muſculis locum præbet. Quinetiam latus hoc utcūq; aſperū cernitur, ut octauus ille muſculus hinc uniuerſum ipſius princi-

Talum ante ſe-  
ſionem talus  
non occurrere.

Exterior mal-  
leolus.

Lib. de oſſib.  
cap. 22.

Excarnis fi-  
bulæ pars.

Fibula ſecun-  
dum ipſius lon-  
gitudinem tri-  
angula.

x 1 fig. 8.  
dein 2, 5, 6,  
9 fig. n.

y 2, uſq. h.

z 6 ſi. cap.  
33 H.

a Conſiſ-  
ſi-  
guras in-  
te-  
grā oſſium  
compagem  
exprime-  
tes, muſc.  
tabulis in  
pede.

b 1 muſc.  
tab. 1, 2 tab.  
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

c 2, 6 ſi. q.  
d 2 muſc.  
tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

e 2, 6 ſi. q.  
f 1 ſi. cap. 1  
lib. 2 g.  
g 1, 5 ſi. q.  
o. p.

h 1, 5 ſi. ſi. f.  
i 1, 2, 3, 4, 5, 6  
fig. ſecunda  
linea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

l 1, 2, 3, 4, 5, 6  
fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

principium pulchrè educat. Tertium latus, secunda & tertia lineis circumscriptum, à musculis comprimitur posteriorem tibiæ sedem occupantibus, & potissimum ab eo qui pollicis secundū os flectit, ab hocq; fibulæ latere carneus enascitur. Secunda linea priuatim<sup>1</sup> ligamentum educit, fibulam tibiæ ossi tota illa sede, qua hæc ossa inuicem dehiscunt, colligans, & in<sup>2</sup> secundam tibiæ ossis lineam insertum. Tibiæ enim os, similiter ac fibula, secundum longitudinem quadantenus triangulare est, ac prima ipsius<sup>3</sup> linea in anteriori ossis sede consistit, insigniterq; prominet, unde etiam Spina Anatomæ professoribus appellatur. Hæc q; adeo acutè porrigitur, ut nusquam potius concertantes pueros pedibus inuicem petere uideamus, quàm ad anteriorem tibiæ sedem, ubi linea proximè cuti subiecta, hanc cultri modo scindit, quoties ipsa impetu ad tibiæ os colliditur. Secunda & tertia tibiæ ossis lineæ, posterioris sui<sup>4</sup> sedis angulos constituunt. ac tertia quidem eius sedis internum efformās angulum, non admodum acutè producit: sed obtusa, propemodumq; teres est. Secunda autem externum posterioris sedis tibiæ ossis angulum educens, paulo est acutior, ligamentumq; admittit, fibulam tibiæ ossi, quā hæc inuicem distant, colligans. His tribus lineis, tria tibiæ ossis cōficiuntur latera. ac<sup>5</sup> primum quidem prima secundaq; linea terminatur, sinuatumq; est, ac planum: eorundemq; musculorum occasione cauatur, quibus primū fibulæ<sup>6</sup> latus cedere dictum est. secundum uerò tibiæ ossis latus prima tertiāq; linea terminatur, & insigniter gibbum est, nulloq; prorsus obtectum musculo: Græcis *λεπία*, & frequētius adhuc *ωτάνημιον* nuncupatur. Tertium tibiæ ossis latus, secunda & tertia circumscriptum lineis, non ualde depressum est, ac musculis occupatur, posteriore tibiæ sedem sibi uendicantibus: præcipuè uerò<sup>7</sup> illo qui quatuor digitorum tertij ossis flexus autor habebitur, &<sup>8</sup> illo quem pedis motorū quintum statuemus. Ad hæc, tertium latus in superiori ipsius sede asperā ostendit<sup>9</sup> lineam, obliquè expositam, cui<sup>10</sup> musculus inferitur, quem in poplite latitantem uocamus. Huiusmodi sanè fibulæ tibiæq; ossis lineæ & latera leui negotio arguūt, quàm suffulciendis, educendisq;, & admittendis musculis hæc ossa conueniant. Articuli uerò ostendunt, quàm affabrè motibus, quos cruribus molimur, obeundis, Natura hæc extruxerit: qui tanto sanè opportunius sui rationes offerunt, quo omnes simul cruris articuli, in coxendice nimirū, in genu, & tali cum conterminis ossibus nexu, magis expenduntur: quum unus scilicet alteri præstet, ut non æquè multis omnes subseruire debeant motibus. unde etiam fit, articulos quosdam extrui potuisse ualidiores, & luxationi minus expositos.

Tibiæ ossis secundum ipsius longitudinem figura.

## DE PATELLA. CAPVT XXXII.

PRIMA TRIGESIMISECUNDI CAPITIS FIGURA, ANTERIOREM PATELLÆ FACIEM OSTENDENS.



SECUNDA FIGURA, POSTERIOREM PATELLÆ SEDEM PROPONENS.

## CHARACTERVM SECUNDÆ figuræ Index.

- A, B Dextri cruris patellæ ruber, sinum inferiorum femoris capitum subiens.  
C Sinus, qui interno femoris capiti adaptatur.  
D Sinus patellæ, gibbo externi femoris capitis congruens.



E Hæc parte patella inferiori sua sede tibie os spectat, & ueluti processum educit, qui similiter atq; tota anterior ipsius sedes, tendinibus tibiam extendentibus innascitur, quemadmodum pulchre ostendit octaua musculorum tabula, charactere k, qui innascitur characteribus g, h, i. Foraminula uero hæc parte, in & in patella anteriori sede conspicua, etiam circa characterum operam promptè obseruantur.

Patellæ sinus  
& forma.



ANTERIORI genu sedi<sup>a</sup> os quoddam præponitur orbiculare, & breui scuto non abfimile, quod à molaris lapidis rotunditate Græcis *μύλη*, & ab ipsius sede *πρυοναρις*: Latinis autè mola, & à patellæ imagine, patella potissimum uocatur. Hoc posteriori sua sede, qua femur spectat, leui lubricaq; cartilagine, magna ex parte obductū uisitur, apto tubere sinibusq;<sup>b</sup> anteriori inferiorum femoris capitū sedi<sup>c</sup> eleganter congruens. Secundū ipsius enim longitudinem<sup>d</sup> tubere amplo & mediocriter prominenti extuberrat, quod patulum femoris capitum sinum in anteriori illorum sede exculptum subit.<sup>e</sup> Vtrinq; ad tuberi huius latera, unus habetur sinus, prominentes & cartilagine incrustatas femoris capitum sedes excipiens. Verū ut exterius femoris caput antrorsum magis, quā interius caput, porrigitur, & ampliori sede leui cartilagine obducitur: ita sanè exterior patellæ sinus, ad tuberi sui externum latus consistens, longè amplior latiorq; interiori sinu occurrit. Patella igitur illa parte, qua femoris os contingit, læuis & lubrica, perinde ac illud, cernitur.<sup>f</sup> Anteriori autem ipsius sede, & in lateribus aspera, & cæcis quibusdam foraminulis obsita spectatur: quemadmodum & in posteriori ipsius sede,<sup>g</sup> ubi infima sui parte, tanquam acuto quodam processu deorsum ducitur, elatioremq; tibie osi sedem respicit: aspera etiam, & foraminulis illis ornata est, quod aptius firmiusq; tendinibus tibiam extendentibus innascitur.<sup>h</sup> Vniuersa enim patella, tota ipsius amplitudine sedeq; ubi lubrica cartilagine non obducitur, tendinibus illis innascitur, neq; femori, neq; tibie aliter quā tendinum beneficio commissa. Hoc enim priuatim patella sibi uendicat, quod alteri osi ligamentorum opem non alligetur, sed tendinibus illis genu articulū transcendentibus innata, & unica tantum superficie ex ipsis quodammodo eminens, ad femoris os ualidissimè constringatur. Patellæ substantia in natu grandioribus impense dura & solida est, utcunq; etiam Galenus eam extrinsecus cartilaginofam esse asserat: ac Marinus quoq; cum alijs Anatomicorum præcipuis, eam separatim cartilaginofum os uocauerit, & suum quod patellis dedicauit Caput, de Cartilaginosis ossibus inscripserit. Atq; isti fortassis animum adhibuere tendinum cui patella innascitur substantiæ, quæ elixa, molliu sculæ cartilaginis speciem obtinet, earum partium modo, ex quibus neruosa musculorum capita, aut ligamēta, principium ducunt, aut in quæ eadem inserūtur. Verū quando patella debite à tendinibus emundatur, aut sola in cœmiterij occurrit, nequaquam cartilaginea, sed perquā solida fortisq; cernitur, non quidem in hominibus tantum, sed in bobus etiam, ouibus, & cæteris quadrupedibus: quorum etiam genu articulo rerum, Opifex patellam preposuit, multo quā in hominibus longiorem & angustiorē: quemadmodum in plerisq; auibus, inferiorū femoris capitum occasione, latiorē & breuiorem. Creatur autem patella, quo minus promptè femur in tibie genu<sup>i</sup> ue flexu, in anteriora luxetur. Verū hunc patellæ usum, quem ipsi solum dissectionum periti uidentur tribuisse, quis merito secundarium indicabit, si haud segniter expendat, qui hæc ualidissimi tendinis, cui inseritur, robori consulat, quoties genu impense flectitur, ipseq; idco tendo à prominente antrorsum femore

a tota, s. si. integratam uero figur. 2.

b 2 fig. c. p. 30 H. c 2 fig. d. b.

d 2 fig. c. d.

e tota, s. si. 2 fig. a.

f 2 fig. e.

g 2 mos. tab. k.

Quæ patellæ femoris ossi connectitur.

Patellæ substantia.

Patellæ usus.

sum femore premendus foret, si patella duritie sua femoris impetum, durumq; contactum non fusciperet, innoxieq; pari usu admitteret, quo<sup>a</sup> permul-  
 ta sefamo semini comparata ofsicula, rerum Opificem extruxisse innuimus.  
 b 1, 2 fig. cap. 25 T, V, X. C. 2  
 fig. cap. 33  
 v, u.

DE PEDIS OSSIBVS.  
 Caput xxxiii.


PRIMA  
 xxxiii  
 capitis fi-  
 gura.



SECUN-  
 DA.



TERTIA. QUARTA. QUINTA. SEXTA.



SEPTIMA.


DECIMA.



NONA.

UNDECIMA.



DUO-  
DECI-  
ma.DECI-  
MATER-  
tia.TREDECIM PRÆSENTIS CAPITIS FI-  
gurarum, & earundem characterum Index.

PRIMA figura integram dextri pedis ossium struem superiori facie exprimit. Secunda, dextri quoque pedis ossium compagem ea sede delineatam proponit, cui stantes innitimur. Tertia, dextri pedis talus anteriori facie ita oculis subijcitur, ut ipsius superior pars in conspectum ueniat. Quarta, eiusdem tali inferior sedes ab anteriori facie exprimitur. Quinta, talus ab interno latere spectatur. Sexta, talum conspiciendum offert, externum latere designatum. Septima, dextri pedis calcis os ab interno latere ostenditur. Nona, calcis ossis externum latus demonstrat, & perinde ac duæ præcedentes, superior em calcis sedem depictam exhibet. Undecima, eiusdem ossis posterior em refert sedem. Duodecima, quatuor tarsi ossium simul nexorum anterior facies conspiciuntur, cui pedis ossa coarctantur. Decimatertia, quatuor tarsi ossium posterior facies spectatur, quæ calci & ossi naviformi est contermina.

Γ 1, 2 Talus.

Δ 1, 2 Calx.

Θ 1, 2 Cymbam referens os.

1, 2, 3, 4 His numeri characteribus in prima figura, secunda, duodecima & decimatertia, quatuor tarsi indicantur ossa.  
I, II, III, IIII, V Quing. pedis ossa in prima figura notantur, quæ in secunda etiam circa characterum appositionem sunt conspicua.

Λ, Ξ 1, 2 Digitorum pedis ossa.

A, B, C, D 3, 5, 6 Tali tuber, inferiori tibia ossis appendici articulatam. ac A quidem ad B, primum huius tuberis latus indicat: C uero ad D, secundum: & A ad C, tertium: B autem ad D, quartum.

E, E 3 Sinus dicti huius tuberis tali, secundum ipsius longitudinem insculptus.

F, F 3 Duæ tali tuberis partes, elatius quam sinus E indicatus prominentes.

G 5 Internum tali tuberis latus, quod cartilagine inrustatum, interno malleolo committitur.

H 6 Tali tuberis sinus, externo ipsius lateri insinuatus, qui cartilagine similiter obductus, externum malleolum excipit.

I 5 Sinus tali asper, cui ligamentum cartilagineum ab interno procedens malleolo inferiuntur.

K 6 Tali sinus, cui ligamentum cartilagineum ab externo malleolo pronatum innascitur.

L, M 5, 6 Duo sinus, quos posterior tali regio uersus internum latus spectandos exhibet, qui deducendis reflectendisque musculorum tendinibus parantur, hæc pedis inferior a subeuntibus.

N 3, 4, 5, 6 Tali ceruix.

O 3, 4, 5, 6 Tali caput, ossis cymbam referentis sinum subiens.

P 7, 8, 9 Calcis ossis caput, cartilagine obuolutum, &amp; in tali sinum Q notandum ingrediens.

Q 4 Tali amplius sinus, calcis caput P iam indicatum admittens.

R 7, 8, 9 Calcis ossis sinus, cui inferior tali capitis sedes S iam indicanda articulat.

S 4 Inferior tali capitis, quod ossi cymbam referenti articulat, sedes, calcis sinum subiens.

T, T 4 Asper tali sinus, ex quo cartilaginea ligamenta a calci inferuntur.

U, U 7, 8, 9 Asper calcis sinus, cui cartilaginea ligamenta ex nuper dicto tali sinu immittuntur.

X, X, Z 2 Calcis ossis sedes, quæ pede in terram firmato, deorsum spectat. Verum Y & Z in secunda, & Y in octaua, & Z in nona, priuatim huius sedis processum notant, musculis quibusdam educendis aptum, & propinquius reliqua calcis sede terræ immittentem.

a, b 7, 8, 9 Ab a ad b superioris calcis sedis interuallum notatur, à posteriori tali regione ad posticam calcis deductum.

c 2, 8, 9 Postica calcis sedes.

d, e 2, 8 Internum calcis latus. Verum e priuatim sedē notat, qua tendines quidam hæc reflectuntur, pedis inferior a petunt.

f, g 1, 7, 9 Externum calcis latus. Verum g separatim huius lateris regionem insinuat, cui septimi & octauæ pedem mo-

nentium



uentium musculorum tendines exporriguntur.

h, i 7 In septima figura, anterior calcis sedes est conspicua. & h quidem eius sedem indicat, quæ talo committitur. i ne rō eam notat, quæ ossi cubum imitanti articulatur.

k II Admodum cauus ossis cymbam referentis sinus, tali caput O signatum suscipiens.

l, m, n IO Anterior ossis cymbæ assimilati sedes, tres perquam leuiter prominentes commonstrans superficies, quibus tria interiora tarsi ossa coarticulantur.

o, p II, et o in IO Superior ossis cymbam referentis sedes, quæ pedis superiora spectat.

q, r IO, & q in II Inferior ossis cymbam referentis sedes, terram intruens. Verum q priuatim huius sedis sinum indicat, quò sextus pedem mouentium musculus deducitur.

si, u I3 Tres plane trium interiorum tarsi ossium superficies, quæ naviculari coarticulantur ossi.

x I3 Ossis cubum referentis sinus, in superficie leuiterq; calatus, quo calci id articulatur.

α, β I2 Ossis cubum referentis sedes, cui pedis os, anularem suffulciens digitum, & illud quod minimo præponitur, planus superficiebus coarticulantur.

γ I2, I3 Ossis cubo assimilati sedes, quæ tertio tarsi coartatur ossi.

δ I2, I3 Ossis cubo assimilati sedes, externum pedis spectans latus.

ε I2, I3 Ossis cubo assimilati superficies, in pedis superiori consistens sede.

ζ I2, I3 Ossis cubo assimilati sedes, terræ innitens.

η 2 Sinus ossis cubo assimilati, ad quem septimi pedem mouentium musculi tendo reflectitur.

θ I3 Processus tertij tarsi ossium, cui quintus pedem mouentium musculus inseritur.

ι I2 Sedes intimi tarsi ossium, cui pedis os pollicis præpositum articulatur.

κ I2 Huic secundi tarsi ossis sedi, pedis os indicem sustinens coartatur.

λ I2 Huic tertij ossium tarsi sedi, os pedis articulatur, cui medius immititur.

μ I, 2 Ossiculum ad externum articulum latus obuium, quo pedis os, paruo præpositum digito, ossi cubum exprimenti committitur.

ν, υ I, 2 Internalla, sedesq; quibus pedis ossa inuicem delinunt.

ξ, ε I, 2 Capitula pedis ossium, sinus primorum digitorum ossium subeuntia.

ω 2 Processus pedis ossis pollicem suffulciens, cui septimi pedem mouentis musculi tendo implantatur.

ρ 2 Processus pedis ossis, minimo præpositi, cui octauum pedem mouentis musculi tendo implantatur.

σ, τ, υ I, 2 Tria in indicis ossa. Eadem ratio medij, anularis, minimiq; est.

φ, χ I, 2 Duo pollicis ossa.

ψ, ω 2 Duo ossicula, pedis ossi pollicem sustinenti supposita, ac in sesaminorum numerum relata.

\* 2 Ossicula secundo pollicis internodio præposita. Reliqua autem pedis sesamina ossicula, nullis notis insigniimus.



VE M A D M O D V M

canes, mustelæ, feles, cuniculi, lepores, ursi, simiæ, sciuri, omniaq; quadrupeda, quibus pedes in digitos finduntur, eandem cum hominibus, femoris ad coxendicis os, & femoris ad tibiam articuli speciem obtinent: ita sanè par quoq; in posteriorū pedum ossibus illis, & huic cernitur contextus. Quippe si illorum animalium pollicis constructionem à nostro differre, & magis

minusq; ad illum accedere, ac plures interdū paucioresq; ue digitos illis animali bus obtingere subaudias, nullo prorsus ossè humanum pedem (cui talum, calcis os, naviculare os, quatuor tarsi, quinque pedis, & quatuordecim digitorum ossa, præter non pauca sesamina ossicula, ascribimus) donari spectabis, cui penitus simile, tum situ, tum articulatione, tum mouēdi ratione, in dictis animalibus non reperias: quibus pes illic incipit, ubi Aristoteles proportionalem nostro genu articulum in omnibus quadrupedibus statuit. Vnde etiā liquet, quàm hoc meum de quadrupedū ossibus paradoxum, Aristotelis, omniumq; (quod sciam) philosophorum, & inter Anatomicos facile principis Galeni de communi animalium gressu, in crurum flexione, extensione, flectione, ac femorum cum dorso ductu, & corporis erectione, dogmata perturbet. Ceterum ab hac ossium in illis animalibus cum homine similitudine, pedis ossium sermonē ag gressum sum, quò minus aliquis hīc mox inuitò à me requireret, quæ tot chartis

Quadrupedum cum hominis cruribus ac pedibus similitudo.

Lib. de Communi animalium gressu.

lib. 3 de r'su  
part.

in tertio de Partium usu Galenus persequitur. quando hominis pedem (qui alioquin breuissimus est) quadrupedū pede longiorē esse scribit, adeoq; diffuse hominem in ofsium cōpositione ab alijs animalibus distinguit: ac demum tam sollicitē, cur homo erigatur, sedeatq; , ratiocinatur, in Pindaro irridendo magis, quā spectādīs ofsibus occupatus. Arbitror itaq; , studiosos posthac hominum & quadrupedū, & auium quoq; ossa inuicem collaturos, ac quo nam pacto nos quatuor ueluti cruribus innixi progrediamur, quāq; ratione felis aut canis (ne quid de fimijs & sciuris & currentibus leporibus dicam) sedeat, aut erectus parieti innitatur, ac deniq; singula seorsim, in quo conueniant aut discrepent, indagaturos: ut inceps placita tantorum uiuorum adeo latē pertractata, rectius euoluant: tandemq; admoniti agnoscant, quā manifestō huiusmodi ofsium similitudo illa redarguat.

TALI situs,  
ac ipsius cum ti-  
biae ossis & fi-  
bula articula-  
tionis ratio.

Homini itaq; talus (qui forma canum, urforum, similiūq; animalium, quibus pedes in digitos dirimuntur: non autem bisulcorum, & solidis unguibus præditorum animalium talo respondet, & ἀσπυγᾶλ & ἄσπυ Græcis appellatur) sub tibiæ ossē & fibula continetur, magna sui sede ab illorum ofsium appendicibus, ut suprà retuli, comprehensus. Elatior enim tali pars, quæ sursum, quoties totus pes terrē innititur, spectat, insigni admodum prominet tubere, lubrica cartilagine incrustato, ac deniq; inuersæ in balista, ut uocamus, nuclei, aut quartæ rotulæ cuiusdam parti non absimili. Est namq; hoc tali tuber rotulæ illius partis modo orbiculare ac læue, & quatuor lateribus seu costis terminatum. ac prima quidem & secūda ad tuberis latera secundū ipsius longitudinem ueluti in orbem ducuntur: tertia secundū anteriorem tuberis terminum, quarta autem secundū posteriorem feruntur. adeo ut hoc tali tuber quadrangulare quodammodo sit, ob idq; etiam Græcis τετραγων, Latinis autem quatrio appelletur. Neq; uerò costis illis duntaxat præfens tuber quartæ illi rotulæ parti correspondet: sed rotulæ etiam, ad quam funis reflectitur, modo, sinu quodam in ipsius medio donatur, qui leuiter admodum cælatus, ad latera utrinq; magis protuberat, illi fedi exactissimē conueniens, quam in ima tibiæ ofsis appendicis sede talo excipiendo paratam scripsimus. Cæterum hoc tali tuber, non superiori sua tantū sede, illi rotulæ parti assimilatur, uerū uti rotulæ latera, quibus ipsa ueluti in furcula, aut ut alijs placet, in trochlea, suffulcitur, detrita & læuia, unctaq; uisuntur: ita quoque tali tuber ad latera, quibus malleolos contingit, comprimitur, leuiq; cartilagine incrustatum cernitur, quamuis non pari modo utrinque. In interno siquidem latere, parua amplitudine & superficietenus tantum comprimitur, quod scilicet inferioris tibiæ ofsis appendicis processus, interiorem malleolum constituens, & hoc tali latus comprehendens, non admodum amplo spacio, læui cartilagine incrustetur. Externum uerò tali tuberis latus ampliter sinuatū, & maiori interuallo cartilagine incrustatum apparet, ut aptam sedem constituat, cui internum exterioris malleoli latus cōcinnē cōgruat, qui magis deorsum, quā interior malleolus, exporrigitur. Vniuerso itaque hoc tali cum tibiæ ossē & fibula articulo, & mutuo ueluti ingressu, talus flectitur & extenditur, absque omni ferē in latera motu: quo etiam canes tanto magis destituuntur, quanto illorum tali tuber profundiore quā in homine secundū ipsius lōgitudinem exculpitur sinu, magisq; mutuo ingressu tibiæ coarctatur. Quem admodum uerò externum interioris malleoli latus asperum sinum obtinere diximus, ex quo ligamentū cartilagineū, talum tibiæ ofsi colligans, pronascitur: ita quoq; eius ligamenti recipiendi gratia internum tali latus aspero sinu inculpitur, perinde

simis tali, qui-  
bus à tibiæ ossē  
& fibula liga-  
menti assumit.

b 1, 2, fi. f.  
c 1, 2, fi. f.  
d 1, 2, fi. f.  
e 1, 2, fi. f.  
f 1, 2, fi. f.  
g 1, 2, fi. f.  
h 1, 2, fi. f.  
i 1, 2, fi. f.  
k 1, 2, fi. f.  
l 1, 2, fi. f.  
m 1, 2, fi. f.  
n 1, 2, fi. f.  
o 1, 2, fi. f.  
p 1, 2, fi. f.  
q 1, 2, fi. f.  
r 1, 2, fi. f.  
s 1, 2, fi. f.  
t 1, 2, fi. f.  
u 1, 2, fi. f.  
v 1, 2, fi. f.  
w 1, 2, fi. f.  
x 1, 2, fi. f.  
y 1, 2, fi. f.  
z 1, 2, fi. f.

d 3, 5, 6, fi.  
ab A ad B.  
c 3, 5, 6, fi.  
d C ad D.  
f caridm  
fig. ab A  
ad C.  
g caridm  
fig. a B  
ad D.  
h 3, fi. F. E.  
i 3, fi. F. E.  
k 9, 10, fig.  
ca 31 d, e, f.

l 5, fig. G.

m 9, fi. cap.  
31 g.  
n 6, fig. H.  
o 9, 11, fi.  
cap. 31 h.  
p Confer  
figure cap.  
31 E u.

q 4, 10, fig.  
cap. 31 h.  
r fig. cap. 1  
lib. 2 f.  
s 5, fig. I.

† 6 fig. K.  
 ‡ fig. cap. 1.  
 lib. 2. g.  
 x post B.  
 D fig. 5.

perinde ac externum quoq; tali latus<sup>1</sup> cēlatur, ut<sup>2</sup> ligamentum admittat, ab interno exterioris malleoli latere eductum. Huiusmodi quoq; ligamentorū ratione, posterior tali sedes, ad descripti iam tuberis<sup>3</sup> radicem consistens, aspera est, ut inibi ligamenta exciperet, à tibia principium ducentia, & rursus alia in calcem porrigeret. At præter eiusmodi asperitatem, posterior quoq; tali sedes, <sup>4</sup> sinus ostendit, musculorū tendinibus, qui hāc pedis inferiora subeunt, uehendis parati.<sup>5</sup> Descendunt autem hāc tendo quinti pedem mouentium musculi, & musculi secundum pollicis os flectentis, & illius tendo, qui tertiā quatuor digitorum ossa inflectit. Ab anteriore tali sede, idq; magis ab interno huius sedis latere, oblonga producit<sup>6</sup> ceruix, quæ aliquousq; progressa, in<sup>7</sup> caput rotundum, lubricaq; cartilagine incrustatum definit, quod nauicularis ossis alto<sup>8</sup> sinui inarticulatur, cōtextum efformans, cuius beneficio pedem modicè obsecuroq; motu in latera agi circumducicq; arbitramur. Inferior tali pars, duplici articulo calcis ossi articulatur, illiq; totus internitur. ac unus quidem in posteriori consistit regione, ubi calcis os amplo latoq; prominet<sup>9</sup> capite, amplum profundumq; tali<sup>10</sup> sinum ingrediente. Alter uerò anterior est, ac uersus internum pedis latus uergens, secus quàm posterior se habet. Calcis enim os hīc oblongo<sup>11</sup> sinu exculpitur, qui cartilagine incrustatus,<sup>12</sup> humiliorem & transversim oblongo læuiq; tubere gibbosam tali<sup>13</sup> capitis sedem excipit, quod nauiculari ossi inarticulatur. In horum articulorum medio, talus &<sup>14</sup> calx pariter exasperantur, profundosq; obtinent sinus, ex quibus cartilaginea pronascuntur ligamenta, talum calci ualidissimè connectētia. Atq; isti asperi horum ossium sinus adeò altè cēlantur, ut in emundatis ossibus, & postmodū inuicem commisis, magnum inter talum calcemq; inibi pateat intervallum, in uiuentibus cartilaginosis illis ligamētis oppletum: quæ adeò pertinaciter talum calci colligant, ut uix tantillum is supra calcem moueatur, suaq; inferiori sede tam sit immobilis, ut superiori, qua tibiæ articulatur, occurrit uerfatilis. Talus, quum pari undiq; propemodum indigeat robore, neq; musculorū insertionem excipiat, neq; ipsdem principiū offerat, nulla donatur appendice: quemadmodum & si magnum sit os, nec sinu quopiam amplo, quo medullam asseruet. adeò ut in tanto suæ imaginis formæ ue discrimine, intus duntaxat rarus fungosusq; spectetur, inibi q; solidissimus densissimusq; euadat, ubi processus constituen-

*Sinus, quibus tendines deducit.*

*Tali cum esse cymbæ reſerit articulus.*

*Tali ad calcem connectitur.*

*Sinus inter tali cum calce commissus apparetur.*

l 1, 2 fig.  
 A. C. 101d  
 7, 8, 9 fig.  
 integratū  
 autem 2, 3  
 figura d.  
 m 2 fig. X.  
 Y, Z.  
 n 2 fig. Y.  
 Z. C. 8 fig.  
 Y 9 autem  
 figura Z.  
 o 14 musc.  
 tab. O.  
 p 14 musc.  
 tab. A. 4. et  
 15. tab. N.

q 7, 8, 9 fig.  
 ab a ad b.

<sup>1</sup> Calcis os, Græcis *πρόπια* nuncupatum, omnium pedis ossium faciliè maximum est, ac simili ferè cum talo constat substantiā, eaq; parte, qua ingredimur, non omnino teres spectatur: uerum tutæ basis, stabilitatisq; gratia, nonnihil latiusculum, & quorundam musculorum occasum asperum & inæquale. Primum enim in inferiori ipsius sede transversim iuxta posteriora deorsum prominet, ac asperum educit<sup>2</sup> processum, à cuius anteriori sede<sup>3</sup> musculus principium ducit, qui quatuor pedis digitorum secundum os flectit. Dein illic<sup>4</sup> muscularosa substantia nascitur, quaternas producens particulas, quibus quatuor digitos pollicis adducimus. Horum enim musculorū educendi gratia, hæc inferior calcis sedes, latior & inæqualis est, & processus ille ob hoc prominens, teraq; propinquiū quàm reliquum calcis corpus accedit, quo minus scilicet illorum musculorum capita inter calcandum comprimantur. Superior calcis sedes, à posteriori tali parte ad posticam usq; ipsius calcis regionem pertinens, teretis corporis speciem refert, priuatim nihil præter exiguam asperitatem, in quam tibiæ ossis & tali ligamenta inferuntur, cōmonstrans, & à musculorum exortu & insertionem & articulationem libera. Posterior autem hæc calcis regio,

*CALCIS ossis sedes teretissimam spectans.*

*Superior calcis sedes, extra tibiæ reſectiundam retrorsum ducta.*

extra



extra tibiæ ossis rectitudinem admodum, in hoc retrorsum educitur, ut tibia opportune instar perpendicularis lineæ in pede, tanquam in alia linea transuer-  
 sum ducta, suffulciatur, utq; totius corporis robustissimus tendo posteriori  
 calcis parti inferatur. Huic enim depressæ, & utcunq; asperæ parti (quæ in pue-  
 ris appendice constat) tendo implantatur, ex primo, secundo & quarto pedem  
 mouentibus musculis conflatur. In quadrupedibus autem, ut canibus, ouibus,  
 & equis, posterior hæc calcis ossis pars ex abundanti finem quandam oblon-  
 gum sibi uendicat, quo tendo is tuto uehitur, qui in illis secus ac in homine la-  
 tum tendinem plantæ cuti subnatum procreat. Ceterum calcis laterum, quæ

*Internum cal-  
 cem latius quale.*

ampliter sunt depressæ, lataq; internum latus læue, & insigniter sinuatū con-  
 spicitur, ut aptam cōstituat sedem musculorum tendinibus, hæc pedis inferiora  
 petentibus, tutissimōq; reflexis. Deducuntur uerò ad internum hoc latus,  
 præter præcipuam pedis inferiora petentem uenam, & arteriam, & neruum,  
 tendo quinti pedem mouentis musculi, & tendines duorum musculorum,  
 qui ultimos pedis digitorum flectunt articulos. Hi tendines potissimū ad po-  
 steriorem processum calcis sedem cōuoluuntur, cui Natura finem insculpsit,  
 tali caput excipientem, & anteriorem tali cum calce articulum cōstituentem.  
 adeo ut is processus, in internum pedis latus protuberās, internum calcis latus  
 impense cauum efficiat, unā hic opem ferente interno posterioris calcis sedis  
 latere: quod ideo insignius ad pedis interiora prominet, ut musculus ab illo  
 enascatur, cuius beneficio pollicem introrsum à ceteris digitis abducimus. Ex-  
 ternum autem calcis latus non sinuatur, sed asperum & inæquale, ac ex carne  
 est, si modò humiliorem ipsius sedem exceperis, quæ musculum educit, par-  
 uum digitum à cæteris digitis in externum latus abducet. Deinde anterior  
 huius lateris sedes, aliqua ex parte læuis, modicèq; admodum in superficie si-  
 nuata cernitur, tendinibus cedens septimi & octauī musculorum pedem mo-  
 uentium, qui ad posteriorem externi malleoli sedem reflexi, secundum hanc  
 calcis regionem porriguntur. Cæterum calcis anteriorum partium, ea quæ  
 regione magni digiti habetur, & processus modo in internum calcis latus ex-  
 cedit, talo, quemadmodum antea diximus, articulatur, nulli interim alteri ossi  
 contigua. At pars minimo digito situ respondens, in anteriori sua facie læuis  
 est, & lubrica cartilagine incrustatur, depresso amploq; prominēs capite, quod  
 ossis tesserā imitantis sinui coarticulatur: qui similiter lubrica obductus car-  
 tilagine, superficietenus duntaxat insculpitur, ea articuli specie calci cōmissus,  
 quam planis ueluti superficiebus fieri dicimus.

*Ossis cym-  
 bam referentis  
 sinum.*

*Anterior ossis  
 sedes, & tres  
 ipsius plana su-  
 perficies.*

Nauculare os, posteriori sede admodum profundo, & transuersum ob-  
 longo, caputq; tali (uti suprā diximus) excipiente, donatur sinu: inde etiam à  
 cymbæ, seu scaphæ imagine, *σκαφοειδης* nuncupatum. Anterior ipsius sedes, lu-  
 brica quoq; cartilagine incrustatur, & tres admodum leuiter prominentes com-  
 monstrat superficies, tribus tarsi ossibus, quæ ipsi articulantur, paratas, adeoq;  
 modicè protuberantes, ut num sinus, num capita sint, penè diiudicare nequeas.  
 Harum superficierū intima, & interno pedis lateri proxima, reliquis duabus  
 amplior est: & insignius quàm illæ ideo prominet, quod tarsi os ipsi coarticu-  
 latum, maius & amplius sit, & profundius quoq; sinuetur alijs duobus tarsi os-  
 sibus, quæ reliquis duabus superficiebus committuntur. Leues has, adeoq; ob-  
 securè protuberantes superficies, dissectionū periti, à planarum cubi tesseræ ue  
 superficierum imagine, cubos uocāt, quum tria tarsi ossa cubis eius ossis quod  
 cymbā refert, coartari docent. Superior huius ossis sedes, gibba, & quodam-  
 modo rotulæ modo secundum transuersum orbicularis est, eam obtinens fi-  
 guram,

*Superior sedes.*

*r 11 musc.  
 tab. 7. aut  
 14. tab. 10.  
 do ex n. o.  
 q cōstituit.  
 s 2, 8, 9. fi-  
 gur. c.*

*t 2, 8 fi. d.  
 c. ac e sinu.  
 atam inai-  
 cat sedem.*

*u ultime li  
 bri 4 fig. d.  
 x ultime li  
 bri 4 fi. u.  
 y 14 musc.  
 tab. u.*

*z 14 tab.  
 s, n.*

*4 7, 8, 9. fi-  
 gur. R.  
 b 2, 8. fi. Y.  
 c 6 musc.  
 tab. x.*

*d 1, 7, 9. fi.  
 fig.*

*e 2, 9. fi. Z.  
 f 2 musc.  
 tab. v. &  
 14. tab. u.*

*g 1, 7, 9. fi-  
 gur. g.  
 h 6 musc.  
 tab. s. de-*

*in v.  
 i 6 tab. u.  
 k 7 fig. h.  
 l 7, 9. fig. i.*

*m 13 fig. x.*

*n 1, 2. fi. o.  
 o tota 10  
 p 11 fi. in  
 tegram*

*autē b cum  
 a, & d, e, f.  
 o 11 fig. h.*

*p 3, 4. fi. o.  
 q 10 fig. b.  
 m, n.*

*r 1, 2, 11, 13  
 fig. cha-  
 ract. 1, 2, 3.*

*s 11 fi. o. p.  
 t 10 fi. q. r.  
 u 11 fi. q.*

guram, quæ pedi hac in sede fuit optima, iniurijsq; ferendis pertinacior. Atque hæc sedes uniuersa non nihil aspera est, quò scilicet ligamenta educat, id os talo & tarfi ossibus connectentia. Inferior ossis cymbæ similis<sup>u</sup> sedes utuncq; sima & angusta uisitur, ut hac parte cavitatem pedi magnopere necessariā adaugeat. Verùm hæc ossis pars, superiori parte asperior ac inæqualior cernitur: quòd hinc ualidiora ligamenta, quàm ex superiori enasci debuerint. Præterea inferior hæc sedes iuxta internum ipsius latus, sinum obtinet, ad quem sexti pedem mouentis<sup>v</sup> muscoli tendo appositissimè reflectitur. Nauiculari itaque ossi, ut neq; etiam calci, neq; talo, in manu nullum proportionale os consultit. quæ autem adhuc in pede recedenda supersunt, manus partibus aliqua ex parte correspondent: cuiusmodi tarfi sunt ossa, brachialis ossibus conferenda.

Inferior.

Quibus pedis ossibus in manu nullum respondet.

TARSI. Proprie inproprie

Nunciat

Vocat autem Græcis *παρὸς*, quatuor pedis<sup>v</sup> ossium series: quorum tria nauiculari coarctantur, quartum uerò calci. quamuis interim Græci subinde tarfi nomen, quo etiam remorum in nauibus seriem, & palpebrarum cartilagine expriment, non his solum ossibus accommodent, uerùm uniuersam pedis superiorem partem eo nomine plerunq; intelligant: uti Galenus in libris de Administrandis sectionibus perpetuò facit, tendines, & uenas, & arterias, neruosq; secundum tarsum ferri scribens, quæ per pedis superiora exporriguntur, digitosq; accedunt. Latinorū quamplurimi hanc ossium struem plantam nuncupant: uerùm quando plantæ nomen latius patet, non ineptè tarfi nomine, dum aptius sese offerat, mihi utendum duxi. Tarfi igitur ad<sup>u</sup> brachiale constructionis proportio non est obscura: ex quatuor enim ossibus tarsus, ex duplicatis autem brachiale constituitur. Ex pluribus namq; & minoribus particulis apprehendendi organum componi debuit: ex grandioribus uerò, paucioribusq; ambulandi instrumentum. Tria tarfi ossium interiora, planis quodammodo<sup>b</sup> superficiebus nauiculari ossi coarctata, proprio carent nomine: at

Planta

Tarsi ad Brachiale Os

Tria tarfi ossia interiora.

Quartum os extremum os.

Nunciat

Cuneum os

Tali nomen

u 10 fig. g.  
r. 7. 11 fig. g.  
gur. g.x 10, 11 fig. g.  
gur. g.  
y 3 musc. tab. v.

z 1, 2, 13, 13 fig. charact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

a figuræ 15 cap. charact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

b 13 fig. f. b. u.

c 11 fig. x. d 7 fig. f.

e 12 fig. m. b. f 1 figuræ 111 b. v.

g 12, 13 fig. gur. y.

h 12, 13 fig. gur. d.

i 12, 13 fig. h. 2 fig. f. u.

k 13 fig. f. u. m. 1 musc. tab. v. x.

l 2 fig. u. m. 1 musc. tab. v. x.

m 1 musc. tab. v. x.

n 8 figuræ cup. d.

o Confer

in uide tarfi ossis primæ fig. cum 2.

cursus duodecimæ cum 12 figuræ ossibus.

Tarsi ossium formam et quantitatem nariam esse.

pollicem multo magis, quàm cetera, eminet. Ex medijs, quod intimo osi proximum est, breue occurrit, non ad eò antrosum, atq; id quod cubum referenti committitur, productū. Omnia simul iuncta, superiorem eorum superficiem gibbam arcuatamq; efformant, inferiorem uerò cauam, simam uē: quemadmodum & pedi ex usu esse, nemo non nouit. Duo media cunei accedunt imaginari. quā enim pedis superiora spectant, lata arcuataq; non nihil sunt: quā uerò plantam constituunt, non secus acuta uisuntur, quàm si cuneorum ritu inter intimum & extimum tarfi ossa ipsa iungerentur. Deinde tarfi os, osi cubo simili coarctatum, priuatim acutius & demissius in pedis inferiora porrigitur, quàm secundum tarfi os, intimo commissum, quod ipsius huc deducto processui tendo quinti pedem mouētis<sup>a</sup> musculi ualidissimè inseratur. Tarfi ossa, ubi lateribus inuicem committuntur, tota connexus amplitudine, læui lubricaq; cartilagine non obducuntur, sed duntaxat in posteriori laterum sede, osi cymbam referenti proxima: quippe in reliqua parte non nihil mutuo distant, cartilaginoforum ligamentorum interuentu inuicem copulata. Hæc omnia appendicibus destituuntur, & perinde ac nauiculare quoque os, substantia tali extruuntur.

p 3 fig. d.  
q 15 musc.  
tab. D. E.  
dein c. d.

St.  
FEDII hī-  
storia.

Tarsum subsequitur pedis<sup>r</sup> pars, quam Hippocrates à costarum in pectore fortassis serie sē<sup>o</sup>, alij uerò Græci *ωεδιον*, Latini plantam, & nonnulli pecten, uestigiumq; appellāt. Cæterum quum illæ Latinorum uoces in musculorum narratione, & in uasorum neruorumq; descriptionibus plurimum obscuritatis (si modò illis uteremur) adferrent: cōduxerit profectò, & hic quoq; à Græcis nomen mutare. est enim & planum (quo nomine alij *ωεδιον* uertunt) in hac significatione, qua pedis partem significat, penè inauditum. Pedion igitur, manus<sup>r</sup> postbrachiali respondet: uerum quinq; ossibus, non autem quatuor, ut postbrachiale, conformatur. In manu namq; pollicem reliquis digitis opponi decebat, atq; hac ratione primum ipsius os brachiali, articulo laxiore, quàm quatuor postbrachialis ossa, alligatur. quare etiam primum pollicis os digitis, non autem postbrachiali, Galenū secuti, ascripsimus, pollicis perinde ac cæteris digitis tria ossa tribuentes. Quinq; uerò pedij ossa, quæ tota substantia & sinu longo medullam complectente, postbrachialis ossibus respondent, tarfi ossibus planis, ijsq; læuibus superficiebus una serie cōmittuntur. Pes enim, quum ambulandi sit organum, stabilitatis securitas illi maximè conuenit, quæ in uno ordine locatis indiget, non solum quidem pedij, uerum etiam & digitorū ossibus. Pedij itaq; os, pollicis præpositum, intimo tarfi committitur ossi: quod indicem suffulcit, secundo: quod medium sustinet, tertio osi coarticulatur. duo autem reliqua, osi cubum referenti attextuntur: perinde ac octauo brachialis ossi ea postbrachialis ossa cōmitti proditum est, quibus anularis & medius innituntur. Et quemadmodū articuli, quo postbrachialis os, minimum digitum sustinens, brachiali necitur, externo lateri<sup>x</sup> ossiculum quoddam apponi diximus: ita etiam non rarè in pede<sup>r</sup> ossiculum uisitur, ad externum latus articuli positum, quo quintum pedij os cubiformi osi articulatur. Porro quemadmodum tarfi ossa non eadem linea anteriori parte finiunt, sic etiam pedij ossium aliud alio magis in posteriora porrigitur. Pedij ossa illic, ubi tarso committuntur, lateribus sibi proxima crassaq; sunt, & aliqua ex parte planis læuibusq; superficiebus inuicem coarctantur. Quā autem à tarso ad digitos abscedunt, tenuiora fiunt, atq; in illorum medio<sup>r</sup> interualla efformant, quibus<sup>a</sup> musculosa reponitur substantia, cuius auxilio primi digitorum articuli flectuntur. Atque ut pedij ossa illi substantiæ aptiorem sedem porrigant, non ad eò acuta tenuiaq;

Pedum quinq;  
ossibus consistere.

Pedij ad tar-  
sum coarti-  
culatio.

Pedij ossium  
interualla.

r 1 fig. l.  
11, 111, 1111,  
V. integra-  
rum uerò  
fig. h. h. ad  
d. e. f. g. ac  
h. i.

s 1, 2 fig.  
ca. 25 l. 11,  
111, 1111.

t Sedes in.  
tarso scri-  
tim nota-  
tur a. u. d.  
c. d.

u 2 fig. cap.  
25. charac.  
111, 1111,  
ad s.

x 1, 2 fig.  
cap. 25 N.  
y 1, 2 fig.

z 1, 2 fig.  
v. v.  
a 15 musc.  
tab. L.

superiori



Pedij ad digi-  
tos articulati.

superiori parte, atq; ea quæ terram spectant, uisuntur. Vbi autem digitis articu-  
lantur, omni ex parte postbrachialis<sup>b</sup> ossibus respondent, & appendice dona-  
ta, in unicuq; caput definunt, sinum primi digitorum ossis subiens. Pedij os,  
pollicis præpositum, quod cæterorū omnium crassissimū est, & caput magis  
quàm reliqua orbiculatum (ut pollex in latera magis quàm reliqui digiti mo-  
ueretur) possidet, ea parte qua tarso articulatur, in inferiori ipsius sede terræ  
contermina, processum exerit, cui septimus pedem mouentium<sup>e</sup> musculus  
inserirur. Et simili etiam occasione pedij os, minimum suffulciēs digitum, quā  
tarso articulatur, insignem commonstrat processum, in externum pedis latus  
excedentem, in quem octauus pedem mouentium<sup>e</sup> musculi tendo inseritur.

Pedij ossa, digiti subsequuntur, qui ex ternis<sup>b</sup> ossibus omnes ad eorum quæ  
in manu sunt, similitudinem extructis constant: pollice tantum excepto, qui  
inter alios duplici tantum<sup>k</sup> osse extruitur, ut anterior cavitatis pedis sedes fir-  
mius terræ innitatur. Cuiusmodi uerò pedis digitorum articulis, ossicula sefa  
mo semini comparata adlocētur, simul cum manus ossiculis iam antea recen-  
suimus, quòd eadem propemodum in istis pedum manuumq; sit ratio. Cæte-  
rū illis seclusis ossiculis, pedē à manu uno osse uinci superari uel manifestum  
est. hæc enim uigintiseptē efformatur ossibus: octo nimirum brachialis, qua-  
tuor postbrachialis, & quindecim digitorum. Pes autem uigintifex tantum do-  
natur ossibus: calce nimirū, talo, naviculari osse, quatuor tarsi ossibus, quinq;  
pedij, & quatuordecim digitorum. Atq; id Galeni nomine hīc addendū duxi,  
qui in secundo libro Commentariorum in Hippocratis librum de Fracturis  
(ubi is inquit, hominis pedem multis ac paruis ossibus non secus ac manum  
efformari) scribit, pedi non aliter quàm manui uigintiseptem adesse ossa: pa-  
rum mehercule perpendens, se bis cubum imitans os enumerare: aut præter  
id os, alia quatuor tarsi recensere. quemadmodum sanè facit eodem in libro,  
quum quatuor tarsi ossa cubum referenti ossi, & illi quod cymbæ asimilatur,  
articulari (sed parum profectò anatomicè) tradit. Cæterū nunc tempe-  
stium erit, ungues, & quæ adhuc reliquæ sunt, cartilagine recensere: si mo-  
dò omnia quæ corpus firmant, sustinentq;, hoc libro, uti institutum fuit, ab-  
soluenda ueniunt.

Pedem à manu  
uno osse, contra  
Calceni placu-  
tum, superari.

## DE VNGVIBVS. CAPVT XXXIIII.



Hic s duabus figuris unguem ita expressimus, quemadmodū conspici solet, quum  
à manu ad sceleti præparationem coctus, aut pede, diuelliur. Sic dextra quidem  
figura, internam unguis regionem, seu cauum ipsius denotat, altera interim un-  
guis gibbum ostendente. Cæterū A hic ungus sedes indicatur, ante confectio-  
nem apparens. B uerò sedes insignitur, quæ mollis est, nullibiq; detegitur, ac uelut  
radix unguis censenda uenit.



ANVVM pedumq; digiti unguibus decorātur, ut ipsis  
firmamētū uice sint. Digiti enim suis partibus carneis, qui-  
bus in extremo donantur, mollia duntaxat corpora appre-  
hendunt. Dura autem, & propter hoc carnis naturam pel-  
lencia, uiolenterq; à se cogentia, digiti sine unguium admi-  
niculo nequeunt amplecti. Ipsorum enim caro, quam pos-  
tea ueluti duriusculā quandam adipem cuti substratam  
esse docebimus, tunc reflectitur, subuertiturq;, ob id firmamento indigens.  
Quinetiam pleraq; dein commoda ex unguibus homini accedunt, si quando  
radere

Cur digiti un-  
guibus donati.

radere quid, aut scalpere, aut uellicare, aut exoriare, aut euellere oporteat. Summus rerum Opifex iustissimè unguium (qui & munimenta & propugnacula digitorum censentur) duritiem effinxit. Si enim duriores quàm nunc sunt, instar osis cuiusdam procrearentur, ita quidem ad apprehendendum magis essent idonei, ut qui ne minimum reflecti declinariq; possent: at rumperentur promptissimè, non secus quàm alia, quæ dura fragiliq; constant temperie. Itaque securitati simul & robori providens, illos mediocriter dueros extruxit: ut neq; usui, cuius gratia creati sunt, quicquam incommodaret: neque ipsi (quòd sua mollitie extrinsecus incidentium uim, cartilaginum ritu, exolvere possunt) leui quaq; occasione afficiantur. Ob eandem hanc causam gibba constant superficie, quòd hac figura iniurijs resistendis melius comparentur. Quò minus uerò suspensi uacillent, ligamento quodam extremi digitorum osis iuxta suum articulum radici, eorum superiori termino colligantur. Quoniam autem carni cutiq; illos connasci operæ precium fuit, hæc extrinsecus uniuersæ unguium radici circundatur, illa interius usque quaque ipsis subnascitur. In unguium radicem, non modò arteriam, uenamq; sed etiam neruum porrigi, Galenus attestatur: ipsosq; ex his sensum, uitam & alimentum, aliarum partium modo, assumere scribit. Scio quidem, non solum duos<sup>a</sup> nervulos ad unguium usque radicem ferri, sed eisdem cum<sup>b</sup> uenis sub unguibus quoq; ad digiti summum reperire. unguis autem sensus omnis interim expertes esse arbitror. Ac proinde non leuiter illorum, qui unguis ex osis, nerui, cutis (quidam & carnis addunt) concretionem gigni censent, sententiæ accedo. Quòd uerò uenæ, arteriæ & nerui, quemadmodum in hortis alueoli, in unguibus non dispensentur, uel hinc constat, quòd pilorum modo ab radice procedentes augeantur. Satiùs enim erat, & hos pilorum ritu semper renouari, atque quum indies atterantur, nunquam non incrementum admittere, quod potius in longum, quàm latum & profundum assumunt.

Unguium natura esse iustam.

Unguium nexu.

Lib. 2 de Animi diff. 1.

a manus a figure ca. 11 lib. 4. b manus si gtra cap. 6 lib. 3.

### DE PALPEBRARVM CARTILAGINIBUS. Caput xxxv.



Hæc figura superioris inferiorisq; palpebra cartilaginem à reliquis partibus liberam delineauimus.



TRIQUE palpebræ, tam inferiori, quàm superiori, una contigit cartilago, ut cunq; mollis & longa: in palpebrarumq; extremo, quæ illæ inuicem conniunt, inter cutem & membranulam palpebras intus succingentem, reposita. Huic cartilagini, palpebrarum pili (quos cilia uocant) infinguntur, in illaq; tanquam in durius quoddam solum, inserti eriguntur. Ideo enim cartilagine hæ (quas ab illa pilorum serie, remorumq; in longis nauibus, seu galeris, similitudine, *ταρσοειδους* uocamus) potissimum creantur, ut pilos illos erectos, neque cæterorum pilorum modo flaccidos dependentesq; contineant. Dein superior etiam creatur, ut musculorum suam palpebram mouentium implantationi, & opportuno palpebræ motui subseruiat: quemadmodum in secundo libro, eorum musculorum naturam explicantes, non obiter docebimus.

a fig. cap. 10 lib. 2 A, b, C, D, E, ac 3 musc. tab. C, D.

## DE AVRIS CARTILAGINE.

## Caput xxxvi.

*Q*UONIAM aures cartilago à cute, qua obducitur, exquisitè libera, auris totius formam (ablata interim eius pinnula) exprimit, illam hic non delineauimus.



**Q**UIS potissimum aures in excipiendis aeris conuolutionibus gyrisq; usus censeatur, quibusq; nominibus aures fedes donentur, in auditus organi constructionis sermone, libro septimo exequendum est. Hic autem obiter aures recensenda uenit cartilago, quæ auris formam referens, in hoc formatur, ut cute uestita, aures corpus instar uanni constituat, idemq; comòdè sustineat, & erectum seruet.

Est autem hæc cartilago mollis & tenuis, tanto semper à capitis ossè uersus aures extrema euadēs mollior, quanto aures orbiculo propius accedit, & quo minus sustinere aliquid debet. Ac proinde etiam in aures pinnula, huius cartilaginis nulla exporrigitur portio, quòd scilicet hanc propendentē, neq; erigi neq; suffulciri oporteat. Ad temporis igitur os hæc cartilago durior sentitur, & ut firmiori radice hæreat, crassior. enascitur enim in orbiculo<sup>a</sup> foraminis auditus meatui in temporis ossè cælati: cuius circūferentia ideo exasperatur, ut promptius aures cartilaginem educat. Quamobrem uerò Natura ex huiusmodi cartilagine aurem constituerit, non uerò osseam aliquam substantiam ipsi indiderit, in secundo Capite executus sum: quum Naturam tanta prouidentia cartilaginis temperiem finxisse dicerē, ut hæc ossis modo non nulla sustineat comòdè: & interim adeò mollis sit, ut occurrentium impetu non rumpatur, sed cedendo leuiter eum exoluat: atq; ita extremas partes iniurijs minus expositas, quàm si ossæ essent, reddat.

## DE NASI CARTILAGINIBVS.

## Caput xxxvii.

*Q*UANTO NAM nasi cartilagine tactu propemodum ante sectionem debuit dignoscantur, nihilominus tamen quare musculorum tabula nasus has literas *K* & *L* insignitur, utcumq; proponit.



**R**ERVM Opificem, nasi terminum extremumq; cartilaginibus eadem ratione extruxisse, qua aures cartilaginem paulo antè procreatam diximus, quadrupedum nasi extremum ferè comprobatur: quod ideo minori amplitudine, quàm hominis nasi terminus cartilagineum existit, quòd non æquè ac hominis nasus ex reliqua faciei superficie extuberat. Ab inferiori itaq; nasi ossium<sup>a</sup> sede, qua hæc aspecta & latiora, quàm superiori<sup>b</sup> sede existunt, duæ enascuntur cartilagine, quæ deorsum in anteriora exporrectæ, inuicemq; coniunctæ, sensim molliores euadunt: ac in nasi extremo, ueluti in cartilagineum ligamentum degenerantes, totam anteriorem nasi regionem constituunt, quæ à nasi ossium inferiori sede ad nasi terminum apicemq; pertinet. Ab ossè<sup>c</sup> septo, narium foramina dirimente, quod octauum Capitis<sup>d</sup> ossis partem esse, supra conuenuimus, alia enascitur cartilago, quæ à tota anteriori septi illius sede antorsum procedens, internæ duarum primarum cartilaginum regioni secundum ipsarum longitudinem adnascitur, tanto magis ligamenti naturæ compos molliq; quo nasi extremo fit uicinior. Hæc pari ratione in ea nasi parte, quæ ueluti

1 2 ex faciei

a i. fi. ca. 9  
ab f. ad e.  
b eadē fig.  
c Z ad Y.


e eiusdem  
fig. O.  
d e. fi. cap.  
6 A, B, A.



ex faciei planicie porrigitur; nafi foramina interdiuidit, qua offeū illud septum ipsa<sup>e</sup> foramina ibidem disiungit, ubi super palati regionē, à naso ad fauces usq; ducuntur. His tribus nafi cartilaginibus, aliæ duæ, utrinque nimirum singulæ accedunt, quæ magis adhuc alijs cartilaginibus ligamentorum natura participant, & orbiculatim singulæ unum nafi foramen cōstituunt. Cartilagine hæ internis suis lateribus inuicem colligantur, & aliarum nafi cartilaginum extrema integunt, solæq; motu pollent uoluntario, cuius ope sursum deorsumq; & introrsum extrorsumq; uelluntur, proprijs in hoc donatæ<sup>f</sup> musculis. Harum cartilaginū latiores mollioresq; partes in nafi lateribus, uersus posteriora, consistunt, ac nafi alē nuncupantur: quod quasi alarum modo nares occludant, reserentq;, homini ita inter respirandum haud uulgarem usum præbentes.

DE ASPERAE ARTERIAE CARTILAGINIBUS. Caput xxxviii.

PRIMA TRIGESIMO OCTAui Capitis figura, totius asperae arteriae, ab omnibus partibus liberae, anteriorem faciem exprimens.



SECUNDA FIGURA, ASPERA arteriae caudicis tantum, posterior facies delineatur. ab re enim fuisset, huic etiam figurae, ramorum in pulmonis substantiā pertinentium seriem appingere, quum illam prima figura abunde oculis subijciat.

TERTIA. IIII. V. VI. VII. VIII.





TERTIAE ET RELIQUARVM DVODECIM  
hic seriatim positarum figurarum, & earundem  
characterum Index.

*H A R V M* figurarum prima, quæ tertia inscribitur, primam laryngis cartilagine[m] ex dextro latere expressam ostendit. Figura autem, quæ quarta ordine est, eiusdem cartilaginis internam seu posteriorem faciem proponit. Quinta, eadem cartilago externa seu anteriori facie delineatur. Sexta, secundæ laryngis cartilaginis anteriorem comonstrat faciem. Septima, secundam laryngis cartilagine[m] ex dextro latere expressam continet. Octava, secundam laryngis cartilagine[m] posteriori ex facie depictam offert. Nona, laryngis tertiæ cartilago ex dextro latere delineatur. Decima, tertiæ cartilaginis anterior sedes occurrit. Undecima, eandem cartilagine[m] posteriori facie oculis subiicit. Duodecima, inferiori laryngis operculi sedē ostendit, quæ id laryngis cavitatem spectat. Decimatercia, superiorē laryngis operculi sedem continet, quæ palatū respicit. Decimaquarta, unam asperæ arteriæ trunci cartilagine[m], C modo extructam, anteriori externæ ne facie videntā obijciit. Decimaquinta, eandem cartilagine[m] posteriori facie proponit, quæ internam asperæ arteriæ amplitudinem spectat.

*A, B* 3, 4, 5 Duo elatiores primæ cartilaginis processus.

*C, D* 3, 4, 5 Duo humiliores primæ cartilaginis processus.

*E, F* in 8, in 7 uerō duntaxat *E*. Secundæ cartilaginis sedes, quibus inferiores primæ cartilaginis processus coalescunt.

*G, H* 3, 4, 5 Hac sedē prima cartilago artissimā brevissimāq[ue] iussit, subinde lineam ostendens, quæ dextram cartilaginis partem à sinistra in partem duarum cartilaginum dirimit.

*I* 6, 7 His sedibus secundæ cartilaginis regio spectatur, laryngis internam amplitudinem respiciens. Reliquis autem sedibus, quæ his tribus figuris conspiciuntur, secundæ cartilago exteriorē laryngis regione[m] seu amplitudinē constituit.

*K, L* 6, 7 Inferior secundæ cartilaginis sedes, perfectum efformans circulum. ac *K* quidem huius partis anteriorem notat regionem. *L* uerō posteriorē in inferioris huius sedis regionem indicat, deorsum processum insit ad eductam, ac in octava etiam figura *L* insignitam.

*M* 7, 8 Linea, spinæ modo in posteriori secundæ cartilaginis sedē protruberans.

*N, O* 8 Sinus in posteriori secundæ cartilaginis sedē, ad lineam illius *N* notatæ latera incipit.

*P, Q* 6, 7, 8 Duo secundæ cartilaginis tubercula, seu capita, sinus tertiæ cartilaginis subeuntia.

*R, S* 9, 10, 11 Duæ tertiæ cartilaginis partes.

*T* 9, 10, 11 Hac tertiæ cartilaginis regio uacua est, ac duntaxat membranis ligamentis occupatur.

*U, X* 9, 10, 11 Tertiæ cartilaginis sedes, quibus secundæ cartilagini articulat.

*Y, Z* 9, 10 Tertiæ cartilaginis processus, qui linguam laryngis efformant.

*Z* 9, 10, 11 Tertiæ cartilaginis regio, maiorem partem assimilata, qua manus lauaturis aquam affundimus.

*a* 12, 13 Laryngis operculi basis, quæ primæ laryngis cartilagini continuatur.

*b* 12, 13 Apex, seu in posteriora avorsusq[ue] uersus dorsum eminens laryngis operculi regio. Præter quindecim figuras modo explicatas, huc cū primis faciunt figuræ Capiti uicissim primo lib[ro] secundi præponēde, quibus laryngis musculus explicabitur. inter cæteris autē, illas opportune non minus quàm si hic locaretur, inspicies, quæ illarū figurarū uires postremæ habebunt, quib[us] laryngis lingue seu rima imago, quàm fieri potuit accuratissimè, delineatur.



**U** I C E T sextus liber, cordi respirationisq[ue] organis dedicandus, asperæ arteriæ naturam diffuse pertractabit, in præsentia tamen ipsius cartilagine[m] explicandæ ueniunt, ne quicquam ossium cartilagineumq[ue] hic non expressum, in musculorum enarratione nos remoretur. In sexto igitur libro docebinus, asperam arteriam à faucibus in thoracis cavitatem deduci, & multiplici ramorū sobole in pulmonem diffundi, ut aerem illi reddat, & eundē rursus ab ipso educat. Neq[ue] solum hanc respirationis instrumentum ponemus, uerū etiam principalissimum ipsam uocis esse organum attestabimur, exactè tum suæ substantiæ rationem pertracturi. Cōstat enim partim cartilaginibus, partim membranis uinculis,

*ubi asperæ arteriæ natura pertractabitur.*

a folia 1  
2 fig. cap. 9  
lib. 4 H. 1.  
K. L. M.  
N.

PRIMA laryngis cartilago.

simplicibusq; membranis, seu tunicis, ac demum musculis ipsius capiti peculiaribus. Ac caput quidem hoc asperæ arteriæ (quod laryngæ potius quam guttur mihi appellandum putauerim) primum tribus cõstituitur cartilaginibus: quarum prima, maxima amplissimaq; & anterior est, foris quidem gibba, intus autem caua, scuto quodammodo similis, non rotundo, sed prælongo, quali ueteres in prælijs usos, & Turcarum aliquot adhuc, in nauibus præsertim, uti cernimus. Atq; hanc ob causam dissectionum periti eam *bugeoddy* (quasi scutiformem, aut scuto similem diceremus) uocarunt. Hæc in homine superiori sede amplior, quam inferiori conspicitur: quod tamen ad imaginis spectat speciem, ipsa ambabus sedibus sibi respondet. Suprà enim infraq; binos educit processus, utrinq; in lateribus singulos. ac horum quidem duo superiores procerius inferioribus educti, membraneis uinculis, ossis u referentis humilioribus lateribus alligantur. Inferiores autem, lateribus secundæ cartilaginis uersus posteriorem ipsius sedem uniuntur. Scutiformis hæc cartilago, quæ uiris antrorsum magis quam mulieribus prominet, tactuiq; magis exponitur, subinde gemina, idq; potissimum in uiris obseruatur. In ipsius enim medio, ubi breuissima est, maximeq; antrorsum extuberat, secundum suam lōgitudinem crebrò linea ducitur, quæ ad amussim à membranulis repurgata, duas cartilaginis partes mutuo commissas etiam ante sectionem fuisse arguit. Atq; id sanè hominibus peculiare obtigit. boum enim cartilago simplex est, & plurimum ab hominis cartilagine forma uariat: quæ sedulo ab architectis spectari uelim. mirum namq; est, quàm scitè boum scutiformis cartilago propugnaculi formæ accedat, quamq; affabrè id speculatoribus in ipsius elatori sede (ob priuatos ipsi incisios sinus) accommodum sit, & quàm aptè bombardarum ictibus retortuendis cõparetur: haud secus profectò, quàm si machina quædam effet portatilis, quæ duobus processibus suis humilioribus, tanquam duobus palis terræ infigi, ac exercitui præponi possit. Secunda cartilago minor est prima, & maior tertia, maximaq; sui portione in posterioribus laryngis sedibus reponitur, quæ stomachus deorsum à faucibus fertur. Quantū enim scutiformis cartilago à perfecta circuli figura deficit, hoc ipsa superiori posterioriq; eius parte supplet. Ima autem ipsius sede perfectum conficit circulum, cuius anteriorem partem sub scutiformis cartilaginis radice, tactu in antica laryngis regione percipimus. Interna huius cartilaginis amplitudo exactè leuis est: posterior autem ipsius sedes, stomachum spectans, lōga extuberat linea, secundum cartilaginis longitudinem, spinæ quasi modo exporrecta. Hæc duos præsentis cartilaginis sinus dirimit, magnaq; ex parte constituit, in quibus duo figuntur musculi, recto ductu à secunda cartilagine in tertiam inserti. Superior huius cartilaginis sedes, qua posteriorem laryngis regionem efformat, in duo definit tubercula oblonga, & utrinq; singula, quæ tertiæ cartilaginis sinibus inarticulari mox audies. Secunda cartilago primæ eo modo committitur, quem supra exposui, quum humiliores primæ cartilaginis processus ipsi uniri dicebā. Ut uerò firmior eorum processuum fieret connexus, secunda cartilago inibi, qua processus ipsi coalescūt, modicè extuberat, crassiorq; est: & in hac utrinq; protuberante sede, sinus uisitur, sui lateris ualidissimè excipiens. Inferior cartilaginis secundæ pars, ubi laryngis posteriora cõstituit, non nihil tenuis cernitur, deorsum magis, quàm reliqua ipsius inferioris partis sedes, porrecta: idq; ut musculi ex remotiori sede initium ducerent, qui rectà per cartilaginis secundæ longitudinem expansi, tertiæ cartilagini inseruntur. Huic cartilagini nullum nomen est inditum: ac idcirco peculiari quodammodo nomine, Innominata

SECUNDA laryngis cartilago.

b tota, 4.  
s fig. & fi  
gur. u. ca.  
21 lib. 2 g  
& b.

c 3, 4, 5 fi.  
A, B.  
d cartilagin  
fig. C, D.  
e 2, 2 fi. ca.  
15 E, F.  
f 2, 3 fi. ca.  
21 lib. 2 C.  
g 8 fi. E, F.  
h 7 fi. E.  
b 2, 3 fi.  
gur. G, H.

i tota 6, 7.  
8 fig. & fi  
gur. u. ca.  
21 lib. 2 i  
dein h.  
k 2, 3, 5 fi.  
cap. 21 lib.  
2 H. & 14.  
15 fig. lib. 5  
A, B, C, D.  
l 6, 7 fig.  
K, L.  
m 6 fig. I.  
n 8 fig. L.  
M. 7 fi. M.  
o 8 fig. N, O.  
p 6, 7 fig. cap. 21 lib. 2 P.  
q 6, 7, 8 fi  
gur. P, Q.  
r 10 fig. V, X.

s 8 fi. E, F.  
t 6, 7, 8 fi.  
gur. L.

u 6 fi. cap.  
21 lib. 2 P.



nominata uocari potest. Si quis tamen sedulo eius effigiem inspexerit, atq; alicuius rei formæ illâ conferre, tandemq; hinc nomē indere uoluerit, uix aliam ipsi conformiorem adinueniet, illo Turcarum anulo, quem sagittâtes dextro imponunt pollici, ut eius anuli beneficio arcus neruū robustius trahât. Is enim anulus illa parte, qua pollicis interiora respicit, anteriori secundæ cartilaginis sedi similis uisitur: qua uerò externam pollicis sedem tegit, posteriori secundæ cartilaginis regioni utcunq; cōuenit.

\* Tertiā laryngis cartilaginem Græci ἀνύττωσαν & ἀνύττωσεῖδῃ uocant, quòd quum integra adhuc est, & membrana asperam arteriam intus succingente adhuc obducitur, illi ollarum parti similima sit, qua aquam manus lauaturis affundimus, quamq; Græci ἀνύττωσαν, & Latīnorum aliqui gutturnium appellarunt. Illi namq; ollarū oris sedi aptius congruit, quàm ligneis illis & longis conchis, quibus nautas uela, olitores autē hortos irrigare cōspicimus. siquidem & eiusmodi obliquatis uasculis Græci hanc cartilaginem contulisse uidentur, non quidem toti uasculo, sed ipsius mucroni. Vtcunq; sit, tertiā laryngis cartilaginem unicam simplicemq; omnes describere: quum interim membranis suis liberata, perpetuò duabus constitutatur cartilaginibus, ligamentorum & laryngem succingentis membranę duntaxat beneficio, inuicem admodum laxè commissis. Ac harum una quidem dextro secundæ cartilaginis lateri, altera uerò sinistro innititur, sinum læuem & altè satis cælatum obtinens, quo secundæ cartilaginis tuberculum excipit: itaq; articulatur, ut ad internam laryngis amplitudinem, & cursus extra illam moueri possit, hæcq; cæteris laryngis cartilaginibus maximè mobilis existat.

Vtriq; cartilaginis basis ampla est, & anteriori sede in longum processum finit, in interiora laryngis exprorectū. Superiores uerò harum cartilaginu partes sensim à basi inuicem dehiscences, ac dein tenuiores, mollioresq; & adiposæ redditæ, mutuò uniuntur: & dextræ cartilaginis superior pars, sinistræ cartilaginis parti cōiuncta, eam laryngis sedem extruit, quæ illi uasorum parti congruit, qua aquam manibus affundi, paulo antè commemorauimus. Hæc laryngis sedes adeò mollis flexilisq; est, ut uomentibus in internam laryngis amplitudinem antrosum reclinetur, asperamq; arteriam adeò exquisitè integat, ut ne minimum quidem ex uomitu arteriæ ipsi illabatur. Cæterum etsi tertiā hæc cartilago gemina sit, duabusq; meritò sui officij causa extruat cartilaginibus, ob id tamen eam duarum cartilaginum loco non enumerabimus: sed unius tantum, aliorum Anatomicorum more, nobis habebitur, quo minus illorum placita (etsi cartilagine interim numerauerint potius, quàm describe-

rint) plus æquo turbare uidear. His tribus laryngis cartilaginibus, alia quædam accedit, quæ laryngis perelegans efficitur operculū, accuratè prohibens, ne quid cibi aut potus in illam defluat. Enascitur autem hoc laryngis operculum ampla & antrosum curuata basi, ab interiori scutiformis cartilaginis regione, iuxta partem ipsius elatiorem. Hinc introsum procedēs, trianguli, aut ut Hippocrates pulchrè docuit, hederæ folij imaginem exprimit: cuius basim operculi à scutiformi cartilagine exortus, ipsius uel cum ea cartilagine connexus efformat. Verticem uerò ea pars constituit, quæ introsum ueluti ad stomachi regionem producit. Corpus hoc, quæ palatum respicit, gibbum est, ac mollius: quæ autem laryngi innititur, cauum, simumq; ac multo quàm superiori parte durius. In extremo autem ipsius, quo stomachū spectat, insigniter molle est: pinguiq; obductum membrana, ligamenti quodammodo naturam refert, superiori q; tertiæ cartilaginis sedi substantia cōuenit. quæ uerò scutiformi committitur cartilagini, etiam multa abundat adipe: neq; inibi adeò

Anuli, quo  
Turce sagittan  
tes utuntur,  
effigies.



TERTIA  
laryngis carti-  
lago.

LARYN-  
gis operculum.

Lib. 4. de  
Morbiis.

Laryngis lingu-  
la, seu rimæ, &  
præcipuum uo-  
cis organum.

durum, atq; in suo medio, cernitur. Pleriq; corpus hoc, præcipuum uocis orga-  
nū esse putauerunt, id temerè γλωττιδα & επιγλωττιδα uocitātes: quum tamen  
hæc nomina penitus pugnantes, diuersasq; prorsus partes ueteribus significēt.  
Γλωττις enim laryngis rimam indicat, quam duo terciæ cartilaginis<sup>k</sup> processus,  
in media laryngis cavitāte pingui membrana obducti, constituunt, & quam  
præcipuum uocis esse organum, suo loco demonstrabimus. Veteres namque  
cuiusmodi rimam γλωττιδα, seu lingulam uocarunt, ab ea lingularum similitudi-  
ne, quas ex duabus arundinum laminis compactas, tibijs accommodamus. Επι-  
γλωττις autem nuncupatur laryngis operculū, dictæ iam laryngis lingulæ im-  
positum, & ne quid inter edendū in eam decidat, cauens. Quod uerò hæc no-  
stri seculi medicos lateant, non ipsi tantum in causā sunt, nihil præter autorum  
sensā, citra omnē dissectionis usum, sectantes: uerū & Celsus etiam ista per-  
peram (uti sanè quæ ad Anatomen spectant permulta) intelligens, laryngis  
operculum, lingulā appellauit, non expendens, id Græcis επιγλωττιδα fuisse ap-  
pellatum, quod laryngis rimæ, quam lingulæ fistularum asinilamus, incumbat.  
Quinetiam Celsi (qui forsan laryngis operculum, humanæ linguæ imagi-  
ni cōtulit) errore Theodorus Gaza delusus, in Aristotele επιγλωττιδα lingulam  
uerit, quum interim Aristoteles laryngis intelligat operculū. Vt modò præ-  
teream, quoties apud Galenum, tum interpretū, tum etiam græci exemplaris  
scriptorū uitio, γλωττις pro επιγλωττις, ac rursus diuerso ordine, legatur. Verū  
hæc latius suo loco exequar. hic namq; tantum de laryngis cartilaginibus ser-  
monem instituisse fat est, quanto ad musculorum in secundo libro tractatione  
indigemus. Ac proinde etiam<sup>m</sup> cartilagine, quæ C nostri formæ magna  
ex parte conueniunt, & mox sub larynge per uniuersam asperæ arteriæ caudi-  
cem, & omnes ipsius in pulmonis substantia digestos ramos, seriatim occur-  
runt, unā cum cæteris ad asperæ arteriæ historiam pertinentibus, in sexto li-  
bro pertractabuntur.

Lib. 2. de Par-  
tibus anima-  
lium, cap. 3.  
Præcipue in 8  
lib. de usu  
part.

Reliquæ carti-  
lagines asperæ  
arteriæ, C. fis-  
mies.

i 11. fig. 2p.  
21. lib. 2. c.  
deu 12, 13  
fig. d.  
h. 9, 10. fig.  
Y, X.  
l. C. 8. fig. L.  
cum c. fig.  
11. cap. 21.  
lib. 2.

in tole 14,  
15. fig. 17.  
sub laryn-  
ge in aspe-  
re arteriæ  
caudice ex  
ramis 1. et  
2. figuris.

# DE OSSIVM CARTILAGINVM QVE numero. Caput xxxix.

Ossium nu-  
merus.



VANDO QVIDEM parum dubito, plerosq; absoluta nunc singulorum ossium & cartilaginum historia, hic alicubi illorum numerum, perinde ac in nostris scholis stu-  
diosi solent, à me desideraturos: modò ossa & cartilagine obiter sic recensere, ut qui nam certo cōprehendi queant  
numero, quisq; promptè percipiat. In prouectæ igitur æta-  
tis homine, cui appendices iam suis ossibus plenè coalue-  
runt, licebit ossa hunc ferè in modum numerare. Caluariæ uiginti sunt ossa,  
octo nimirum capitis uocata, & maxillæ superioris duodecim: ita tamen, ut  
frontis os unicum hic duntaxat statuamus, & dein iugalia & lapidea priuatim  
non enumeremus, quum quorundam illorum uiginti ossium partes sedes ue-  
tantum sint, propriasq; circūscriptione destituantur. Auditus organi ossicula  
quatuor sunt, duo scilicet ad singulas aures. Dentes ut plurimum censentur tri-  
gintaduo. Maxillæ inferioris os unicum. Ossis u referētis ossicula, sunt ferè un-  
decim, cervicis uertebrae septem, thoracis duodecim, lumborum quinq; ossa.  
facri ossis sex, ossicula coccygis ossis quatuor: costæ uiginti quatuor. Pectoris  
ossis tria enumerauimus ossa, alijs autem septena recensentur. sed agè, hoc ca-  
talogo tria tantum sint: & aliàs, quotquot ex tuo arbitratu uisum fuerit. Sca-  
pulæ duæ, totidem clauiculæ, humeri duo, ulnæ duæ, radij duo: brachialium  
ossa

ossa sedecim, utriusq; scilicet manus octo: postbrachialium item ossa octo, in utraq; nimirum manu quatuor. digitorū ossa triginta, utriusq; scilicet manus quindecim. Sesamina ossicula in singulis manibus ut minimū occurrunt duodecim. ac proinde iam uiginti quatuor illa in manibus statuamus. Ossa sacri ossis lateribus commissā, duo, utrinq; nimirum unum. femora duo. in utroq; poplite duo sesamina ossicula. duo tibiæ ossa. fibulæ duæ, patellæ duæ, calces duæ, tali duo, naucularia ossa duo: tarsi ossa in utroq; pede quatuor, pedij ossa in utroq; pede quinq;, digitorū ossa in utroq; pede quatuordecim: pedis unius sesamina ossicula uel minimo numero sunt duodecim. Ac proinde si hæc ossa in unum numerum reijcies, uniuerſa erunt (si rectè addo) trecēta & septem: quibus si pectoris ossa quatuor adhuc adijci uelles, & duo maxillæ inferioris ossa statueres, & cordis deniq; cartilagineā substantiam in ossium classe unius ossis loco haberes, trecēta & tredecim cōsurgent. Porro si priuatim omnes insuper appēdices, eo quod ossa sint, propria omnino in pueris saltem circumscriptione terminata, enumerare lubebit, facile dictum nuper numerū semel, ac rursus dimidio duplicabis. quod uel hinc colliges, si uertebras, scapulas, femora, tibiæ ossa, & alia, quæ multis appendicibus donantur, in memoriam reuocaueris: ac dein etiam recorderis, unam subinde appendicē pluribus quoq; efformatam esse partibus: uti in illa euenit, quæ superiori scapulæ obtingit processui. Rursus, si ossa, ut in pueris uisuntur, subduxeris, Dij boni, quantū ossium acerum cumulabis? quum occipitis os ferè tribus, & multæ uertebræ, non habita appendicum ratione, duobus, plurimæ autem tribus constent ossibus: quumq; pectoris os in illis quoq; pluribus, quàm in ijs qui iustum attingere incrementum, ossibus cōpingatur: & ossa, quæ sacro coarctantur, etiam singula tribus fabricentur ossibus. adeo ut cuiq; suo uoto numerū ossium confingere sit integrum. Quanquam in certo cartilaginum numero diffiniendo, plus adhuc sit operæ, quum tam reperiantur uariæ, ac non in omnibus ætatibus eadem. Nihilominus, ut num quauis tandem ratione in numerū redigi possint, expendas, eæ primū recenscantur, quæ ossibus sunt prorsus continuæ: ut utriusq; auris cartilago, ex temporis osse pronata: duæ nasi, à duobus nasi ossibus exortæ: ea quæ à narium septo pronascens, ad nasum quoq; refertur: uiginti quatuor costarū cartilagine: eæ in quas totius dorsi ossium spine, & mul ti eorundem transuersi processus finiunt: ea in quam pectoris os exacuitur: basis utriusque scapulæ cartilago: ea quæ ossis coccygis mucroni obtingit: exiguæ, quæ ultimis digitorum manus & pedis obtigerunt ossibus. Dein omnes læues & lubricæ cartilagine, quibus ossa ad articulorum fabricam incrustantur, quæq; non secus quàm articulorum superficies, sunt quàm plurimæ, ac trecentorum & quinq; ossium numerum longè excedunt. Insuper quæ in appendicum cum suis ossibus cōnexu spectantur, quæ etiam dictum ossium numerum superant, præter eas quæ ossium quorundam partes mutuo in pueris priuatim committunt. Adduntur his, quæ in sacri ossis ossium mutuo contextu interueniunt, ea quæ pubis ossa inuicem necit. Item illæ, quæ ligamenti natura participantes, etiam ossibus sunt continuæ: ut eæ quibus ossis u referentis ossicula compinguntur, eæ quæ uertebrarum interueniunt corpora, eæ quæ sunt inter tria pectoris ossa: eæ quæ occurrūt inter sacrum os, & ossa ipsi commissā: eæ quæ ossicula coccygis ossis mutuo iungunt. Cæterum earum quæ ossibus non sunt continuæ, utriusq; oculi statuuntur duæ: quarum una in superiori, altera in humiliori consistit ipsius palpebra. alarum nasi duæ. in larynge tres præcipuæ: quarū prima subinde, tertia autem perpetuò reperitur gemina.

*Cartilagina  
nasoetia.*

*laryngis*



laryngis operculum: cartilagine C imaginem exprimentes, quæ in asperæ arteriæ caudice, & ipsius in pulmonem digestis ramis sunt innumeræ: cartilaginea cordis basis substantia. Postremò, quæ in articulis sunt liberæ, ac ossibus non prorsus continuæ: quales nonnunquàm in duobus humilioribus primæ uer-tebræ ad secundam nexibus duæ occurrunt, & aliquando in utriusq; lateris humeri ad scapulam articulo una. semper autem in articulis maxillæ inferioris ad temporum ossa, duæ: in clavicularum cum pectoris osse, & dein cum superioribus scapularum processibus, quatuor: in utroq; genu duæ. quæ uerò inter ulnam & brachiale quodammodo spectatur libera, radio est continua. Quum itaq; cartilaginum tam multiplex sit ratio, non facillè ex cuiusq; sententia ipsarum numerum diffinire possim. ac proinde iam tempestiuum erit, modum subiicere, quo ossa & cartilagine ad disciplinam parentur, aut per Anatomem discantur: ad eam uidelicet methodū, qua semper post partiū descriptionē, illarum secandi artificii (prout id suo loco aptius fieri posse putauero) subiiciam.

## QVO ARTIFICIO HVMANI CORPORIS

ossa & cartilagine inspectioni apparentur.

Caput XL.



*Ossium in calce  
maceradurum,  
ac dein in flu-  
mine emundan-  
dorum ratio.*

ONS VEVERVNT medici, Hippocraticæ arti dignè incumbētes, non mediocri labore ossa, quæ ad disciplinam seruantur, apparare, siue ea inuicem iuncta, siue singula separatim essent inspecturi. Solent enim suspensum, uel aliàs mortuum cadauer, magna ex parte primum carnibus liberare: & uiscera, nullo soluto corporis articulo, exsecare. postea oblongæ arcæ ita dissectum corpus immittebāt, hanc calce opplentes, ac nonnihil aquæ dein aspergentes. Deinceps ubi arcæ ad hunc modum occiduo obseruassent, eam undiq; angustis foraminibus perforatam, rapido illigabant fluuio, ut calx unā cum marcescentibus iam carniū reliquijs, temporis successu deflueret, ac undiq; ab ossibus abscederet. Post dies aliquot, exemptum cadauer passim cultrorum beneficio emundabatur, mente adhibita, ne aliquis ossium connexus in eo opere dissolueretur, ligamentaq; ossa colligantia (quorum scilicet interuentu in posterum adhuc hærerent) integra custodirentur: ac demum omnia, præter ossium articulos, niterēt. Emundatum cadauer, eo situ, quo id aut sedēs, aut erectum, hacq; aut illa forma cōpositum spectari uolebant, soli exponebatur: ut ligamēta solis æstu resiccata, ossium articulos in eo positi continerent. Verūm hæc præparandi ratio, præterquam quòd molesta, sordida, ac difficilis est, nullos ferè ossium ostendit processus, appendices, capita, sinus, & eius generis reliqua, in ossibus præcipuo sanè studio spectanda: quòd scilicet hæc omnia insigniter nigricantibus ligamentis adhuc obducantur. adeò, ut hic ossium mundandi repurgandi uel modus, ad doctrinam penè nihil accommodet. Quemadmodū neq; ridicula musculorum, tendinum, ligamentorum, neruorum, uenarum & arteriarum uidendi ratio, quæ hactenus Medicinæ candidatis nostræ artis professores imposuerunt, quicquam commodi adfert: sed duntaxat studiosorum animos cohibet, ne eorum quæ iam dicebam organorum demonstrationem à Rabinis illis expetant. Hi namq; asserēbant, illa solum è corporibus in aquarū gurgitibus (si Dijs placet) emaciatiss, non autem è nuper mortuis discenda esse. quasi uerò quicquam eruditione dignum, in corporibus ad eum modum coaptatis, prorsus uel hac ratione corruptis, disci possit. Ceterū quo nam pacto aliæ corporis particule sint ag-

sint aggrediédæ, suis locis affatim prosequar. Ossia autem, ut modò subiiciam, leui negotio concinnabis, si discendi saltem cupidus, & quod in dissectionum studio Galenus in primis requirit, laborum patiens, ac industrius fueris. Alicunde itaq; nactus cadauer, quaecunq; id sit (quamuis tamen morbo emaciatum, longè aptius censebis) uas unum, carnibus & uisceribus & cuti reponendis, & sanguini denique admittendo, ad manum esse curabis, unà cum magno grandiq; lebetè, aut cacabo, cuiusmodi illi sunt, quibus lixiuium mulieres igni adhibent. is namq; coquendis ossibus est aptissimus, illiq; ossa opportunè iniicies. Præterea & ampla papyrus charta uel in affere quopià distendatur, ut huic cartilagine non elixandæ applicari, seriatimq; imponi possint. Mox acutiori cultro orbiculatim per frontem & tempora & occipitium, sectionem tentabis, ad caluariam usque penetrantem. Ad huius deinceps sectionis orbiculum, ferra caluariam diuides, parum sollicitus, etiam si cerebrum uities, aut paulo humilius elatus uel caluariam diuidas: quandoquidem nunc duntaxat ossa ac cartilagine inueneris, seruareq; propositum est. Dissecta igitur caluaria, cerebrum solis manibus ex ipsa euulsum, uasi iniiciendum est: ac caluariæ pars, à reliquo capite adempta, cacabo in detur, liberata tamen prius ab illa uerticis cute. Iam utranq; aurem proximè à temporum osse absectam, seorsum in chartam, cui cartilagine adhibentur, collocato, unà cum palpebris, & nasi extremo, quod cartilaginibus constat, quæ uicinissimè ab illis quibus committuntur ossibus, simul cum cute sunt resecandæ. Deinceps maxillam inferiorem à suo cum capitis ossibus connexu liberabis: ac cartilagine, quas priuatim in ipsius cum capite articulis haberi diximus, cultello à ligamenti articulū continentibus dissecabis: eas chartæ illi, cui promptè hærebunt, seriatim applicans. Quando inferiorem maxillam adimis, & eam obiter cute & lingua (relictis, si uoles, musculorum appplantationibus) liberas, ac tandem in cacabum reijcis, integram quoq; laryngem, cum osse uel referente, & lingua, & stomachi asperæq; arteriæ portione, è faucibus auferes, ac chartæ illi non aliter emundatâ impones. Iam à pectoris ossis mucrone ad pubem usq; sectionem molieris, ad omentum usq; penetrantem, cui deinceps aliam sectionem, quæ transuersum à dextro ilio ad sinistrum pertingat, adiuges, & absq; delectu omnia quæ peritonæo continentur, laniorū more euelles, eaq; uasi iniicies. Abdominis cutem unà cum ipsius musculis obiter ab ossibus dissecabis: & sanguinem spongijs excipiens, eum in uas exprimes. Dein à iugulo ad pectoris ossis usq; mucronem, adeo profundam duces sectionem, ut illa ad pectoris usq; os penetrante, simul cum cute musculos thoraci instratos, à costarum ossibus, earundemq; cartilaginibus, adimere possis, & clauiculæ simul nudæ, carnibusq; liberæ appareant. Quippe hæ acutiori cultello à pectoris osse ueniunt liberandæ, & cartilagine his articulis propria (quemadmodum inferioris maxillæ cartilagine aggressus es) accuratè sunt adimendæ, & dein chartæ seriatim adhibendæ. Pectoris os, unà cum costarum cartilaginibus, studiose à costarum ossibus liberabitur, sectionibus acutiori & non admodū crasso cultro per cartilagine inibi ductis, ubi costarum ossa in has degenerant. Atq; id promptè obitur, si modò memoria non exciderit, primæ costæ cartilaginem à pectoris ossis medio magis in latus, quàm secundæ costæ cartilaginem ferri. Neq; tantum cartilagine pectoris ossi coarctatæ, à costis sunt dirimendæ: uerum etiam omnes spuriarum costarum cartilagine, quæ uel intercostalium musculorum interuentu superioribus cartilaginibus hærebunt. Disiunctis hunc in modum cartilaginibus, pectoris os à iugulo attolles, & id uenis & arterijs à iugulo ad ipsum porrectis, & membranis quoq;

a Ita diuides, ut septima fig. ca. 6 à sexta si gura liberata cernitur. Verum non est utriusq; modo in ossibus cartilaginibusq; probè instructo, hoc Capite aliquid adnotem, potissimum quæ singulis ferè dictionibus alioquin characteres esset adhibendi.

quoq; liberabis, quæ thoracis cavitatem intersepiunt. Postremò cartilaginea à septo transuerso refecabis, & ipsas simul cum pectoris ossæ non aliter mundatas, in chartam repones. Dein alterius lateris scapulâ unâ cum clauicula à thorace diffecaturus, longam sectionem à summo humero per brachium & cubitum ad pollicem usq; duces, & scapulam, humerû, cubitum, & manum cute carnibusq; nudabis, non admodum anxius, etiamsi aliqua tendinum carnisq; portio ossibus adhuc appensa relinquatur. adeò, ut etiam suffecerit, relicta manus cute, illam aliquot sectionibus hic atq; illic scindere, quo postea leuiori negotio manus elixetur. Modò clauicula à superiori scapulæ processu secabitur, mente adhibita, num præter illum processum, quem summum humerum appellamus, & clauiculam, inibi aliud tertium os occurrat. Hoc ubi præstiteris, ac peculiarem eius articuli cartilaginem chartæ adhibueris, clauiculam in cacabum conijcies, scapulamq; ab humero, & deinde humerû à cubiti ossibus separabis: & cubitum cum manu connexum relinques, simul omnia in cacabum quoq; locabis. Priusquam tamen scapula cacabo indetur, opportunè feceris, si cartilaginem, scapulæ sinû, quo humeri caput excipitur, aliquando augentem, à scapula diremeris, chartæq; cum ceteris cartilaginibus applicueris. Istud similiter in altero latere est præstandû, ac ilico ad thoracem denudò accedendum, ex quo primùm pulmonem cum corde & septo transuerso execabis: & priusquam cor in uas conijcias, cordis basim per transuersum à reliquo cordis corpore diuides: & deinde basim rursus à uasis, quæ ab ipsa prodeunt, sic auferes, ut ita uenæ arterialis & magnæ arteriæ orificia illæsa habeas, ac postmodum (si uisum fuerit) in cartilaginum numero illa seruaturus, chartæ applices: aut etiam, num mutua illorum duorû uasorum radix os quoq; in homine sit, expendas. Vbi igitur reliqua quæ in thorace inueniuntur, in uas reieceris, cadauer in prorum uertes: & utcunq; licebit, ceruicem, reliquumq; dorsum, unâ cum tota thoracis amplitudine, carnibus emundabis: studiòse cauès, ne costam aliquam (utpote fragilem) rumpas: aut nimium uicinè carnem diffecans, processum aliquem uities. Atq; id adhuc magis cauendum est, quum iam singulas costas seorsum à uertebis thoracis es liberaturus. Etenim resupinato cadauere, cultello acutiore costæ cuiusq; capitulum à uertebæ corporis sinu uenit separandum: & deinde ligamenti sensim diuisis, à transuersis quoq; uertebra-rum processibus costæ sunt adimendæ, obiterq; repurgatæ, in cacabum mittendæ. Crura ad eum modum, quo brachia & manus aggressus es, attrahabis, femur uniuersum carnibus emundans, mox & tibiâ, & pedem. Quum tamen genu nudas, & ad posteriorem radicis inferiorû femoris caput sedem, num inibi sesamina quæpiâ consistant ossicula, expendis, extendinibus anteriorem genu sedem occupantibus, patellâ execabis, & in cacabum non secus ac femur conijcies ilico, atq; id à coxendicis ossæ tibiâq; liberaueris, & cartilaginea refeceris, quæ tibiæ ossis sinus, femoris capita excipientes, adaugent. quippe & illas non inopportunè chartæ agglutinabis: ac deinceps tibiæ os, unâ cum fibula & pede, cacabo indes. Id ubi in utroq; crure præstitum erit, & ossa sacri ossis lateribus coarctata, aliquantulum repurgata fuerint, cartilaginea ligamenta, uertebra-rum corpora intercedentia, ad amulsim ueniunt execanda, & chartæ seriatim accommodanda. Ligamenti igitur, quæ uertebra-rum corporibus in superficie obducuntur, acutiore cultro ademptis, inter ossis sacri summum & cartilagineum ligamentum, os sacrum ac infimam lumborum uertebra-m interueniens, sectionem tentabis, quæ ligamentum id ab ossæ sacro diuidat. Rursus inter infimæ lumborum uertebrae corpus, & elatiorem dicti nunc cartilaginei



ginei ligamenti regionem, similem duces sectionem, hacq; ratione integrum auferes ligamentum. quod ubi chartæ imposueris, sequentia tantisper excindes, dum ad secundam usq; cervicis uertebam deuenieris. Quum igitur uigintia ligamenta cartilaginea ad hunc modum chartæ erunt adhibita, dorsum in tres quatuor uel partes cautè & leniter disiungendum uenit, ne impetu id tentans, casu aliquè uertebrae processum confringas. Quare etiam cauendum est, ne primam uertebam à capite negligentius liberare studeas. Licebit enim cum capite cervicis uertebrae cacabo imponere, ut & thoracis uertebrae cum lumborum uertebis: modò illas à sacro ossè prius disiunxeris. Os sacrum autem, unà cum ossibus ipsi utrinq; commissis, quæ ilium, coxendicis & pubis ossa còstituunt, & dein cum coccyge ossè, nihil prohibet cacabo indere: quum scilicet ilium ossa adhuc cruda, à sacro difficulter & arduè separantur, & pubis ossium cartilago etiam tunc uitietur: quam aliàs integrum asseruabis, si pubis ossa non dirempta, cacabo inieceris. Ossibus ad hunc modum cacabo immisis, aqua is uniuersus implebitur, ut ossibus altè in aquam subsidètibis, nulla ossis pars emineat. Hoc enim in primis toto coctionis tēpore obseruandum est, ne os aliquod aqua non tegatur: multoq; magis, ne id ex cacabo prominēs, fumum excipiat, cuius etiam occasione grandem cacabum esse cōuenit. Vniuersæ coctioni nullum peculiare adhibetur artificium: sed ut in cæteris elixationibus, spuma sedulò auferenda est, quo ius clarius reddas, ipsaq; ossa minus sordida extrahas. Pari etiam ratione pinguedo omnis (quæ plurima nonnunquam ijs qui morbis non fuerunt emaciati, supernatare solet) est haurienda, ac in uas aliquod uel uulgi nomine reponenda, quod illi in obliterandis cicatricibus, & nervis tendinibusq; producendis multum tribuit. Coctioni nullum tempus præfinitur, quum id ex ætatum ratione plurimū uariet. Duabus enim aut tribus horis plūquam satis sit, dum puerulorū ossa coquantur præcipuè: quum in illis studendū sit, ne quum ossaundas, appēdices decidunt: quarum interim coalitus in prouectioris ætatis hominibus uix unquam, quantumuis coxeris, dissoluitur. Is itaque coctionis scopus est, ut ossa cultrorum beneficio, uti inter edendum sit, aptè mundari queant. ut autem id facias opportunus, pedetentim nonnulla ossa inter elixandum forcipe eximes, eaq; solus repurgabis: nisi fortasse studiosus adsit sodalis, qui unà manus operi adhibeat. Summopere enim cauendum est, ne imperitior aliquis ossium supercilia, processus, capita & sinus radendo uitiet, aut alicunde cartilaginem læuem, & crustæ modo ossibus obductam imprudens auferat. hæc namq; quum carnem, ligamenta, tendines & membranas ossa ambientes adimis, accuratissimè seruanda uenit. Neq; uerò officium id hac duntaxat ratione inepto alicui, & Anatomæ parum studioso, minus committi uelim: at ut unumquodq; os priuatim purgans, sinus ipsius & capita, & potissimum ligamentorum naturam, & tendinum insertionem, musculorumq; exortum sedulò cōtempleris. Non enim facile dixerim, quantum cognitionis partiū eo opere tibi paraturus sis. Quando igitur hunc in modum seriatim ossa ex bulliente iure extrahis, ac mundata terræ aut sportulæ alicui imponis, non admodum anxie expédito, quod nam os prius tibi occurrat. Manum tamen cum cubiti ossibus extrahens, obseruabis, ne uiolētius brachiale à cubiti ossibus seiungas: sed cultro articuli ligamenta sensim diuidens, brachiale à cubiti ossibus accuratè liberabis, uti & in postbrachialis ossium à brachiale separatione. Caueri enim cuperem, ne brachialis ossa inuicem dirimātur. unde etiam ilico atq; id integrum à cubito, & pollicis primo ossè, & postbrachiale disiunxeris, obiter duntaxat tendines ligamen-

raq; ipsi obnata diuelles: id studeas, ne ossa in interna externaq; ipforum superficie penitus ligamentis emundentur, sed ut ligamentorum beneficio adhuc inuicem hæreant. Brachiale enim ita igni adhibito, ligamenta inde sensim resiccata, ipsius ossa firmiter continent, leuioriq; negotio in ossium connexu illud cubiti & postbrachialis ossibus committitur: nisi fortè in iungendis ossibus peritior, brachialis ossa mutuò dirimere, ac ligamentis emundare, postmodumq; æneis filis inuicem committere audeas, aut etiam disiuncta asseruare uelis. Mox ubi brachiale in eum modum igni apposueris, chartam quamuis assumes, cui postbrachialis & digitorum ossa, non prætermisis undiq; sesaminis ossiculis, exactè emundata imponas: quo minus hæc illi chartæ inuoluta, neq; alterius manus ossibus confusa, in committendis ossibus negotium augeant. Conduxerit igitur, manuum pedumq; ossa separatim in quatuor chartas recludere. Priusquam tamen huius illius ue manus aut pedis ossa chartæ implicas, antea semper indagandum est, num aliquod os non mundatum super sit: ne quum putamina & ius abijciendum curas, unà aliquot ossa oscitanter auferenda porrigas. Si fortè unguem quoq; asseruare uisum sit, illum, dum pedis manusq; digitorum ossa expurgas, auelles. Non minus enim humanos ungues, quàm auium & quadrupedum ungues, elixatione, aut calentis aquæ ui, abscedere conspiciamus. Porrò quum ulnam & radium emundas, cartilago non negligetur, quæ à radio profecta, magna ex parte ulnam à brachiale dirimit. Hæc namq; ab ulna liberatur, ut radio adhuc connata, in ossium connexu, rursus ulnam & brachiale intercedat. Quinetiam quum caput purgas, accuratissimè caueto, ne membranam, quæ auditus organi foramen succingit, euellens, ossicula illa negligenter eximas, quæ eius organi constructionem subintrat: quippe illa stylo quopiam in foramen missò, sunt studiose euellenda, & pariter excutienda. Hæc ossicula ad reliquam ossium colligationem, aliquò recondes, & uertebra omnium postremo è iure eximes, quemadmodum & sacrum os: nisi fortè post aliquantulam elixationem, coccyx os à sacro liberare lubeat: quòd scilicet huius ossicula, ob cartilaginea ligamèta, quæ ipsa connectunt, si diutius coquantur, ab inuicem seiungi soleant. Si tamen coccygis ossis præscindendi gratia, os sacrum prius exemeris, id denuò cacabo est immittendum, coccyxq; os priuatim in chartam aut sportulam coniiciendum, in quam minuta locabis ossicula: cuiusmodi dentes sunt, si fortè ipforum aliquis exciderit, aut aliqua ossis portio oscitanter effracta fuerit. Verum ut pubis ossium cartilagineum serues, priusquam ilium ossa à sacro liberas, pubis ossa anteriori posterioriq; sede leuiter sunt à ligamentis ac ambientibus membranis emundanda, ac dein inuicem solis manibus seiungèda, ut ipsa intercedens cartilago, ab altero osse abscedat, uniq; duntaxat commissa maneat, leui negotio postmodum in ossium connexu, cum altero pubis osse iungenda. Ossa hac ratione purgata, denuò numerabis, non quidem manuum & pedum ossa, quæ iam seorsum chartis prius inuoluisti: uerum recessibus caluariæ partem, quam ferra à reliquo capite ademisti: in qua considerabis, num portunculæ temporum ossium, quæ instar squamæ uerticis ossibus applicat, atq; ferra à cætera temporum portione auferri solèt, ex elixatione deciderint, ne fortè illas cum ossium spolijs aut iure donec reijcienda. Deinde, num dens aliquis ex superiori inferiori ue maxilla exciderit, perpendes: & uiginti quatuor uertebras, totidemq; costas enumerabis, duas clauiculas, duas scapulas, duos humeros, duas ulnas, & radios duos: sacrum os, à quo iam antea coccyx os ademptum est: duo grandia ossa, sacri ossis lateribus nexa: femora duo, tibiæ ossa duo, & fibulas duas,


duas, item patellas similiter duas. Vbi omnia enumeraueris, magnopere conduxerit, ossa denuò mundæ & bullienti aquæ indere: ac mox exempta, seorsum aspero rudiq; linteo abstergere: & si quæ ligamentorum, aut membranarum, aut muscutorum insertionis exortus ue sint reliquæ, eas defricare ac abstergere: studio interim adhibito, ne lubrica, & crustæ modo ossibus adhibita cartilago simul auferatur. Interea uerò dum hæc in orbem igni apposita leuiter delicantur, aurium cartilagine cute deteguntur, chartæ cum reliquis cartilaginibus applicandæ. Idem quoque in palpebrarum & nasi cartilaginibus molendum est: ac deinceps acutis cultellis os u referens, à musculis ipsi commissis, quàm licebit exactissimè, crudum emundabis. Purgato illo osse, laryngis cartilagine similiter crudas accuratè carnibus membranisq; liberabis, simul cum una atq; altera asperæ arteriæ trunci cartilagine, C imagini comparata. Iam pectoris os, ipsiq; connexas cartilagine, sedulo emundabis: quod eo minus promptè perfeceris, quo id pluribus obducitur membranarum, pingueq; est, & interim coquendum neutiquam uenit, uixq; calente aqua aspergendum. Quum uerò cartilagine carne spoliata, cauendum est, ne membranam cartilaginibus proximè obductam, illiq; correspondentè auferas, quam circumossilem dicimus. Quippe hac membrana à cartilaginibus discernpta, illæ infirmius pectoris ossi committuntur, & contractæ, breues & intortæ euadunt. Insuper quo minus cartilagine hæc contrahantur, pectoris os ad ignem non est excidendum: sed alicubi tantisper, dum ossa necere proposueris, in loco non nimis humido reponendum, ne rursus cartilagine plus æquo flaccescant, ac postea deformem thoracis ossium fabricam constituent. Nihil enim æquè elegantem sceleti struem uitiat, atq; pectoris os cum cartilaginibus, si modo illè negligentius obseruentur, & non iam compactis ossibus potius quàm antea exiccari permittatur. Reliquas autem cartilagine, chartæ adhibitas, licebit igni non nihil admouere: at ita, ne nimium conuellantur: quum satius sit, & has quoq; post compactionem siccari. Iam integrum tibi est, ossa & cartilagine ad eum quem mox dicam modum contexere, aut dissoluta asseruare: quod longè etiam prestiterit, si modò aut cónexis, aut dissolutis carendum esset. Ossanamq; diffusam, & in oblongam arcam seriatim posita, quouis tempore seorsum conspici, ac omnia quæ ad ossium cognitionem spectant, edocere possunt. quæ autem erecta, simulq; commissa sunt, sinus capitaq; ossium non admodum accuratè commonstrant: sed ut uerè dicam, ad ostentationem potius quàm ad disciplinam conducunt. Quanquam rursus ad hanc illa ossa accommodatissima sint, quæ ex Italicis subducuntur monumētis, penus modo (ut hîc ferè omnia) extructis, & sub impluio aliquo, aut alioquin aeri ita expositis, ut hæc pluuialem aquam quâdoq; excipiant. Præter id namq; quòd monumēta eiusmodi humida sunt, etiam aqua subinde accedit, cuius beneficio omnia quæ ossibus adnascuntur, promptissimè marcescunt: adeò ut illa ossa post aliquod tempus exempta, & dein abluta, sint integerrima, nihilq; nò in ossibus spectandum cõmonstrent, modò in arcâ seriatim citra connexum reponantur. ad coniungendum enim propter deperditas costarum totiusq; corporis cartilagine, prorsus quodammodo sunt inutilia. si namq; illarum fortè aliquæ reperiuntur, ob putredinē sunt friabiles, & undiq; ab ossibus liberæ. Rursus ossa ad hunc usum sunt inepta, quæ è terra apud alias nationes effodiuntur, & cumulatim in cimiterijs asseruantur. Præter hoc enim, quòd illa carie ob terræ siccitatē afficiuntur, omnia eiusdem hominis ossa nunquam, uelut in dictis nuper monumētis reperias, uel Parisijs etiam in Innocenti cimiterio: ubi, si usquā modò mehercule, quāplurimos ossium

*Quæ ossa ad  
disciplinam  
utilissima.*



*Emendata ossa  
quomodo iun-  
genda.*

osium quæ è terra fodiuntur, habes acervos: qui mihi primùm cognoscendis ossibus uacanti, ad eò uberem suppeditarunt copiam, ut longo indefessoq; spectandi usu edoctus, etiam obuinctis oculis cum sodalibus interdum deponere ausus fuerim, unius mediæ horæ spacio nullum os ex tot acervis porrigi posse, quod, cuiusmodi esset, tactu non diiudicarem. Atq; id eo faciendum erat studiosius, quo discendi cupidus, magis præceptorū opera, in hac medicinæ parte (quod uerè dixerim) destituebar. Porro quod ad coëtorum osium conexum erectionemq; attinet, ea mox post emundationem (ne nimium indurescant) cōmittenda sunt. nam statim à coëctione, ossa solis subulis, quibus suppinguntur calcei, citra negotium perforantur, æneisq; filis mutuo alligantur: quod quisq; pro ut manu nactus est industriam, & ad ea quæ hæcenus toto libro descripsimus, minus obaudiuit, suo Marte perficiet. Verùm interim si quando ossa alicui aridiora durioraq; obtingent, quàm ut illorum qui coria subulis perforant ritu, illa ex uoto terebrare posset, haudquaquam abs re erit, id instrumentum operi adhibere, quod aliquando in hunc usum, quum in durissima quædam ossa, spectatu ob siccam hominis mediæ ætatis temperiem iucundissima, incidissem, ossibus perforandis paravi: sumptis uidelicet duobus stipitibus, trium ferè palmarum longitudine, & crassitie trium propemodum digitorum: qui deinde altera parte, non procul ab extremo orbitali, & quod pollicem admitteret, foramine, perforabatur, ut axis in illis uolui posset, quæ longa erat palmas ferè tres, & suis extremis crassitie pollicis, in medio autem duplicata crassitie, teres, ut scilicet extrema, stipitū foraminibus conuenirent, ac in illis com modè uoluerentur: & media crassitudo axem ita cohiberet, ut stipitibus secundum eius crassitie longitudinem ualidè alicuius mensæ uel scammii angulo intrusis, & cum axe illis indita firmatis, ipsa duntaxat in stipitibus circumduci posset, non autem antrorsum aut retrorsum ageretur. Atque ita unum axis extremum, ad trium ferè digitorum latitudinē, pollicis modo teres erat: ad quatuor autem, uel quinque digitorum latitudinem, duplo crassius. & reliquum axis, pollicis crassitiem ita æquabat, ut extra alterum stipitem, & ultra mensæ scammii uel amplitudinē aliquousq; prominere, illiq; ferrum immitteretur, quo ossa perforabam: modò tenuius, modò crassius, pro rei usu, illorum ratione assumens, qui sphaerulas, orationibus Dominicis, & ad diuam Virginem salutationibus sanctè enumerandis aptas, indies præparant. Cæterum media illa axis crassities, inter firmatos consistens stipites, exactissimè fuit teres, ut tenue lorum ipsi aptius circumuolueretur, quod semel axi circumductum, oblongi baculi extremis tanquam arcui necessebatur: ut baculo sursum & deorsum sinistra manu, tanquàm lyra ludente, uicissim ducto, axis cum ferro ipsi indito, in stipitibus circumageretur, ac os, quod dextra manu adhibebam, perforaret. Hoc itaq; instrumento, aut solarum subularum ope, ossa perforabuntur. & ad manum erit æneū filum, partim crassius, partim tenuius: quod postmodum, quo magis sequax reddatur, & quo rariùs, quantū uis intortum, frangatur, erit igni, ut aliquandiu candescat, imponendum. His aderunt duæ tenaculæ, seu forcipes: unus quidem, quo filū intorquebitur: alter autem, quo iam intortum absecabitur. Inchoabis autem osium colligationem à pedibus, ac primū



*Hæc figura instrumentum id expressimus, quo duriora ossa leui negotio perforantur. Significet itaq; A & B duos stipites, qui mensæ aut scammii angulo possunt intrigi. C, axis. D axis partem, cui ferrum, subula in modum inditur. E uero arcum, quo axis circumuoluitur.*

*Huiusmodi instrumenta ferè sepius ponit tabula cap. 41 ad charact. S, T, V, X, Y.*


ac primùm calci talum iunges, & deinde cubiforme os calci, & cymbam referens talo, & tria interiora tarfi ossa cymbam referenti: deinde his committes pedij ossa, hisq; seriatim digitorum ossa, cum ossiculis sesamo comparatis, quæ ideo cautius & tenuiori subula perforabis, quod duriora solidioraq; sunt, & ex subulæ impetu promptius diuisa dissiliunt. Vbi utrunq; pedem iunxeris, tibiæ ossis tüber, quod sinus femoris capita excipientes dirimit, tanto foramine in tibiæ usq; cavitatem, qua ipsius medulla reponitur, terebrandum est, quantum excipiendo duriori baculo sufficiat: qui femori etiam intrusus, clauī ritu ita tibiā femori committat, uti fundi uasis asseres absq; glutine necti cernimus. Est enim in femoris inferiori sede aliud foramen molendū, illi è directo consistens, quod in tibia fieri uolebam, ut idem baculus & femori & tibię indatur, huiusq; ope articulus genu inflexus maneat. Præter hunc baculum tamen, femur tibiæ ossi utrinq; crassiori filo committendum est, non prætermisiss cartilaginibus, tibiæ ossis sinus augmentibus. quæ quum hæc ossa iungentur, simul cum illis restricta, in articulo genu seruantur. Mox fibula tibiæ ossi supra infraq; alligabitur, & patella simul femori ac tibiæ ossi firmabitur. Hoc ubi in utroq; crure præstitum erit, sacri ossis lateribus ilium ossa crassiori filo suntnectenda: ac deinde pubis ossa, interueniente etiam illorum cartilagine, iungenda. Iam ad manū erit orbicularis asser, in quem ossa erigentur. cōuenit autem, huius asseris orbem tantū esse, ut pedes illi eo situ, quo ossa erigenda ducis, aptè firmari queant. In huius asseris medio foramen paratur, ut quum ossa in erectam arcam recondes, inferior arcæ fundus axem habeat, quæ foramini illi indita, orbem conuolui sinat. Præter hoc foramen, aliud iuxta orbis circumferentiam aptabitur, in quo lignum firmari queat, quod instar teli, aut hastæ, aut falcis (utcunq; uisum erit) paratum, skeleti manus suffulciet. Extructo in hunc modum orbi pedes impones, & astantis alicuius ope super pedes reliqua crurum ossa inniti curabis: ac deinde femorum capita in coxendicum ossium acetabulis indes, ut rectè filo aut uirgula interuallū metiaris, quod ab orbe ad humiliorem sedē foraminis pertinet, in sacro osse dorsalis medullæ gratia incisi. Hoc etenim interuallum edocebit, qua mensura ferrum fabricandū sit, quod orbi affixum, & ossis sacri reliquarumq; uertebrearum foramini dorsalem medullam transmittēti inditum, uniuersa ossa pulchrè sustinebit. Ferrum namq; ita aptandum est, ut ualidè orbis medio clauis affigatur, & ab orbe ad infimam usq; nuper dicti foraminis sedem, teres aut quadratum sit. ab illa autem sede sursum latius quàm crassius esse conuenit, ut postmodum ad dorsū inflexum obliquari queat, uertebraq; ipsi ita latioribus quoq; adhibitis intrusisq; bacillis adaptetur, ut immotæ maneant, neq; ad ferrum circumuertantur. Atq; ideo ferrum inibi primū tenuius fiet, ubi sacrum os, ne deorsum subsideat, suffulciendum uenit. Nisi enim hoc os firmetur, sustineaturq; unā cum ipso reliquæ uertebre sensim descendunt, temporisq; successu skeleti crura turpiter obliquantur. Verū quia os sacrum (quantumuis foramen dorsalis medullæ gratia in illo cælatum, cultri ope rectum agas, ut ferrum per ipsum transmittas) in hac quam modò paramus ossium strue, non satis in posteriora obliquatur, neq; ad pubis os collatum satis sursum spectat: soleo interdum ex medio corporis secūdi ossis sacri ossis foramen rectā sursum in debito sacri ossis situ, in foramen usq; dorsalis medullæ exculpere, ubi id in altissima sede primi ossis sacri ossis consistit. Accuratè igitur ab orbe ad sacri ossis foraminis, siue id sit finis eius quod dorsali paratū est medullæ, siue nouum prorsus ipsi ossi, uti iam dicebam, insculpsis, præparandi ferri longitudo metienda uenit. De reliqua

autem ferri longitudine non adedò curandum est: quum hæc, si fortè longior sit, post ofsium compactionem facilerè præscindatur. Et etiam si ossa arcæ impo-  
nenda duxeris, magnopere iuuerit, ferrum plus minus duabus palmis longius  
quàm uniuersum sit sceleton, fieri: ut ipsius portio extra uerticem eminens, su-  
perioris arcæ fundi foramini possit indiri, in ipsoq; conuolui. Cæterum ossè fa-  
cro, cum ipsi utrinq; nexis ilium ofsibus, uti iam diximus, ad ferrù orbi fixum  
suffulto, crassiori filo femoris capita coxendicum acetabulis innectes: diligen-  
ter perpendens, quantù hæc aut extrorsum aut introrsum intorqueas, ne fortè  
crura turpiter intorta committas: aut patellæ, interiora potius crurum, quàm  
anteriora respicias. quod sanè futurum est, nisi ad amussim secundum totius  
cruris situm, femoris capita suis sinibus iunxeris. Vt cunq; tamen feceris, in hoc  
connexu filum prorsus intorquendum non est, priusquam pedes orbi & tibijs  
eo situ commiseris, qui tibi apparebit elegantior. Hunc à baculi, quo manus sta-  
bilientur, forma, potissimù petes: alium quippe situm mefforia falx, & alium  
hasta, aut Neptuni tridens, aut aliud quoduis instrumentum expetit. Modò  
uertebæ omnes seriatim accòmodandæ sunt, quo cuiusq; situm ordinemq;  
inuentu non arduum obserues. hunc namq; uertebRARUM forma, & articu-  
lationis ratio promptè ostendunt. Quum primùm itaque ordinatim omnes in  
mensam reposueris, quinq; lumborum uertebRAS inuicem còmittes duobus  
nexibus, in corporum lateribus factis, qui unà cartilagineù ligamentum con-  
tineant, quod uertebRARUM corpora interuenit. Huiusmodi ligamèta seriatim  
à charta, cui illa applicasti, sunt assumenda: eo semper relicto, quod eas interce-  
dit uertebas, quas inuicem nunc non alligas. quemadmodum in præsentia est  
ligamentum, seu cartilago, sacrum os & infimam lumborum intercedens uer-  
tebram, idq; quod supremam lumborù & infimam thoracis uertebRAS inter-  
uenit. Iunctis enim lumborum uertebRis, sex inferiores thoracis inuicem, &  
postmodum sex superiores unà cum ceruicis humiliori connectentur. Reli-  
quæ autem ceruicis mutuò non sunt colligandæ: sed eas interueniens cartila-  
gineum ligamentum, corpori inferioris uertebRæ duntaxat est glutinandum.  
quandoquidem ceruicis uertebRæ, ferro tantum inditæ, suam seruant sedem,  
neq; thoracis uertebRARUM modo costas sustinere debent. Illico igitur atq; uer-  
tebras ad eam quam præcepi rationè, priusquam ferrum illis trajciatur, com-  
miseris, lumborù uertebRAS ita connexas ferro impones, idq; sedulò ad eorum  
inflexum obliquabis: ac infimam uertebRAM unà cum sacro ossè ita còmittes,  
ut iam prius lumborù uertebRAS mutuò uinxisti. Mox his inferiores thoracis  
adiunges, perpetuò quàm licebit accuratissimè ferrum, secundum totius dor-  
si ductum, complicans, & infimam thoracis uertebRAM supremæ lumborum  
adnectens. His pari modo superiores thoracis uertebRæ addentur: & harum  
infima supremæ earum quæ iam ferro appositæ fuerant, alligata, latiusculum  
& longum, nigroq; colore intinctum adaptabis baculum, qui posteriori ferri  
parti appositus, quàm licebit demissè inter ferrum & uertebRAS intrudetur, ut  
huius baculi beneficio uertebRæ ad ferrum firmitus contineantur, neq; ulla ra-  
tione uersatiles sint, ne postmodum uniuersus thorax in hoc illud ue latus tur-  
piter conuolui queat. Vt autem caluaria ferro applicetur, necessum est uer-  
ticem foramine quodam perforari, ad amussim ferri amplitudini & crassici  
correspondente: ne si quando orbiculari alicui uerticis foramini ferrum traj-  
ceres, caluaria quauis occasione quoquoersum circumuertatur. prout enim  
faciem anteriora exactè, aut uersus latera spectare uolueris, foramen uerticis  
aut transuersum, aut obliquè insculpi oportet. Iam caluaria quoq; perforanda  
est, ut



est, ut ligulis ea sectio, quam ferra in caluaria molitus es, cōmittatur: & quum uisum fuerit, caluaria à ferro adempta, rursus dissolui queat. summopere namque conducet, internam caluariæ amplitudinem, qua cerebrum continetur, quotiescunq; libuerit, intueri. quod ut fiat, utraq; caluariæ pars tribus foraminibus sibi mutuò correspondētibus perforabitur. ac unum quidem foramen opportunè in occipitio perficietur, & in utroq; tēpore unum. At inferiorem maxillā, non neglectis hic peculiaribus cartilaginibus, æneo filo in ipsius temporum ofsium sinibus committes. Verū quum hic connexus non adeò firmus sit, ut accuratè dentes mutuò applicet, sed inferior maxilla dependeat, elegansq; sit, hanc superiori modò iungi, & modò ab illa disiungi: præter dictum nexum, maxillæ inferioris acuti processus etiam perforandi sunt, & funiculus ipsis illigandus, qui sub iugalibus traiectus, ofsibus & uertici incumbens, nunc uersus frontem, nunc uersus occipitiū tendi possit, dentesq; ita collidi queant. Porro nunc tempestiuum erit, costas uertebreis & suis cartilaginibus alligare: quod sanè ut ad amussim & sedulo facias, primū omnes dextras costas à sinistris discernes, coniectura uel à sinu sumpta, quo uena, neruus & arteria secundum costas exporrigitur: dein à superiori costarū sede, quæ latior spissiorq; inferiori occurrit. Deinceps in hunc ferè modum ((( ))) costas mensæ seriatim impones, ut dextræ sinistris respōdeant, curans. Promptum enim erit, singulas suis sedibus ponere: si ea modò memoriæ non exciderint, quæ ad interuallum prorsus dehiscere sinas, quæ ante sectionem cartilaginibus inuicem diemptæ fuerant. Nunc humeros spissiori filo scapulis nectes, & deinde tenuiori filo clauiculas superioribus scapularum processibus, mox scapulas costis, & clauiculas pectoris ofsi. Quum tamen humeros scapulis aduincies, expendendum est, quò nam situ manus collocandas duxeris. Hic enim multum refert, quomodo scapulæ sinui, caput humeri committatur. In quo etiam connexu cartilago neutiquam prætereunda est, cuius auxilio scapulæ sinus interdū adaugetur: atq; ita etiam cartilagine, clauicularum articulis peculiare, non neglectæ, suis articulis nectentur. Cæterū cubiti ossa humero uincienda non sunt, priusquam manus tota ipsi fuerit nexa. Radius itaque, habita ad futurum manus sitū ratione, suprà infraq; ulnæ est colligandus. deinde si brachialis ossa disiecta, suisq; ligamentis libera sunt, ea inuicem ueniunt committēda: aliàs autem suorū ligamentorum interuentu abundè continentur. Inferiori ipsorum sedi primū pollicis os, & quatuor postbrachialis ossa, ac deinde his digitorum ossa, unà cum sesaminis ofsiculis adnectes. Postremò autem brachiale radio iunges, & deinde ulnam humero. Atq; ubi id in utroq; latere præstitum erit, manus baculo illi alligabis, quem ualidè orbi infixum, instar falcis, aut aliter extruendum dixi. Erectis nunc ofsibus, & ex osse u referenti, & auditus organi ofsiculis, ac asperæ arteriæ, auriumq; & palpebrarum cartilaginibus, & ungue, cordisq; cartilaginea portione, monile licebit confingere: his omnibus catenulæ, aut exiccato cruris aut manus neruo adnexis.

ANATOMICORUM INSTRUMEN-  
TORUM DELINEATIO.



QVADRAGESIMIPRIMI CAPITIS FIGV-  
rarum, eiusdemq; characterum Index.

*P R A E S E N T I* figura, menſe cuidam incumbente ſinximus aſſerem, quo in uinorum ſectionibus uti-  
mur: dein huic aſſeri omnia propemodum accommodauimus, quibus in diſſectionum adminiſtrationibus, adeoq;  
tota Anatome quæ uti poſſet.

- A, A* Menſa, cui reliqua omnia modo ſeriatim indicanda ſuperſternuntur.
- B, B* Aſſer, cuius ſectionibus adminiſtrandis idoneus.
- C, C* Varia foramina, quibus laqueos pro animalis mole adhibemus, quum femora & brachia uincimus.
- D, D* Eiſmodi anuli manibus pedibusq; ligandis adaptantur.
- E* Huic anulo maxilla ſuperior, libera inferiori, catenula alligatur, ut caput immotum ſeruetur, ac interim neq;  
uox, neq; reſpirationis uinculorum aliâs occaſione præpediantur.
- F, F* Diuerſa nonaculorum genera, quibus ſpongia accumbit.
- G* Culcelli, ad earum ſpeciem formati, quibus calami adaptantur.
- H* Vulgaris qui menſæ adhibetur culter.
- I* Grandis ac ualidus culter.
- K* Cultri è buxo parati.
- L* Hamuli.
- M* Vary ſtyli, unâ cum ſiphone.
- N, N* Obliquæ acies cum filo craſſiore, quibus literarum faſciculos colligamus.
- n* Minores acies, quas uulneribus ſuendis accommodamus.
- O* Serra.
- P* Forficula.
- Q* Malleus ligneus.
- R* Arundines, inſtando pulmoni & alijs quibuſdam partibus idoneæ.

*S* Filum aneum, osibus necedens aptum.

*T* Subula forandis osibus parata.

*V* Varia subularum ferramenta.

*X* Forpex, intorquenda filorum extremis comparatus.

*Y* Forpex, quo moriri, & ossa iam committentis filii reliquias præscindimus.



VANDO QUIDEM superiori Capite in nonnullorum instrumentorum mentionem incidimus, quibus ad Anatomen utimur, quumq; non infrequens horum similitumq; in subsequentiis libris sermo occurreret: haud abs re fore duxerim, ea omnia obiter, ut in huius Capituli figura exprimuntur, utq; dissectionum studiosis ad manum esse debent, recensere. Primum itaq; plures comparandi

*a* *F.* sunt <sup>a</sup> cultri, quibus tonfores in abradendis pilis utuntur, & quos vulgò nouaculas dicimus. ac harum quasdam acutas esse conuenit, quasdam uerò retusiores. *Nouacula.*

quamuis istarum maior semper, quàm ipse uelis, futura tibi sit copia. Eligendæ sunt minores & leuiorès: quamuis etiam grandes aliquot adesse, nihil prohibeat. plures uerò coemendæ sunt, quòd leui quaq; occasione in membranis, aut tendinibus, ligamentisq; findendis corrumpantur: & quum fragili admodum constent ferro, promptè exiliant, præcipuè si nouas, & acuendo non detritas, operi adhibueris. Quibusdam ex his, & potissimum minoribus, illud ferri tuberculum non inutiliter aufertur, quod cultrum extra manubrij rectitudinem extendi prohibet. atq; id tunc in primis tentandum uenit, quum nullæ reperiuntur nouaculæ obliquo extructæ manubrio: quales illæ sunt, quibus nostrates & Galli tonfores utuntur. Italis enim, ut & Anglis ferè, rudes, & magnis erectisq; capulis seu manubrijs præditæ nouaculæ sunt in usu: quarum capuli subinde in obliquis sectionibus, quo minus scilicet manum ex sententiâ inflectas, obstaculo sunt. His <sup>b</sup> paruos cultellos, quibus calamos adaptamus, addere oportet: & ex his nonnullos orbiculato cuspidè, nonnullos uerò oblongo acutoq; esse conuenit. Horum autem potiores sunt, penitus ferrei: alijs enim,

*Parui cultri, quibus calami adaptantur.*

quum transuersa ligamenta scindere conamur, capulus promptè frangitur: ipsumq; ferrum imbecillius, emollita nimirum ex calidæ aquæ lotionè resina, in capulis firmatur. Prorsus respuendi sunt incuruati, ac falcibus similes: quoniam solo propemodum mucrone inter dissecandum utimur, qui intorsum in curuis illis cultellis reflexus, difficulter transuersis ligamentis, & potissimum per uniuersam internam digitorum sedem, subijcitur. Præterea non inutiliter adhibentur <sup>d</sup> cultri aliquot illorū, quos mensæ apponimus. quorum unum & alterum maiorem esse conuenit, sed retusum & crassum, ferreumq; potius quàm chalybeum, aut saltem non impense fragilè. Si uisum fuerit, poteris his

*r'ulgares cultri.*

*e* *K.* adicere <sup>e</sup> duos è buxo, aut ligno guaiaco confectos: atq; ex his alterum tenuem & oblonga cuspidè scindes, alterū uerò latum & orbiculari cuspidè esse fines. Verum illos rarò admodum sectionibus adhibeo, quum retusiores nouaculæ

*Buxei.*

*f* *L.* semper sint ad manum. Licebit etiam <sup>f</sup> hamulos duos effingere, illos referentes, quos Capituli initio appinximus. Consueui autem illos parare ex furculis, quæ Italarū mensæ indies apponuntur, & à pyramide nomen sibi uendicant. Si enim utraque eiusmodi furculæ crura magis lima attenuaueris, & dein eorum apices obliquè nonihil instar semicirculi inflexeris, hamulum tibi elegantem paraueris, cuius mucrones lima ex arbitrio acuerè est integrum. atque ita unum hamulum obtusiozem, alterum uerò acutiorè comparare iuuerit. Quamquam interim relictis hamulis, unguis subinde operi in eleuandis quibusdam

*Hamuli.*

*e* *1* *musc.*  
*tab. charad.*  
*h. 3. 3. 3. 3. 3. 3.*  
*6. 3. 3. 3. 3.*




busdam corporibus utilius adhiberes, nisi sinistrae manus umbra sectionē ob-  
 tenebraret. Insup<sup>r</sup> styl<sup>s</sup> longos, breues, & crassitie uarios, ex argenteo aut  
 aeneo filo tibi dissecari curabis, & quosdam ex mollissimo maximeq; sequaci  
 plumbo, ab aurifabro quopiam educi trahi;q; instar filorum fines. Hi enim unā  
 cum porcinis aliquot fetis, ad uarios usus, & praesertim ad obliquorum du-  
 ctuum foraminumq; naturam inueniendam, mirē conferunt. Iuuerit quoq;  
 syphonem adesse, si fortassis illum per penem aliquando uesticaē indere libe-  
 ret, ut in eo opere redderis exercitator. Et quemadmodum nucleum sy-  
 phoni affinximus, ita quoq; quibusdā stylis illum adhiberi, & quosdam etiam  
 syphonis modo incuruari conduxerit. Neq; profectō mediocriter utiles sunt  
 styli aliquot, instar mediae canal<sup>is</sup> extructi: ita nimirum, ut syphones paran-  
 tur, in quorum cauitatem sectio tentatur, ex qua ē uestica calculus euellitur:  
 aut ad eam stylorum formam, in quibus pilosi serici textores sericum in pilos  
 seriatim secant. Conferunt namque illi styli in sectionibus, quibus membra-  
 nam longa sectione diuidimus, cauentes, ne quid subditorum aut in membra-  
 na complexorum laedatur. <sup>a</sup> Acus quaedam habere conuenit, instar Cliterae, <sup>b</sup> N.  
 aut (obliquatas. quod ilico praestabitur, si uulgares acus ignitas, ac ueluti du-  
 ctiles redditas, obliquaueris. Conduxerit uerō has esse magnas & paruas, ut fi-  
 lum funiculosq; graciles transmittant. Praeter incuruas has, & retusiori quasi  
 cuspidē praeditas acus, tales quoque ad manum sint, quibus in consuendis uul-  
 neribus utimur, aut quibus chirothecae aut pelles alioquin consuuntur: ut cu-  
 tem aliquando fuere ualeas, quoties metuis, te absente, aliquid à spectatori-  
 bus discendi cupidis uitandum. His acubus <sup>c</sup> filum adaptatur sericum, quo uulne-  
 ra committuntur, aut peculiare aliquod, si fortē quāpiam confuta dissolui tur-  
 bariq; ab alijs, quum abes, ueris. Caeterum ad uasa religanda, communi illo  
 utēris filo, quo literarum fasciculos colligamus, quod praestantissimū ex Ger-  
 mania in Italiam adfertur: apud alias autem nationes imbecillius & crassius,  
 minusq; intortum & laeue reperitur. <sup>1</sup> Forficula, non nisi abscindendis post li-  
 gationem funiculis est accommoda, quod etiam quouis obitur cultro. <sup>m</sup> Ser-  
 ra uerō, quam interdum operi adhibemus, ea cōducet, qua gangraena, aut eius  
 generis affectibus uitiata membra praescindimus: cui muneri illae magis sunt  
 idoneae, quae à pectinum artificibus petuntur, quam quae impense tenues, &  
 ob id nimium uibratiles, apud chirurgos magno supercilio seruantur. <sup>n</sup> Mal-  
 leus, si quando illo ad <sup>o</sup> grandiore<sup>m</sup> cultrum impellendum, quum aliorum a-  
 nimalium effringes caluarias, aliud <sup>p</sup> ue os illo discindes, quiuis ferē erit accom-  
 modus. Non inopportunē etiam ex arundinibus oblongi aptabuntur <sup>r</sup> cala-  
 mi, quibus minister aliquis hoc illud <sup>s</sup> ue corpus commodius quā folle infla-  
 re possit. <sup>t</sup> Forpicum uerō, quibus aeneum filum in osium compactione in-  
 torquemus, & <sup>u</sup> aliarum, quibus id praescindimus, uti & <sup>v</sup> subularum, & <sup>w</sup> aeneo-  
 rum filorum, & dein <sup>x</sup> instrumenti cuiusdam, quo ossa promptē terebrantur,  
 rationem, in praecedente Capite complexi sumus. <sup>y</sup> Asseres uerō, quibus ma-  
 gno usu uiuas obimus sectiones, paratu quoque faciles sunt: & illos ad  
 finem septimi libri describemus, ubi uiuorum per-  
 sequemur Anatomē.


HUMANI

fig. occur-  
rens in con-  
textu cap.  
19 lib. 7. et  
in infima  
sele figurae  
in fronte  
operis po-  
sita.

HUMANI COR-  
SIMUL COMPACTO-  
FACIES.

PORIS OSSIVM  
RUM ANTERIOR








CORPORIS  
POSTERIORI

HUMANI OSSA,  
FACIE PROPOSITA.









*minus brachy, canna, arundo minor brachy.*

Y 1,2,3 Cubiti inferius os, ulna nobis dictum, eisdemq; cum toto cubito uocibus donatum. כפוף חסר  
hamud batakthon. Facile maius brachij, carna, ac arundo maior & inferior brachij. Huius processum, m se-

υ. cunda figura v insignitum, Græci nuncupant ὠλεγεσθων, λυβερρ, ἀγνῶνα: Latiorum quidam gibberum, ξ. gibbum. Additamentum necatum. Processus autem ξ insignitum, ac stylum referēs, συλοειδὴς nuncupatur.

Z, Z<sub>1,2,3</sub> Brachiale.  $\lambda\epsilon\alpha\tau\epsilon\varsigma$ . Palma quibusdam.  $\text{רס}$  rasegh. Rascha, raseta. ascam, offa rasete.

Γ 1,2 Ποσibrachiale, μετὰ ἀφ' ἰοιοῦ, ἀφ' ἰοῦ, ἑξήϛ' αἰς, αἰς ἰοῖοιοῦ, permultus palma, pectus manus, pecten. מוסרס  
 בַּת הַיָּד mafech chaph haiad. al'elamust.

Δ<sub>2</sub>Δ<sub>1</sub>Ι<sub>2</sub>Δ<sub>3</sub> *Digiti*. δακτύλοι *hezbathoth*. *Horum* ossa dicitur φαλαγγες, σκευτελίδες, κροτύλοι. *Agmina*, acies, articuli, intermedia. Den fingulis digitis priuata tribuuntur nomina. Pollex enim, seu primus, dicitur μεγας, ἀντίχειρ, *magnus*, *promarius*. Secundus, δαχτύλος, *index*. Tertius, μέσος, *medius*, *impudicus*, *infamis*, *uerpus*. Quartus, πέγδάμος, ἰατρίδος, *anularis*, *medicus*, *cordis digitus*, & potissimum *sinister*. Quintus, μικρός, *parus*, *minimus*, *auricularis*.

Θ 12,3 Offa sacri ossis lateribus commissæ, quorum utring. unum est, in tres veluti sedes (etsi cœtinuum sit) à dissectionis professoribus distinctum. ac prima quidem o. insignitur, illius o. nuncupatur, αλαρχαω, habet bezem  
 w. hachefel. Altharia, anche, interdu. lumbare. Secunda autem sedes, mediæ, ac w. insignita, cœcidio o. nuncupatur, יסאך, עזב חיר, bezem baarech, coxa o. quibus nominibus plerq. totum o. etiam uocatur, uti &  
 p. αλφαιον. Althaurat, pixis o., sed ualde perperam. Tertia uero sedes, anteriorq., ac & insignita, p. bis o. dicitur, w. g. pectine, הטרור, גבי gabe haberna, גלעצא, belhaua. Peni o. pudibundū, & fenestrau o. hoc etiam barbari femoris o. subinde appellat. ant. Uterum uniuersum o. ftebris dicitur עזבור גב הטרור  
 hazamoth gba haberna.

s 1, 2, 3 *Coalitus pubis ossium. uerum priuatim cartilago hic insignitur, eorum ossium unionem interueniens.*

Λ 1,2,3 *Femur, seu femoris os, femur.* *μῦς* *פֶּחַד חֵירֶךְ* *pachad, haiarech.* *Os coxa, coxa, agis, ancha os.* *Quibusdam*  
*crus appellatur.*

τ 1,2,3 Exterior femoris processus, qui rotator & natis ferè nuncupatur, το χαρτὴς μέγας, γλατὸς. Malum gra  
v. natum testicularum. θάρυκα, trachametra maior. Minor uerò interior ᾧ processus, v. insignitur.

¶ I, 2, 3 *Patella*. μύλη, ὡς μύλης, μυλακρὺς, κέγχχι, κέγχχ, ὡς γονατῆς. Ἰδιότα, scilicet forme os, genu rocula.  
הַיָּן אִם מִגֵּן הַבְּרִיבָה hayn am maghen baharcuba. Oculus genu, polus, adiacen, raga, alrafafe, aresfatu.

ΠΣ 1,2,3 *Hæc pars uniuersa Celso cruris nuncupatur. quonquã Galeno οὐλ & dicitur, quicquid à coxæ dicitur offe, ipfis uē  
inguinibus, ad extremum usq; digitorum pedis pertinet: femur nimirum, tibia, & pes ipse. Nominatur itaq; se-  
cis pars hæc, Π & Σ inter se pra, tibia, ἄνω μὲν, πρὸς soch. Quibus nominibus huius quoq; sedis orandus inte-*

Φ. *rus*, & cui Φ *inscriptus*, obuium est, quod tibi os ferè nuncupamus, πικνύμιον, & interdum ἀντικνύμιον appellatum, קנה החרור *chane habadol*. *Focile* maius, & *arundo*, & *canna* maior, seu *domestica cruris*.

Υ. Ceterum exterius graciliusq; os, Υ insignitum, ac fibula nobis dictum, appellatur *πρόδον, παρακνήμιον*. *Sura*. *הסן קנה chane hachaton*. Focile minus, canna, & arundo minor cruris.

φ, χ 1, 2, 3 Inferiores tibiae ossis & fibulae sedes, malleoli appellatae, φ, χ, α, ω, τ, ω, τ. Latinorum autem nonnulli male tali  
 appellantur. הקיים בשני קצות הכובטים שני שית chez gaouth habolettin miscene hachanim. Claviculae, ca  
 nulle, cababin. Ac φ quidem anteriorem indicat malleolum, χ autem posteriorem.

Ω 1, 2, 3 *Talus*, ἄσφαλός, ὅ, ἄσφ, ὅ. Latini interpretibus quibusdam parum recte malleolus appellatur, fortassis huc quondam non Anatomicorum sententia ductus, qui τῷ σφίγγει malleum, neutro autem genere τὰ σφύα ἰστος potius significare contendunt: חֶאֱרָסֶהוּ hacharsel, עֵרֶסֶהוּ haarcchom. Baliste os, *sen* balista nux, *camille*, *chahab*, *allochi*.

2,3 Calx. πῶλον, χαλκῆς. Calcis os. כבשן haachen. Alrip, calcar pedis.

b 1,2 *Oscymbam scapham* ue referens.  $\sigma\alpha\alpha\phi\epsilon\sigma\delta\iota\varsigma$ . *Nauculare, nauiforme*. עֵצֶם הַשִּׁיטָה אֵי סִפִּינָה לִטְנָה *hezem*  
*hafsane, aut sephinachotena.*

c, c 1, 2, 3 Hæc pedis pars, quatuor efformata ossibus, nobis iarsus, ut & Græci, ferè nuncupatur. ראַפֶּסֶף. Rafeta pedis, d, e, f, dis, & ossa rafeta pedis. Tria autem interiora, d, e, f, insignita, primum χελυκοειδῆ quibusdam appellantur.

g. extitum uero, ac g. notatum, uocamus os cubum cesseram'ue referens. κυβοειδης, πλῆμορφον. Cubiforme,

quadratum. כררי *chardij*, ערר *hezem nipir<sup>at</sup>*. *Grandinosum, uarium, nerdi.*  
*h, b 1, 2, 3* *wedlop, planta, planu, nefligium, & solum.* μετά ταρασ, & σφιδ. *Pellus, & pecten.* מסרס תרגל *masrech*

hareghel. Alfelameet.

k<sub>1,2,3</sub> Charattere q' oscula notantur scamina, חסאס מוסדית תלמידיהת helhefeminiath. Alcfeminiæ.

LIBRI PRIMI FINIS

# ANDREAE VESALII

DE CORPORIS HUMANI FABRICA LIBER

SECVNDVS, LIGAMENTIS OSSA CARTILA-

ginesq; inuicem committentibus, & Musculis, uoluntario-

rum motuum instrumētis, dedicatus: & figuras ipsi

proprias, uti nunc describetur,

proponens.




*TABLEÆ* seriatim modo sequentes, omnibus serè secundū libri Capitibus communes erunt. Prima enim quatuordecim, integros exprimunt homines: harumq; ordine prima, anteriorem uiri faciem delineatam continet: secunda latus ostendit: tertia, quarta, quinta, sexta, septima, octaua, anteriore faciem quoq; proponunt, in hoc illud uel latus, pro musculorum, qui indicantur, natura & situ, magis repositam. Sex uero octauam consequentes, posteriorem corporis faciem referunt, omnes prope modum ita effigiatæ, ut musculi in præcedente tabula omnino conspicui, in sequente resecti, ab infertione pendeant. Deinde omnes tabule ita inuicem congruunt, ut uni, quæ anteriorem exprimit faciem, alia succedere possit, posteriorem exhibens. Integrum namq; erat, tertia subiungi nonam, mox quartam, dein decimam: insuper quintam, illi uero undecimam: postmodum

sextam, ab hac duodecimam: deinceps septimam, quam sequeretur decimatertia: cui rursus succederet octaua, & huc decimaquarta. Unde etiam non inopportune feceris, si utraq; serie has musculorum tabulas intuearis, atq; quid singule potissimum expriment, ex ipsarum earundemq; characterum indicibus obiter requiras, quò promptius a Capitulo contextu ad eas recurras. Per paucis enim secundū libri Capitibus peculiare figuræ præponentur: ijs nimirum duntaxat, quorum musculi communibus figuris scire omnes exprimi nequiverunt. in quorum numero sunt, oculum mouentes musculi, laryngis musculi, peni peculiare, & recto intestino & ceruicis uesica propriæ. Dein primi Capitis frontis tabella adhibebitur, ligamentorum differentijs ostendendis præcipue apta: & secundū Capitis initium eas ostender figuræ, quæ musculorum compositioni intelligendæ sunt idoneæ.

Porro non suffecerit, in una tabula musculum aliquem intueri, etiam si illum caractere insigniuerim: sed ut uideas, ubi nam quisq; emineat, alteri uel succumbat, passim tibi uenit inquirendus, & potissimum spectandus, ubi totus se offert, quod serè fit, ubi peculiariter uni musculo plures characteres adhibentur, præcipue quum is extra aliorum ordinem musculi Græcis caractere peculiari notatur. Quod uero in integris tabulis, musculorum effigies ita digesserim, neq; singulis Capitibus singuli articuli cum suis musculis appicti sint, ea potissimum occasione factum puta, quod illi, si priuatim articuli pingerentur, a nemine, nisi Anatomes peritissimo, possent distingui. Nunc autem, quum omnia cohererent, cuius obuium est, quæ sede quisq; musculus reperiatur: adeo sane, ut prorsus fuisset operæ precium, integras ad hunc modum tabulas delineari, quantumuis etiam scorsim articuli fuissent expressi. Insuper si singulis Capitibus suos musculos adhibere, uel aliqua ratione necessarium fore putassem, non hoc usu studiosi caruissent: quandoquidem præter simptum, nullus labor in super mihi impendendus erat. Ex his namque integris tabulis necessario sculptis, particulas singulas articulos uel scorsim transciendos dare, non maioris mihi esset opæ, quam ex chartis, quibus tabule iam impressæ sunt, nunc caput, nunc brachium, nunc crur aut thorace, utut nissim esset, abscindere, & sculptori offerre. Ad hæc, idem semper labor lectori in uertendis folijs impendisset, quum eadem pagina & musculorum effigiem, & characterum indicem, ac deinde musculorum descriptionem historiamq; continere nequeat.



PRIMA  
MUSCULO-  
RVM TA-  
BULA.





PRIMAE MUSCULORVM TABVLAE  
characterum Index.

PRIMA tabula anteriorem corporis faciem exprimit, à quo cutis cum adipè, & omnibus in superficie extantibus nervis, venis & arterijs reiecta, nulla etiam relictà carne vocatè nobis membrana portione, vel in illis sedibus, quibus hac musculosa euadit, quaq; omnes in tertia potius tabula, iam multis locis dissecta, quam in hac expressimus, ut ista simul cum secunda & nona illis carne & membrana sedibus non ita obscurarentur: qui commodè id inuicem proponerent, quod pictores & sculptores in musculorum ratione solum ferè expendunt. Verim quid aliè potissimum commonstrent tabule, ipsarum characterum edocebit index. Præsentis autem tabule characteres, ut modo subiiciam, se habent.

- A Glandule quamplurimæ notantur, quæ sub aurium radice, ad posteriorem inferioris maxillæ sedem repositæ, cavitatem hic opplent, tutaq; vasorum distributioni præficiuntur. Hac sede, quæ glandula reponitur, citra characteris adminiculum, præfisse hic auris foramen obseruatu est facillimum.
- B Sinistri lateris musculus, ab inferiori maxilla in os v referens insertus.
- C Musculus à pectoris osse pronatus, qui cum suo coniuge inseritur in os v referens.
- D Musculus gracillimus, à superiori scapule costâ, in os v referens insertus: ac in quarta musculorum figura U & T, in quinta autem R & S notatus. Sedes, quæ utriusq; ad lierè D latera iussit, canaq; est, nervos continet sexti parvis nervorum cerebri, interioribus utriusq; angularibus, & arterijs soporadibus concomitatos.
- F Musculus, à pectoris osse & clavicula, in mamillarem temporis ossis processum, carne insertione implantatus, & caput mouentium septimi parvis alter.
- G Portio musculi scapulam mouentium secundi. Præsentis musculi aliud nihil hic est conspicuum, quàm quòd in claviculam, & summi humeri sedem clauiculae connexam, inseritur. Verim in nona figura totus apparet musculus, Γ & Δ insignitus.
- H Sedes hæc iugulares venas exteriores transmittit. quare etiam citra omnem musculi distinctionem, in iuiis (nisi forte qui spiritum validius contineant, iugularesq; turgidas reddant) solum cana apparet. Vena autem hinc resecta, & mucosus quibusdam membranulis ademptis, ille occurrit musculus, quem D insigniui: & etiam unus, qui à prima thoracis costâ, in anteriorem transversorum processum cervicis vertebrae sedem inseritur, C in octava musculorum tabula notatur.
- I Clavicula anterior sedes, quæ excarnis occurrit.
- K Musculus brachium attolles, cuius principium à clavicula, summo humero, & scapulae spina enascitur: atq; hic ipsius pars spectatur, à clavicula & summo humero pronata.
- L Musculus, brachium pectori adducens.
- M Pectoris os, ex carne apparet. nam musculus pectori brachium adducens ad ossis latus, primum carnes esse incipit, & quamvis dexter sinistram nervoso, & membrana modo tensi exortu continat, ob hoc tamen in iuiis adhuc hominibus pectoris os non prorsus occultatur.
- N Sub axilla N latitat, partem notans musculi, brachium deorsum uersus dorsum detrahentis, ac sequenti tabula Γ indicandi.
- O, O Hæc digitorum imago, musculi aliquot insertiones indicat, qui in octo superiores thoracis costas insertus, ipsi rationi famulatur, & in octava musculorum tabula F & F insignitur.
- P, P Ista digitorum effigies, exortus est musculi abdominis obliquè descendentis, quem pluribus characteribus hic notare non libuit: quemadmodum neq; recto etiam abdominis musculo notam adhibui, quod prorsus adhuc sub obliquarum nervosiss tenuitatibus, & musculo brachium pectori adducente, reconditus sit: utcunq; etiam tubera, quæ secundum abdominis longitudinem porrecta conspicias, recti abdominis musculi sint. quæ quo minus extuberent, obliquorum tendinum tenuitatibus non inhihentur: quemadmodum neq; cutis crassities in non admodum obesi obstat, quo minus eadem ante sectionem spectentur.
- Q Anterior cubitum spectentium musculus.
- R Sub axilla R reconditur, notans dicti iam musculi, interioris capitis carnosam partem, peculiaris musculi ritu hic extuberantem.

S, S *Musculus posterior cubiti flexorius, quem duobus insigniui characteribus, ne sedes illis characteribus notatas, diuersos esse musculos quis arbitraretur.*

T *Musculus ab inferiori scapula costa enatus, cubitiq; extensioni subseruiens.*

V *Superior musculus eorum qui ad iugum in prouum agunt. Ceterum quoniam praesentis figurae cubitorum & manuum non eadem sit facies, haud inopportune dextro & sinistro lateri V ac subsequentes aliquot characteres adhibui.*

X *Musculus, ante indicem postbrachiali insertus, idq; flexor.*

Y *Musculus, latum tendinem in manum producens. Sedes autem, quae utriusq; ad huius tendinis latus in cubiti longitudine protenditur, nulloq; characteri insignitur, musculus est flexionis secundi quatuor digitorum articuli autor, quem quinta figurae O indicat.*

Z *In dextro cubito indicatur musculus, ab interno humeri tubere principium ducens, qui recto brachialis ossi inferius, brachiale flexit.*

a *In utroq; cubito musculus notatur, radium in supinum ducens: qui ab humeri osse natus, inferiori radij appendici implantatur.*

b *In utroq; cubito musculus insinuat, bicorni tendine brachiale extendens.*

c *In utroque cubito indicantur duo musculi, ex uba originem ducentes: quorum unus tendinem brachialis ossi offert, pollicem sustinenti: alter in binos dissectus tendines, unum primo pollicis ossi, alterum secundo & tertio inferi.*

d *In sinistra manu hic occurrit tendo musculi, pollicem uersus indicem euerteris.*

e *In sinistra manu spectantur tendines, in exteriorem indicis sedem exporrecti.*

3, 4, 5, 6 *In sinistra manu notatur transversum ligamentum, in cubiti externa sede conspicuum. uerum numeri characteres seorsim indicant, quot in hac manus superficie sinus anuliq; dissecantibus apparere possunt. Sunt autem omnes quatuor radio proprii, illisq; tendinibus adaptati, in quorum regione numerus conspicis. In dextro cubito etiam & spectatur, idem quod in sinistro indicans.*

f *Musculus in dextera manu spectatur, externum uolae latus occupans, ac paruum digitum à ceteris abducens.*

g *Ad internum latus musculi insigniui, se offert portio musculi duorum parui digiti primum os flexientium exterioris, seu os illud in externum latus magis inflexens.*

h *In sinistra manu, sedes musculi indicatur, pollicem indici proximè adducens.*

i *In dextera manu musculus occurrit, pollicem ab indice plurimum abducens: atq; ad demissus huius latus, portio eius musculi insitit, qui primum pollicis os flexientium est superior.*

k *Tunica, testem ac ipsius uasa seminaria inuoluens, quae hac in uiris prorepunt. Mulieribus enim hac uasa, cum reliquis generationi famulantibus organis, in alto corporis reconduntur.*

l *Ad sinistri testis latus occultatur, notans glandulas cavitatem hic in inguinibus replentes, quae insignis uenae cum arteria crui adi. Glandulis enim repletis, hic magnus exurgere sinus.*

m *Musculus, à pubis osse in femur procedens, & in octaua tabula Z notatus, femurq; mouentium octauus.*

n *Hic prorepunt duo musculi, quorum alter femoris motorum sextus habebitur, in octaua tabula O notandus: alter uero septimus, in eadem tabula A indicandus.*

o *Ab ilium osse pronatus musculus, qui tibiae insertus, illius motorum primus est.*

p *A pubis ossum commissura enatus musculus, ac tibiam mouentium secundus.*

q *Sextus inter tibiam mouentes musculus, cuius carnosae substantiae hic conspicitur: tendo autem ipsius adeo tenuis est, ut subiectorum illi musculorum circumscriptionem non obliueret. Quapropter etiam priuatim hic se non ostendit, quemadmodum neq; in secunda musculorum figura. in tertia tamen & quarta, adhibita si licet sectionis quadam ratione, utcunque oculis subijciatur, in hac quidem characteri 3, in illa uero Q notatus.*

r *Praesens musculus, etsi cum alijs inibi ad superficiem repositus, nuper dicto membraneo tendine sexti tibiam mouentium musculi obducatur, attamen sese ostendit: quemadmodum neq; in musculosis, integra adhuc cute, confectum fugit. Notat autem r priuatim septimum tibiam mouentium musculum.*

s *Musculus supra coxendicis ossis articulum principium ducens, & inter tibiae motores nonus. Verum & hic membraneo obtegatur tendine, musculi tibiam mouentium sexti.*

t *Musculus,*

- 1 Musculus, femoris os uniuersum quodammodo amplectens, tibiamq̃ mouentium oclausus, sexti etiam musculi tendine hic obiectus.
- 11 Sedes hæc ut notata, ad sinistrum spectatur genu, estq̃ quarti tibiam mouentis musculi pars.
- x, y Tota hæc tibia osse regio excarnis est, nulloq̃ obtegitur musculo.
- 2 Musculus, pedis motorum ordine sextus, ac per transversum ligamentum in anteriori tibia sede positum, & ad indicandum, descendens, pedisq̃ osi pollicem sustinenti insertus.
- a Musculus, quatuor pedis digitos extendens, qui sub musculo 2 insignito, maxima sui portione occultatur.
- β Quatuor digitos extendentis musculi portio, quæ pedi in anteriora attollendo suppetias ferens, pedem mouentium nonis censetur.
- γ Pollicem extendens tendo. Carnosa autem musculi hunc tendinem educentis pars, in alio alijs subijcitur musculis.
- δ Transuersum ligamen, in anteriori tibia sede locatum, & quatuor ultimo notatis musculis uiam porrigens.
- ε Exterior malleolus, seu fibula excarnis pars.
- ζ Musculus fibule exporrectus, qui in pedis os pollicem sustinens, inferionem molitur, ac pedem mouentium septimus numerabitur.
- η Musculus, ab externo femoris capite pronatus, & pedem mouentium secundus.
- θ Hunc charactere, & aliquot subsequentes, in dextro crure repositi, quod illis indicandi musculi, in eo sint conspectiores. θ itaq̃ notatur musculus, ab interno femoris capite pronatus, pedemq̃ mouentium primus.
- ι Tendo totius corporis gracillimus, ab illo enatus musculo, quæ ab externo femoris capite principium ducens, pedem mouentium tertius describitur.
- κ Maximus suræ musculus, à commissura fibula ad tibiae os enatus, pedisq̃ motorum facile robustissimus, & quartus.
- λ Musculus, quatuor pedis digitorum os flectens, modica sua parte hic se offert.
- μ Portiuncula quoq̃ hic uisitur, pedem mouentium quinti. Verum hæc, ut & musculi paulo ante in dextra potissimum tibia commemorati, dilucidius multo in dextra sequentis tabule tibia, quam hic modo conspiciuntur.
- ν Transuersum ligamentum, à tibia in calcem pertinens.
- ξ Musculus pollicem in internum latus agens, hicq̃ interno pedis lateri totus exporrectus.
- ω In dextro pede musculus notatur, pollicem alijs digitis adducens, seu illum in latus externum mouens. Apparent ad hæc, sub tendinibus musculi quatuor digitos extendentis, ac α notati, tendines indicem, medium & anularem in externum latus abducentes, qui commune sibi uendicant caput cum ea portione, quæ pollicis seruit, ac inscribitur.



AND. VESALII DE CORPORIS  
 SECVNDA  
 MUSCULO-  
 RVN TA-  
 BVLA.



SECUNDÆ MUSCULORVM TABULÆ  
characterum Index.

SECUNDA tabula prima, quod ad sectionem spectat, omnino correspondet, & in latus uersa, eisdem cum illa demonstrat musculos, una cum ossium sedibus, in superficie prominentibus, quod, ammodoq; ex carnisbus. Facies itaq; propemodum uniuersa, & caput quoq; quum paulo minus toto sit ossium, literis nisi paucissimis in hunc modum insignitur.

- A Temporalis musculus. Quicquid autem supra semicirculum hunc, quo temporalis musculus exortus circumscribitur, constitit, prorsus ex carne est.
- B Ossiuale. Foramen illud ad ossis huius terminum sese offerens, auditorius est meatus.
- C Musculus, à mandando maioris præcipue nuncupatus, & inter maxillam inferiorem mouentes secundus describendus.
- D Musculus, buccarum motibus subseruiens, qui ex una maxilla in alteram pronascitur.
- E Musculus sinister, ab inferiori maxilla in os u referens productus.
- F Musculus, à pectoris osse in os u referens insertus.
- G Musculus sinister, à superiori pectoris osse sede principium ducens, & in humiliorē cartilaginis scui imaginem representantis regionem insertus. Is enim, quum sub musculo F insignito latitet, non prorsus in latere hic conspectum fugit.
- H, H Musculus à superiori scapulae costa ad os u imaginis simile properans, qui ablato adipi, & ingulari externa hinc diuenter exacta, iuxta humilium H est conspicuus. Deinde superius H indicat etiam glandulas, ad auris radicem & internam inferioris maxilla sedem hic repositas.
- I A pectoris osse & clauicula principium ducens musculus, & in manillare temporis osse processum insertus.
- K, L Musculus scapulam mouentium secundus, ac K quidem notat superiore ipsius partem, quæ scapulam sursum trahit. L uero inferiorem, cuius beneficio scapula deorsum agitur. Ad dextrum latus L hic quoq; dextris musculi portio sese ita offert, ut ad sinistram natem, dextram hac quoq; figura conspicimus. Verum in nona musculorum tabula, utriusq; lateris musculus literis Γ & Δ est spectatissimus.
- M Musculus brachium attollens, qui longe accuratius in quarta figura Ξ, & in decima Δ indicabitur, quod ideo additum nolui, ne quis hunc musculum multis donatum impressionibus, plures esse ex uera hac integrâ delineatione sibi persuadeat, præcipue quum hæc impressiones, peritos sculptores pictoresq; ludant : quos non hic solum, sed & in toto externo brachij latere uelim esse attentissimos, quod male musculum, quem iam N notabimus, ueluti in cubiti exteriora potraherent. Quauquam sanè difficile sit, musculorum iniuria, quæ ab externo humeri tubere, & linea ab ipso sursum ducta, seriatim oriuntur, in mortuis pulchre exprimere: quod ne leui solum inter exorciandum cubiti flexione & extensione, musculi ab illis capitibus educti, in cubiti flexus regione flaccescant, aliumq; inflexum in mortuis quam uiuis ostendant. Unde etiam quum subsequentes aliquot musculorum explicato, abs te quoq; spectari uelim non æ tabule dextrum brachium: uti & decima tabula brachia, cum secunda figura secundi huius libri Capituli: quod scilicet in illis feliciter Naturam, quam in præsentis brachij musculorum S, T, U, X notandorum exortibus imitati fuerimus.
- N Quauquam ex subsequentiis characteribus nonnullos in utroq; brachio repositos cernis, tantisper tamen sinistro duntaxat animum adhibebis, donec & dextris meminero. N itaq; notatur posterior cubiti flectentium, qui in uiuis altius supra brachium attollentis musculi insertionem nasci uidetur, quam reuera principium ducit: licet hic non nimis inferius incipiat, sed (quod pictoribus animaduertendum est) fortassis etiam elatius quam deceat.
- O Musculus cubitum extendens, qui ab humeri capitis scapulae articulati ceruicæ principium adipiscitur.
- P Musculus cubitum quoq; extendens, cuius origo ab inferiori scapulae costa pendet.
- Q Hac sede duo dicti nuper musculi cubitum extendentes, in unum coeunt, non amplius duplicis musculi imaginem representantes. Quod autem hic insignius quam reliquis progressu extuberant, præter ipsorum partem summæ carnosam alius cubitum extendentium in causâ est, qui hic sub illis occultatus, ab humero seu brachij osse pronascitur, in duodecima figura X, in decimatercia autem d indicandus.
- R Hac parte cubiti extensionis autores in posteriorem ulnæ processum, & articuli ligamenta implantantur, neruicam suæ inferioris partem in triangularem hanc sedem porrigentes, quæ ex carnis ulnæ est portio.
- S Musculus ab humero enatus, qui in inferiorem radij appendicem insertus, radium in supinum ducit.
- T Musculus, bicorni tendine brachiale extendens.
- U Musculus indicem, medium, & anularem præcipue extendens.
- X Musculus, extensionis parui digiti primarius autor.
- Y Musculus brachiale extendentium inferior.



- a *Musculus brachiale stellentium inferior.*  
b, c *Duo hic indicatur muscoli, quorum superior b insignitus, brachiali inferitur: inferior autem, cui c inscriptum est, in duos deducitur tendines, unum primo pollicis internodio inferens, alterum duobus superioribus eiusdem internodijs implantans.*  
1, 2, 3, 4, 5, 6 *His numeris notatur transversum ligamentum, in exteriori sede cubiti repositum, in totq. rursus annulos diffusum, quot numeros scripsimus. 1 enim indicat ligamentum radio ulnaq. commune: 2 ligamentum ulnae proprium. 3, 4, 5, 6 uero insinuant quatuor ligamenta radio peculiararia.*  
d *Sedes muscoli, aut ipse etiam musculus, pollicem indici proximè adducens.*  
e *Tendo muscoli pollicem ad indicem euerterentis. Verùm modo tempestivum est, & dextro brachio animum accommodare: ac partim easdem notas, quas in sinistro spectasti, partim uero novas inueniri. Idem igitur significat N ac N, P, S, T, a, sed uix hic musculi a insigniti linea conficiuntur. dein b, c, & 4, 5, 6, & d ac e idem in dextra, quod in sinistra manu referunt. Ceterum priuata dextrae manus notae sunt huiusmodi.*  
Z *Anterior cubitum stellentium musculus.*  
f *Musculus superior radium in pronum mouentium.*  
g *Musculus superior brachiale stellentium.*  
h *Latum in uola producents tendinem musculus.*  
i *Musculus gibbam scapulae sedem occupans, qui extorsum brachium circumuertens, illud mouentium septimus numerabitur.*  
k *Musculus brachium mouentium tertius, quo illud retrorsum ad dorsum elatius, quam iam signando musculo ducitur.*  
Γ *Præsentem musculum, qui brachium mouentium quatuor habebitur, nona tabula O, & detectum adhuc magis decima Θ ostendunt. At quum externum secundum uicem ipsius latus nullibi opportunius quam in hac tabula ostendetur, hic ali quot characteres adicere erit opere precium. Est itaq. musculus hic, cuius beneficio brachium agitur deorsum, triangularis quodammodo figurae, cuius internum latus spinarum apicibus exporrigitur l, m. (qui praesenti musculo principium offerunt) ab l ad m pertinet. Exterius uero latus, quod a sacro offectursum n. oblique in priora ad intersectionem properat, ab m ad n usq. pertinet. n enim insinuat huius musculi partem, sua inferiori proximam, quæ circa alterius musculi dissectionem conspici nequit. Atq. hoc latus est, quod in prima tabula N notat, in sequenti uero U. & rursus longè accuratius dextrum septimae tabulae brachium O litera hanc intersectionem monstrat. Tertium latus ab l ad n porrigitur, quod transversum ductum, humiliori basis scapulae angulo inferitur. Atq. l etiam indicat huius musculi partem, musculo cui L inscripsimus subiectam.*  
Δ *Ne paruum o in umbra ad pectoris sedes plus satis lateret, Δ inibi positum habes, musculum in indicans, quo brachium pectori adducitur.*  
o, o, o *Huiusmodi formæ, quasi anguli acutioris ritu procedentes, intersectiones musculi sunt eius qui in octo superiores thoracis costas, manus modo inferatur.*  
p, p, p *Exortus abdominis musculi oblique descendens, qui mutuo cum musculi iam dicti, & aliquot o insigniti intersectionibus ingreditur. Quod autem in uniuersa abdominis sede conspicitur, obliquus ille est musculus: quamquam rectus abdominis musculus nonnihil propter obliquorum tendinum tenuitatem (quemadmodum & ante sectionem) hic extuberet.*  
q *Principium primi tibiae mouentium musculi, quem sequenti figura Σ notatum cernes. Hic autem in dextro femore q etiam indicatur.*  
r *Musculus tibiae mouentium sextus, qui latum producit tendinem, omnibus ferè femur amplexantibus musculis obductum. uerum quum iste membranae propemodum ritu tenuis sit, subditorum ipsi musculorum inspectionem multo minus quam cuius ipsa hic occupat. Musculum hunc in tertia tabula Φ, & in quarta characterè 3 notabimus.*  
s *Portio musculi tibiae mouentium noni, quem in quarta tabula Φ exprimam.*  
t *Musculus tibiae mouentium septimus, membraneo tendine sexti tibiae mouentis musculi obiectus.*  
u *Musculus sinistru femur mouentiu primus. Qui uero dextrum femur agit, etiam magna ex parte hic se offert.*  
x *Regio maioris exterioris uel processus femoris, quem rotatorem dicimus.*  
y *Conspicua, iam ablata cute, secundi femur mouentis musculi pars. Reliqua autem primo femur mouente musculo u. superius indicato, & illo quem latum producere diximus tendinem, quemq. r notauimus, occultatur.*  
α *Quartus tibiae mouentium musculus, qui hic externo ipsius latere est spectatissimus, ac nullibi in dextro crure apparet.*  
β *In utroq. femore tertius notatur tibiae mouentium musculus.*  
γ *In dextro tantum femore indicatur secundus tibiae mouentium musculus.*  
δ *In dextro crure bis δ posui, musculum indicaturus, quem quintum femoris motorem enumeraturus sum. In sinistro*



- sinistro autem crure à iuxta popliteum ponitur, quantum quoque eius cruris notans musculus.
- 6,3 In dextro femore indicator quintus semur mouentium musculus. ac e quidem huius musculi posteriorem partem indicat, 3 tunc posteriorem anterioris partis portionem, quanta scilicet sese hac figura (quod & de ceteris adhuc magna ex parte latitantibus musculis intelligendum est) spectandam offert.
- 7 Musculus hic extuberans, tibiæ mouentium octauus censetur.
- 8,8 Excarnis tibiæ ossis pars: uerum interior malleolus priuatiu & notatur.
- λ In utroq; crure suram constituentium indicatur musculus, quem pedem mouentium primum n. numerabimus.
- μ Musculus in utroq; notatur crure, pedem mouentium secundus.
- ν Gracillimus totius corporis tendo, à musculo enatus, qui pedem mouentium tertius habebitur.
- ξ Maximus suram constituentium musculus, ac pedem mouentium quartus.
- ω Musculus, tertius quatuor digitorum pedis flectens articulos.
- ρ Portiuncula musculi, qui pedem mouentium quintus erit.
- ς Transuersum ligamen, ab interno malleolo in calcem pronatum.
- τ Musculus pollicem in internum latus ab alijs abducens digitum.
- υ Ligamentum, musculo secunda quatuor digitorum internodia flectenti obnatum, & laci manus tendinis uicem in planta gerens.
- φ In utroq; crure & musculus modice conspicitur, qui in anteriori tibiæ sede locatus, pedem mouentium est sextus.
- χ Musculus fibulae exporrectus, qui pedis motorum septimus numeratur.
- † Musculus nuper dicto substratus, pedemq; mouentium octauus. huius tendo, ut & septimi, sub transuerso ligamento, mox Σ notando, est conspicuus.
- ω Musculus quatuor digitos extendens. ad latus autem sinistrum characteris ω, occurrit huius musculi portio, bi corni tendine in pedis os ante paruum digitum inserta, quam pedem mouentium musculorum nonum appellabimus, in quarta musculorum tabula Σ aptius expressum.
- ⊙ Tendo musculi, pedis pollicem extendentis.
- ⊕ Transuersum ligamentum, tibiæ ossi & fibulae commune, in utroq; crure indicatur.
- Ξ Exterior malleolus, seu fibulae ossis excarnis sedes, triangulum quasi referens.
- Σ Transuersum ligamentum, à fibula in calcem pertinens.
- Π Musculus, ab auctione parui digiti à reliquis autor.

TERTIAE MUSCULORVM TABVLAE,  
QVAM SEQVENS PROPONET PA-  
gina, characterum Index.

PRÆSENS tabula, anteriorem corporis faciem exprimens, in hoc à prima musculorum tabula differt, quod musculos ex carnosa membrana constitutos, & aliquot etiam faciei musculos, ab adipis admysum liberatos, commonstret: quodq; magis ad musculorum disciplinam, quam priores due, sit comparata, uti subsequens characterum index nunc insinuat.

- A Recte secundum fontem ductæ lineæ, frontis & superioris nasi sedis musculosam constitunt substantiam.
- B Temporalis musculus, supra quem carnea membrana fibris etiam carnis aliquando enutritur, & aures uscung. mouet.
- C Musculus, interiorem oculi occupans angulum, & palpebram attollens.
- D Musculus, palpebram deorsum trahens, & minorem exteriori uel angulum sibi uendicans.
- E Natus palpebræ musculorum secundum palpebræ longitudinem connexus.
- F Musculus, media sui parte nasi alam, altera uero superius labrum petens. Quemadmodum sane narium musculorum fibrarum in labijs implexum indicare non licuit, ita quoque characterum copia faciem alioquin satis obscuram, non sum aliter hic occupaturus.
- G Alatum, ac iugalis ossis anterior sedes, quæ prorsus excarnia sunt.
- H Musculus superiori labro proprius, ac à malo quasi à G pronatus.
- I Musculi maxillam inferiorem mouentium secundi origo, ipsaq; adeo iugalis ossis sedes, musculo iam Γ notando nix obiecta.
- Γ Musculus, carnosa constans membrana, & præcipuus buccarum laborumq; & anterioris colli cutis motuum dux, qui hic subditis sedibus in utroq; latere haret, reliqua carnosa membranae parte, quæ carnea non efficitur, K. L. à corpore iam resecta. Quod autem ad præsentis musculi fibrarum progressum attinet, K ad L usq; musculi principium notat, è regione ossis pectoris, ac mediæ clauiculæ sedis ossi pectoris proximè incipiens, cuius fibræ re-  
X. lo transite sursum ad X exporriguntur. Ab L uero ad N, principii pars notatur, è regione reliquæ sedis  
N. clauiculæ & summi humeri sedis incipiens, cuius fibræ obliquè sursum in anteriora porriguntur. Deinde etsi ea

TERTIA  
MUSCULO-  
RUM TA-  
BULA.





**O.** musculi pars, quæ in posteriori cervicis sede constitit, non sese spectandam offerat, nihilominus **O** ad auris radicem positum, transverſas fibras illic prorepentes utcumq; ostendit. Quare etiam in musculi lateribus describendus, primum latus tibi fingendum est ab **N** ad **O**, secundum ab **O** ad **H. K** uerò per **L** ad **N**, tertium indicabit latus. **A K** autem ad **N**, quatuor habet latus. Intensus enim nigricans linea, à **K** ad **N** ducta, dextri musculi cum sinistro interstitij loco habenda est.

**P** Brachium attollens musculus, quem hic in anteriore corporis facie **L, N & Q** circumscribunt, quanquam in **Q** ferius, quam **Q** constitat, sua infertione prorepat.

**Δ** Musculus brachium pectori adducens, qui in sequenti tabula simul uenit inspicendus. ibidem namq; à suis liberatus initij, **Δ** perinde ac hic notatur, isdemq; ferè characteribus ibidem atq; hic ita circumscribitur. **K** ad **L** usq; principij ipsius pars, à clavicula originem ducens. **K** uerò ad **R**, principij pars, ex media latitudine ossis pe-

**R.** toris pronata. Quæ etiam **R** notat musculi membraneam partem, quæ ad mucronatæ cartilaginis latus, oblique descendens musculi abdominis nervose tenuitati exporrigitur. **S** autem significat carneam musculi partem, à sexta & septima costarum cartilaginibus, propter obliquè descendentem abdominis musculum peculiariter exortam. **Q** presentis musculi infertionis index est, quæ inter brachium attollentem (qui **P** notatur) &

**Q.** priorem cubitum flectentium, **Z** indicandum, in humerum inferiur. Porro si latera ipsius, & fibrarum infertionem intueri animus sit, sequentem etiam inspectio tabulam, quæ presentis musculi infertionem, **Q & T** (qui character illi tabulæ est peculiaris) notatam exhibet: quo ad hunc modum, ambarum tabularum characteribus simul iunctis, quinque musculi latera metiaris. Primum à **K** ad **L**. Secundum à **K** ad **R**. Tertium ab **L** ad **Q**. Quartum ab **R** ad **T**. Verum in presenti tabula latam musculi infertio occultatur. unde etiam fit quintum latus, à **Q** ad **T** pertinet, in quarta duntaxat tabula esse conspicuum.

**U** Musculus brachium deorsum trahens, idq; mouentium quartus.

5, 6, 7, 8 His numeris, infertiones aliquot musculi thoracem mouentium secundi notantur. ac singuli numeri earum costarum, in quas hic conspiciæ infertiones sunt, sedes denotant.

**Θ** Abdominis musculus, obliquè descendens, qui cum suo coniuge iuniuersam abdominis sedem cooperit, & magnam quoq; thoracis sedem inegit. Presentis musculi exortus, qui è costis pendet, etiam quodammodo numeris indicatur, quibus secundi thoracem mouetis musculi infertiones significantur, quum scilicet exortus ille mutuo his infertionibus respondet. Cæterum **R** ad **X** albam excarnemq; abdominis offedit lineam, quam aliter simplici colore non datur exprimere. & quamquam fortè omnium exemplarij tabulas suis coloribus distinguere, esset quidam operæ precium, sumptus tamen quibusdam esset non admodum mediocris.

**X** Penis, sua cute, quam præputium uocant, liberatus.

**Y** Vasa seminaria, sua adhuc tunica, quam peritonæum educit, intellecta.

**Z** Musculus anterior cubitum flectentium.

a, a Posterior cubitum flectentium musculus.

b Musculus cubitum extendens, qui ab humiliori scapule costâ principium sumit.

c Musculus, bicorni tendine brachiale extendens.

d Musculus, radium in supinum ducens, qui inferiori radij appendici implantatur.

e Superior radium in prouum mouentium musculus.

**Λ** Musculus brachiale flectentium is, qui postbrachiali ante indicem inferiur. Ac si ipsius notat principium, g f, g, h. tendinis ex musculi uentre exortum: h sedem, qua tendo negligentijs secantibus desinere putaretur.

**Π** Musculus, latum manus producens tendinem, cuius caput i indicatur, tendinis autem ipsius principium k. at i, k, l. l locum insinuat, ubi tendo primum dilatescere incipit.

m Musculus alter inferiorq; brachiale flectentium, qui quarto brachialis ossi præcipue implantatur.

n Hic obscure uidetur portio musculorum, quorum alter brachiali, alter uero pollicis tendines offert: quibus in decima **Ξ**, & dein k & l inscribuntur.

o Excarnis primi pollicis internody sedes.

p Musculus, ab indice pollicem remotissimè abducens.

q Inferior duorum primum pollicis os flectentium.

r Musculus, minimum digiti maxime à reliquis in latus amouens.

**Σ** In dextro crure primus notatur tibia motuum opifex, cuius initium f insignitur, t tendinis illius principium, u sit, u. eiusdem infertio. Cæterum character 2, infertionem secundi notat tibiam mouentis musculi: 3 uerò, infertionem tertij.

**Φ** Sextus tibiam mouentium musculus, cuius principium x notat: y uerò sedem, qua carnosus esse desinit, membranaq; modo toti femoris amplitudini obducitur. Non licet alter ipsius tendinem membranam ue exprimere, quam hic modo in utraq; femore obseruatur: in quo tenuissimam ipsius partem, interiori femoris sedi obducitam, ueluti laceram membranam dissectimus, ut sectio aliquantisper membrana naturam commonstraret.



Quicquid enim ad externum inaequalis illius lineae sectionis uelatus habetur, ipsa adhuc est sexti musculi membrana, seu tendo.

- α *Musculus tibiae mouentium nonus.*  
 β *Oclauus tibiae mouentium, magis in sinistro crure, quam in dextro, à sexto tibiae motuum autore detectus musculo. Septimo tibiae mouentium musculo caractere non adhibui. nam etsi aliquo pacto sub sexto tibiae mouentium tendine, seu membrana, perinde ac in musculosis uiris sub cute, protuberare uideatur: hac tamen figura, nulla sui portione est detectus.*  
 γ *Inguinum regione indicantur musculi, quos femur mouentium sextum & septimum recensimus. Ceterum γ glandulae quoque inguinum insinuat, una cum sinu, ex quo uasa cruris potentia rescui.*  
 δ *Musculus femoris motorum oclauus.*  
 ε *Musculus, tibiae motus officium secundus, cuius tendinem character 2. demonstrat.*  
 ζ, η *Ex carnis tibiae ossis pars uerum & primum internum notat malleolum.*  
 Υ *Sextus pedem mouentium musculus, cuius exortum β indicat: u. autem principium sui tendinis, cuius ductus*  
 θ, η. *citra characterum appositionem manifestus est, quamquam ξ insertionis quasi ipsius sedem ostendat.*  
 ι *Musculus septimus pedem mouentium.*  
 μ *Musculi pollicem extendentis tendo.*  
 ν *Musculus quatuor digitos extendens.*  
 ξ *Musculus pollicem à ceteris digitis in internum latus abducens.*  
 ο *Transuersum ligamen, in anteriori tibiae sede positum, & facta sectione, hic in latera reflexum.*  
 ω *Tendo bicornis musculi pedem mouentium noni.*  
 ρ *Primus pedem mouentium musculus.*  
 σ *Pedem mouentium quartus musculus.*  
 τ *Longissimus gracillimusq. tendo, à tertio pedis motuum autore productus musculo.*  
 υ *Musculus, tertium quatuor digitorum os flectens.*  
 φ *Musculus pedem mouentium quintus.*

CHARACTERVM QVARTAE MVSCV-  
 LORVM TABVLAE, QVAM SEQVENS  
 proponet pagina, Index.

QVARTAE tabula quamplurimos praecedentis tabulae musculos, sectionis serie ademptos, demonstrat: & deinde periosq. qui prioribus figuris nondum in conspectum uenire, uidendos offert. quod omnes ad oclauam usq. musculorum tabulam subsequentes, tantisper praestabunt, dum ossa anteriori facie nuda occurrant.

- Γ *Musculus temporalis, cuius principium, semicirculo non ab simile, A, B & C circumscribitur.*  
 Δ *Ossis ingualis externa sedes, quae ex carnis est.*  
 E, F. *Alaster, qui inter musculos inferiorem maxillam mouentes secundus describitur. E huius musculi principium indicatur, à malo exortum. F principij ipsius portio, auri proxima. Atq. ita ab E ad F totus ipsius principij ductus secundum ingualis ossis longitudinem metitur. G infima musculi insertionis sedes notatur. Porro si musculum hunc triangulo assimilare lubet, E, F & G tres angulos tibi proponere finges: quorum tertius, G indicatus, tam est obtusus, ut etiam latus dici queat.*  
 H *Nervulus minoris radices tertij paris nervorum cerebri, hac frontis musculosam compagem & elatiorem palpebram petens.*  
 I *Nervulus dictae modo radices, ad superius labrum & externam alae nasi sedem propagatus.*  
 K *Cartilago, in quam sinistrum nasi os desinit.*  
 L *Ala nasi sinistra, dictae modo cartilaginis extremo alligata, incumbensq. Inter K & L, narium cute iam cum quibusdam membraneis ligamentis ablata, in conspectum uenit anterior alae nasi musculus, nimisquam tenuis.*  
 M *Musculus, à superiori maxilla in inferiorem insertus, ac buccae mouentium in altero latere secundus.*  
 N *Musculus sinister inferiori labro peculiariter, cuius sane corpus minori negotio, quam multiplex ipsius fibrarum inter se cito delineari potest: quod etiam in musculo M notato usumuenit. Auri autem foramen circa O appositionem sese ostendit: uti etiam auri radice subdita glandula, eum characterem quodammodo exprimentes.*  
 O *Vix conspicua est eius musculi portio, qui inferiorem maxillam deorsum uellit.*  
 P *Hac sede os u referens reponitur.*  
 Q *Musculus, à temporum ossis processu styliformi imitante enatus, ac ossi u referenti insertus.*  
 R *Musculus sinister, ab inferiori maxilla in os u referens, insertionem tentans, cuius coniuncta nonnihil quoque hic se spectandum praebet.*  
 S, T *Dexter & sinister ossis u referentis musculi, à pectoris ossis summo pronati.*

U, U *Musculus*

QVARTA  
MUSCULO-  
RVM TA-  
BYLA.





- U, U Musculus gracilis & longus, qui à superiori scapula costâ ossi v referentur implantatur.
- Θ Musculus capitis motibus subserviens, qui ab osse pectoris principium X notatum sumit: deinde aliam principii partem, T indicatam, à clavicula sedes pectoris ossi proxima, obtinet. Ceterum Z in sectione ipsius insinuat, Z. qua uniuersum mamillarem capitis processum amplectatur.
- a Clavicula, magna ex parte anteriori ipsius sede excarnis.
- b Musculi scapulam mouentium secundum latiore claviculae partem & summum humerum insertio.
- c Musculorum hic magnam obscuritatem parit uasa caput adueniunt, & nervi in brachium excurrentes.
- d Musculus, à clavicula in primam thoracis costam insertus, thoracemq; mouentium primus.
- Ξ Musculi brachium attolentis anterior pars: posteriorem uero decima ostendit tabula, adhuc in sua sede repositam, ac Δ præcipue insignitam. Proximè autem sequens tabula anteriorem hanc partem ab exortu liberam, e, f, g. reflexamq; ac γ notatam commonstrat. Porro in præsentia tabula, e, f & g conficiam hic musculi brachium attolentis partem, triangulæ ruit circumscribunt.
- h Musculi brachium pectori adducunt insertio, quam in dextro brachio Q & T notari, & ipsi musculo Δ Q, T, Δ. quæ, impositæ, ut hi characteres ad præcedentis tabulae notas referantur, ad quam quoq; K, L & R spectant. K, L, R.
- i Pectoris os, liberum ab iniuriis muscularum brachia pectori adducientium.
- 2, 3, 4 Secunda, tertia & quarta thoracis costæ, ad quas reliquæ seriatim subsequuntur: atq; in harum intervallis, exteriore musculi intercostales sunt obuii. Lineæ autem in costis ductæ, atq; ad characterum sinistram consistentes, ossa costarum ab eandem cartilaginibus determinant: sunt enim ille notæ cartilaginibus inscriptæ.
- k Musculus scapulam mouentium primus.
- l Musculus thoracem mouentium secundus.
- m In dextra axilla m latitat, musculi notas, quo brachium deorsum trahitur, idq; motum quartus nobis habetur.
- n Dexter lateris rectus abdominis musculus, hic altius q; oblique ascendens musculi nervosa tensio ascendens.
- o Abdominis musculus, oblique descendens, quem hic in posteriora ab abdomine reflexum sinxit.
- Π Abdominis musculus, oblique ascendens, ac totam sui lateris abdominis sedem amplectens. Hunc quodammodo circumscribit o, n, p, q. & lineæ secundum inferiorem abdominis sedem, adilius os, & coxendicis, & pubis ducta.
- p, q Portio abdominis muscularum oblique descendentium, quæ ad albam in abdomine apparentem lineam est relictæ. Ceterum q; priuatim significat penis constructionem, qui ad pubis os, quæ primum flaccidus, deorsum deinde propendet, dissectus est. Duo itaq; uelut insigniores circuli, duo ipsius sunt corpora: circulus autem sub illis consistens, meatus est, urinae seminiq; communis.
- r Ablatis iam testium & uasorum seminalium exterioribus inuolucris, testes hic cum suis uasis recta deorsum propendent.
- f Exterioris tunice testis ea hic adseruata est portio, quæ uocatum testis constituit musculum.
- t Musculus cubiti flectentium anterior, cuius interioris principij carnosæ, & hic in dextro brachio ualde conficiam parti, nullum adhuc characterem: quum is hic, uti neq; in sequenti tabula, adhuc auferri possit. Interuallum autem, inter duo ipsius apparens principia, humeri seu brachij os existit.
- u Musculus cubiti extendens, cui ab humiliori scapulae costâ principium præbetur.
- x, x Posterior cubiti flectentium musculus.
- y Musculus superior radium in prouum ducentium.
- α Musculus radium in supinum agentium longior.
- β Musculus quatuor digitorum secundos flectens articulos.
- Σ Musculus, qui ab interuiri hioneri inberet ortus, & ulnæ longitudini exporctus, brachiale flectit. ac γ quidem ipsius denotat initium: δ uero, ipsius in quartum brachialis os insertionem.
- y, δ. Alter brachiale flectentium musculus, qui à cubito sectionis serie reflectus, deorsum hic pendet.
- ζ Musculus, primum parui digiti internodum uerius exteriora flectens.
- η Hic musculus propendet, paruum digitum à reliquis in externum latus abducens.
- θ Transierum ligamentum, in interna brachialis sede obtinuit, tenditibusq; hac repentibus obductum.
- i Musculus maior primum pollicis os flectentium.
- x Propendet hic ab insertione musculus, cuius beneficio pollicem ab indice remouemus.
- λ Latus tendo manus, una cum ipsius musculo, à summis quatuor digitorum aciebus in dextera manu dependens. Præterea hic in utriusq; manus uola tendines occurrunt, mucosi membranis induti, atq; ad digiti os, quo illos flectant, protensi.
- μ Secundus femur mouentium musculus.
- ν Primus femur mouentium musculus, nonnihil hic quoq; sese offerens: quod tabula huius imago, ut externam tibie sedem magis ostenderet, in latus sit posita.
- ξ Ossis dextro sacri ossis lateri commissi sedes, à qua primum & sextum tibiae mouentes rescindimus.



- Charactere & sedes insignitur, maioris exteriorisq. femoris processus.  
 Nonus tibiae mouentium musculus, cuius initium supra coxendicis articulum incipiens, o notatur.  $\omega$  uero tendinis ipsius principium:  $\varphi$  autem sedes indicatur, qua praesentis musculi tendo subditis connascitur tendinibus.  
 Musculus femur mouentium septimus, hac descendens, se offert.  
 Musculus femur mouentium sextus, suo tendine cum septimo musculo hac prorepens.  
 In sinistro femore musculus  $\nu$  insignitur, femur mouentium oclauus.  
 Quinti femoris motibus seruientium musculi anterior portio hic spectatur.  
 Secundus tibiae mouentium musculus.  
 Oclauus tibiae mouentium.  
 Septimus tibiae mouentium musculus, in dextro femore insignitur, quod ibidem is sit conspectior.  
 Primus tibiae mouentium musculus, ab ilium ossis spinarectus, & a femore auulsus, ab insertione sua propedet.  
 Sextus tibiae mouentium musculus, ab ilium etiam osse liberatus, & a ceteris amplexantibus femur musculis, cuius modo abstractus, ab ea sede propendet, cui ualidissime iuxta superiorem fibulae appendicem inseritur.  
 Sextus pedem mouentium musculus, ab anteriori tibiae sede reiectus, huius hic procumbit, ipsius tendine ad insertionem adhuc relicto, quae in sinistro pede magis quam dextro est conspicua, ad characterem 6. quemadmodum & sub dextro genu, tendinis primi tibiae mouentium musculi insertio est eadem ratione asseruata, characteresq. 5 insignita.  
 Septimus pedem mouentium musculus.  
 Excarnis tibiae ossis pars, a cuius externo latere sextus pedem mouentium musculus ablatu est. Verum  $\varphi$  priuatim interiori notat malleolum.  
 Musculus quatuor pedis extendens digitos. Character 10 ipsius exortus insignitur. 11 uero ipsius sedes, qua portionem suam emittit, quam noni pedem mouentis musculi loco numerabimus, & hic  $\Omega$  notauimus. Ceterum character 12 musculi  $\Upsilon$  insignitae sedes inscribitur, quatuor tendines, quibus quatuor digiti extenduntur, pullulans.  
 Uti & iam paulo ante scripsi,  $\Omega$  musculus notatur inter pedis motores nonus, qui bicorni tendine in pedis os, paruum digitum sustinens, insertionem 13 indicatam molitur.  
 Musculus pollicem extendens.  
 Musculus pedem mouentium oclauus, hic sese parum offerit spectandum.  
 Musculus pedem mouentium secundus. Reliquos autem in posteriori tibiae sede non notabimus, quod eadem hic cum tribus tabulis praecedentibus sit ratio.  
 Portio musculi hic sese in pedis superiori parte offert, qui pollicem indici adducit.

CHARACTERVM QUINTAE MVSCV-  
 LORVM TABVLAE, QVAM SEQVENS  
 habet pagina, Index.

- QUEMADMODVM quarta tabula multos dissectos ablatoq. ostendebat musculos, qui in tertia tabula erant integre conspicui: ita sane hac quinta sectionis serie plurimos ademptos habet, quos quarta penitus detexerat. unde etiam hac plerisque omnino proponit, quos sexta tabula reiectos commonstrabit. Interim uero haud negligendum est, quod statim in huius libri initio monuimus, tabulis anteriorem corporis faciem exprimentes, mutuo cum illis sectionis ordine respondere, quae posteriorem faciem ostendunt: perinde scilicet, ac si haec decimam subsequeretur tabula. Musculos namq. quos decima tabula reiectos continet, haec nullibi facit obuios.  
 Foramen, quo nervulus tertij paris nervorum cerebri frontis, & superioris palpebrae musculosam petit substantiam.  
 Temporalis musculus.  
 Hic magna ossis ingulis portio est execta, ut temporalis musculi cum musculo nunc D indicando coitus in conspectum ueniret.  
 Secundus inferiorem maxillam mouentium musculus, quem maxillarium fore appellamus.  
 Foramen, quo surculus tertij paris nervorum cerebri, ad superius labrum & alam nasi deducitur.  
 Amplius musculus, a superiori maxilla in inferiorem productus, ac buccarum motibus seruientium in altero latere secundus.  
 Nervi utriusq. ad hunc characterem occurrentes, labro inferiori exporriguntur. Ceterum superior characteris sedes, singulorum labrorum substantiam insinuat, ad utrumq. labrum conspiciam.  
 Musculus, inferiorem maxillam deorsum trahens. Singuli characteres singulos eius musculi uentres notant, in quorum medio excarnis teresq. musculi pars consistit.  
 Portio musculi caput mouentis, qui a pectoris osse & clauicula enatus, toti manillari processui inseritur.

QVINTA  
MUSCULO-  
RVM TA-  
BVL.A.





- L Os v imaginem referens, à quo primum & secundum & tertium par eorum quid mouent musculorum recessimus.
- M Primum & secundus lingue muscoli ab osse v referente pronati.
- N Laryngis cartilago, scutum referens, & iam narrandus musculus adhuc obiecta.
- O Dexter duorum musculorum, qui ab osse v referente, in cartilaginem scuto similem inferuntur.
- P Dexter duorum musculorum, qui a pectoris osse scutum imitanti laryngis cartilagini inferuntur. Ad huius musculi exterioris latus, congeries iussit sporarum arterie, interioris uenae iugularis, & sexti cerebri nervorum paris.
- Q Apera arteriae anterior sedes.
- R, S Musculus osis v referenti proprius, & à scapula superiori costula enatus. Singuli characteres singulos ipsius indicant uentres. Pars autem in horum medio consistens, eius musculi sedes est, tendinis substantia non dissimilis.
- T Portio musculorum secundi paris caput mouentium.
- V Tertius scapulam mouentium musculus, ex transuersis superiorum cervicis uertebraeum processibus initium ducens.
- X Quoniam hic locus nihil aliud peculiariter, quam septima tabula in homine ostendit: & quia in Galeni uerba iurat, ipsius sententia, quum haec pingerentur, plus aequo fauimus: musculum hic ex cane delineatum cernis, quo homines prorsus destituntur, & qui Galeno tertius thoracem mouentium habetur, sequenti tabula integer T notandus.
- Y Dextri lateris claviculam hic à pectoris osse auulsumus, adhuc summo humero connexam, & sibi adhuc musculum seruauimus, qui thoracis motorum primus numerabitur, hicq; Z insignitur.
- Z Scutum seruauimus, qui thoracis motorum primus numerabitur, hicq; Z insignitur.
- a Summus humerus, seu scapulae elatior processus.
- b Interior demissior uel scapulae processus.
- c Ligamentum brachij osis ad scapulam articuli peculiarium quartum ab interiori scapulae processu summum petens humerum.
- d Ligamentum teres, ab apice interioris scapulae processus, in anteriorem sedem externi capitis humeri insertum, ac huius articuli, post membranaceum omnibus articulis commune, primum.
- e Aliud teres ligamentum, ex eminentissima scapulae acetabuli sede, ad externum quoq; humeri caput procedens, atq; huius articuli peculiarium ligamentorum secundum.
- f Hac sede duo ligamenta, d & e insignita, suis lateribus uniuntur, & uelut transuersum efformant ligamentum, transmittens caput externum musculi cubiti flectentium anterioris, ac mox Z notandi.
- g Pectoris os, cui septem superiorum costarum cartilagine utriusq; conueniunt.
- h Prima thoracis costula: reliquae dein etiam, una cum ipsarum interuallis, circa characterum opem sunt conspicuae.
- I Musculus scapulam mouentium primus. i & k huius musculi principium notant, quandam manus speciem i, k, l perinde in exortu, ac musculi ipsi succumbens, & m insignitus, in inflexione representans. l tendinem praesentis musculi indicat. Porro i, k & l simul, huius musculi trianguli speciem quodammodo ostendunt.
- m Musculus, qui à scapulae basi pronatus, octo superioribus thoracis costis inseritur.
- n Dexter rectorum abdominis musculorum. Ac n carneum recti abdominis musculi principium, triangulo non dissimile notat. o principium eiusdem musculi nerueum inscribitur, penè uniuersum efformans musculum. To p, q, to interuallo, à p ad q pertinet, recti abdominis musculi internis suis lateribus inuicem contingunt. Tota autem sede supra q, aut mox supra umbilicum consistente, tanto magis musculi mutuo coniunguntur, quanto altius conscendunt. Ceterum q notabit etiam obliquorum abdominis musculorum neruosa tenuitatis, ad transuersum abdominis musculum, hac in parte ad pectoris usq; sedem connexam. Porro r linea insignitur, quae carnem recti musculi partem finit, quaeq; ultima ipsius inflexionis in homine est portio, uti in quarta tabula ad characterem n est cernere. Interapedine igitur ab r ad s pertinet, se offert recti siniae abdominis musculi tendo seu t. membrana, excarnis uel musculi pars. t autem indicat carnem musculi sedem, prima costula & secunda thoracis insertam. estq; latus ille tendo & carnea hac pars is musculus, quem Galenus quintum thoracem mouentium enumerat, in hominibus haudquaquam, ut in caudatis simijs & canibus, conspicuus. Nos autem hic illum, Galenum intelligendi gratia, delineauimus, quod alioquin haec pectoris sedes, sequentium duarum tabularum penultimis erat absq; his musculis responsura. Postremo, u, u, u notantur inflexiones, seu neruae declinatione, transuersim recto musculo impressa, quibus oblique ascendens musculi neruosa exilitas pertinacissime conuascitur.
- x Linea haec portiunculam notat musculi abdominis oblique ascendentis, quae is transuerso abdominis musculo imbi adeo ualide committitur, ut inter dissicandum, nisi recto eiusmodi signo, à transuerso liberari nequeat.
- y Transuersus abdominis musculus.
- z Oblique ascendens abdominis musculus, ab abdomine hic reflexus.



- β *Ulsorum feminalium portio. Caterum tres illi quodammodo circuli, ad reſtorum muscutorū radicem, seu iuxta n & o ac p coſpiciunt, idem quod in mox precedente tabula, abſecti nimirum penis conſtructionē ac naturam, oculis ſubijciunt.*
- γ *Reuerſa eſt muſculus brachium attollens anterior pars: adeo ut ſedes ipſius in conſpicio ſit, quæ anteriorem humeri articuli regionem proximè integebat.*
- δ *In ſiniſtro brachio inſertionis pars adhuc reliqua eſt, muſculi brachium attollentis.*
- ε *Excarnis nunc humeri pars, inter duo capitū a apparent, muſculi cubitum ſtudentium anterioris.*
- ζ *Muſculus cubitum ſtudentium anterior.*
- η *Muſculus, cubiti extensionis autor, cuius principium ab inferiori ſcapula coſta pronafciſtur.*
- θ *Posterior muſculus cubitum ſtudentium.*
- ι *Superior muſculus eorum qui radium in proutum agunt.*
- κ *Radium mouentium longiſſimus, cuius auxilio radius in ſupinum ducitur.*
- ⊙ *Quatuor digitorum ſecundum os ſtudent muſculus, cuius principium ſub muſculo radium in proutum agentium*
- λ, μ. *ſuperiore, & i notato, reconditum, λ inſignitur. μ uero, muſculi huius in quatuor carneas partes diſtributio indicatur, quæ poſtmodum in ſingulos tendines degenerant.*
- ν, ξ *Transferſum interioris brachialis ſedis ligamentum, longa ſeſſione diuiſum, & utriq; in latus reflexum. Uerum v præterea muſculum priorem primum pollicis os ſtudentium cōmonſtrat. ξ autem muſculum, cuius ope primum parui digiti internodum extorſum ſtudent. Porro quod ad quatuor tendinum, ſecundum quatuor digitorum os ſtudentium ſeriem attinet, omnia ſunt cōſpicienda: quamvis interim tendinibus indicem & paruum*
- ο. *digiti petentibus o inſcripſerim.*
- ⊖ *Nonnihil hic ſeſe offert muſculus, quatuor digitorum tertium ſtudent os.*
- ρ *Portio muſculi tertium pollicis os ſtudentis, qui in ſiniſtro cubito eſt conſpectior.*
- \* *Muſculus ulnæ exorſus, quo brachiale ſtudent, hic ab exortu & ulnæ liberatus, à ſua pendet inſertione.*
- ς *Secundus femur mouentium muſculus.*
- τ *Apparet hic obſcure femoris caput coxendicis oſis ſinum ſubiens, & ligamento adhuc obductum: ſed τ in hoc præcipue adhibetur, ut ceruus ſeu collum femoris hic indicaretur.*
- υ *Femoris magnus exterior uel proceſſus.*
- φ *Femur mouentium ſeptimus, qui perinde ac tres rhodo ſubſequentes, modica tantum ex parte eſt conſpicuus.*
- χ *Muſculus femur mouentium ſextus.*
- ↓ *Femur mouentium oclauus.*
- ω *Quintus femur mouentium muſculus.*
- Λ *Septimus tibiā mouentium muſculus. Charactere 2 ipſius amplum principium, à radice magni femoris pro-*
- 2, 3. *ceſſus enatum, indicatur. 3 hic in tendinem latum deſinit, cum oclauo & noni muſculorū tibiā mouentium*
4. *tendinibus commixtum, unitumq; 4 hac linea illum in anteriori femoris ſede terminat, ubi oclauus muſculus ipſi primum ſubijci incipit.*
- Ξ *Oclauus tibiā mouentium muſculus.*
- Π *Π oclauum tibiā mouentium muſculum indicat: ſed priuatim ſinum oſtendit, cui nonus tibiā mouentium muſculus inſidebat, quem mox caractere 5 notabimus. Maxima itaq; ſinus ſedem oclauus muſculus conſtituit: uerum ſeptimus eius tantam portionem efformat, quanta à linea, caractere 4 inſignita, ad umbram ſepimi muſculi uſq; protenditur: ita ſanè, ut ab utriq; muſculo ſinus iſte conſiſcat.*
- 5 *Hoc caractere muſculus inſignitur tibiā mouentium nonus, qui à ſuo exortu liberatus, & à femore auulſus, illic à genu pendet, ubi ſeptimi & oclauo tibiā mouentium muſculorum tendinibus commiſcetur.*
- 6 *Hic ſuo liberatus etiam initio, & à femore abſtractus, ab inſertione propendit tibiā mouentium ſecundus muſculus.*
- Σ *In hac tibiā, tibiā os anteriori ſede prorſus excarne cernitur, propter hactenus reſectos muſculos: ſuper eſt enim ex omnibus illi adnatis, tantum is quem modo φ notabimus.*
- Φ *Muſculus, ab interno tibiæ oſis latere & ligamento membranaceo in tibiā longitudine oſſa colligante enatus, ac*
7. *pollicem pedis extendens. Huius tendinem 7 inſcriptum conſpicias.*
- 8 *Septimus pedem mouentium muſculus.*
- 9 *Oclauus pedem mouentium muſculus, parum ſeſtandum, quoniam ſeptimo recondatur, offerens.*
- Υ *Carnea moles, in ſuperiori pedis ſede reſoſita: quæ in quatuor carneas partes diſgeſta, quatuor educit tendines, & pollicem treſq; ipſi proximis digitos in latus externum mouet.*
- Ω *Hic proſternitur muſculus quatuor extendens digitos, una cum ipſius portione, quam noni pedem mouentium muſ-*
- ⊕ *ſculi uice reſcenſimus, ac cui iam (&) caracterem inſcriptum cernis. Muſculus poſterior tibiæ ſedem occu-*
- pantibus nullos adhibuit characteres, quod ipſorū eadem cum præcedentibus tabulis adhuc ſit ſeries & copia.*

- SEXTAE tabulae caput in posteriora reflexum est, & maxillam inferiorem in summo mento diuisam, & uring, in latera diductam referi.
- A Hic eadem ingulis ossis portio reflecta est, quam in quinta tabula quoq; ademeramus. Notatur uero A priuati temporales musculus, ablato iam manfio musculo.
- B Acutus maxilla inferioris processus, cui temporalis musculus ualidissime inseritur.
- C Sinistra maxilla inferioris pars.
- D Musculus in ore delitescens, qui interne inferioris maxillae sedi, ubi latissima est, inseritur, eamq; mouentium tertius habetur.
- E Gurgulio, a palati fine propendens.
- F Glandula sinistra, amygdale non absimilis, ac eminentissime laryngis sedi appositae: nisi etiam paulo altius in suis cibis, quam larynx, consistat.
- G Lingua: uerum superior characteris pars, laryngis operculo est conterminata.
- H Haec sede plures capitis & colli motibus famulantes musculi confunduntur.
- I Musculus inferiorem maxillam deorsum trahens, hic ab exortu pendet.
- K Tertius hominis scapulam mouentium.
- L Glandula insigniter carnea, quae sinistro laryngis radicio lateri adhaesit, ac in altero latere coniugem obtinet.
- M Aspera arteria, ipsi incumbentibus musculis iam libera.
- N Haec congeries, est uasorum & nervorum lateribus asperae arteriae exporrectorum. quanquam & musculi dorsum mouentium primi aliqua ex parte hic se ostendant.
- O Quoniam hanc pectoris collig. sedem, illi similem delineare oportuisset, quam sequens ostendit tabula: non abs re fore duxi, ex cane hunc Galeni musculum exprimere, qui a transversis uertebrae cervicis processibus ori-
- O. cinem O notatam ducent, ad quartam usq; costam carnosus fertur: ubi P notatus, in membraneum cessat ten-
- P. Q. dinem Q insignitum, & deorsum ad aliquot adhuc costas pertinentem.
- R Musculus, a scapulae basi principium ducent, thoracemq; mouentium secundus.
- Pectoris os citra characterum impositionem conspicuum est, quemadmodum & costae, & earundem interval-
- S. la, una cum exterioribus musculis intercostalibus. Quo tamen melius singula expendas, significet S tertiae costae
- T. U. os, Tertiae costae cartilagineum, U musculum exteriorem intercostalium, in tertiae & secundae costarum ossium
- X. intervallo repositum, cuius fibrae deorsum in priora feruntur. X uero denotabit exteriorem intercostalium mus-
- sculum, inter secundae & tertiae costarum cartilagineis conspicuum, cuius fibrae sursum in anteriora prorumpunt.
- a Arteria & uena, sub pectoris osse deorsum ad abdominis superiora propagatae, hicq; a rectis abdominis musculis reflectae.
- Δ Transuersus abdominis musculus, quem costarum ductus, seu fines, & ossis sacri ossis sinistro lateri commissi re-
- b. gio, abunde hic circumscribunt. Ceterum b sedem notat, quae oblique ascendentis musculi tendo, transuerso ab-
- c. dominis musculo pertinacissime adhaesit, priusquam rectum conscendat. c autem indicat asperitatem, quam
- musculorum oblique ductorum cum transversis musculis connexis inibi molitur, ubi recti musculi supra umbi-
- lici sedem, uersus pectoris os mutuo dehiscunt.
- d Foramen, uasis feminae uirorum uiam praebens.
- e Vena & arteria, in rectos abdominis musculos, conterminasq; sedes sursum excurrentes, a magna uasorum crisi
- ra adeuntium distributione.
- f Hic sinistri lateris rectus abdominis musculus, a pubis osse dependet, uasorum posteriori ipsius sedi commissorum
- seriem quoq; proponens.
- g Spina ossis ilium, carnosus partibus duorum obliquorum abdominis musculorum liberata.
- h Scapula & sinistro brachio mentem accommodata. ibidem namq; h superiorem notat scapulae angulum, cui mus-
- culus scapulam mouentium tertius, & K insignitus, inseritur.
- i Summus humerus, seu scapulae elatior processus.
- k Musculus brachium mouentium quintus, scapulae sinum occupans, qui inter elatiorem ipsius costam, & supe-
- rioris processus radicem, seu scapulae spinam, consistit.
- l Interior scapulae processus, anchora imaginem referens.
- Θ Musculus anterior cubitum flectentium, cuius exterius caput, quod a scapulae acetabuli supercilio nascitur, m
- m. n. notat. n uero indicat internum caput, ab interiori scapulae processu enatum. Quo tamen huius capitis nerueam
- partem a carnea exquiritus discernas, huius tabulae dextrum brachium spectabis, in quo n nerueam partem de-
- o. p. q. notat, o aut carnea. Ceterum p duorum capitum coitum indicat: q uero tendinis, quae musculus hic educit, principiu.
- r. r Muscu-



## SEXTA

MYSCVLO-

RVM TA-

BVLA.





*r.* *Y* Musculus posterior cubiti flexionis autor, cuius principium ab humiliori scapulae costa enascitur.

*f* Musculus, cubiti extensionis autor, cuius principium ab humiliori scapulae costa enascitur.

*Λ* Musculus radium mouentium longissimus, cuius a tristima partem, quae hic oculis subijci potest, et indicat: ipse enim ortus in nona musculorum tabula spectari potest, quae hunc musculum *X* insignitum habet, uti decima tabula illum litera *e* ostendit. Ceterum in hac tabula u. praesentis musculi insertionem notat, quam in inferiorem radii appendicem molitur.

*x* Musculus superior duorum, qui radium in pronum ducunt.

*Ξ* Musculus, tertium quatuor digitorum os flectens. *α* quidem huius musculi caput insinuat. *β* autem sedem, *α. β.* quae musculus in quatuor partes carneas discinditur, quae singulos postmodum porrigunt tendines. Porro quae ratione ad tertium usque digitorum internodium tendines huius musculi porrigantur, et incumbens musculi tendines transiant, hic in utraque manu est conspicuum. Sit tamen, doctrinae gratia, *γ* tendo, tertium medij digiti os *δ.* accedens. *Δ* autem tendo, qui secundum os flectit, ut nunc dicam, cum ceteris sui musculi tendinibus, ex uola ad insertionem usque, auulsis.

*ε* Musculus secundum quatuor digitorum flectens articulum, qui suo principio, adeoque à cubito liberatus, à tendinum ipsius in secunda quatuor digitorum ossa insertionem propendit.

*ζζ* Hos characteres referre oportet ad quatuor musculos, quorum beneficio quatuor digiti adducuntur pollicis, atque in interno lateri tendinum tertium os flectentium exporriguntur.

*η, θ* Musculus tertium pollicis os flectens, *γ* notatur. *θ* autem ipsius tendinem proponit, inter musculos primum pollicis os flectentes, et eos qui secundum pollicis os flectunt, propeperentem.

*κ* Musculus maior primum pollicis os flectentium, hic ab insertionem dependet.

*λ* Musculus minor primum pollicis os flectentium, qui sub maiori *κ* indicato recondebatur. Inter *λ* uero et *κ*, primum pollicis os nudum excarnae, apparet.

*μ* Musculus primum parui digiti os uersus exteriora flectens. Tuberculum uero ante huius musculi initium apparens, ubi est sedes, quae ualidior em ligamenti exporrigit portionem brachiale cubito colligantis.

*ν* Tertius femur mouentium musculus, hic magna ex parte conspicuus.

*ξ* Magnus exterior uel femoris ossis processus.

*ο* Musculus femur mouentium septimus.

*π* Musculus femur mouentium sextus.

*ρ* Musculus femur mouentium octauus.

*ς* Quintus femur mouentium musculus.

*Π* Octauus tibiae mouentium musculus, uniuersum femoris os quodammodo amplectens. *τ* insinuat amplum huius musculi principium, à radice magni femoris processus, et femoris collo enatum. Deinde *Π* priuatim indicat sinus illius portionem, quo nonus tibiae mouentium musculus continetur. Ceterum carnosae huius musculi u. li partis terminus, instar semiglobi extuberans, in utroque femore u. insinuitur.

*φ* Dependet hic musculus tibiae mouentium septimus, cuius cauitas argumento est, qui octauum tibiae mouentium amplexetur musculus, et qui horum tendines unà coeant. Quod ut commo dius expenderes, in dextro genu septimus musculus adeo ab octauo musculi tendine dissectus est, ut et patella seu mola pars ibidem in conspectum ueniat, \* notata.

*Χ* Haec sedes, ad exteriorem genu regionem occurrēs, ostendit portionem quarti tibiae mouentis musculi, atque hic *χ* notat quarti musculi sedem, ipsius insertioni proximam. *⊥* autem eam partem abscissam ostendit, cui coxendicis ossis appendix principium praeberet, quum reliqua à femoris ossis initium ducat.

*Σ* In sinistra tibia totum externum tibiae ossis latus conspicuum est. Id dico latus, quod ad externam sedem excarnae etiam ante sectionem partis habetur, quam et dextra tibia totam oculis subijci. Ceterum *Σ* priuatim notat ligamentum, tibiae os et fibulam, quae haec inuicem delibant, intercedens.

*ω* Externus malleolus, et pars fibulae excarnae.

*φ* Musculus pedem mouentium septimus. Character *2* ipsius exortum indicat. *5* tendinis principium, quod anteriori et posteriori parte, ac dem interius, quae fibulam spectat, carne adnutritur, ac *4* partem notat anteriorem carnem, *3* uero posteriorem.

*⊥* Octauus musculus pedem mouentium, magna sui portione sub septimo occultatur. Ceterum character *6* huius musculi tendo, ad posteriorem exterioris malleoli sedem reflexus, indicatur.

*Ω* Musculosa moles, cuius beneficio pollex et tres ipsi proximi digiti in externum latus ducuntur.

*7* Hic procumbit musculus pollicem extendens, suaeque insertioni adhuc haerens.

*8* Musculus paruum digitem in exteriora abducens, hac sede obuius est.

*9* Secundus musculus pedem mouentium.

*χ* Musculus in dextro pede insignitur, pollicem in internum latus à ceteris digitis abducens. Posteriori dexterae tibiae sedis nullo adhibuimus characteres, quod ea cum praecedentibus tabulis prorsus respondeat.

## SEPTIMA

MUSCULO.

RPM T.A.

BVL.






SEPTIMAE musculorum tabula corpus laxato sine, à quo inter pingendū pendebat, in posteriora tantum prociuit, quantum reflecto iam peritoneo, & omnibus quæ illo amplexantur, uidendo septo transuerso iussit. quod etiam in præfenti tabula ad sinistram ea forma appictum cernis, quæ ex cælium, parietisq; suo leniore hærens, nobis apparuit. Quo minus autem dextra scapula, effractæ alæ rursus deorsum decumberet, illam iunículo ita suspendimus, ut uniuersum ipsius cauum in conspectu sit.

- A Gurgulio, à palati termino propendens, inferiori interrim maxilla prorsus aînotæ.  
B Aliquot ceruicis uertebularum corpora anteriori sede, quæ musculis non obteguntur, se hic ostendunt.  
C, D Primum par musculorum dorsum mouentium.  
E Stomachi seu gulæ hic præfecta pars.  
F Afferre arteriæ stomacho infusæ pars, hic quoq; iuxta iugulum à reliqua caudicis sui portione liberata. Ceterum uas utrinq; ad afferre arteriæ latera occurrentia, soporales sunt arteriæ, cum internis iugularibus uenis, & sexto nervorum cerebri pari.  
G Musculus alter secundi paris dorsum mouentium.  
H Scapulam mouentium tertius, qui in dextro latere transfectus est.  
I Musculus brachium mouentium quintus, inter elatiorem scapula costam, & superioris ipsius processus radiicem repositus.  
K Musculus brachium mouentium sextus, totam scapula cauam anteriorem uel occupans sedem. Huius insertio K. K. insignitur, reliquæ ipsius forma ex scapulae imagine deprehenditur. quamquam si præfentis musculi triangularem figuram uolueris constituere, licebit K, L & L simul conferre.  
L, L Musculus thoracem mouentium secundus, octo superioribus costis manus modo insertus.  
M Brachium agentium tertius, & ab inferiori scapula costâ, iuxta basim scapulae inferiori in angulum enatus.  
N, N Musculus cubiti non extendentium, cuius initium superiori N insignitur, à scapula educitur.  
O Portio tendinis musculi brachium mouentium quarti.  
P Cubiti flectentium posterior, qui totus fere hic est conspicuus.  
Q Radium in prouum constituentium superior.  
R, R Anterior cubiti flectentium, qui ab ossibus, unde initium duxit, liberatus, ac à brachio auulsus, à sua dependet insertione.  
S Radius.  
T Ulna.  
U Ligamentum inter radium & ulnam, quæ inuicem dehiscunt, intercedens.  
X Radium in prouum mouentium inferior musculus, propemodum quadratus.  
Y, Y A dextro radio (qui cum uniuersa manu magis quam sinistra attollitur) dependet à sua insertione longior radium in supinum ducentium musculus.  
a Musculus primus pollicis os flectentium musculus, suo initio liberatus, ab illo cui inseritur osse tantum pendet.  
1, 2, 3 Tribus his characteribus musculi notantur secundum pollicis os flectentes.  
b Dependet à sua insertione musculus tertius pollicis internodium flectens.  
c Musculus tertius quatuor digitorum ossis flexus auctor, à cubito reflectus, deorsum est reflexus. Hunc sedulo intruere, quod illius tendinibus musculi attendantur, quatuor digitos pollicis adducentes: quorum u qui indicem mouet, d insignitur, perinde ac reliqui tres, ab insertione dependens. Quinctiam tendinum musculi secundum quatuor digitorum os flectentis portiones hic adhuc seruantur. ac portioni quidem indici propriæ e inscripti: tendini f. autem tertium indicis os flectenti, f. Ceterum in dextra manus digitorum musculorum dumtaxat conspiciuntur g. h. insertiones. ac g in indice insertionem indicat musculi indicem pollicis adducentis: h insertionem tendinis secundum indicis os flectentis. i insertionem tendinis, qui tertius eius digiti ossis flexioni præficuit.  
Præfenti tabulae thoracis, quod ad intercostales spectat musculi, præcedentis tabulae thoracis respondet: unde etiam characteribus non uenit obliuiscendus.  
Δ Septum transuersum, cuius membranae circulus in septo extra corpus expanso, & suo mucore parietis agglutinato, circumscribitur k, l, m, n. quod uerò exterius hos characteres ambit, & foris existit, fibrisq; intersinguntur, o. p. carneam septi partem esse putato. o. p. Duo ligamenta, seu tendines septi, uertebularum in lumbis consistentium corporibus inserti. q Septi scissura, quæ id uertebularum incumbi corporibus, ac magnam arteriam, uenamq; coniugis expertem transmittit, aut illis cedit, quarum officia q in corpore huius tabulae possumus indur. cat, quemadmodum & arteriæ ramos in septum excurrentes. r Foramen septi, stomacho uiam præbens, qui f. etiam r in corpore insignitur. s Foramen in septo transuerso, uenæ causæ caudicis parati, qui in corpore s notatus conspiciuntur.






- t *Musculus femur mouentium sextus.*  
 u *Musculus dorsum mouentium nonus.*  
 x *Femur mouentium septimus, qui perinde ac sextus, propter ablatum peritonaeum, magis quam in praecedentibus tabulis se offert.*  
 y *Sacrum os hic insignitur, nervi quoque aliquot ab ipsius medullaeducti, obuij sunt.*  
 a *Femur mouentium octauus.*  
 b *Quintus femur mouentium.*  
 y *Tibiam mouentium octauus.*  
 d *Musculus pollicem à ceteris digitis amouens, sua tantum haeret insectione.*  
 e *Dependet & hic quoque ab insectione musculoſa moles, pollicem & tres ipsi proximos digitos in externum latus ducens. Quae uero in praesentis tabulae tibys occurrunt, illis respondent, quae prioribus tabulis fuisse obuia. haec enim namque ex posteriori tibia sede nullus est abſectus musculus: & in anteriori tibia regione, hoc figurae situm, nihil praeter excarnem, etiam ante anatomen, tibiae ossis partem, est obuium.*

CHARACTERVM OCTAVAE MUSCV-  
lorum tabulae Index.

- H A E c tabularum anteriorem corporis faciem exprimentium postrema est, musculos in anteriori hac sectionis serie adhuc reliquos proponens. Ut uero interiores intercostalium ostenderet musculos, & eos qui in interna thoracis sede pectoris ossis attenduntur lateribus, os illud una cum costarum cartilaginibus excitum, & sub dextrae manus indice ita propositum cernis, ut internam ipsius referat faciem, thoracis cavitatem respicientem.*  
 A, B *Musculi collum, superiorem uel dorsi partem flectentes, dorsumque mouentium primum coniugium.*  
 C *Musculus à prima enatus costa, secundumque dorsum mouentium parvis alter.*  
 D, D *Exteriores musculi intercostales, in costarum ossium interuallis conspicui.*  
 E, E *Interiores musculi intercostales, in costarum ossium interuallis obuij.*  
 F, F *Musculus octo thoracis costis insertus, ipsiusque motorum secundus.*  
 G *Utrique scapula modo nuda excarnis est, musculi F insigniti ope adhuc corpori haerens.*  
 H *Musculus dependet, brachium antrorsum circumuertens, scapulae cauum occupans.*  
 I *Musculus superiori capulae basis angulo insertus, ipsamque agentium tertius, ab insectione pendens.*  
 I *Posterior cubitum flectentium musculus, cuius principij elatior exteriorque pars L insignitur, demissior uero in anteriori pars M. Inſectio autem praesentis musculi N indicatur.*  
 L, M, N. *O Radius.*  
 P *Ulna.*  
 Q *Tendinis musculi cubitum flectentium anterioris pars.*  
 R *Musculus ab insectione dependet, radium in prouum mouentium superior.*  
 S *Musculus à sinistra ulna dependet, radium in prouum ducentium inferior.*  
 T, U *Sede T insignita, ligamentum, brachiale ad cubitum neſtens, crassius apparet, ut etiam sede U notata.*  
 X *Musculi ab insectione propendent, secundum pollicis internodium flectentes.*  
 Δ *In postbrachiali dilucidius exprimi nequiverunt octo muscoli, quatuor digitorum primos articulos flectentes. Ceterum dextrae manus in latus picta est, ut musculi Y insignitum offerret, qui primum indicis os introsum flectit.*  
 Y *Sextus femur mouentium musculus, cuius initium è uertebrarum procedens corporibus, a insignitur. b uero a, b. ipsius sedes indicatur, qua tendinem educere incipit.*  
 Δ *Septimus femur mouentium musculus.*  
 E *Musculus dorsum mouentium nonus.*  
 Π *Sacrum os, ex cuius anterioribus foraminibus nervi proſilire hic uidentur.*  
 Σ *Octauus femur mouentium musculus, qui ut ualde est carneus, nonnihil hic laxus propendit.*  
 Φ *Quintus femur mouentium musculus. Verum Φ primum huius musculi partem notat posteriorem, c autem c. anteriorem.*  
 e *Pubis ossis anterior sedes, quae hoc latere ex sectionis serie, carne est denudata.*  
 Y *Musculus femur mouentium nonus, anteriorem pubis ossis foraminis sedem occupans.*  
 Ω *In sinistro genu tendines, septimi tibiam mouentium musculi g insigniti, & octauum h indicati, & noni i notati, g, h, i. à genu reflexi sunt: ac patellam ipsi innatam, ac k insignitam, oculis subiiciunt. In dextro autem crure octauus tibiam mouentium musculus, solus ab insectione ac integer dependet, l notatus, & patellam sibi innatam seruans, cui etiam k inscripsimus.*  
 m *Tibiae ossis anterior sedes, omni prorsus musculo libera.*



NONA  
MUSCU-  
LORVM  
tabula.





- n* Fibula anterior sedes, ex dissectionis serie musculis omnibus iam denudata.  
*o* Ligamentum inter tibia os & fibulam inibi positum, ubi hæc ossa inuicem debilesunt.  
*\* Qui* hic spectantur musculi, illi sunt, quos sexta musculorum tabula expressit literis  $\Phi$  &  $\Psi$ , septimus nimirum & octauus pedem mouentium. In superiori pedis sede modo nulli adhuc reliqui sunt musculi, ossaq. sunt axæ ligamentis obducta, in conspectum ueniunt. Ceterum musculi, qui hætenus in tibia posteriori sede fuere obuij, p. q. sectionis serie nunc auferri incipiunt. ac p, q. notant primum ac secundum pedem mouentium, a quarto eiusdem f. t. motus auctore musculo, & insignito, ad characterem s propendentes, quo priuatim notatur tendo tertij pedem mouentium musculi, qui inter s & u deducitur.  
*u* Musculi pars hic occurrit, quatuor digitorum tertium articulum flectentis.  
*x* Hic obscure se offert pedem mouentium quintus.  
*a* Pectoris ossus posterior, seu cor spectans sedes.  
*1, 2, 3, 4, 5, 6, 7* His characteribus septem uerarum costarum indicantur cartilagine. Reliquæ autem quatuor cartilagine, octauæ, nonæ, decimæ & undecimæ costarum cartilagine sunt.  
*\beta* Musculus humanum thoracem mouentium sextus.

NONAE MUSCULORVM TABULÆ  
 characterum Index.

NO *n* a tabula, omnium posteriorem corporis faciem exprimentium prima occurrit, nullum abscissum habens musculum, præter eos quos carnea membrana constituit, tertiâq. tabula obuios fecit. Verum transuersa in externa cubiti sede iuxta brachiale posita ligamenta hic dissecuimus, quod prima & secunda tabula abut de fuerint conspicua, & numerorum characteribus insignita.

*A* Temporalis musculus.

*B* Os inale.

*C* Masseter præcipue appellatur musculus, seu inter musculos maxillam inferiorem mouentes secundus describens. Auris uero foramen, cum ipsi subiectis glandulis, citra characterem est obuium.

*D* Musculus caput mouentium, qui a pectoris osse & clauicula enatus, in manillarem temporis ossis processum inferiuit.

*\Gamma, \Delta* Musculus secundo loco inter scapulam mouens rescendens. Atq. huius principium, ab occipitij osse pronatum, *E, F, G*. tum, *E* ac *F* insinuat. *E* uero usq. ad *G*, musculi notatur principium ab occipite, ad octauæ usq. thoracis uer *H, I*. tebre spinam, a mediarum uertebra rum apicibus quodammodo enatum. *H, I* insertio indicatur, quam musculi *\* lus* in scapule spinam, & summum humerum, latiusculamq. clauiculæ sedem molitur. *\* hac* sede præsens musculus, quasi membrancum semicirculum obtinet, seu carnosæ ipsius fibræ in semicirculi hic cessant circumferentiam. *Hac* parte *K* insignita, ceruix collumq. ue, thoracis elastissime parti comittitur. Linea autem, latera ue musculum circumscribentia, in hunc modum colliguntur. Ab *E* ad *F* prima protenditur, ad occiput transuersim ducta. Quod autem huius extremum *F* notat, non tantum ab auris radice distare hic uideatur, quantum *F* remouetur ab *E*, pictura in causa est, oculum fugiens: quod & sinistrum brachium, in anteriora porrectum, liquido demonstrat. quod foris fluxus ignarus, plus aequo breuius esse arbitraretur. Porro secunda linea præsentis musculi ab *E* per *K* ad *G* metitur. Tertia autem ab *F* ad *H*. Quarta ab *H* ad *G*. Atq. his lineis musculus terminatur. Inferionis autem linea, ab *H* ad *I* protensa, & ille quoq. ductus, qui ab *I* ad *K* metiri posset, nulle prorsus separationis diuisionis ue musculi in partes, notæ existunt.

*L* Musculus brachium attollens, eiusq. motorum secundus.

*M* Musculus gibbam scapula sedem occupans, brachiumq. mouentium septimus.

*N* Musculus ab humiliori scapule costâ pronatus, & brachium mouentium tertius.

*O* Musculus brachium agentium quartus, sequenti tabula  $\Theta$  insinuetur.

*P* In præsentis tabule dextro latere, *P* indicat portionem abdominis musculi, quem oblique descendente uocamus.

*Q* Nonnihil in dextro brachio occurrit anterior brachium flectentium musculus.

*R* Posterior cubitum flectentium musculus.

*S* Musculus cubitum extendentium, cuius principium ab humeri pendet ceruice.

*T* Musculus cubitum extendentium, cuius principium ab humiliori scapule costâ pronascitur.

*U* Ulnæ sedes trianquila, nullis obiecta musculis, ex carnis ue, ac præcipue insertionem excipiens neruose cubitum extendentium musculorum insertionis.

*X* Musculus radium in supinum agentium, qui in inferiorem radij appendicem inferiuit.

*Y* Musculus, bicorni tendine brachiale extendens.

x 4

Z Musculum

*Z* *Musculus* *Z* insignitum, autorem extensionis indicis, medij ac anularis recensebimus, cuius initium a *ind.*  
*a. b.* *catur.* Sedes uero, qua carneus esse desinit, tendinesq; educit, *b* insignitur.

⊙ *Musculus*, qui nobis parui digiti extensionis autor recensetur. Ceterum et si in externa postbrachialis sede, & ad digitorum radicem aliquo modo exprimere conati sumus, qui duorum musculorum, quos *Z* & ⊙ insignimus, tendines commisceantur, & uarie latecentes, suismet ipsorum portionibus rursus uiuantur: nihilominus tamen, quum hæc commixtio omnibus non sit eadem, hanc ex uarijs sectionibus te potius quam ex hac unica delineatione, petere optauerim.

Δ *Musculus* brachiale extendentium, cuius principium *c* insignitum, ab humero pender: insertio autem *d* indicis, *d.* *cata*, in postbrachialis os perficitur, paruum digitem sustinens.

Ξ *In* utroq; cubito Ξ insignitur *musculus*, brachiale flectens, quartoq; brachialis ossi insertus, ac in nulla musculorum tabula æque atq; hic conspicuus. Quemadmodum & musculi latum manus tendinem producentis initium, *q* hic ad characterem *q* est obuium, una cum exortu musculi brachiale flectentis, qui postbrachiali insertus, Δ in tertia musculorum tabula notatur.

*e* *Musculi* hæc oblique prorepentes, illi sunt, quorum alter unum tendinem brachialis ossi pollicem suffulcanti inserit: alter uero unum tendinem primo pollicis ossi offert, alium secundo & tertio pollicis ossi inferens.

*f* *Musculus* tribus pollicis ossibus externa sede insertus, & pollicem uersus indicem euertens.

*g* *Musculus* pollicem indicis proximè adducens.

*h* *Musculus*, parui digiti a reliquis abductionis autor.

Π Primus femur mouentium *musculus*, *i, k, l, m* & *n* circumscriptus. Quandoquidem *i* usq; ad *k*, sui principij *i, k, l, m, n.* partem notat, quæ ex ossis ilij spina enascitur. *k* autem ad *l*, principij partem indicat, ab osse coccyge, infraq; sacri ossis sede pendente, ubi etiam sinister *musculus* dextro contiguus est. *m* indicat elatorem ipsius insertionis partem. *n* autem insertionis infimam notat partem: quæ quia inter *musculos* tibiae mouentes hic penitus se insinuat, reconditq; omni ex parte non est conspicua.

*o* Secundus femur mouentium *musculus*, magna ex parte primo adhuc obiectus.

*p* Sextus tibiae mouentium *musculus*, in latum illum degenerans tendinem, qui femur amplexantibus *musculis* obvoluitur: attamen non ad eam pertingit crassitiem, ut subduos ipsi *musculos* obscurare possit, adeo ut illis quoq; *q* *q* characteres iam sim inscripturus. Ceterum *q* notat huius sexti tibiae mouentium musculi carnosæ partis terminum.

*r* Septimus tibiae mouentium *musculus*, membraneo tendine sexti tibiae mouentium musculi obiectus.

*f* Quartus tibiae mouentium *musculus*, septimi musculi posteriori sedi attentus.

*t* Tertius tibiae mouentium *musculus*, in utroq; crure (quemadmodum & subsequentes aliquot) notatus.

*u* *Musculus*, quem quinti tibiae mouentium loco habemus.

*x* Apparet & hic quoq; portio musculi femur mouentium quinti.

*y* *Musculus* secundus tibiae mouentium.

*α* *Musculus* tibiae mouentium primus.

*β* Octauus tibiae mouentium *musculus*.

*γ* Nonus tibiae mouentium *musculus*, modica ex parte, ut & duo proximè præcedentes musculi, conspicuus.

*d* Hoc sinus, tibiae accedens arteria, una cum maxima cruris uena, & nervo quoq; totius corporis crassissimo uehuntur.

*e* *Musculus* primus pedem mouentium.

*z* Secundus pedem mouentium *musculus*.

*3* Septimus pedem mouentium *musculus*.

*θ* Octauus pedem mouentium *musculus*, sub septimo occultatus, modicè admodum se hic spectandum offert.

*ι* Excarnis fibula pars, ipsaq; adeo exterior malleolus.

*κ* Aliqua ex parte portiuicula hic occurrit, musculi pedem mouentium noni: hic enim ipsius tendo ad insertionem suam se offert.

*λ* *Musculus* paruum digitem a cæteris abducens.

*μ* In sinistra sora, tendo tertij pedem mouentium musculi notatur.

*ν* Interior malleolus.

IN HAC omnium tabularum decima, posterior em uero faciem exprimentium secūda, musculi aliquot, qui in precedente tabula erant prorsus cōspicui, iam sectionis serie adempti dependent: multiq; in illa non obuij, qui se commōstrant. Verum iterum prorsus ablati est ille musculus, quem nona tabula Γ & Δ insigniui-  
mus, quod nidebet nusquam apē formam ipsius dependens ostendere potuisset, quorundamq; musculorum in-  
sectionem occupasset.

- A Dexter primi parvis caput mouentium musculus.  
B, B Secundi parvis caput mouentium dexter.  
C Scapulam mouentium tertius musculus.  
D Clavicula, sectionis serie musculus hic denudata.  
E Musculus humani thoracis motorum tertius, sequenti tabula F notandus.  
Γ Musculus scapulam mouentium quartus, cuius primum latus ad dorsi uertebrae aliquot spinas deductum,  
G, H. à G ad H metitur. Secundum uero latus, ad scapulae basim pertinens, ab I ad K, protenditur. Tertium latus à  
L, K. G ad L, & quartum ab H ad K pertinet.  
L Musculus brachium mouentium quintus, inter scapulae spinam, & elatiorem scapulae costam locatus.  
M Scapulae spina, ac summus humerus, à secundo scapulam mouentium musculo liber.  
Δ Musculus brachium mouentium secundus, quem in posteriori corporis sede promptē circumscripseris, si P mu-  
sculi insertionem esse cognoueris. P namq; ac N & O, trianguli modo, dictam musculi partem terminant, an-  
teriori interim parte Ξ, in quarta tabula musculorum insignita.  
Q Brachium mouentium septimus musculus, gibbam scapulae sedem occupans.  
R Musculus brachium mouentium tertius, ab humiliori scapulae costā circa eius basim enatus.  
S Hac sede aliquot dorsum mouentes musculi exporriguntur, una cum humanum thoracem mouentiū quarto.  
Θ Hunc musculum secunda tabula Γ insignitum proponebat: est autem is, cuius beneficio brachium deorsum,  
S, T. uersus dorsum uellitur, idq; mouentium quartus. S & T, musculi huius principij indicant longitudinē: U par-  
tem ipsius inferiorem proximam, quae hic ostendi nequit: uerum in septima tabula O insignita, utcumq; sit ob-  
X. uia. X autem musculi latus ea sede indicat, ubi ab ilium osse non amplius enascitur. Circumscribes uero praesentis  
T. musculi latus ab S ad T, dein à T per X ad U, insuper ab S ad U. Caterum I notabit inferiorem scapulae  
basim angulum hic extuberantem, & tertio musculi latere intectum.  
Z Oblique descendenti abdominis musculi portio.  
a Musculus, ab humiliori scapula costā principium ducens, & cubiti extensionis opifex.  
b Musculus, à ceruice capitis humeri in xtra scapulam originem ducens, ac cubiti extensionis autor.  
c Portio anterioris cubiti flectentium musculi.  
d Portio posterioris cubiti flectentium musculi.  
e Musculus radium in supinum agentium longior, qui à brachio ad humiliorē usq; radij appendicem protenditur.  
f Musculus, bicorni tenāne brachiale extendens.  
g Hac sede bigamentum conficitur membraneum, superiorem radij partem humero colligans. Sunt uero ab hac  
sede resecti tres musculi, qui deorsum à manu pendunt.  
h, h Hac sede, inter uirung, h, h occurrente, ubi iam carne omni, musculi ue libera cernitur.  
i Musculus brachiale flectentium, qui quarto brachialis ossi inseritur.  
A, Ξ, Π Tres isti characteres, tria notant musculorū principia, ab ulna pronata. Primum Δ insignitum, illud est, quod  
radio ante medium illius longitudinis inferum, musculum cōstituit, radium in supinum agentium breuiorem,  
k, l. Secundum principium Ξ indicatum, illud est, quod in duas portiones, k & l notatas dirimitur. k enim eam  
significat portionem, quae tendentem brachialis ossi pollicem proximē sustinenti offert. l uero inferiorem insinuat  
m, n. portionem, quae dein bipartita, unam partem, quae m inscribitur, primo pollicis ossi inserit: alteram n indica-  
tam, in secundum & tertium pollicis ossa implantat. Porro tertium principium, Π insignitum, illud denum  
o, p. est, quod in duas quoq; partes, o & p indicatas discinditur: quarum superior, o notata, tribus pollicis ossibus in-  
seritur: inferior uero, p, indicata, indicem ac medium à pollice abducere creditur, etsi porisimū indicem adeat.  
q Propendet ab insertionē musculus, brachiale unico tendine extendens.  
r Propendet hic quoq; ab insertionē musculus, paruum digitum praecipuē extendens.  
s Musculus à digitorum radicibus hic dependet, qui indicem, medium & anularem in primis extendit.  
t Musculus, pollicem indici proximē adducens.  
Σ Secundus femur mouentium musculus, cuius exortum, semicirculi formae quodammodo respondentem, u & x  
u, x. notant. quanquam u in anteriora magis adhuc deberet exporrigi, si praesens tabula in latus magis uerteteretur.  
Ceterum




DECIMA  
MUSCULO-  
RUM TA-  
BULA.



- γ. Ceterum γ huius musculi indicat insertionē unde etiam u, & x, & y, uniuersum musculum circumscribunt.
- α. Magnus exteriorq; femoris processus.
- β. Quartus femur mouentium musculus.
- γ. Ligamentum à transuerso quintio ossis sacri ossis processu, in acutum coxendicis ossis processum pertinens.
- δ. Ligamentum à dicto nunc sacri ossis processu in posteriore elatioremq; appendix ossis coxendicis sedē insertum.
- ε. Musculus femur mouentium decimus, qui hac à posteriori pubis ossis sede reflexus, alium ueluti musculum su-  
pra infraq; ipsi attensum commonstrat.
- ζ. Quoniam hac sedes, quantum ad musculorum seriem attinet, sequenti tabula, perinde atq; hic erit conspicua,  
neruum ab hac tabula non resecuimus, quem quartum femur petentium numerabimus, eum secunda tertiaq;  
figuris, Capiti undecimo libri quarti praeponendus, caractere 71 indicaturi. Praesens etenim nervus, is profecto  
est, secundum quem ex caluarie cauitate, per dorsū uer-tebrarum foramen, quod dorsali medulla transmitten-  
de paratur, descendens humor, in pedes confluit, quem nonnulli haud infrequenter instar tepentis, alij instar fri-  
gidae aquae emanare, ac in crus profuere sentiunt. Ad haec, eundem neruum in poplite γ notari cernis. quan-  
quam u priuatim ipsius graviorē indicet portionem: quae etsi in alias quamplurimas soboles diffeminetur,  
θ. praecipua tamen ipsius parte, pedis inferior a inter calcem & interiorē malleolum petit. θ uero praesentis nervi  
in poplite bipartiti minorem insinuat rārum, maxima sui parte in musculos digestum, exterius tibiae latus, &  
anteriorē eiusdem sedem occupantes: qui me hercule non minus quoq; accurate, quam quintus corporis nervus  
est obseruandus, si non ob aliud, saltem propter urentia medicamina, quae subinde hic aegris adhibentur, ut ulcus  
eorum ui inustum, humorem secundum hunc neruum decurrentem expurgeret. Nam quod inuitur ulcus, huic  
nervi ramo, θ indicato, uicinum est: & quum paulo inferius fiat, quam superior fibula consistit appendix, ra-  
mus ille proaeipua sua portione contingi nequit. Atq; eiusmodi sane pleraq; crebro sermoni adycerem, nisi ridi-  
culum arbitrarer, reliquas medicinae partes huic Anatomicae misceri, aut ego etiam eiusmodi aliqua non essem  
priuatim suo tempore, uti iam cepti, exaraturus.
- κ, κ. In utroq; femore κ occurrit, musculum notans femur mouentium primum, qui in sinistro crure integer à sua  
sede reflexus est, insertionē dumtaxat corpori commissus, quae in dextro crure solum inibi reliqua est, ubi uali-  
λ. dissimā spectatur: ubi autem leniter, membranēq; tantum rui inferebatur, λ. ascriptum cernis.
- μ. Septimus tibiae mouentium musculus, non amplius membraneo sexti musculi tendine obiectus.
- φ. Tertius tibiae mouentium musculus, cuius caput υ insignitur: sedes uero tendinem primum educens, §. Inser-  
v. §. tionem autem tertia musculorum tabula proponebat, caractere 3 insignitam.
- Y. Quartus tibiae mouentium musculus.
- ω, ω. Quintus tibiae mouentium musculus.
- ς. Quinti femur mouentis musculi portio.
- ς. Secundus tibiae mouentium musculus.
- τ. Portio octauae tibiae mouentis musculi, resecto iam interrim primo tibiae mouente, qui alias hic in orbe occur-  
reret. Quod uero ad musculos in tibia pedeq; repositos attinet, omnia praecedenti conuenient tabula, ut & duo-  
decimae, quam inibi caracteribus primum occupabimus.

UNDE



VNDECIMA  
MUSCULO.RVM TA-  
BYLA.



A, A SINISTRA primi caput mouentium paris musculus.

B, B Secundum par musculorum caput mouentium, in sinistro tantum latere characteribus insignitum.

\* Musculus hic obscure occurrit, cuius beneficium inferiorem maxillam deorsum agimus.

C Musculus scapulam mouentium tertius.

D Clavicula, hac in parte nunc musculus denudata.

E Dependet hic musculus, a scapula ossi v referenti insertus.

F Humanum thoracem mouentium tertius.

G Brachium mouentium quintus.

H Musculus, scapula gibbum sub illius spina occupans, ac brachium mouentium septimus, cuius initium ab H ad H, I pertinet, insertionis vero sedes K indicatur: atq, ita totus trianguli modo H, I & K circumscribitur.

L Musculus ab humiliori scapula costa ad humilioris basis ipsius angulum originem ducens, brachiumq, mouentium tertius.

M Hic musculus brachium mouentium secundus, ab exortu liberatus, antroorsum tota parte reflectitur, quam proxime praecedens tabula, O, N & P circumscribebant. Atq, ita interna musculi sedes, qua humeri articulo incumit, hac tabula in conspectum venit, & trianguli uertex etiam quodammodo proponitur, ad cuius similitudinem ueteres huius musculi initium describebant. N enim ea musculi pars est, quae basi scapulae fuit proxima:

O. O autem illa, cuius initium a summi humeri cum clavicula articulo pendet. Dein si D eam musculi partem esse finxeris, cui clavicula initium largitur, prompte assequeris, musculi suo exortu liberi principium insigniter obtusum angulum referre, ut figura modo inserta comprobat, quae tota musculi interna sedes exprimitur, articulum proxime integens. Atq, hic A, B, C, musculi indicant principium: ab A quidem ad B, principij portionem, a summo humero & scapulae spina pronatam: a B uero ad C, reliquam principij partem, quae clavicula debetur. Postremo D musculi insertionis sedes insignitur. Quod autem ad trianguli obtusum attinet uerticem, nulli non obuium est, B humilioris poni, quam A & C, quibus characteribus triangulum terminari prompte animaduertis.

P Dicitur nuper brachium mouentium musculus, ab omnibus, unde principium ducit, sedibus liberatus, ac ab infertione diutaxat in dextro brachio pendens, pulchre ostendit, hanc transversim in humerum fieri.

Q Humanum thoracem mouentium quartus.

R Musculus dorsum mouentium undecimus.

S Dorsum mouentium decimusquintus, seu octauum dorsum mouentium paris alter.

T, T, U Characteribus T, T, duas costas earum quae iam sectionis serie deteguntur, insignimus, U uero eandem costarum interuallum: ut intercostalium musculorum exterioris species obseruaretur, qui in costarum ossium interuallis consistunt.

X Musculus thoracem mouentium secundus.

Δ Quintus humanum thoracem mouentium musculus, hic uniuersum se spectandum offerens.

a, b Obsecrum impenseq, membraneum musculi oblique ascendens ab dominis initium, a spinarum apicibus inter a ac b pronatum.

c Musculus ab infertione hic dependet, brachium mouentium quartus.

⊙ Musculus cubitum extendens, cuius initium d insignitum, a ceruice capitis humeri educitur, quod scapulae articulatur. e autem sedem indicat, qua praesens musculus ab alio cubitum extendentium musculo, mox f indicando, amplius propter mutuum connexum distinguere nequit.

f Cubitum extendentium musculus, ab humiliori scapula costa pronatus, ac cum musculo ⊙ insignito ad characterem e coiens.

g Musculus cubitum flectentium posterior.

h, h Longior musculus radium in supinum ducentium.

Λ Musculus bicorni tendine brachiale extendens, cuius initium in dextro brachio i insignitur. sedes uero, quae tendinem educit, k indicatur. tendinum autem ipsius infertio, l notatur.

m Musculus radium in supinum ducentium breuior.

n Radius, dissectionis serie magna ex parte denudatus.

o Ulna. In horum ossium medio ligamentum occurrit, tota sede illa ossa intercedens, committensq, quae inuicem dehiscent.



Ξ Secundum principium trium principiorum, quibus ulna seriatim originem præbet, ab ulna hic est resectum: & ut commodè eius series tota constaret, illud, quasi quis manu id eleuasset, depinximus: ne ab insertionibus deorsum pendens, manum obscuraret: aut si per manus interiora dependisset, ipsummet obscurum euassisset. Ceterum p eius principij pars est, quæ tendinem brachialis offert. q autem tendo, primo pollicis ossi insertus. r uero is tendo, qui secundo & tertio pollicis inseritur ossibus.

f Musculus pollicem indici proximè admoens.

Π Tertium principium eorum quæ ab ulna pronascuntur, hic ab insertionè suâ pendens. Ac t quidem notat eius i, u. principij portionem, quæ indici ac medio præcipuè tribuitur: u uero eam quæ pollicis est peculiaris.

Σ Tertius femur mouentium musculus, cuius initium z, y, x circumscribitur. Quod uero ad horum characterem x, y, z rum latera, superius q spectatur, illum ossis dorsum est, primo secundoq, femur mouentibus musculis liberum.

α Ceterum α tertij illius musculi insertionem proponit.

Φ Quartus femur mouentium musculus, à tribus humilioribus sacri ossibus initium sumens, & illic primum β tendinem educens, ubi β conspicitur. Insertio autem ipsius sub α quoq, consistit.

γ Magnus femoris processus.

δ Secundus femur mouentium musculus, ab insertionè duntaxat deorsum pendet.

ε Septimus tibiae mouentium musculus. Quia uero δ indicetur, ad characterem Ω paulo post commemoraturus sum.

η Ligamentum ab osse sacro, in coxendicis ossis acutum pertinens processum.

θ Musculus decimus femur mouentium, hæc ab interiori pubis ossis sede reflexus, ac ueluti inter duos musculos,

i, κ. i & κ insignitos, prorrepens.

λ Caput tertij tibiae mouentium musculi, quod primum eorum censetur, quæ à coxendicis ossis appendice pronascuntur. Musculus interim ipse, à femore auulsus, deorsum ab insertionè pendet, mox s notandus.

μ Caput quartij tibiae mouentium, quod quatuor ut minimum capitum, à coxendicis ossis appendice pronatorum, secundam numeramus. Musculus autem ab hoceductus capite, à femore est auulsus, & paulo post insigniendus.

Υ Musculus, quem quintij tibiae mouentium loco habemus, cuius initium u insignitur, quod tertium eorum capitum habetur, hinc à coxendicis osse ductorū. ξ uero præsentis musculi ostendit sinum, cui tertius tibiae mouentium alioquin insidet. o hic quintus musculus in tendinem desinit, anteriori tibiae ossi sedi implantandus.

Ω Subsequenti tabula musculum explicabo, quem femur mouentium quintum recensemus, characteribus Ξ, & Θ. Σ & Π ibi indicandum. In præsentī autem idem musculus, characteribus & ac Θ, tum ξ ac Ω insignitur, singulisq, peculiaris musculi pars indicatur. Uterq, enim character & posteriorē notat musculi partem, ξ uero & Ω anteriore. Ceterum ξ priuatim indicat eius anterioris partis anteriore portionem. Ω autem posteriorem significat portionem anterioris partis.

ϖ Quartus tibiae mouentium musculus, hic ab ipsius parte, quam femoris os educit, quæq, ξ insignitur, pendet, g. ipsius capitis portio adhuc in exortu relicta, & μ superius notata.

ς Musculus tibiae mouentium tertius, ab insertionè pendens, cuius capitis portio in ipsius origine adhuc est relicta, superius λ insignita.

τ Musculi tibiae mouentium octauij portio. Tibia autem nullum adhuc characterem, quod sequenti tabula idem, qui hic modo, proponantur musculi, illic characteribus ex sectionis serie occupandi.

DVODECIMAE MUSCULORVM TABVLAE,  
QVAM SEQVENS PROPONIT PA-  
gina, characterum Index.

- Γ *SINISTER* primi caput mouentium musculorum parū musculus, cuius principium *A* notat: *B* uero *A, B.* & *C* inferiōne, quam in occipiti os molitur. *D* autem sedem indicat, qua dexter musculus à sinistro primum *C, D.* abscedit. Postremo *E* insinuat internum inferiōnis dextri musculi latus. Quare si illum musculus in triangu-  
*E.* liformam agere uisum fuerit, illum circumscribes lineis, *A, B.* *A, C, B, C.* Quinetiam si interuallum inter dex-  
trum musculus & sinistram consistens, quoq; trianguli modo spectare uolueris, circumscribes id opportunè, à  
*B* ad *E*, dein à *B* ad *D*, & ab *E* ad *D*.  
*F, F.* Sinistri lateris musculus secundi parū caput mouentium, qui uarijs musculis, ut sequens tabula pulchrè osten-  
det, est conformatus.  
*G* Scapulam mouentium tertius.  
*H, H* Brachium mouentium quintus.  
*I* Summus humerus, à connatis ipsi musculus liber. Ceterum neq; costas, neq; earundem interualla characteri-  
bus in presente tabula insignimus, quod in hac eadem, que in precedente tabula, ad characteres *T, T, U* sit  
ratio.  
Δ *Musculus* humanum thoracem mouentiū quartus, cuius initium *K* insignitur: *L* uero sedes indicatur, qua  
*K, L.* primum longissimo dorsum mouentium musculorum, *N* mox notando, non amplius pertinaciter (quemadmo-  
*M, M.* dum inferius à *K* ad *L* usq;) adnascitur. Tendines autem presentis musculi aliquot *M, M.* indicantur.  
*N* Dorsum mouentium undecimus musculus, seu dorsum mouentium sexti parū dexter.  
*O* Dorsum mouentium decimus quintus musculus, hic modicè conspicuus.  
*P* Scapula dorsi sedes, sub summi humeri radice, aut scapulae spina consistens, modo excarnis est, ob liberatum mus-  
culum, quem nunc *Q* notabo.  
*Q* *Musculus* brachium mouentium septimus, dictam nuper scapula sedem occupans. uerum hic ab illa excelsus, à  
sua dependet inferiōne.  
*R* *Musculus* brachium mouentium tertius.  
*S* Secundus thoracem mouentium musculus.  
*T* *Musculus* cubitum extendentium, qui ab humiliori scapulae costa initium ducit.  
*U* In sinistro brachio musculus cubitum extendentium exterior, ab ea sede propendens, qua cum interiori, *T* no-  
tato, impense commiscetur. In dextro autem brachio propendens ea pars, resecta cernitur.  
*X* Hac sede ab humero carnea exoritur portio, quam secundi musculorum cubitum extendentium loco habebi-  
mus, sequentiq; tabula d notabimus.  
*Y* *Musculus* cubitum flectentium posterior.  
Θ *Musculus* radius in supinum ducens, qui ab humero multo superius, quam externum illius consistit tuber,  
*a, b.* imbi exoritur, ubi à ascriptissimus, ipsius inferiōnem, quam in humiliorem radij appendicem molitur, b indi-  
cantes.  
Λ *Musculus* alter, cuius ope radius in supinum agitur. Huius initium c indicatur, inferiō autem d insignitur. *c, d.*  
*e* Neruea portio, seu inferiōnis terminus musculi superioris radius in prouum agentium.  
*f* Radius.  
*g* Ulna.  
*h* Ligamentum, radius ulnamq; quā inuicem dehiscent, committens.  
*i, k.* Hanc sedem, sinuum uehendis musculorum tendinibus paratorum, & cartilaginis ulnam à brachiali diuimen-  
tis nomine, pluribus ornassent characteribus, nisi illa superiori libro pulchrè fuissent obuia, præcipue autem in  
secunda & quarta figuris Capitis uigessimiquarti.  
*l* Hac sede, iam ex sectionis serie musculi tendinibusq; libera, aliter ligamenta, quibus ossa compinguntur, propo-  
ni nequeunt.  
*m* Postbrachialis os, anularem suffulcens digitum: quod ideo priuatim notauimus, ut ossa postbrachialis ab ipso-  
rum interuallis, musculisq; illa occupantibus, interstingeretur.  
*n* Hic musculus reponitur, pollicem indici proximè adducens.  
*o* *Musculus*, bicorni tendine brachiale extendens, ab inferiōne in dextra manu propendens: in sinistra autem sua  
inferiōnis termini duntaxat sunt asseruati.  
*p* Hic bona transuersi abdominis musculi pars occurrit.  
*q* Ilum ossis dorsum, nunc prorsus ex carne, musculisq; liberum spectatur.  
*r* Femoris caput, coxendicis ossis acetabuli subiens: aut ipsum potius ligamentū, presentem ambiens articulum.  
*s* Ligamentum, à sacro osse in acutum coxendicis ossis processum desinens.




## DVODECIMA

MUSCULO-


RVM T. A.

BY L. A.



- \* Dependet hic ab insertione tertius femur mouentium musculus.  
 u Quartus femur mouentium musculus, hic quoq; ab insertione propendens.  
 x Magnus exterior ne femoris processus.  
 α Decimus femur mouentium musculus, cuius præcipuam partem in decima sexta musculorum tabula opportunè spectabis, ad characteres F, G, H. Præsens autem tabula eam musculi partem monstrat, quæ ad peculiarem ipsi in coxendicis osse elatum sinum reflexa, ad magnum femoris ducitur processum.  
 β Musculus gracilis, ab acuto coxendicis ossis enatus pro processu, elatioriq; musculi α insigniti sedi exporrectus.  
 γ Musculus similiter gracilis, à coxendicis osse etiam pronatus, & inferiori exporrectus parti eius musculi, quem α notauimus.  
 Ξ, Σ, Π Musculus femur mouentium quintus. Verum Ξ priuatim notat posteriorem huius musculi partem, cuius caput partim nerueum, ac Δ insignitum: & partim carneum, & notatum, à coxendicis ossis appendice enascitur, hincq; prodeuntium capitum numero quartum censetur. ? Hac sede posterior hæc quinti femur mouentis musculi pars, admodum carnea est, uerimuris, ut ita dicam, effigiem præ se ferens. u Hic posterior quinti musculi pars in tendinem degenerat, interiori capitum femoris insertum. Ceterum Π & Σ, anteriorem quinti femur mouentium musculi indicant partem: ac Π quidem eius partis posteriorem portionem, Σ uero anteriorem. Quo autem hæc non admodum sane obuia, promptius percipias, eosdem illos Græcorum manusculos characteres in sequenti tabula repositurus sum, in qua musculus suus principijs liberatus, dumtaxat illa insertione adhuc fixus propendet, quam in interius femoris caput circa popliteum molitur: & characteres inibi iisdem quibus in præsen-  
 ti tabula, musculi quinti sedibus, erunt obuij.  
 θ Musculus tibiam mouentium septimus.  
 u, x Musculus tibiam mouentium octauus.  
 λ Ampla depressaq; femoris ossis sedes, supra radicem inferiorum ipsius capitum, posteriori in sede consistens.  
 μ, ν Quartus tibiam mouentium musculus, in sinistro crure ab insertione pendens. ac μ quidem partem illius indicat, à coxendicis osse enatam: ν uero partem, cui femur principium præbet.  
 ξ Tibiam mouentium quintus musculus, à femore auulsus, & ab insertione tantum pendens.  
 Φ Primus pedem mouentium musculus.  
 Υ Secundus pedem mouentium musculus. Ceterum huius musculi (perinde ac primi) principium duobus notatur characteribus, ut duæ utriusq; principij partes melius occurrerent. Est enim principium partim carneum, ω, ς, T. ac ω insignitum: partim nerueum, ac ς indicatum. T autem sedes significatur, ubi primum duo isti primi pedem mouentium musculi contigui sunt. ϑ Hactenus musculi illi in sura exuberant, hincq; carni osse desinunt: uerum hæc tubera, nona tabula etiam accuratè exprimuntur. υ Tendinis, qui è duobus præsentibus musculis educitur, principium.  
 ω Initium musculi pedem mouentium tertij, cuius tendinem proponit character & in sinistra positus tibia.




DECIMA-  
TERTIA  
TABVLA.



- A, B, C, D, E, F, G, G* Dextra portio secundi musculorum caput mouentium parvis, in quo singuli caracte-  
res aliquod priuatum insinuant. *A* enim indicatur musculus secundi parvis, acuto principio ex transuersis quin-  
tae & quarta thoracis uertebrae processibus enatus. *B* musculi huius sedes, quae carnea esse desinit, ac uelut  
in tendinem degenerat. Porro *B* quoque musculum significare debet, qui à septima ceruicis uertebra spina ena-  
scitur, & cum musculo *A* insigulo commiscetur. Congressus autem sedis, C inscriptum est, ubi uterque exacte  
carneus efficitur. *D* uiriusque musculi insertionem notat. *E* secundi parvis tertius in altero latere musculus indi-  
catur, cuius etiam principium in alto latitat, insertionem interim ipsius ad *F* conspicua. Postremo *G* ac *G* secun-  
di parvis carnea moles insiguitur.
- H* Musculus dorsum mouentium quintus.
- I* Portio musculi dorsum mouentium sexti.
- K* Decimus quintus dorsum mouentium, seu eorum musculorum octauus parvis alter.
- L* Undecimus dorsum agentium, cuius principium à sacro osse pendens, *L* insiguitur: ipsius uero ansula, tendi-  
nes uel, *M, N* notantur, superiori interim *N* ad huius musculi summum reposito.
- L, M.* Character *z*, loco *N* positus, musculum dorsum mouentium nonum indicat.
- O, O* Musculus hic ab exortu propendet, thoracem hominis mouentium quartus.
- P, P* Haec costarum asperitates, earum tubercula referunt, in quae quartus thoracem mouentium musculus inferebat-  
tur. Quod autem ad costas, eandemque interualla attinet, eadem hic atque in aliquot precedentibus tabulis est  
ratio.
- Q* Scapulam mouentium tertius.
- R* Scapula, posteriori parte prorsus iam musculis liberata.
- S* Brachium mouentium tertius, hic pulchre conspicuus.
- T* Secundus thoracem mouentium musculus.
- U* Tertium ligamentum peculiare articuli humeri.
- X* Dependet musculus brachium mouentium quintus.
- Y* In utroque brachio posterior humeri pars, excarnis prorsus, musculisque libera cernitur.
- a* Posterior cubitum flectentium musculus.
- b, c, d* Musculi cubitum extendentes. *Ac* *b* is insiguitur, qui ab humiliori scapula costa initium ducit: *c* ille, qui ab  
humeri capitis ceruice exoritur: *d* autem, carnea pars, quae ab humero ad medium ferè longitudinis ipsius ori-  
ginem sumit.
- e* Radius.
- fg* Musculus radium in prorum ducentium superior, cuius insertionem priuatum *g* insinuat.
- h* Dependet hic ab insertione musculus radium in supinum mouentium breuior.
- i* Ulna.
- k* Ligamentum, radium ulnae, quae haec ossa inuicem dehiscunt, committens.
- l* Resecto musculo, pollicem indici proxime adducente, hic notatur *is* qui primum indici os introrsum flectit.
- I, 2, 3* Tribus his characteribus tres notantur musculi, secundum pollicis articulum flectentes. Quod ad ossa hic in ma-  
nu, & ligamenta spectat, omnia praecedenti tabula respondent.
- m* Illum osse dorsum, quemadmodum & coxendicis osse exterior sedes, prorsus excarne occurrit.
- n* Coccyx os excarne, seu musculis ipsi adnatis liberum cernitur.
- o* Ligamentum à sacro osse, coxendicis acuto processui insertum.
- p* Femoris caput.
- q* Magnus exteriorque femoris processus.
- r* Hic ab insertione propendet decimus femur mouentium musculus, internam ipsius sedem, quae ossibus undique  
fit, attenditur, commonstrans. Atque ita *fit, u*, huius musculi tendines notant, ad coxendicis os reflexos.
- x, y, z* Tribus his characteribus, carnea indicae pars, uagina quasi modo decimum femur mouentium musculum  
inibi deducens, quae ad coxendicis os reflectitur. Atque ita *x* huius carnea pars supremam indicat sedem, *y* me-  
diam, *z* autem infimam.
- α* Musculus femur mouentium nonus, hac ab anteriori osse pubis for aminis sede magnam petes femoris processum.
- β, γ* In dextro femore duo musculorum notantur insertiones, in paruum femoris facta processum. *Ac* *β* quidem  
insertionem indicat musculi femur mouentium sexti, *γ* autem femur agentium septimi.
- δ, A* Musculus tibiam mouentium octauus, uniuersum femur propemodum ambiens.
- e, e* Aspera femoris indicatur linea, cui quintus femur mouentium musculus insertus.
- Ξ, Π, z* Quintus femur mouentium musculus, ab interno femoris capite propendet, in quo *Ξ* posteriore ipsius notat  
partem,

DECIMA-  
QUARTA  
MUSCULO-  
RUM TALI  
BPLA.



- partem, Π uero & Σ anteriorem. atq; hic rursus priuatim Π posteriorē indicat portionem partis anterioris, Σ uero anteriorem partis anterioris portionem.
- Φ *Atysculus, in pedem mouentium classe tertius enumeratus, ac principium Φ indicatur, à femoris externo ob-*  
*tinens capite: tendinem autem illic educens, ubi ? insignitur.*
- <sup>H, H</sup> *Atysculus, quem in poplite latitantem uocamus.*
- Υ *Quartus pedem mouentium musculus, cuius initium θ indicatur, ipsius autem sedem, qua tendo duorum pri-*  
<sup>θ, u.</sup> *morum pedem mouentium musculorum illi primum pertinacissime adnascitur, u. notauimus. λ uero tendinis*  
<sup>λ.</sup> *insignitur insertio, quæ duobus illis primis pedem mouentibus & tertio confurgit.*
- μ *Hac sede tibie os musculi liberum conspicitur, quemadmodum & magna portio exterioris capitis duorum hu-*  
*miliorum femoris capitum.*
- ν *Tendo musculi pedem mouentium octaua.*
- ξ *Tendo septimi pedem mouentium, qui secundum posteriorem externi malleoli sedem, quemadmodum & tendo*  
<sup>ν</sup> *insignitur, hac reflectitur.*
- Θ *Presenti characterē indicatam uolui figuram, ad dextrum integri hominis hac decimatercia tabula expressi*  
*crus repositam, lapidq; immitentem: quo tandem inferior pedis sedes oculis subijciatur, & sectionis serie, musculi*  
<sup>ω.</sup> *in hac apparentes, sensim in sequentibus tabulis proponantur. Significetur itaq; primum ω ligamentum, seu*  
*membranea substantia, primo digitos mouentium musculo obnata, latiq; tendinis uicem in planta subiens.*
- ρ *Musculus, pollicem à cæteris digitis inuorsum abducens.*
- σ *Musculus, ab dictionis parui digiti à cæteris oppos.*
- <sup>T, T</sup> *Primus secundusq; pedem mouentium musculi, in integro quidem homine à quarto pedem mouentium propen-*  
*dentes: in ista autem figura, quam Ω propomus, sua sede adhuc repositi.*
- υ *Tendo tertij pedem mouentium musculi, qui ? in integro homine notabatur.*
- φ *Portio quarti pedem mouentium musculi, quem in integro homine Υ insignitur cernis.*
- χ *Tendo ex primo, secundo & quarto pedem mouentium musculis conflatus, calcij insertus: quanquam χ hic*  
*priuatim cavitatem proponat, inter anteriorem huius tendinis partem, & posteriorem sedem aliorum muscu-*  
*lorum conspicuam, qui hanc tibie sedem occupant.*
- <sup>†, ω</sup> *†, ω Hæc carnis, nulliq; musculi, uel ante sectionem, obrecta tibie ossis pars.*
- \* *Hæc portiones occurrunt musculi tertium quatuor digitorum articulum sectentis, & quinti pedem mouentium.*

## DECIMAE QVARTAE MUSCVLORVM

tabulæ characterum Index.

- P R A E C I P U A huius tabule imago, iam sectionis serie scapulis & brachijs caret, & genua flectit, ut  
 plantam altero crure spectandam proponeret. Ad genua uero, ne alia quæpiam integra delineanda esset tabu-  
 la, caput unà cum duabus primis cervicis uertebis reponitur, quantum musculorum caput mouentium par  
 ostensum. Deinde dextro pedi (qui sectionis serie illi succedit, quem figura iuxta integriorem decimatercia ta-  
 bula imaginem reposita, & Ω indicata, demonstrat) alia accumbit figura, sectionis quoq; ordine integrioris
- Δ. hic imaginis pedem subsequens, ac Δ insignita.
- <sup>A, B</sup> *Tertium caput mouentium par, à secunde cervicis uertebrae spina occipiti insertum.*
- C *Mamillaris processus, tam in præcipua imagine, quàm illa quæ ad genua spectatur, conspicuus.*
- D *Hic character, cum tribus subsequenibus, figuræ ad genua locatæ proprius est, transuersum primæ cervicis uer-*  
*tebra indicans processum.*
- E *Spina secunde cervicis uertebrae, atq; ita etiam E secundam cervicis denotat uertebra.*
- F, G *Quartum caput mouentium musculorum par, à prima cervicis uertebra occipiti insertum.*
- <sup>H, I</sup> *In ceruice præcipue imaginis insinuat quinquum par musculorum caput mouentium.*
- <sup>K, L</sup> *Sextum caput mouentium par, à spina secunde uertebrae, transuersis primæ processibus insertum.*
- M *Musculi scapulam mouentium tertij pars, in primo musculi exortu relictæ.*
- N *Dorsum mouentium musculorum tertius.*
- O *Dorsum mouentium septimus musculus, seu quarti paris alter.*
- P *Character P in lumbis reponitur, notans nonum dorsum mouentium musculum.*
- Q *Undecimus dorsum mouentium musculus, hic ab ultima ipsius insertionē pendens, ac sinum R insignitū osten-*  
<sup>R, S.</sup> *dens, quo decimotertio dorsum mouentium cedit: ipsius autem principium S indicatur.*
- T *Decimotertius dorsum mouentium musculus, cuius principium U notatur, finis uero X: quod etiam princi-*  
<sup>U, X.</sup> *pium decimiquinti dorsum mouentium musculi indicat, iam Y insigniendi.*
- Y *Decimus quintus dorsum mouentium, cuius superius extremū, a insignitū, sub septimo dorsum agentis recoditur.*

Costia



Costis & intercostalibus musculis nullos adhibui characteres, quod hæc cum præcedentibus tribus tabulis sunt communia, atq. eadem etiam ratione, ossa iam sectionis ordine denudata non explicantur, quod hæc ex integris ossum figuris sint petenda. Conduxerit tamen, huius thoracis, ut & octavæ tabule thoracis, formam & costarum ductum cum illis conferre, quod omnia hic magis suo situ exprimuntur, quam ex ossibus, nostra industria rursus compactis, delineari queunt. Quocumq. enim modo ossa connecto, semper mihi manus inter humillimæ costæ apicem & illius os intervallum confurgit, quàm omnibus suo situ in homine positis occurrit.

b, b Ligamentum, seu membrana, pubis ossis foramen occupans.

c Musculus sextus femur moventium, ab insertione propendens.

d Musculus septimus femur moventium, ab insertione quoq. propendens.

e Hic musculus propendet femur moventium nonus.

f, g Pendet hic carnea pars, seu, si voles, privati musculi, decimus femur moventium deducens.

h Musculus, quem in poplite latitante vocamus, cuius exortu h insignimus, ipsius interim insertione i notata. h, i.

k, k Septimus pedem moventium musculus, in utraq. occurrens tibia.

l In sinistra tantum tibia notatur octaviæ pedem moventis musculi tendo, cuius insertio in pedis os, parvum sustinens, facta, m insignitur.

n, o, p, q A sinistri pedis calce quatuor humi prostrati pendunt musculi, pedis motorum opifices. n enim & o, duos primos pedem moventium insinuant, p autem tertium, q vero quartum. Cæterum r priuati terij musculi tendinem hic notat.

f Ligamentum, seu membrana pedis, à digitorum terminis pendet, & lati in manu tendinis vicem gerebat.

t Dependet musculus, pollicem a cæteris digitis abducens.

u Musculus hic à sua insertione dependet, minimum digitum à reliquis in latus abducens.

x, a Musculus secundum quatuor digitorum os flectens. x ipsius principium à calce enatum, a illius in quatuor tendines partito. Cæterum qua ratione huius tendines diuisi, subditos transmittant tendines, in dextro integrioris imaginis pede expressum habes, quanquam & figura Δ notata, hæc etiam commonstret, musculum illum ab insertione propendentem, & o quoq. insignitum obtinens.

β Musculus, primum pollicis os introversum flectens: qui in uno pede, suo loco asseruatus, in altero ab insertione dependet.

γ, δ Musculus, secundum pollicis os flectens. γ in dextra tibia huius musculi notatur principium. Ea sede, qua superius perius d occurrit, præfens musculus ab interno ipsius latere tendinem educit, qui in carnea ipsius substantia aliquosq. incoperat, iuxta characterem e. Huiusmodi autem δ in utraq. etiam figura plantam referente, tendinem indicat, pollicis iam proximum.

Ξ Musculus, quatuor digitorum tertium os flectens, cuius principium aliquantisper altius adhuc, quàm ζ, sub musculo in poplite latitante consistit. u tendo illius, ab interno etiam latere carnosæ sue substantiæ enatus, atq. in pe θ, dis plantæ, in quatuor alios tendines inibi, ubi θ occurrit, diuisus.


u Hic sese ostendit portio musculi, quem inter pedis motores quintum numeramus.

λ Musculosa caro, quæ in quatuor portiones ducta, tendinibus tertium quatuor digitorum os flectentibus exporrigitur, & quatuor pedis digitos ad pollicem mouet. Et uero & tendines illos, & has musculosæ substantiæ portiones accuratius cognoscas, tendinem, qui tertium indicis os flectit, v notatum conficis: portionem uero,

μ, indicem pollicis adducentem, μ.

HUMANI FABRICA LIBER II.  
DECIMAQVINTA MVSCVLO-  
RVM TABVLA.

251



DVARVM DECIMAEQVINTAE MVSCVLO-  
RVM TABVLAE FIGVRARVM, EARVN-  
demq; characterum Index.


*D* & *A* praesentis tabula figuræ, in ea seruantur effigie, in qua interioris imaginis decimæquartæ tabulæ dextra tibia simul cum se exhibuit. Atq; prior hîc figura in sectionis serie figuram subsequitur, quam præcedens tabula  $\Delta$  notatam ostenderat. Posterior autem huius tabulæ figura succedit priori. Notæ uero harum figurarum ita se habent.

- A* 1 Tibiæ os.  
*B* 1 Fibula.  
*C* 1 Musculus à tibiæ osse dependet, qui in poplitæ latitat.  
*D, E* 1 Musculus quintus pedem mouentium : ac *D* quidem ipsius notat principium, *E* uero tendinem, ab interno musculi latere pronatum.  
*F* 1 Sinus, quo tendo uehitur musculi tertium quatuor digitorum os flectentis.  
*G* 1 Sinus, cui tendo insidet, secundi pollicis internodij flexionis opifex.  
*H* 1 Musculus pedem mouentium septimus, hic adhuc ad fibulam, uti & subsequens, illiq; substratus, se offert.  
*I* 1 Musculus pedem mouentium octauus.  
*K* 1 Sexti pedem mouentium musculi tendinis portio, ad ipsius insertionem hic asseruata.  
*L* 1 Musculosa congeries, primum quatuor digitorum os flectens, ab seclâ nimirum iam eius cogeret parte, primum pollicis os flectente.  
*M* 1 Officula ad primum pollicis internodium reposita, quæ à sesami seminis imagine nomen inuenerunt, quæq; ab Arabibus & Occultis philosophis dimidiati ciceris formâ assimilantur.  
*N* 1 Pendet hic musculosa substantia, quæ singulis quatuor digitorum internis lateribus portionem exporrigit, digitos pollicis adducentem.  
*O* 1 Musculus secundum pollicis os flectens, humi prostratus iacet, insertione sua tantum hærens.  
*P* 1 Musculus tertium quatuor digitorum os flectens, ab insertione tantum hæret, ac humi extensus usitur.  
*Q* 1 Portio tendinis secundum pollicis os flectentis, illi tendani commixta, qui tertium indicis os flectit.  
*R* 2 Tibiæ os.  
*S* 2 Fibula, similiter ac tibiæ os posteriori sede iam prorsus musculus libera.  
*T* 2 Ligamentum membraneum, fibulam tibiæ ossi illic committens, ubi hæc ossa inuicem debiscunt.  
*U* 2 Musculus pedem mouentium septimus. *X* hæc septimi musculi tendo, sub osse cubum tesseram' ue imitante reseritur, & latefit quoq; *Y* tendinis huius in pedis os pollicem sustinens insertio.  
*X, Y* 2 Musculus sub septimo occultatus, & pedem mouentium octauus, cuius insertionem *b* notat, quæ in pedis os, *b* paruum

- paruum sufficiens diguum, perficitur.
- 1, 2, 3 Tribus his characteribus, in secunda sinistra ue figura, tres sinus indicantur, tendinibus à posteriori tibia sede inferiora pedis subeuntibus exculpti. Atq. 1 sinum notat, quo quinti pedem mouentium musculi tendo uehitur. 2 sinum tendini tertium, quatuor digitorum os flectenti insinuatum. 3 uerò sinum indicat, nomine tendinis ca latum, cuius beneficio secundus pollicis articulus flectitur.
- c 2 Acufculus humi dependet pedem mouentium quintus, in dextra figura D & E notatus, ac in sinistra figura d. ad insertionem d insignitus.
- e 2 Acufculosa moles, primum quatuor digitorum os flectens, hic ab insertione pendet, à pedis ossibus, quae iam nuda ex carneq. spectantur, liberata.

DECIMA-  
SEXTA XV.

SCYLOPYM  
TABVLA.



DECIMAE.



DECIMAESEXTAM tabulam licuisset statim tertiae musculorum tabulae subijcere: sed quoniam corporis duntaxat pars existit, huc eam reponere magis usum fuit, quia sinistri femoris, tibiae, pedisq; interna facies, nullo liberata musculo, exprimitur, una cum osse sacro, & osse ipsius sinistro lateri commissio, ut decimus femur mouentium musculus ea sui parte alicubi in conspectum ueniret, quae internam pubis ossis & coxendicis ossis sedem occupat.

- A Os sacrum.  
B Ossis sacri latus, cui dextrum ilium os committebatur.  
C Ligamentum a sacro osse, in coxendicis ossis appendicem pertinens.  
D Sinistri pubis ossis sedes, quae dextro pubis ossi committebatur.  
E Notatur quartus femur subiens nervus.  
E, F, G Decimus femur mouentium musculus, cuius tres ueluti partes, E, F, G insignitae, in inscriptionibus quodammodo distinguuntur. Atq; his partibus ab interna pubis ossis sede, & interna quoq; coxendicis ossis regione, musculus H. iste carneus pronascitur. Ad sedem uero H indicatam, arctior redditur, & ad sinum sibi in coxendicis osse insculptum reflexus, ad magnam femoris perfertur processum.  
I Conspicua est portio septimi femur mouentium musculi.  
K Portio sexti femur mouentium musculi.  
L Primus tibiae mouentium musculus, cuius sedes, quae iuxta internum femoris caput in tendinem cessat, N. indicatur.  
Δ Secundus tibiae mouentium musculus. N & O musculi huius principium, ab ossis pubis commissura a pronatum indicant. N quoq; etsi in primo tibiae mouentium ponatur musculo, huius secundi musculi etiam sedem notat, quae prorsus in tendinem desinit.  
P Nonus musculus tibiae mouentium, parua ipsius portione hic conspicuus.  
Q Octauus tibiae mouentium musculus.  
R Tercius tibiae mouentium musculus, cuius tendo, quemadmodum & primi & secundi tibiae mouentium musculorum, N quoq; indicari potest. & promptissimum etiam est inueniri, ubi nam musculorum tendines in anteriorem tibiae ossis sedem inferantur.  
S, T Quintus femur mouentium musculus. uerum S posteriorem eius musculi partem notat. T autem eius musculi anterioris partis posteriorem indicat portionem.  
U, V Quintus tibiae mouentium musculus.  
X, Y Excarnis tibiae ossis pars. uerum Y interiorem notat malleolum.  
a Primus pedem mouentium musculus.  
b Secundus pedem mouentium musculus.  
c Tendo tenuissimus, idemq; summe gracilis, qui a tertio pedem mouentium musculo educitur.  
d Musculus suram constituentium maximus, pedemq; mouentium quartus.  
e Musculus, quatuor pedis digitorum tertium os flectens.  
f Portio musculi pedem mouentium quinti.  
g Tendo sexti pedem mouentium musculi.  
h Tendines digitos extendentes.  
i Musculus. pollicem a ceteris digitis introrsum abducens.

TABVLARVM MUSCULORVM, ET EARVNDEN  
characterum indicum finis.

Z

QVID

AND. VESALII DE CORPORIS  
QVID LIGAMENTVM, AC QVIS  
ligamenti usus & differentia.  
Caput I.

*F I C R A* hic in latere posita, uniuersum femoris os exprimit, unà cum tibia offe, & fibula: quibus ea ligamenta adhuc connata haerent, quae primi Capitis contextus intelligendo subferuiunt.

*A, T, C, D* Femoris os.

*B* Femoris ossis caput, sinum coxendicis ossi subiens.

*C, D* Femoris ossis humiliora capita, quae tibiae articulantur.

*E, F, G, H* Tibiae os.

*F* Eminens superioris sedis tibiae ossis processus, qui sinum subingreditur, quem duo humiliora femoris ossis capita in ipsorum medio continent, & qui ligamentum mox *X* insinuandum educit.

*G* Sedes tibiae ossis, quae complures uehuntur tendines eorum musculorum, qui anteriorem tibiae regionem occupant.

*H* Interior malleolus.

*I, K* Fibula. uerum *K* exterior malleolus priuatim insignitur.

*L, M* Musculus notatur in sura maximus, pedemq; mouentium quartus, atq; inter reliquos corporis musculos intensissime ueniens. Verum *M* huius musculi tendinem, calcis ossi in-

*N* sertum, particulatim indicat. *N* autem portiuunculam tendinis primi & secundi pedem mouentium musculorum ostendit, quae quarto pedem mouenti musculo conuascitur, ac simul cum illo unita, calci inferitur.

*O* Teres ligamentum, femoris os coxendicis ossi iungens.

*P, P* Ligamentum, orbiculatim femoris cum coxendicis offe articulum amplectens.

*Q* Ligamentorum portiones, ex magno externoq; femoris processu in musculorum substantiam absumptae, ac potissimum in tibiae mouentium septimi.

*R* Portiuncula ligamentorum quoq; à radice interioris minorisq; processus femoris pronatae, & in oclauum tibiae mouentem musculon præcipue degenerantes.

*S, S* Membraneum ligamentum, reliquis etiam omnibus articulis commune, quod uniuersum genu articulum ambrat: ea tantum parte excepta, cui mola patellae praeponitur.

*T* Ligamentum, genu articulo proprium, quod externo ipsius lateri attenditur.

*U* Ligamentum hoc, etiam genu articulo peculiare censetur, interno ipsius lateri attensum.

*X* Ligamentum, ex tibiae ossis processu *F* notato, in femoris os insertum.

*Y* Ligamentum, superiorem fibulae partem tibiae ossi connectens.

*Z* Ligamentum, inferiorem fibulae partem tibiae alligans.

*a* Membraneum ligamentum, fibulam tibiae ossi toto ductu, quo inuicem haec ossa dehiscent, committens.

*b, c* Hic ligamentum notatur, tendines anuli riuu amplectens, qui à tibiae anteriori sede, in pedis superiora porriguntur. Ut uero ipsius natura exactius oculis subiceretur, id sectione secundum longitudinem ducta diuisum, unaq; sui parte in latus reflexum sinximus.

*d* Ligamentum, à tibiae offe ad calcem insertum, & tendines hac ad pedis inferiora descendentes continens.

*e* Ligamentum, à fibula ad calcem porrectum, & tendinibus hac pedis inferiora petentibus obductum.

*f* Ligamentum cartilagineum, ab interno malleolo, in tali internum latus insertum.

*g* Ligamentum cartilagineum, fibulam talo colligans.



CAPITIS  
PRIMI  
figura.

Huc sanè & tabulam retuliffem, trigesimo præsentia libri Capite proponendam, quæ primæ cernicis uertebra ad secundam, & primæ secundæq; ad caput connexum exprimit: nisi quam hic modo exhibui, omnem utinam ligamenti differentiam & usum commonstraret.



a undiq; in  
figura, Cu-  
pitis huius  
initio præ-  
posita, liga-  
menti oc-  
currunt.

b o.p.s.  
T.V.

VANDO QUIDEM primus liber omnia quæ ad ossium cartilaginumq; historiam spectare duximus, recensuit: præfens ipsorum ligamenta, & eos quibus mouentur musculos, peropportune prosequetur. Ligamentum itaq; quod nervi generatim dicti nomine etiam cõprehendimus, Græcicè *συνδεσμος* nuncupatur, corpus est simile, primario ex osse, aut cartilagine principium ducens, durum, sed tamen cartilagine mollius, albū, uariosq; in colligando, continendo, obtegendo, dirimendo, &

Quid liga-  
mentum.

Ligamentorum  
us in colligando.

Ligamenti  
substantia.

c b.

Ligamenti in  
tendensibus col-  
ligandis usus.

d i. mofc.  
14. charact.  
3. 4. 5. 6. fe-  
cundæ aut  
14. charact.  
3. 2. 3. 4. 5.  
6.  
e 4. tab. d.  
f 1. tab. d.  
2. tab. a.  
g 2. tab. s.  
dein 2. ue-  
rius fuffice-  
rit femper  
unum atq;  
alterum in  
singulis ex-  
emptis ad-  
notasse.

musculis constituendis, usus præstans. Nisi enim ossium & cartilaginum articuli, non læui sanè occasione extructi<sup>b</sup>, ligamentis tenerentur, nihil sanè miranda est rerum Opificis Dei industria, qui ex mutuò coarticulatis partibus substantiã quandam pronasci uoluerit, ita duram, ut eas simul adamussim tutoq; colliget: & quo minus per uiolētos & cõtinos, propemodūq; indefessos motus à se inuicē rumpantur & dissiliant, pulchrè præstet. & interim in molitie ita tēperatur, ut tantū tendi remittiq; possit, ut articulorū, quibus singuli ex sua cõstructionis ratione agi debent, motus haudquaquā prohibeat, & quo minus cõcinnè celebrētur, obstat, adeò ut iste præcipuus primariusq; ligamēti habeatur usus, à quo etiã suum nomen potissimū inuenit. Secundo autē usu ligamentū, tendines suis, quibus uehūtur, sinibus cõtinet, ac ne ex ipsis declinēt, aut ab illis eleuentur, præcauet. Huius generis ligamēta in externa cubiti sede, quæ brachiale illi articulat<sup>d</sup>, sex uisuntur: in interna uerò brachialis regione<sup>e</sup>, unicum insigniter ualidū. deinde in interna digitorū manus ac pedis sede, unicū quoq; in tota ferè ipsorū longitudine consistit. In anteriori insuper sede, quæ pedi articulat<sup>f</sup>, unum quoq; occurrit, amplum & ualidū. &<sup>g</sup> alia deniq; inter tibiã & calcem, ac inter fibulã & calcem obseruātur, omnia potissimū in hoc creata, ne tendo in musculi cõtractione è proprio sinu affurgat. Nisi enim huiusmodi ligamentū anteriori tibiæ sedi iuxta pedem præpositum, inter reliquos, quibus uiam præbet, tendines, eos qui digitorum extensionis authores sunt, transmitteret & cõtineret: illi, quoties digitos tenderemus, antrosum à tibiæ & pedis articulo prominerent nihilo minus sanè, quàm si funiculū unī digito alligatum, ad genu usq; protenderes, illoq; digitū eleuare conareris. funiculus nanq; ille, uersus genu attractus, plurimū à pedis cum tibiã articulo abscederet. At si aliū funiculum transuersim infimè tibiæ sedi obligaueris, & sub illo eum quo digitum extendi uolebā, traduxeris, funiculus iste, etiam si protrahatur, non amplius à tibiã rectus abscedet: sed tibiæ pedi<sup>q</sup>, transuersi uinculi occasione toto ductu exporrectus, digitum eleuabit. Hanc Naturæ fo-





tertiam aurigas anulis illis imitari cernimus, quos equorum iugis connectunt, ut oblongiori habena per anulū traiecta, equos, quibus non infident, opportunius reflectāt. Quia uerò ligamēta hæc, perinde ac anulus habens, transuersim tēdinibus obducuntur, aut potius illos orbiculatim amplexantur, Græcis *ὀφθαλμοειδῆ* fere nuncupata. nos autē illa nunc transuersa, nunc anularia appellamus. Interior eiusmodi ligamentorū superficies anulis, per quos funes traiciuntur, penitus respōdet, quum secundum cauum (ut i tendo secundum convexū) orbicularis sit, & leuis, & uiscido humore, ceu oleo quopiā, perfusa. Quippe hæc ligamenta non solum tēdinibus, qua cutē spectant, extrinsecus obducuntur: uerū etiam uelut strātū ipsis fiunt, ossisq; duritiē corrēctura, inter os & tēdines sese infinuant, undiqueq; in orbē eos, citra omnem prorsus connexū amplexantia, & ut anulus habena, transmittētia. Horum ligamentorū ferē ordini ascribendæ sunt membranæ, trāuersim alicui integræ musculorū congeriei obductæ, ac ne illi inter se implicētur, suā ue sede aberrēt, pulchrè auxiliatæ. huiusmodi enim membranas in tota cubiti, femoris & tibię lōgitudine, musculis præesse recēsebimus. Insuper & transuersum primæ ceruicis uertebre<sup>a</sup> ligamentum, dentem secūdē uertebre in suo sinu cōtinens, ac ne ille aliquādo dorsalem medullam cōprimat, instar ualli prohibens, in horū quoq; numero haberi potest. Præterea, si non fictos penitus arbitrarer cerebelli processuum, qui uermibus cōparantur, motus, inter hæc ligamēta quoq; enumerarē, tenuis cerebri membranæ partes, quæ anteriore cerebelli sedem, cerebri<sup>k</sup> natibus, & posteriorem<sup>i</sup> dorsali medullæ cōnectunt. Quandoquidē Galenus illas membranæ partes in hoc formari arbitratus est, ne processus uermiū modo extructi, à sua sede reclinarent. His itaq; tenuis mēbranæ omisissis partibus, huc quoq; referam mēbranas, seu ligamēta potius ex ossibus pronata, & quosdam ossiū sinus ideo succingentia, ut, etsi musculus tendinem<sup>u</sup> ue sinui incumbētē, anuli modo orbiculatim undiq; non amplexentur, nihilominus tamen (quum nullus eleuationis tendinis alioquin metus ingruat) sinum ita subungant, & ipsa uiscido quoque humore sic oblinentur, & læuia sint, ut pinguis rotulæ modo, musculū & tendinem sibi superuehi sinant, & quo minus is atteratur præsent.<sup>m</sup> Reperies autem non sine summa uoluptate huiusmodi ligamentum, in posteriori coxendicis ossis sede, sinui obnatum, ad quem musculus reflectitur, qui internam pubis ossis sedem occupans, femur extorsum circumagit: deinde etiam in superiori coxendicis ossis<sup>n</sup> regione, qua<sup>o</sup> duo musculi descendunt, primarij femoris flexus opifices. Huc quoq; spectant ligamenta, cartilagineam ligamentorum naturam seruantia, quæ ossium acetabulorum cavitatem augent, cuiusmodi ad coxendicis sinus, quo femur excipitur, supercilium obnascitur. Et fortassis huc reponendæ essent ligamētosa<sup>r</sup> cartilagine, quas in genu articulo haberi, in primo libro retulimus. Videtur namq; Galenus & genu cartilaginibus, ligamentorum nomen indidisse, licet ad colligationem nimis quàm parum (ut i ad femoris capita cōtinenda plurimum) conducant. Porro tertius ligamentorum usus censebitur, quo illa instar indumenti & propugnaculi, corporibus quibusdam obducuntur, in quorum albo in primis transuersa secundū usum ligamenta comprehendimus, & priuatim mucosas quasdam membranas, tendinibus tunicæ ritu circumdatas,<sup>q</sup> cuiusmodi in manu præcipuè obseruantur. Tendines enim musculorum, qui ex cubito ad digitos procedunt, membranalibus proprijs obteguntur: & potissimū ea tendinum portio, quæ in brachialis sinu, & manus uola, ad digitorum usq; radices habetur. Cæterum hæc membrana à tendinibus, ipsisq; musculorū peculiaribus membranis potius, quàm ab osse,

Lib. 8 de r/su  
part.

Ligamenta aut  
membranæ s  
mibus obducit  
ad quos muscu  
li referuntur.

Ligamenta, of  
suum acetabula  
augentia.

Lib. 2 de Ad  
minis, sect.

r/su ligamen  
torum, que in  
star propugna  
culi sunt.

b fig. cap.  
30. K.

i 12 fil. lib.  
7 B, D, G,  
d. H. I.  
h 10 fil. lib.  
7 E, F, G,  
H.  
i 9 fig. lib.  
7 H, aut E  
ad H.

m spectau  
tabulae a, b,  
7, dein 13  
tab. f, i, h,  
x, y, z.

n 1 fig. cap.  
25 lib. 1 T.  
o 8 tab. 3,  
4.

p 3 fig. cap.  
31 lib. 1.

q 4 tabule  
manus uo  
la.

ab osse, primariò ortum ducunt: unde etiam membranarũ ordini non ineptè  
 ascribuntur. & si huius generis membranas inter ligamenta cum Galeno enu-  
 merauerimus, reliquæ propemodum corporis membranæ huc quoq; non in-  
 opportunè referuntur: quoniam quibuscumq; obducuntur corporibus, & uelut  
 uincula eorum existunt. Essent autem ex harum numero, peritonæum præci-  
 puè, membrana costas succingens, intersepiètes thoracis cavitatem membra-  
 næ: dura, & magis adhuc tenuis cerebri membranæ, unà cum omnibus quos  
 educut processibus. Præterquàm enim quòd non minus ab ossibus ferè, quàm  
 cætera ligamenta, enasci cõspiciuntur, etiam in se aliquid colligant, continent  
 & amplexantur, proximisq; ossibus astabiliunt. Quartus ligamètorum usus  
 haberi poterit, quo septi alicuius ac interstitij uice illa musculos intercedunt.  
 cuius notæ<sup>r</sup> ligamentum illud profectò est, quod inter ulnam radiumq; secun-  
 dùm cubiti longitudinem porrectum, musculos internam cubiti sedem occu-  
 pantes ab exterioribus interdiuidit. & illud quoque, quod tibiæ osi fibulam,  
 membranæ cuiusdam ualidioris ritu, ubi inuicem ossa hæc dehiscunt, con-  
 necit. dein præter<sup>r</sup> ligamentũ in spinarum intervallo occurrens, & dextros mus-  
 culos à sinistris dirimens, his quoq; adnumerari possent<sup>r</sup> membranæ, pubis  
 ossium foramina occupantes, musculosq; anteriori foraminum sedi attensos,  
 ab illis qui posteriori committuntur, ossis quasi modo discernentes. \* Quin-  
 tus ligamentorum usus neutiquam infimus est: in huius enim ordinem ea li-  
 gamentorum portio reponenda uenit, quæ musculi constitutionem ingreditur,  
 musculòq; non infimam substantiam suppetit. Qua autem ratione id fiat,  
 sequenti Capite, quod musculorũ constructionem enarrabit, opportunè pro-  
 sequemur. Hic uerò suffecerit addidisse, musculum etiam ad ossium cartilagi-  
 numq; colligatione plurimum auxiliari, quum capite suo ex uno osse aut carti-  
 lagine principium ducat, & ipsius sine in aliud os uel cartilaginem implantetur.  
 Hac itaq; ratione ligamentorum usus commiscere, promptum erit. sunt enim  
 primi duntaxat usus omnia, quæ femoris os coxendicis osi, & tibiæ femori col-  
 ligant. nullum enim aliud homini, quàm colligandi officiũ præstāt: nisi etiam  
 forsitan aliquis tertio ligamentorum usu, ipsa ossibus obduci assereret. Secũdi  
 uerò dũtaxat usus nullũ reperies: quum omnia tertio usu instar propugnaculi,  
 aut ab ossis iniuria uindicis instar, tendinibus sint. Verũ ex his occurrèt non-  
 nulla, quæ aliud nullum beneficiũ, quàm secundi & tertij usus conferunt, neq;  
 ossa aut cartilagines inuicè nectunt: qualia omnia sunt, quæ uni solummodo  
 osi propria cõtinue<sup>r</sup> ue censentur. ut<sup>r</sup> quatuor illa, quæ in externa cubiti sede,  
 radij appendici ascribuntur, & unum ulnæ propriũ. Ea autè secundi usus liga-  
 mēta, quæ duobus ossibus sunt cõmunia, primi etiam ligamentorũ usus uicem  
 suppleunt. tendinē namq; quem trāsmittunt, tuētur, & ossa etiam inuicè ligant:  
 ut<sup>r</sup> illud sex transuersorum cubiti ligamentorũ, quod radio & ulnæ cõmune  
 dicemus. deinde trāsuersum quoq; ligamentũ, anteriore tibiæ sedem iuxta pe-  
 dem occupans, & ad fibulā tibiæq; os relatũ, & transuersum internæ<sup>r</sup> brachia-  
 lis sedis ligamentũ, pluribus omnino ossibus cõmune. Tertij duntaxat usus illa  
 sunt, quæ tendinibus secundũ ipsorũ longitudinē obuoluuntur: nisi etiā pri-  
 mi usus sint, quòd tendines uicinis sedibus cõmissos seruent, aut ligent. Quan-  
 quam rursus ex his quædā & quinti usus uicem gerant<sup>r</sup> quandoquidē mucosæ  
 membranæ, tendinibus tertij quatuor digitorũ os flectētibus, in brachiale &  
 uola obductæ, etiam musculus gracilibus, quatuor digitos pollicis adducētibus,  
 principium præbent. Cæterũ in quarti solũmodo usus numero propemo-  
 dum habendæ sunt<sup>r</sup> membranæ, in pubis ossiũ foraminibus obuicæ. Id autem,

Lib. 1 de Ad-  
ministrat. differt.Ligamētorum  
usui, quæ instar  
interstij sunt.Ligamētorum  
usui, quo mu-  
sculi constru-  
ctiōne iuuantur.Quæ ligamēta  
inuicem tantum  
præstāt usum,  
quæ plures.

quod in<sup>f</sup> cubito &<sup>s</sup> tibia habetur, etiam primi usus ligamentum existit, quum  
 & ad osium connexū egregiè auxilietur. quamvis etiā hæc omnia & ad quinti  
 usus ligamentorū classē reiici possent, quod non obscurè musculis etiā prin-  
 cipium porrigant. Qui enim internā & externā pubis ossis foraminis sedē ob-  
 tegūt musculi, ab illius quoq; foraminis membrana partim enasci dicuntur, uti  
 etiam ab eiusmodi ligamētō in tibia nōnulli musculi originis portionem assu-  
 munt. Porro ut ligamentorū non idem usus est, & plures inter ligamēta eius  
 gratia consurgunt differentia: ita quoq; in ortu, insertionēq; & partibus quas  
 cōmittunt, variant: quum alia ad solas spectent cartilagineas, ut laryngis, & nasi  
 alarū ligamēta: alia ad sola ossa, ut genu, cubiti, humeri, & alia permulta corpo-  
 ris ligamēta: alia ad cartilaginē & os pertineant, ut ea quæ pectoris ossi, costarū  
 nectunt cartilagineas. Alia uerò aliā partem quampiā ossi aut cartilagini cōmit-  
 tunt, ut corporis mēbranæ ad unā ferè omnes: atq; hæc semper duabus parti-  
 bus sunt cōmunia. Alia uerò uni dūtaxat ossi priuata cēsuntur, ut sex cubiti ex-  
 teriorum ligamentorū, quæ transuersim ducuntur quinq; nam primū, quod  
 ulnæ radioq; cōmune est, non ad unicū tantum os referetur. Insuper & quæ  
 pubis ossiū foramina opplent mēbranæ, huc quoq; spectāt, si modò illæ (quum  
 non ligent) in ligamentorū numero habeātur. Substantia demū alia constant  
 molliori, magisq; membranæ, ut omnia ferè quæ in orbem articulos ambiūt:  
 quanquam in illis rursus quædam sit differentia. Digitorum enim internodia  
 mollius ambit ligamentū, quàm humeri articulum: & huius denuò duriem,  
 coxendicis articuli ligamentū longè superat. Alia autem dura sunt, mediamq;  
 inter ligamenta quæ articulos ambire dixi, & cartilagineas, naturam fortiūtur.  
 unde etiam Græci hæc *νευροχονδρῶδες συνδεσµα*, quasi ligamenta cartilaginea di-  
 cas, appellant. Huius generis omnia propemodum sunt, quæ extrinsecus arti-  
 culis non obtenduntur, sed inter ossa ipsa latitant: quale illud est, quod ex me-  
 dio capitis femoris in coxendicis acetabulum fertur, & ea quæ uertebra-  
 rum corpora intercedunt, & id quod ex media tibiæ sede, quā hæc femur respicit,  
 inter femoris capita ducitur, & quædam malleolos talo nectentia, & quod fa-  
 crum os iliumq; ossa interuenit, & generatim omnia quæ inter ossa sedem ha-  
 bent. Vnde etiam & situ ligamenta inter se pugnant, quum alia extrinsecus of-  
 sibus obducantur, ut molliora illa: alia autem inter ipsa ossa, ubi se inuicem re-  
 spiciunt, cōtinguntq; situentur, quemadmodum cartilaginea propemodum  
 uniuersa. A forma quoq; ligamenta differentiam mutantur: sunt enim quæ-  
 dam prorsus lata, membranæ & tenuia: uti illud, quod secundum cubiti lon-  
 gitudinem inter ulnam radiūq; cōspicimus: & illud, quod pari modo inter  
 fibulam & tibiæ os, ubi hæc mutuò dehiscunt, obseruatur, & etiam pleraq; in  
 orbem articulos circundātia: eaq; tandem omnia, quæ tendinibus musculisq;  
 ex dente secundæ ceruicis uertebrae, in occipitis os procedens: & id pariter,  
 quod transuersim denti obducitur, primæq; uertebrae est peculiare: deinde  
 & ligamentum, femoris caput coxendicis ossi in articuli medio committens,  
 teres etiam uisitur. Alia ampla lataq; sunt, ut<sup>p</sup> tertium peculiariū humeri arti-  
 culi ligamentorū: præter membranē quoddā, in orbem articulū ambiens.  
 Insuper genu articuli peculiaria omnia, crassā quidem sunt, non tamē prorsus  
 teretia: ut & cartilaginea, talū tibiæ & fibulæ colligātia. Rursum quædam con-  
 tinua, & nullo foramine peruia cernūtur, ut ligamentorum maxima multitu-  
 do. quædā uerò aliquid transmissura perforantur, ut ligamēta anuli modo ten-  
 dines transmittentia: & membrana pubis ossis foraminis, neruo cum uena &

f 7 lab. V.  
 3. 4. 15  
 tabule 2  
 fig. 4.

Ligamentorum  
 differentia.  
 Ab usu.  
 Ab ortu.

A partibus,  
 quas conne-  
 ctunt.

A partibus,  
 quibus com-  
 mittuntur.

A substantia.

A situ.

A forma.

b o.  
 i fig. cap.  
 24 lib. 1. R.  
 h x.  
 i fig.

m fig. 10  
 cap. 1.  
 n eiusdem  
 fig. H.

o 2 fig. cap.  
 49 P.  
 p 13 lab. V.

arteria



arteria uiam præbens: ut & membraneum ligamentum, inter tibiæ os & fibulam consistens. Commune autem omnibus ligamentis est, quod obtuso admodum sensu (nollem enim dicere nullo) participant: ne propter crebrum frequentemq; motum, & cōtinuum affrictum, dolore uexentur. Qua etiam ferè ratione (quum scilicet natura sicca sunt) ne ocyus exsiccetur, ligamēta mucoso quodam lentoq; humore, ut etiam articularum cartilagine, oblinuntur.

Ligamentis  
communis.

Viscidus liga-  
mentorum  
humor.

## QVID MUSCULVS. CAPVT II.

PRIMA huius Capitiū figura, musculi structura ratio, qua omnes dissectionis professores musculum formari hactenus tradiderunt, ut cumq; exprimitur. Quod enim inter  $\Phi$  &  $\Omega$  continetur, nervi cuiusda est portio suprà & infraq; abtruncata. neruum hac characterum indice opportunius explicabuntur.

$\Phi, \Omega$ .



PRIMA SE-  
CUNDI CA-  
pitiū figura.

- A Nervi in plures soboles distribuendi portio.
- B Nervi A notati soboles, musculi constitutionem sciens.
- C Ligamentum, quod ab osse ad musculum constituendum pronascitur, cui aqua ferè cum nervi sobole debebat esse proportio.
- D Ligamenti & nervi ad musculum efformandum congressus, ac prima in fibras distributio, musculiq; caput.
- E Sedes, qua fibrarum maxima est diuisio, & qua musculi uenter consistit.
- F Diuisionis fibrarum concursus, commixtioq;, & tendinis seu caudæ musculi initium.
- G Tendinis pars, que mouendo ossi inseritur.

SECUNDÆ FIGV-  
ræ, eiusdemq; caracte-  
rum Index.

SECUNDA figura, musculorum humeri, seu brachij os, & cubiti ossa, & extremam manus sedem ambientium fibras, à carne quodammodo liberæ, demonstrat, una cum quarto brachij adeuntium nervo: ut hic, quam fieri posset commodissime, musculi fabricæ natura oculis subiceretur.

H Humeri caput, quod scapulae articulat.

I Quartus brachium petens nervus.

K Principium musculi cubitum extendentis, qui ab humeri capitis radice exoritur.

L Principium alterius cubitum extendentis musculi, qui ab humiliori scapulae costâ pronascitur.

M Sedes, qua quartus brachij accedens nervus, duobus cubitum extendentibus musculis propagines offert.

N Cubitum extendentium musculorum finis, seu eorundem in posteriorem ulnæ processum insertio.

O Posterioris ulnæ processus pars, que excarnis perpetuo cernitur.

P Quartus brachium petens nervus, inibi conspicuus, quâ posteriori sedi exterioris tibiae humeri inmittitur, ac musculis hinc ab hinc



SECUNDA  
FIGURA.

ab humero principium ducentibus ramos offert.

*R* Initium est cubitum flectentium musculorum posterioris.

*Q* Caput oblongi musculi, qui radij appendici iuxta brachiale insertus, radium in pronum ducit.

*S* Musculus, lucorni tendine brachiale extendens.

*T* Musculus brachiale extendentium alter, qui è regione minimi digiti post brachiali implantatur.

*U* Musculus ulnæ exporrectus, & brachiale flectens.

*X* Musculus indicem, medium & anularem extendens.

*Y* Musculus, quo minimum digitum precipue extendi docebo.

*Z* Carnea pars eius musculi, qui in tres diductus tendines, unum brachialis ossi pollicem sustinenti inserit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis ossi & tertio.

*a* Musculus, cuius beneficio pollex indici adducitur.



V S C V L V M motus uoluntarij, ex nostroq; arbitrato pendentis proprium esse instrumentum, omnibus concessum uidetur dissectionum professoribus: idemq; ab omnibus musculi constructionis modus enarratur. Qui equidè probabilis apparet, magnumq; Naturæ artificium commoñstrat: attamen quum in paucissimis musculis, aut potius in nullis illum obseruem, secus profectò quàm illi, de musculorum cōstructione sentire cogor. Quæ autem omnium ferè sit sententia, nunc quàm potero breuissimè, & simul explicatissimè subijciā: eorum placita in continuam orationis seriem, quæ ueritati proximè sit consona, congesturus. Diffiniunt itaq; musculum, partem esse instrumentalem ex neruo, ligamento, carne, uenis & arterijs confabricatam, motusq; uoluntarij peculiare organum, in cuius fabrica ad hunc ferè modum Naturæ opus recensent.

Quid musculi, ipsiusq; cōpositionis ratio, secundum aliorum Anatomicorum sententiam.

Ligamenti & nerui in musculi necessitas.

Quum bina sint corpora, quibus in præsentī sermone (qui de musculi constitutione est) indigenus, ligamētum scilicet, & neruus sua propria uoce dictus: quumq; ligamentum sit durum, neruus uerò mollis: miranda Creatoris est industria, qui in singulis motui uoluntario præfectis partibus, utroq; utitur, neq; in ligamenti locum neruum aliquando transponens, neq; in nerui regionem ligamentum. Concessum enim est omnibus, neq; durum ad sensum (utpote quod non facile afficiatur) neq; molle ad motum (quum imbecillius sit) esse idoneum. Ergo neq; per solos neruos mouetur aliqua particula, neq; per ligamenta. Neruus enim sensituius quidè est, quatenus mollis: inualidior autem, quàm ut moueret & transferret totum membrum. Ligamentum uerò tutò quidem colligare, & interim membrorū motibus non ob stare poterat: ipsum tamen motus uolūtarij organum per se nequiuuit produci, quum originem ex osse aut cartilagine, non autem nerui modo, ex cerebro uoluntarij motus fonte obtineat. Nemo enim ambigit, huiusmodi fontis seu principij corpus molle oportuisse fieri: quandoquidem neque ex molli perfectè durum, neq; ex duro molle quicquam enasci, possibile est. His igitur occasionibus, Natura neq; solis ligamentis uti ad motus uoluntarios potuit: quoniam neq; sensu, neque motu prædita sunt, ut quæ animæ principatus sedi non continerent. neque neruis etiam solis utendum fuerat, cum hi propter mollitiem tenuitatemq; transferre tam magna pōdera minimè ualerent. Permixtum igitur ex ambobus oportebat aliquid creari motus organum, quod omnino neruo esset durius, & ligamento mollius: & ideo quoq; participare sensu, minus quidem quàm neruus, magis autem quàm ligamentum. Insuper deuit & id quoq; in medio roboris & imbecillitatis, aliorumq; contrariorum, quæ ligamenti & neruis insunt, existeret. Atq; hac occasione motus instrumentum, utrisq; ipsum componentibus substantijs cōmunicat: non tamen exactè alteram, neq; solam, neq; eam im-

Hee ex prima figura seriatim petita.

musculum naturam inter ligamentū & neruum esse medium.

eam impermixtam obtinet, sed ex ambabus commiscetur. Verum quum nihil alicui per totum confundi potest, non contractum prius in minimas particulas, necessarium fuit utrunq; neruum uidelicet & ligamentum, in fibras tenues discindi, deinde sibi inuicem eas copulari ad uoluntarij motus organi generationem. Perficitur autem nerui ac ligamenti in fibras distributio in hunc modum. neruus accedit ligamentum, ac simul commixta in fibras duas quodam modo digeruntur, illæ rursus singulæ in alias, & hæ iterum in plures tantisper diuiduntur, donec in tenuissimas membranasq; fibras procedant, postquam hæ ad extremum diffusionis peruenere, rursus ut diuisæ fuerût, mutuo concursu coalescentes, & immixtæ in unum colliguntur. Et quemadmodum prima diuisio, musculi caput constituebat: ita hæc postrema collectio finem musculi efformat, quem Græci ἀρσενιον, quasi enervationem dixeris, & ut nos quoq; tendinem musculorum appellant. Medium uerò, in quo diuisionis series consistit, musculi uentrem nuncupamus, similitudinem à mure, & lacerta, & piscis musculi, aut alioquin communi piscium forma mutuantes. Musculi namq; seu lacerti caput, muris lacertæq; capiti conferimus: tendinem autem caudæ, & uentrem uentri. Cæterum si Natura solummodo ac neruum & ligamentum diuississet, nec medias regiones, fibrarumq; interstitia molli infarsisset substantia, quæ fibris, thori ac texturæ alicuius, & firmæ sedis loco esset, haudquaquam musculi uel tantillo temporis spacio fibras illas infractas in corruptasq; seruarent. Est autem sedes ea, ac thorax, simplex caro fibris obducta, quæ non aliter fibris committitur, quàm calathis alijsq; fiscellis lac, dum harum rerum periti id in illis coagulant. Finge igitur fibras ex neruo & ligamento diffusas, iuncis respondere, lacti uerò ipsi sanguinem, & caseo carnem proportionari. nam ut ille ex lacte, ita hæc ex sanguine paratur, Quamquam tanto uerorem tibi confinges imaginẽ, quanto per caseum plures crebrioresq; iuncos funiculos uel porrectos, & non solum ad casei latera attensos, imaginatus fueris. Ne autem caro hæc, reliquaq; musculi substantia, sanguine nutrimentoq; indiga relinqueretur, & suus innatus calor non refocillaretur, uenas ac arterias, tanquam riuulos quosdam, musculis immisceri fuit necessarium. Deinde quoq; membranam, uniuersum musculi corpus integentem, à ligamenti, quæ musculi caput & finem osibus committunt, produci oportebat. Commemorata iam musculi constructio, quantumuis concinna & elegans dissectionum imperito apparere queat, ad amussim nulli prorsus conuenit musculo: quum nullum in uniuerso corpore adinuenias, qui parem ligamenti, seu ex osse aut cartilagine exortus sui, & nerui portionem sibi assumat. Nam ut cæteros taceam, tendo in posteriorem calcis sedem insertus, solus crassior est quatuor femur petentium neruorum radicibus, utcunq; eas simul collegeris. Deinde si nunc omnes tibię insertos tendines, ac reliquos pedis ossa accedentes perpendis: quæ nunc cum tendine illo, in calcem inserto, erit proportio, ut illa scilicet mediam tendinũ portionem neruo, & mediam ligamento formari ostendat? Profectò si tendines neruis hic cõparabuntur, ne utiquam nonagesimam tendinum portionem neruis consistare fatebimur. Deinde si fortassis aliquis musculus parem ligamenti & nerui portionẽ sibi uendicare reperiretur, esset profectò temporalis, & septũ transuersum, quippe in hoc duo satis insignes nerui implantantur: illum uerò etiam quinque neruorum propagines adire docebo, quauis interim in neutro neq; trigecupla nerui cum ligamento uideatur proportio. Sed quid tantopere Galeni præcepta, tanquam oracula subuerètes, & ipsius libros de Musculorum motu exofculantes, de illis dicemus musculis, quila-

Ligamenti & nerui permixtio.

Musculi caput finis, seu cauda, & tendo.

uenter.

Carnis in musculo usus.

Vena & arteria in musculo necessaria Musculi membrana.

Musculum non aq̃ue nerui ac ligamenti natura participare.

a. fig. D.

b. fig. E.

c. fig. F.

d. 1. lib. 4.

e. 2. lib. 4.

f. 3. lib. 4.

g. 4. lib. 4.

h. 5. lib. 4.

i. 6. lib. 4.

k. 7. lib. 4.

l. 8. lib. 4.

m. 9. lib. 4.

n. 10. lib. 4.

o. 11. lib. 4.

p. 12. lib. 4.

q. 13. lib. 4.

r. 14. lib. 4.

s. 15. lib. 4.

t. 16. lib. 4.

u. 17. lib. 4.

v. 18. lib. 4.



*Nervum singu-  
lis musculis, ita  
ut alijs diffu-  
sionis præstet  
vires, alijs suis  
non misceri.*

*Omniū mu-  
sculorum capi-  
tibus, nervos non  
inferi, aut alio-  
quin attendi,  
etiamsi alijs  
ipsorum sub-  
stantia nervus  
inferatur.*

qui latissimo oriuntur principio, ac sensum in angustum versus ipsorum inser-  
tionem definunt? cuiusmodi, præter temporalem, inter reliquos, brachium  
attollens est: deinde is qui brachium pectori admouet, & femoris motibus fa-  
mulantes propemodū omnes: in quorum exortibus nervum, qui, ut Galenus  
cenfet, cum ligamento diffundi possit, confingere nequimus. Nam statim in  
eiusmodi musculorum origine multo maior fibrarum est copia, quàm in mu-  
sculi reliqua parte: siquidem in illis musculis, & præcipuè qui femoris motibus  
præfunt, fibræ ab ipso ortu non amplius in plures diuiduntur: imò sensum ad  
insectionem properantes, inuicem colliguntur, musculi triangularis figuræ  
efformantes. Vnde etiam conspicuum euadit, si modo illam, quæ Anatomicis  
proponitur, nervi ac ligamenti diuisionem commixtionemq; in musculis fieri  
oportere, singulis fibris in ortu neruulū debere misceri: quod neutiquam  
accidere, ipsa neruorum series commonstrat. Quandoquidem in plerisq; mu-  
sculis duntaxat neruulum admodum gracilem, neq; magis quàm uenam diui-  
sum, ad superficiem musculi nunc interiorem, nunc exteriorem, uenæ ac arte-  
riæ modo exporrigi, membranæq; musculi adherere conspicies, neutiquam  
autem in fibras per musculi substantiam diffundi. Quod inter plerosq; corpo-  
ris musculis in illis liquidò condiscis, qui ab ilium osse, femoris os accedunt,  
ex quibus etiam quosdam reperias, quorum ne superficiei quidem nervus, uti  
neq; uena & arteria, uix ut cōtiguus omnino sit, attendatur. Neq; id hic solum  
obseruabis, imò etiam in quadrato musculo, radium in prouum mouēte, cui  
nunquam nervum, uenam & arteriā exporrigi intuitus sum: præter illos ner-  
uos, uenas ac arterias, quæ cum tendinibus digitos flectētibus ad manum pro-  
repunt: quæ etsi à musculo illo non multum distent, ipsum tamen non contin-  
gunt, & minus adhuc illi adnascuntur & inferuntur. Adde neq; neruulum ob-  
seruari insertum in graciles musculos, qui quatuor digitos pollicis adducunt:  
ut neq; in illos, qui primi quatuor digitorū ossis flexionibus præfunt. Adiunge  
præter hos, abdominis etiam musculos (quos prius, quia omnibus notiores  
uidentur, recensere decuerat) nullam nerui cum ligamento proportionem  
ostendere: quum nequaquam in singulis musculorū, qui obliquè & transuer-  
sim fibras porrigunt, principiorū sedibus nervus implantetur: quumq; ipso-  
rum eneruatio seu tendo multo latior eorundē origine existat, quod cum ple-  
risq; musculis habent commune. Non est itaq; musculus inter ligamentum &  
neruum natura medius: neq; etiam illa, quam uulgò imaginantur, ligamenti  
& nerui sit commixtio. Nam etsi fortè neruum in musculi alicuius caput inferi  
animaduersurus sis, nunquam sanè nerui soboles, ligamētū fibrarum modo,  
ad tendinis usq; principium diffundi, aut aliquo pacto ligamētū fibris uniri, ue-  
req; permisceri reperies. Quod profectò in nullo musculo perpendes facilius,  
quàm in illis qui ab interno humeri tubere principium capiunt: illorum ete-  
nim capita sunt acuta, & neruorum insectiones in ipsum substantiam, non so-  
lum in superficie adipiscuntur. Atq; id etiam in illo animaduertes, sic & in  
ijs, qui ab inferiorū femoris capitum radicibus ad calcem feruntur. Non enim  
omnes musculi, nerui implantationem (etiam si quando in ipsum substantiam  
nervus porrigitur) in capitis exortu adipiscuntur: sed subinde multo in-  
ferius quàm caput habetur, & in medio sui quodammodo ductus & longi-  
tudinis. Quod, præter temporalem musculum, anterior cubitum flectentium  
musculorum ostendit, nerui primum propaginem assumens, ubi duo ipsius  
capita in unū coeunt. Idem in nonnullis femoris os amplexantibus obseruatur,  
& in

k 4 tab. 2.  
10 tab. A.  
l 3 tab. 2.

m 9 tab. P.  
10 tab. 2.  
11 tab. 2.

n 7 tab. X.

o 6 tab. J.  
7 tab. d.  
p 8 tab. A.  
q, feriatum  
abdominis  
regio 3, 4,  
5, 6 tabu-  
larum.

r 3 tab. P.  
A. m. C. 9  
tab. 5.  
s 6 tab. 2.

t 12 tab. 2.  
T. 10.

u 6 tab. 2.  
x 3 fi. esp.  
11 lib. 4.  
charac. 5, 5.

& in abdominis musculis, & plerisque; qui in collo habentur, & in omnibus ferè qui costis internuntur. Verùm utcunq; nervi, uel in musculi substantiam sese insinuent, siue ipsius tantum superficiei attendantur, semper ferè sua serie & propaginibus, secundùm musculi ductū (quod &<sup>r</sup> recurrētes nervi arguunt) porriguntur. Rursus tendo elixus, neq; sapore, neq; colore, neq; substantia à ligamento uariat: nisi fortassis illum molliorè, non quidem omnibus ligamentis, sed tantum quibusdam esse quis cōtenderet. ut ut tamen sit, tendo musculi capitis molliciei nequaquam cedit: quamuis id statim in ortu purum, & nervo minimè mixtum esse ligamentum, nemo inficias ire possit. Neq; etiam mirandum esset, tendinem ligamento ossa colligant ut plurimum molliorem, minusq; cartilagineum esse: cum ligamentorum, quæ ossa mutuò colligant, substantiæ, in duritie eadem non sit ratio. Adde etiam, tendinem elixum cum nervo non proportionari: hic enim elixus aut crudus, si per transuersum diuidatur, ex multis quasi funiculis constructus apparebit, non aliter, quàm si chordam aliquam crassiorē diuissiles. tendo autem solidior, & magis ut ligamentum similis, continuusq; uisetur: præcipuè si crassum aliquem tendinem ex illis qui pedem, aut tibiā, aut manum adeunt, examini adhibueris. In latis enim & quodammodo membraneis tendinibus series fibrarum aliquanto est manifestior: quo etiam nomine à ueris membranis inter dissecandū distinguuntur,<sup>r</sup> quemadmodum in peritonæi cum obliquo<sup>r</sup>um & transuersorum abdominis musculorum neruosis tenuitatibus collatione est cernere. Ac licet id in quouis animante inter edendum intueri integrum sit: in bubula tamen carne id feceris aptissimè, cum pars aliqua mensæ apponetur, quam insignis perrepat nervus, qui plerunq; cum uena & arteria inter glandulas conspici consuevit. Inuento autem nervo, nunquam tendo deesse poterit, qui modò proposita non edoceat. Deinde id, quo alij tendinem nervo misceri, atq; ex ligamento & nervo æqualiter, aut plus minus confusis fieri, maximè probare cōtendunt, prius num ita ut illi proponunt, res se haberet, perpendēdum erat, priusquam aliquid inferret. Dicunt namq; tendinem capite musculi ob id crassiorē esse, quòd is non capitis solū musculi substantia, sed & nervo quoq; constet.<sup>a</sup> Quasi uerò quis rectè asserere possit, exortus musculorū furæ simul collectos, quod ad nerueam generatim dictam attinet substantiam, minores esse suorum musculorum tendine, qui calci inseritur, perinde ac si<sup>b</sup> brachium attollens musculus, pauciores fibras in ortu haberet, quàm ipsarum collectio ad insertionem ostendit. Erat itaq; id prius probandū, quàm falsa conclusio inducēda. Quemadmodum & hæc quoq; inefficax assumptio est: Tendo sensu exactissimo participat, nervo igitur & ligamento constat. Quasi uerò musculorum capita, & præcipuè ligamentosa, & prorsus excarnea, minus ipsis tendinibus sentiendi uipollerent, & læsa conuulsionis periculum minus quàm tendines inducerent, etiamsi capitibus mox in exortu nervus non inferatur, sed tantum attensus occurrat, isq; etiam subinde notabili interuallo à capite remotus. Hac igitur occasione, & huiusmodi pluribus, quas recensere prolixum foret, efficitur, ut fateri cogar, nullam prorsus aliam nervi in musculos, quàm uenæ & arteriæ distributionem esse: & pari etiam ratione neruū, qua uenam arteriamq; musculum accedere. Neq; ullam aliam in uena arteriaq; cum nervo differentiam statuo, quàm quòd ad finem seu insertionem musculi nervus nunquam, ut aliquādo illa uasa, implantetur, quanquam etiam paucissimos prorsus musculos eius generis enumerare possem. Sunt uerò inter alios<sup>c</sup> recti abdominis, qui & à uenis & arterijs, sub pectoris osse deorsum repentibus, ramulos assumunt, &<sup>d</sup> temporalis

*Tendinem ligamento, non autem nervo respondere.*

*Excarnè musculi caput: ten dino sē seu per esse tenuius.*

*Musculorū capita, maximè carnis expertia, non minus quàm tendinem, sentire. Quod nervi musculi uerè præsent.*

*y: s. cap. 2 lib. 4. m. p. c. fig. cap. 3. lib. 4. inferio. Q. S.*

*z Cōfer ab domen c. 12. hyl. c. 11. ab. domine u. si gure lib. 5.*

*a collige id ex 14. tab. m. o. q.*

*b Cōfer A. D. c. 11. D. in figura in dici u. tab. la inferio.*

*c observa 6 tab. f. d. d. 8 tab. f. r.*

*Qualiter mus-  
culi suum mu-  
nus obeant.*

*Quid uerè mu-  
sculus sit.*

*Caro, præcipua  
musculi sub-  
stantia.*

*Adipè etiam  
carni passim  
attendit.*

poralis etiam ab inferioribus suis sedibus<sup>c</sup> uasa admittit, quum is tamen ex elatioribus principium deducat. Vt itaq; uena nutriendo musculo subseruit, & arteria ipsius innatum calorem recreat: ita quoq; neruum animalem spiritum continuè ipsi deferre, neruumq; illo spiritu musculum nunquam indigum relinquere arbitror, ut neq; uena alimento musculum destituit. Deinde spiritus animalis ui, & debitæ peculiarisq; musculi constructionis, essentialisq; formæ beneficio, musculum contrahi & laxari sentio: neq; aliter suum munus obire, quàm oculum, reliquaq; sensuum organa: quæ singula propriâ peculiaremq; fabricam obtinent, & animali spiritu (quem per neruos cerebrum ipsis porrigit) imbuta, suis funguntur munijis. Non enim alius animalis spiritus oculo, aut lingua, aut auditus organo, quàm musculis diffunditur: uerum suæ constructionis ratione, & accedente spiritu, oculus uidet, lingua gustat, auditus organum sonos percipit, & sanè musculus ipse uoluntarijs motibus præest. Atq; hac etiam ratione omnia, quibus neruus attenditur, sentiendi ui pollent, nisi propria eorum substantia id prohibeat. Cæterum ut quamplurimos musculos arteria non contingit, quorundam autem superficiei tantum attenditur, & aliquando adnascitur, interdum uerò etiam in musculorum substantiam penitius ramos exporrigit, & interim omnium calorem temperat, tam eorum scilicet quos non proximè contingit, quàm illorum quorum superficiei adnascitur, ac in quorum substantia penitius disseminatur: ita profectò & neruis usuuenit, qui suam facultatem tam illis musculis exporrigunt, quibus uix attenduntur, quàm quorum superficiei adnascuntur, & in quorum substantiam aliqua ramorum serie digeruntur. quanquam neruos propinquius uenis quàm arterijs assimilare queas. Pauciores enim musculi uenæ, quàm arteriarum actu insertioneq; destituuntur: licet etiam quosdam prius recensuerim, quos neq; neruo, neque uena proximè contingi obseruabis, qui nihilominus interim, ut neq; alimento, & uitali facultate, ita quoque spiritu animali non priuantur. Est itaq; musculus, uoluntarij motus instrumentum, uti oculus uisus, & lingua gustus, ex ligamenti natura in fibras complures diuisa, & carne has continente firmanteq; fabricatum, uenarum, arteriarum & neruorum furculos in se interdum assumens, ac neruorum beneficio animali spiritu nunquam, dum sanum est animal, destitutù. Atq; hanc carnem, non solum stratum aliquod, & ueluti thorum & fulcrum esse existimo, quo musculorum fibræ, neruæ uel generatim dictæ diuisiones contineantur: aut etiam carni cum Platone & Aristotele (quibus musculorum ratio penitus latuit) tam leuem usum duntaxat tribuo, ut adipis & pinguedinis, ac uestimenti alicuius modo, in æstu calori ob stare, & in frigore frigus potissimum arcere concedam: uerum musculorum carnem, cui alia nulla in uniuerso corpore est similis, præcipuū autorem esse, mihi persuadeo, cuius beneficio (non deficientibus interim neruis, animalium facultatum nuncijs) musculus crassior effectus, sese breuiat & colligit, itaq; partē cui inferitur, ad se allicit & mouet: & cuius dein occasione se rursus laxat & educit, attractamq; partē remittit: perinde sanè ac cerebri, cordis, iecoris, pulmonum, lienis, renum, uentriculi & testium propriam substantiam, primarium suarum functionum autorem esse, nobis constat. Quòd uerò musculorū carni, aut carni simpliciter, nullum adipem intexi, omnes hæcenus falso prodiderint, obesi boues, quos Brabanti sale coniungunt, attestantur, in quorum musculorum fibris per carnem adeps attenditur. Adde etiam, obesarum mulierum musculos, qui femur extendunt pinguitudine, adeò oppletos inter dissecandum uideri, ut ambigas, num caro adipi, an adeps carni cōmiscetur. Neq; hic de mu-

<sup>c</sup> fig. cap.  
<sup>6</sup> lib. 1. c.  
<sup>7</sup> fig. cap.  
<sup>12</sup> g.



de musculorum superficie solùm loquor, uerùm de intima & maximè carnea ipforum substantia, quam præcipuam musculi partem esse asserui. Tendines autem, & enervationes illæ, quas caro destituit, in illis tantum musculis habentur, qui longo ductu feruntur, plusq; habent spacij, quàm carnea musculi substantia requirit. Breues enim, & succincto arcto uel loco repositi musculi, tendine carent, & undiq; carnosi sunt: ut laryngis omnes, si<sup>1</sup> duos rectos exceperis, quatuor musculorum tertiam cartilaginem primæ iungentium: illi enim longi, in insertione nerueam naturam obscurè expriment. Deinde inter eos qui ossa mouent,<sup>2</sup> qui primum pollicis flectunt articulum, &<sup>3</sup> qui pollicem indici maximè admovent. Inter magnos autem huius generis est quadratus<sup>4</sup> musculus, scapulam dorso admovent: &<sup>5</sup> musculus, qui à scapula basi enatus, octo elatioribus costis implantatur. Verùm de innumeris musculis tendine carentibus, tendinūq; generibus, iam agemus, musculorū differentias aggredientes, quæ insuper musculorum constructionis rationem, à me propositam, pulchrè docebunt.

*Tendines quare musculi dentur.*

*Musculi tendinibus destituti.*

### DE MUSCULORVM DIFFERENTIIS. Caput III.



**D**IFFERENTIAS musculorum non paucas recensere, promptissimum est, ab illorum substantia, ortu, insertione, quàm mouent particula, forma, foraminibus, colore, situ, fibrarum specie, & musculi capite, uentre, tendine, ac deniq; ex mutuo musculorū cōcurfu, aut unius musculi uelut in plures separatione. Quæ igitur à substantia petuntur differentiæ, ex uenis, arterijs, neruisq; potissimum pendunt. Nullum enim corporis musculū reperiās, qui non aliqua ligamēti membranæq; portione in fibras desecta, & carne illas cōtinentē firmanteq; ac præcipua aded musculi substantia cōstituitur. Verùm præter hæc, alij neruum, arteriam & uenam in suum corpus quoq; diffundi funt: ut<sup>1</sup> septum transversum, & maximus totius corporis<sup>2</sup> musculus, qui femur mouentium quintus erit: præterea abdominis omnes, ac præcipuè<sup>3</sup> recti. In alios neruus nullus, neque uena, neq; arteria (quod animaduerti potest) inseritur: ex quorum classe<sup>4</sup> musculus est, qui latum in manu educit tendinem. deinde præter alios quàm plurimos, quadratus<sup>5</sup> musculus, radium in pronom uertēs: &<sup>6</sup> graciles illi, qui digitos ad pollicem in latera agunt. Solus neruus quibuscum propaginibus in illorum<sup>7</sup> musculorū capita distribuitur, qui à radicibus capitum femoris principium sumunt, atq; ad calcem ducuntur. horum namq; substantiæ neq; uena, neq; arteria penitus inseritur. Latus in collo<sup>8</sup> musculus, qui genas mouet, uenis abundat & neruis, arteria interim destitutus. Qui uerò solam nanciscitur arteriam, nullus occurrit. Cæterum adeps, quem interdum musculorum fibris per carnem digestis attendi diximus, in macilētis non reperitur. In obesius autem illi musculi adipe potissimum abundant,<sup>9</sup> qui ilium ofsibus obducuntur, ac clunes, & ueluti sedentibus puluinaria constituunt. In ortu magis adhuc musculi uariant: alij enim ab ossē originem sumunt, ut<sup>10</sup> qui à femoris ossē & coxendicis ossē ad tibiam procedunt, & plurima musculorum multitudo. Alij à cartilagine iporum ortum obtinent: ut omnes laryngis musculi, quos laryngis proprios nuncupabimus: deinde intercostales musculi, qui inter costarum cartilaginum habentur interualla. Alij à membrana quapiam enascuntur: cuiusmodi sunt oculi omnes<sup>11</sup> musculi, à dura membrana uisoriū neruum

*Unde musculi rursus differentia petantur.*

*A substantia.*

*Ab ortu.*

A inuolvente

f 6, 7 fig.  
cap. 11 P.  
Obliqui ad  
lrm 7, 8 fig.  
gur. R.  
g 6 la. n. n.  
h 11 tab. f.  
i 10 tab. f.  
h 7 tab. L.

a 7 tab. a.  
b 11 tab.  
c 6 tab. f.  
d 3 tab. f.

e 7 tab. X.  
f 6 tab. f.  
7 tab. d.  
g 11 tab. o.  
h 3 tab. f.

i 9 tab. f.  
10 u. 11 X.  
h isti in f.  
dibus, quas  
occupat, in  
tabulis sunt  
citra notam  
operem  
cōstici di.  
l 6 tab. X.  
m 1, 2 fig.  
cap. 11.

inuoluerunt nati: deinde duo<sup>o</sup> musculi stomachum retrò amplexantes, & in scutiformis cartilaginis latera inserti. his namq; ab externa stomachi tunica principium pendet. Idè & de<sup>o</sup> circulari ani & uelicæ ceruicis musculo censendum uenit. Alij à membrana tendines obuoluerunt enascuntur: ut quatuor graciles<sup>p</sup> musculi, quatuor manus digitos ad pollicem in latus ducentes. Alij ab alio quouis ligamento originem petunt: ut<sup>o</sup> duo pollicis primum internodiū flectentes, qui à transuerso<sup>r</sup> ligamento tendines in brachialis interna sede transmittente enascuntur. Tales etiam sunt, qui in superiori pedis regione locati, pedis digitos extrorsum ad latus mouent, qui à ligamenti tibiæ talo, & talum calcis & nauiformi ossi, calcemq; cubiformi ossi colligantibus enascuntur. Alij ueluti ex altero musculo prodeunt: ut<sup>o</sup> qui à circulari ani musculo, ueluti digiti duo, meatum urinarium, quà sub penis corporibus ferri incipit, amplexantur. Alij uelut ex nullo corpore principium obtinent: uerùm membranæ partes aliqua sui sede carneæ, ac musculosæ, seu musculi euadunt: ut omnes<sup>o</sup> musculi ex carnea membrana constituti, qui in collo & facie in hominibus habentur: deinde & testis<sup>o</sup> musculus, in rubicundo testis & uasorum feminalium inuolucro, instar carnosioris lineæ innatus. Quinetiam<sup>r</sup> septi transuersi ortum, ex peritonæi & tunicæ costas succingentis partibus, ipsius centro adnatis, pendere fateamur necesse est: nisi illius ortum, contra aliorum musculorum rationem, ubi costis inseritur, esse dicamus. Cæterum nō omnes musculi ab una duntaxat parte originem sumunt: permulti enim ex pluribus ossibus enascuntur. nam dorsum mouentibus musculis plures plerunq; uertebrae principium præbent. Sic & abdominis<sup>o</sup> musculus, oblique descendens, à pluribus costis exorditur. Qui brachium pectori admouet, ex pectoris osse, & quarundā costarum cartilaginibus, & ipsa demum clauicula enascitur: quemadmodū & b<sup>is</sup>, cuius auxilio brachium attollitur, ex scapula quoq; & clauicula procedit. Pariter etiam<sup>o</sup> recti abdominis musculi, à<sup>o</sup> cartilagine, pubis ossa interueniente, & ab ipsis ossibus enascuntur. adèd, ut quidam musculi ex pluribus ossibus, alij ex osse cartilagineq; non ineptè principium habere dicantur. Alij ex pluribus eiusdem ossis processibus enascuntur: ut<sup>o</sup> prior flectentium cubitum, qui ab eminationi sede ceruicis scapulae, & processu ipsius interiore educitur. Ab insertione uerò integrum est dicere, musculorum alios in os, ut qui femur & tibiæ, caputq; mouent, inseri. alios uerò in cartilaginem: ut laryngis omnes, & qui palpebrarum motuum autores sunt, & qui narium alis ascribuntur. alios in cutem, ut labrorum musculos. alios in aliud quiduis: ut oculorum musculos, in duram oculi tunicam: & penis quatuor musculos, in penis corpora, & urinæ meatum: dein testis musculū, in uas semen à teste sursum deferens. Ad hæc, musculos recto intestino proprios, in eius intestini exteriorem tunicam: & circularem uelicæ colli musculum, ad meatum urinæ corpus applantari inseriq; cernimus. Cæterum & ab insertione musculi isto quoq; modo differūt. Quidam à pluribus partibus enati, in unicā inseruntur: ut musculus brachium pectori admouens, & is qui brachium attollit, ex pluribus orti sedibus, duntaxat in humerum inseruntur. Ita etiam<sup>o</sup> qui brachium deorsum trahit, ex plurium uertebrae spinis oritur, attamen in humerum tantummodo definit. Pari etiam ratione & scapulae motuum autores musculi ad unum omnes, ex pluribus ossibus initium sumunt, & uni tantum scapulae implantantur. Quidam uerò ex uno osse exorti, in plura inseruntur. Musculus enim, qui à scapulae basi prodit, respirationiq; subministrat, in octo superiores thoracis costas inseritur. Eius quoq; generis sunt, qui quatuor pedis & manus digitos extendunt. deinde

Ab insertione.

n 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224,

inde<sup>i</sup> qui nasci alas, simul & superius labrum mouent, in cutem cartilaginemq;  
implantantur: quemadmodum & septum transuersum, quod alicubi ossi, ali-  
cubi cartilagini innascitur. Quidā etiam à plurib. enati ossibus, in plura quoq;  
inferuntur: ut<sup>k</sup> musculus à ceruicis uertebrarū spinis enatus, qui in aliquot su-  
periores thoracis costas implātur, thoracemq; mouentiū in homine tertius  
habebitur. Præterea dorsum mouentes muscoli ad unum ferē omnes, in hunc  
ordinem referuntur. Item his differentijs illæ consentiunt, quæ ab ea quam  
musculus mouet, particula defumi possent: quum omnes muscoli eius, cui in-  
feruntur, partis uoluntario motui præsent. Porro ab insertionē & ortu simul,  
alia sumitur differentia, quum alij muscoli ab illo oriantur ossē, quod mouen-  
do ab ipsis ossi, cui etiam inferūtur, alligatum est, proximumq; uisitur: ut<sup>l</sup> tres  
musculi ex ilium ossē in femoris os inserti, septimus & octauus tibiā mo-  
uentium, qui à femoris ossē enati, tibiæ implantantur. Alij uerò à superiori ali-  
quo ossē, & non illi, cui inferuntur, proximo, originem ducunt: ut muscoli ti-  
biæ motibus famulantes, qui à magnis ossibus sacro ossi connexis principium  
obtinunt: ex quorū numero sunt uniuersi tibiā mouentes, septimo & octa-  
uo tantum exceptis. Istis respondent, qui secundum cubiti aut tibiæ longi-  
tudinem extensi, digitos adeunt. Forma etiam omnium musculorum haud e-  
adem est. Quidam enim sunt, quos muri aut lacertæ (si ipsis pedes absētos fin-  
xeris) ac pisci musculo, quem & mytulum uocāt, & alijs multis piscibus appo-  
sitē conseras: ut scilicet muscoli caput, lacertæ, aut piscis, aut muris capiti, uen-  
trem autem corporis trunco, tendinem uerò caudæ assimulare queas. Est au-  
tem huius ordinis musculus, qui ab interno humeri tubere enatus, ac radici  
postbrachialis ossis, quo index sustinetur, insertus, brachialis flexioni subseruit.  
Talis etiā est, qui primus in tibiæ anteriori sede occurrit, & in pedij os, cui ma-  
gnus digitus articulatur, insertus, ad pedis eleuationem famulatur. Qui autor  
est longissimæ pollicis abductionis à ceteris digitis, & alius, qui paruū digitum  
à ceteris maximē in latum amouet, tam in pede, quam in manu, ad nuper di-  
ctam quoq; figuram eleganter accedunt. Vnde etiam arbitror, inter reliquos  
corporis musculos (quasi nulli essent alij) illos, qui ad pollicis manus primū  
articulum habentur, Bruxellenfibus, & alijs quibuscū nationibus mures nun-  
cupari, alijs uerò ita appellari cubitū flectentium<sup>m</sup> anteriorē. Italorum autem  
uulgus in quibuscū corporis partibus, nescio quem pisciculū esse fingit, eo no-  
mine in dicās musculos, piscis imagini non absimiles. Vt cunq; sit, ab eiusmodi  
similitudine omnes muscoli à Græcis & Latinis suū nomen sortiuntur, etiā si  
quamplurimi muscoli illorum animalū effigiem nulla ex parte referant. Qui  
dam enim figura constant triāgulari: ut brachiū attollens musculus, & is qui  
scapulā pectori adducit, & qui brachiū declinē ad dorsum uellit. Alij quatuor  
efformantur angulis: ut scapulā dorso admouēs musculus, & qui ad brachia-  
le positus, radij motus in prouum autor est, quiambo etiam quodāmodo qua-  
drati sunt: ut & latus sub colli & genarū cute occurrens musculus, qui ex car-  
nea membrana cōstituitur. Alij quinque angulos exprimūt, ut is qui brachium  
pectori adducit. Qui ex scapulæ basi natus, octo superioribus costis inferitur,  
si obiter spectetur, quadrangularis apparebit: at si ipsi in costas insertiones  
quis perpēderit, tot angulos suæ insertionis lateri tribuet, quot digitis illud im-  
plantatur. Atque huius etiam figuræ est, ab dominis musculi oblique descēden-  
tis exortus, & quorundam thoracem mouentium insertio. Sed plures anguli  
etiam tribuuntur musculo latum tendinem sub manus cute producenti, &  
alijs omnibus in plures tendines cessantibus. Verū angulis his postpositis,

Ab ea qua  
mouetur par-  
ticula.

A forma.

Musculi no-  
men unde de-  
sumptum.



mirabilis formæ est<sup>c</sup> musculus, singulis costarum radicibus tendines exporri-  
gens, quem palmiti non ineptè assimilaueris: ut palmitis quidem lignosa pars,  
musculi carnosa esset portio: folia autem ab altero duntaxat latere educta, ipsi  
tendines. Quinetiam huius quoque ordinis est, longissimus dorsum mouen-  
tium<sup>d</sup> musculus, qui in apices transuersorum processuum thoracis uertebrarum  
potissimum inseritur. Septi quoque transuersi figura admodum rara est:  
accedit autem raia (quem *βασις* Græci appellant) piscis effigiei, si modò illi  
prius caudam secundum longitudinem diuisam finxeris. Anulis uerò respon-  
dent, qui faciunt excretionibus præficiuntur: tam is scilicet<sup>f</sup> qui ad anum spe-  
tat, quàm<sup>g</sup> qui orbiculatim uesicæ ceruicem ambit. Piramidem uerò & tur-  
binè<sup>h</sup> musculus refert, inter oculi musculos ordine septimus. Musculus quem  
palpebram deorsum agere credimus, nostro C similis uisitur. In tibiæ etiam  
hominis posteriori sede, iuxta calcem, musculorum imagines occurrunt, la-  
niorum securi aliquantulū similes: ut musculus secundū pollicis os flectens,  
& qui tertium quatuor digitorum os flectit, & unus qui sub planta tendinem  
porrigens, ad pedis in posteriora reflexionem iuuat. Horum namque musculo-  
rum uenter, securis ferro, tendo autem capulo obscurè respondet. Iam si utri-  
usque lateris<sup>i</sup> musculum, qui secundus inter scapulæ motores habebitur, confi-  
deraueris, non cum quibusdam parum religiosis, à satanæ qui Iesum in deserto  
tentauit, sed ab horum musculorum forma Franciscanos, Iacobitas, & præ-  
cipuè Benedictinos suæ cucullæ imaginem mutuasse contendes, quantum sci-  
licet eius, dorsum scapulasque integit. Verum ne in musculorum figuris recen-  
sendis, & potissimum eorum qui ad femur tibiāque pertinent, in monachos  
alicubi impingam, duntaxat cōmemoratis à figura differentijs adjiciam, quos-  
dam musculos ampliore multo habere insertionem, quàm ortum. qualis<sup>m</sup>  
ille est, qui à scapula pronatus, octo thoracis costis inseritur: dein<sup>n</sup> transuersus  
abdominis musculus, quemadmodum & obliquè descendens. Alij latum ob-  
tinent principium, & sensim coarctati, in acutum feruntur: ut<sup>p</sup> musculus bra-  
chium sursum agens, & alius qui id deorsum ad dorsum trahit, præterea om-  
nes ab ilium osse in femur inserti. Alij ortum insertioni æqualem nanciscun-  
tur: ut<sup>r</sup> qui scapulæ basi insertus, eam dorso attrahit, dein & intercostales om-  
nes: præterea quadratus<sup>s</sup> musculus in cubito, iuxta brachiale reconditus, ra-  
diumque in prouum circumuertens. Ex enarratis musculorum differentijs li-  
quidò constat, alios esse longos & graciles: ut eum<sup>t</sup> qui ab ilium ossis appendi-  
cis anteriori parte in tibiā fertur, totiusque corporis longissimus est, & etiam  
gracilis. Musculus à scapula ad os u referens deductus, pro sua proportionem si-  
militer longus & gracilis est, quemadmodum & testium<sup>x</sup> musculi. Alij autem  
ampli admodum sunt: ut ab dominis<sup>y</sup> obliquè descendentes musculi, & septum  
transuersum. Huc quoque referri possent insertionis principijque formæ, nam  
aliud principium uelut puncto tantum fit: ut<sup>d</sup> musculi latum tendinem in  
manu producētis principium, & principia eorum<sup>b</sup> musculorum, qui à coxen-  
dicis ossis appendice pronati, in tibiæ os & fibulam inferuntur. Quidam uerò  
instar simplicis lineæ principium obtinent: ut<sup>c</sup> is quo brachium deorsum,  
uersus dorsum trahitur: & is quoque, qui scapulæ basi insertus, eam dorso at-  
trahit: deinde cum alijs compluribus, qui inter scapulam sursum trahentes  
prior maiorque recensentur. Alij rursus musculi non lineæ simplicis mo-  
do, uerum latæ superficiei ritu nascuntur: ut<sup>f</sup> tres, qui ab ilium ossis dorso  
femur adeunt, & musculi cauam gibbamque scapulæ sedem occupantes,  
quorum ope brachium circumagitur. Quinetiam hæ lineæ superficiei que,  
in rectas,

c 12 tab. a.

d 13 tab. r.

e 7 tab. a.

f 1, 2 fig.

g 4 fig. cap.

h 2 fig. cap.

i 11 O.

m 1 fig. cap.

n 10 D, C

p 1 tab. 3 D.

q 1 fig. 11 y

r 10, C, P.

1 2 tab. r.

2 9 tab.

3 a.

m 7 tab. l.

n 6 tab. a.

o 4 tab. r.

p 4, 10, 22

q 10 tab. a.

r 10 tab. e.

s 10 tab. f.

t 6 fig. X.

u 11 tab. V.

v 7 tab. X.

w 3 tab. 2.

x 1 tab.

y 8, S.

z 21 fig.

11 b. 5 y.

2 3 tab. e.

3 4 5 tab. n.

4 5 6 tab. n.

5 7 8 tab. n.

6 9 10 tab. n.

7 11 12 tab. n.

8 13 14 tab. n.

9 15 16 tab. n.

10 17 18 tab. n.

11 19 20 tab. n.

12 21 22 tab. n.

13 23 24 tab. n.

14 25 26 tab. n.

15 27 28 tab. n.

16 29 30 tab. n.

17 31 32 tab. n.

18 33 34 tab. n.

19 35 36 tab. n.

20 37 38 tab. n.

21 39 40 tab. n.

22 41 42 tab. n.

23 43 44 tab. n.

in rectas, circulares & angulares rursus subdividi possent. at ne hæc curiosius quam decet, aliquis me persequi arbitretur, ad alias differentias orationem rectam, si prius addidero, insertiones similiter alias, rectæ lineæ instar, & secundum osis longitudinem fieri, cuiusmodi est musculi brachium pectori admoventis<sup>i</sup> insertio: alias per transversum, & lata apprehensione, ut<sup>h</sup> musculi brachium attollentis insertio. Velut punctum autem inseritur, tendo prioris musculi flectentium cubitum. Cæterum & ad formam quoque foramina fortassis spectant, quæ quibusdā musculis insunt: ut<sup>l</sup> septo transverso bina obtigerunt foramina, quibus uenam cauam stomachumque transmittit: quæ autem magnæ cedit arteriæ, & uertebris uiam præbet, uix foramine peruium est, sed sectione quadam inibi diuisum dici debet. Præterea<sup>m</sup> orbicularis recti intestini musculus, & ille qui uelicæ ceruicem ambit, anulum referunt, perforatorumque loco habendi sunt. Est & unus quoque perforatorum is<sup>n</sup> musculus, qui à prima thoracis costâ pronatus, anteriori transversorū ceruicis uertebrarum processum sedi inseritur, ac uenam in brachium cum arteria tendentem, unâ cum multis nervis transmittit. Alij foramine nullo sunt peruij, ut corporis reliqui ferè omnes, nam fortassis quis intercostales ideo perforatos esse dixerit, quod uenas, nervos & arterias, ad musculos costis instratos transmittat. Et aliquot insuper abdominis musculi in perforatorū quoque classē non immeritò fortè numerantur, quod<sup>o</sup> feminalibus uasis alicubi uiam in uiris præbent. Quamquam etiam perforati dici possint<sup>p</sup> musculi, qui secundo digitorum quatuor manus & pedis osi tendines, qui id flectant, largiuntur: quum illi longa sectione diuisi, subditum ipsi tendinem ad tertium digitorū os descendere sinant. In magnitudine autem musculi uariant, quod alij maxima consistunt mole: ut maximus corporis<sup>r</sup> musculus, qui toti propemodum femoris longitudini implan-

*A foramina.*

*A magnitudine.*

*A colore.*

A 3 interdum

interdum adeo crassa est, ut prorsus non uideatur pellucida. unde quum crassa nerueaq; sit, & caro subtus rubeat, aut nigricet potius, facile color ex nigro & albo permixtus confurgit. quamuis non idem carnis rubor in omnibus hominibus occurrat: uti sanè neq; sanguinis, quo caro enutritur, natura eadem est.

*Neruea muscu-  
lorum pars.*

*Carnea.*

*Liuida.  
Differentia à  
sua.*

Porro albam hanc musculi substantiam, quæ adhuc excarnis est, in sermonis contextu nerueam, quasi diceremus ligamentosam, appellabimus, hac uoce illam à carne distinguentes: uerùm quæ in harum partium media est, non inopportunè liuida nobis uocabitur. Par etiam situs omnibus musculis non contigit: quoniam alij ad corporis habentur superficiem, cutiq; accumbunt, ut omnes ex carne membrana constituti: & alij innumeri, quos ferè semper inter articularum motores primos recensebo. Alij penitus recoditi delitescunt: ut in poplite latitans<sup>a</sup> musculus, pubis ossium foraminibus proximè<sup>b</sup> attensi, sub stomacho<sup>c</sup> latitantes. Alij rursus secundum membri longitudinem locantur, ut omnes in tibia repositi: illo tantum excepto, qui in poplite occultatur, obliquumq; situm sibi peculiariter uendicat: ut & illi, qui radij mediæ prope modum longitudo in inferuntur, proprijsq; radij motibus subferuiunt. Transuersum autem fertur,<sup>d</sup> qui iuxta brachiale locatus, radium in pronum mouet.

*f 14 tab. I.  
g 10 tab. I.  
h 6 tab. V.  
i 7 tab. Q.  
k 7 tab. X.*

Quin etiam diuersum musculorum situm, seu potius fibrarum ductum, abdominis musculi eleganter ostendunt: quum<sup>e</sup> alij oblique deorsum in priora ferantur,<sup>f</sup> alij sursum oblique in priora,<sup>g</sup> alij rectè sursum,<sup>h</sup> alij prorsus orbicu-

*A fibrarum  
genere.*

latum, transuersumq;. Fibrarum genus omnibus ferè musculis unum duntaxat simplexq; est: nisi enim<sup>i</sup> musculo brachium pectori adducenti, & etiam illi qui<sup>j</sup> secundum inter scapulam mouentes est, duplex, & genarū laborumq; musculis multiplicius adhuc fibrarū genus tribuerimus, singulis prorsus musculis unicum tantum fibrarum genus, musculorum ductui & formæ magna ex parte respondens ascribetur. Musculi autem, quos ab aliorum numero uidebamur secludere, ita se habent. Musculus brachium pectori admouens, fibras quasdam ex superioribus deorsum, uersus exteriora ductas adipiscitur: quasdam uerò ab inferioribus sursum, etiam uersus exteriora. Qui scapulā mouentium secundus est, quasdam etiam à superioribus deorsum in priora, seu extrorsum protensas obtinet: alias autem ab inferioribus sursum similiter in priora, aut extrorsum. Vnde illis duobus duplex fibrarum genus accidit, quæ in illo, cuius ope brachium pectori admouemus, in aliqua sui sede, idq; potissimum iuxta insertionem, instar X se interfecant, seu decussatim feruntur. Rursus, si la bra mouentium musculorum, eos qui ab inferiori maxilla & malis ortum ducunt, inspexerimus, uariam profecto fibrarum iuxta insertionem differentiam intuebimur. Quemadmodum & latum musculum, qui carneâ constat membrana, fibras rectas, obliquas & transuersas obtinere conspiciamus. & prout etiam diuersæ fibræ his musculis obtingunt, ita quoq; diuersis famulantur motibus, ad harum illarum uel fibrarum tensionis remissionisq; rationē. Ad hæc, quid de lingua dicemus,<sup>k</sup> omni fibrarum genere intertexta? aliud sanè nihil, quàm & musculis diuersas adesse fibras, & has seorsum suis subseruire motibus. Nequaquam enim hanc fibrarum in eodem musculo contrariam seriem penitus inficiari possumus, & præcipuè in illis musculis, ubi mutua perficitur fibrarum intersectio, seu ubi fibræ decussatim aguntur: adeo sanè, ut prorsus aliorum Anatomicorum (qui omnibus musculis simplex & unicū fibrarum genus ascribunt) placito acquiescere nequeam. etsi interim per me licebit unumquemq; de fibrarū genere suo arbitrato statuere, modò has ab ipsarū incessu petitas musculorum differentias, uti nunc ferè proposui, subintelllexerit,

*s 3 fig. 10  
cap.*

*Galenus cum  
alibi sapit,  
tunc maxime  
ubi cor non esse  
musculū, pro-  
bare nititur: se-  
cus tamen lib. x  
de Adm. fecit.*

ac etiam



ac etiam fibras non æquè in omnibus musculi partibus collectas & tenues esse didicerit. In musculis enim acuto capite enatis, & in crassum tendinem fini-  
 tibus, in uentris musculi medio, ubi is crassissimus est, fibræ tenuissimæ, inui-  
 cem propter carnis interuentum magis distant, quàm in capitis & tēdinis ini-  
 tio. Alijs autem musculis in principio & origine, plures, & magis dissitæ, laxio-  
 resq; obtingunt fibræ, quàm in fine: ut omnibus ferè, qui ex lato principio in-  
 star trianguli in acutum ferūtur, & ampla superficie principium ducunt. Alijs  
 musculis in ortu fibræ magis cōstringuntur, quàm in ipsa insertione: quod illi  
 accidit<sup>1</sup> musculo, qui à scapulæ basi enatus, octo thoracis costis inseritur. Quin  
 etiam id in<sup>2</sup> septo transuerso usuuenit, cuius fibræ plures, magisq; inuicem re-  
 motæ sunt in ipsa insertione, quàm in capite, uel reliquo ipsius corpore. Alijs  
 propemodum æqualis undecunq; fibrarum est ratio: ut<sup>3</sup> illi, qui ad brachiale  
 locatus, radium in prouum ducit<sup>4</sup>, intercostales, & laryngis primam cartilagi-  
 nem secūda<sup>5</sup> neccentes, & musculi orbiculares, qui recto intestino & uesicæ  
 ceruici obducuntur. Alij rursus musculi toto ipsorum corpore rectà ferri ui-  
 dentur, obliquas tamen habent fibras: ut dorsum mouentium<sup>6</sup> sextum par, cu-  
 ius musculi tendines in apices trāsuerforum processuum præcipuè inserūtur.  
 Verùm illis etiam musculis aliquid priuatim euenit, qui duobus donātur uen-  
 tribus: ex quorum albo illi sunt<sup>7</sup>, qui inferiorem maxillam deorsum trahunt:  
 &<sup>8</sup> illi, qui à scapulis ad os<sup>9</sup> referens porriguntur. His enim in fibris accidit, ac  
 si duo, unus post alium scilicet, positi essent musculi, qui acutum caput & tere-  
 tem tendinem ostenderent. In musculorum capitibus exortibusq; quàm-  
 plures cōsurgunt differentiae: quarum prima à forma crassitieq; musculorum  
 desumi posset, quam superius commemorauimus. Secunda uerò à substantia  
 ad hunc modum accipi poterit, quòd alij penitus carni in exortu appareant,  
 fibris duntaxat raris & incompactis interstincti, ut<sup>10</sup> qui ab ilium osse femur ac-  
 cedunt. Alij neruei in ortu apparent, & rursus quidam ex his illicò in ipsius of-  
 sis cōtactu carni euadunt: ut<sup>11</sup> maximi in sura musculi origo, & in externa in-  
 ternaq; cubiti sede plurium musculorū principia. Quidam uerò longo ductu  
 neruei permanent, priusquam carnem adipiscantur: ut inter reliquos tibiam  
 mouentes<sup>12</sup>, qui tertium caput à coxendicis ossis<sup>13</sup> appendice assumit, & tibiae  
 motorum quintus censetur: dein<sup>14</sup> musculus brachium deorsum ad dorsum  
 trahens. Alij unico quidem capite oriūtur: uerùm haud secus, quàm si duo ob-  
 tinerent. quædam enim ipsorū principij pars aliquoufq; neruea apparet, quæ-  
 dam prorsus carnea, quod<sup>15</sup> rectis abdominis euenit musculus, quæ ex pubis of-  
 sibus enascuntur: dein<sup>16</sup> duobus ex radice capitum femoris principium ducen-  
 tibus, & calci insertis. Alij, duo sortiūtur capita: & unum nerueum prorsus est,  
 longoq; ductu tale permanet: alterum uerò, ut rectorum abdominis muscu-  
 lorum principia, carneum nerueumq; simul uisitur. Atq; id in<sup>17</sup> anteriori cubi-  
 tum flectentiū musculo usuuenit, cuius caput à scapulæ ceruice enatum, prorsus  
 nerueum cernitur: quod uerò ab anchoram imitante processu enascitur,  
 nerueum carneumq; simul existit. Ille etiam musculus illicò cōmonstrat, quos-  
 dam musculos plura habere capita, in ipso exortu inuicem neq; continua, neq;  
 contigua: hoc namq; illi ultimo cōmemorato euenit musculo. Alijs unicum  
 est caput, ut uniuerfis qui tibiam cubitumq; amplexātur, quibus omnibus aut  
 in inferiori, aut superiori parte capita sunt: septo tamē transuerso caput in me-  
 dio cōsistere credimus, non autem in altero extremorum. Dein ofsculorum  
 quæ sèmano semini comparantur ratione, ipsa musculorum capita uariant. in-  
 ter reliquos namq; musculos, capita duorum primorum pedem mouentium,

*1. fibrarum  
compactione.*

*14. musculorum  
capitibus.*

mox in exortu, sesaminum sibi priuatim innatum habent oficulum, quo infe-  
*A' uentribus.* riorum femoris capitum uim reprimunt & exolunt. Quæ à musculorum  
 uentribus sumuntur differentiæ, præcedentibus differentijs ferè omnes expli-  
 catae sunt, quum musculorum formas & fibras recenserem. Neq; hîc aliud ad-  
 dendum est, quàm uentrem musculi illic propriè reponendum esse, ubi fibræ  
 musculi inuicem minus compinguntur, ac copiosiore carne continentur. ac  
 proinde quibusdam musculis, in ipso exortu uentres potissimum habentur, ut  
 qui ab ilium osse in femoris os inferuntur: alijs ad finem, ac ad insertionem ma-  
 gis quàm ad caput, uentres consistunt: ut septo transuerso, quod carnosus in  
 extremis, atq; ipsis adeò insertionibus, quàm alibi conspicitur. Alijs musculis  
 uentres statim post ortum incipiunt, ut furam<sup>a</sup> constituuntibus. Alijs musculis  
 uenter longius ab ortu conspicitur: ex quorum numero is est,<sup>o</sup> qui brachium  
 deorsum ad dorsum trahit: &<sup>p</sup> unus inter tibiæ motores, qui à coxendicis of-  
 sis appendice enatus, suum caput diu neruosum obtinet, tibiâq; mouetium  
 quintus mihi habebitur. Alijs uenter per uniuersum musculi corpus perman-  
 et: ut intercostalibus, & illi qui ad brachiale repositus, radiû in prouum agit,  
 & laryngis non paucis. Atq; ita aliqui musculi uentrem ad ipsam usq; insertio-  
 nem seruant: ut nunc postremò commemorati. Aliorum uentres longè ad-  
 modum ab insertionem distant: ut<sup>n</sup> musculi illius, qui à femoris externo capite  
 natus, in calcem tenuissimo longoq; tendine fertur: & illorum omnium, qui  
 ex cubito tibiâ ue procedentes, digitorum motibus famulantur: &<sup>r</sup> eius qui  
 membraneum tendinem, musculis secundum femoris longitudinem proten-  
 sis obductum profert. Alij rursus geminum uentrem ostendunt: cuius gene-  
 ris musculi sunt, quos paulo antè inferiorem maxillam deorsum trahere, &  
 quos à scapulis in os *u* referens pertinere dicebam. Deinde<sup>r</sup> recto abdominis  
*Musculorum* musculo ex abundanti quædam transuersim ductæ impressiones insunt, quæ  
*impressiones.* illum musculum ita exornant, ac si pluribus efformaretur uentribus. Huius-  
 modi uerò impressiones, seu lineamenta, & circumscriptiones, quas Græci *ω-*  
*ρυσμας* uocauerunt, sunt ueluti albæ quædam lineæ, in musculi aliciuius substan-  
 tia impressæ: quarum quum frequens nobis mentio incidet, non abs re feceris,  
 si has in rectis musculis, atq; ijs etiam<sup>r</sup> qui sub stomacho latitant, in musculo-  
*A' tendinibus.* rum tabulis intueri non grauaberis. Quæ à tendinibus sumi possent differen-  
 tiæ, ex commemoratis ferè etiam pendunt. Quidam enim in tendinem ener-  
 uationem<sup>r</sup> ue prorsus non desinunt: ut laborum<sup>n</sup> musculi, &<sup>r</sup> rectum intesti-  
 num &<sup>r</sup> uesicæ ceruicem ambientes, & laryngis omnes: illis tantum exceptis,  
<sup>r</sup> qui recto donantur situ, ac secundæ cartilagini tertiam committunt: hi siqui-  
 dem in insertionem nerueum quid commonstrant. At non solum illi, qui aliud  
 præter os mouent, tendinibus destituuntur: uerum (etiam si secus in primo de  
 Musculorum motu, & alibi quoq; Galenus sentiat) eorum quibus ossa mouen-  
 tur, quàm plurimi tendinibus carent: neq; in insertionem magis nerueum quid,  
 quàm omnes musculi in suis uentribus commonstrant. Est autem eius classis  
 in manu,<sup>a</sup> qui pollicem indici proximè adducit: dein duo,<sup>b</sup> qui primum polli-  
 cis os inflectunt: ac<sup>c</sup> qui ad brachiale positus, radij motus in prouum autor est.  
 Intercostales etiam musculi tendine priuatur: ut & ille grandis<sup>d</sup> musculus, qui  
 à scapula ortus, octo superioribus thoracis costis inseritur: deinde<sup>e</sup> is qui à cla-  
 uicula in primam fertur costam. Atq; ita etiam insignis<sup>f</sup> musculus, inter mo-  
 uentes dorsum non infimus, qui ab ilium osse in uertebras lumborum & infi-  
 mam costam ducitur, flexionisq; dorsi autor est, nullibi nerueum quid (perin-  
 de ac dorsum mouentium alij permulti) ostendit. His accedit septum trans-  
 uersum,

n 14 tab. n.  
 o. p. q.  
 o 10 /a. o.  
 p 11 tab. r.

q 13 tab. p.

r 3 tab. o.

s 5 tab. a.  
 u 13 tab.

t 8 tab. h.  
 B.

u 5 tab. r.  
 H, F.

x 1 si cap.

49 M.

y 4 si cap.

49 N.

z 6, 7 fig.

cap. 11 P.

a 11 tab. f.

b 6 tab. n. n.

c 7 tab. X.

d 7 tab. L.

e 4. tab. d.

f 8 tab. x.

uerfum, in infertione nullibi nerueam fubftantiam exprimens,<sup>g</sup> præterquam ubi lumborum uertebreis exporrigitur. Neq; etiam in homine recti abdominis mufculi,<sup>h</sup> ubi coftarum cartilaginibus implantantur, tendinem commonftant: ut<sup>i</sup> neq; in fimijs & canibus, quibus ad primâ ufq; coftam confcendunt. At in illis, quâ pectoris ofi exporriguntur, in medio ductu nerueam naturam habent, ac fi inter illos prorfus reponendi effent, qui duos commonftant uentres. Neq; etiam complures mufculi, in occipitij os capitis motuura gratia inferti, tendinem magis in infertione, quàm in ipforum uentre oftendunt, præter alios fanè quàm plurimos corporis mufculos. Porro alij mufculi tendines habent, ut eorū qui aliud quàm os mouent,<sup>k</sup> ſex oculi mufculi: ſeptimus enim in nerueam fubftantiam non definit. Ex mufculis offa mouentibus omnes qui ex cubito manum adeunt, tendinibus ornantur. Tendinum quidâ lati membranciq; ſunt: ut ſex oculi mufculorū tendines, &<sup>l</sup> obliquorum, &<sup>m</sup> tranſverſorum abdominis. Alij omnino teretes: ut<sup>n</sup> qui ex cubito procedentes, digitos flectunt. Alij paulo minus toto teretes, & latiores nonnihil, quàm profundiores: ut<sup>o</sup> tendo in calcem infertus, &<sup>p</sup> tendo in latum ceſſans tendinem, priuſquam brachiale attingit. Et alij tendines breues ſunt: ut<sup>q</sup> circumuertentium brachium mufculorum tendines, & radius mouentium,<sup>r</sup> qui circa mediam radij longitudinem infertionem moliuntur. Alij autem lōgiſſimos edunt tendines: ut<sup>s</sup> mufculus ab externo femoris capite natus, & gracilem tendinem, priuſquam genu articulum prorfus ſuperauit, educēs. quin etiam is qui latum in manu educit tendinem, & omnes qui ex cubito & tibia procedentes, digitorum motibus ſubſeruiunt: & præter nonnullos tibiæ infertos, is etiam,<sup>t</sup> qui ex ilium offe natus, in membranam omnibus femoris amplexantibus mufculis obductam definit, ac tibiæ ofi fibulæq; inferitur. Mufculi qui tendines educunt, illos alicubi ab extremo porrigūt: temporalis tamen, ex ſui corporis medio tendinem emittere, Galeno in libris de Uſu partium dicitur. Quid autem hac de re ſentiam, Capite de mufculis maxillam inferiore mouentibus ſcribam. Priuatim etiam robuſtiſſimo tendini, ad tibię extensionem auxilianti, os ipſa nimirum patella<sup>u</sup> innafcitur: perinde ac breuib<sup>x</sup> mufculorum tendinibus, quorum beneficio ſecundum manus pollicis os, & primum quatuor digitorum manus, & primum quinq; pedis digitorū os flecti docebimus, quibus ſeſamo comparatā<sup>y</sup> ofſicula peculiariter ad infertionem propemodum innafcuntur. uti etiam alijs quibuldam tendinibus, reliquorum digitorum ofſium flexioni præſectis, eius generis ofſicula quædam inferta innataq; audies. Sic & tendo ex tibia inter fibulā calcemq; ductus, & ſub cubiformi offe, priuſquam in pedij os, quod pollicem ſuſtinet, inferatur, protenſus, quâ ſub illo offe reflectitur, inſtar ofſis, durioris<sup>z</sup> ue cartilaginis indureſcit, modicè ibidem dilatatus. Ad hæc, unus mufculus plures emittit tendines, ſingulos quaſi ex priuatis ſui uentris carnoſis propaginis educens: ut<sup>a</sup> qui in cubito locati, ad quatuor digitorum manus flexionē auxiliantur. Alij unum quidem educunt tendinem, at is poſtmodum in plures diſcinditur: ut<sup>b</sup> mufculi ex tibia enati tendo, qui in pedis planta, tertijs quatuor digitorū ofſibus tendines exporrigit: deinde<sup>c</sup> qui bicorni tendine in poſtbrachialis offa inferitur, & ad brachialis extensionem iuuat.<sup>d</sup> Qui autem indicem, medium & anularem manus extendit, in harum differentiarū medio conſiſtit. is namq; neq; plures educit tendines, neq; etiam ipſius tendo in plures diuiditur, ſed medium quid inter iam dictos commonſtrat. Ruſus plures mufculi unum efficiunt tendinem: <sup>e</sup> tres enim ſuræ maximi, tendinē unum in calcem inferunt. In ſuper & cubitū extendentes<sup>f</sup> mufculi in unum



*A' mutua mu-  
sculorum in offi-  
cio oppositione.*

*A' munere.*

in unum coeunt, unamq; simul insertionē efformant. <sup>f s tab. 2.</sup> Præterea & tres tibiam <sup>b, i, d. c. i. a.</sup> extendentium maximi, in unum quoq; tendinē, cui patellam innasci diximus, colliguntur. At de muscutorum numero & concursu aliquid nunc subijciendum venit: & si quid ex muscutorum differentijs omisissum sit, quom seorsum singulos percurram, in libri huius progressu explicabitur. Quemadmodū & hæc esse possit, musculos quosdam habere alios, qui suo motui opponuntur: ut flectentibus digitos opponuntur, qui eosdem extendunt. Sic qui caput inclinant, cōtrarios fortiuntur, qui idem rursus in posteriora releuant. At quidam, motus sui nullum habent cōtrarium. testium namq; <sup>22 fi. lib. s. 4.</sup> musculus nulli, qui testes deorsum trahant, opponuntur. Neq; etiam anum fursum <sup>b</sup> uellentes, qui eundem priuatim deorsum trahant, oppositos adipiscuntur. Vt neq; etiam circulares illi, qui recti intestini finem, & uesicæ ceruicem amplexantur: & postmodum <sup>i 2, 3, 4 fig. cap. 21 K.</sup> musculi à nobis inuenti, qui laryngis operculum fursum atq; in anteriorem mouent, nullos quoq; oppositi motus socios obtinent. Sic etiam à muscutorum munere differētia pendet: quum alij rectis præsent motibus, ut qui quatuor & manus & pedis digitos extendūt. Alij duntaxat obliquis subministrant motibus, ut radij motores omnes. Alij utrunq; motum præstant: si enim <sup>k</sup> musculus à pectoris ossē & clauicula enatus, ac in mamillarem occipitij ossis processum insertus, qui in dextro est latere, unā cum sinistro contrahitur, caput flexionem rectissimam experitur: si uerò is solus, quiescente sinistro agit, caput sinistrorsum in anteriora circumuertitur. <sup>h 4 tab. 6.</sup>

### MUSCULORVM NUMERVM NON promptè diffiniri. Caput IIII.



*Alis aliis mu-  
sculorum nume-  
rum propter fi-  
bras & motus  
statui.*

<sup>R D V V M</sup> difficileq; esse, muscutorum numerum persequi, ac semel, quot uniuersi corporis sint, recensere, præcedens Caput liquidò satis commonstrasse reor. non lanè quòd illum describere, prorsus impossibile sit: sed quòd uaria, eademq; non admodum absurda de muscutorum numero unicuiq; possit esse sentētia. Aliquis namq; unum dicet esse musculum, <sup>a</sup> qui brachium pectori adducit, eo quòd nulla sui parte sibi non continuus contiguusq; sit. Alius uerò duorum muscutorum loco illum fortassis censendum contendet, quòd omnes ipsius fibræ non parem ductum obseruent, ipseq; musculus utcunq; contrarios motus obeat. Eius enim pars, cui clauicula, & media pectoris ossis pars, clauiculæ proxima, principium præbent, deorsum obliquè, uersus musculi in brachium insertionem, suas fibras porrigit, & brachium pectori elatius, quasi ad guttur clauiculamq; trahit. Inferior autē pars, quæ à reliqua pectoris ossis sede, & quibusdam costarū cartilaginibus enascitur, fursum obliquè ad brachium fibras dirigit, brachiumq; humiliori pectoris sedi adducit. Vtrisque autem musculi partibus in se collectis, brachium pectoris medio admouetur. Præterea ad hanc muscutorum continuitatem, & unius instar partis circumscriptionem, & nullam, ut inter duos manus digitos, sectionem, sed diuersum fibrarum ductum, ac latum musculi principii, uariumq; eiufdē munus, non solum, quem nunc recensuimus, musculum quis referre potest: uerum & illum, <sup>b</sup> quem inter scapulam mouentem secundum recensēbo, qui continuus quidem est, attamen superiori sua parte fursum, uersus occipitium scapulam attrahit: inferiori uerò deorsum, uersus dorsum: media autem sede, aut utraq; ipsius parte, rectè retrorsum scapulam mouet. Dein huius musculi fibræ, supra scapulæ spinam conspicuæ, <sup>a 3, 4. tab. 2. a.</sup> <sup>b 9 tab. 1. a.</sup>

conspiciæ, deorsum in exteriora feruntur: quæ autem sub scapulæ spina uidentur, sursum in exteriora contendunt: uerùm nullæ interim decussatim se mutuo interfecant. Item<sup>e</sup> qui brachium attollit, unus quidem cōtinuitate est: uerùm apud Anatomicorum præcipuos non defuisse uidetur, qui duos hunc esse dicerent, unum à clauicula, alterum à scapula oriri contententes, ac motibus, non autem continuitati animum adhibentes. Quinetiam præter alios ple-  
rosq; his adnumerari possint, femoris motibus famulantes omnes,<sup>d</sup> qui trian-  
gulæ figuræ proximi sunt, & interim nullam disunctionis aut incontinuita-  
tis notam referunt: uerùm fibras ueluti ex latiori basi ad conum tendentes, &  
ideo non pari prorsus ductu delatas, sibi uendicant. Fibrarum etiam ductus di-  
uersitas, alijs<sup>c</sup> quatuor intercostales musculos in uerarum costarum interuallis  
constituit, propter diuersam illarum inter costarū ossa & cartilagine seriem,  
nihilominus tamen continuas seruat: unde etiam alijs duo tantummodo  
in toto interuallo recedunt. Sed & musculorū dorsum mouentium<sup>f</sup> quàm-  
plurimi, uarium musculis ascribi numerum indicant: quum alius continua-  
tem perpendens, unum utring; stomacho subiectum esse dicet: alius fibris &  
explantationibus implantationibusq; attendens, tot musculos recenset, ex  
quot ossibus enascitur, & in quot inseritur. alius non ossibus, sed quibusdam  
leuibus impressiōibus inscriptionibusq; attendens, tot musculos enumera-  
bit, quot inscriptiones uiderit. Atq; id maximè in<sup>e</sup> secundo caput mouentium  
pari usuuenit, quod ex pluribus enascitur ossibus, & multas ostendit fibras: &  
præterea in hominibus adeo uarias priuatorum musculorum descriptiones  
obtinet, ut id par quibusdam nequitiam duorum musculorum loco haberi  
possit, sed plurimum, neq; id quidem adhuc eodem numero omnibus. Cæte-  
rū & musculorum capita numerum turbant. non enim dubito,<sup>h</sup> musculus  
à pectoris osse & clauicula enatum, ac postmodum in mamillarem temporis  
ossis processum insertum, duorum musculorum numero nonnullis Anato-  
micorum proceribus cōprehensum fuisse, quod eam principij partem, quam  
à pectoris osse educit, ab illa quæ à clauicula prodit, nonnihil diremptam puta-  
rint, quodq; una aliquantulum neruosiore altera sit, etiam si reliquo ductu mu-  
sculus non separetur, neq; diuersam fibrarum naturam habeat. Pari etiam ra-  
tione certissimum est, non defuisse, qui<sup>i</sup> primum & secundū pedem mouen-  
tes musculos, à radicibus femoris caputū originem ducentes, seorsum singu-  
los posuerint esse duplices: quod unam originis partem nerueam, alteram car-  
neam, ut & recti abdominis, proponant. Alij tamen eam originis diuersita-  
tem non tanti, ut eius gratia musculorū numerus ipsis excresceret, fecerunt,  
& singulos unius loco habuerunt. At hoc postremum magis adhuc usuueni-  
ret, in anteriori cubitum flectentiū<sup>j</sup> musculo: qui etsi nullis, quod sciam, duo-  
rum numero habitus fuit, duo tamen distincta nascitur capita, magis quàm  
nuper dictorum musculorum capita inuicem dirempta: quamuis in commu-  
nem conueniant musculi uentrem, qui unicum tandem educit tendinē, adeo,  
ut ad capita respicientibus, non idem omnibus placitum fuerit. Quanquam id  
illis cōstitutum fuisse uidebatur, ut unum dicerent musculus, cuius capita in  
eundem musculi uentrem porriguntur, quod iam dictis sit musculis: atq; plu-  
rium musculorum uice eos haberent, qui etsi in unum coeunt tendinem, uen-  
tribus tamen non continuantur. Quod exactissimè in suræ musculus obserua-  
tum est, quum<sup>m</sup> musculos ualidum illum calcis tendinem constituentes, tot  
numero esse uolunt, quot uentres, qui tres uisuntur: duo nimirum à femore  
producti, quos etiam alijs enumeratos dixi: & tertius, qui pedem mo-  
uentium

Ab impressio-  
nibus.

A capitis.

uentium est quartus. Idem quoque maximis tibiā extendentibus<sup>n</sup> musculis, se-  
 ptimo uidelicet, octauo & nono tibiā mouentium contingit: qui etsi unum  
 tendinem tibię insertum unā producant, tamen quoniam uentribus non con-  
 tinuantur, plurium musculorum loco censentur. Cæterum tendinum ratio  
 talis est, ut omnes unum numerent musculum, qui uno enatus capite, unicum  
 educit tendinem, etiam si ille postmodum in plures diuidatur: quemadmo-  
 dum<sup>o</sup> musculo accidit, qui tertios quatuor digitorum pedis flectit articulos.  
 Ita etiam musculus unum caput habens, & adhuc carneus, in plures tendines,  
 dissectus, qui eiusdem motus autores existūt, unius musculi loco comprehen-  
 debatur: quemadmodum<sup>p</sup> musculus quatuor manus digitorum secundos fle-  
 ctens articulos: & is etiam,<sup>q</sup> qui tertios inflectit: à quo nos illum suo distingue-  
 mus loco,<sup>r</sup> qui pollicis tertium intermedium flectit, quod is ab illo prorsus sit  
 seiunctus: & si alibi fortè ipsi cōtinuus cernatur, id obscurè admodum in pri-  
 mo tantum est exortu. In dictorū modò classe etiam ferè, præter aliquot alios  
 musculos, habetur, qui indicem & medium atque anularem manifestè exten-  
 dit. Verum si tendines in diuersa specie ossa inserantur, dissectionū periti mus-  
 culum, qui tendines educit, plurium musculorum numero recensent. quem-  
 admodum nonnulli<sup>i</sup> musculum, qui pollicis duos tendines, & unum brachia-  
 lis ossi pollicis sustinenti exporrigit, duorū loco enumerarunt, etiam si omnes  
 isti tendines ad euerfionem faciant: pollicis quidem tendines, ad pollicis mo-  
 tum: brachialis autem, ad brachialis. Verum tale quid in anteriori tibię sede  
 magis adhuc est<sup>u</sup> conspicuum: ad medium enim longitudinis tibię, à muscu-  
 lo quatuor pedis digitos extendente, carnosus educitur musculus, qui in pedij  
 os minimo digito præpositum inseritur, ad pedisq; eleuationem in anteriora  
 iuat, quum digitorum interim tendines digitos extendant. Adeò ut alicui ui-  
 deatur duos hic enumerandos esse musculos, alij uerò unicum: prout hic ex-  
 ortus continuitati, ille uerò diuersis tendinibus, & in uaria ossa insertionibus,  
 differentibusq; functionibus animum adhibuerit. Neq; minorem in numero  
 obscuritatem parit mutus musculorum connexus.<sup>x</sup> Qui enim à pectoris os-  
 sis summo enati, in os v referens inseruntur, internis suis lateribus adeò inui-  
 cem adnectuntur, ut quis hos duos esse, alius autem unicum, non ineptè dixe-  
 rit. Quod etiam illi commonstrant,<sup>y</sup> qui à circulari ani musculo enati, uesicæ  
 meatum, ubi primū sub penis corporibus exporrigi incipit, tanquam duo di-  
 giti, amplexantur. Numeri etiam musculorum obscuritatē auget eorundem  
 concursus: ex quorum albo, si quis alius,<sup>z</sup> quartus tibiā mouentium profe-  
 ctò est, qui à coxendicis ossis appendice enatus, ualidis deorsum fertur: & ad  
 medium longitudinis femoris nerueus factus, alteri carnosæ parti cōnascitur,  
 cui femoris os initium præbet. Dein ambæ hæ partes, ea scilicet quæ à coxen-  
 dice ducitur, & ea quam femori ascribimus, unum tendinē simul efformant,  
 elatissimæ fibulæ parti robustissimè insertum: adeò ut & unum & duos mus-  
 culos hunc recenseri, nihil prohibeat, dummodò à uera descriptione non de-  
 clinetur. Porro & ad hunc uariarum partium concursus,<sup>a</sup> illi musculi referri  
 possunt, qui cubiti extēfionis habentur opifices: quum & tres & duo & unus,  
 ante insertionem, tendinisq; productionem, connexus continuitatisq; ratio-  
 ne, enumerari poterunt. Vt & uario numero<sup>b</sup> decimum femur mouentium  
 musculum haberi, nihil prohibet, propter carneas partes, quas sibi ueluti no-  
 uos musculos assumit, ad ipsius secundū posteriōrē coxendicis ossis sedem,  
 reflexum: quos alius fortè à decimo, propter uarium exortum, numero seiun-  
 get: alius, quod simul cum decimo concurrant, & ante insertionem, totiusq;  
 tendinis

n s tab. A.  
P. charact.  
s.

o 14 tab. z.

p s tab. o.

q 6 tab. z.

r 6 tab. n.

s 9 tab. z.

t 10, 11 tab. z.

u 4 tab. y.  
n.

x 4 tab. S. T.

y 1, 2 fig. cap. 49 ff. 1 ab M.

z 10 tab. y. 11 tab. w. f.

a 2 tab. O.  
P. Q. R. 11  
tab. o. f. c.  
12 tab. T.  
V. X. 13 tab.  
b, c, d.  
b 16 tab. F.  
G. H. de 18  
12 tab. m. f.  
y. c. 13 tab.  
15, 16, 17, 18,  
19, 20.



tendinis productionem decimo connascantur, uniantur'ue, hos cum reliqua decimi musculi portione, unius tantum loco recensere. Atq; hinc fit, ut toto sermonis progressu accuratè mihi de musculorū numero ueniat constitutum, ad quosiam tempestiuum est accedere, ne prolixius in generali musculorum explicatione hæsisse uidear. Cæterum ne quid obscuritatis sequens pariat oratio, & præcipuè quum cutis motores pertractaturus sum, aut quoties crebra carnosæ membranæ mentio incidet, nunc cutis & membranæ eius naturam prosequar.

## DE CVTE, CVTICVLA, ET MEMBRANA

per uniuersum corpus cuti subiecta, præterea & adipe inter cutem membranamq; illam reposito. Caput v.

*PARTES hoc Capite describenda, nigesima quinti libri figura utcumq; exprimuntur, iuxta r, s, t: dein & in nigesima quinta figura eiusdem libri, iuxta dextram mamillam.*



VT IS, omnium corporis partium est indumentum, cor-  
pori instar natui tegumentum obductum, non duntaxat om-  
nium hominis partium, sed uniuersæ substantiæ, quam  
generationi & corruptioni subiecta scimus, duritie mol-  
litieq; media. Est enim cutis, ueluti sanguine præditus ner-  
uus, ac inter neruum musculorūq; carnem quiddam plan-  
ne medium, perinde ac si ex mixtis utrisq; constitueretur.

*CVTIS  
quid.*

*Cutis substan-  
tia.*

*Cutis differen-  
tia.*

*A' connexu.*

*A' neruorum  
copia.*

*A' mollitiæ.*

*A' motu.*

*A' pilis.*

*A' forami-  
nibus.*

Hæc in homine, Herodoto *αὐθιγίων* aut *αὐθιγίων* dicta, boum & equorum ter-  
goribus, ex quibus coria adaptantur, respondet, & non pari ratione omnibus  
subiectis ipsi partibus adhæret, connectiturq;. Secus enim in manus uola & pe-  
dis planta subditis partibus adnascitur: aliter rursus in fronte sibi subditæ mu-  
sculosæ substantiæ, & aliter in labris, palpebris, auribus, naso, ano, ac pudendo,  
& aliter per uniuersum corpus, substratis partibus cutis committitur, ac inter  
secundum, diuersa ratione à subditis aufertur. Deinde in omnes cutis regiones  
non æqualis est neruorū distributio, nec cutis etiam undecumq; eadem crassi-  
ties: internæ enim manuum cuti, plurimæ neruorum fibræ porriguntur, uer-  
ticis uerò cuti paucissimæ. Quinetiam faciei cutis mollior & tenuior, uerticis  
autem & plantæ pedum durior uisitur. Quæ internam manus sedem inuehit  
(nisi labore callosior euaserit) exquisitissimè in duritie mollitieq; inter reli-  
quam cutem, & omnia prorsus corpora, media est, quàm proximè æquali ad  
pondus temperamento accedens. Vtcumq; uerò sit, cutis homini pro magni-  
tudine corporis tenuior, quàm animantibus quadrupedibus obtigit: quan-  
quam etiam homini profectò in uertice, dorso, cruribus, & pedis planta, crassa  
sit admodum, sed non omnibus æqualiter. Quinetiam aliæ cutis partes prorsus  
immobiles sunt, & circumactu difficiles: ut uolæ & plantæ cutis. aliæ uer-  
sátiles quidem sunt, sed nullo aguntur motu uoluntario: ut tota corporis cus-  
tis, ea excepta quæ mouetur, ut est frõtis & faciei uniuersa, & quæ anteriorem  
colli sedem lateraq; complectitur. Atq; hæc motu participat, aut proprijs in  
hoc famulâtibus musculis, ut cutis frontis, colli, genarum & labrorum: aut ui-  
cinæ ipsius cutis gratia, ut malarum cutis, quæ musculis destituta, simul cum  
proxima ipsi cute (at obscure interim) mouetur. Quòd quidè alia cutis sedes  
pilosa sit, ut uerticis, axillarum, pudendorū, in uiris menti: alia autem penitus  
pilis orbata, ut palmæ & plātæ cutis, omnibus conspicuū esse arbitror. Quem-  
admodum neminem latere scio, cutem maximā totius corporis partem esse,  
perpetuo contextu efformatam: nisi quòd tenuibus foraminulis, ad fuligino-

B forum

CUTICU-  
la quid.

Cuti uenas &  
arterias ac ner-  
uos porrigi, ip-  
samq; sensus  
esse competentem.

Lib. 3 de Ani-  
ma, cap. 11.

CARNO-  
sa membran.

forum excrementorum propulsiōem, & pilorum generatiōē paratis, per-  
uia sit; atq; etiam in palpebris, naso, auribus, ore, ano, pudendo, & ubi unguibus  
uiam præbet, interpellitur, perforataq; conspicitur. Ad hæc, ex cætera cutis re-  
gione, interna manus cutis (ut & pedis plantam inuestiens) maximè cōtinua,  
minimèq; perforata uisitur: quod & nuper natorum cuti aliquibus ascribere  
libuit. Cuti alia tenuis, & prorsus exanguis cuticula obducitur, propemodum  
ceparum tenuioribus ac pellucidis respondens inuolucris: nisi quòd alicubi,  
& præsertim in uola, & pedis planta, crassior duriorq; occurrit. Hanc quum  
cutis (quæ *ἀσπὴν* Græcis uocatur) uelut quēdam efflorescentia sit, *ὠδὸς πυλὸς*  
illi appellant. Quod si aliquando attritu in scabie, aut in uulneribus, ex unguen-  
torum applicatione, aut ignis admotione, aut feruentis aquæ infusione, aut ex  
longo itinere auferatur, & interdum uesiculæ ac papulæ instar à cute abscedat,  
promptissimè, aliterq; ac uera cutis renascitur, quæ sola sanguinis & uitalis spi-  
ritus compos est, ob quod uenarum arteriarumq; alicubi, & neruorū tenuissi-  
mæ partes, finesq; ad eam confluunt, ipsamq; simul concretę quibuscūdam effor-  
mare creduntur. Neq; sanè audiendus est Aristoteles, cutem sensu destituens,  
non secus, quàm si carnis cuti subditæ duntaxat beneficio tactus sensus perfi-  
ceretur: quum cuti proprios, certaq; serie neruos exporrigi, ex Anatome disca-  
mus, illi præcipuè, quæ in facie est, ac brachio, cubito & manu, deinde & cruri-  
bus & pedibus. Per reliquum autem corpus, etiamsi non ordinata serie nerui  
ad cutem deducantur, attamen complures in illam definunt, sub ipsaq; & po-  
tissimùm ad thoracis latera exporriguntur, membrana cuti subdita (ut & ue-  
næ ipsæ) suffulti: quemadmodum etiam in quarto libro, qui neruis dedicabitur,  
enarraturus sum explicatius. Atq; ita musculorum (quos carnem Aristote-  
les appellabat) gratia, cutis nequaquam sentit: uerùm, uti diximus, proprio-  
rum neruorum occasione. Et quamuis uerticis cutis obscuriori sensu sit præ-  
dita, attamen sentit, utcunq; etiam incōmodissimum Naturæ fuerit, sursum  
ad uerticem neruos distribuere, ipsaq; etiam cutis hic non admodum sensu in-  
diguērit. Deinde quis non quotidiana experientia edoctus, cutem à subditis  
musculis, aut osibus quoque auulsam, & postmodum scalpello ictam, ungui-  
busq; compressam, sentire non didicit? Neq; est, quod Aristotelis sectatorum  
quispiam hic nescio quam Terrestritatem mihi astruat: quum nerui à dorsali  
medulla (& potissimum humiliori ipsius sede) enati, ipsa cute duriores sint,  
& his adhuc ipsi tendines, quos potissimum faciliè affici, non admodum sensu in-  
dignos. Imò si non minus rationi, quàm experientiæ simul fides habenda erit, ausim asse-  
rere, musculorum uentres quamplurimos (ut quorundam femur amplexan-  
tium) obtusius quàm ipsam faciei manusq; cutem affici. Atque etiam mihi ri-  
dendi uidentur, qui cutem ob hoc sentire posse auerfantur, quòd nullum hîc  
sit medium: quasi uerò etiam neruum proprijs membranjs prorsus denudat-  
um, aut etiam in medio diuisum, grauissimè cruciari non uideremus, quoties  
ipsius denudatæ substantiæ acriores pulueres insperguntur. Et si medium etiam  
præter rationem in tactus sensu ridiculè desideraremus, non ne in promptu  
est ipsa cuticula cuti obnata, & interim (ut putamus) sensu priuata? At nunc  
membranam quoq; aggrediamur, cuti per uniuersum corpus subditam, quæ  
cuticula longè robustior crassiorq; est, & fibris quibuscūda raris, his qui subster-  
nuntur illi musculis adhæret, cuti uerò pertinacius committitur. Siquidem  
quamplurimæ uenæ, & paucissimæ tenuissimæq; arteriæ, cutem nutrientes,  
& neruorum propagines, cuti sensum communicantes, hanc membranam  
transeunt, ipsaq; inter cutem & illam prorepentes, hac suffulciuntur, mem-  
branamq;

branamq; cuti copulant, præter continuam quandam, sibiq; proximam fibrarum membranarū seriem, cuius etiam beneficio membrana ualidissimè cuti connascitur. Hęc non eandē in uniuerso corpore crassitiē obtinet: uerū quibusdam corporis sedibus, carnosus fibris adaugetur: & crassior reddita, adeo carnosā efficitur, ut musculi nomine donetur. Huiusmodi regio in tota<sup>a</sup> colli amplitudine habetur, & in<sup>b</sup> frōte, & in reliqua propemodū facie: quibusdam autem animalibus undecunq; ferè carnosus oppletur fibris, & præsertim illis quę totius corporis cutem (ut nos frontis) mouent. Audio & homines fuisse, qui in thoracis regione, & alibi etiā in corpore cutem mouere ualuerint, quibus proculdubio membrana hæc, similis equorū asinorumq; carnosus membranis contigit. Porro huic membranæ, quam aliarum membranarū nomine *ὤμνρα* Græci appellant, non perperam uocem Carnosa adiectā arbitror, quum inter reliquas corporis membranas hæc sola propemodum carnosā appareat, uereq; talis censenda sit. Quod Arabes paulo exactiūs perpendētes, primi omnium, quod sciam, hanc membranam Carnosam appellauisse uidetur. Atq; id sanè penitus huius nostræ ætatis medicorum præcipuis indagandum fuerat, qui panniculum carnosum, à Barbaris quibusdam non malè mehercules eo nomine appellatum, octo abdominis musculos esse cōtendunt, & contra Galeni sententiam, ac rei ueritatem, cuti membranam in uniuerso corpore, & in ipso demum abdomine (de quo duntaxat sapere uidentur) subtendi inficiantur. Alij, etsi per uniuersum corpus à me hanc membranam demonstrari conspexerint, adeo ineptiunt, ut hanc non fateantur eam esse, cuius Galenus tum alibi sæpius, tum in tertio de Administrandis sectionibus meminit, eo quod ego adipem inter cutem & hanc membranam ostendo, sæpe trium etiam digitorum crassitudine: quodq; hominis membrana tantum à cute semper abscedat, quanta adipis est crassities. Debeant profecto eiusmodi Naturæ & ueritatis hostes perpendere, Galenum de suis simijs, non autem hominibus locutum, quibus nullus adeps inter membranam & cutem interuenit ipsaq; membrana non fibris duntaxat cuti continuatur, sed prorsus undique citra alterius corporis interuentum ipsi cōtigua est. Vnde etiam non adeo arduum est, in homine cutem solam illā membrana diuidere, ac in simijs, canibus, & illis animalibus, ex quibus Galenus Anatomen descripsit. Huic membranæ ea parte, qua musculorū proprias respicit membranas, lentor ille mucosus, quem cuti Aristoteles tribuit, obducitur, ob hoc fortassis, ne ipsa subiectorū musculorum motū præpediat. Membranis enim omnibus, quæ corpus, quod situm locumq; aliquando mutat, continent, ambiunt<sup>ue</sup>, mucoso quodam lentoq; humore, quā corpus id respiciunt, oblini, commune habetur. Sunt itaque tria, uniuersum hominis corpus perpetuò cingentia: cuticula nimirum, cutis, & membrana hæc carnosā. quibus & quartum accedit, ipsa uidelicet pinguedo, seu adeps, *πικρὰν* Græcis nuncupatus: qui, nisi extremè homo emaciatur, undique propemodum inter cutem, & quam nuper diximus membranam, copiosissimè continetur. Ex uenis enim compluribus, & arterijs (si quæ reperiuntur) membranam perreptantibus, atque inter illam cutemq; propagatis, plurimus sanguis refudat, membranæ frigiditate, calorisq; inopia, in adipem, seu pinguedinem, aut ut alij etiam in cornutis animalibus uocant, axungiam degenerans. Est namq; hæc adipis ad uniuersi corporis membranas, ligamenta, & (ut semel dicam) ad omnia sanguine indiga, frigidaq; corpora, generatio nis ratio: uidelicet quod ex uenis emanans sanguis, frigoris ui congeletur, illisq; adhæreat corporibus. Verū interim à Natura cautum est accuratissi-

a s. lab. r.  
b s. lab. A.  
ac in eius  
tabula fū-  
cie.

Præfens mem-  
brana cuti car-  
nosa dicitur.

Ex Auicenna  
Hebræo.

קרום  
חבננה  
הגולגולת  
הזאת  
העורן הנה  
חבננה הגול-  
גולת, או ה-  
חבננה.

Panniculus  
carnosus.

ADEPS,  
seu pinguedo.

ubi adeps co-  
piosior sit.



*Quibus anima  
libus adipis co-  
pia.*

mè, ne adeps nascatur, ubi noxia inutilis'ue esse possit. Non enim Natura adipem cerebri membranis obduxit, non testium inuolucris, non internæ fedi cordis inuolucris, quamuis tamen cor hac non destituerit: non internæ ligamentorum fedi, quæ tendinibus transuerfim obuoluuntur: neq; etiam palpebrarum, aut frontis, aut penis cuti adipem subiecit, neq; etiam aded multum manus pedisq; externæ fedi. quemadmodum profectò copiosissimum clunibus obduxit, ut illi adipe, puluinaris uice uterentur. Adeps humidis frigidisq; animatibus (ex quorum numero homo & porcus sunt) plurimus colligitur: ficcis uerò & calidis nullus, aut perquam exiguus: ut leonibus, & canibus uenaticis, ipsiq; etiam fumiæ. Quanquam præter hominem, & porcum, & ericium, nunquam aliud terrestre occurrerit quadrupes, quod inter cutē & carneam membranam, adipem nāciscitur, utcunq; etiam aliās oues & glires illi subinde reperiantur præpingues. Albet autem adeps, etsi in omnibus animalibus non æquè, & in homine minus adhuc quàm in cæteris omnibus, quod membranæ, cutisq; & alia, quibus adhæret, corpora, alba, & nō carnis modo rubra sint: omnia enim quæ in nostro corpore ab aliquo emutantur, mutantis alterantisq; colorem quàm possunt proximè etiam fortiuntur. Et ridiculum profus est, ob hoc adipem album arbitrari, quòd aereæ substantiæ compos sit: quum osse, & cartilagine, & ligamēto, & tendinibus uix aliquid candidius occurrat, quibus nihil æquè terreum in corpore reperias. Adipi inter cutem membranamq; collecto, eum usum ascribere possumus, quem uesti tribuimus: ut corpus scilicet calefaciat frigoris tempore, & si Soli homo exponatur, uestis quoque modo refrigeret, calorem, quò minus penetret, inhibens. Atque tam leuis est adipis usus, ut homini necessariam corporis partem aut substantiam nequaquam deesse putemus, si adipe fortassis destituatur. Vnde etiam haud mirum est, nuper natos pueros, aliorumq; animalium fœtus, nihil adipis, quibusuis etiam membranis attensum adnatum'ue ostendere.

*Adipis usus.*

QVI CVTICVLAE, CVTIS, ADIPIS, ET  
carnosæ membranæ natura per sectionem obser-  
uari debeat. Caput vi.

*Qui masculo-  
rum, secandi ra-  
tio ipsorum in-  
terjacetur his-  
toria.*



T I præcedente libro, postquam osium cartilaginumq; historiam absolui, rationem modumq; tradidi, quo quis hæc ad disciplinam opportunè sibi parare queat: ita quoq; hoc libro, omnium quæ seriatim tradentur, secandi artificium post cuiusq; enarrationem sic subiungam, ut quis in uno corpore omnem musculorum ac ligamentorū dissectionem rectè aggressurus, & ordine absoluturus est. Vnde etiam alia modò musculorum describendorum tradendorum'ue series, quàm in mea horum librorum Epitome, nonnunquam incidet, in qua uicinæ potius quàm sectionis rationem in ordine digerendo habuimus: aded ut uarijs scopis, uarij præfigantur ordines. Quanquam & hic fortè uicinitatis rationem habuissē, musculorumq; secandi modum ad libri calcem ueluti uno quopiam Capite, unaq; serie reiecissem: nisi is longior omnino esset, & subinde aliquid ad musculorum historiam pertinens contineret, quod alioquin in ipsorum descriptionibus fuisset cōplectendum, ne dicam Galeno (qui in musculorum quàm in aliarum corporis partium historia prolixior & diligentior est) intelligendo, nos debere aliquando accommodare. Varius itaq; in eodem libro ordo non tantum esset ineptus ac incommodus, uerum insuper prolixitatem

ratem frustra augetet. Vt cunq; interim per melicebit unicuiq; mea Capita lectione suo arbitrato transponere, qui eos quoq; ferre cogar, qui ne per somnium quidem in sectionibus exercitati, & aliorum laboribus quouis tandem prætextu sibi uindicandis dediti, ac deniq; auream quandam mediocritatem se affectos arbitrati, meos conatus & uigilias in epitomen, aut dispendium potius aliquod turpiter concinnabunt, pestilentiq; fucio studiosis imponent: nuncq; mihi profectò autores sunt, ut præter animi sententiam subinde breuitati studere, ab ijsq; non semel, quæ alioquin utilissima forent, me temperare cogar. Ea igitur ratione, quam modò præstantiorem ducimus, partium præcedente Capite traditarum anatomen auspicaturus, nouacula acutiore, in abdomine, aut quacunq; uisum fuerit corporis parte, adipe non destituta, cutē ad adipem usq; recta sectione, & deinde transuersa (ut saltem unum, aut plures angulos moliaris) incides, tam leuiter ac moderatè cuti nouaculam adiuuens, ut solam ipsam, illæsa interim carnea membrana, diuidas. Quod sine negotio in homine facies, & præcipuè pinguiori: quum subinde, & potissimum in mulieribus, adipis crassities duorum digitorum latitudinem in thorace & abdomine superet: in coxis autem ac clunibus etiam palmæ latitudinem, in mulieribus non extremè etiam obesis uincere, in publicis sectionibus uiderimus. Ac postinde sectiones ducendæ sunt eo accuratius, quo macilentius obtigerit corpus. Deinde etiam conandum est, ut hanc sectionem citra negotium obire assuescas, cum propter musculos ex carnea membrana cõformatos, tum ad discendas neruorū uenarumq; series, inter cutem membranamq; hanc sparsas. Postquam igitur cutem ad adipē usq; (non tacta interim carnea membrana) dissectueris, hamulo aut unguibus, in aliquo ex sectionibus angulo cutem attolles: & diligēter transuersis acutiore nouacula ad cutem ductis sectionibus, cutem ab adipe, quo usq; liberit, separabis. Cuti deinde reflexæ ardentem candelam admouebis, ut cuticula ignis ui uesiculę instar abscedat, seorsimq; cutem & cuticulam intuearis. Dum uerò cutem ab adipe liberas, neruulos indagare conuenit, & uenas, quæ super membranam in adipe prorepentes, cutem adeunt: deinde ipsa quoq; membrana, fibris illis frequentibus cuti cõmissa, sedulo inspicienda est. Iam si obesum ad manum sit cadauer, adipem à membrana liberare contendito: quod eadem prorsus ratione, quā cutem ab adipe seiungebas, præstandum est. Cauendumq;, ne membrana oscitanter cum adipe auferatur: in quo Galenum secuti Anatomici aberrarunt, eam membranam in homine repperiri inficientes, hacq; potissimum occasione necessariò ignorantes musculos, ex carnea membrana cõstitutos, & per illam exporrectas uenas & neruos. Ablato adipe, leuem sectionem per carnosam membranam ad subiectos ipsi musculos usq; induces: & parua opera, solis ferè digitis per transuersum hinc inde actis, aut buxco cultello, aut si uoles, nouacula, illam à subditis partibus separabis: aliamq; membranæ à cute separationem esse disces, quā membranæ ab illis quibus incumbit corporibus auulsionem, quam Herophilus *dissep* nuncupauit. Hæc enim factu facilis est, ocyusq; perficitur, illi operationi penitus respondens, qua bobus, uitulis, ouibus, leporibus cutem citra negotium auferri uidemus: imò auulsio hæc adeò prompta est, ut solo flatu hœdis, agnis, & etiam iunioribus uitulis, membranā hanc cum cute à subditis corporibus separari indies cernamus. Verum cutis ab adipe aut à membrana separatio, non nisi frequentissimis sectionibus, acutissimisq; nouaculis, longoq; spacio completur. Quod etiam & lanij nos docent, quoties sub axillis cutem auferre conantur, carnosam membranam, corpori bouis adnexam (ne nimium carnis au-

Cuti admi-  
stratio.

Cuticula.  
Adipis.

Carnosa mem-  
brana.

Differen-  
tiam inter  
cutem & car-  
nosam mem-  
branam, & de-  
inde inter carnosam  
& subditos il-  
li musculos.

ferant) relinquentes. Neq; ista tantum apud lanios discuntur, uerùm etiam cuticulæ natura, quum lanij obustos prius porcos deradunt: aut potius, quum calidæ aquæ ipsos immergentes, unâ cum cuticulâ pilos defcalpunt.

DE MUSCVLOSA FRONTIS CVTEM  
mouente substantia. Caput VII.



Frontis muscu-  
losa substantia.

**C**ARNEAM membranam, quæ uniuerſæ cuti subiicitur, quibusdam corporis sedibus carneis fibris augeri, & alicubi in musculi naturam degenerare, prius commemorauimus. Nunc autem pertractabitur, cur & quo nam pacto id sub frontis cute accidat, quam *πρωτοπιδιον* Græci uocant: quemadmodum & insinuatæ illi lineæ, *σολιδας* & *ἐμμεγυγας* appellant. Vt itaq; supercilia attollantur, & interdum demissa, oculi sedem angustâ reddant, ipsamq; corrugata muniant, frontis cutis uniuerſa, quæ depilis est, simul cum nasi cute, motu uoluntario opportune agit: quod carnosæ membranæ, totius frontis & nasi cuti subtenſæ, fit beneficio.<sup>a</sup> hæc namq; carneis fibris augetur quàm plurimis, & musculosa reddita, plures neruorum propaggines mutuatur. Deinde frontis nasiq; cuti membrana hæc tenacius, & citra adipis alicuius, aut per quàm modici interuentum connascitur, quàm per reliquum corpus cuti adnecti consueuit. Quod etiam alijs imposuit Anatomicis, arbitrantibus frontis cutem, carnosam musculosamq; substantiam esse: quum cutis non magis hic, quàm alibi, carniformi substantia donetur, sed duntaxat præſens membrana carnosior reddatur, cuti ipsi (quemadmodum iam diximus) pertinacius, quàm in abdomine, aut dorſo, aut cruribus cõnata, haud secus, quàm si membrana unum corpus cum cute efformatur: quandoquidem sic rectè idem motus amborum, membranæ ſci licet & cutis perficitur. Porrò huius musculosæ compaginis fibræ, mutuò ad latera accumbentes, à nasi summo usq; ad mediam frontis sedem (quæ inter primas capillorum radices & supercilia consistit) & ad huius quoq; loci latera, carnosiores uiſuntur, omnes sursum recto tramite procurrentes, si modò interim per quàm raras exceperis, obliquo ductu exporrectas. Atque hæc sanè recta fibrarum series, non perfunctoriè à medicis uenit perpendenda, ne in fronte transuerſas potius, quàm rectas moliantur sectiones. Accidit enim, quum transuerſim quandoq; sectionem inibi, & maxime iuxta supercilia, ubi carnosiores esse fibras dixi, aliquis tentat, ad palpebrarum radices, tum supercilia, tum contiguam ipsis cutem deorsum ita conuolui, & oculos, quibus incumbunt, aggrauare, ut neq; aperiri ex sententia queant, neq; liberè suo munere fungi.

<sup>a</sup> Hanc nò  
aliter quàm  
in 3 tabula  
fronte deli-  
neare li-  
cuit, ad A.

Fibrarum in  
fronte series.

In fronte trans-  
uerſas sectiones  
non tentandas.

MUSCVLOSÆ FRONTIS SVBSTAN-  
tiæ administratio. Caput VIII.



Duplex admi-  
nistratio.

**D**ESCRIPTÆ modò musculosæ<sup>a</sup> substantiæ administratio, duplex tibi erit. Vna quidem, qua simul cum carnosâ membrana cutem à membrana caluariam cingente auferes. Altera autem, qua cutem à musculosa substantia separabis, carneam membranam capiti affixam relinquens. Vt uerò utraq; in uno cadauere ex sententia perficias, detonsis crinibus, à uertice rectâ per frontem & supercilio- rum medium, ad nasi usq; extremum, sectionem nouacula per cutem duces: deinde

<sup>a</sup> 3 tab. A.



deinde aliam in fincipite, secundum coronalis futuræ ductum, ad tempora & aurium radices usq; moliere. Ductis sectionibus, in altero latere, hamulo, aut summis digitis, cutis propter sectionum angulos (qui in elasticissima frontis sede, & ipso ferè uertice erunt) eleuanda est, ac simul cum carnea membrana ad supercilia usq; auellenda, eodem prorsus modo, quo carneam membranam à subditis musculis separari, superius relatū est. At in alio latere, varias easdemq; transversas sectiones experieris: donec relicta ad caluariam carnea membrana, cutem cōmodè ab ipsa, ad supercilia usq; adimas, iam in palpebrarum<sup>b</sup> musculis incidens. Neq; id tam factū arduum est, atq; alij uidentur innuere dissectionis proceres: quum, uti antea testatus sum, membrana non eo pacto cuti connascatur, ut unum prorsus ex ambo bus simul confusis corpus confurgat.

## DE MUSCULIS PALPEBRARVM.

## Caput IX.



QUAMVIS tertia musculorum tabula, ad characteres C, D, E, hos musculos utcumq; exprimat, hic tamen istam peculiarem locauimus figuram, in qua A primum indicat palpebræ musculum: b uerò C musculi illius principium. D autem secundum musculum insinuat, cuius initium e notatur. Mutuus uerò duorum musculorum connexus, F insignitur.

sum musculorum connexus, F insignitur.



PALPEBRAM utranq; tam inferiorem, quàm superiorem, efformat membrana, quæ à caluariam succingente membrana principium ducit, & unum continuum cum adherente alba<sup>a</sup> ue oculi tunica corpus existit, deinde & cutis quoq; cum carnea membrana. Atq; hæc simul ad palpebrarum fines, & ubi<sup>c</sup> cartilago cilia erigens, & tarsus dicta, consistit, firmissime uniuntur. Per reliquam uerò palpebrarum regionem, cutis carnosæ membranæ, ut in cæteris ferè omnibus corporis partibus, quod ad connexum attinet, committitur: at nullus interim adeps, sed uctuosus duntaxat quidam humor, inter cutem membranamq; ia cet. In superiori quoque palpebra, secundum uniuersam ipsius amplitudinem ex abundanti, carnea membrana musculosis adaugetur fibris, ac uelut duos efficit musculos, in medio cutis & eius membranæ, quam adherenti oculi tunicæ continuam esse diximus, repositos. Moueri enim oportebat ex nostro arbitratu superiorem palpebram, alioqui in nullum usum nobis accommodatam. Etenim frustra palpebras Natura largiretur, si aliquando extrinsecus illato, uersus hominis oculos, scarabæorum & cancrorum oculis longè molliores, quod percussurum ipsos & læsurum esset, ex nostro arbitratu eas non clauderemus. Duos itaq; tenues, latos, membraneos, ac substantia propemodum omni ex parte sibi similes musculos Natura produxit, unum in maiori oculi ponens angulo, alterum in minori. Qui portionem maioris anguli occupat, ex media anguli sede ad nasi latus incipit, suo principio etiam superciliorum partem naso proximam contingens. Huius finis amplus, quemadmodum totus etiam musculus, cartilagini, in quam pili firmantur, applantatur, mediam ipsius sedem, quæ maiorem respicit angulum, uniuersam occupans. Alter uerò musculus totum minorem angulum amplectitur, ductum quodammodo semicircularē obtinens. A medio namq; inferioris palpebræ exortus, per minorem angulum circunducitur, & in superiorem palpebram ascendens, in reliquam cartilaginis dimidiam sedem sese inserit: prioriq; musculo, non ad cartilagem

Palpebrarum constitutio.

Duo palpebræ musculi.

Superioris palpebræ cur moueri oportuerit.

Unus musculus.

Alius.

tilaginem tantum, sed etiam per reliquam superioris palpebræ longitudinem ita committitur, ut nisi fibris ambos distinxeris, uterq; unus esse apparebit. Fibræ enim secundi, nostro C, palpebra sursum ducta, respôdent: ea autem continuente, acutum magis efficiunt angulum. Prioris uerò musculi fibræ, minus obliquæ conspiciuntur, & uelut ex duplici ducuntur principio: nimirum ex angulo maiori, & supercilij parte naso cõtermina. Musculus iste superiorem palpebram attollit, secundus uerò eam deorsum agit. Simul namq; semper attrahitur, tam altera tarfi pars, cui cõtractus musculus non implantatur, quàm reliqua: idq; tarfi, cui musculi inferuntur cartilagineæ cõstitutionis, beneficio. Si namq; is esset membranofus, uel carnosus, uel quomodocunq; libet (ut reliqua palpebræ sedes) mollis, præterquàm quòd cilia non referuaret erecta, attractam ex musculi collectione partē reliqua haudquaquā sequeretur. c F. G.  
tab. B.

*Cur tarsus  
perinde ac reli-  
qua palpebra  
non sit mollis.*

*Difficilem esse  
palpebræ mo-  
uentis muscu-  
lorum cogni-  
tionem.*

*Inferior palpe-  
bra immobili-  
lis.*

Quemadmodum enim si baculum aliquem obliquum & retortum, utra uoles parte apprehensum, attraxeris, se totus sequitur: pari modo tarsus nunc utrunq; etiā musculū uniuersus alternatim sequitur. Quod uerò palpebræ motus, eodem ritu, quo reliqui totius corporis motus, qui oppositis perficiuntur musculis, celebrentur, omnibus conspicuum esse debet, uno scilicet musculo in se cõtracto, altero uerò à propria functione quiescente, & longiore reddito, laxatoq;. Si enim uterq; musculus conuelleretur, & ad seipsum sibi continuam tarfi partem alliceret, sursum quidem pars eius, quæ magnum respicit angulum, reueleretur, deorsum autem traheretur ea quæ paruo uicinior est: ac ita non magis aperiretur oculus, quàm clauderetur: eaq; uideretur palpebra, quā in Prælagiorum libris retortam uocauit Hippocrates. Cuius sanè oraculi gratia non oscitanter palpebrarum musculos à studiosis obseruari uelim: est enim, ut omnium propemodum in facie motuum, eorum quoq; speculatio ardua. Quod uel Galenus faciliè attestatur, qui in libris de Affectuum locorum cognitione, tres palpebræ musculos secus atq; alibi recensuit. Duos enim illos, quos iam enu meraui, innuit palpebrā deorsum trahere: & tertium à fronte natum, ductus palpebræ ad superiora autorem ponit. Neq; adeò adhuc palpebrarum motus admirandus uenit, atq; pelliculæ illius, quam in auiibus & testudinibus, alijsq; plurimis animalibus, ex maiore oculi angulo, quoties oculus cõnuet, toti oculi obduci conspiciamus, & quæ aperto oculo, rursus ad maiorem oculi angulum collecta, quid simile commonstrat, nostræ<sup>h</sup> carunculæ, in maiore oculi angulo repositæ. Quæ itaq; ad superioris palpebræ motum pertinent, sic se habent, inferiori interim palpebra optimis rationibus & minori & immobili. h 19 fig.  
cap. 14. lib.  
7. 2.

MUSCULORVM PALPEBRAS MOVENTIUM administratio. Caput x.





MUSCULORVM palpebras mouentium administrationem illi respondere conuenit, qua musculofam frontis substantiam es aggressus: nimirum, ut in unius lateris palpebris, musculos unā cum cute ad ipsarum usq; insertionem auferas: ac dein musculos à cute, quoad id tibi concessum erit, integros separe. In alterius uerò lateris palpebris, cutis à musculis ad ipsos usq; tarfos est auferenda, musculis ad illam membranā integrè asseruatis, aut dimissis, quæ ab adhærente alba ue oculi tunica pronascitur, & internam palpebrarum sedem constituit, interq; se & cutem musculos superiorem palpebram mouentes comprehendit, citra omnem (quemadmodum ferè & in fronte) adipis interuētum. Vbi igitur

igitur musculos, aut potius carneam membranam, hic superioris palpebræ motuum gratia musculosam redditâ, à cute liberasti, nitêris dein illam à subdita ipsi membrana transuersis undique sectionibus adimere, quo palpebrarum motuum rationem, perquàm sanè obscuram & difficilem, absolutius perdis-  
cas: ne quid interim de affectibus dicam, his sedibus tam crebrò oboriuntibus, diligentemq; manus operam expetentibus.

## DE OCVLORVM MVSCVLIS.

## Caput XI.

PRIMA OC-  
LI MVSCULO-  
rum figura.SECUNDA  
OCULI MV-  
sculorum fi-  
gura.VNDECIMI CAPITIS FIGVRARVM, ET  
earundem characterum Index.

QVANDO QV IDEM in integris musculorum tabulis, oculi musculos depingere non dabatur, ipseq; oculus ex caluaria ad musculorum ostensionem euellendus sit, hic ipsorum delineatione extra reliquorum musculorum proportionem reposuimus. Ac in harum prima quidem, oculus simul cum suis musculis, in ipsorum sede adhuc repositis, una facie delineatur. Secunda uerò sex primos oculi musculos, ab insertione humi prostratos, commonstrat, septimo adhuc ad inferiorum nervum sua in sede asseruato.

A 1, 2 Anterior oculi sedes, in qua iris constitit.

B 1, 2 Visorius nervus, imbi resectus, quâ primum ex caluaria in oculi sedem delabitur.

C, D, E 1 Tres in hac facie musculi occurrunt, nondum scilicet aliquo musculo sua sede liberato.

F, G 1 Intervallorum inter sex primos musculos consistentium, & adipe opplerorum, duo in hac facie apparent.

H, I, K, L, M, N Primi sex oculi musculi. Verùm H musculum notat, quo oculus sursum agitur: I, quo deorsum: M & N, quibus leuiter circumagitur: K, quo ad maiorem oculi angulum ducitur: L, quo ad minorem angulum fertur.

O Septimus oculi musculus, nulla ex parte à visorio nervo liberatus, sed ab adipe ipsum alioquin integre omnino detectus.



V V M neq; ex lateribus, neq; alijs omnino sedibus, quàm ad pupillæ rectitudinem, oculorum perficiatur visio, paucissima sanè uideremus, si oculi penitus essent immobiles. At quia tres oculorum nobis occurrunt motus: unus nimirum, quo hi intrò uersus nasum adducuntur, & quo extrorsum ad paruum angulum aguntur: secundus, quo sursum tenduntur uersus supercilia, & deorsum ad malas tra-

Oculus motus  
uoluntario mo-  
ueri

huntur: tertius, quo obscuro admodum motu circumuertuntur: meritò singulis motibus, bini adaptantur musculi, quorum primus ad internum oculi consistit

Primi quatuor  
oculorum mouen-  
tes musculi.



confistit latus, introrsumq; oculum agit.<sup>b</sup> Secundus autem ad externum latus <sup>b = fig. L.</sup> repositus, illum extrorsum ducit.<sup>c</sup> Tertius suprà habetur, oculumq; sursum <sup>c = fig. H.</sup> mouet: uti<sup>d</sup> quartus, qui infrà locatur, deorsum. Hi quatuor muscoli, ut rectis <sup>d = fig. I.</sup> oculi præfunt motibus, ita quoq; rectum situm obtinent, sibiq; omni ex parte similes sunt. Capita enim ipsorum ex dura cerebri<sup>e</sup> membrana, neruum uisorium obtegente, & è neruo<sup>f</sup> secundi paris neruorum cerebri, mox in nerui uisorij è caluariæ cauitate prolapsu originem ducunt: dein ipsorum uenter amplior, quàm profundior, attamen propemodum teres uisitur: & quum ad oculi usq; regionem, quæ inter posteriorem & anteriorem media habetur, uenter ille peruenit, in latam membraneamque cessat enerationem, quæ ultra mediam eam oculi regionem in anteriora perfertur, & duræ oculi<sup>g</sup> tunicæ, tantumquam mouendo ois, non procul ab<sup>h</sup> iride, maioriq; oculi circulo inferitur, re- <sup>g fig. 16. 17 cap. 14 lib. 7. h carund. fig. 2. i = fig. M. h = fig. N.</sup>cta secundum oculi latitudinem incedente linea. Porro<sup>i</sup> quintus &<sup>k</sup> sextus, circumductionis sunt opifices, dictisq; nunc quatuor forma quidem & ortu respondent: at minores, & ductu & insertione ab illis differunt. Vnus nam quæ à dura cerebri membrana, uisorium neruum ambiente, è regione minoris anguli originem ducit, & in humiliorem oculi sedem, neruosa sua tenuitate iuxta iridem obliqua linea implantatur. Alter uerò à uisorij nerui membrana, è regione maioris anguli enascitur, & duræ oculi tunicæ, neruosam ipsius tenuitatem obliqua quoque linea ad superiorem oculi sedem inserit. Cæterum etsi hi ambo circumuersioni præcipuè conducant, attamen & sursum deorsumq; oculum quodammodo agunt. Sex istū muscoli, quum simul omnes suum adhuc seruant situm, unaq; committuntur, figuram constituunt turbinatam: <sup>i tota prima fig.</sup> cuius conus, ipsorum est exortus: basis uerò, eorundem insertio. Breuissimo enim ductu, neruo connectuntur uisorio: quum in illorum quam unà conformant capacitate, multus contineatur<sup>m</sup> adeps duriusculus, & albus admodum, qui rursus alteri cuidam obuoluitur musculo. Est enim præter commemoratos oculi musculos, alius adhuc grandis, & undecūq; ab illis & eo quem diximus adipem circumdatus, ac solus similem figuram illi quam priores sex simul efformabant, constituens. Nam musculus iste paulo anteriùs, quàm sex illi, à dura quoque membrana, neruum uisorium inuolvente, principium assumit carneum, quod neruum illum orbiculatim ambiens, in prioraq; porrectum, instar turbinis tantisper dilatescit, dum musculus posteriorem oculi sedem cōtingat, illiq; circuli modo carneus implantetur, non quidem proximè ad neruum uisorium, sed ferè ubi oculus hac posteriori sede amplissimus fieri incipit. Quemadmodū uerò inter hunc musculum, & sex priores, adipem repositum dixi: ita etiam inter neruum ipsum, & præsentem musculū, eo interuallo, quo is à neruo abscedit, adeps colligitur. Musculus hic nullam prorsus inscriptionem obtinet, nisi fortassis unam in inferiori sede, secundum ipsius longitudinem protensam. Vnde etiā miror, hunc non unius musculi loco ab Anatomicis enumeratum fuissè, sed ab alijs duorum, ab alijs trium: quum interim musculum hunc uix obiter omnes descriperint. Ac proinde etiā uereor, ipsos non admodum aptè illius usum expressisse, dum hunc priuatim retentionis oculi in sua sede autorem esse asserunt, nullum præterea illi usum ascribentes. Quum tamen sex priores musculi id munus sibi aptius uedicare possint, quòd externa ipsorum superficie, membranæ oculi sedem in caluaria exculptam suc- <sup>ostendit hac prima figura.</sup>cingenti, fibris quodammodo cōnascantur, septimum musculum undiq; in se occultantes, ac ne caluariā ullibi cōtingat, arcètes. Quinimo fortè non deerūt, qui sex

Quintus & sextus.

Adeps oculi musculi in-repositus.

Septimus musculus.

Septimi of-ficium.

qui sex musculorum exortum non à membrana neruum inuestiente, uerùm ab illa quæ os succingit, pendere contendunt, quum interim septimus musculus multis intervallis undiquaq; ab os succingente membrana distet: quod profectò factum non fuisset, si modò huius beneficio oculum in sua sede retineri, ac quodammodo ad cerebrum trahi oporteret. Proinde si ipsius naturam accuratè rimatus fueris, illum instar tegumenti uisorio neruo obduci concedes, & postmodum etiam oculum rectis motibus agere fateberis, prout nimirum has illas uel sui corporis fibras contraxerit, laxauerit uel.

## OCULI MUSCULORVM ADMINI-

## stratio. Caput XII.



**R**ECTIVS musculorum oculum mouentium administrationem, illo ex caluariæ<sup>a</sup> sinu euulso, perficies. Euellitur autem promptè uniuersus, integra adhuc caluaria, si omni ex parte oblongo cultello, ad os semper ductis in circuitu sectionibus, à suo sinu ipsum liberaueris, & tandem neruum uisorium, ubi primùm ex caluaria procedit, absecueris. Si uerò caluaria fortè ad cerebri inspectione prius fuerit dissecta, ipsumq; cerebrum auulsum, còdukerit duabus lineis caluariam ferra diuidere: una quidem linea à regione maioris anguli, uersus uisorii nerui foramen facta: altera autè à minori angulo, ad prioris sectionis, iuxta foramen illud, terminum. Si enim ad eum modum ferram in oculi usq; sedem penetrare coegeris, totam superiorem sedis partem, instar cuiusdam trianguli auferes: ac deinceps undiq; oculo à pinguedine liberato, illù adimes: aut si uisum erit, oculum ab ossè undecunq; liberatum, solius uisorii nerui interuentu, caluariæ appendere fines. Euulsum sodali tenendù porriges sic, ut summis dextræ manus digitis nerui uisorii finem (quem & eleuabit) sinistra autem manu uelut in pugnum coacta, in indice ac pollice anteriorem oculi partem comprehendat. Mox adipem oculo circūpositum, & glandulas, uenarum & arteriarum diuisionem intercedentes, adimito. Dein consideratis musculorum ductibus, & quam simul omnes constituunt, forma, sex capita primorum à neruo uisorio, cultello acutiori liberato: ac singulos deinde musculos leuiter secando, ad mediam usq; oculi regionem deducito, unumquemq; supra leuam sodalis manum, quasi stellam effigiaturus, extendens. hac namq; ratione cuiusq; implantationem, formam, & usum leui negotio condifces. Porrò nihil æquè diligenter præcauendum uenit, ac ne<sup>b</sup> adhærentem albam uel oculi tunicam à cornea prorsus abrasas, nimiumq; oculum emungas, priusquàm sex musculorum insertionem intuitus fueris: aliàs enim (nisi fortè exercitator sis) eam uitabis, neruosam alicuius musculi tenuitatem unà cum adhærente membrana incuriose absecans. Iam ubi adipem in media horum musculorum cauitate coacervatum, unguibus aut cultello à septimo oculi musculo adempseris, illum quoq; aggredi integrum est. Quì itaq; neruum ambiat, circulatimq; in oculi radice implantetur, examina, ipsum à neruo prorsus ad duram usq; oculi tunicam radendo. Cæterum si oculum, caluariæ adhuc hærentem, administrare animus sit, musculorū capita primùm liberans, ad eum quem iam dixi modum, musculos attrēctabis, capita scilicet à neruo adhuc fixo, ad insertionem usq; deducens. Commodius tamen, minoriq; molestia priorem sectione obibis. In utroq; tamen administrandi modo, oculi situs semper perpendendus est, quem<sup>c</sup> caruncula indicabit, maiorem angulum in homine occupans, & (ut creditur)

*Administratio in oculo à caluaria resecto, & hunc eximendi modum.*

a 1 fig. cap. 9. lib. 1. T. V, 8, 9. d. 11. multi characteres.

Hec quasi ostendunt dñe cap. 11. figura.

b 18 fig. cap. 14. lib. 7. n. 11. c 17 fig. cap. 14. lib. 7. x.

d 19 fig. cap. 14. lib. 7. a.

*Administratio oculi musculorum, quum in albine caluaria hæret.*

creditur) pituitam in genas defluere præcauens. Hæc namq; (dummodo cognoscas, an dextrum, an sinistrum oculum in manus assumpseris) oculi regionem, quæ magnum spectat angulum, perpetuò commōstrabit, à qua illico reliqua oculi latera opportunè petes. Aut si lubet, neglecta caruncula, potius cultello corneam membranam, priusquā oculum à caluaria resecahis, punctim in aliqua parte radere, hincq; oculi regiones semper augurari. Interest autem, oculi regiones, propter obliquos musculos potissimū, cognoscere.

DE BUCCARVM, LABRORVM, ET  
nasi alarum musculis. Caput XIII.



*Alterius lateris primus musculus, uel secundus omnium primus ac secundus.*

*Lib. 4. de Administrandis sectionibus.*

*Nonnulli hominibus aures moueri.*

LIBRO superiore, duo nasi ossa in<sup>b</sup> duas desinere cartilagineas, atq; horū extremo secundū latera alias<sup>c</sup> duas molles & latas cartilagineas (quas alas uocant) accumbere alligariq; scriptum fuit. Nunc uerò musculos, qui eas mouēt, simul cum buccarū labrorumq; motoribus exequemur, buccarum & labrorum motus hic intelligētes, quos quiescente etiam inferioris maxillæ ossē obimus. Alijs siquidem musculis maxillæ os, alijs uerò buccæ labraq; motu aguntur uoluntario.

Duorum itaq; primorum, qui buccas & labra mouent, in utroq; latere<sup>d</sup> singuli habentur membranei, admodumq; ampli. Ex omnium enim uertebRARUM ceruicis spinarum regionibus, deinde scapularum, & clauicularum, & pectoris ossis sedibus originē ducunt, usq; ad faciei medium protensi. Suntq; hi aliud nihil omnino, quā carneā mēbrana, carnosus fibris adaucta, & dictis iam regionibus musculosa penitus reddita. Cæterū fibræ à nullo prorsus ossē originem (ut fortassis quispiam, ab alijs Anatomicis lusus, arbitaretur) ducunt, neq; etiam quis musculos hos ab aliquo ossē principiū petere, non perperam dicturus est. At quia fibris his multi neruorum surculi exporriguntur, qui à subditis membranæ corporibus in illam excurrunt, membrana substratis sibi sedibus ualidius hic, quā in reliquo ferè corpore affirmatur, uarium sanè fibrarum proponens incessum. Fibræ enim<sup>e</sup> à pectoris ossis sede, mediāq; clauiculæ regione, pectoris os spectante, sursum uersus faciem conscendentes, secundū colli longitudinem recto tramite protenduntur.<sup>f</sup> Quæ autem ex reliqua clauiculæ sede, & summi humeri, & scapulæ sedibus, ad ceruicis usq; spinam incipiunt, oblique sursum cōtendunt, tantoq; obliquiores uisuntur, quantō ceruicis spinæ sunt propinquiore. Omnes enim carneæ fibræ, à ceruicis uertebRARUM spinarum sedibus prorepentes, sursum transuersim feruntur, idq; eo magis, quo musculus occipitiō uicinior existit. Porro eiusmodi fibrarū ductus, in collo admodum conspicuus est: nullaq; fibrarum intersecctio, ut neque etiam in summo mento, & in inferioris maxillæ iuxta aurem regione sese offert. Verū ubi fibræ iam labra<sup>h</sup> contingunt, inter se adeò confunduntur, ut rectas & obliquas & transuersas iam amplius distinguere, prorsus arduum & impossibile sit, idq; præcipuè secundum totam inferioris labri regionem. Superior enim huius musculi<sup>i</sup> pars, ab elatiore sui principij, quod per spinæ ceruicis sumit lōgitudinem, sede, secundum occipitijs ossis basim fertur, mox sub aurem, ut ipsius radicem perreptando contingat, incedens. Imò interdū hic adeò carneis suis fibris ascendit, ut & auris ipsius beneficio quibusdam hominibus, uti & simijs, moueatur. Musculus dein ab aure in faciem ductus<sup>k</sup> illum quem inferiorem maxillam mouentiū secundum statuemus, integit musculum: & paulo ualidius ossi in mala, quā alibi in reliquo ipsius progressu conascitur,

*a 1 fig. 9  
cap. lib. 1  
2, 3.  
b 4 tab. K.  
c 4 tab. L.*

*d 3 tab. mu  
sculus & no  
tatur cir  
cūscriptus  
H, I, O, N,  
L, K, M.*

*e Hæc ner  
uorum fe  
rie aliquo  
paccio colle  
dit collum  
3 fig. cap.  
f 3 tab. 4.  
g 3 tab. 2  
K ad L.  
L ad O.*

*h iuxta H.  
M 3 tab.*

*i 3 tab. ab  
O ad H.*

*k 4 tab. 5.*



l. 1. ta. quasi  
ab O ad N.  
m. 1. tab. ab  
O ad H.  
H.  
n. 3. ta. quasi  
f. ab N. p. r.  
L. ad K. nascitur, hinc ad nasi usq; radicem pertingēs. unde etiam fit, <sup>1</sup> primum quidem  
o. 5. tab. ab  
M. ad K. musculi latus per ceruicis spinæ longitudinem, <sup>2</sup> secundum autem ab occipitij  
p. 1. tab. M.  
f. tab. E. medio ad superius usq; labrum opportunè ac manifestò diffiniri. Reliqua ue-  
q. 1. tab. F. rò duo ipsius latera (sortitur enim quatuor) haud æquè sunt distincta. <sup>3</sup> Quod  
r. 1. tab. G.  
H.  
s. 3. tab. E. enim à spina ad summum usque pectoris ovis, secundum scapulam & clauicu-  
t. 1. tab. F. lam exporrigitur, inæquale est, ac uarium. Quandoquidem non instar rectæ li-  
u. 4. tab. I.  
1. tab. G. C.  
2. fig. cap. 2  
lib. 4. O.  
V. neæ carnosarum fibrarum hic apparet principium, sed instar obliquæ, admo-  
C dumq; inæqualis, nunc paululum sub scapulæ spina & clauicula incipiēs, nunc  
C paulo superius, & nunc è regione. <sup>4</sup> Quartum autē latus, quod à summo men-  
C to, ad superiorem pectoris ovis sedem protenditur, uix ob id distingui potest,  
C quòd hominibus utriusque lateris musculi hic ad eò coeant, ut duo musculi  
C unus esse uideantur: quodque hac in parte carnosiores longè, quàm in reliqua  
C ipsorum sede existant. Hi musculi buccas, & totum inferius labrum deorsum  
C retrahunt, & ad latera simul cum superiori labro abducunt: aut, ut dicam ue-  
C rius, reliquam faciei cutem, quæ à musculosa frontis & nasi substantia, & pal-  
C pebræ musculis non mouetur, circumagit, ad hoc opitulante <sup>5</sup> lato quoque, &  
C quodammodo orbiculari musculo, à tota ferè superioris maxillæ longitudi-  
C ne, in inferioris longitudinem, ad gingiuarum radicem inserto. Est autem hic  
C musculus similiter membraneus, & uaria fibrarum specie intertextus, totam  
C eam buccarum sedem complectens, quam inflare possumus. Neque sanè aliud  
C corpus id uniuersum, quod inflatur, censendum est, quàm cutis, cui immédia-  
C tē succumbit <sup>6</sup> primus iam commemoratus musculus: deinde, prout obeso-  
C res homines sunt, ad ipsos maior minor ue copia: & postmodum quidam supe-  
C rioris labri <sup>7</sup> musculus, & <sup>8</sup> alius, labro quoq; eidem, & alæ nasi cōmunis, quos po-  
C stea describemus. præterea orbicularis & amplius musculus, cuius naturam ex-  
C plicare iam contendimus, cuiusque internam superficiem os succingens tuni-  
C ca oblinat, ipsique ad eò connascitur, ut nullo prorsus modo illacera à muscu-  
C lo, aut musculus ab illa auferri queat. Imò secundus hic buccarum musculus,  
C uix aliud est, quàm carnosarum fibrarum implexus admodum tenuis, ac quo-  
C dammodo membraneus. Cognosces autem eam, quam diximus, utriusque  
C iam commemorati buccarum musculi, & potissimum primi functionem  
C promptissimè, si inferiore maxilla superiori adducta, immotaque, plurimum  
C ad quamcunque partem, sedem ue, labra & buccas duxeris: unaque etiam ob-  
C seruaueris, qui anteriorem colli cutem, primi musculi beneficio, unà cum buc-  
C cis deorsum uellere possis. Rursus si immota colli cute, totam buccarum se-  
C dem, quam inflare integrum est, nunc in oris amplitudinem uolueris: nunc au-  
C tem extrorsum, nunc sursum, nunc deorsum, nunc prorsum, nunc retrorsum  
C duxeris, secundi musculi functionem, & motus, quos illius & aeris in ore ui-  
C obimus, plurimum admiraberis. Cæterum Galenus <sup>9</sup> primo utriusque lateris  
C musculo, qui ipsum, quum libros de Vsu partium conscriberet, latuit, quemq;  
C à se tandem inuentum fuisse, non semel in libris de Administrandis sectioni-  
C bus inculcat, ad eò fuit, illumque, ut ueterum oscitantiam magis argueret, tan-  
C ti momenti esse tradidit, ut in quarto de Administrandis sectionibus, ipsum  
C duntaxat omnium functionum, quas labris & ore, edentes, aut bibentes, aut  
C differentes obimus, autorem uideatur statuere, <sup>10</sup> neruis quoque huc concur-  
C rentibus mouendi officium priuatim tribuens, & nullam ferè (uti tamen de-  
C cebat) aliorum in super musculorum mentionem faciens. Sunt autem nerui  
C eiusmodi utrinque bini: quorum unum ex foramine inferioris maxillæ, ad  
C inferius labrum elabi, suo loco docebimus: alterum, ex oculorum sede per pe-

Secundus alte-  
 rius lateris, seu  
 omnium 3. C.  
 4.

culiare foramen deductum, in malarum regionem decumbere audies. Verum quum eiusmodi nervi (si modò motibus præesse debuerint) musculis indigeant, & omnes labrorum motus illis<sup>x</sup> latis & tenuibus tantum peragi nequeant, ipsiq; alios exigant auxiliares, meritò Natura alios<sup>y</sup> quatuor musculos mouendis labris confluxit. Quorum principia, euidèntia quidem & manifesta sunt, antequam labrorum extremis permiscerentur: concreta uerò illis, omnifariam redduntur obscura, & inseparabilia à reliqua labrorum substantia. Vniuersa enim labrorum cute, & oris amplitudinem succingente tunica, toti musculosæ naturæ commixtis, ac musculis, ut quispiam non ineptè dixerit, ibidem corruptis, unà cum<sup>z</sup> fungosa, quam postea explicabimus, substantia, hominis labra procreantur. Quatuor itaque enarrandorum iam musculorum duo primi, labro superiori peculiaria sunt, ipsorumq; in utroque latere<sup>a</sup> unus habetur, qui à maxillæ superioris osse, ubi mala confitit, carnoso principio enatus, deorsum obliquè in priora fertur, quousque in sui labri latus sese inferat. Duorum inferiorum utrinque etiam<sup>b</sup> unus obferuatur, superiori musculo latior, sed breuior. Exoritur namque carneus & hic quoque, ab inferioris maxillæ humiliori parte, ad menti quasi latera, hinc sursum obliquè in priora protensus, latusque permanens, in mediam inferioris labri sedem implantatur. Sunt itaque omnes quatuor lati, ac quodammodo, quod ad fibras attinet, duplici donati initio: ipsorumq; fibræ circa insertionem, X literæ modo sese interfecant, pertinaciter (uti admonuimus) labrorum cuti immixtæ. His musculis duodecim motus ut minimum obimus: quatuor quidem obliquos, in utroque labro duos: & alios octo rectos, in utroque labro quatuor. Duo quidem ad amussim recti fiunt, quando labra plurimum à se inuicem distant: hoc quidem à duobus musculis sursum agentibus ad nares tenso, altero autem deorsum ad mentum ducto, dum duo inferiores musculi laborant. dein quando ad sese labra retrahuntur, & inuicem coeunt, uno ex superiore loco deorsum, altero ex humiliore sursum protenso. Cæterum ab internis horum musculorum fibris, labra introrsum conuertuntur & subimplicantur, ab exterioribus uerò foras euelluntur: ut ita & duo alij in singulis labris recti consurgant motus, qui paulo minus toto ad obliquos quasi referendi sunt. Quatuor uerò obliqui motus, unico duntaxat laborante musculo, reliquo interim laxato, celebrantur. Si enim dexter superioris labri musculus, remisso sinistro, contrahitur, dextra labri pars obliquo motu, sinistra dependente, attollitur: atque hac ratione reliqui tres obliqui motus labrorum peraguntur. Vt uerò ualidiùs adhuc superius labrum moueretur, & secundum totam ipsius substantiam musculis participaret, illi alia portio<sup>c</sup> musculi elargitur, qui narium<sup>d</sup> alam extrorsum sursumque agit. A mala enim, iuxta proprium superioris labri<sup>e</sup> musculum, carneus quidam, sed tenuis membraneusq; nascitur musculus, qui in ipso modicè uersus priora descensu, in duas portiones partitur, unam nasi alæ radici, alteram superioris labri parti, quam Latini mustacem, Græci uerò *μυστω* uocant, inferēs. Portio nasi alæ exporrecta, eā extrorsum sursumq; mouet: quæ autem labro propria est, id quoq; sursum uellit: & tātus huius portioneis cum alæ portione est cōnexus, ut superius labrū, immota ala, sursum uehementer mouere nequeas. Verum præter hunc alæ musculū, alius in interna nariū amplitudine habetur: qui ad suæ cavitatis externū latus, sub tunica nares succingente reconditus, impense tenuis est, ac membraneus: inq; interiorē alæ regionē insertus, illam introducit & colligit: hacq; ratione cum opposito sibi musculo in repentinis inspira-

Labrorum constructio, deinde quatuor musculi labris proprii, seu in altero latere tertius, & postea quartus, uel quintus 5, 6, 7, 8.

Alarum nasi musculus, præsentis Capitis in altero latere 5, aut omnium 9 & 10.

In altero latere 6, aut omnium 11 & 12.

x 3 tab. F.  
y aliter lateris u. mus G, H 3  
tab. alter 4  
tab. N. notatur.

z 5 tab. G.

a 3 tab. G.  
H.

b 4 tab. N.

c 3 tab. F.  
d 4 tab. L.  
e 3 tab. G.

f ad regionem K  
tab. 4.

inpirationibus & expirationibus homini accommodus redditur. Sunt itaq; hoc Capite nobis enumerati duodecim muscoli, si omnes utriusq; lateris iunxerimus: duo quidem lati, ex carnea constantes membrana: duo admodum uarij, ex una quasi maxilla in aliam pronati: & quatuor labris proprij, & totidem alarum nasi. nisi fortassis illum, qui labrum superius & alam simul adit, propter ipsius<sup>8</sup> dissectionem in progressu, & in diuersas partes insertionem, duos fingere, atq; ita quatuordecim musculos statuere, uisum fuerit. Sic etiam nihil obstat, & duos qui carnea membrana efformantur, unum dicere, quum adeò in anteriori colli parte continuentur, ut<sup>h</sup> diuisionem nullam notatu dignam ostendant.

MVSCVLORVM BVCCAS, LABRA, ET  
nasi alae mouentium administratio. Caput XIII.



ORVM musculorum administratio, à<sup>a</sup> latis, & ex carnea cōstantibus membrana musculis, opportunissimè auspicaberis, ac primùm acutiori nouacula in cute rectà sectionem, à summo mento, mediaq; inferioris labri sede (ubi cutis in ruborem definit) ad pectus usq; secundum colli longitudinem duces, ita quidem ad amussim, ut sola cutis ad subiectum usq; musculum, carneam uē membranam diuidatur. Deinde alia ducenda est sectio, ad utriusq; labri extremum, secundum ruboris finē, sic ut orbiculari sectione os uniuersum obducatur. His alia per nasi longitudinem addetur sectio: & si prius frontis musculosam comparam, & palpebræ musculos aggressus fueris, nulla præter has (nisi sub aure, ad medium usq; occipitiū) in facie est ducenda: aliàs enim ex summo narium, sub inferiori palpebra & aure, uersus occipitiū transuersam moliri deberes sectionem. Cæterum à fine sectionis ad pectoris usque os ductæ, transuersa una sub clauicula, & summo humero, & scapulæ spina ad dorsum usque perficietur. Licebit & his transuersam ex faucibus, seu ex gutturis regione, usque ad spīnam adiungere. His tentatis sectionibus, hamulo cutis leuabitur: ac in altero latere, acutiori nouacula, cutis à subiecto membraneo musculo, omni industria liberabitur. quod nullibi feceris molestiūs, quàm ubi laqueus ceruicem comprehendit: hic enim laquei occasione, cutis membraneo musculo pertinacissimè connata reperitur: & etiam cutis instar cornu adeò inibi mox indurescit, ut uix nouaculam admittat. Quanquam musculorum sectioni corpus opportunius adhibebitur, ex quo uenæ prius sectæ, uniuersum sanguinem in aquam calentem effuderint: quandoquidem tunc non toties uenæ sanguine inantæ, dum musculos diuidis, uenient colligandæ, atque adeò frequenter spongijs abstergendæ. Ex altero autem cadaueris latere, unà cum cute (quod factū facillimum est) musculum latum tenuemq; auferes: & utrinque musculi naturam, & fibras, nervosq; ac munia (si hinc inde suas, quas prius enarrauimus, partes attraxeris) intuebere. Fibrarum autem huius musculi feriem nequaquam ofcitabundus in tota humiliore inferioris maxillæ sede præteribis: quin prius eas strumarum, uel, ut uulgò dicimus, scrophularum gratia diligenter examinaueris, quo in eo abscessus genere, ferus usus expetet, felicius ac magis industrie tumētes glandulas exfeces. Administratio enim sectionis in hoc affectu extra fibrarum ductum tentata, admodū obscœnè hinc inde colli cutē aut tendit, aut corrugat. Vbi hæc igitur sedulò obseruaueris, eius lateris musculum, quem subditis corporibus adempta cute affixum reliquisti,

C 2 omni

musculorum  
epiogram.

Primi ac secundum  
duodecim  
precedentis Capitis  
musculorum  
administratio.

Corpus musculorum  
sectioni  
opportunum.



omni ex parte adimes, administrationemq; ad proprios laborum musculos conuerteres, qui in conspectum ueniunt, quamprimum adipem ademeris, qui his præcipue in buccarum regione incumbit, & unâ cum lato, qui ex carnea constituitur membrana, permiscetur musculo. Liberabis itaq; ab inferiori maxilla primum<sup>b</sup> duorum, qui inferiori labro elargiuntur capita, sensim ea ad infertionem usq; ut fibras examines, deducens. Atq; hîc labra fungosâ cuiusdam substantiæ interuentu, maxillæ ofsi connata reperies, quæ labris opitulatur, quoties distrahuntur, tenuesq; fiunt, & quoties contracta in crassantur, ac corrugantur. Quippe eiusmodi substantia omnino & inanitur, & repletur prompte: inanita quidem submittitur, repleta uerò attollitur. Præter hanc substantiam occurrunt &<sup>c</sup> nerui duo, maioris tertij paris neruorum cerebri radices ramuli, ex maxilla inferiori in eos quos iam dissecas, musculos diffusi. Cæterum posteaquam inferiores liberati fuerint, à malis<sup>c</sup> duos quoq; superiores dissecabis: illisq; ad superius usq; labrum deductis, quatuor musculorum functiones, capita huc illuc trahens, spectabis. Dein<sup>c</sup> musculo alæ nasi, & superiori labro communi, à malis derafo, ac ad alam usq; & labrum deducto, eius quoq; usum contemplantur. Hic uolens prætermitto<sup>c</sup> neruum, minoris gracilioris<sup>c</sup> uertertij paris neruorum cerebri radices propaginem, ex superiori maxilla excidentem, ac nuper dictis musculis comunicatum: siquidem neruorum omnium seriem, quam dabitur accuratissimè in quarto libro prosequar. Atq; eadem ratione hîc nullam neq; uenarum, neq; artieriarum mentionem facio, etiam si lato musculo<sup>b</sup> externa iugularis sit contermina, quum tertius liber uenis arterijsq; dedicabitur. Integrum itaq; est, ut consideres membranosa ligamina, narium alas cæteris nasi cartilaginibus colligatia, & deinde mutuam earum cartilaginum connexum. nam de narium<sup>c</sup> tunica, in neruorum distributione similiter pertractabitur. In præsentia autem suffecerit, adhuc sermoni adieciſſe, tunicam illam, quæ narium cavitatem ambit, aliquousq; cultello à subditis partibus abradendam esse, ut commodè tenuem membranæumq; musculum, intrò alam mouentem, intuearis. His omnibus reſectis, secundus alterius lateris enarratus mihi<sup>c</sup> musculus, externa ipsius superficie spectatissimus est. Vt tamē ipsius naturam quoq; examusſim obſerues, undecunq; unguibus hamulisq; est diuellendus: ac postmodum à maxillis & dentium gingiuis deraſus, à tunica, oris cavitatem oblinente, quoad fieri poteſt commodè, uenit liberandus. Et quo huius musculi rarior, magisq; admiranda est cōſtructio, fibrarumq; mirabilior implexus, eo studioſius illum in multas particulas non mediocri delectatione diſcerpes: & ad buccarum motum, non uerò maxillæ inferioris, illum auxiliari ſpeculaberis.

DE MUSCULIS INFERIOREM MAXILLAM MOVENTIBUS. Caput xv.

Inferiorem maxillam, ſuperiore quieſcente, moueri.



INFERIOR<sup>a</sup> maxilla homini, quieſcente interim immotaq; ſuperiore, motu agitur uoluntario: quemadmodum animalibus ad unum omnibus, ſi fluuiatilem crocodilum exceperis, cui unico ſuperior maxilla mobilis uiſitur, inferiore interim cum temporum ofſibus adeo unita, ut ne tantillum quidem moueri queat, ipſaque duos ſinus nanciscatur, quibus ſuperior ſingulis utrinq; capitulis latis, nec<sup>b</sup> noſtris admodum diſſimilibus inarticulatur, magna ex parte lacertarum teſtudinumq; inferiori maxillæ reſpondens: quemadmodū etiam totus crocodilus

a figure ca. 10 lib. 1.

b 1, 2 fig. cap. 10 lib. 1. A.

crocodilus imagine (non autem magnitudine, & geniculatis caudæ tuberibus) lacertæ similis uisitur. Hominis inferior maxilla ad superiorem, quum os claudimus, insigni ualidoq; admodum motu sursum ducitur, & deinde manducantibus prorsum ac retrorsum in lateraq; circumfertur: & deniq; quum os aperimus, nunc reftà, nunc paululum in alterutrum latus declinans, deorsum agitur. Complemus uerò hos maxillæ motus,<sup>e</sup> quatuor utrinq; musculis:

*Maxilla inferioris motus, quos actio complectitur musculi.*

quorum<sup>d</sup> unus, sui lateris tempus occupans, ac proinde temporalis ab omnibus nuncupatus, principium ducit<sup>f</sup> à uerticis & temporis & frontis ossibus, & offe cuneum imitante, & eo offe, quod minorem externum<sup>u</sup> ue sedis oculi angulum amplectitur, maxillæq; superioris ossium mihi primum habetur.<sup>i</sup> Instat tertiæ enim circuli partis musculus iste à uerticis ac frontis offe multo elatius enascitur, quàm<sup>e</sup> commissura squamæformis consistit: & hinc sensim crassescens, & carnosior redditus, arctatusq; in cavitatem inibi in capitis ossibus concinnè, magnaq; Naturæ industria, totius musculi gratia exculptam, & uallis pulchrè circumdatam, septamq; descendit, à temporis offe, & cuneum imitante, & frontis, & illo quod externum oculi sedis angulum efformat, toto suo incesu enatus. Quum uerò ad<sup>h</sup> iugale usq; os pertingit, admodumq; crassus (sed angustus interim) euasit, superiori quoq; iugalis ossis sedi adnascitur, musculo illi admodum<sup>e</sup> continuus, quem secundo loco enumeraturi, à iugali potissimum offe enasci docebimus. Vniuersum itaq; temporalis musculi corpus, ad iugale usq; os carneum est, & exteriori tantum sede, propter propriæ membranæ crassitiem, perquam liuidum: idq; potissimum ad exortus sui initium, & ipsius ad os iugale connexum. Vbi uerò acutum maxillæ inferioris<sup>i</sup> processum contingit, in breuem, quanquam insigniter ualidum, nerueumq; finit<sup>m</sup> tendinem, sua amplitudine processum amplectentem, illiq; ualidissimè insertum. Ad tendinem hunc omnes temporalis musculi fibræ, tanquam ex

*Primum alterius lateris musculi, seu tem poralis.*

e 4 musc.  
1. tab. C.  
a. 7. 6. 14.  
D. 7. 5. 14.  
H. 1.  
d. 4. tab. B.  
3. 5. 14. tab.  
A.  
e 3. 4. fig.  
cap. 6. lib. 1.  
R. 1. unde  
hæc offa  
petit.  
f 4. tab. A.  
B. C.  
g 3. 4. fig.  
cap. 6. lib. 1.  
1. F.  
h 3. tab. B.  
4. tab. D.  
i 4. tab. A.  
h 5. tab. C.

l 1. 2. fig.  
cap. 10. lib. 1.  
1. C. 7. 6.  
1. tab. B.  
m 6. tab. A.

n 11. tab. F.  
7. tab. F. 9.  
1. tab. F. 10.  
1. 2. 11. 14.  
2. 8. tab. A.

o 3. tab. A.  
3. 9. tab. C.  
5. tab. D.  
p 4. tab. D.  
supra A.

q 4. tab. D.

tribus circuli partibus, ad suum centrum procurrunt: tendinemq; hunc effor mant illorum musculorum ritu,<sup>n</sup> quos gibbum & cauum scapulæ implere au dies, & qui ex ilium offe pronati, femoris motibus famulantur. ita profectò, ut satis mirari nequeam, quid<sup>i</sup> nam peculiare illud sit, tãtopere in temporali musculo à Galeno decantatum. Neq; satis assequor, quamobrem is Naturam tot laudibus efferat, quasi hic magno singulariq; artificio ab aliortū musculorum forma declinasset, tendinem educens non ex musculi extremo, ut aliàs semper, sed ex musculi medio: quum ego in tēdinis productione hic nihil rarum, ac à commemoratis musculis sanè quàmplurimis diuersum reperiā. adeò, ut non mirer, Galenum secus de tēporali musculo in quarto de Administrandis sectionibus libro (dum iam sectionum esset peritior) sermonem, quàm in undecimo de Partium usu instituisse. Quod uerò temporalis musculi sit munus, tum opportunè explicabitur, ubi duos adhuc musculos orationi adiecerò.<sup>o</sup> Secundus itaq; hoc Capite commemorandorum, ille est musculus, quem ad posteriorem maxillæ inferioris sedem, sub offe<sup>f</sup> iugali possumus manu amplecti. Dum enim pollicem inter auris radicem & inferiorem maxillam inferis, medium uerò digitum genæ admoues, illumq; quasi in oris amplitudinem protrudere tentas, totam præsentis musculi extemam superficiem contines. quam denuò tactu dignosces, si mutuò adductas prius maxillas, adhuc ualidius comprimere adnitus fueris: quia tunc musculus ille in se magis collectus, pollicem & indicem feriet, sese dilatans & cōtrahens. Præterea & hunc quoq; musculum in equis uides spectatissimum: is enim cum<sup>a</sup> illo quem tertium in uniuersa serie statuemus, ij sunt musculi, quos crebrò in equis amplectimur,

*Lib. 11. de r. p. partium.*

*Secundus, seu masseter.*

obseruatur, num carneus aut nerueus nobis equus proponatur, & num is fauces mollibus laxisq; glandulis oppletas infarctasq; habeat. <sup>r 4 tab. E.</sup> Nascitur itaque secundus hic musculus nerueo & amplo ualidissimoque principio, ab ea malorum sede, qua infima pars futuræ illius consistit, quæ maxillæ superioris os, totum minorem oculi sedis angulum occupans, <sup>s 1 fi. cap. 9 lib. 1. a. t. cinglem fig. r.</sup> mediamq; osis iugalis portionem educens, maximo eiusdem maxillæ osi coniungit: quod dentium superiorum præsepeola continere, ac nariū amplitudinem magna ex parte constituere, superior liber edocuit. Deinde hoc musculi principium à malis in posteriora ducitur, è tota inferiori interioriq; osis iugalis sede ad aurem usq; pronatum. Ut uerò id in malis impenſe nerueum esse dicebam, ita quoq; ubi ab inferiore exterioris iugalis osis superficie parte prodit, nerueū liuidumq; conspicitur: <sup>u. 315 fig. cap. 6 lib. 1. v.</sup> ubi autem ab interiore iugalis osis sede originem ducit, ac magna amplitudine inibi consistenti, tendinemq; suum producenti musculo temporali adnascitur, carneum est. Musculus hoc enatus principio, deorsum tendit, totamq; inferioris maxillæ amplitudinem, in externa posterioriq; ipsius sede conspicuam amplectitur, illi ualidissimè partim carneus, partim nerueus latissima infertione implantatus. Ex tota autem infertionis amplitudine, nulla insignior, nullaq; ualidior est ea quam musculus molitur in <sup>x 1 fi. cap. 9 lib. 1. a. 2 4 tab. ab E ad F d.</sup> asperitatem, in infima maxillæ inferioris sede uelut processulus aliquot extuberantem: <sup>b 4 tab. G.</sup> ubi musculus etiam est angustissimus, & obtusio rem trianguli alicuius angulum quodammodo exprimit. Totus enim quadantenus triangularis est. una namq; ipsius linea secundum totam principij amplitudinem porrigitur: secunda à malis, seu anteriori principij parte, ad infimā maxillæ inferioris sedem retrorsum ducitur, illam quam nuper diximus maxillæ asperitatem contingens: tertia linea, ab aure, seu posteriore principij sede, in anteriora deorsum ad demissionem secundæ lineæ sedem fertur, angulum cum illa linea tam obtusum constituens, ut ferè hic musculo aliud latius possit ascribi. Vt cunq; uerò sit, obtusus hic angulus, seu, si modò ita uelis, quartum hoc musculi latius, multo strictius est amplo illius principio. unde etiam ilico fibrarū ipsius quoq; ductum uariare necesse est. Fibræ enim ab anteriore principij parte originem sumentes, deorsum in posteriora feruntur: <sup>c 4 tab. ab E ad G. f 4 tab. ab F ad G.</sup> quæ autem à posteriore principij sede prodeunt, obliquè deorsum in anteriora repunt, omnes ex amplo principio ad obtusum quem recensui angulum protensa, maxillæq; inferioris amplitudini citra tendinis educationem insertæ. Galenus hunc tantum maxillam mouentium musculū, masseterem seu mansorium undecūq; appellauit: quumq; in quarto de Administrandis sectionibus libro illum describit, satis uidetur innuere, quosdam fuisse Anatomicos, qui duos masseteres in uno latere enumerarunt, fibrarū præsentis musculi ductui & lato principio (ut ipse cenſet) animum adhibentes. & dein alios extitisse quodammodo insinuat, qui tres masseteres utrinq; recensuerūt, musculi huius principijs & infertionibus attendentes: perinde ac si singulos musculi angulos, unius musculi loco, præter omnē sanè rationem, enumerassent. Verū mihi musculus iste unius tantum loco, quouis tandem pacto habetur: arbitrorq; eos qui duos masseteres statuerunt (in quorum classe fuit Hippocrates) <sup>g 4 tab. A. h 4 tab. r. i 6 tab. D.</sup> unum quidem masseterem commemorasse præsentem musculum: alterum uerò masseterem, ipsum <sup>k 4 tab. A. l 4 tab. r. m 6 tab. D.</sup> temporalem, cum eo quem in ore delitescentem, temporaliq; admodum continuum esse, ac insuper ad manducandum apprimè etiam cōducere audies. Atq; quum alij hunc à temporali numero disungerent, <sup>k</sup> tres masseteres constituerunt, quod mordētibus manducatibusq; omnes tres (uti mox dicemus) suppetias ferant. quantumuis



quantumuis ego interim, dictionis fugiens æquiuocum, secundum maxillam mouentium musculum, masseterem passim cum Galeno appellauerim. <sup>1</sup> Tertius itaq; musculus principium perquam neruofum assumit, ex tota cauitate sinu<sup>a</sup> ue osis cuneum referentis<sup>m</sup> processuum, qui uespertilionum alis comparati, unà cum eorundem sinu in hoc extruuntur, ut musculi huius principium concinnè ambiant, idq; ab ipsis opportunè enascatur. Cæterum ilico atq; nerueum illud principium dictorum iam processuum cauitatem sinum<sup>a</sup> ue egreditur, ipsum carneus, amplus & crassus efficitur musculus, internæ temporalis musculi parti iuxta sui tendinis productionem insertionemq; admodum connatus, & magna ex parte masseteri, seu secundo maxillam mouenti musculo similis, itaq; in internam posterioremq; maxillæ sedem ampla & lata, impenseq; etiam neruea insertionem implantatus, atq; ille in externam maxillæ sedem figitur. Vt uerò tertius hic musculus sua crassitie oris spaciū faucesq; minus occuparet, maxillæ (uti & in primo libro explicuimus) amplus patensq;<sup>a</sup> sinus inculpitur, in quem musculus commodè reponatur, magnaq; sui portione latitet. Tribus his musculis, cum suis in altero latere coniugibus, primario conceditur, ut maxillam inferiorem nobis mordētib; simul sursum ducant & contrahant. nulli enim priuatim id munus commissum existimo: et si fortè temporalis & masseter, utpote grandiores, amplioresq;, ualidius quàm tertius id præstent. Quàm uerò musculi isti hoc munus alacriter ualideq; compleant, et si in omnibus hominibus ferè sit obuium, histriones tamen permultū id liquidò attestāt, quorum quidam ferreos quosdā palos dentibus perinde ac manibus ferè tractant: quidam uerò maximas trabes, inferioribus tantum dentibus innitentes, miro robore sustinent. Vidimus namq; Patauij Tridentinum histrionem, mira articulorū tamen laxitate præditum, qui ferreum palum uiginti quinque librarum, dentibus à terra subleuatum, & aliquandiu in ore erectū, retrorsum à tergo punctum parieti iniecit, quem triginta pedum intervallo ab histrione destitisse, ipse metitus sum. Turcum insuper quendam, ut & Mantuanum, non admodum proceræ stature histrionem, à duobus adductam erectamq; uiris trabem, solis inferioribus dentibus suffulcisse, & aliquandiu gestasse, sæpius uidi, quum interim astantium pleriq; trabem à terra subleuare uix possent. Cæterum maxillæ uersus priora posterioraq; motum, quem manducantes potissimum obimus, secundis seu masseteribus præcipuè conficitur, idq; latorum suorum principiorum, ductusq; fibrarum gratia. Anterioribus enim principiorum partibus contractis, inferior maxilla prorsum ducitur, mentumq; in anteriora prominet. Posterioribus uerò principiorum sedibus in se collectis, retrorsum, ac uelut ad aures maxilla retrahitur: quamuis huic etiam motui temporales musculi latis principijs pronati, & in acutum uersus suas insertiones definentes, suppetias nonnihil ferre uideantur, prout has illas<sup>a</sup> ue suorum corporum fibras colligunt, aut remittunt. Insuper masseterum, & in ore delitescentium musculorum in primis opera, inferior maxilla in latera circūducitur: dextro enim massetere dum taxat, & sinistro in ore delitescente, simul contractis, maxilla in dextrum latus agitur: à sinistro autem lateris massetere, & dextri lateris in ore delitescente, unà contractionem molientibus, inferior maxilla in sinistrum latus mordentibus manducantibusq; circumfertur. Enarrationi adhuc supersunt duo<sup>o</sup> musculi, utrinq; singuli & graciles & oblongi, originem ducentes ex prominentibus ossium temporum processibus, qui scriptorij styli imaginem referunt. Hinc membraneo latiusculo; capite exorti, statim carnosī teretesq; fiunt: ac uersus priora maxillæ, ubi sum-

*Tertium musculus, qui in ore latet.*

*Descriptorum huius musculi nomen.*

*Alterius lateris maxillam mouentium quatuor, aut omnium 7 & 8.*

16 tab. D.

15 ff. cap. 6 lib. 2 P. dicitur char. 2, 3, 4, 5.

15 ff. cap. 10 lib. 2 D.

o Altrius lateris musculi notatur in 5 ff. H. 1. 4 tab. O. 6 tab. 1. P. 3. 4. 5 ff. cap. 6 lib. 2.



circuli partium instar exoriri dicebatur, undecunq; cultello proximè ab ossè abrades, quousq; totum musculus à capitis & maxillæ superioris ossibus ademeris. Iam temporali musculo deorsum & extrorsum reflexo, intuebere nervo ossissimum ipsius tendinem, acutum maxillæ inferioris processum amplexantem. deinceps qui is musculus in ore delitescenti, & masseteri committatur, spectabis. postremò, si aperto ore, musculi temporalis initia sursum trahere non detrectaueris, ipsius quoque munus promptè condisces. Nunc integrum est, masseterem à iugali ossè & malis liberatum, ab humiliori maxilla similiter cultello deradere, atque illius insertionem munusq; non oscitanter perpendere.<sup>d</sup> Musculus in ore delitescens ad amussim, non nisi inferiori maxilla in mentiregione per medium dissecta, administrare poteris: ac proinde grandiori cultro operi adhibito, ipsam à summo mento auspicatus, per medium dentium incisivum divides: illamq; manibus apprehendens, ut utraq; ipsius partem in latera reflectes, & à temporis ossis illi insculpto<sup>c</sup> sinu luxabis. Mox circa maxillæ extrema, oris tunicam à subditis sibi corporibus, cutis instar separabis, quousq; musculus in ore reconditus sese omni ex parte offerat: quem, si uisum fuerit, aut ossibus commissum relinques, aut ab ipsis dera sum abijcies, ipsius quoq; functionem non oscitanter expendens.<sup>e</sup> Musculus maxillam deorsum trahentem, inferiori sedi maxillæ secundum ipsius longitudinè exporrectum, & maxillæ in interna summi menti sede insertum, modò reperies: quum is nulla peculiari opus habeat administratione, musculo massetere iam cu<sup>e</sup> glandulis & uenis & arterijs, quæ auribus subijciuntur, resectis. Quanquam alteram quarti huius musculi, suiq; coniugis, perinde ac tertiorum, seu in ore delitescentium musculorū sectionem, & officij muneris<sup>f</sup> ue eorundem examen, tum demum opportunius aggredieris, quum linguæ & ossis u referentis & la ryngis musculos percrutaberis.

DE MUSCULIS OSSI U REFERENTI  
commissis. Caput XVII.

4 tota 4, 2  
fig. cap. 15  
lib. 1. cap. 1  
fig. cap. 1  
lib. 2. A.



S<sup>a</sup> u referens, in faucibus superiori laryngis sedi prælocari, & radici linguæ fundamētū uice, super quod moueri eam oporteat, & plurium musculorum uelut anchoram esse, iam antea diximus. Ex musculis uerò qui ossi committuntur, alij quidē ipsi sunt proprij, & solius sui gratia constructi, qui omnes ab alijs ossibus principium sumentes, ossi u simili inseruntur: alij autem ex ossè hoc procedentes, alijs organisi famulantur. Qui igitur ossi ipsi peculiare proprij<sup>g</sup> sunt, potissimum præstare credūtur, ne os non admodum stabili firmatum basi, hinc inde ad latera, uel sursum aut deorsum, uel prorsum aut retrorsum præter rationē conuellatur. Sunt porrò hi ad minimū numerum redacti septem, ad maximum autem octo, utrinq; nimirum quatuor, ut uniuersi quatuor constituant paria.

delitescens ossi u referenti commissi, partim ipsi, partim alijs subseruiunt partibus.

6 4 tab. D.  
T. 1. tab. C.  
2 tab. F.

Primus cæteris ualidior & crassior, bifidus aut geminus est, scutiformi laryngis cartilagini, & asperæ arteriæ in collo exporrectus. Lato namque & carneo principio ex eminentiori pectoris ossis sede, ad partem magis internam exoritur: rectaq; sursum tensus, ac parem semper ipsi origini latitudinem seruans, in<sup>e</sup> anteriorem ossis u referentis sedem inseritur, carnoso innexu totam amplitudinem medij ossiculi, cui ossis u referētis latera firmantur, apprehendens. Huic musculo secundum ipsius longitudinem in medio linea incisa est, cuius occasione, ex duobus, dextro uidelicet & sinistro musculis cōstare, non ineptè dicitur:

ipsi proprios primū par, seu alterius lateris u.

c consule  
fig. cap. 15  
lib. 1. cap. 1  
lib. 2. A.  
B. C. C.



dicitur: ac duorum musculorum, seu unius paris uice enumeratur, qui os *v* referens deorsum, si quando uiolentiùs à superioribus musculis sursum uellitur, retrahunt: & scutiformi cartilagini, & asperæ arteriæ, propugnaculi loco haberi possunt.<sup>a</sup> Tertius & quartus, utrinq; nimirum unus, his duobus opponuntur: & ampli, breues, ac omni ex parte carni, à maxilla inferiori, sub summo mento interiùs enascuntur: hincq; descendentes, ac admodum modicè arctiores reddit, *v* referenti osi duobus primis contermini inferuntur, eandè prorsus insertionis latitudinem in anteriori osis sede cum illis obtinentes. Ac proinde hi os sursum, opposito duorum inferiorum motu, deinde & modicè in exteriora protrahunt: quemadmodum & illi quoq; in exteriora os perquam obscurè promouent.<sup>b</sup> Quintus ac sextus, ab utroq; uidelicet latere singuli, admodum graciles teretesq; sunt musculi, qui à<sup>c</sup> processum, stylum & galli calcaria referentium, radicibus explantati, *v* referenti osi ad latus amplitudinis inferuntur, quam primi quatuor musculi occuparunt. est autem hæc regio, ubi osis latera cum medio osiculo coeunt. Musculi hi toto ductu illis exterioribus attenduntur, quos maxillam inferiorem deorsum trahere retuli: qui etiam ab eisdem stylum imitantibus processibus, sed paulo humilioribus, quàm hi osis *v* referentis musculi, exoriuntur: quibus ne os aut in dextrum, aut in sinistrum reuellatur, prohibendi munus concreditum est, & præterea illud quoq; sursum nonnihil, introrsumq; cōtrahunt. At<sup>d</sup> septimus & octauus præsentis osis musculi, utrinq; etiam singuli, graciles longiq; uisuntur: nullus enim uniuersi corporis his simul & gracilior & longior occurrit. Deinde uterq; enervationem quandam, perinde ac musculi maxillam deorsum trahentes, priuatim uendicat: in medio namq; ipsius ductu carneus esse definit, tendinis aliquouiscq; naturam ostendens, à qua denuò carnis euadit, itaq; duos ueluti uentres nanciscitur. Principium etenim carneum, ex elatiori scapulæ costâ, iuxta ipsius ceruicem, & processus anchoram imitantis<sup>e</sup> radicem obtinet: & sub<sup>f</sup> musculo scapulam attollentium primo occultatus, sursum obliquè protenditur, sub musculo à pectoris ossè & clauicula in mamillarem capitis processum inferito, qui hunc osis *v* referentis musculum adeò comprimit, ut carnosus sub illo esse desinat, tendinisq; speciem ostendat, perinde ac si digniori illi caput mouenti musculo cederet, aut ipse durior factus, in cōtractione impetum incumbentis musculi faciliùs exolueret. Nam simul atq; illum superauit, rursus carneus apparet, quousq; in eam osis *v* referentis regionè implantetur, in<sup>g</sup> quam quintum aut sextum insertionem moliri dictum est. Galenus quarto de Administrandis sectionibus libro, istos quarti paris musculos scapulis proprios esse arbitratur, horum ope illas sursum ad guttur agi asserens. Quàm uerò id ueritati consonum sit, obseruari peroptarim: mihi enim osi *v* referenti, non uerò scapulis, proprii uidentur, nec quicquam his cum scapularum motu commune esse existimo. Quippe minores sunt, minusq; firma (quum *v* referenti osi committantur) basi stabilitur, quàm qui scapulas (quibus brachia, cubiti & manus appendent) attollere obliquo motu possint. Deinde substantia formaq; cæteris osis *v* referentis musculis, nequaquam autem scapularum motuum autoribus, respondent. Quod Veteres pulchrè norunt, ex quorum sententia Galenus in libro undecimo de Partium usu, hos musculos osi *v* referenti ascribit: licet rursus sui oblitus, in decimotertio de Partium usu, eosdem inter scapulæ motores commemoret, facilè in illis, ut & in alijs plerisq; scapulæ musculis, aberrans. Quinetiam os *v* referens his musculis omnino indiget, si demum id contrariomotu agi debuit illi, quem quintus & sextus musculi perficiunt.

Videntur

Secundus par.

Tertius par.

Quartus par.

Quartum par.  
scapulari motibus non subseruire.d 5 tab. B.  
dein Q.  
e 4 tab. R.  
f tab. B. 2  
tab. E.f Confr.  
tabula B.  
cum, C.

g 4 tab. Q.

h 3, 4, 5 ff.  
cap. 6 lib.  
1 i.i 4 tab. O.  
f tab. H, I.k 5 tab. R.  
S. 4. lib. V.  
V. 1 tab. D.  
2 tab. H.l inter R.  
S 5 tab. G.m 1 ff. cap.  
24 lib. 1 F.  
n 4 tab. B.  
aut 9 tab. F.  
o 4 tab. B.

p 4 tab. P.

Videntur itaq; mihi postremo loco enumerati muscoli, deorsum ac utrinque ad latera os *v* referens detrahare. & nisi his illa concrederetur actio, os *v* referentis situs prorsus fallax esset. Adde, musculis his, ubi scapulæ cōmittuntur, neruulum applantari: nequaquam autem, ubi os *v* referenti inferūtur. Sunt igitur, mea quidem sententia, octo muscoli, solius os *v* referentis occasione efformati, in hoc scilicet, ne hinc inde ex sua sede id turbetur, fundamentumq; plus satis infirmum linguæ, & ipsi quoq; laryngi efficiatur. Cæterum musculi, quos huic os *v* non proprios esse dixi, ex ipso originem mutantur: horumq; quatuor laryngi, & alij linguæ porriguntur. Primi duo laryngem adeuntes, la-  
*q. 2. ramo i*  
*notatio fig.*  
*2. cap. 11*  
*lib. 4.*  
*r. 1. fig.*  
*21. F.*  
*s. 2. 3. fig.*  
*cap. 22. K.*  
*t. 2. fig. cap.*  
*17. lib. 1. D.*  
*u. 2. 7. fig.*  
*cap. 22. L.*  
*x. 1. 2. fig.*  
*cap. 19. H.*

*Musculi hyoidi  
 osi non pro-  
 prij.*


PROPRIORVM OSSI *v* REFERENTI MV-  
 sculorum administratio. Caput XVIIII.



OMMO DE horum musculorum sectionem admini-  
 straturus, ceruici (ut in posteriora pendente capite, ea ex-  
 porrigatur) trunculum aut oblongum lapidem subijcies:  
 & uenis, arterijs, ac glandulis, quæ in harum distributioni  
 bus locantur, utcunq; resectis, minoribus cultellis sectio-  
 nem auspicabere. Ac primum quidem ab inferiori maxil-  
 la, quæ adhuc integra est (nisi illam<sup>a</sup> musculi ipsam deor-  
 sum trahentis, &<sup>b</sup> eius qui in ore delitescens, maxillam attollit, occasione fre-  
 geris) obliquos & latos musculos, qui<sup>c</sup> tertij & quarti loco habebantur, dera-  
 des, eos usq; ad regionem, qua os *v* referenti implantantur, diffecans. Deinde  
*a. 5. tab. H.*  
*b. 6. tab. D.*  
*c. 4. tab. R.*  
*d. 4. tab. S.*  
*e. 5. tab. P.*  
*f. 4. tab. Q.*  
*g. 5. tab. Q.*  
*h. 5. tab. R.*  
*i. 9. tab. R.*  
*Δ.*  
*Secundi par.*  
*administriatio.*  
*Primi par.*  
*Tertij par.*  
*Quarti par.*

PRIMA DECIMIONI  
CAPITIS FIGURA

SECUNDA.



TERTIA FI-  
GURA.

TRIVM DECIMIONI CAPITIS FIGV-  
rarum, & earundem characterum Index.

PRIMA figura linguam, unà cum ipsius musculis, à reliquo corpore liberatam, ex dextro latere cernit, musculorum dextri lateris naturam ac situm, quam fieri licet, proximè exprimens.

Secunda figura eadem, quae prima, oculis subijcit: verum ut primi linguae musculi, ac item noni natura aliquo pacto hic magis, quam in prima conspiceretur, tertium & septimum linguae musculis sursum refleximus, quinto interim deorsum ab ipsius insertione propendente.

Tertia figura novem linguae musculis absiectos habet: ac lingua secundum longitudinem diuisa cernitur, linguae ligamento hic ab utriusque linguae corporibus dirempto, & corporum superficie, quae ligamento continuatur, hic apparente. Atque cum in modum hominis (ut semel dicam) linguae constructio est expressa, quo nobis hanc picturis assequi datum fuit.

A, A, A 1, 2, 3 Linguae portio, ante sectionem in hiante ore conspicua, & tunica adhuc obiecta, ipsi, ac toti ori, & stomacho, item & asperae arteriae communi.

B, B 1 Hac linea diste nuper tunica partem notat, secundum inferioris maxillae latera ab ore dissectam. Linguae enim portio supra lineam consistens, illa adhuc obteguitur tunica: quae autem sub linea cernitur pari, hic (uti etiam nunquam) illa tunica non succingitur.

C 1 Lam diste prius tunica portio, quam hic ab intimo palati unà cum lingua praefidimus.

D, D 1, 2



D, D 1, 2 Primus lingue musculus.

E 1, 2 Tertius lingue musculus.

F 1, 2 Quintus lingue musculus.

G 1, 2 Septimus lingue musculus.

H 1, 2 Nonus lingue musculus.

I, I 3 Lingue ligamentum, cui lingue corporum fibrae continuantur.

K, K 3 Dextri lingue corporis fibrarum species.

L, L 3 Sinistri lingue corporis fibrarum species. Verum hæc adeo confunduntur, inuicemq; permiscetur, ut visu, nedum pictura, eas queamus assequi.



INGVÆ moles ori exquisitè congruit, in omnè enim eius sedem commodè pertingit: quod sanè, si minor esset, ipsi negaretur, neque rursus præ oris angustia impeditur: quamuis tamen id facillimè contingit, si aliquando in magnitudinem præter naturam excreuerit. Quoniam uerò promptè ipsam nostro arbitratu, quocumq; agi conueniebat, hanc musculosam fieri summus rerù Opifex uoluit:

*Lingua magnitudinè instam esse, illamq; musculis egerere, quorum cognitio difficilis est.*

operæ preciumq; fuit, multos illi elargiri musculos, qui uariorum motuum auctores existerent. Cæterum qui, qualesq; & quot numero ipsam agant, cognitu est quàm difficillimum: adeo enim inuicem connectuntur, ipsorumq; fibræ mutuo tam uariè coeunt, ut iustum numerum formamq; musculorù, & motuum linguæ differentias cognoscere, non iniuria arduum censeatur. Imò linguæ constructionem hæcenus à nemine ad amulsim perspectam fuisse, neq; etiam ocys fore metuo: ita, ut fateri cogamur, eò Conditoris nostri in effingendo ex terra Adamo artem industriamq; processisse, ut tota hæc non inueniatur, quantumuis longo temporis spacio, idq; à uiris illustribus, fuerit indagata. Quousq; tamen in linguæ constructione Galenus eximium Naturæ miraculum artificiumq; perspexerit, minimè constat: ea siquidem libri de Admistrandis sectionibus pars, in qua linguæ musculos proculdubio recensuit, nobis unà cum libris de Musculorum refectione interijt. In libris autem de Partium usu, per transfennam, leuiterq; duntaxat de linguæ motu, absq; peculiari alicuius musculi enarratione meminit. Ego, quantum hæcenus assecutus sum, linguam rarum quippiam, ac peculiare præter cæteros musculos sortiri obseruo. Ad radicem enim, qua ampla lataq; est, ac ueluti stabilitur (uti suo fine, ut ad motum promptior existat, in obtusum mucronem definit, tenuisq; uisitur) proprios quosdam, ac suis fibris utcunq; distinctos obtinet musculos: & quorundam ipsorum fines illic terminantur, ubi lingua in longitudinem ferri incipit, cum sua radice quodammodo angulum illic constituens, ubi corpus, laryngem in ciborum uoratu obturans, sese offert. Alij eorum musculorum hic neuitquam cessant: sed mixti inuicè, raram corporis partem efformant, nempe duorum ueluti oblongorum musculorum concursum, qui ligamentum quoddam tenuissimum, membraneum, ac ad linguæ crassitudinem latum, in ipsorum medio plerunq; adipiscuntur. sic sanè, ut uniuersum linguæ corpus, ante sectionè nobis apparens, ex duobus illis musculosis corporibus, ligamento hoc, accurrentibus uenis, arterijs & nervis, ac binis hæc omnia integribus membranis conformetur: una quidem musculis omnibus communi, quæ est interior: altera autem eius tunicæ pars censeatur, quæ uniuersam oris amplitudinem succingit, & eadem continuaq; cum interna asperæ arteriæ ac stomachi tunica existit, priuatimq; tertij paris neruorum cerebri præcipuas portiones sibi uendicat, quarum etiam beneficio lingua gustatorum efficitur organum. Rarum uerò id, atque peculiare, quod duo hæc musculosa corpora obti-

*Quid lingua in musculis rarum obijerit.*

*Lingua pars ante sectionem conspicua, quibus constat partibus.*

D nere

42 fl. cap.  
21 L.

Hæc sicut  
tertia fig.  
fritiua  
proponit  
libris K,  
L, L, L, L,  
1.

62 fl. cap.  
2 lib. 4  
X, Y.

nere diximus, ad hunc quasi modum sese habet. Quum ceteri corporis muscu-  
li unicum ferè fibrarum genus, aut rectum scilicet, aut obliquum, aut transuer-  
sum duntaxat obtineant: hæc tamen corpora obliquas, transuerfas, rectasq; fi-  
bras simul adepta mihi uidentur, quæ inuicem ad eò coeunt, commisceturq;  
ut in his aliquod fibrarum genus sectione assequi propemodum sit impossibili.  
imò musculosa hæc corpora quippiam non absimile cordis<sup>c</sup> substantiæ, in  
ea fibrarum contrariarum commixtione adipiscuntur: quanquam non ad eò,  
atq; cor, solida constant substantia. Nam carnosæ fibræ in pinguioribus, & iam  
ætate prouectis animalibus, pinguedinem in lingua, spongiosum quid & fun-  
gosum exprimente, adnatam obtinent: & fibræ multo quoq; rariùs in lingua  
conferuntur, quàm in còpactissima cordis substantia. Atq; hæc uel inter eden-  
dum cuius euadunt perspicua, quàm scilicet à uulgaris musculorū carnis na-  
tura, formaq; & gustu, linguae pars, quā in delicijs habemus, uariet. Verùm ex  
quibus<sup>d</sup> nam musculis ea còformetur, ac unde musculi linguae, quos inter disse-

*Inter manife-  
stos lingua mu-  
sculos duo pri-  
mi.*

*Tertius &  
quartus.*

candum obseruauim, originem ducant, nunc opportunè subiicietur. Duo sunt  
recti, & impèse crassi, obscureq; ab inuicem, ac si plures duobus essent, aliquot  
locis discreti: qui ex media, superiori quæ<sup>e</sup> osis u referentis sede, carni, sed ut-  
cunq; fungosi, principium ducunt: ac secundum linguæ longitudinem pro-  
tensi, ipsius medio inferuntur, hancq; contracti rectà intrò, & uelut ad poste-  
riora uellunt. Tertius & quartus, ex<sup>f</sup> duobus superioribus osis u referentis  
osculis oriuntur: quæ ad ipsius latera haberi, ac ipsorum fine ad stylos usque  
imitantes capitis processus definere diximus. Quanquam etiam interdum hi  
musculi ab<sup>h</sup> humilioribus eius osis lateribus, quæ superioribus scutiformis  
cartilaginis processibus colligantur, principium sumant, tunc nimirum, quum  
superiora osis latera non planè ossa, cum ligamentorum natura aliquid com-  
mune adipiscuntur, quod potissimum in mulieribus obseruatur. Musculi igitur  
illinc exortum adepti, & oblique quodammodo procedentes, linguae la-  
teribus implantantur. Si horum alter, uno remisso laxatq; contrahatur, lin-  
gua, & potissimum sua radice, in latus deorsum uellitur: at si simul uterq; agat,  
lingua in neutrà partem inclinans, deorsum uersus interiora quoq; mouetur.

*Quintus &  
sextus.*

Quintus ac sextus, similiter carnosus, & utcunq; crassus, duobus nuper dictis op-  
ponuntur: ac à temporum ossium<sup>k</sup> processibus, qui styli acusq; imaginem re-  
ferunt, explantati, linguae ad nuper dictorum fines innascuntur. Hi, quoties  
ambo conuellantur, uersus interiora linguā sursum agunt: at si alter duntaxat  
in se colligatur, lingua sursum tracta, ad alterum latus inclinatur. Sunt &<sup>m</sup> alij  
duo, linguam ad inferiora còtrahentes, ad lateraq; inuoluentes: qui ex inferio-  
ris maxillæ lateribus, intus ad dentium molarium radicem utrinq; lato, & ut-  
cunq; mucoso principio enati, linguae, secundum ipsius longitudinē, usq; ad li-  
gamenti finem, quo faucibus illa colligatur, sese inferunt, non quidem prorsus  
in linguæ medium, sed<sup>n</sup> duorum, quos primos enumerauimus, musculorum  
latera. Horum altero tantum suas fibras colligente, conspicua ante sectionē lin-  
guæ pars, in contracti musculi latus còniuet: at utroq; laborante, pertinetur  
lingua faucibus recto motu adigitur. Post hos<sup>p</sup> carnea quædā moles ab<sup>q</sup> inter-  
na quoq; inferioris maxillæ sede, ex menti regione nascitur, ab illis præcipue  
processibus, ipsorumq; lateribus, qui inæqualiter in interna inferioris maxillæ  
ad summū mentum sede extuberant. Presens moles sursum retrorsumq; ad fau-  
ces ducta, in linguæ radicē, amplam infertionē molitur, quemadmodū etiam  
lato principio originē sumit. Hæc moles linguā ad mentū contrahere uidetur,  
nunc exquisitè ad labrorū medium, nunc autem ad latus, prout nimirum has  
illas<sup>r</sup> ue

*Septimus &  
octauus.*

*Nonus.*

*c u. fib. lib.*

*c lib.*

*d u. fig. D.D.*

*e figura cæ filis u. lib.*

*f sed præcipue a fi- gura D. et a fig. C.*

*g u. fig. cap. u. lib.*

*h u. fig. cap. u. lib.*

*i k.*

*l caruncle fig. B. E.*

*i u. a. fig. E.*

*k u. a. fig. E.*

*cap. 6 lib.*

*i i.*

*l u. a. fig. E.*

*m u. a. fig. G.*

*n u. a. fig. D. D.*

*p u. a. fig. H.*

*q u. a. fig. H.*

*r u. a. fig. H.*

illas' ue fibras laxat & intendit: fibræ enim ipsius, secundum totam illius amplitudinem, ab anteriori sede retrorsum rectâ ducuntur. Deinde musculus iste, præter fibras, uelut quasdam inscriptiones quoq; rectâ progredientes ita obtinet, ac si harum occasione plurium musculorû numero etiam habendus esset. Enarratos iam musculos, qui undiq; attensum habent adipem, inter dissecandum ad linguam porrigi cernimus, & horum plurimos circa ipsorû fines inui-<sup>259</sup>dem confundi, ac <sup>260</sup>duo musculos linguæ corpora constituere: quæ triplex fi-<sup>261</sup>brarum genus ad eod. cõfusum permixtumq; obtinent, ut fibras internoscere sit quàm difficillimû. Reliquarum tamen omnium obliquæ transuersæq; in corporum medio plurimæ reperiuntur, quæ mihi utrinq; in proprium linguæ<sup>262</sup> ligamentum longè tenuissimû, & membranæ non ablumile, tanquam in ipsorum firmamentû, hominibus, canibus & sumijs secus quàm bobus & ouibus propemodum, definire uidentur: rectæ uerò pauciores sese offerunt, omnes propemodum in externa illorum corporum superficie excurrētes. Transuersarum fibrarum beneficio, linguæ corpus ante sectionem apparens, in se contrahi, in crassariq; & rursus egeri tenuariq; arbitror: id enim in ligamentum fibrarum insertio tibi dissecanti utcunq; cõmonstrabit. Rectis autem fibris, lingua in senicirculum, ad palatum faucesq; cõuolui spectatur: prout nimirum aut superiores, aut inferiores collectæ fuerint. Porro obliquis fibris in latera linguam agi omnino coniector, sic sanè, ut alij interim musculi linguæ moueant radicem: alij uerò linguæ corpus, ante confectionē in hiante ore conspicuum. Ligamentû uerò, cui fibræ firmantur, linguæ ossis uice datum est. Haud enim decuisset, linguæ secundum ipsius longitudinem os, aut cartilaginem, quantum uis etiam in exiguas diuisam uertebras, innasci, quum tam uarijs diuersisq; motibus inter mandendum loquendumq; moueri linguam oportuerit, ipsaq; interim nullum corpus suffulciat, ac quouis etiâ serpente agilior fluctuoliorq; esse debeat. Atq; hæc sanè ita trado, ut mihi occurrerunt: lubens, si quid sese notius ueriusq; mihi offerret, id impertiturus. Porro<sup>263</sup> neruos a septimo præcipue pari neruorum cerebri, & a sexto, linguæ musculi motus principium præbentes, de industria, ut & cæteros neruos, in quartum librum reijcio: & hiccirco etiam hic, nisi de ligamento linguam faucibus colligante, paucissima recensenda supersunt. Est autem id quod ad palatû, reflexa lingua, apertorq; ore, sub ipsa conspicitur, magni usus gratia efformatum. Nisi enim id esset ligamentum, lingua nimium aliquando retrorsum in se colligeretur, nec facile exerta intrò tra heretur: præterea neq; sedem obtineret stabilem & tutam, ut quæ undiq; esset soluta. Vtroq; enim munere ligamentum fungi, ex artis operibus experimur, quoties id præscindimus, aut propter nimiam humiditatē laxum reliccamus.

LINGVÆ MUSCULORVM ADMINISTRATIO. Caput xx.



**M**USCULORVM linguæ sectio, cum hætenus commemoratorum in ore musculorum sectione communis erit. Deducta igitur, quantum licet, utraq; maxilla, & oris tunica, cutis modo à subditis organis, quàm licet exquisitissimè cultello undecunq; detracta, omnium primi secabuntur<sup>264</sup> obliqui, quorum principiu à processibus stylum imitantibus uenit liberandû. Iam hos ad linguæ radicem<sup>265</sup> studiose secutus, eam<sup>266</sup> carneam molem, quam nono loco recensui, ab inferiori maxilla liberabis: atq; quàm poteris accuratissimè, ipsius inscriptiones, & ipsi



Septimi &  
octoni.

Tertij &  
quarti.  
Primi &  
secundi.

Reliqui lingua  
corporis admi-  
nistratio.

immixtum adipem, deinde illius etiam exortus & implatationis latitudinem spectabis. Atq; hæc perfeceris promptissimè, si modò ad dentiũ incisiorum radicem, & sub mento uicissim sectionem tentaueris. Mox post hos aggredieris, qui ab internæ maxillæ sedis lateribus enascuntur, & linguam ad latera movent. Post hos autem, aliorum<sup>e</sup> duorum obliquorum, ab ossis *v* referentis lateribus originem ducentium, principia liberabis. Postremò autem illi ab osse *v* referente adimentur, quos primos recensuimus, quicq; maximam linguæ radicis partem constituere uidebuntur. In huiusmodi administratione, exiguum cultellum liberandis musculorum capitibus operi accommodabis: ad reliquam uerò separationem, buxum cultellum, quòd mucosi admodum sunt musculi, adhibere, nihil prohibet. Cæterum linguæ reliquũ corpus ad hunc modum aggredi consulo. Ante omnia id ambiens crassior membrana, toti communis ori deradetur: firmius enim connascitur, quàm ut citra coctionem, cutis modo à lingua auferri possit. Deinde illa membrana, quæ musculis omnibus est communis, quamq; frustra separare contenderes, relicta, sectio ad linguæ medium, super id quod diximus<sup>8</sup> ligamentum, & secundum linguæ longitudinem ducetur, non superficialis tantum, sed quæ ad medium usq; linguæ penetret, aut etiam uniuersam diuidat. Mox hamulis & cultellis, fibrarum corporis linguæ naturam sedulò inquire: ac qui fibræ ligamento committantur, eæq; inuicem uariant & commisceantur, perspicies.

d. coru-  
fig. G.  
e. coru-  
fig. E.  
f. coru-  
fig. D, D.

g. i. f. cap.  
19 h.

## DE LARYNGIS MUSCULIS.

Caput XXI.

PRIMA XXI.



II.

III.

IIII.

V.

CAP. FIG.



VI.

VII.

VIII.



IX.

X.

XI.

XII.

XIII.



TREDE.

## TREDECIM VIGESIMIPRIMI CAPITIS FIGURARUM, &amp; earundem characterum Index.

QVONIAM in integris musculorum tabulis, in presentis libri initio, seriatim positus, omnes laryngis musculi oculis subijci nequeerunt, non abs re fore putavi, in huius Capituli fronte priuatim laryngis musculos hac figurarum copia exhibere.

PRIMA figura, ossis v referentis, & hic suis musculis omnibus proprijs liberati anterior facies exprimitur, una cum anteriori laryngis, & asperæ arterie caudicis (qui in collo consistit) sede, nullo interim laryngis musculo reflecto. Qui vero musculi hic sint conspici, characterum index dilucide explicabit.

Secunda figura, eadem quæ prima ex dextro latere commonstrat. quanquam hic non tantum asperæ arterie caudicis portionem (quum id frustra factum fuisset) asseruauerimus: dein superiora ossis v referentis latera hinc etiam refecimus.

Tertia, secunda penitus respondet: nisi quòd hæc ex posteriori facie eadem quæ illa ex latere commonstrat. Verum & hic studio superiora ossis v referentis latera, perinde ac in prima, delineantur.

Quarta anteriorem laryngis sedem, cum portione caudicis asperæ arterie proponit, reflecto iam v referente osse, cum musculus ab illo & à pectoris osse laryngi oblati. Seruantur itaq; adhuc ex communibus laryngis musculis, quantum & sexus, ac dein musculi laryngis operculo proprij.

Quinta figura, à quarta sectionis ordine nihil uariat, sed eadem quæ quarta, ex sinistro latere eleganter spectanda offert.

Sexta laryngem, à reliquo asperæ arterie caudicis liberatam, ita à posteriori facie exprimit, ut neq; stomachi, neque communis alicuius musculi portionem adhuc reliquerim, interea tamen nulla laryngis cartilaginum sua sede dimota.

Septima laryngem ex dextro latere ita expressam continet, ut ipsius operculum iam reflectum sit, una cum musculus primæ cartilaginis secundam nectentibus. Dein prima cartilaginis in hoc latere inferior processus, à secunda liberatus est: ipsaq; prima antrosum, atq; à secunda sic reflexa occurrat, ut media primæ cartilaginis sedes, in posteriori regione nuda se spectandam offerat.

Octaua à septima in hoc differt, quòd hic reflectos musculos illorum quatuor, qui tertiam cartilaginem secundam nectunt, rescidimus, ipsaq; secunda cartilago magis detecta appareat.

Non a ab octaua in hoc uariat, quòd præter musculos nuper dictos, etiam quatuor musculorum tertiam secundam iungentium obliquos, & dein duos in tertia cartilaginis basi positos, abstulimus, seruatis dumtaxat cum tribus cartilaginibus illis musculis, qui tertiam primæ alligant.

Decima, ex anteriori laryngis sede se spectandam præbet, ablata iam prima cartilagine, & dumtaxat cum secunda & tertia apparentibus musculis, tertiam primæ committentibus.

Undecimam, ut & duos sequentes, ostendende laryngis lingue seu rimæ gratia delineauimus. Exprimitur itaq; hic larynx, à reliquo asperæ arterie trunco, & suis communibus musculis libera: atq; hæc, asseruato adhuc ipsius operculo, posteriori suæ sedi incumbit, superiorem faciem commonstrans.

Duodecima in hoc ab undecima differt, quòd hæc inferiorem laryngis sedem delineatam contineat.

Decimatercia hoc à duodecima habet uarium, quòd laryngis rimam, seu lingulam, magis coarctatam oculis sanè ue repræsentet. Ceterum characterum index erit eiusmodi.

A In prima, secunda & tertia figuris, v referens notatur os, non prorsus suis membranulis liberum.

B In prima, secunda & tertia, humilior ossis v referentis latus, superioris scutiformis cartilaginis alligatum pro-

C. cessus, qui C in secunda, tertia & quarta figuris indicatur.

D In prima & tertia, superior notatur ossis v referentis latus, à secunda figura inibi reflectu, ubi E ascriptu cernit. E.

F Musculus ab ossis v referentis inferiori sede enatus, ac humiliori primæ cartilaginis sedi insertus. In prima figura dexter & sinister est conspicuus, in secunda dexter dumtaxat.

G Musculus ex pectoris ossis summo, ad humiliorem primæ cartilaginis sedem deductus. Prima dextrum & sinistrum exprimit, at secunda dextri tantummodo portionem.

H Gula, seu stomachus, in secunda, tertia & quinta conspicuus.

I Musculus ex posteriori sede stomachi, primæ cartilaginis lateri insertus. Ac tertia dextrum & laeuum serè uniuersum ostendit, & potissimum utriusq; initium: secunda dextrum, & minimam sinistri portionem. Quanta uero sinistri infertionem exprimit, ut etiam prima & quarta utriusq; infertionem proponit.

K Duo musculi, ab osse v referente enati, ac in laryngis operculi radicem inserti. Hi occurrunt in secunda figura, & tertia, & quarta.

L Laryngis operculum, in secunda figura, & dein in 3, 4, 5, 6, & 11 conspicuum.

M Glandula, laryngis radici ad asperæ arterie latera adnexa, in 2, 3, 4 & 5.

N Musculus à prima cartilagine ad secundam protensus, exterior ue primam cartilaginem secundæ iungentium.

Dextri musculi & sinistri pars in prima uidetur, utraq; autem integer in quarta.

O *Musculus a secunda cartilagine in primam protensus, alterius uel lateris interior secundam cartilaginem primam connectentium. In quinta solus sinister exprimitur.*

P *Musculus ab infima secunda cartilaginis sede, posteriori in parte principium ducens, & tertia cartilagini inferius. Sexta dextrum & sinistrum ostendit, septima dextrum, & quodammodo sinistrum.*

Q *Sedes iam dictæ, ac P insignitis musculi, in octaua & nona.*

R *Musculus a latere secunde cartilaginis, in tertiam cartilaginem inferius. Septima & octaua dextrum duntaxat ostendunt.*

S *Sinus secunde cartilaginis, in octaua & nona notatur, cui inferior primæ cartilaginis processus, T in octaua & T. nona insignitus, connascitur.*

U *Alter musculi duorum in tertia cartilaginis basi locatorum. Sexta utriusq; lateris musculum repræsentat, septima dextrum, & sinistri portiunculam, octaua etiam dextrum.*

X *In nona figura sinus indicatur, cui musculus insidet, tertia cartilaginis basin in altero latere occupans, ac U iam expressus.*

a *Musculus ex tota primæ cartilaginis longitudine enatus, ac tertia inferius, aut musculus primæ cartilagini tertiā copulans. Decima dextrum a insignitum, & sinistrum b notatum indicat, ablata interim primæ cartilagine. Septima uero, octaua & nona, integrum dextri lateris musculum a indicatum expriment, & elatorem sinistri sedem, quam ob hoc quoq; b litera in illis figuris notauit.*

c *Lingula, seu rima, in medio laryngis obuia, superior sedes, in decima figura conspicitur.*

d *Inferior facies lingule, quam in decimatertia magis, quam duodecima apertam expressimus.*

e, e *Duo sinus, utriusq; unus, qui clausa lingula, seu rima, in humiliori ipsius sede ad latera euadunt cōspici, in duodecima & decimatertia.*

f *Callus in medio rime laryngis apparet, ubi ipsa potissimum conuiet, in decimatertia exprimitur.*

g *Ne fortasse aliquid obcurtatis cartilagine lateris non insignitæ adferant, illas quoq; notabimus. g itaq; prima est cartilago, in anteriori parte se offerens, in prima figura, dein in 2, 4, 5, 12, 13.*

h *Prima cartilago, in tertia figura, & 6, 7, 8, 9, posteriori facie se offerens.*

i *Secunda cartilago, anteriori facie conspicua, in prima, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13.*

k *Secunda cartilago posteriori facie spectatur, in sexta, 7, 8, 9, 11, 12, 13.*

l *Tertia cartilago occurrit in secunda, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11.*



RES laryngis<sup>a</sup> cartilagine libro superiore descripsi, tertiam cartilaginem, etiam si<sup>b</sup> gemina sit, ne aliorum diffinitionis professorū placita nimium in terturbarētur, unius loco enumerans. Præterea his cartilaginibus<sup>c</sup> corpus simili-  
liter cartilaginofum, sed adiposæ membranæq; substantiæ etiam compos, incumbere retuli, quod ἀργωτῆς nuncupatur.<sup>d</sup> Γλωττιδα<sup>e</sup> enim, corpus quoddam, aut potius laryngis sedem, in medio ipsius locatam esse recensui, rimulæ seu fissuræ lingu-  
larum, quibus tibiæ inflatur, perquam similem. Nunc itaq; laryngis persequar  
musculos. Quum enim hæc ex pluribus cartilaginibus, ut aptè clauderetur, ape-  
rreturq; cōstruitur: quumq; spiritus retentionis, & uocis item occasione, mo-  
tu eam agi oportet uoluntario, iurè musculos cartilaginum motores Natura  
ipsi communicauit: quorum quidam & exortibus & insertionibus, solis com-  
mittuntur cartilaginibus, proprijs; idcirco laryngis appellantur: alij autem, ab  
alijs partibus enati, laryngis cartilaginibus, ipsiusq; operculo inferuntur, ob id  
communes ferè nuncupati.<sup>f</sup> Proprios humana larynx duodecim nanciscitur:  
horumq; quatuor primam cartilaginem secundæ iungunt, quatuor tertiam  
secundæ connectunt, duo tertiam primæ copulant, & duo in basi tertiæ carti-  
laginis sedem habent. Communes autem octo numeramus: sex quidem pri-  
mæ cartilagini, duos aut laryngis operculo infernos. Cuiusmodi uero omnes  
sint, iam ordine prosequar, à proprijs sumpto sermonis initio. Quatuor itaque  
primam secundæ iungentium, ad inferiora laryngis utriusq; duo habentur, in  
priori

Duodecim pro-  
prios esse laryn-  
gis musculos,  
communes octo.

Proprium 1,  
2, 3, 4.

a Specta-  
de sunt fig.  
ca. 35 lib. 1.  
b 5, 10, 11  
fig. cap. 38  
lib. 1. R. S.  
c tota 12, 13  
fig. cap. 38  
lib. 1.  
d Conspici-  
tur in 14,  
15, 16 fig.

e Penlo  
pōsi singu-  
li scōrim  
adnotatus  
tur.

f 14 fig.  
unus N. ad  
ter s. fi. O.



priori parte ipsius, uersus latera locati. atq; hi breues sunt, sed lati, tenues, ac carnosius: unusq; alteri incumbit, ac ambo se inuicem fibris ad X literæ similitudinem intersecant. Exterior namq; ab inferiori primæ cartilaginis sede fibrarum originem ducit, quæ deorsum obliquè in priora procedentes, secundæ cartilaginis parti, priora laryngis spectanti, inferuntur. Interior huic subiectus, ac forma exteriori similis, à secundæ cartilaginis sede, quæ primæ subiicitur, originem ducit, primæ cartilaginis humiliori sedi implantatus, & fibris ex postica parte obliquè in anticam ascendētibus præditus. Quatuor isti muscoli, intercostalibus musculis apprimè respondētes, primam secundamq; cartilaginem inuicem adducunt, laryngis rimulam clausuri. Ad hunc sanè modum hos quatuor musculos locari, non infrequēter ostendi: aliquando tamen unicum duntaxat utrinq; reperi, ductum fibrarum<sup>a</sup> anterioris enarrati nobis muscoli seruātem, sed interim paulo crassiores. Præterea, quum alterū duntaxat adesse obseruauimus, non semel, idq; præcipuè in uiris, duos graciles, sed carneos animaduerti musculos: qui ex media lon-



Presens figura, sexta huius Capituli frontis præpositæ omni ex parte correptæ: nisi quod hac priuatum musculos spectandos exhibet, quos à secundæ cartilaginis spina, ad inferiores primæ cartilaginis processum aliquando deductos uidi. A itaq; & A prima laryngis notatur cartilago, B uerò spina secundæ cartilaginis. C autem & D duo muscoli, à secundæ cartilaginis spina principium sumētes, ac in primam cartilaginem inserti.

g 6 tab. V.  
X sed potius confer  
t tabula D  
cum E.  
h; fig. N.  
i 8 fig. cap.  
38 lib. 1. M.  
h 3, 4, 5 fig.  
cap. 38 lib.  
1. C, D.  
l 6, 7 fig. R.  
m 8 fig. cap.  
38 lib. 1. L.  
n P, Q, 6,  
7 fig. cap.  
38 lib. 1. C.  
miliuntur  
V & X fig.  
gure 10 &  
11 eiusdem  
cap.  
o 7, 8 fig.  
R.  
p 8, 9 fig.  
T ad Q.  
q 8, 9 fig.  
Q & 8 fig.  
cap. 38 lib.  
1. A.  
r 8 fig. cap.  
38 lib. 1. M.  
s 7, 8, 9, 10  
fig. unus a.  
alter b.  
t 4 fig. cap.  
38 lib. 1. G.  
H.  
u 9, 10 fig.  
cap. 38 lib.  
1. Y, Y.  
gitudine<sup>1</sup> spinæ secundæ cartilaginis enati, ac tandem deorsum obliquè ducti, in inferiores primæ cartilaginis<sup>2</sup> processum insertionem moliebantur. atq; hi manifestò primam quoq; cartilaginem secundæ propinquius accommodabant, rimulam laryngis hac functione arctantes. Quatuor uerò musculorum, secundæ cartilaginis tertiam cōmittentium, duo quoq; utrinq; habentur: ac unus quidem exactè in tota sui lateris posteriori secundæ cartilaginis sede, secundum ipsius longitudinē, qua stomachum spectat, locatur: & carneo principio ab infima secundæ cartilaginis<sup>3</sup> parte enatus, ac deinde rectà sursum procedens, tantisper latefcit, donec tertiæ cartilaginis radici, qua secundæ coarticularatur, ut cunq; neruofus implantetur.<sup>4</sup> Alter musculus, nunc dicto cōtiguus, & omnino carneus, à secundæ cartilaginis sede enascitur, quæ primæ cartilaginis internam regionem respicit, primæq; inferiorem processum<sup>5</sup> admittit. Ex hac itaq; sede præsens musculus, carnosum latumq; ducens principium, ac sursum obliquè protensus, tertiæ cartilagini inseritur, totam sui lateris tertiæ cartilaginis radicis sedem occupās, à priori ac recto musculo non amplexam. Hi quatuor tertiam cartilaginé ad exteriora laryngis retrorsum euertunt, lingulam, aut ipsam, si uoles, laryngem aperientes. Ac duo quidem primi, posteriorem cartilaginis secundæ sedem (quæ horum gratia utrinq; secundum longitudinem<sup>6</sup> exculpitur, & in medio acuta ueluti linea, ac dorsi quodammodo spina, prominet) occupantes, recto motu id præstant: reliqui autem, ut obliquo situ præditi sunt, ita quoq; tertiam cartilaginem in posteriora obliquè reuellunt.<sup>7</sup> Nonus & decimus, qui tertiam primæ copulant, etiam utrinq; singuli sunt lati & carnei: enascuntur autem inuicem cōtinui, ex<sup>8</sup> media primæ cartilaginis sede, secundum totam ipsius internæ sedis longitudinē. Dexter (idem de sinistro subaudi) uelut triplex sui principium ostendit, propter quasdam ipsius inscriptiones, ad id impressas, ut harum occasione triplex musculus esse uideatur, à principio obliquè sursum ascendens, & dextræ tertiæ cartilaginis partis anteriori sedi implantatus. Duobus his ualidis sanè musculis tertia cartilago primè adducitur, illorumq; beneficio duæ tertiæ cartilaginis<sup>9</sup> partes, con tractis nimirum musculis cōiuent, ipsaq; lingula horum potissimum auxilio

Proprium 5.  
6, 7, 8.

Proprium 9  
& 10.

Proprium 11  
12

comprimitur.\* Vndecimus ac duodecimus, in basi tertiæ cartilaginis confistunt, ea regione, quæ stomacho larynx committitur, tertiæq; cartilago secundæ coarticulatur. Sunt autem ab utroq; latere singuli, qui ex radice tertiæ cartilaginis, quæ hæc primæ proxima est, principium sumunt: & secundum basim tertiæ cartilaginis modicè sursum protensi, ad tertiæ cartilaginis medium (ubi duæ ipsius partes inuicem colligantur) finiunt, se mutuo inibi contingentes. Præsentibus itaq; musculi breues, & exterius quodammodo pyri modo rotundi, intus uerò omni ex parte cartilagini tertiæ connati spectantur: & ubi se inuicem contingunt, latiores crassioresq; sunt, quàm statim in ipsorum exortu. Ambobus musculi, tertiæ cartilaginis basim cōstringentes, duasq; eius cartilaginis partes inuicem comprimentes, lingulam claudunt, arctantq;: & unâ argumentum sunt, tertiam cartilaginem necessariò esse geminam: quum, si simplex esset, ab illis musculis cōstringi nequiret: uti neq; à duobus tertiam primæ iungentibus ocludi, neq; à quatuor secundæ tertiam necentibus aperiri potuisset. Ex duodecim igitur laryngis peculiaribus musculis, octo laryngē arctant, quatuor scilicet primam secundæ necentes, & duo tertiam primæ committentes, ac demum duo in basi tertiæ cartilaginis repositi: quatuor uerò ipsam referant, aperiunt uel, illi nimirum, qui tertiam secundæ iungunt. Alij quoq; musculi, quos communes uocamus, utriusq; etiam motus quodammodo duces sunt, per quem spiritalis meatus lingula uel amplificatur & comprimitur. Horum enim primi duo, utrinq; singuli, ex tota propemodum inferiori oris referentis sede principium ducunt: ac lati & carnei, & internis lateribus inuicem proximi, contiguiq; uisuntur. Hinc deorsum protensi, & mutuo internis lateribus abscedētes, singuli in sui lateris inferiorem primæ cartilaginis sedem implantantur, tanta latitudine, atq; ipsorum originū est latitudo. Toto autem descensu, qua anteriori primæ cartilaginis sedi exporriguntur, ipsi fibrosis tantum nexibus in eum modum hærent, quo aliàs incumbentes inuicem musculi, mutuo committuntur. Ad præsentium musculorum insertiones, quæ non minus quàm sui exortus carniæ existunt, alij duo musculi, æque propemodum ampli, primæ cartilagini implantantur, ab interiori regione oris pectoris, in iugulo carnei, sed non latis principijs ortum ducētes: qui sursum secundum anteriorem asperæ arteriæ sedem protensi, ac sensim latiores redditi, illi quam diximus primæ cartilaginis sedi inseruntur. Quintus ac sextus communium laryngis musculorum, transuersi sunt, & ipsorum utrinq; habentur singuli, stomachum amplexantes. Ex stomachi enim postica parte, uertebras ceruicis respiciēte, secundum stomachi longitudinem principium sumunt, adeò inuicem cōtinui, ut utrorumq; musculorum idem unitumq; principium esse uideatur. Hinc ampli & carnosi, uersus priora transuersim protensi, lateribus primæ cartilaginis, secundum ipsorum laterum longitudinem implantantur, tota amplitudine, qua stomachū contingunt, impenso ipsi connati, cōtinuiq;.

Hi ad posteriora cōtrahunt primæ cartilaginis latera, secundæ cartilagini eam ita applicantes, ut laryngem quoq; seu lingulam coarctent. Qui uerò ab osse u referente procedunt, primam cartilaginem à posterioribus sursum quodammodo abducentes, laryngem dilatant. Verum his contrariam functionem adpiscuntur musculi, à pectoris osse primæ cartilagini inserti. illi namq; humiliores primæ cartilaginis sedes contrahunt, easdemq; deorsum uellunt, non nihil unâ contrahentes stringentesq; asperam arteriam, ne quicquam, quum uocem edit homo, reduplicetur, ipsa uel plurimum dilatetur. Præter hos sex, alios duos animaduerti, propemodum teretes, ac ex media interiori oris referentis

x 6, 7, 8  
fig. V.  
7 2, 3, 1, 2 fig.  
H.

7 8, 9,  
10 fig. 4, b,  
4 7 fig. 2,  
R.

Communium  
primus 12

Communium  
1 12

Communium  
5 12

Descriptio  
laryngis musculorum  
communium

Duo musculi  
laryngis operculi.

b 12 fig.  
F. 5. mufc.  
tab. O.  
c 12 fig. d.

d Aliter 12  
fig. G. 5. 12.  
P. 2.  
e 7 fig. cap.  
19 12. 12.  
uerfus o.  
f 12, 3, 4,  
5 fig. d.

g 2, 3, 4  
fig. H.

b 5 tab. Q.

i 2, 3, 4 fig.  
K.

ferentis sede explantatos, & radici laryngis<sup>k</sup> operculi insertos. Hos Galeno, quum in nullis quæ hodie extant operibus, illorū meminerit, incognitos fuisse opinor: non enim (quod fortè quis arbitraretur) in Galeni communium laryngis musculorum numerum sunt reiiciendi. Quamuis enim hos octo esse dixerit, tamen sex tantum describens, omnes octo primæ cartilagini committit, postmodum sermoni subnexuit. Duobus his id munus concredidum est, ut laryngis operculum, cibus potuq; depressum, denuò eleuent. ipsorum namque principijs uersus<sup>l</sup> os u referens tractis, operculum illud erigitur. Veruntamen musculos, qui his duobus opposito munere fungeretur, nullos obseruauim. Neque id mirum est, quum cibus & potus suo pondere euersum eleuatumq; laryngis operculum facile cōprimant, & ipsummet mole etiam sua grauatum, laryngi promptè applicetur. Quamuis non hi solum musculi oppositis destituantur, sed & illi, quorum beneficio rectum intestinum & testes sursum allicimus. Corpora enim, quæ sua natura plus satis deorsum tendunt, nec peculiarem motum in ductu, qui deorsum fit, exigunt, ad eam actionem minimè proprijs indigent musculis. Larynx rarum aut peculiare ligamentum prorsus nullum obtinet, præter membranæ, articulos orbiculatim cingentia: ad eò, ut priuatim nobis neutiquam ueniant describenda. & si quid fortè larynx, propter membranam, qua oblinitur, succingitur, ue, proprium sibi uendicet, id ad lingulæ refertur historiam.

# LARYNGIS MUSCULORVM ADMINISTRATIO. Caput XXI.



**F**ABRICAM laryngis in boue primùm, si uisum fuerit, deinde exercitatio redditus, in homine aggredieris. Administratis itaque nunc sectionis serie proprijs ossi u referenti<sup>a</sup> musculis, statim tibi occurrent<sup>a</sup> duo, ab illo osse ad primam cartilaginē procedentes: quorum principia paruo cultello ab osse liberans, paulatimq; musculos à cartilagine radens, eos ad ipsorum usq; insertionem deduces. pari<sup>a</sup> ratione<sup>a</sup> musculos à pectoris osse ad primam cartilaginē ductos, primùm ab osse separabis: ac postea ipsos ab aspera arteria leuiter diuellens, ad primam usq; cartilaginem, cui inseruntur, eosdem consequeris. Quatuor his diligenter inspectis, sectionem per palati tunicam, fauciumq; intima duces, ac laryngem cum stomacho è faucibus eximes, ad eum prorsus modum, quo lanij bouum laryngas execare consueuerunt. Liberatam dein, & à corpore cum asperæ arteriæ & stomachi portione resectam laryngem, sodali tenendam porriges: ac mox<sup>a</sup> musculos ex stomachi posteriori parte ad primæ cartilaginis latera productos inspicies. quod ut fiat promptius, ipsos longa sectione, ubi illorum capita sese cōtingunt, diuidito: & hamulo aut lummis digitis alterius capite apprehenso, totum à stomacho ad primæ usq; cartilaginis latera accuratè separato. Licebit modo sex horum musculorum laryngi cōmunium actionem discere, dummodo ipsorum capita huc illuc, uersus sua principia attraxeris. quo facto, omnes ilico à prima cartilagine liberabis, atq; ad<sup>a</sup> duos, quos operculi laryngis radici implantari dictum est, sectionem cōferes. Linguae igitur<sup>a</sup> tunicam, quæ cum palati tunica, & laryngis & stomachi interiori, ipsiusq; demum operculi communis est, ad operculi radicem lunari linea incides, ac hamo exceptam, cutis modo excorabis. Mox enim illorum musculorū fines in promptu erunt: quos posteaquam ad os u referens, leniter ipsos ab adipe illis proximè accum-

Lib. 7 de respiratione.

Laryngis ligamenta.

Administratio primi & communium.

Communium tertij & 4.

Communium 5 & 6.

Duorum laryngis operculi.

b 2, 3, 4, 5 fig. 1.

1, 2, 3 fig. A.

m fig. cap. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

n Spectatur 21, 22, 23 figuris.

a 4 tab. 5, T. R. Q. V. V. b 5 tab. O.

c 5 tab. P.

d 2, 3, 4 fig. cap. 21 I.

e 2, 3, 4 fig. cap. 21 K. f 1 fig. cap. 19 C.



bente separando deduxeris, ab osse eos difsecabis. Vt autem illorum functionem discas, laryngis operculum digito deprimes: ipsorumq; capitibus uersus u referens os attractis, operculum euerti, antrorsumq; tendi & eleuari conspicias. Modò & hos quoq; musculos, & stomachum, ipsumq; (si libuerit) operculum à larynge in totum adimes, ut tres laryngis cartilagine cum duodecim ipsi proprijs musculis solæ relinquantur. Quum tamen reliquam asperæ arteriæ partem à secunda cartilagine abscecas, inspicito\* glandulas, hominis laryngi appositas, & ut in sexto libro exequar, utcunq; carneas. In boue autem harum loco carneam prorsus reperies substantiam, ad secundæ cartilaginis latera repositam, & musculo cuiusdam similem, qui septimus & octauus communium laryngis musculorum in boue censerî possit: quum interim homo eius substantiæ, seu musculorum uice, quemadmodum nuper dixi, grandes insignesq; obtineat glandulas. Cæterum nunc tempus est, ut ad amussim\* lingulæ seu rimæ formam intuearis. cernes enim, laryngem superiori parte & inferiori amplam esse: in medio autem rimam oblongam habere, ex ea quam in primo libro explicuimus substantia cõformatam. Vt uerò hanc proprijs manibus subinde distendas, aperiastq; priusquam musculorũ sectionem aspiceris, dextræ manus pollice, medioq; digito, laryngis latera comprehendens, indice interim interiori tertiæ cartilaginis amplitudini inserto: sinistra autem manus pollicem ac indicem inferiori laryngis orificio immittes, ac duobus illis sinistræ manus digitis secundam cartilaginem à prima abducere conaberis, dextræq; manus indice tertiam cartilaginem extrorsum euertes. liquidissimè enim hac ratione inspicies, quò lingula aperiatur. Si uerò sinistra manu secundam primæ adduxeris, & dextræ manus pollice ac indice tertiam cartilaginem uersus interiora protruseris, ac inuicem duas ipsius partes cõnuere feceris, lingulam ad amussim claudi intuebere. Scribo autem hæc paulo fusiùs, ut Galenus aliquando intelligatur: nec posthac laryngis operculum, uocis principalissimum esse organum, qui hodie sese Galenicis profitetur, cõtendant: & idem corpus, *γλωττιδα* uell lingulam, & *ἀνγλωττιδα*, seu laryngis nobis uocatum operculũ existere opinentur, ignorantes profectò lingulam in medio esse laryngis, ac tibiæ linguis, quibus illæ instantur, quàm sumillimam. Quum itaq; lingulam tuis manibus, utcunq; uisum fuerit, & claueris, & aperueris, proprios laryngis musculos difsecabis, à quatuor primæ cartilagini secundam nec tentibus auspicatus. Leui igitur ac transuersa sectione exteriorem musculum à prima cartilagine liberabis, præcauens, ne interiorem simul conuulneres. hoc ablato, interiorem similiter à secunda cartilagine abrades, mentem adhibens illi quem dixi fibrarum intersectioni. Neq; hoc duntaxat ad amussim, num scilicet unus duò ue sint, rimaberis: sed etiam, dum stomachum à larynge liberaas, diligenter expendes, num\* eos quos interdum obseruari dicebam, musculos reperturus sis, qui à secundæ cartilaginis spina in humiliores primæ cartilaginis processus inferuntur. Quatuor itaq; secundam cartilaginem primæ iungentibus à larynge resectis, in altero laryngis latere\* processum inferiorem primæ cartilaginis à secunda liberabis: ac primam hac ratione à secunda antrorsum reflectes, duos inspecturus musculos, tertiam primæ colligantes. Vbi hos utcunq; examinaueris, integrum erit, ac utiori cultello primam cartilaginem à reliquis duabus adimere, aut si uoles, ad duos musculos illi tertiam nec tentés appendam seruare, ac postmodum te ad quatuor tertiam secundæ nec tentes conferre: quos licebit à suis principijs, quæ ex secunda cartilagine sumunt, liberare, atq; ad tertiam, cui inferuntur, deducere. Postremò qui in tertiæ cartilaginis sunt basi, auferes, similiter

Hominis glandulas, quarum lobes in bouis sunt musculi.

Laryngis rimule seu lingula quemodo spectanda.

Administratio propriorum 123 & 4.

Proprium 9 & 10.

Proprium 15, 16, 17 & 18.

Proprium 11 & 12.

g 210, 11  
fig. cap. 11  
M.

b quemadmodum ceruere est in 11, 12, 13 fig. cap. 11.

i 22 cap. 11.  
4. N. deus  
fig. O.

k fig. capituli 21 inferioris C, D.

l ut T ab 8 fig. 8, 9 cap. 11.  
m 7, 8, 9  
11 fig. cap. 11 ab.

n 7 fig. cap. 21 P, R.

o 7, 8 fig. cap. 21 V.

militer quoq; eorum principia primùm liberans, ac ad finem usq; quo se mutuo cōtingunt, deradens. Ablatis musculis, cartilagine inuicem separabis. nec fieri poterit, quin nunc accuratè lingulę substantia habeas perspectam: quemadmodum & naturam illius quoq; & usum, & formam, ex administrationibus nimirum, quas proprijs manibus iam es aggressus.

DE MUSCULIS BRACHII MO-  
uentibus. Caput XXIII.



ICINITATIS quidē ordo, ante musculos brachium mouentes, capitis & dorſi, & ſcapulę motuū duces oportuiſſe deſcribi indicabit, ſi demū partēs iam enarratis propinquiores aggredi, inſtitutū eſſet. Verūm quum integris adhuc brachium mouentibus musculis, ſcapulam mouentes adminiſtrari nequeāt, quumq; multo minus, illis nondum ablatis, aut capitis aut dorſi diſſecare datum ſit: oportet

*Alia uicinia  
quā ſectio  
ordo.*

reprecium me facturum duxi, ſi brachij, & dem ſcapulę motores, ante caput toto de Adminiſtrandis ſectiōnis nomine, uti & Galeni ordinis in quarto & quinto de Adminiſtrandis ſectiōnibus, occaſione perfequar. Brachium itaq; antroſum ad pectus, & retroſum uerſus dorſum, & ſurſum ad ceruicē caputq; & deorſum ad thoracis latera mouetur: & præter hos motus, brachium, quacunq; ſede ductum ſit, quodammodo in gyrum quoq; agit, ita uē circumuertitur, ac ſi baculum aliquem in utraq; manus non flexas, ſed ſecundū longitudinem tantū mutuō appoſitas acciperes, ac deinde alternatim, prorſum retroſumq; actis manibus, baculum uolueres: adeō, ut triplici motuum genere brachium agi conſtet. Pectori brachiū unicuſ adducit muſculus, originem ſumens<sup>b</sup> ex media pectoris oſis latitudine, & ipſi inſertis cartilaginibus: deinde quoq; priuatim ex ſeptimę & octauę coſtę cartilaginibus, &<sup>d</sup> ex media clauiculę ſede, qua hæc pectoris oſis ſecundū dextrum ſiniſtrumq; medio enaſcitur, alteriuſq; lateris muſculi initio contigua eſt, neruoſior, membranofiorq;, & minus craſſa uiſitur. Attamen quę ex oſis pectoris latere, ipſiq; inarticulatis cartilaginibus pronāſcitur, penitus iam carnoſa exiſtit: quę uerō priuatim ex ſeptimę octauęq; coſtarū cartilaginibus, iuxta mucronatam cartilaginem exoritur, membranea & tenuis aliquouſq; cōſpicitur. Muſculus ex his ſedibus prodiens, & paulatim craſſior carnoſiorq; redditus, ſenſim arctatur: atq; in acutum tantisper procedit, quouſq; amplo & neruo, admodumq; robuſto, ſed breui<sup>c</sup> tendine, humero ſeu brachij oſi ſecundū ipſius longitudinem implātetur, ſubter humeri capitis ceruicem, in interiore ipſius regione, nonnihil interim in priora uergens.<sup>f</sup> Huius muſculi ſi brę inuicem uariant: & paulo ante tendinis productionem, adhuc in carnea muſculi parte, deinde & ſecundū totam tendinis amplitudinem ſeſe decuſſatim interſecant. Quę enim ex clauicula, & medio pectoris oſis longitudinis clauiculę contermino enaſcūtur, ex ſuperioribus deorſum obliquē in exteriora procedentes, ſuperiorē tendinis partem, ſecundū totam ipſius amplitudinem efficiunt: carnoſaq; toto ductu, præterquam in muſculi ad humerum inſertione, permanēt. Sed quę ex reliqua pectoris oſis ſede, ac priuatim ex ſeptimę & octauę coſtarū cartilaginibus originem mutuantur, obliquē ſurſum protenſę, inferiorē tendinis partem ſecundū ipſius latitudinem conſtituunt: & citiùs carnem ipſarum, qua implentur, ſuffulciunturq; quā ſuperiores amittunt.

*Brachij motus  
quot.*

*Primum brachij  
motus mouentium.*

*a 3, 3, 4. l. d.  
b 1. l. d.  
c 3. l. d.  
d 3. l. d.  
e 3. l. d.  
f 3. l. d.*

*e 3. l. d.  
f 3. l. d.  
g 3. l. d.  
h 3. l. d.  
i 3. l. d.  
j 3. l. d.*

amittunt. Superiùs enim ad insertionem usq; musculus carneam naturam reseruat: inferiùs autem, multò ante insertionem, liuidus nerueusq; conspicitur: quod superiores fibræ proculdubio, propter breuiorem ductum adeptæ sunt. Id namq; omnibus commune esse diximus musculis, ut tanto breuiori donentur tendine, quo succinctiori ductu, pro motus ipsorum ratione feruntur. Cæterùm superiora inferioraq; in tendine uoco, non quæ humeri caput propinquius accedunt, aut remotius ab illo reclinant: sed ad tendinis, quæ secundum latitudinem perficitur, insertionem, has positionis differentias in præsentī refero non secus, quàm si hanc chartam subdita altiore, aut etiam anteriorem diceres. Est itaque musculus hic quodammodo quinquilattris, sed inæqualibus costis constitutus. <sup>h prima co</sup> Vna namq; secundum mediam clauiculæ longitudinē ducta <sup>sta 3, 4. te.</sup> secunda, ad osis pectoris longitudinem procedit: tertia, secundum insertionis longitudinem fertur: quarta, à media clauiculæ sede, ad insertionis partem, humeri capiti propinquiorem, proficiscitur: quinta uerò à remotiore ab humeri capite insertionis parte, ad pectoris osis mucronatā cartilaginem protenditur. hæc q; costa, illa demum est, quæ anteriore cavitatis axillæ sedem efformat, posteriore interim illo constituta <sup>h. i. sc. cap.</sup> musculo, quem brachium deorsum dorso admouere audies. Ceterùm ut brachium pectori adducens musculus, differentes fibras, a clatum & amplum, uariumq; principium sortitur, sic quoq; alijs atq; alijs pectoris regionibus brachium admouet. Si enim superiores ipsius fibræ, à clauicula & superiori pectoris osis sedeeductæ, contrahantur, uersus pectoris superiora, & ad clauiculam brachium adducitur: sin inferiores fibræ contendantur, præfens musculus humilioris brachij ad pectus adductionis opifex redditur, siquidem tunc ad <sup>19 lib. ii.</sup> mucronatam pectoris cartilaginem & spurias costas brachium fertur. At si utræq; & potissimum mediæ, laborauerint, in neutram partem brachium inclinans pectori adigent. Quia igitur hic musculus amplum, atq; ex uarijs natum osibus principium obtinet, & fibras sese interfecantes, contrariæq; serie ductas, & ad hæc differentes etiam motus adipiscitur: nihil obstitit fortassis, ipsum geminum pronunciare, ac duorum musculorum loco cum aliquot dissectionis proceribus enumerare, quanquam unius duntaxat uice mihi toto orationis cōtextu habebitur. Quandoquidem uerò inferior musculi pars, quæ humiliores fibras producit, uersus inferiora brachium pectori adducit, meritò quoq; minor, & secundum profundum tenuior superiori parte euasit, quæ sursum agit, cuiq; uehementior ualidiorq; functio conceditur. Præter hunc musculum (pace interim Galeni dixerim) nullus alius brachij pectori admouet. Nam quem is inter brachij musculos primùm enumerat, quemq; iuxta mamillas exiguum, ad humeri articulum ascendere, ac ad spurias costas brachium adigere scribit, in homine ne utquam reperies. Non enim nos fugere posset, quum hunc obliquè sub cute, in aliorum superficie extantem, sursum ad articulū humeri proropere Galenus recenseat, & illum in membraneam desinentem exilitatem, articulo inferi affirmet, propter humeri osis <sup>1. i. sc. cap.</sup> sinum, <sup>23 lib. i. H.</sup> exterior caput musculi flectentium cubitum anterioris amplexantem. Nec quispiam sanè illum me oscitanter cum cute auferre arbitrabitur, qui aut humeri articuli musculorum sectionem aggressus fuerit, aut administranti adlitterit. Et quomodo, quæso, musculus aliquis ex mammarū regione incipiens, & aliorum superficiē incumbēs, etiam si uel fibræ cuiusdam crassitiem duntaxat æquaret, à quopiam in homine ignorari posset? si demum <sup>m 6 tab. m</sup> inter illum quem modò recensui musculum, & illum quem brachium attollere audies, ad articulum conscenderet. Nam etsi eius musculi

*Musculus brachij pectori adducens, quo semia abidat.*

*Lib. 5 de Administrant. sect. 13 de Partium uso.*

*h prima co  
sta 3, 4. te.  
K. L. secun  
da à K ad  
T. tertia 4  
tab. Q. T.  
quarta ab  
L ad Q.  
quinta ab  
R ad T.  
i 3 tab. V.  
10 tab. Q.*

*h. i. sc. cap.  
19 lib. ii.*

*1. i. sc. cap.  
23 lib. i. H.  
1.  
m 6 tab. m  
musculi Q.*

*n 3 tab. in  
ter A et P.  
in linea ob  
L ad Q.*



musculi pars, cuti subiecta, imperitè adimeretur, illa nihilominus pars sese offerret, quæ inter duos illos brachium mouentes musculos sese ininuans, articulo esset proxima. At quorsum attinet, oscitantia excusationem hic prætexere, quum Galenum simiarū, me autem pro uiribus, hominum constructionem describere, uel hic brachij musculus attestetur? homines enim illo priuantur, & in simijs ad hunc modum obseruatur. Cute detracta,° is quem nos in homine primū occurrere diximus, pari modo in simijs ac hominibus conspicitur, nullo prorsus alio tectus musculo. Verū sub huius humillima° costa, seu latere, super \* obliqui abdominis musculi (quem descendentem uulgo dicimus) principium, gracile membraneumq; musculi initium reperitur, longè sub papillæ regione consistens. Initium hoc carnosum euadens, sed gracile interim permanens, sub magno illo brachium pectori adducente musculo, sursum obliquè ad humeri articulum porrigitur, eam prorsus, quam Galenus tradidit, insertionem tentans. Ac proinde neq; huius musculi insertio, neque ipsius ductus, nisi magno illo musculo penitus eleuato, in conspectum ueniunt: quod non persuntoriè, ut Galenum intelligas, uenit obseruandū. Nisi enim hunc Galeni muscolum, suo progressu ita occultatum, & tantū membraneo principio modicè admodum extare cognoueris, erroneus omnino, atq; admodum difficilis quintus de Administrandis sectionibus liber statim in ipsa fronte uidebitur, quum is passim illum in aliorum, ac proinde etiam in eius, quem nos brachium pectori attrahere diximus, superficie, sub cute expor-

*Musculus qui scapula antior sum agit, à Galeno male pro brachij motore haberi.*

rectum, minus rectè tradiderit. Præter hunc, Galenus alium describit° muscolum, quem altioris brachij ad pectus ductionis autorè esse existimat. Ille perfectò in homine nequaquā me fugit: at minimè tamen, ut Galenus autumat, brachium pectori uersus elatiora admouet: imò scapulæ gratia, ut scilicet eam ad pectus ducat, creatus est: quod & ipsius origo & ductus, suiq; tendinis insertio, luce clariùs demonstrant. Principium enim sub \* musculo, quem ego brachium pectori accommodare retuli, sumit, illiq; omnino substernitur. Enascitur autem carnosio principio à secunda, tertia, quarta & quinta, nonnunquam (sed perquàm rarò) & sexta, superioribus thoracis costis, non quidem (etsi Galenus non semel aliter affirmet) ubi pectoris ossi coarctantur, & ex ipso pectoris osse, sed anteaquàm costarum ossa in cartilaginem pectoris ossi inarticulandam definire incipiunt: nec prorsus recto tramite, recta uel linea enascitur, sed quasi digitis quibusdam, ex costarū ossibus longiùs exortis, procedit. Hinc ad exteriora porrectus, angustior & crassior efficitur, quousq; ad humeri cum scapula articulum, in latum nerueumq; tendinem, carne mixtum finiat, quo \* processus anchoræ imaginem referentis interno lateri implantatur, illic neruofior euadens, ubi is processus ex suo appendice° neruofiores interni capitis partem emittit, eius musculi, quem inter cubitum flectentes anteriorem recēsebitimus. Nequaquam autem tendo iste, articuli ligamentum in homine contingit, ut sanè, sed admodum adhuc obscure, in caudatis simijs, quibus anchoram imitans processus modicè extuberrat: deinde nullam scapulæ regionem uacare, præter hunc processum, reperias, cui tendo ille com modè implantari possit. Ad hæc, si musculi huius fabricam ad amussim perpendaris, proculdubio suæ potissimū insertionis gratia illum exeri altrues. Istius musculi fibræ sese non decussatim interfecant, quemadmodum° musculi, qui nobis brachium pectori adducere dictus est. Quum itaq; hoc situ ac figura musculus iste à Natura creatus sit, quī obsecro ad altiora, quàm primi musculi superior pars, brachium pectori admouebit? Eius enim principiū longè

à prioris musculi superiori principio superatur: quum hoc à clauiculæ, & superiori pectoris osis sede, insigniter etiam deorsum obliquè feratur: illud uerò ex secunda costâ, & tertia, primum, ut uel elatissimè procedat, longeq; inferius habeatur, ac minus obliquum ductum (qui & iam ad<sup>b</sup> superiora ferè pertinet) molietur. Quam obrem si hæc omnia haud segniter perpenderit, & Galeno concesseris, musculi<sup>c</sup> insertionem, quæ è regione humeri capitis in internum scapulæ processum perficitur, nonnihil articuli ligamentū apprehendere: necessario fateberis, eam quam musculus iste moliretur brachij adductionē, neq; humiliorem, neq; altiore fieri ea quam à primo musculo effici, dudum dixi.

Secundus brachium mouentium.

Vnum igitur<sup>d</sup> musculum, omnium adductionum brachij ad pectus autorem esse cenleo: & cum qui brachium ad superiora attollit, unum quoque statuo. Est porrò hic musculus carnosus, uaria etiam, sed continua principia sortitus, ac uelut ex diuersis musculis (si lato ipsius principio, & uarijs inscriptionibus attende-<sup>e</sup>ris) conformatus. Ex media enim clauiculæ parte, secundum ipsius longitudinem, quæ scapulam spectat, principium ducit, musculo brachium pectori adducen-<sup>f</sup>te contiguus: deinde ex superiori scapulæ processu, seu summo humero,<sup>g</sup> ubi is clauiculæ committitur, & tota quoque scapulæ spina, prodit, continua ueluti linea, & principio nerueo, quod uix bene pronatum, ilico carnosum, crassumq; admodum & extuberans efficitur. Mox à principio musculus carnosus permanens,<sup>h</sup> in angustum, tanquam in trianguli uerticem tantisper porrigitur, donec humero tēdine amplo, & ex carne neruosaq; substantia mixto, robustoq; ad humeri osis latitudinem, non modicè sub ipsius ceruice<sup>i</sup> inferatur. Ipsius insertio, quæ intus quàm extra neruosior est, non ad amussim secundum transuersum perficitur: sed modicè obliqua ab anterioribus, deorsum in posteriora nonnihil uergit, nihilq; minus quàm decliuis, recta ue (etsi Galenus secus attestetur) occurrit, qui ipsi eandem insertionis formam tribuit, cum<sup>j</sup> musculo brachium pectori adducen-<sup>k</sup>te, quam secundum rectum, ac humeri longitudinem perfici diximus. Totus itaque musculus, i quis illum obiter intueatur, trianguli imaginem præ se fert: ac proinde à Δ similitudine, Græci illum *Δελταειδής* appellarunt: quemadmodum etiam ob id, quod humeri ad scapulam articulo, quem *ωμορ* uocant, insertitur, illumq; quodammodo contegit, eundem *επωμίδα* nominarunt. Ego autem toto sermonis contextu, musculum appellabo brachium attollentem, musculum<sup>l</sup> ue brachium mouentium secundum. Cæterum costæ hunc describentes, ita sese habent.<sup>m</sup> Prima, à media clauiculæ longitudinis sede, ad summum humerum contendit, & hinc per scapulæ spinam, ad eisdem usque basim. Secunda, à clauicula obliquè deorsum ad insertionis internum latus ducitur. Tertia, à scapulæ basi, ubi eius spina eminere incipit, ad externum latus insertionis obliquè deorsum in priora contendit. Cæterum ueteres Græci uidentur & exortum præsentis musculi cuidam trianguli uerticis assimilasse, quem musculus uix antea ostendit, quàm suo principio undiq; liberatus, in planum ponitur. Tunc enim principij pars, quæ brachium pectori adducen-<sup>n</sup>ti musculo proxima est, & deinde quæ ad basim scapulæ habetur, ambæ magis ea principij parte prominent & attolluntur, quæ à summo humero pēdet, & quasi ualde obtusum trianguli uerticē exprimit. Huius fibræ inuicē non aliter uariant, quàm quod anteriores, quæ clauiculæ debētur, deorsum obliquè in posteriora ferantur: posteriores uerò, quæ à scapulæ spina pendent, obliquè in priora descendant. Quæ autem à summo humero, & ipsius cum clauicula articulo pronascuntur, recta deorsum procurrunt. Quamuis interim nullæ se inuicem fibrarum musculi

A notat trianguli, de quo hic agitur, uerticem.



b tab. ab  
ad l. quem  
adducen-  
tes cū K.  
L. ad Q.  
tabule.

c s. tab.

d s. tab. d.

e 4. tab. z.

f 10. tab. a.

g 10. tab. a.

K. a. ta. M.

3. tab. P. s.

tab. y. y. ta.

L. 11. tab.

M. P. C.

principij

figura eius

tabule in-

dici infer-

ta.

f. 4. tab. ab

c. ultra f.

g. 3. tab. li-

nea ad L.

ad Q.

h. ultima-

rum f. lib.

i. Q. ad d.

j. i. s. f. cap.

2. lib. v. k.

per l. ad G.

h. 10. tab.

ab. 11. per

21. ad O.

l. figure in

dici 11. ta.

inferte A.

B. C. cōt.

rum ad D.

m. 11. ta. de

pendet P.

n. 4. ta. d.

ad Q. T.

o figure

indici 11. ta

bulæ infer-

te A. per B.

ad C. pri-

ma notat,

secundā ad

A. ad D. s.

ā C. ad D.

Aut cōstet

4. 10. 11. ta

bulæ, ne

hic in no-

tando ni-

mus sim.

brachium pectori adducentis ritu, decussatim interfecit: etsi tamen ob inscriptiones nonnullas obliquè ductas, fibræ parumper implicari conspiciantur. Si itaque musculi pars, à clauicula principium ducens, in se colligitur, brachium sursum ad anteriora colli & faciem attollitur. Si uerò fibræ à summo humero, & clauiculæ sede ipsi commissæ, originem mutuant, contrahuntur, brachium recta, & in neutram partem uergens, assurgit. At si posterior musculi pars, ex scapulæ spina prodiens, in se conglobatur, ad posteriora ceruicis, ipsumque occiput, brachium uergit. Musculi huius initia, ex tota amplitudine illorum quæ diximus ossibus non exoriuntur: sed duntaxat instar crassioris lineæ, undecunq; à prominentiori ipsorum sede, adeò ut parua omnino initij crassities occurrat. Neq; id prorsus negligendū est: quum præter hunc musculum, qui brachium motu proprio attollat, nullus sit, neque etiam brachium alio egeat, qui eodem cum illo fungatur munere. Quanquam non ignorem, Galenum hic alios quosdam describere, at id tam uerè, ut sibi in decimotertio de Partium usu, & quinto de Administrandis sectionibus, minimè constet: cuius loca si omnia prosequer, in nimiam prolixitatem præfens Caput excreceret. Addam tamen cercopithecis prorsus eandem esse speciem musculi brachium attollentis, cum hominum musculo. Canes autem, equi, boues, in hoc articulo, non solum in ossibus, sed maximè in musculis & ligamentis, ab hominis constructione uariant. <sup>p</sup> Musculus brachium recta ad dorsum agens, carnosus est, & crassus, & inter cæteros huius articuli musculos utcunq; teres. Oritur autem carneo principio, ex inferiori scapulæ basis<sup>a</sup> angulo, à basi quidem medicam principij partem assumens, sed insignem ab inferiori scapulæ costa: ex media enim costæ illius longitudine, basi scapulæ propinqua, & ab externa gibba<sup>a</sup> ue humilioris anguli basis sede, continua carnosaq; origine enascitur. Iuxta medium uerò longitudinis costæ inferioris, musculus hic à scapulæ ossè abscedit: & modicè sursum in priora tensus, humerumq; accedens, in ualidum, breuemq; sed latum cessat tendinem, qui non solum forma (quam ad latitudinem & crassitiem ac insertionem refero)<sup>a</sup> illius tendini correspondet, qui ad pectus mouet: uerum hi duo musculi in eandem ferè regionem implantantur, in eorum medio interuallum demittentes, cui<sup>a</sup> tendo<sup>a</sup> musculi inferitur, quem retrorsum ad ilia brachium mouere, paulo post subiungiam. Quamuis interim tendo musculi ab inferiori scapulæ costa pronati, paulo uiciniùs humeri capiti implantetur, quàm illius tendo, quem brachium pectori adigere relatum est. Hic rursus non me fugit, præsentem musculum inter brachium circumuertentes à Galeno perperam recenseri, atq; ab illo<sup>a</sup> musculum triangularem, & scapulæ gibbum occupantem, & mihi in circumuertentium brachium classẽ ponendum, ab ipso autorem ductus brachij ad dorsum poni. Brachium deorsum trahitur, à<sup>a</sup> magno quodam, latoq; admodum musculo, qui à spinarum apicibus, quæ à sexta thoracis uertebre spina, ad ossis sacri usque medium habentur, principium sumit, omnino instar amplæ membranæ tenue, continuumq; ac recta linea pronatum. Verum ubi musculos dorsum mouentes id principium perreptaui, eamq; costarum regionem contingit, quæ maximè in dorso, uersus posteriora extuberat, carnosum densumq; efficitur: & uniuersus musculus ad eum modum auctus, in<sup>a</sup> angustum tantisper procedit, donec tendinem latum & ualidum humero inserat, subter ipsius ceruicem, & secundum ipsius longitudinem, in medio<sup>a</sup> tendinis brachium pectori ad mouentis, &<sup>b</sup> tendinis qui brachium in posteriora ad dorsum agit. Hic itaq; musculus etiam triangularis est, sed planè inæqualibus conformatur

*Tertium brachium mouentium.*

*Lib. 13 de Partium usu, lib. 5 de Administr. d. 36.*

*Quartus brachium mouentium.*



costis. Duas enim longissimas obtinet: unam, quæ secundum dorsi longitudinem porrigitur: alteram, quæ ab osse sacro, per ilia & inferiorem thoracis partem, sursum ad tendinis insertionem cōscendit, alterumq; axillæ cavitatis ualidum constituit. Tertia uerò costa, cæteris multo breuior, à sextæ thoracis uertebræ spina, super angulum scapulæ, quem ipsius basis humilior pars ostendit, ad insertionem tendinis transuersim uehitur. Pro trianguli costarum inæqualitate, etiam musculi fibræ differunt: quæ enim per ilia & spuriarum costarum extrema sursum porriguntur, prolixissimæ, ac minus oblique sunt: quæ uerò ab inferiorum uertebrarum thoracis spinis enascuntur, breuiiores sunt, & transuersim magis prorepunt. Musculus iste, motus brachij deorsum opifex est, non quidem id simplici motu, sed uario, pro fibrarum discrimine, præstans: quandoquidem prout superiores fibræ, aut inferiores in se colliguntur, contrahuntur uel ita quoq; deorsum, nunc ad superiora, nunc ad inferiora, brachium uersus dorsum deprimitur. Porro musculum hunc, dum scapulæ humiliorem transcendit angulum, fibris quibusdam scapulæ committit, atq; ipsi aliqua insigniori apprehensione adnasci, Galenus scriptum reliquit: deinde non modo brachium duntaxat ab hoc musculo moueri asseruit, imò etiam illum insertionis huius beneficio, detractionis scapulæ ad inferiora autorem esse commemorat. Profectò et si quàm maximè uerear, Galeni placitis obuiam ire, & lubens hoc Capite saltem unicum musculum citra controuersiam plenè describere optem: haudquaquam tamen, ut res sese habet, hic subticere queo. Præsens enim musculus, dum humiliorem scapulæ basis angulum integit, scapulæ ossi, non nisi musculorum, qui ab illo pronascuntur, interuentu, contiguus uisitur: neutiquam autem ossi connatus, ut neq; etiam, cui incumbit ibidem musculorum regionis, aliqua peculiari insertionem committitur, connasciturq;: Non enim aliter inibi subditis adnectitur musculis, quàm musculis dorsum mouëtibus, & thoracis & abdominis, qui huic musculo nō minus quàm illi scapulam occupantes substernuntur. Quum itaq; musculus hic nullā in scapulam molitur insertionem, proprio etiam motu unā cum brachio eam nequaquam, ut Galenus opinabatur, deorsum uellit. Et si illum tota ea sede, qua angulo scapulæ superuehitur, scapulæ innasci, aut quouis tandem pacto ualidius hæere autnecti darem, id tantum mehercules transuersis perficietur fibris, illis inquam, quæ in elatissima suæ originis sede habentur, & à sextæ, septimæ, octauæ, nonæ & decimæ thoracis uertebrarum spinis dependent, quæ sanè non deorsum scapulam mouerent, sed rectā ad dorsum. Quod Galenus facile animaduertisset, si sedulò præsentis musculi initium obseruasset. Nam etsi in quinto de Administrandis sectionibus libro obiter scripserit, musculum hunc ex spinis uertebrarum, præcipuè autem quibus spurie costæ coarctantur, principium ducere: attamen (ut sibi undique pulchrè constat) istum musculum inibi exortus sui uerticem assumere tradidit, ubi secundus noster scapulam mouentium musculus cessat, cuius inferiorem partem Galenus demissiore humiliorem uel musculum uocat posteriorum scapulam mouentium, quemque in quarto de Administrandis sectionibus libro, ad duodecimæ usque thoracis uertebræ spinam pertingere affirmat: etsi interim homini ad octauæ propemodum thoracis uertebræ spinam terminetur, suoque etiam fine, notatu digno interuallo brachij musculo incumbat, cuius modò historiam instituiamus. Quia autem de scapulam agentibus musculis, peculiari pertractabimus Capite, ad brachij motuum opifices, qui adhuc reliqui sunt, sermonem iam opportunè reflectemus, inter quos

Lib. 13 de Partium usu, & de Administr. differt.

Musculus alius, quo spina & canes abundat.

e ad fedem  
Y tab. 100.

f 9 tab. 1.  
Δ. uerticem  
hic de parte  
istius Δ  
insignia  
tantum  
agimus.

Galenus

Lib. 1. & 8. de  
Administ. dif.  
f. 11. & 13. lib.  
de r. s. u. part.

Galenus alium enumerat musculū, eiusdem ferè functionis, cui nuper dictus præest, gratia efformatum, ut scilicet brachium deorsum trahat: atq; hunc qui dem latum amplumq; esse recenset, sed tenuem interim. Membranam enim, quam nos carnosam uocamus, fibris carneis augeri narrat, quum primū illa contingit: ac fibras has sursum tensas, carnosiores tantisper effici tradit, donec membrana ampli & tenuis<sup>g</sup> musculi naturæ, quem buccas mouere diximus, respondeat, humeroq; implantetur. Deinde hunc musculum Galenus omnes qui illum præcesserunt latuisse, atq; ab ipso in simijs inuentum, nusquam non iactitat. Ego profectō in simijs & canibus, plurimisq; quadrupedibus ipsum obseruavi, non tamen in omnibus æquè latum, carnosum<sup>h</sup> ue. At in simia (ut id priuatim dicam) ad hunc modum mihi apparuit. Membrana carnosā, secundū spinæ totius longitudinem firmius subditis organis, quā alibi conascitur, haud aliter, quā si ex spinarum apicibus, tanquam ex ossibus aut cartilaginibus, principij sui portionem, aliorum ligamentorum modo educeret. Verū in ea sede, qua membrana è regione quinque lumborum uertebraarum consistit, illiumq; os cōtingit, carneis, sed tenuibus rarisq; fibris adaugetur: quæ sursum obliquè uersus axillam prorepētes, ac ex lata basi sensim in arcum collectæ, musculum amplum, at tenuem exprimunt, qui in mucronem definens, obscurè, uixq; admodum, in humerū implantatur, tendini eius<sup>h</sup> musculi continuus, quem brachium pectori adducere cōmemoratum est. In canibus manifestam insertionē in humerum non ostendit, & uidetur musculi brachium pectori adducētis tendini aliquo pacto admisceri, aut potius propriæ eius musculi membranæ adnasci. In equis quoq; bobus & ouibus, & id genus animalibus, admodum euadit conspicuus. unde etiam consulo, illum in boue potissimum perpendi: quod fiet promptissimè, si excoriati bouis axillam inspexeris. Apparebit namq; is amplus, & conterminis sedibus rubicundior: illiusq; maximam portionem ablatam esse cōperies, quam lanij cuti adnatam relinquunt, eo quod carnosam membranam unā cum cute auferre inter excoriandū consueuere: atq; ideo etiam tantam præsentis musculi partem, quanta nondum prorsus, & insigniter carnosā apparet, auferūt. Quapropter etiam iuuabit, excoriantes lanios uidere, qui longè acutiori cultello, maioriq; mora in axillis cutem adimunt, quā in reliquo corpore, ubi membrana unā cum cute à subditis corporibus separant. Non inutile quoq; erit, excoriatam cutem iubere tibi exporrigi, ut & cuti eorum musculorum portionem adhuc adnatam contempleris: obseruesq; huic musculosæ carni paulo rectiores fibras intertextas esse, quā amplo illi<sup>i</sup> musculo, quem brachium deorsum ad spinam mouere testatur. Atq; hæc in simia, & quæ proximè nominata sunt animalibus didici: at in homine me eiusmodi quid reperisse, nequeo affirmare, quantumuis rectè cutem ab adipē, & quum obesi accidit corpus, adipem à membrana carnosā, & membranā à subditis illi musculis, per totum thoracem abdomenq; non laceram semper difficem. Qui brachium circumagunt, tres mihi constituuntur musculi, omnes ex scapula ducentes originē, & latis tendinibus, articulum continentibus ligamentis implantati. \* Primus itaq; qui ordine brachium mouentium quintus haberi potest, scapulæ<sup>1</sup> sinum occupat, qui inter superiorem scapulæ costam, & eiusdem spinam, seu superioris processū sui radicem uiuitur. Proccedit enim à scapulæ basi: & omnino carnosus, totum, quem diximus, scapulæ sinum implet, ossi semper ualidè, ac si ab ipso toto progressu enascere-  
tur, connatus. Quum uerò ad superiorē ceruicis scapulæ sedem pertingit, sub ligamento ualidissimo, summum humerum interiori scapulæ processui col-

Quintus bra-  
chium mouen-  
tium.

E 3 ligante,

h. 12. l. 4. H.  
H. 11. X. G.  
K. 7. 10. L.  
11. G.  
l. 3. f. 1. cap.  
21. lib. 1. b.

m. 5. tab. c.  
inter a. b.

ligante, in anteriora contendit: & in amplum ualidumq; cessans tendinem, humeri ad scapulam articulū superat, eius articuli ligamento pertinacissimē, obliqua quodammodo insertionē implantatus. Est itaq; musculus hic oblongus, & exterius gibbus: intus autem illi respondet sinui, seu cavitati, quam implet. deinde fibras secundum sui longitudinē exorrectas habet: quæ si brachium attollentis\* musculi fibris conferantur, transuersæ prorsus existunt. Huius musculi Galenum non meminisse opinor, nisi fortē inter brachium attollentes (quos uarios, neq; semper eosdem recenset) illum reponat: quamuis ipsi brachij ad superiora cōtractio, quam obscurē uersus anteriora molitur, præcipuē demandata non sit. Deinde Galeni descriptionum nulla illi congruit, etiamsi scapulæ eminētiori costæ quendam exorrectum obiter narret: quem si quis hunc nostrum esse dixerit, non tamen ipsi insignem cum brachium attollēte musculo connexum (imò uix contactū) tribuere poterit. °Sextus brachium mouentium musculus admodum est carnosus, ac concavam internamq; scapulæ sedem opplet, ex<sup>o</sup> basi totius scapulæ carneam originem deducens, & in trianguli<sup>o</sup> uerticem, ad scapulæ formam tātisper arctatus, dum ad anteriorem articuli regionem pertingat, cui amplo tendine quasi in semicirculum implanatur, brachium introsum circumuertens. Huius musculi superius latus<sup>o</sup> illi admodum continuum existit, quem postremò recensui: adeò sanē, ut nisi diligenter animū adhibueris, uterq; unus esse tibi apparebit: sextumq; musculum ad<sup>o</sup> elatiorem scapulæ costam, inflexionem in posteriora fecisse, atq; ita portionem gibbæ sedis scapulæ etiam occupare, & eum quem quintum uocauimus, constituere asseres. Septimus uerò brachium mouentium musculus ille est, quem Galenus decimotertio de Partium usu (nam quinto de Administrandis sectionibus, omnes à scapula in humerum porrecti musculi mirè confunduntur, & præfens musculus ferē inter brachium attollentes inibi recenseri uidentur) brachium retrorsum ad dorsum agi credidit: illum enim, qui uerē id munus præstat, quemq; inter huius Capitis musculos tertio loco recensui, Galenus circumuertētis ad exteriora uice descripsit. Cæterum hic septimus musculus, cuius ope brachium ad exteriora circumagi scio, uniuersum scapulæ gibbum, \*quod sub ipsius spina habetur, implet. Exoritur enim carnosus ex scapulæ basi: deinde arctior ad scapulæ formam<sup>o</sup> redditus, tandem articuli ligamento, tendine amplo, at breui, tanquam in semicirculum extrinsecus inferitur, ita ut trium musculorum brachium circumagētium tendines, in orbem quasi uniuersum articuli ligamentum amplexentur, & qua ratione singuli suis fungantur munijis, faciliē demonstrent.

Sextus brachium mouentium.

Septimus.

MVSCVLORVM BRACHIÏVM MOVENTIUM administratio. Caput XXIIII.



Musculi, quem carnea membrana in sinu ram & canis a uillis constituitur, ex am.

I hætenus ad brachium mouentes usq; musculos, ceteros dissectionis nostræ serie, & in primis<sup>o</sup> latum illum, qui buccarum motibus præest, carneaq; membrana efformatur, administrueris, cutem quoq; ex superiori scapulæ parte, & pectoris elatiori sede ademisti: ac proinde hæc à brachio, abdomine, & uniuerso thorace, usq; ad femora & nates, nunc ita cum adipe auferetur, ut carnea membrana illæsa, corpori adnata maneat. Quod profectò, nisi laborum sis patiens, discendiq; cupidus, moleste perfeceris: cum tot sectionibus cutis prorsus aliter liberanda ueniat, quam si carnosam membranam unā cum cute adimeres. Ablata

cute,

11 4 tab. 2.  
10 tab. 2.

0 7 tab. 7.  
8 tab. 11.

p 7 tab. 2b  
L ad L.  
q 7 tab. 2b  
L. L. sur.  
fuit K.  
r 7 tab. 1.

5 1 fi. cap.  
21 lib. 1. 2b  
A per 4  
ad Z.  
b 11 tab. 7.  
2 tab. 1. 9  
M. 10, 12  
Q.

11 13 tab. 5.

x 2 fi. cap.  
21 lib. 1. 1b  
ter G, 1, H.  
D, T, Y.  
y 11 tab.  
ab H, I.  
z 11 tab. 2b  
H, I ad K.

4 3 tab. 7.



cute, unam rursus lineam, à media pectoris regione, ad pubis usq; os, in membrana carnosa duces: & deinde alia à pubis osse transuersum, secundum coxenicis articulum, ad sacri ovis usq; spinam: & tertiam à summo humero, ad usq; mediam brachij regionem. His ductis sectionibus, membranam carnosam hamulo aut unguibus apprehendes, & ab uniuerso thorace & abdomine auferes, ipsam interim glandulis, quæ in axillis habentur, adhuc connexam sinens. Auulsa itaq; ad axillæ usq; cavitatem membrana, hæc ad lucem extendenda est: ac diligenter animaduertendū, num ea sub axillis in carnosum degeneret musculus, à lumbis & spurijs costis (ut Galenus docuit) incipientem. Verum interim sedulo cauebis, ne eò ruditis uenias, ut adeps, qui in thoracis lateribus, totoq; dorso occurrit, carnis loco tibi imponat. Vidi enim quosdam tam rudes, ac in similibus partibus dignoscendis adeo negligenter uersatos, ut primo intuitu adipem dorfi, carnem esse arbitrarentur, quod multo magis illum hinc, quam alibi propter incubitum rubere cernerent. Quando enim cadauer longo morbo non extenuatum, una atq; altera die dorso incubuit, tota incubitus sedes, quasi inflammatione obfessa rubet, atq; ideo & eius sedis adeps. Cæterum uniuersa iam membrana à corporis trunco & media brachij regione liberata, brachium pectori adducentem<sup>b</sup> musculum aggredieris, ante omnia perpendens, num alicubi promineat ille gracilis musculus, quo caudatæ simiæ donantur, quiq; à manillarū regionibus sursum obliquè fertur. Verum quum isto homines destituuntur, iam musculi brachium pectori adducentis caput, à clauicula, & tota ovis pectoris regione, ipsiq; insertis cartilaginibus, nouacula aut cultello abrades, ac hamulis aut summis digitis apprehensum, ad humerum usq; à subiectis corporibus separabis. Dum uerò musculi huius caput nouacula liberas, accuratè studendum est, ne quid aliud unà cum illo auferas. In canibus enim ac simijs, uerarum costarum cartilaginibus<sup>c</sup> musculus obtenditur, quem ferè<sup>d</sup> recti abdominis musculi partem esse dicemus, & qui à Galeno uice proprii thoracis musculi habetur, quemadmodum in musculorum thoracem mouentiū enarratione dicturi sumus latius. Nunc autem eius meminisse, ut etiam si ego in homine illum minus reperiā, studiosi tamen ipsum obseruare conentur: cōmitonesq; inter dissecandum sese admoneant, eiusmodi musculum ex Galeni sententia hinc latere, ac proinde non oscitanter musculus brachium pectori adducentem oportere suo principio liberari, aut liberatum, non deberi negligenter abijci. Neq; huic solum animus accommodandus est, uerum & illi, qui in simijs sub musculo brachium ad pectus mouente occultatus, ad articuli ligamentum exporrigi aliter atque in hominibus dicebatur. Cæterum magnum hunc pectori brachium adigentem musculum in præsentia humero adhuc appensum relinquens, ad reliquos brachij accedes: quos commodè administrare nequis, nisi prius ablato<sup>e</sup> musculo, qui ab occipitij osse procedens, per totam ceruicem extenditur, & toti scapulae spinæ, summoq; humero, unà & huic proximæ clauiculæ<sup>f</sup> sedi inferiæ, quique hinc per scapulæ gibba & basim deorsum protenditur, donec mucrone suo octauæ thoracis uertebrae spinæ committatur. Est enim musculus iste ab occipitio, ad octauam usque thoracis uertebra, spinarum apicibus quodammodo connexus, ab ipsisq; principium sumit. Verum de hoc musculo, & cæteris scapulam mouentibus, postea agemus. nunc autem obiter eius mentio incidit, quod posteriores brachium mouentes conspici aptè nequeant, nisi ille à spina & occipitio ad ipsius usque insertionem liberatus fuerit. Administratur uerò nouacula aut cultello, secundum spinæ

Primi brachij  
mouentiū mus-  
culi admini-  
stratio.

Lib. 6 de Ad-  
ministr. consil.

Administra-  
tio secundi sca-  
pulae mouen-  
tiū, ut reliquos  
brachij scitè  
aggrediaris.

b 3 tab. 2.

c 5 tab. ab  
r ad fert.  
d 5 tab. a.

e 9 tab. r.  
a. ubi mu-  
sculus iste  
plene cir-  
conscriptus  
est.

f 2 fig. 2.  
cap. 22 lib.  
1 ab 1 uer-  
sus Q.

dorsi longitudinem facta sectione, quæ musculum illum duntaxat ad subiecta usq; uulneret: deinde altera secundum occipitiū est ducenda, quæ ibidē etiam musculi principium ab occipitiū ossē liberet. At si fortassis subiectum aliquem musculum illis sectionibus uitandum metuis, buxum cultellū exterioribus musculi lateribus subdes, illi scilicet lateri, quod ab occipito ad clauiculam fertur: & deinde illi, quod à summo humero, seu clauicula, ad ostē auræ thoracis uertebrae spinam descendit. Cultello enim lateribus indito, & sursum deorsumq; acto, à subditis musculis illum scapulæ musculum abscedere coges, atq; ipsius nerui principij crassitiem facili tunc coniecturabis, musculumq; à substratis corporibus iam liberatum, paruo negotio ad ipsius insertionem perduces. Verum rursus sub hoc, uti etiam in peculiari huius musculi enarratione audies, obseruandū est, ne unā cum ipso musculus ab occipito in scapulam procedens auferatur, quem Galenus scapulā quoq; sursum trahere prodidit. Neq; hoc eō dico, quasi homines hunc cum simijs cōmunem haberent: uerū ut non perfunctoriē, an illo quoq; homines donētur, animaduertas, & simia administrationi simul adhibita, hæc nostra cum Galeno (si modō diligens Naturæ sis admirator) conferas: neq; etiam canibus hic confidas, qui quemadmodum equi, & boues, & cetera quæ clauiculis carent animalia, plurimum in brachium & scapulam mouentibus musculis, à simijs uariant. Quæ adhuc alium insuper habent musculum, ab externa sede transuersorū processum quatuor primarum ceruicis uertebrae enatum, & in scapulæ spinam insertum, quo homines etiam carent: esset tamen & iste quoq; in hominibus, si reperiretur, iam diffecandus. In simijs igitur, tribus his scapulam attollentibus musculis ad ipsum usq; insertionem post liberata eorundem principia deductis, in homine autem unico duntaxat, quem is tantum ex tribus illis simiarū musculis obtinet, uersus insertionem perducto, musculum, cuius beneficio brachium eleuamus, aggredieris, eius caput ab uniuersa scapulæ spina, summo humero, & clauiculæ media sede, nouacula aut cultello proximē ossi adiecto absecans, donec illum transuersam in humerum insertionem moliri conspexeris. Posteaquam uerō huius musculi triangularem figuram, & sui capitis, quod iam obtusum trianguli uerticem ostendet, formam perpenderis, non solum in superficie is undiq; est intuendus: sed summa diligentia inquirendum uenit, num tota illa moles, articulum exterius integens, quamq; nos unius musculi loco habemus, plures musculi sint, mutuo sibi incumbentes: quemadmodum Galenus in quinto libro de Administrandis cōsectionibus uidetur innuere, immerito, uti aliās sapiens, ueteribus dissectionis professoribus (qui in hominum cadaueribus sese exercebant) nescio quam oscitantiam imponens. Examinabis itaq; uniuersum musculi principiu, ac quomodo crasset, carnosusq; sensim musculus efficiatur, considerabis: ac insuper tendine etiam (qui simplex est) examinato, per transuersum undiq; musculum hunc diuides: ut aliquando fatearis, illum nihil minus quam duplicatum esse, neque illam referre speciem, quam tres primi, ab illo ossē enati, & femoris motibus famulantes musculi, simul mutuo incumbentes, pulchrē exprimunt. Cæterum duobus primis brachium mouentibus musculis ab humero abscētis, musculū, qui brachium deorsum mouet, à subditis illi partibus ad insertionem usq; liberabis. quod factū est facillimum, si secundum spinæ longitudinē, à qua principium assumit, lineam duxeris, quæ membraneū ipsius principium duntaxat perfecerit. Quam itaq; principiu liberaueris, hamulo aut digitis id apprehendes, uniuersum musculum retusiori nouacula à subditis musculis separās. In hac administratione,

Administratio  
secundū bra-  
chium mouen-  
tium.

Quarta admi-  
nistratio.

b 4 tab. x.  
10 tab. a.

i 9 tab. v.  
10 tab. b.  
11 tab. x.  
h 10 tab. b.

qualiter

10 tab. Y. qualiter musculus iste basis scapulæ humiliorem angulum transcendat, scapu-  
 læq; adhæreat, contueberis: & deinde, si principium ipsius uariè ad originis lo-  
 cum protenderis, manifestè quo modo hic musculus brachium detrahat, &  
 nihil minus quàm scapulam primariò moueat, addisces. Porrò quum lineam  
 illam moliris, quæ eius musculi principium à spinarum apicibus libera, cau-  
 dum sanè est, ne unà quoq; disseces<sup>m</sup> initiū ab dominis musculi oblique ascen-  
 dentis: & deinde<sup>n</sup> illius, qui transuersim à spinis quoq; uertebrae enatus, in  
 11 tab. A. decimam & undecimam thoracis costas inferi dicitur. Quapropter si tuis ma-  
 nibus parum fidis, idem in hoc musculo tentabis, quod in illo experiendū pro-  
 9 tab. F. bauerimus, qui<sup>o</sup> secundum scapulam mouentiū nobis numeratur: ut scilicet pro-  
 tensam manum, aut buxeum cultellum externo musculi lateri subdas, atq; il-  
 lum transuersim sursum deorsumq; actum, tantisper moueas, donec ad spina-  
 rum usq; apices musculū à subditis organis diuisum esse conieceteris. hac namq;  
 ratione principij sui membranei crassitiem promptè cognosces, & quàm altè  
 cultellus aut nouacula ad hoc separandū immitti debeat, exquisitè intelliges.  
 Verū omnino opportunè feceris, si stylum aliquem longiorem, rotundoq;  
 ornatum tuberculo, sub musculi principio rectè protenderis, & sensim cultel-  
 lo sub musculo ad styli latus demisso, principium diuideris, cultelli semper acie  
 extrorsum ducta, & leuiter obliquata, sursumq; semper cum stylo protusa, ad  
 eum ferè modum, quo chartā diuidimus. nisi etiam eo artificio uti uelis, quod  
 eruendis è uesica calculus adhibemus, quum siphonem instar dimidiæ canalis  
 effictum, uesicæ ceruici indimus, ut dein in eius cavitatem sectio molitur,  
 eo prorsus modo, quo pilosi serici textores sericum in pilos diuidunt: his enim  
 rationibus omnia pulchrè diuiduntur, quæ secundum styli longitudinem  
 10 tab. G. dissecanda, in posterum subinde audies. Quando igitur<sup>p</sup> musculum, quo bra-  
 chium decliue agitur, ad humerum perduxeris, tendinem ipsius ab humero li-  
 9 tab. S. berabis: ac demum<sup>q</sup> musculo retrorsum brachium trahenti te accingēs, ipsius  
 11 tab. R. initium similiter ab humiliori scapulæ costa abscindes: & accuratè indagabis,  
 num Galenus uerius huic circumuertendi munus attribuerit, quàm nos<sup>r</sup> mus-  
 sculo gibbam scapulæ sedem occupati. Poteris itaq; tertium brachij motuum  
 opificem musculum, tam diu humero appensum relinquere, donec illum qui  
 scapulæ gibbū opplet, & septimus nobis enumeratur, à scapula ad articuli usq;  
 12 tab. H. H. ligamentum abraferis, ut scilicet eo uerius singula expendas.<sup>s</sup> Musculum, qui  
 scapulæ cavitati incumbit, quæ inter spinam & superiorem ipsius costam ui-  
 situr, à scapula ad ipsius usq; insertionem derades duabus lineis, una per spinæ  
 scapulæ superius latus, altera secundum elatiorem eiusdem costam, ductis. Bra-  
 7 tab. T. chium circumagentium<sup>t</sup> musculus, qui internam scapulæ sedem sibi uendi-  
 cat, non nisi prius scapulam sectionis serie à clauiculis solueris, cōmodè se spe-  
 ctandum offert. Verū quia integris adhuc scapulam mouentibus musculis,  
 inopportunè hanc à clauicula separaueris, aut etiam unà cum clauicula à tho-  
 race ipsam præter rationem modò seiungeres, ab eius musculi, quem ordine  
 brachium mouentium sextum esse retuli, administratione tantisper tempe-  
 rabis, dum sectionis serie cauum scapulæ tibi occurrerit, & musculum hunc ex  
 12 tab. L. illo promptè deradere queas. Conduxit quoq; interdum &<sup>u</sup> quintum  
 brachium mouentium musculum hucusq; referuare, ut qui  
 sexto continuus sit, pulchrè & commodè  
 perspiciatur.



AND. VESALII DE CORPORIS  
DE LIGAMENTIS HUMERI AD  
Scapulam articuli. Caput xxxv.



Ligamenta hu-  
merum scapu-  
lae connectunt.

Ceterum articu-  
lus communis.

Tria propria.

Primum.

Secundum.

Tertium.

Ligamen ab in-  
teriori scapulae  
processu in supe-  
riorem perti-  
nens.

LIGA-  
mentorum ad-  
ministratio.

RIMO libro<sup>a</sup> rotundum magnumq; humeri caput, & non admodum latum, neq; insigniter profundum scapulæ<sup>b</sup> acetabulū (propter uarios, quos brachio obimus, motus) meritò extructa esse retuli. Ne autem laxus adeò articulus malè custodiretur, & humerus quouis ferè motu sua sede excideret, processus quosdam scapulæ, & uaria deinde ligamenta, inuicem ossa colligantia, Naturam protulisse subiunxi. Cæterum quum iam articulum quodammodo munientes processus, ac plerosq; hunc stringentes<sup>c</sup> musculos absolui, tempus sanè postulat, ut articuli etiam ligamēta seriatim nunc pertractem. Tria itaq; robusta humerum in scapulæ acetabulum connectunt ligamenta, præter commune, omnes articulos instar mēbranae, nunc tenuioris, nunc crassioris ambiens uinculum. Quod igitur amplum & membranofum est, omnibusq; articulis commune, orbiculatum ex supercilijs ceruicis scapulæ principiū assumit, ac totum articulum ambiens, in radicē interni capitis humeri primū inseritur: & deinde totius exterioris capitis amplitudini, ac utriusq; ceruici implantatur. Aliorum uerò trium<sup>d</sup> duo quidem ad amūsum instar neruorum teretia uisuntur, tertium uerò nonnihil amplum. Enascitur autem<sup>e</sup> primum ex<sup>f</sup> apice interioris processus scapulæ: & hinc procedens, internis anterioribusq; partibus exterioris humeri capitis circumdenditur, ualidissimè huius capitis sedis impressioni adnatum. Alterum uerò, quod crassius maiusq; isto est, ex ceruicis scapulæ superiori<sup>g</sup> parte, ubi summo humero submittitur, ortum ducit: & interioris humeri caput superans, inseritur toti illi exterioris capitis<sup>h</sup> regioni, quæ ad exteriorem latius eius sinus extuberat, qui exteriori<sup>i</sup> capiti musculi cubitū flectentium anterioris uiam præbet. Huius ligamenti anterius latus, posteriori primi ligamenti connascitur lateri, ac simul ambo uelut transuersum ligamentum efformant, caput dicti nunc musculi in suum sinum seruans. Reliquum uerò tertium, ex eadem cum secundo regione principium nanciscitur: ac obliquè hinc porrectum, inseritur in totam posteriorem exterioris capitis humeri<sup>j</sup> sedem, adeò ut præfens ligamentum posteriorem articuli ambiat regionem: ut enim amplum obtinet principiū, ita quoq; ampliorem molitur in humerum insertionem. Cæterum præter hæc tria, quæ præcipuè humerū, ne deorsum extrorsumq; ab acetabulo scapulæ labatur, continent, aliud est adhuc<sup>k</sup> ligamentum, humerum sursum & in anteriora, ad mediam nimirum inter summum humerum, & interiorem scapulæ processum, sedem luxari prohibens: hoc enim similiter ualidum, ab interiori processu scapulæ, sursum obliquè ad summum humerum porrigitur, articulum humeri cum scapula nusquam contingens. Atq; huic eidem muneri subseruit<sup>l</sup> nerueum caput anterioris cubitū flectentium musculi, quod ab eminentissima scapulæ acetabuli sede enatum, inter articuli ligamēta humeri caput transcendere, illiusq; finem incumbens, deorsum ferri audies. Horum quoque ligamentorum administratio, non nisi scapulam mouentibus musculis, & cubitum flectentibus dissectis, aggredienda est, quæ tunc cultellis paruulis, sed acutioribus celebrabitur. atq; omnium primum id secundum ueniet, quod ex interiori scapulæ processu exoritur: deinde alia duo peculiaria, ab ipsorum radice ea liberans, usque ad humerum singula deduces. Neque hîc interim oscitanter animus adhibendus erit, ne quum secundum ligamentum aggredieris, unà quoq; caput exterioris cubitum flectentiū musculorum

a Hæc feriatum perter ex 1. 2. fig. cap. 23. lib. 1. A. B. C. D. E. F. G.

b 2. fig. cap. 21. lib. 1. A. B.

c 1. fig. cap. 21. lib. 1. A. B.

d magna ex parte qui brachii unum mouet.

e id quum nulla obli- neat crisi- tiem, seu de- delicat nequit, quum ille occurrit, ubi in tabu- lis ossa de- tella spe- ciuntur, ut

f 8 tabula.

g 13. tab. V.

h 5. tab. d.

i 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

j 1. fig. cap. 23. lib. 1. B. figura 4.

k 6. tab. d.

l 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

m 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

n 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

o 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

p 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

q 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

r 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

s 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

t 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

u 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.

v 1. fig. cap. 23. lib. 1. A. B.







dorsum agi insinuaret: quorum inferior, est huius nostri musculi humilior pars, ab octo superioribus, non autem (ut Galenus inibi docet) duodecim thoracis uertebrae spinis præcipue originem assumens, quam etiam alibi demissiore scapulae musculum appellauit. Vtunque sit, parua hic nobis cum Galeno futura est dissensio, si ambos ipsi enarratos musculos, unum continuum corpus esse annuerit. Nam etsi fortassis musculi huius<sup>o</sup> insertio, quæ instar latae, ac oblique admodum procedentis lineæ perficitur (quantum uis etiam & in hac tota musculus continuus sit) illum in duos distinguere appareret, nulla tamen prorsus discriminis nota inter dorso spinam & scapulae basim habebitur, ubi tamen distinctionem lineamque, secus ac res se habet, confingere debes, si modo superiorem Galeni musculum, trapeziæ figuræ quouis pacto assimilaturus sis. Ea siquidem<sup>o</sup> lineæ, quæ à ceruicis radice, secundum scapulae spinam, & summum humerum, & latiore clauiculæ sedem duceretur, comparanda uenit basi trianguli rectanguli, in cuius summo lineæ æquè distans à basi ducta sit. Quemadmodum ea musculi<sup>o</sup> lineæ, quæ secundum spinæ ceruicis longitudinem fertur, illi trianguli lineæ assimilatur, quæ perpendiculariter trianguli illius basi incidit.<sup>a</sup> Quæ autem ad occipitium transuersim ducitur, illi lineæ correspondet, quæ in trianguli uertice æquè cum basi distat. At<sup>e</sup> quæ ab occipitio ad clauiculam procedit, obliquo trianguli lateri confertur. Cæterum nunc magis à Galeni dogmatibus mihi reclinandum est, idque præcipue propter simiarum ad homines differentiam. Primum enim, si Galeno credideris, te ipsum inscitia oscitantiaque inter secandum insimulabis, quum deinceps alios musculos scapulam attolentes, in homine sedulo indagare conaberis. Ex Galeni namque placito, sub eminentiori nobis dicti iam musculi parte alium inquires, qui illo longè gracilior, minorque, sed totus tamen carnosus esse deberet: & qui ex occipitij ossis, sub nuper dicto musculo enatus, deorsum modicè uersus anteriora oblique descenderet, & altiori basis scapulae angulo exporrectus, in latum tendinem desineret, ad medium usque basis scapulae interiùs insertum, è regione radices spinæ scapulae. Huic id munus concreditum esset, ut scapulae basim uersus occiput attolleret. Verum hunc frustra mecum in homine (quod ipse illo destituatur) indagabis: quum interim promptissimè is in caudatis simijs occurrat, eam prorsus fabricam, quam Galenus ipsi tribuit, quamque ego iam descripsi, seruans. Rursus in caudatis simijs alium obseruamus musculum, à Galeno quoque enumeratum, qui carnosus principio, ex primæ ceruicis uertebrae transuerso processu, dein & ex tertiæ & quartæ uertebrae transuersis processibus enascitur, non quidem ex interna ipsorum sede, sed ab externa magis. Hic musculus, postquam primum ex reliquis musculis, qui ceruicis uertebrae adnascuntur, emergit, teres, sed tamen latior, quam profundior apparens, deorsum in posteriora, uersus scapulae basis superiorem angulum perfertur, illiusque internæ sedi carnosus ac latior redditus insertatur. Insuper simiæ alio quoque musculo donantur, quem inter Galeni musculos scapulas attolentes, si quartum de Administrandis sectionibus adamusim discussæris, quarto loco enumerari reperies. Atque hic mihi ab interna transuersi primæ ceruicis uertebrae processus sede, deinceps & tertiæ quoque & quartæ ceruicis uertebrae transuersis processibus, carneo principio nasci uisus est: quod prædicto nunc musculo latius redditum, deorsum quoque, sed minus in posteriora tantisper ducitur, dum carnea lataque insertionem in scapulae spinam inferatur, in ea spinæ sede,

Musculus scapulam attolens, quo simia abundat.

Tertius musculus simiæ scapulam attolentium.

Quartus, quæ simiæ sibi primatim, secus quam homines uidentur.

*Tertius homi-  
nis scapulam  
mouentium.*

qua hæc summum humerum producit, ac quæ quodammodo è regione ceruicis scapulæ consistit. Cæterum ut homines prorsus secundo Galeni musculo, qui ab occipite in simijs exoriri dictus est, destituuntur, ita etiam & quarto. Verum<sup>1</sup> tertium musculus homo cum simijs communem nanciscitur, sed nonnihil quàm simiæ ualidiorem. Exoritur enim homini musculus ualidus à<sup>2</sup> transuerso primæ ceruicis uertebræ processu: deinde &<sup>3</sup> transuerso processu tertiæ uertebræ, quartæ & quintæ, quasi diffunctis constaret principijs: uno nimirum, quod primæ ceruicis debetur uertebræ: altero autem, quod tribus secundæ uertebræ proximè subiectis ascribitur. quanquam etiam interdum à<sup>4</sup> transuerso secundæ ceruicis uertebræ processu musculus hic, sed parua origine nasci uisus sit. Principia hæc, simulatque ex reliquis uertebras ceruicis amplexantibus musculis emergunt, unà coeunt, & ualidum efformant musculus, nonnihil latiore, quàm profundum, qui lata carneq; in insertione in internam superioris anguli scapulæ basis sedem inseritur, scapulam sursum uersus anteriora, ceruicisq; latera trahens. Non inopportunè itaq; hic musculus nobis scapulam attollentium alter dicetur, aut saltem omnium scapulæ motorum tertius in hac nostra serie locabitur. Galenus suis omnibus scapulam attollentibus musculis, addidit oblongum gracilemq;<sup>5</sup> musculus, quem ex osis *v* referentis lateribus procedentem, scapulæ, propter ipsius ceruicem, interiori ex parte inferi, scriptum reliquit, & eius musculi beneficio in anteriora colli scapulam attolli opinatus est. Ego autem in Capite de osis *v* referentis musculis, huius osis gratia, non autem scapulæ, musculus hunc efformatum asserui: ac proinde cuius nam motus autor is censerī debeat, diligenti sectione uenit indagandum. In hoc enim simijs nulla cum hominibus est differentia, nisi quòd simijs toto progressu carneus uideatur: hominibus autem in medio ductu gracilescit, tendinis speciem monstrans, & duobus quasi musculorum uentribus donatus. quod sanè Galenus, si hominem unquam secuisset, non minus animaduertisset, quàm<sup>6</sup> musculos inferiorem maxillam

*Musculus, inter scapula<sup>7</sup> attollentes à Galeno perperam descriptus.*

*Quartus hominis scapula<sup>8</sup> mouentium.*

deorsum ducentes duobus donari uentribus obseruauit.<sup>9</sup> Vnus adhuc musculorum scapulam mouentium reliquus est, qui hanc retrorsum ad dorsi spinam, uersus superiora nonnihil agit. Hic musculus amplus & tenuis, sed omni ex parte carneus uisitur: & à quartæ, quintæ, sextæ & septimæ ceruicis uertebrarum, deinde quatuor aut quinque primarum thoracis uertebrarum spinis<sup>10</sup> principium ducens, toti propemodum scapulæ basi carneus, ac æquè ut in exortu<sup>11</sup> latus inseritur, fibras obtinens non prorsus transuersas, at nonnihil oblique à dorso, ad scapulæ basim deorsum ductas. Quibus uerò musculis hic quadrilateris musculus (cui Galenus nimum latum initium ascripsit) & alij omnes tegantur, quibus<sup>12</sup> uelli obducantur, sectionis semper series, & musculorum tabulæ leui negotio monstrant. Quod profectò non oscitanter in illo<sup>13</sup> musculo obseruandum præcepimus, qui brachij ad dorsum uersus inferio<sup>14</sup>ra motus autor est: quem Galenus in libro decimotertio de Vsu partium, scapulam quoq; deorsum ducere, parum rectè prodidit. Ego autem huius quoq; modo meminī, ne quis in musculorum scapulam mouentium numero, Galeni nomine alium in super, quàm hactenus enarraui, requirat.

*Lib. 4. de Admuni<sup>15</sup>strat.*

*Musculus quo brachium detrahitur, scapulam non mouere.*

f 7 tab. H.

6 tab. K. 8

1. 10. 11 C.

12 G. 13 Q.

8 10 R. 11

15 lib. 1. 2.

b cistam

fig. 2.

i 5, 6, 7 R.

cap. 15 lib.

1 H.

k 1 R. cap.

21 lib. 1. 2.

l 5 tab. A.

S.

m 5 tab.

H. 1.

n 10 tab. f.

o 10 tab. 2

G ad H.

p 10 tab.

ad 1 ad K.

q 11. 6.



ORVM musculorum administrationem pari, qua reli-  
quos omnes, methodo aggredieris.<sup>a</sup> Primi enim, quo sca-  
pula pectori adducitur, principium, nouacula à coltis, un-  
de prodiit, liberandum est: & deinde toto musculo à tho-  
race ad internū usq; scapulæ processum separato, ipsiusq;  
attractis principijs, cuius potissimū motus opifex ha-  
bendus sit, inquires: num scilicet brachium potius, ut Ga-  
lenus docebat, quam scapulam, uti ego dicebam, moueat.<sup>b</sup> Secundum muscu-  
lum, quem & scapulam attollere & deorsum trahere dixi, in musculorum bra-  
chium mouentium administratione iam antea es aggressus: unde etiam hic  
ipsius sectionem neutiquam oportet repetere, quemadmodum nec eorum  
musculorum obseruationem, qui simili in collo priuatim tribuuntur, & à Ga-  
leno, perinde ac si hominibus quoq; communes forent, describuntur. Verū  
tertius scapulam mouentium, qui à ceruicis uertebreis ad superiorem scapu-  
læ basis angulum ducitur, suo principio prorsus liberādus non est, nisi aliquot  
ceruicis musculis antea præsectis. Ac proinde operæ precium erit, illum trans-  
uersum, ubi primū ex ceruicis musculis emergit, abscindere: ipsiusq; princi-  
pio ad uertebreas relicto, illum à scapula liberare, illius tamen functione prius  
perpensa.<sup>d</sup> Quartum musculum leui longaq; sectione à spinarum apicibus se-  
cabis: & ubi ipsius insertionem adamusim obseruaueris, eundem à scapula se-  
moueabis, sedulo cauens, ne tertium hominis thoracem mouentium muscu-  
lum simul reseces, aut saltem imprudenter suo exortu liberes. Deinde si lon-  
gus ille musculus, quem contra Galeni sententiam, osi u referenti proprium  
esse retuli, adhuc asseruatus sit, non oscitanter specta, num scapulæ, an illius of-  
sis gratia, hunc rerum Opifex procreauerit. Nunc cultello, quam licebit pro-  
ximè, ligamenta à summo humero & clauiculis, quā inuicem committuntur,  
refecabis, summum humerum à clauiculis liberans, & peculiarem huius arti-  
culi cartilaginem obseruans, quæ illi similis est,<sup>e</sup> quæ in maxillæ inferioris ad  
temporum ossa articulis, & clauiculæ rursus cum pectoris osse nexu adinue-  
nitur. Deinde accuratè perpendes, num tertium aliquod os hic, præter clauicu-  
lam, & summum humerum, cum ipsius appendice, dictaque nunc cartilagi-  
ne existat: cuius Hippocratem in libro de Articulis, de brachij luxationibus  
differentem meminisse, Galenus docet. Sed quid de illo osse sentiam, primo li-  
bro sum executus. Vbi itaque clauiculam à scapula diremeris, hæc in sua sede  
diligenter seruanda uenit. Verū uasis ex thorace in brachium proreptanti-  
bus funiculis binis interceptis, & deinde in funiculorum medio resectis, scapu-  
lam à thorace euertes, ut iam circumuertentis brachium musculi naturam  
inspicias, qui cauam scapulæ sedem occupat. Hoc itaque ab osse undique era-  
so, atque ad articuli ligamentum deducto, & eius functione perpensa, illum  
quoque abijcies, ut nunc scapula nulli alteri firmata parti, à thorace  
maximi musculi interuentu hæreat, qui thoracem  
mouentium secundus enume-  
rabitur.

Primi admini-  
stratio.

Secundi.

Terti.

Quarti.

Clauiculæ à  
scapula libe-  
ratio.



Capitis motus.



VPERIORI libro, cervicis uertebraꝝ fabricam describentes, & Galeni sententijs nos meritò parum accommodantes, caput proprijs motibus & secundarijs moueri retulimus. Quot enim proprijs motibus ceruix agitur, totidem etiam secundarijs caput mouetur: ac ceruix quidem extenditur, seu in posteriora uersus dorsum ducitur, & in anteriora flectitur: deinde utrinq; ad latera, ad humeros

scilicet etiam inclinatur. Caput autem uno proprio motu, uel quiescente etiam ceruice, flectitur & extenditur, seu antroꝝsum & retroꝝsum, idq; supra primam ceruicis uertebraꝝ, fertur: & dein alio ipsi prorsus peculiari motu supra secundam uertebraꝝ, ueluti ad axim circūducitur, siue flexum, siue extensum cum ceruice, aut citra ceruicē existat. In latera uerò, seu uersus humeros, caput non, nisi ceruicis beneficio, ac ueluti secundario, inclinatur: quum immota rigidaq; ceruice, ne minimū quidem caput proprio motu humeris adducamus. Tempestiuum itaq; nunc fuerit, ijs musculis, qui ceruicis præsumt motibus, in suum locum asseruatis, eos aggredi, qui proprijs capitis motibus famulantur, septenis complexi paribus, partim caput, partim primam ceruicis uertebraꝝ agentibus, quorum sex in posteriori ceruicis consistunt sede, à quibus sermo modò est inchoandus. Verūm anteaquam ad horum enarrationem Galenus accessit, duo alia musculorū paria ex dissectionis serie præposuit, scapulæ motibus feruentia: quorum unum homines cum simijs commune nanciscuntur, id

In 4 libro de Admin. scilicet.

Primum par musculorū aut caput, aut primam uertebraꝝ mouentium.

scilicet, cuius alterius lateris musculus in scapulæ spinam, summū humerum, & latiusculam clauiculæ partem inferi dictus est. alteri autem pari homines destituuntur, cuius in altero latere musculus ab occipitio enatus, ad altiore basis scapulæ angulum in simijs protendi commemoratus est. Atque hinc fit, primum caput mouentium par Galeno tertia serie inter musculos ceruicem occupantes enumerari, quod duobus constat musculis, principium ducentibus ex apice quintæ thoracis uertebraꝝ spinæ: dein etiam ex quartæ, tertię, secundæ & primæ uertebraꝝ thoracis spinarum apicibus. Principium hoc, quā primum ex quinta thoracis prodeit uertebra, acutum refert angulum, qui sursum tensus, sensim ita latefcit, ut ad tertiam secundamque thoracis uertebraꝝ iam porrectum, adeò amplificetur, ut externū ipsius latus è regione transuerforum processuum earundem uertebraꝝ consistat. Ambo musculi hanc seruantes latitudinem, sursum feruntur, à quinq; etiam inferiorum ceruicis uertebraꝝ spinis (sed nimis quā leuiter) exortum assumentes. Quando autem ad tertię ceruicis uertebraꝝ usq; spinam conscenderunt, quum hæc nus toto progressu dexter sinistro coniunctus fuerit, utriq; ab inuicem sensim magis magisque tantisper abscedūt, dum transuersa linea occipitis ossi carnea lataq; insertione implantentur. Eius enim insertionis tāta est amplitudo, quā tum internum alterius musculi latus à media occipitij sede, & externū latus ab auris radice remouentur: adeò, ut insertionis amplitudo utriusq; musculi tanta sit, quantum ab una aure ad alterā occipitij est interualli, quod musculorū insertione non occupatur. Cæterum istius musculorū ab inuicem recessus forma, triangularis exactè uisitur, si modò unam lineam transuerfam ad occipitium, ab interno unius musculi latere, ad internū latus alterius duxeris: & deinde alias duas ab eius lineæ terminis, secundum utriusq; musculi internum latus, ad tertię ceruicis uertebraꝝ spinam, ueluti ad trianguli uerticē porrexeris.

Rursus

g. 1. f.

h. 11. f.

10. 11. f.

A

c. 12. f.

d. 12. f.

e. 12. f.

B.

f. 12. f.

E. D.

Rurfus finguli mufculi<sup>a</sup> triangulari forma conftant, fi lineam fecundùm fpinae longitudinem ad occipitium ufq; ductam, unius lateris loco habueris: & fecundi lateris uice, lineam fecundùm externum mufculi latus exporrectam: & tertij lateris loco lineam, quæ tranfuerfim mufculi infertionem ad occipitium defcribit. Fibrae horum mufculorum, à fpinis uertebrarum furfum oblique, quafi ad tranfuerfos fuperiorum uertebrarum proceffus tantisper ducuntur, dum fimul omnes in occipitium finiant: præfentes enim mufculi modicum prorfus & exiguum in tranfuerfos uertebrarum proceffus nexum moliantur. <sup>b</sup> Secundum mufculorum par, admodum fanè uarium, & fecus multò in homine, quàm canibus & fimijs, obferuamus. His namque ex tranfuerfis tertiae quartae ue thoracis uertebræ proceffibus, & infuper fecundæ ac primæ quoq; thoracis, & quinq; humiliorum ceruicis uertebrarum tranfuerfis proceffibus, mufculi iftius paris enafcuntur, & ad earundem uertebrarum fpinas procedentes, ipfis nonnullis infertionibus appllantantur. Deinde dexter nufquam toto progreffu à finiftro recedit, fimulq; ambo in occipitiij medium ampla infertione innafcuntur, nullibi nerueum aliquid, quod notatu dignum fit, oftendentes: etfi interim obliquas quasdam impreffiones exprimant, ex tranfuerfis inferiorum uertebrarum proceffibus, ad fuperiorum quodâmodo fpinas excurrètes. at illæ leuiiores cenfendæ funt, minusq; penetrant, quàm ut his aliqua ex parte mufculum diuidi quis dicere queat. Quanquam Galenus nonnullos diffectionum profeffores, non duos huius paris tantùm mufculos enumeraffe, uerùm quofdam quatuor, quofdam uerò fex ibidè recenfuiffe, uideatur teftari, qui aliter ac Galenus homines aggrediebantur. In fimijs enim & canibus (de quibus hætenus in hoc fecundo pari locutus fum) unum duntaxat utrinq; mufculum recenferem: quandoquidem fi illis attendendum foret infertionibus, totidem ferè mufculorum loco uterq; habendus effer, quot funt ex tranfuerfis uertebrarum proceffibus exortu, & in earundem fpinas infertiones. In homine itaq; multo aliter hanc cõiugationem, quàm Galenus illam defcripfit, aut enumerauit potiùs, obferuauit. Apparent enim quàm plurimi utrinq; mufculi, ferie multiplici inuicem commixti, & admodum uariè principium obtinètes, & diuerfis omnino rationibus infertiones in occipitium molientes. Illico enim atq; primum mufculorũ par fubductum eſt, mufculus occurrit, qui acutum principium ex medio tranfuerforum proceffuum quintæ & quartæ thoracis uertebræ educit, & ilico ab exortu carneus apparens, muris & lacertæ formam adipifcitur: quum uerò furfum ad ceruicis initium<sup>k</sup> perreptat, carnofus eſſe definit, ac ueluti in teretis tendinis naturam ceſſat, mufculum imitatus, qui maxillam humiliorem deorfum trahit, duobusq; uentribus donatur. quandoquidem<sup>m</sup> inibi, quàm mufculus iſte fecundi paris caput mouentium, ceruicis radicem fuperauit, carnofus denuò eſſe incipit, quouſq; in occipitij ofſis medium<sup>n</sup> inferatur. Verùm ante ipſius infertionem, cum illo alius<sup>o</sup> coit mufculus, qui ex ſeptimæ ceruicis uertebræ ſpina, nerueo tereti<sup>p</sup>; principio enatus, furfumq; aſcendens, carnofus quoq; euadit, & unà cum dicto mufculo occipitio inferitur, ubi dextri lateris mufculi, finiftri lateris mufculis contigui ſunt, neq; ab inuicem (ut primum par) remouentur.<sup>p</sup> Alius deinceps occurrit, qui ueluti alterius lateris tertius eſſe poſſit, ac ex apicibus tranfuerforum ſecundæ & primæ thoracis uertebrarum proceffuum, partim carneus, partim nerueus enaſcitur: & furfum uerſus exteriora oblique exporrectus, carnofusq; ac latior redditus, occipitio ad radicem<sup>q</sup> mamillaris in capite proceffus ualidè inferitur. Sub his magna moles carnea conſiſtit, ſecundo in canibus pari quo-

dammodo respondens, quæ à transuersis uertebra-  
 rum processibus oblique  
 sursum ad spinas exorrecta, occipitij ossi implantatur, fibras obtinens ab exte-  
 rioribus sursum intrò oblique repentes. Huiusmodi itaque secundum muscu-  
 lorum homini est coniugium: in quo cuius integrum erit, utrinque quatuor  
 collocare musculos: primum scilicet, secundum & tertium, tres illos ante car-  
 neam molem enarratos: & quartum, ipsam carneam molem. Nisi fortassis  
 quis denuò illam carnem in tot musculos subdividere proposuisset, quot in  
 ipsa impressiones, aut exortus insertionesq; uisuntur. At consultius fore arbi-  
 tror, unicum tantum par ex omnibus his, & unum duntaxat utrinque muscu-  
 lum numero statuere, quum cætera paria duobus tantum conformentur mu-  
 sculis, & omnes huius secundi paris musculi eiusdem functionis gratia pro-  
 creati sint. Hoc enim (ut primum quoque par) capitis, & obscurè admodum  
 ceruicis etiam extensionem, aut in posteriora ductum perficit. Si igitur mus-  
 culi utriusque lateris contrahantur, caput rectissimè extendent: at si alterna-  
 tim laborauerint, circumuersionis capitis motui famulabuntur. <sup>¶</sup> Tertium  
 par duobus gracilibus constat musculis, qui neutiquam prædictis mole cor-  
 respondent. Ex secundæ enim ceruicis uertebrae spinæ extremo, duo ena-  
 scuntur muscoli, non admodum neruei, qui sursum porrecti, in occipitij me-  
 dium teretes inferuntur, in ipsa insertionem minus quam in ortu inuicem con-  
 tiguui: ab ipso enim nonnihil oblique sursum ducuntur, sensim mutuò absce-  
 dentes. Hi si simul contrahantur, caput quoque solum in posteriora agunt: at  
 si alter tantum in se colligatur, sui incessus ratione, circumuersionis capitis, ut  
 duo priora paria, opifex erit. <sup>¶</sup> Quartum par, capitis etiam extensioni præ-  
 sectum, sub tertio reconditur, illi, quod ad substantiam, formam, ductumque  
 attinet, simile. A<sup>o</sup> posteriori enim primæ uertebrae<sup>a</sup> sede, ubi aliæ in spinam  
 definunt, ipsaq; lineæ modo prominens tuberculum processum<sup>ue</sup> obtinet,  
 utrinque ad processum eius latera unus nascitur musculus gracilis, & omnino  
 carneus. amboq; huius paris musculi in exortu contigui sunt: & sursum por-  
 recti, modicè ab inuicem diducuntur: & nonnihil mutuò dirempti, in occi-  
 pitium inferuntur. <sup>¶</sup> Quintum par, forma & substantia duobus prædictis  
 iam paribus respondens, iuxta externum latus tertij paris, ab occipitij osse prin-  
 cipium obtinet: atque illinc deorsum oblique descendens, in apicem<sup>o</sup> trans-  
 uersi primæ ceruicis uertebrae processum inferitur, dexter quidem musculus  
 in dextrum processum, sinister uerò in sinistrum. <sup>¶</sup> Sextum par<sup>b</sup> à spina se-  
 cundæ ceruicis uertebrae nascitur: & oblique sursum procedens, in transuer-  
 sum quoque primæ ceruicis uertebrae processum implantatur, pari prorsus  
 cum quinto coniugio ratione, formaque. Sunt enim utriusque paris musculi  
 oblongi, carnei, & paulò minus toto teretes. In cane uerò & simijs multò quam  
 in hominibus sunt crassiores & insigniores, ut etiam horum animalium se-  
 cundæ ceruicis uertebrae spina perquam amplalataque occurrit, perinde ac  
 transuersi etiam primæ uertebrae processum ampli existunt: et si interim illis  
 animalibus æquè ac hominibus tertium par cum quinto & sexto pares æqua-  
 lesq; triangulos utrinque formare conspiciuntur. Si enim trium illorum parium  
 dextros musculos unà contuleris, in dextro latere<sup>c</sup> triangulum statues: si uerò  
 sinistri lateris musculos inuicem comparaueris, etiam & hic triangulum fieri  
 obseruabis: cuius unus angulus consistit in occipitij medio, secundus ad secun-  
 dæ uertebrae spinam, tertius in sinistri lateris transuerso primæ uertebrae pro-  
 cessu. Cæterum quinti & sexti parium munus est, primam uertebra<sup>a</sup> unà cum  
 capite supra secundam circumuertere: utriusque enim paris dextris musculis  
 in se

Primi ac secun-  
di paris mu-  
sculi.

Tertium par.

Quartum par.

Quintum par.

Sextum par.

¶ 14. tab.  
A, B.

¶ 14. tab. B.

¶ 14. tab.  
F, G.

¶ 3, 4, 9. ff.  
cap. 17. lib.  
1. X.

¶ 14. tab.  
H, I.

¶ 14. tab.  
D.

¶ 14. tab.  
K, L.  
b ab E ad  
D 14. tab.

c Huius eo  
sive in 14  
tab. sunt A,  
H, K. alie-  
rius autem  
trianguli  
osse B,  
L, M.



in se contractis, prima uertebra in posteriora sinistrorsum circumuertitur: sinistris autem laborantibus, in posteriora dextrorsum conuoluitur. Atque ad hunc modum posteriores capitis musculi habent, " anteriores uerò hac ratione. Vtrinque à media superioris ossis pectoris sedis regione, secundum ipsius amplitudinem, & " clauiculæ parte, pectoris ossi ibidem coarticulata, amplum ac neruosum membraneumque musculi prodit caput, neruosius ex pectoris ossè, quàm à clauicula pronatum. Caput hoc obliquè uersus superiora procedens, carnosum, densumq; & paulo latiore quàm profundum efficit musculum, qui carnosio crassoque admodum " fine, " mamillari temporis ossis processui innascitur, illum sua amplitudine uniuersum amplexus: sic sanè, ut unicuius duntaxat utrobique in hominibus mihi repertus sit musculus, membraneo latoque in collo occurrente " musculo proximè subditus, ac citra sectionem omnibus ferè hominibus conspicuus. Cæterum in quibusdam quadrupedibus, musculum hunc in medio ductu, quo sursum fertur, diuisum bipartitum ue obseruaui, una quidem parte mamillari processui, altera autem ad auris radicem caluariæ insertum. Tres uerò huius musculi fines ac insertiones hæcenus in nullo comperi animante: multoque minus principium à pectoris ossè & clauicula procedens, in duas tres ue partes manifestè dissectum, mihi occurrit. quamuis interim hos musculos utrinque ab aliquibus Anatomicis tres, aliquando & duos enumeratos fuisse, non ignorem. Verùm hic numerus pro musculi finium ratione, in simijs & canibus inter dissectionis peritos uariat: licet plerique hos à capite natos, pectoris ossi & clauiculis inseri, thoracis motibus præfici contenderint. At neminem interim lego, qui mentione digna descriptione eos donauerit, tantum abest ut quis uerè ipsorum functionem naturamque nobis exprefferit. Vtriusque enim lateris musculus contrarijs prorsus munijs quatuor primorum parium præficitur: ambobus enim contractis, caput in anteriora, siue rigida, siue inclinata ceruice, flectitur. Si uerò dexter duntaxat contrahatur, caput in anteriora sinistrorsum circumuertitur: sinistro autem solo laborante, caput in anteriora dextrorsum circumagitur. Porro præter hos, " alij conspiciuntur musculi, quos ferè sub " stomacho latitantes, ueteres appellasse uidentur. Hi namque quatuor primarum thoracis uertebraarum, & omnium ceruicis uertebraarum corporibus connascuntur, ac partim ab iisdem principium ducunt, partimque ipsis inferuntur, non minus liquidò postmodum in occipitis os inserti, iuxta " anteriorem foraminis dorsalem medullam transmittentis sedem. At hos exactiùs inter dorsum mouentes musculos recensebimus: flectunt enim superiorem dorsi partem, capite interim proprio motu horum ope uix flexo. Quamobrem etiam inter capitis musculos uix eueniunt enumerandi: quemadmodum neque " alij adhuc quatuor (utrinque nimirum duæ coniugationes) ad ceruicis latera repositi, qui ceruicem, non autem caput proprio motu in latus agunt. Et rursus " alia coniugatio ceruicem extendens, hic prætereunda est, ac ad reliquum de dorsum mouentibus musculis sermonem asseruanda: quum & illa quoque non nisi secundariò caput moueat, ea nimirum ratione, qua brachium mouentes musculi, cubitum manumq; ducunt.

Musculi à pectoris ossè & clauiculis in caput inserti, atq; in huius capite numero 13

Musculi 13

Musculi salubis ceruicis motibus præficti.

Primi paris  
administratio.



ORVM qui capitis motibus præfunt musculorum ad-  
ministratiōem à primo pari auspicaberis, perpendens  
membraneum<sup>b</sup> cuiusdam musculi principium, quod ex  
inferiorum cervicis uertebra<sup>a</sup>rum spinis enatum, primo  
capitis musculorum pari, reliquisq; hîc dorsum mouenti-  
bus musculis infertur: ac tandem aliquot superioribus  
thoracis costis infertum, respirationis opifex efficitur. Li-  
cebit itaq; huius musculi (qui hominis thoracem mouentiū tertius erit) prin-  
cipium à uertebra<sup>a</sup>rum spinis cultello liberare: & musculo ad insertionem us-  
que à subditis diuulso, illum ibidem à costis appensum tantisper finire, dum  
thoracis musculos aggredieris. In præsentia enim cultellum retusio<sup>c</sup>rem, aut  
buxeam, sub externo primi paris musculi latere subijcies, & illum à subditis li-  
berare conaberis: deinde secundum spinæ longitudinē ducta sectione, ipsum  
ad insertionem usq; in occiput duces. quod ubi in utroq; latere præstiteris, hu-  
ius paris musculos, ab occipitio non amputatos, ita ad latus aliquod reflectes, ut  
reliquam sectionem non impediant. Mox uarios<sup>e</sup> secundi paris musculos con-  
siderabis, ea illos serie, qua enumerauî, à uerteb<sup>a</sup>ris absecans, & ad occipitium  
deducens, ut modò illorum tractis principiis, quarum functionū potissimum  
autores sint, rectè perspicias: quod tunc demum optimè uisitur, quum cere-  
brum ex caluaria ademptum est, ipsaq; inferior maxilla, quò caput leuius, ma-  
gisq; sequax sit, absecta. <sup>a</sup> Tertium par à spina secundæ cervicis uerteb<sup>a</sup>re post-  
modum liberabis, sensim illud ad occipitiū usq; à quarto pari subleuans, præ-  
cauensq; ne & id unà imprudens auferas: hoc enim nunc à prima uertebra se-  
parandum uenit, atq; ut cætera, ad suam, quam molitur, insertionem ducen-  
dum. <sup>f</sup> Quintum insuper par, ab occipitio liberatū, ad transuersos primæ uer-  
tebræ processus, quemadmodū<sup>g</sup> sextum à spina secundæ uerteb<sup>a</sup>re ad eisdem  
processus, ducetur. Reflexo iam cadauere, à pectoris osse & clauiculis, <sup>h</sup> anterio-  
rum musculorum principia sunt acuto cultello rescanda, mente interim ad-  
hibita, num plura musculorum principia simul concurrant, aut utrinq; plures  
musculi obseruari queant. Vbi itaq; & hos ad mamillares processus perduxeris,  
illorumq; insertionem rimatus fueris, eos à capite absecato: & propriis cer-  
uicis musculis in præsentia relictis, ad ligamenta capiti & duarum primarum  
cervicis uertebra<sup>a</sup>rum peculiaria, sectionem confer, quibus nunc priuatum  
Caput dedicabimus.

Secundi paris.

Tertij.

Quarti.

Quinti.

Sexti.

Decimij  
& decimiquar-  
ti musculorū.

c 13. 14. A.  
B. 15. G.  
G.

d 14. 15b.

A. B.

c 14. 15b.

G. F.

f 14. 15b.

H. I.

g 14. 15b.


L. K.

b 14. 15b.

DE CAPITIS ET PRIMAE SECUNDAE QVE  
cervicis uertebra<sup>a</sup>rum ligamentis. Caput xxx.

CAPITIS TRIGESIMI

FIGURA.



TRIGE-

PRÆSENS figura primam secundamq; cervicis exprimit uertebras, posteriori sede delineatas, unā cum earundem ligamentis, hoc Capite describendis.

A, B, C Prima cervicis uertebræ, secunda connexa. Verum A priuatim dexter primæ uertebræ sinus, qui dextrum occipitis ossis caput suscipit, indicatur. B autem sinister sinus, cui sinister occipitis ossis caput insidet. C uero primæ uertebræ sedes, ubi in spinam aliæ terminantur.

D, D, G, H Secunda cervicis uertebræ.

E, E, E Membraneum ligamentum, primam cervicis uertebram occipitis ossi colligans, aliqua ex parte hinc primæ uertebræ adhuc adnatum cernitur.

F, F Ligamentum membraneum, primam cervicis uertebram secundæ neclesis uertebræ.

G Corpus secundæ uertebræ, dentem producens.

H Dens, acutus uel secundæ cervicis uertebræ processus.

I Teres ligamentum, a dente in occipitis os insertum, hic transversum abscissum occurrit.

K Transversum ligamentum, dentem in sinu continens, qui dentis gratia in prima cervicis uertebræ celatur.



APITIS cum prima cervicis uertebræ articulationem, & secundæ item uertebræ cum prima, secundæq; rursus cum capite coniunctionem, omni dignas esse admiratione, libri superioris decimumquintum Caput explicauit. Præsens autem ligamenta articulos hos continentia perstringet. Quum itaque primam cervicis uertebram capiti copulari necessum fuit, merito uniuersum articulum ambiens

Ligamentum primam uertebram capiti committens.

a E, E, G.

b I.

Secundam uertebram capiti.

c H.  
d i. f. cap.  
u. lib. a G.

Ligamentum transversum dentis obductum.

e i. f. cap.  
u. lib. a K.

f K.

Primam secundam colligans.

g F, F.

Ligamentum administrans.





ossa abdomi-  
nis musculorū  
breuis enume-  
ratio.

obliquē de-  
scendens.

ERE OR ne & hic pariter morosior quispiam discipli-  
ne ordinem culpaturus sit, quod ante musculos abdomen  
constituentes, aut cubiti, aut thoracis, aut dorsi motores  
non aggredior: nihil enim prohibet, cubitum mouentes  
musculos modò pertractare. Sed quum hos, uicinitatis ra-  
tione dorsum agentes muscoli præcedant, & ante dorsi  
musculos, quod ad sectionis seriem attinet, thoracem mo-  
uentes, & ante hos illi, quos abdominis uocamus, dissecari debeāt: proximum  
est, abdominis musculos persequi, quibus à fibrarum ductu nomina imponi-  
mus, quosq; octonario numero comprehendimus, quatuor obliquos, & duos  
rectos, & totidem transuersos enumerantes. Obliquorum igitur in utroq; la-  
tere bini sunt, qui inuicem incumbunt, & contrarias, scq; mutuò decussatim  
intersecantes fibras obtinent.<sup>a</sup> Superioris enim fibræ deorsum uersus priora  
obliquē procedunt: <sup>b</sup> inferioris uerò sursum obliquē ad anteriora tendunt. Re-  
ctorum ab utroq; latere <sup>c</sup> unicus est, suas fibras secundum corporis longitudi-  
nem extensas obtinens.<sup>d</sup> Transuersorum similiter unus utrinq; habetur, cuius  
fibræ secundum corporis latitudinem, aut à dextris ad sinistra nullo obliquo  
ductu transuersim feruntur.<sup>e</sup> Obliquē descendens, cæteris abdominis muscu-  
lis superferitur,<sup>f</sup> & ex sexta, septima, octaua & nona costis, priusquam in car-  
tilaginem finiant, carnosum principium sumit, propter musculum, quem ex  
scapulæ basi pronatum, octo elationibus thoracis costis inferi, thoracemq; mo-  
uere dicemus. Hoc amplum principium non instar rectæ prodit lineæ, uerum  
instar manus. ille enim thoracis musculus, costis, quasi digitos singulis porri-  
gendo, inferitur: ex quorum interuallis prominentiores obliquē descenden-  
tis musculi partes, digitorum ritu enascuntur, non secus, quàm si sinistrae ma-  
nus digitorū interuallis, dextræ manus digitos infereres. Deinde post nonam  
costam, à tribus etiam inferioribus costis iste musculus enascitur, illam semper  
originē imitatus, quam ad magni thoracis musculo interualla adipiscitur, non  
quidem amplius cum illo thoracis musculo ingressu mutuo cōmissus, uerum  
cum <sup>g</sup> alio quodam, qui ab inferiorū thoracis uertebrae, & unius alteriusq;  
in lumbis positarum spinis enatus, thoracis decimæ & undecimæ costis potis-  
simū inferi, in thoracis musculorū enarratione dicitur. Is enim manus quo-  
que ritu costis, priusquam in cartilaginem cessare incipiunt, implantatur: &  
obliquē descendens musculi principium, manus quoq; modo ex eius muscu-  
li interuallis, ab ipsis costis alternatim procedit. Hoc obliqui musculi princi-  
pium, undiq; carnosum quidē est, sed tenue: uerum musculus ipse sensim car-  
nosior crassiorq; euadens, deorsum in priora fertur, ilia (quæ quasi inania inter  
ilium os & infimam costam, *λεγεῖννας* & *λαγύνας* Græci uocant) carnosæ ipsius  
parte amplectēs, quousq; ad ilium os perreperit, cuius <sup>h</sup> summitati secundum  
totum eius ossis appendicis ductum, carneus inferitur. Quum uerò carnosæ  
musculi pars, ex iliū regionibus, ad corporis anteriora mediāq; secundum to-  
tam abdominis longitudinem properat, in neruosam exilitatem, membranæ  
quàm simillimam degenerat, quæ sextæ & septimæ costarum cartilaginibus,  
& pectoris ossis mucroni, & rectis musculis expanditur, firmissimèq; superio-  
ri ossis coxendicis, & pubis regioni, ubi hanc excarnem reperit, implantatur.  
Quà enim <sup>i</sup> sextus & <sup>k</sup> septimus femur mouentium musculi, super coxendicis  
& pubis os descendunt, obliquus hic musculus ossi proximè non cōmittitur.

<sup>l</sup> Secundum

<sup>a</sup> s. tab. o.

<sup>b</sup> 4. tab. p.

<sup>c</sup> s. tab. o.

<sup>d</sup> 6. tab. o.

<sup>e</sup> s. tab. o.

<sup>f</sup> 1. tab. o.

<sup>g</sup> 1. tab. o.

<sup>h</sup> 1. tab. o.

<sup>i</sup> 1. tab. o.

<sup>k</sup> 1. tab. o.

<sup>l</sup> 1. tab. o.

<sup>m</sup> 1. tab. o.

<sup>n</sup> 1. tab. o.

<sup>o</sup> 1. tab. o.

<sup>p</sup> 1. tab. o.

<sup>q</sup> 1. tab. o.

<sup>r</sup> 1. tab. o.

<sup>s</sup> 1. tab. o.

<sup>t</sup> 1. tab. o.

<sup>u</sup> 1. tab. o.

<sup>v</sup> 1. tab. o.

<sup>w</sup> 1. tab. o.

<sup>x</sup> 1. tab. o.

<sup>y</sup> 1. tab. o.

<sup>z</sup> 1. tab. o.

<sup>aa</sup> 1. tab. o.

<sup>ab</sup> 1. tab. o.

<sup>ac</sup> 1. tab. o.

<sup>ad</sup> 1. tab. o.

<sup>ae</sup> 1. tab. o.

<sup>af</sup> 1. tab. o.

<sup>ag</sup> 1. tab. o.

<sup>ah</sup> 1. tab. o.

<sup>ai</sup> 1. tab. o.

<sup>aj</sup> 1. tab. o.

<sup>ak</sup> 1. tab. o.

<sup>al</sup> 1. tab. o.

<sup>am</sup> 1. tab. o.

<sup>an</sup> 1. tab. o.

<sup>ao</sup> 1. tab. o.

<sup>ap</sup> 1. tab. o.

<sup>aq</sup> 1. tab. o.

<sup>ar</sup> 1. tab. o.

<sup>as</sup> 1. tab. o.

<sup>at</sup> 1. tab. o.

<sup>au</sup> 1. tab. o.

<sup>av</sup> 1. tab. o.

<sup>aw</sup> 1. tab. o.

<sup>ax</sup> 1. tab. o.

<sup>ay</sup> 1. tab. o.

<sup>az</sup> 1. tab. o.

<sup>1</sup> *1. tab. ab R. ad X.* Secundum autem corporis longitudinem, in abdominis medio dexter musculus cum membrana tenuitate sinistri ita sanè coit, ut simul utriq; descendentes, ueluti tunicam quandam uniuerso abdomini obductâ efforment. <sup>2</sup> *Oblique ascendens.* Quis huic substratus, ex superiori ovis ilium regione, quam ipsius spina & appendix circumscribunt, carneus nascitur, ac simul impense tenuem membranamq; originem à lumborum uertebrae & ovis sacri spinis assumit, quæ in musculi progressu carnosae fibræ tandem adaugetur, enutritur<sup>3</sup> ue. Musculus iste sursum tendens, ilia carnosae sui parte integit, & quatuor infimarum costarum finibus carnosus inseritur. Vbi autem abdominis priora & mediâ conscendit, in nervosam definit exilitatem, quæ inter rectum musculum, qui ipsi subijcitur, & membraneum oblique descendens tendinem, media intercedit, pubisq; ovis, & mucronatæ pectoris ovis cartilagini inseritur: per reliquam uerò abdominis longitudinem, cum alterius lateris oblique ascendens musculi tendine sic unitur, ut ex utriusq; lateris musculo, simul toti quoque abdomini tegumentum efficiatur. Membranei horum musculorum tendines, eundem ferè cum reliqua musculorum parte, fibrarum ductum sibi uendicant. Cæterum ea sede, qua tendines super abdominis medium inuicem inferuntur, utriq; firmissimè simul tanta amplitudine connati occurrunt, quanta media recti musculi est latitudo: atq; id aded ualidè secundum totam abdominis longitudinem perficitur, ut hic in abdominis medio, quatuor obliquorū musculorum tendines, unum producere quis arbitraretur, nisi duos utrinq; haberet, accuratissima sectio, fibrarumq; ductus commostrarent. Vbi dextri sinistris uniuntur, nullam prorsus separationis neq; coitus lineam exprimunt: sed paulo crassiores redditæ, ac sese inter rectos musculos, ubi illi inuicem distant, imprimentes, robustissimè transuersorum musculorū nervosis tenuitatibus, ipsiq; aded peritonæo<sup>4</sup> connascuntur. <sup>5</sup> Quod etiam oblique ascendentiū nervosis tenuitatibus usuuenit, secundum externa rectorum musculorum latera, priusquam illos conscendunt: per abdominis enim longitudinem, instar lineæ insertionem ualidam moliantur in nervosas transuersorum tenuitates, & etiam ad quasdam rectorum musculorū<sup>6</sup> impresiones nunc commemorandas. Sub obliquorum itaq; nervosis tenuitatibus<sup>7</sup> recti abdominis musculi retri. li reconduntur, singuli ex media ovis pubis regione, duplici quodammodo principio ducentes originem, uno quidem superiore interioreq; altero inferiore ac exteriori: non quod hæc principia singulis musculis distincta incontinua<sup>8</sup> ue sint, sed ipsa musculi origo diuersam substantiâ ad hunc modum exprimit. Superior originis pars, seu superius (ut ita dicam) principium, introrsum nonnihil uergens, exactè carneum est: ac ex lato in angustum desinens, priusquam ad mediam suminis regionem pertingit, in acutum quasi angulum terminatur. Inferius uerò, quod & extrorsum paulo magis prominet, nervosum est, carnis omnino expers: uerum sursum porrectum, sensim assumpta carne dilatescit, totumq; rectum musculum producere uidetur. Recti itaq; musculi, duobus eiusmodi principijs singuli ex pubis osse nati, inuicè contigui sunt, retri. ctâ sursum porrecti, donec ad umbilicū peruenerint: ibidem enim nonnihil mutuo distantes, modiceq; ampliores facti, ad pectus usq; feruntur, cui supra mucronatam cartilaginem, ad ovis pectoris latera, illiq; connexas cartilagineas, latior carnosiq; implantantur. Musculi hi non uno fibrarū ductu, secundum totam longitudinem ferri uidentur: sed singuli in abdominis regione diuersa<sup>9</sup> delineamenta, seu inscriptiones transuersim, & incurua albaq; lineæ, ipsis indutas expriment, non aliter sanè, quàm si rectorum singuli plurium musculorum numero

*regi muscoli  
pars, quæ simia  
abundant.*

*Transuersi.*

*Abdominis  
musculorum  
usu.*

numero essent habēdi. Non enim rectā ab ossē pubis, ad pectus fibrę nusquam inclinantes ferūtur: sed ad nunc dictas circūscriptiones impressiōes uē non-nihil implicatę obliquātur, atq; ex alijs alię produci quodammodo apparent. Deinde musculus rectis, non propter pubis os nerui duntaxat inferūtur, sed interiori quoq; ex parte, ubi his impressiōibus muscoli donantur. Istarum impressiōnum duę plurimū supra umbilicum cōsistunt, & interdum una sub umbilico in funine, aliquādo etiam tres supra umbilicum. Neq; has Naturam musculis frustra largitam arbitror, uerū ut cōmodiūs sursum in priora non-nihil uergentes porrigerentur, & secundū orbicularem abdominis regionem obliquati, peritonæum appositē premerent, eoq; quod narraturi sumus munere opportuniūs fungerentur. Quum thoracem mouentes exequemur musculos, unum in simijs & canibus enumerabimus, qui inter ipsos ordine quintus futurus est, quemq; uerarum costarum cartilaginibus ad pectoris ossis latus exporrectum, docebimus totum esse membraneum, præterquā ad primę secundęq; costę interuallum, ubi carnosior redditus, in primam costam definit. Profectō musculus hic in omnibus animalibus, in quibus sectiōe illum deprehendi, pars recti abdominis musculi mihi esse uidetur, & rectū musculum ad primam usq; thoracis costam in illis animalibus ascendere prorsus assero. quod in canibus, caudatisq; simijs maxime euadit cōspicuum: in hominibus autem (ut uerum fatear) hunc musculum nunquam obseruauī: hominesq; illo, quum breuissimo donentur pectore, facile destituuntur. Omnis modō commemoratis musculis subsunt transuersi, utrinque unus, qui ex transuersis lumborum uertebRARUM processibus, tenui membraneoq; principio enascitur: deinde in progressu ex dorsum mouentibus emergens musculus, & carnosus adactus fibris, superiori ilium ossis regioni, & spuriarum costarum finibus exactē carneus cōnascitur, carnosus ipsius parte uniuersa inuestiētia. Vbi uerō uersus abdominis medium, ad exterius recti musculi latus usq; prorepsit, in neruofam finit exilitatem, quę pubis ossi & mucronatę cartilagini implantatur: per reliquam inter hæc extrema longitudinē, membranosus iste tendo neruofę exilitati transuersi alterius lateris musculi continuatur, ac simul ambo tunice instar uniuersum abdomen circumcingunt, in hoc obli quos musculos imitati. Verū neruosa horum musculorū tenuitas non æquē atq; obliquorum lata est: transuersi enim nonnihil sub rectis musculis, & potissimū iuxta pectoris regionem, carnei cōspiciuntur. Transuersis musculis peritonæum, seu membrana nutritioni famulantibus organis circumposita, adeo ualidē subnascitur, ut arduum sit, illos ab hac, idq; potissimū in homine, illaceros liberare. Carnosę tamen musculorum partes uix aliter peritonęo committuntur, quā mutudē incumbentes muscoli inuicem hæere solent. Transuersi enim musculi propria musculorū membrana illic, quā peritonæo obducuntur, neutiquam (etsi pleriq; secus arbitretur) destituti secantibus occurrunt. neq; unquam alius musculorū abdominis, quā nunc enarrauimus, situs uisitur: uti forsitan aliquis, librorum duntaxat ope nauatam agens, promptē colligeret, pugnantibus nimirum Galeni locis delusus. Quandoquidē hos aliter recenset in libris de Affectorum locorum cognitione, rursus aliter in libris de Partium usu, & aliter prorsus in libris de Administrandis sectiōibus, ubi eos ita enumerat, ut in sexto libro curatiuę methodi ipsorum situm rectē describit. Octo abdominis musculi, præter communem omnium musculorum usum, quo corpori calefaciendo refrigerandoq; auxiliantur, & propugnacula quædam cēsentur, primario usu thoracis motibus præstant, ut in proprio de

*25 tab. 45  
r per sed.*

*a 6 tab. 2.  
5 tab. 3. 12  
tab. 4.*

*b 6 tab. 3.*

*c prima f.  
1 lib.*



prio de thoracem mouentium musculorum Capite dicturi sumus prolixius. Deinde homini ad durorum recrementorum expulsionem aptissimè subseruiunt: quando enim omnes unà in se collecti cōtracti; laborant, septo transuerso interim ex spiritus retentione depresso, ita intestina comprimunt, ut ex angusto loco in ampliorem (qui inferior est) faeces protrudant, expellantq; & rursum ad uentriculū superiora uel illas deferri, prae caueant nihilo secus, quàm si duabus ad brachiale iunctis manibus, & semper magis magisq; sensim ad extremam usq; digitorum aciem distantibus, madentem spongiam imponeres, manibusq; paulatim coeuntibus, aquam exprimere nitereris. Verum hoc musculorū abdominis munus, nisi cognita septi transuersi functione situq; aperte percipi nequit. Pari etiam ratione, quo pacto abdominis muscoli parientibus (ut commodius fœtus propellatur) cōferant, non aptè cognoscitur. Atq; hæc adhuc minus ab illis assequuntur, qui septum transuersum, dum contrahitur, thoracēq; adaperit, deorsum pelli arbitrantur, non animaduertētes, quum aerem intrò ducimus, ac thoracem continuò, citra spiritus retentionē, thoracisq; repleti compressionē, distendimus, septum transuersum nullū impetum in excretionem moliri, quòd scilicet perpetuò sursum tractū, non deprimatur: quemadmodū id spiritum retinentibus, & ui interim thoracem cōprimētib; in firma sede permanet. Cæterum nostri seculi medicos, qui hos tantum musculos recensere ita uidentur, ac si alij in corpore nulli essent, omnino delirare existimandū est: qui rectis musculis cibū in uentrem attrahi, trāsueris autem expelli, & obliquis retineri cōtendunt, præsentibus musculis attribuētes, quod uerè uentriculi intestinorūq; fibris ascribendū fuerat. Sed hæc absurdiora sunt, quàm quæ in mediū adduci debeāt, quum aliæ fibræ uoluntario motui, aliæ uerò naturali, qui à nostro non pendet impetu, famulētur. Neutiquā sanè hæc ab ipsis cōfingenda uenerant: at laudandus erat rerum Opifex, qui quum abdomen ossē destitutū necessariò creari uoluit, tam affabris tunicas inuolucraq; ipsi parauit, quæ præterquam quòd tegumenta & aptissima propugnacula sunt, thoracis quoq; motibus, uti monuimus, utilissimè subseruiunt.

ABDOMINIS MUSCULORVM ADMINISTRATIO. Caput XXXII.



ADMINISTRATIONEM hanc, aut à musculorum capitibus, aut tendinum terminis aggredi, nihil prohibet: uerum facilius est, musculorūq; naturam accuratius demonstrat, quæ ab exortibus auspicatur. Qualitercunq; igitur sectionem exordiri proposueris, cutem unà cum carnosa membrana, ab uniuerso abdomine, & lumborum regionibus, ad femora usq; liberatam esse oportet, unà cum musculis, quem brachium deorsum trahere ostendimus, quiq; iam pridem ex sectionis hætenus cōmemoratae serie ablatus est. His igitur ademptis, & membrana insuper perquam tenui & fibrosa, quæ musculis, præter carneam, obducitur, unguibus hinc inde leuiter (ut ipsius naturam discas) diuulsa, priorem sectionem hunc in modum aggredieris. Cadauere ad alterum latum inuoluto, ut commodè & lumborum uer̄tebris, & abdominis medio manus adhibeas, à sexta costa nitēris musculi abdominis obliquè descendētis principium paruo cultello, aut exigua nouacula liberare, leui sectione ducta secundū reliquas costas, uersus dorsum, & secundū superiorē ilium ossis regionem, ad pubis ossis usque medium. Hanc sectionem adeò duces leuiter, ut nihil præter præ-

Duplicem esse horum musculorum administrationem.

Administratio à musculorum exortibus. Obliquè descendens.

sentem musculum uulneres. Mox ab his ossium regionibus eleuato musculi principio, conaberis paulatim ab obliquè ascendente descendente eoque liberare, dum ad abdominis usq; medium illum perduxeris, precauens, ne unà tanquam obliquè descendens musculi partem auferas, tenuem musculum, qui ad decimam undecimamque thoracis costam cum obliquo mutuis interuallis committitur. Si enim hunc scopulum uitaueris, & in uiris quoq; à tunica uasa seminaria inuolente abstineris, musculum obliquè descendente, uersus medium abdominis promptissimè duces. Cæterum ubi ad medium usq; recti musculi amplitudinem peruentum erit, pertinaciùs cum ascendente musculi tendine, obliquè descendente tendo coire uidebitur, quàm ut intergrum, & non uulneratum, lacerum ue, ad lineam usq; (quæ in abdominis medio ambientibus meritis, quòd illi nulla subit caro, candidior apparet) ipsum difficere ualeas, utcumq; acuta nouacula usus fueris: retusiori enim nihil penitus promouebis. Quamobrem reflexo pendenteq; à media recti musculi amplitudine primo abdominis musculo, ascendente, qui secundus est, similiter aggredieris, ducta nimirum à pubis osse, per superiorem illum ossis regionem, & lumborum uertebras, & fines quatuor infimarum costarum sectione, quæ ab his omnibus musculum separare possit: & ab illo etiam respirationis musculi abstineat, qui decimæ & undecimæ costæ potissimum inseritur. Post sectionem musculi huius principia hamulo aut ungubus attolles, & à transuerso, cui insidet, in priora procedens, liberabis. Quod usq; ad exteriorem costam, latus ue recti abdominis musculi, mediocri negotio perfereris, si modò in uiris uasorum seminalium tunicis (quæ ad testium musculorum sectionem seruandæ sunt) animum adhibeas, ne unà etiam illæ præscindantur. Vbi uerò membranofus obliquè ascendens musculi tendo externum recti musculi latus spectat, acutiori nouacula à subditis separandus est: neq; id quidem oscitanter, ne eum tendinè pertundas, ipsumq; hic finire arbitreris. Tantus enim huius tendinis cum nervosa transuersi musculi exilitate iuxta externum recti musculi latus, occurrit nexus, ut aliquando obliquè ascendens tendinem diuidi putauerim: & unam ipsius partem, transuerso musculo connatâ, sub recto musculo procedere, alteram uerò super rectum expandi arbitrari fuerim, atq; id potissimum supra umbilici regionem est manifestum. Verum si ad amussim obliquè ascendens tendinè à transuerso liberaueris, recto musculo illum supersterni cõperies, à quo ad albam usq; abdominis lineam accuratè separandus uenit: quod in carnosus recti musculi partibus factum est promptissimum, at in nervosis illis recti musculi inscriptionibus id arduum esse obseruabis. Hic modò doceberis, qui ascendens descendensq; tendines circa abdominis medium in uicem conascantur, ubi recti musculi mediæ amplitudini (quæ interior est) incumbunt: nec nisi maxima industria, & acutiori nouacula, ad albam usq; abdominis lineam mutuo separari queunt. Cæterum posteaquâ unius lateris, cuius iam sectionem aggredieris, obliquos abdominis musculos ad albâ usq; lineam perduxeris, expède, qualiter obliquorum tendines rursus transuersorum tenuitatis in ea abdominis regione adnascantur, quæ recti musculi ab inuicem magis feiunguntur. Vtroq; obliquo musculo in illud cadaueris latus, quod mensæ incumbit, pendente, sola manu rectum musculum à transuersi nerue tenuitate separabis, dextræ manus digitis ab exteriori musculi latere iniectis, & secundum abdominis longitudinem hinc inde sub musculo ductis. Quum primum relictus musculus à transuerso abscissus, integrum est, eius fibras unà cum transuersis ipsius inscriptionibus cõtueri, ac tandè musculum à thorace nouacula liberatū, ab abdomine

Candidior in  
abdomine li-  
nea.  
obliquè ascen-  
dentis.

Nervosa ner-  
uosa tenuitatis  
obliquè ascen-  
dentis musculi  
cum transuerso.

Recti abdomi-  
stratis.

4 tab. 1.

4 tab. 2.

5 tab. 1.

f. Hec ef-  
fectus, in qua  
recta dicitur  
rectus linea  
per ueneris  
tab. 1.

8 tab. 1.

11 tab. 2.

15 tab. 1.

15 tab. 2.

15 tab. 1.

15.

15 tab. 2.

15.

15 tab. 1.

15.

15 tab. 1.

15.

15.

q 6 tab. f. abdomine detrahare: ita tamē, ut adhuc pubis ossi hēreat, ipsiusq; hic initium  
 accuratē examines. At quum hunc à pectore in cane aut simia adimes, studen-  
 dum est, ne<sup>r</sup> continuum illi membraneum tendinem simul auferas, aut uulne-  
 res, qui secundum pectoris longitudinē, à recto musculo ad primam usq; tho-  
 racis costam porrigitur, ac re uera in eiusmodi animantibus recti pars esse con-  
 spicitur. <sup>Transuersi.</sup> Transuersum pari modo, quo obliquos aggressus es, opportunē ad-  
 ministrabis, ducta similiter à pubis ossē, per iliū os, & transuersos uertebrarum  
 lumborum processūs, aut potius<sup>r</sup> musculorū dorsum hic mouentiū exterius  
 latus, & demum ad fines spuriarū costarum, leui sectione, quæ intacto perito-  
 næo, solum musculū penetret. Mox trāuersi principia hamulo eleuabis, & no-  
 uacula quā potēris attentissimē à<sup>r</sup> peritonæo paulatim liberabis, donec ad  
 neruosam ipsius deueneris exilitatē: quæ maiori adhibita cura, à peritonæo ita  
 separanda est, ut neq; peritonæū, neq; neruosa ea tenuitas lacerentur. quod qui  
 dem non adeo arduū est, atq; operosum, & præcipuē iuxta abdominis elatiora,  
 non procul à pectore. nam in summe tendo ipse (ut etiam peritonæū) nimis  
 quā tenuis occurrit. Nunc uerò, ubi & hunc musculū ad medium abdomi-  
 nis perduxeris, ac à peritonæo, ut licuit, optimē liberaueris, rursus in suum lo-  
 cum quatuor huius lateris musculos repones: ac cadauere in dorsum reflexo,  
 secundam administrādi rationem aggredieris, quæ à tendinū finibus, in abdo-  
 minis medio auspicatur. Duces itaq; à pectore ad pubem usq; per totam abdo-  
 minis longitudinē, super medium recti musculi eius lateris, cuius administra-  
 tionem moliris, adeo leuem sectionem, ut nihil præter<sup>r</sup> obliquē descendētis  
 musculi tendinē uulneret. Atq; hanc sectionē ad mediam recti musculi ampli-  
 tudinem tentandā scribo, quod nollem frustra per albam lineam, quæ in abdo-  
 minis medio occurrit, eam sectionē fieri. siquidē impossibile arbitror, descen-  
 dentis tendinem, non uulnerato illæsoq; ascendētis tendine, seorsum hinc li-  
 berari posse. quanquā & ab alba linea interdum sectionē inchoari experiri ue-  
 non improbauerim, ut cumq; etiam laceratos tēdines inuicem separares. Qua-  
 propter hac illa uē sectione ducta, adniteris hamulo descendētis tendinē at-  
 tollere, ac à subiecto ipsi musculo nouacula dissecare, quousq; uniuersum mu-  
 sculum uersus dorsi spinā à costis & ilium ossē liberatū deduxeris. Post hunc<sup>r</sup> obliquē ascen-  
 dentis, tendinem à recto separabis, principii separationis ab alba linea ex-  
 orsus. In hoc opere rursus intueberis, qui tendo ille trāuersi recti musculi in-  
 scriptionibus adnascatur, ac cum neruosa transuersi musculi tenuitate, ad ex-  
 ternum recti musculi latus coalescat. Quod simul atq; obseruaueris, à reliqua  
 transuersi musculi parte, obliquē ascendētē auelles ipsum à pubis & coxendi-  
 cis & iliū ossibus, & inferioribus thoracis costis, ad lumborū usq; uertebrarum  
 spinas abscans. <sup>Recti.</sup> Rectū similiter, ut alterius lateris rectū in priori administra-  
 tione dissecasti, à transuerso musculo attolles: & ipsius capite à pubis ossē abscē-  
 to, illum super thoracē reflectes. Modò recta sectione secundum albæ lineæ  
 longitudinē ducta, quæ duntaxat neruosam<sup>r</sup> trāuersi musculi tenuitatē ille so  
 peritonæo diuidat, conaberis eā à peritonæo diligētē separare. quod quidem  
 in homine, & potissimū iuxta pubē, uasorumq; seminaliū transitum, facturus  
 es difficillimē, in porcis autē minimo negotio. Ceterum trāuersi musculi ten-  
 dine ad carnē usq; ipsius regionē à peritonæo liberato, eam quoq; tantisper ab  
 ijs quibus cōmittitur partibus refecabis, quousq; uniuersus musculus à perito-  
 næo dissectus pēdeat. Integrū iam quoq; est, & huius lateris musculos in pristi-  
 num locū reponere, & adamussim eorū formam, sitū, & fibrarū ductū exami-  
 nare: ac demū illis refectis, ad testīū musculos cōtinua quadā serie te accingere.



AND. VESALII DE CORPORIS  
DE VIRILIVM TESTIVM ET MVLTIE-  
bris uteri musculus. Caput xxxiii.

*L*ICVISSET huc aliquot quinti libri figuras reponere, ex quibus testium uteriq; musculorum natu-  
ra utcumq; peti posset: uerum ne easdem figuras diuersis in locis proponamus, hic tantum adyicietur, in quibus  
nam figuris presentes muscoli sint obuij. Testis itaq; musculus nonnihil spectatur tertia musculorum tabula  
scilicet uigesima secunda figura libri quinti. Uteri autem musculosa substantia, eiusdem libri uigesima quarta fi-  
gura ad charactere. O, quoad id fieri potuit, exprimitur.



virili testis  
musculus.

*A*M tempestiuum est, ad musculorum thoracem & dor-  
sum & femur mouentium inspectione, peritonæum ad-  
ministrare, atq; cum eo quoq; testium musculos aggredi.  
Pertingunt itaque ad unumquëq; testem<sup>a</sup> singuli muscoli  
graciles admodum, ex ea uasorum seminaliū & testis tunica  
efformati, quæ à peritonæo principiū ducens, uasa simul  
cum teste continet. Hæc enim in posteriori sua sede, mox

in ipso à peritonæo exortu, longis, ac inuicem sibi proximis, carneisq; fibris ita  
adaugetur, ut fibræ illæ gracilis oblongiq; musculi naturā exprimant, qui illi te-  
stis tunicæ semper innatus, deorsum proteditur, ac tandem iuxta infimā testis  
sedem, unā cum illa tunica<sup>a</sup> uasi ei seminario applātatur, quod à teste paratum  
iam semen assumit, idq; sursum in peritonæi cavitatē deducens, in uesicæ cer-  
uicem<sup>a</sup> profundit. Neq; aliqua prorsus parte, testi aut seminario uasi tunica illa  
pertinaciter adnascitur, quā ubi unā cum musculosa ipsius substantia, inser-  
tionem ad uasis inflexum tentat, qui ad infimam testis sedem perficitur, unde  
etiam musculus ipse nusquā testem contingit. Respondet itaq; testis musculus  
illis qui ex carnosa membrana efformantur: quum is aliud nihil sit, quā car-  
næ fibræ, uasorum seminaliū & testis inuolucro innatæ: quem admodum  
carnosæ membranæ<sup>a</sup> muscoli, carneis quoq; fibris per membranā digestis consti-  
tuuntur. Testium musculorum beneficio, uiri arbitrario motu testes modicè  
(ut & ipsi muscoli graciles tenuesq; sunt) sursum alliciunt: ne testes fortè plus  
æquo laxati, deorsumq; pendentes, nimio oneri<sup>a</sup> seminarijs uasis sint. Hunc u-  
sum musculi in coitu quodammodo conuulsi, potissimum præstant: si enim  
testes uasis seminarijs oneri semper essent, atq; hæc ad inferiora protracta, per-  
petuò arctarentur, non ad eò comòdè semen transmitteret, atq; modò, quum  
testium à musculis iam attractorū pondere subleuata, magis patefcerēt. Vt cunq;  
uerò sit, constat musculos hos (qui λεγμασγες Græcis uocantur) ex eorū classe  
censendos esse, qui nullum sortiuntur musculū, contrarij motus autorē. Nulli  
enim, qui testes ad inferiora reuellant, extruuntur: quum testes, quos nisi rectā  
deorsum, nec in ullam partē inclinantes prolabi decebat, ab eò à naturalis ipsis  
indita grauitate dimittātur: idq; subinde adeò, ut ne minimum quidē sursum  
ægris senibusq; horum musculorū beneficio allici queāt. Quid uerò Arabibus  
in mentē uenerit, ignoro, qui binos in uiris cuiusq; testis musculos, in mulieri-  
bus autem unicū haberi, scriptū reliquerunt: unicū enim hæcenus ad singulos  
porrigit testes, semper in masculis obseruauim. Mulieribus porrò Natura simili-  
ter musculos largitur, quos in magna peritonæi amplitudine, ut & reliqua ipsa  
rum generationis organa, recōdidit. Ea nāq; peritonæi<sup>a</sup> pars, seu processus, qui  
utrinq; à laterib; ad uterū instat<sup>a</sup> mesenterij pertingit, uenasq; & arterias utero  
deducit, & testes sibi innatos obtinet, & demū cum alterius lateris peritonæi  
processu, exteriorē uteri<sup>a</sup> tunicā procreat, carnosus quoq; adaugetur fibris, ex  
ilium regionibus deorsum obliquè ad uteri latera, ipsosq; testes perreptatibus:  
adeò sanè, ut & mulieribus utrinq; singuli sint musculi, illis speciem similes, qui-  
bus ui-

musculi mulie-  
bris uteri.

a 22 fl. lib.  
s 4. atque  
ex illa figu-  
ra c. 20 se-  
riatim hic  
subseque-  
ntia petes.

b 22 fl. lib.  
s 21. 22 fl.  
lib. s 4. d. d.  
c 23 fl. lib.  
s 5. d.

d 3 tab. A.  
C. E. f.

e 23 fl. lib.  
s 4. d.

f 24 fl. lib.  
s 3. d. p. q.  
s 26 fl. lib.  
E. E. C. 27  
l. l.  
g 10 fl. lib.  
s 1. l. s. d.  
m.  
h 27 fl. lib.  
s 1. l. s. d.  
i 24 fl. lib.  
s 1. l. s. d.

bus uirorum testes donantur. Et quamuis plerumq; graciles sint, neque admodum carnei, crassius uero: ego tamen eos aliquando in nonnullis mulieribus uteri cornua esse arbitratus sum, Galeni uteri descriptione eleganter delusus, qui non muliebrem, sed uaccinum caprinum uero describit<sup>a</sup> uterum, cornua arietum cornibus longè simillima obtinentem, secus multo quam muliebris uterus. Porro his uteri musculis, obscura uteri, sed magis adhuc testium, ad superiora attractio perficitur, quam mulieres tunc ferè percipiunt, quum ilia iuxta facrum os trahere colligereq; conantur, atque adeò (ut sic dicam) uteri ceruicis os, totumq; uterum penitus in peritonæi cavitatem allicere student.

*In libro de rie  
rificatione.*

MVSCVLORVM TESTIVM ADMINISTRATIONIS. Caput XXXIII.



**Q**UEMADMODVM in quinto libro, musculorum, quos testibus ascripti, mentione incidere necessum erit: ita quoq; eorum administrationem, cum reliquarum partium illo libro enarrandarum, sectione pertractabo. Quod tamen ad administrationem hoc libro persequendam spectat, a mucronata pectoris ossis cartilagine, ad pubis usq; os, nouacula peritonæum diuides, alia rursus sectione per transversum utrumq; ab umbilici regione ducta. Mox absq; delectu, in uiris omnia quæ peritonæo cinguntur, præter recti intestini finem, & uesicam, auferes. His ita ademptis, & etiam scorto a testibus, unà cum carnea membrana ipsi subdita, liberato, exiguum stylum ab interiori peritonæi parte meatui indedes, qui seminarijs uasis in humiliori peritonæi regione, ad inguina uiam præbet. Posteaquam uerò stylum ad testem usq; protruleris, atq; ad illius latus, seu (si modò talis stylus ad manum sit) in ipsius rimam aut canalem, cultellum indederis, longa sectione ad peritonæo ad testem usq; secundum styli longitudinem facta, membranam tunicam uero, uasa cum teste inuestientem, diuides: hacq; ducta & extensa, gracilem testis musculum, quo tunica ea uelut enutritur, conspicias. Hoc musculo ab humillima uasis a teste semen deferentis inflexione liberato, eius naturam promptissimè condisces, qualiterq; testem sursum trahat, intueberis. Liceret modò, testibus cum suis uasis musculisq; abscitis, penis & uesicæ ceruicis musculis aggredi: at quum ante hos integrum sit, & thoracis & dorsi & brachij & cubiti & manus diffecare, ad thoracis musculos sese iam conuertet oratio. Cæterum mulierum musculi, aperto iam peritonæo, & intestinis ad latera sursumq; reductis, & mulieris testibus quoq; subleuatis, in conspectum citra aliam sectione ueniunt, dummodo uteri lateribus membranisq; illum peritonæo alligantibus, animum accommodare non pigeat.

*Qui ea que peritonæo continentur, modo reseranda ueniunt.*

*Præter musculi administratio.*

*Muliebris musculi administratio.*

DE MVSCVLIS THORACEM MOVENTIBUS. Caput XXXV.



**T**HORACEM eius motus, quo respirantes indigemus, gratia, non unico cōformatum osse, aut omnino osseum esse, superiori libro declaratum est. Iam uerò proximum erit, thoracis motum ex nostro arbitratu debuisse pendere, non autem naturalem esse, sermone persequi: dein, si uoluntariū esse, ex usu homini fuerit, quibus is motus perficiatur musculis, subiungere. Summus itaq; rerum Opificex respirationem homini, animalis spiritus reficiendi, & cordis occasione largitus est.

*Thoracis motum iure arbitratum esse.*

gitus est: quodd & ipsum quidem substantia aeris indigeat, & plurimum feruens in eo calor refrigerari expetat. Inspiratio quidem cor refrigerat, suppeditata ei frigida qualitate: expiratio autem, feruens in corde, & quasi combusti & fuliginosi recrementi effusione expulsiōeque; illi etiā refrigerando conducit. Atque ita cordis potissimum causa, respiratio duobus contrariis motibus perficitur: attrahit enim hæc in distentione & dilatatione, euacuat uerò in contractione, eisdem scilicet motibus, quibus & cor ipsum perpetuò agitur. Quamquam respirationis cordisq; motus aliàs genere plurimum uariant. siquidem cor naturali motu, uelimus nolimus, mouetur: respiratio autem adeò ex nostra pendet uoluntate, ut quosdam spiritus retēione sese necauisse (etiā si unde tandem uires illis suppeditauerint, mirer) legamus. atque id magnopere non ad bene uiuendum duntaxat, sed etiam ad ipsam uitā hominī utile cēsetur. Si enim idem rhythmus consonantiq; respirationis cum cordis motu necessariò esset, neque ipsa respiratio ex nostro impetu uolūtateq; pendēret, multum diuq; loqui nequiremus. ne quid de submersione in aquam, & per fumum, aliū ue corruptum aerem, dicam transitu. Cæterum quum pulmo thoracis motum, quoties ille cōprimitur, dilatatur ue, uacui potissimum ui fequatur, musculos debuisse extrui certissimum est, qui thoracem dilatarent, arētarentq;. Erunt autem hi in uniuersum, unā cum octo abdominis musculis in homine, octuaginta nouem, utrinque scilicet quatuor & quadraginta, ac postmodum unus, utriq; lateri communis. Verum canes & simiæ duobus abundant utrinq; ut si mul tres habeant & nonaginta, quos Galeni intelligendi occasione, in serie sua enumerare haud graabor.

*Musculorum  
thoracem mouentium nomen  
rur.*

*Primus in altero latere thoracem mouentiu.*

*Secundus.*

*Tertius canis thoracem mouentiu.*

Primus itaq; alterius lateris musculus, ex inferiori clauiculæ regione, secundum ipsius longitudinem, quā primam respicit costam, exoritur, principiu carnosum undiq; obtinens: & carnosum quoque termino primæ costæ, quā pectoris ossi cōmittitur, ipsiq; etiam pectoris ossi, ubi eius costæ cartilaginem excipit, insertus. Musculus hic brevis, sed amplus est, & tenuis, fibrasq; fortitur impense obliquas, & propemodum transuersas: huiusq; beneficio prima costa sursum uersus exteriora retrahitur, hacq; ratione thorax ibidem dilatatur. Secundus musculus grandis est carnosus enim principio, ex tota scapulæ basi interiore in parte enatus, & hinc carnosus perpetuò procedens, ac costis exporrectus, admodum latefcit, & octo, interdum uerò nouem superioribus costis sese inserit, ad mediam potissimum illarum longitudinis sedē. Reliqua autem parte, qua musculus costis exporrigitur, ipsis duntaxat incumbit, exiguisq; tantum fibris (ut mutuo instrati solent musculi) illis committitur. Cæterum non recta simpliciq; linea, ipsius insertio costis implantatur: sed musculus hīc tanquam in digitos discretus est, qui per costarum ossa longius quā eius pars, quæ costarum interuallis cōnascitur, in priora procedunt: contrario nimirum modo, quā oblique descendens abdominis musculus, ex inferioribus sex costis suam assumit originē. Is enim ex costarum interuallis prolixius suos digitos educit, cum secūdo respirationis musculolo ferratam efformans compagem. Secundi huius musculi fibræ, si quando in se colliguntur, uniuersas costas, quibus musculus inseritur, uersus exteriora uel lunt, thoracem dilatātes. Hic musculus in hominibus ita fere habet, in canibus uerò & caudatis simijs secus: non enim solum ipsis in octo costas inseritur, sed etiam ualidissimè transuersis septimæ & sextæ & quintæ & quartæ cervicis uertebrarum processibus implantatur, aut potius (ut quispiam fortē non admodum absurdè cōtenderit) ab illis processibus sui principij portionem assumit. Tertius, qui ob Galeni doctrinam in serie occurrit, musculus, homini nequaquam

*8. Si simi  
gulus scro-  
sim aduote  
bimus.*

*4. tab. d.  
5. tab. Z.*

*d. 1. tab. O.  
O. O. 14.  
O. O. 14.  
cherati. 1.  
6. 7. 1. tab. 4.  
1. 5. tab. m.  
6. R. 7. L.  
8. E. 11. X.  
12. S. 11. T.*

*e. Observa  
tur il. 14.  
O. O. O.  
P. P. P. 6.  
2. tab. O. O.  
O. P. P. P.*

*f. 6. tab. d.  
filius est;  
et 1. no-  
tatis.*



nequaquam perinde ac canis & simiæ communis est: ideoq; duntaxat à me describitur, illoq; orationem, hominis fabricam enarrantem, interpello, ut Galenus promptius intelligatur, & ne quis me aliquem in homine musculum præterisse nugeatur. Hic itaque secundum anteriora insertionis<sup>g</sup> secundi musculi

g 6 tab. R.

h 6 tab. O.

i 6 tab. P.

h 6 tab. Q.

i 6 tab. R.

10 tab. E.

11 tab. A.

11 tab. B.

Q. R. S.

11 tab. X.

p 5 tab. Y.

11 tab. Z.

q 5 tab. A.

r 5 tab. B.

uentium, quo  
homines desti-  
tuntur.

Tertius homi-  
nis, qui canum  
& simiarum  
quartus est.

Quintus canis,  
quo humanum  
thoracem desti-  
tuitur.

carneo exortu<sup>h</sup> enascitur: deorsumq; protensus, ex transuersis insuper aliquot subditarum uertebrarum processibus principium ducit, donec uarijs auctis exortibus, primæ thoracis costæ committatur: hic enim latior, sed tenuior efficitur, & quatuor superioribus costis undique carnosus iniicitur. 'Vbi uerò quartam, interdum autem, idq; præcipuè in canibus, quintam prætergreditur costam, in<sup>k</sup> membraneum neruofumq; tendinem definit, qui subsequenti bus costis ad septimam, aliquando & octauam usque exporrigitur, singulis, quibus incumbit, costis firmiter adnatus: quas quum attollit, dilatando thoraci pulchre præest. Hoc autem canes tanto magis indigere uidentur, quanto longiori pectore quam homines donantur, isto Galeni musculo prorsus destituti. 'Quartum in musculorum hoc Capite descriptorum serie, homines iuxta ac simiæ canesq; adipiscuntur, sed nonnihil diuersum. Hominibus enim ex trium inferiorum ceruicis uertebrarum, ac primæ thoracis uertebræ spinis, membraneum latumq; exoritur principium: quod<sup>m</sup> primo caput mouentium musculorum pari, & hac sede<sup>n</sup> repositis, dorsum thoracemq; mouentibus musculis instratum, in priora, seu si dextrum spectas musculū, dextrorsum decliue exporrigitur, carneum euadens, lati q; musculi naturā ostendens, simulatq; primi illius paris externum latus superauit. Deinde ubi primam thoracis costam contingit, in latera sensim oblique ductus, in tres ueluti digitos tripartitur, singulos tribus quatuor primarum costarum interuallis exporrigens, illisq; sese costis inferens. Canibus porro ex eo dem principio musculus iste prodit, nisi etiam altius nonnihil exoritur. Verum ubi membraneum eius principium magis oblique, quam transuersim descendens, ad tertiam thoracis deuenit costam, musculus ipse carnosus latusq; inibi conspicitur: ac tertiæ costæ, & tribus ordine deorsum ipsi succedentibus implantatus, in priora, seu in latus semper oblique tantisper descendit, donec aliquousq; sub<sup>o</sup> secundi thoracem mouētis musculi principio reconditus, atq; in digitos discretus finiat. Musculus iste, si quando contrahitur, eas quibus implantatur costas sursum alliciens, thoracem manifestò dilatat, hominis thoracem mouentium tertius, simiarū uerò quartus statuendus. <sup>p</sup> Musculo, qui quinto loco iam uenit cōmemorandus, homines carent: isq; anteriori costarum parti, qua pectoris ossi proximæ sunt, exporrigitur: paulo enim supra latus mucronatæ cartilaginis, tendo membranei ualidiq; ligamenti instar, super costarum cartilaginū fines, sursum nonnihil in posteriora inclinans procedit, quousque secundæ costæ supersternatur. Ibidem namq; tendo ille carnosus adaugetur fibris, ex ipsoq; carnosa & tendinis ritu latiuscula musculi cōstituitur portio, quæ primæ costæ cartilaginis principio, & ipsius ossis fini adnata, ad superiorē eius costæ regionē terminatur, eminētiōri sua sede semiorbicularis, & externo latere longius, quam interno carnosa. Musculum hunc (ut in abdominis musculorum enarratione admonui) nullum peculiare esse arbitror: nam recti abdominis musculi portio, quantumuis accurate diffecati apparet. Videtur enim carnosa<sup>q</sup> recti musculi pars, quæ paulo supra mucronatæ cartilaginis latus cōsistit, in hunc membraneū ualidūq; tendinē definire: atq; ita sursum cōscendens, denuo carnosio fine primæ costæ indinē seriat<sup>r</sup> eiusq; musculi naturā referre, qui maxillā inferiorē deorsum trahit, qui in

Hominis quatuor  
simiarum 6.

medio tendinis speciem exprimens, duobus uentribus donatur. Aut si hæc costis exporrecta portio, recti musculi pars non censenda sit, nemo illius termino firmissimè connatam, aut potius ex ipso enatam, ibit inficias. Vt cunq; uerò res habeat, siue peculiaris sit musculus, siue recti portio, eiusdem semper functionis opifex erit: nimirum uerarum costarum terminos, pectoris ossi articulos, comprimendi, constringendiq; ob idq; & thoracem arctandi. Cæterum quum in hominibus mihi nunquam uisus sit (uti neque ijs qui Galenum præcesserunt Anatomicis, sese in hominum corporibus exercentibus) hominibus duntaxat tres musculos hæcenus recensui, in caudatis uerò simijs & canibus quinq; atq; id adhuc ea conditione, ut reclamantibus oculis, quantum musculum à recto abdominis distinctum, Galeni gratia recenseamus. <sup>5 12. 14. 15.</sup> Sextus itaq; <sup>11 tab. C.</sup> <sup>12 tab. D.</sup> <sup>13 tab. E.</sup> <sup>14 tab. F.</sup> <sup>15 tab. G.</sup> <sup>16 tab. H.</sup> <sup>17 tab. I.</sup> <sup>18 tab. J.</sup> <sup>19 tab. K.</sup> <sup>20 tab. L.</sup> <sup>21 tab. M.</sup> <sup>22 tab. N.</sup> <sup>23 tab. O.</sup> <sup>24 tab. P.</sup> <sup>25 tab. Q.</sup> <sup>26 tab. R.</sup> <sup>27 tab. S.</sup> <sup>28 tab. T.</sup> <sup>29 tab. U.</sup> <sup>30 tab. V.</sup> <sup>31 tab. W.</sup> <sup>32 tab. X.</sup> <sup>33 tab. Y.</sup> <sup>34 tab. Z.</sup> <sup>35 tab. A.</sup> <sup>36 tab. B.</sup> <sup>37 tab. C.</sup> <sup>38 tab. D.</sup> <sup>39 tab. E.</sup> <sup>40 tab. F.</sup> <sup>41 tab. G.</sup> <sup>42 tab. H.</sup> <sup>43 tab. I.</sup> <sup>44 tab. J.</sup> <sup>45 tab. K.</sup> <sup>46 tab. L.</sup> <sup>47 tab. M.</sup> <sup>48 tab. N.</sup> <sup>49 tab. O.</sup> <sup>50 tab. P.</sup> <sup>51 tab. Q.</sup> <sup>52 tab. R.</sup> <sup>53 tab. S.</sup> <sup>54 tab. T.</sup> <sup>55 tab. U.</sup> <sup>56 tab. V.</sup> <sup>57 tab. W.</sup> <sup>58 tab. X.</sup> <sup>59 tab. Y.</sup> <sup>60 tab. Z.</sup> <sup>61 tab. A.</sup> <sup>62 tab. B.</sup> <sup>63 tab. C.</sup> <sup>64 tab. D.</sup> <sup>65 tab. E.</sup> <sup>66 tab. F.</sup> <sup>67 tab. G.</sup> <sup>68 tab. H.</sup> <sup>69 tab. I.</sup> <sup>70 tab. J.</sup> <sup>71 tab. K.</sup> <sup>72 tab. L.</sup> <sup>73 tab. M.</sup> <sup>74 tab. N.</sup> <sup>75 tab. O.</sup> <sup>76 tab. P.</sup> <sup>77 tab. Q.</sup> <sup>78 tab. R.</sup> <sup>79 tab. S.</sup> <sup>80 tab. T.</sup> <sup>81 tab. U.</sup> <sup>82 tab. V.</sup> <sup>83 tab. W.</sup> <sup>84 tab. X.</sup> <sup>85 tab. Y.</sup> <sup>86 tab. Z.</sup> <sup>87 tab. A.</sup> <sup>88 tab. B.</sup> <sup>89 tab. C.</sup> <sup>90 tab. D.</sup> <sup>91 tab. E.</sup> <sup>92 tab. F.</sup> <sup>93 tab. G.</sup> <sup>94 tab. H.</sup> <sup>95 tab. I.</sup> <sup>96 tab. J.</sup> <sup>97 tab. K.</sup> <sup>98 tab. L.</sup> <sup>99 tab. M.</sup> <sup>100 tab. N.</sup> <sup>101 tab. O.</sup> <sup>102 tab. P.</sup> <sup>103 tab. Q.</sup> <sup>104 tab. R.</sup> <sup>105 tab. S.</sup> <sup>106 tab. T.</sup> <sup>107 tab. U.</sup> <sup>108 tab. V.</sup> <sup>109 tab. W.</sup> <sup>110 tab. X.</sup> <sup>111 tab. Y.</sup> <sup>112 tab. Z.</sup> <sup>113 tab. A.</sup> <sup>114 tab. B.</sup> <sup>115 tab. C.</sup> <sup>116 tab. D.</sup> <sup>117 tab. E.</sup> <sup>118 tab. F.</sup> <sup>119 tab. G.</sup> <sup>120 tab. H.</sup> <sup>121 tab. I.</sup> <sup>122 tab. J.</sup> <sup>123 tab. K.</sup> <sup>124 tab. L.</sup> <sup>125 tab. M.</sup> <sup>126 tab. N.</sup> <sup>127 tab. O.</sup> <sup>128 tab. P.</sup> <sup>129 tab. Q.</sup> <sup>130 tab. R.</sup> <sup>131 tab. S.</sup> <sup>132 tab. T.</sup> <sup>133 tab. U.</sup> <sup>134 tab. V.</sup> <sup>135 tab. W.</sup> <sup>136 tab. X.</sup> <sup>137 tab. Y.</sup> <sup>138 tab. Z.</sup> <sup>139 tab. A.</sup> <sup>140 tab. B.</sup> <sup>141 tab. C.</sup> <sup>142 tab. D.</sup> <sup>143 tab. E.</sup> <sup>144 tab. F.</sup> <sup>145 tab. G.</sup> <sup>146 tab. H.</sup> <sup>147 tab. I.</sup> <sup>148 tab. J.</sup> <sup>149 tab. K.</sup> <sup>150 tab. L.</sup> <sup>151 tab. M.</sup> <sup>152 tab. N.</sup> <sup>153 tab. O.</sup> <sup>154 tab. P.</sup> <sup>155 tab. Q.</sup> <sup>156 tab. R.</sup> <sup>157 tab. S.</sup> <sup>158 tab. T.</sup> <sup>159 tab. U.</sup> <sup>160 tab. V.</sup> <sup>161 tab. W.</sup> <sup>162 tab. X.</sup> <sup>163 tab. Y.</sup> <sup>164 tab. Z.</sup> <sup>165 tab. A.</sup> <sup>166 tab. B.</sup> <sup>167 tab. C.</sup> <sup>168 tab. D.</sup> <sup>169 tab. E.</sup> <sup>170 tab. F.</sup> <sup>171 tab. G.</sup> <sup>172 tab. H.</sup> <sup>173 tab. I.</sup> <sup>174 tab. J.</sup> <sup>175 tab. K.</sup> <sup>176 tab. L.</sup> <sup>177 tab. M.</sup> <sup>178 tab. N.</sup> <sup>179 tab. O.</sup> <sup>180 tab. P.</sup> <sup>181 tab. Q.</sup> <sup>182 tab. R.</sup> <sup>183 tab. S.</sup> <sup>184 tab. T.</sup> <sup>185 tab. U.</sup> <sup>186 tab. V.</sup> <sup>187 tab. W.</sup> <sup>188 tab. X.</sup> <sup>189 tab. Y.</sup> <sup>190 tab. Z.</sup> <sup>191 tab. A.</sup> <sup>192 tab. B.</sup> <sup>193 tab. C.</sup> <sup>194 tab. D.</sup> <sup>195 tab. E.</sup> <sup>196 tab. F.</sup> <sup>197 tab. G.</sup> <sup>198 tab. H.</sup> <sup>199 tab. I.</sup> <sup>200 tab. J.</sup> <sup>201 tab. K.</sup> <sup>202 tab. L.</sup> <sup>203 tab. M.</sup> <sup>204 tab. N.</sup> <sup>205 tab. O.</sup> <sup>206 tab. P.</sup> <sup>207 tab. Q.</sup> <sup>208 tab. R.</sup> <sup>209 tab. S.</sup> <sup>210 tab. T.</sup> <sup>211 tab. U.</sup> <sup>212 tab. V.</sup> <sup>213 tab. W.</sup> <sup>214 tab. X.</sup> <sup>215 tab. Y.</sup> <sup>216 tab. Z.</sup> <sup>217 tab. A.</sup> <sup>218 tab. B.</sup> <sup>219 tab. C.</sup> <sup>220 tab. D.</sup> <sup>221 tab. E.</sup> <sup>222 tab. F.</sup> <sup>223 tab. G.</sup> <sup>224 tab. H.</sup> <sup>225 tab. I.</sup> <sup>226 tab. J.</sup> <sup>227 tab. K.</sup> <sup>228 tab. L.</sup> <sup>229 tab. M.</sup> <sup>230 tab. N.</sup> <sup>231 tab. O.</sup> <sup>232 tab. P.</sup> <sup>233 tab. Q.</sup> <sup>234 tab. R.</sup> <sup>235 tab. S.</sup> <sup>236 tab. T.</sup> <sup>237 tab. U.</sup> <sup>238 tab. V.</sup> <sup>239 tab. W.</sup> <sup>240 tab. X.</sup> <sup>241 tab. Y.</sup> <sup>242 tab. Z.</sup> <sup>243 tab. A.</sup> <sup>244 tab. B.</sup> <sup>245 tab. C.</sup> <sup>246 tab. D.</sup> <sup>247 tab. E.</sup> <sup>248 tab. F.</sup> <sup>249 tab. G.</sup> <sup>250 tab. H.</sup> <sup>251 tab. I.</sup> <sup>252 tab. J.</sup> <sup>253 tab. K.</sup> <sup>254 tab. L.</sup> <sup>255 tab. M.</sup> <sup>256 tab. N.</sup> <sup>257 tab. O.</sup> <sup>258 tab. P.</sup> <sup>259 tab. Q.</sup> <sup>260 tab. R.</sup> <sup>261 tab. S.</sup> <sup>262 tab. T.</sup> <sup>263 tab. U.</sup> <sup>264 tab. V.</sup> <sup>265 tab. W.</sup> <sup>266 tab. X.</sup> <sup>267 tab. Y.</sup> <sup>268 tab. Z.</sup> <sup>269 tab. A.</sup> <sup>270 tab. B.</sup> <sup>271 tab. C.</sup> <sup>272 tab. D.</sup> <sup>273 tab. E.</sup> <sup>274 tab. F.</sup> <sup>275 tab. G.</sup> <sup>276 tab. H.</sup> <sup>277 tab. I.</sup> <sup>278 tab. J.</sup> <sup>279 tab. K.</sup> <sup>280 tab. L.</sup> <sup>281 tab. M.</sup> <sup>282 tab. N.</sup> <sup>283 tab. O.</sup> <sup>284 tab. P.</sup> <sup>285 tab. Q.</sup> <sup>286 tab. R.</sup> <sup>287 tab. S.</sup> <sup>288 tab. T.</sup> <sup>289 tab. U.</sup> <sup>290 tab. V.</sup> <sup>291 tab. W.</sup> <sup>292 tab. X.</sup> <sup>293 tab. Y.</sup> <sup>294 tab. Z.</sup> <sup>295 tab. A.</sup> <sup>296 tab. B.</sup> <sup>297 tab. C.</sup> <sup>298 tab. D.</sup> <sup>299 tab. E.</sup> <sup>300 tab. F.</sup> <sup>301 tab. G.</sup> <sup>302 tab. H.</sup> <sup>303 tab. I.</sup> <sup>304 tab. J.</sup> <sup>305 tab. K.</sup> <sup>306 tab. L.</sup> <sup>307 tab. M.</sup> <sup>308 tab. N.</sup> <sup>309 tab. O.</sup> <sup>310 tab. P.</sup> <sup>311 tab. Q.</sup> <sup>312 tab. R.</sup> <sup>313 tab. S.</sup> <sup>314 tab. T.</sup> <sup>315 tab. U.</sup> <sup>316 tab. V.</sup> <sup>317 tab. W.</sup> <sup>318 tab. X.</sup> <sup>319 tab. Y.</sup> <sup>320 tab. Z.</sup> <sup>321 tab. A.</sup> <sup>322 tab. B.</sup> <sup>323 tab. C.</sup> <sup>324 tab. D.</sup> <sup>325 tab. E.</sup> <sup>326 tab. F.</sup> <sup>327 tab. G.</sup> <sup>328 tab. H.</sup> <sup>329 tab. I.</sup> <sup>330 tab. J.</sup> <sup>331 tab. K.</sup> <sup>332 tab. L.</sup> <sup>333 tab. M.</sup> <sup>334 tab. N.</sup> <sup>335 tab. O.</sup> <sup>336 tab. P.</sup> <sup>337 tab. Q.</sup> <sup>338 tab. R.</sup> <sup>339 tab. S.</sup> <sup>340 tab. T.</sup> <sup>341 tab. U.</sup> <sup>342 tab. V.</sup> <sup>343 tab. W.</sup> <sup>344 tab. X.</sup> <sup>345 tab. Y.</sup> <sup>346 tab. Z.</sup> <sup>347 tab. A.</sup> <sup>348 tab. B.</sup> <sup>349 tab. C.</sup> <sup>350 tab. D.</sup> <sup>351 tab. E.</sup> <sup>352 tab. F.</sup> <sup>353 tab. G.</sup> <sup>354 tab. H.</sup> <sup>355 tab. I.</sup> <sup>356 tab. J.</sup> <sup>357 tab. K.</sup> <sup>358 tab. L.</sup> <sup>359 tab. M.</sup> <sup>360 tab. N.</sup> <sup>361 tab. O.</sup> <sup>362 tab. P.</sup> <sup>363 tab. Q.</sup> <sup>364 tab. R.</sup> <sup>365 tab. S.</sup> <sup>366 tab. T.</sup> <sup>367 tab. U.</sup> <sup>368 tab. V.</sup> <sup>369 tab. W.</sup> <sup>370 tab. X.</sup> <sup>371 tab. Y.</sup> <sup>372 tab. Z.</sup> <sup>373 tab. A.</sup> <sup>374 tab. B.</sup> <sup>375 tab. C.</sup> <sup>376 tab. D.</sup> <sup>377 tab. E.</sup> <sup>378 tab. F.</sup> <sup>379 tab. G.</sup> <sup>380 tab. H.</sup> <sup>381 tab. I.</sup> <sup>382 tab. J.</sup> <sup>383 tab. K.</sup> <sup>384 tab. L.</sup> <sup>385 tab. M.</sup> <sup>386 tab. N.</sup> <sup>387 tab. O.</sup> <sup>388 tab. P.</sup> <sup>389 tab. Q.</sup> <sup>390 tab. R.</sup> <sup>391 tab. S.</sup> <sup>392 tab. T.</sup> <sup>393 tab. U.</sup> <sup>394 tab. V.</sup> <sup>395 tab. W.</sup> <sup>396 tab. X.</sup> <sup>397 tab. Y.</sup> <sup>398 tab. Z.</sup> <sup>399 tab. A.</sup> <sup>400 tab. B.</sup> <sup>401 tab. C.</sup> <sup>402 tab. D.</sup> <sup>403 tab. E.</sup> <sup>404 tab. F.</sup> <sup>405 tab. G.</sup> <sup>406 tab. H.</sup> <sup>407 tab. I.</sup> <sup>408 tab. J.</sup> <sup>409 tab. K.</sup> <sup>410 tab. L.</sup> <sup>411 tab. M.</sup> <sup>412 tab. N.</sup> <sup>413 tab. O.</sup> <sup>414 tab. P.</sup> <sup>415 tab. Q.</sup> <sup>416 tab. R.</sup> <sup>417 tab. S.</sup> <sup>418 tab. T.</sup> <sup>419 tab. U.</sup> <sup>420 tab. V.</sup> <sup>421 tab. W.</sup> <sup>422 tab. X.</sup> <sup>423 tab. Y.</sup> <sup>424 tab. Z.</sup> <sup>425 tab. A.</sup> <sup>426 tab. B.</sup> <sup>427 tab. C.</sup> <sup>428 tab. D.</sup> <sup>429 tab. E.</sup> <sup>430 tab. F.</sup> <sup>431 tab. G.</sup> <sup>432 tab. H.</sup> <sup>433 tab. I.</sup> <sup>434 tab. J.</sup> <sup>435 tab. K.</sup> <sup>436 tab. L.</sup> <sup>437 tab. M.</sup> <sup>438 tab. N.</sup> <sup>439 tab. O.</sup> <sup>440 tab. P.</sup> <sup>441 tab. Q.</sup> <sup>442 tab. R.</sup> <sup>443 tab. S.</sup> <sup>444 tab. T.</sup> <sup>445 tab. U.</sup> <sup>446 tab. V.</sup> <sup>447 tab. W.</sup> <sup>448 tab. X.</sup> <sup>449 tab. Y.</sup> <sup>450 tab. Z.</sup> <sup>451 tab. A.</sup> <sup>452 tab. B.</sup> <sup>453 tab. C.</sup> <sup>454 tab. D.</sup> <sup>455 tab. E.</sup> <sup>456 tab. F.</sup> <sup>457 tab. G.</sup> <sup>458 tab. H.</sup> <sup>459 tab. I.</sup> <sup>460 tab. J.</sup> <sup>461 tab. K.</sup> <sup>462 tab. L.</sup> <sup>463 tab. M.</sup> <sup>464 tab. N.</sup> <sup>465 tab. O.</sup> <sup>466 tab. P.</sup> <sup>467 tab. Q.</sup> <sup>468 tab. R.</sup> <sup>469 tab. S.</sup> <sup>470 tab. T.</sup> <sup>471 tab. U.</sup> <sup>472 tab. V.</sup> <sup>473 tab. W.</sup> <sup>474 tab. X.</sup> <sup>475 tab. Y.</sup> <sup>476 tab. Z.</sup> <sup>477 tab. A.</sup> <sup>478 tab. B.</sup> <sup>479 tab. C.</sup> <sup>480 tab. D.</sup> <sup>481 tab. E.</sup> <sup>482 tab. F.</sup> <sup>483 tab. G.</sup> <sup>484 tab. H.</sup> <sup>485 tab. I.</sup> <sup>486 tab. J.</sup> <sup>487 tab. K.</sup> <sup>488 tab. L.</sup> <sup>489 tab. M.</sup> <sup>490 tab. N.</sup> <sup>491 tab. O.</sup> <sup>492 tab. P.</sup> <sup>493 tab. Q.</sup> <sup>494 tab. R.</sup> <sup>495 tab. S.</sup> <sup>496 tab. T.</sup> <sup>497 tab. U.</sup> <sup>498 tab. V.</sup> <sup>499 tab. W.</sup> <sup>500 tab. X.</sup> <sup>501 tab. Y.</sup> <sup>502 tab. Z.</sup> <sup>503 tab. A.</sup> <sup>504 tab. B.</sup> <sup>505 tab. C.</sup> <sup>506 tab. D.</sup> <sup>507 tab. E.</sup> <sup>508 tab. F.</sup> <sup>509 tab. G.</sup> <sup>510 tab. H.</sup> <sup>511 tab. I.</sup> <sup>512 tab. J.</sup> <sup>513 tab. K.</sup> <sup>514 tab. L.</sup> <sup>515 tab. M.</sup> <sup>516 tab. N.</sup> <sup>517 tab. O.</sup> <sup>518 tab. P.</sup> <sup>519 tab. Q.</sup> <sup>520 tab. R.</sup> <sup>521 tab. S.</sup> <sup>522 tab. T.</sup> <sup>523 tab. U.</sup> <sup>524 tab. V.</sup> <sup>525 tab. W.</sup> <sup>526 tab. X.</sup> <sup>527 tab. Y.</sup> <sup>528 tab. Z.</sup> <sup>529 tab. A.</sup> <sup>530 tab. B.</sup> <sup>531 tab. C.</sup> <sup>532 tab. D.</sup> <sup>533 tab. E.</sup> <sup>534 tab. F.</sup> <sup>535 tab. G.</sup> <sup>536 tab. H.</sup> <sup>537 tab. I.</sup> <sup>538 tab. J.</sup> <sup>539 tab. K.</sup> <sup>540 tab. L.</sup> <sup>541 tab. M.</sup> <sup>542 tab. N.</sup> <sup>543 tab. O.</sup> <sup>544 tab. P.</sup> <sup>545 tab. Q.</sup> <sup>546 tab. R.</sup> <sup>547 tab. S.</sup> <sup>548 tab. T.</sup> <sup>549 tab. U.</sup> <sup>550 tab. V.</sup> <sup>551 tab. W.</sup> <sup>552 tab. X.</sup> <sup>553 tab. Y.</sup> <sup>554 tab. Z.</sup> <sup>555 tab. A.</sup> <sup>556 tab. B.</sup> <sup>557 tab. C.</sup> <sup>558 tab. D.</sup> <sup>559 tab. E.</sup> <sup>560 tab. F.</sup> <sup>561 tab. G.</sup> <sup>562 tab. H.</sup> <sup>563 tab. I.</sup> <sup>564 tab. J.</sup> <sup>565 tab. K.</sup> <sup>566 tab. L.</sup> <sup>567 tab. M.</sup> <sup>568 tab. N.</sup> <sup>569 tab. O.</sup> <sup>570 tab. P.</sup> <sup>571 tab. Q.</sup> <sup>572 tab. R.</sup> <sup>573 tab. S.</sup> <sup>574 tab. T.</sup> <sup>575 tab. U.</sup> <sup>576 tab. V.</sup> <sup>577 tab. W.</sup> <sup>578 tab. X.</sup> <sup>579 tab. Y.</sup> <sup>580 tab. Z.</sup> <sup>581 tab. A.</sup> <sup>582 tab. B.</sup> <sup>583 tab. C.</sup> <sup>584 tab. D.</sup> <sup>585 tab. E.</sup> <sup>586 tab. F.</sup> <sup>587 tab. G.</sup> <sup>588 tab. H.</sup> <sup>589 tab. I.</sup> <sup>590 tab. J.</sup> <sup>591 tab. K.</sup> <sup>592 tab. L.</sup> <sup>593 tab. M.</sup> <sup>594 tab. N.</sup> <sup>595 tab. O.</sup> <sup>596 tab. P.</sup> <sup>597 tab. Q.</sup> <sup>598 tab. R.</sup> <sup>599 tab. S.</sup> <sup>600 tab. T.</sup> <sup>601 tab. U.</sup> <sup>602 tab. V.</sup> <sup>603 tab. W.</sup> <sup>604 tab. X.</sup> <sup>605 tab. Y.</sup> <sup>606 tab. Z.</sup> <sup>607 tab. A.</sup> <sup>608 tab. B.</sup> <sup>609 tab. C.</sup> <sup>610 tab. D.</sup> <sup>611 tab. E.</sup> <sup>612 tab. F.</sup> <sup>613 tab. G.</sup> <sup>614 tab. H.</sup> <sup>615 tab. I.</sup> <sup>616 tab. J.</sup> <sup>617 tab. K.</sup> <sup>618 tab. L.</sup> <sup>619 tab. M.</sup> <sup>620 tab. N.</sup> <sup>621 tab. O.</sup> <sup>622 tab. P.</sup> <sup>623 tab. Q.</sup> <sup>624 tab. R.</sup> <sup>625 tab. S.</sup> <sup>626 tab. T.</sup> <sup>627 tab. U.</sup> <sup>628 tab. V.</sup> <sup>629 tab. W.</sup> <sup>630 tab. X.</sup> <sup>631 tab. Y.</sup> <sup>632 tab. Z.</sup> <sup>633 tab. A.</sup> <sup>634 tab. B.</sup> <sup>635 tab. C.</sup> <sup>636 tab. D.</sup> <sup>637 tab. E.</sup> <sup>638 tab. F.</sup> <sup>639 tab. G.</sup> <sup>640 tab. H.</sup> <sup>641 tab. I.</sup> <sup>642 tab. J.</sup> <sup>643 tab. K.</sup> <sup>644 tab. L.</sup> <sup>645 tab. M.</sup> <sup>646 tab. N.</sup> <sup>647 tab. O.</sup> <sup>648 tab. P.</sup> <sup>649 tab. Q.</sup> <sup>650 tab. R.</sup> <sup>651 tab. S.</sup> <sup>652 tab. T.</sup> <sup>653 tab. U.</sup> <sup>654 tab. V.</sup> <sup>655 tab. W.</sup> <sup>656 tab. X.</sup> <sup>657 tab. Y.</sup> <sup>658 tab. Z.</sup> <sup>659 tab. A.</sup> <sup>660 tab. B.</sup> <sup>661 tab. C.</sup> <sup>662 tab. D.</sup> <sup>663 tab. E.</sup> <sup>664 tab. F.</sup> <sup>665 tab. G.</sup> <sup>666 tab. H.</sup> <sup>667 tab. I.</sup> <sup>668 tab. J.</sup> <sup>669 tab. K.</sup> <sup>670 tab. L.</sup> <sup>671 tab. M.</sup> <sup>672 tab. N.</sup> <sup>673 tab. O.</sup> <sup>674 tab. P.</sup> <sup>675 tab. Q.</sup> <sup>676 tab. R.</sup> <sup>677 tab. S.</sup> <sup>678 tab. T.</sup> <sup>679 tab. U.</sup> <sup>680 tab. V.</sup> <sup>681 tab. W.</sup> <sup>682 tab. X.</sup> <sup>683 tab. Y.</sup> <sup>684 tab. Z.</sup> <sup>685 tab. A.</sup> <sup>686 tab. B.</sup> <sup>687 tab. C.</sup> <sup>688 tab. D.</sup> <sup>689 tab. E.</sup> <sup>690 tab. F.</sup> <sup>691 tab. G.</sup> <sup>692 tab. H.</sup> <sup>693 tab. I.</sup> <sup>694 tab. J.</sup> <sup>695 tab. K.</sup> <sup>696 tab. L.</sup> <sup>697 tab. M.</sup> <sup>698 tab. N.</sup> <sup>699 tab. O.</sup> <sup>700 tab. P.</sup> <sup>701 tab. Q.</sup> <sup>702 tab. R.</sup> <sup>703 tab. S.</sup> <sup>704 tab. T.</sup> <sup>705 tab. U.</sup> <sup>706 tab. V.</sup> <sup>707 tab. W.</sup> <sup>708 tab. X.</sup> <sup>709 tab. Y.</sup> <sup>710 tab. Z.</sup> <sup>711 tab. A.</sup> <sup>712 tab. B.</sup> <sup>713 tab. C.</sup> <sup>714 tab. D.</sup> <sup>715 tab. E.</sup> <sup>716 tab. F.</sup> <sup>717 tab. G.</sup> <sup>718 tab. H.</sup> <sup>719 tab. I.</sup> <sup>720 tab. J.</sup> <sup>721 tab. K.</sup> <sup>722 tab. L.</sup> <sup>723 tab. M.</sup> <sup>724 tab. N.</sup> <sup>725 tab. O.</sup> <sup>726 tab. P.</sup> <sup>727 tab. Q.</sup> <sup>728 tab. R.</sup> <sup>729 tab. S.</sup> <sup>730 tab. T.</sup> <sup>731 tab. U.</sup> <sup>732 tab. V.</sup> <sup>733 tab. W.</sup> <sup>734 tab. X.</sup> <sup>735 tab. Y.</sup> <sup>736 tab. Z.</sup> <sup>737 tab. A.</sup> <sup>738 tab. B.</sup> <sup>739 tab. C.</sup> <sup>740 tab. D.</sup> <sup>741 tab. E.</sup> <sup>742 tab. F.</sup> <sup>743 tab. G.</sup> <sup>744 tab. H.</sup> <sup>745 tab. I.</sup> <sup>746 tab. J.</sup> <sup>747 tab. K.</sup> <sup>748 tab. L.</sup> <sup>749 tab. M.</sup> <sup>750 tab. N.</sup> <sup>751 tab. O.</sup> <sup>752 tab. P.</sup> <sup>753 tab. Q.</sup> <sup>754 tab. R.</sup> <sup>755 tab. S.</sup> <sup>756 tab. T.</sup> <sup>757 tab. U.</sup> <sup>758 tab. V.</sup> <sup>759 tab. W.</sup> <sup>760 tab. X.</sup> <sup>761 tab. Y.</sup> <sup>762 tab. Z.</sup> <sup>763 tab. A.</sup> <sup>764 tab. B.</sup> <sup>765 tab. C.</sup> <sup>766 tab. D.</sup> <sup>767 tab. E.</sup> <sup>768 tab. F.</sup> <sup>769 tab. G.</sup> <sup>770 tab. H.</sup> <sup>771 tab. I.</sup> <sup>772 tab. J.</sup> <sup>773 tab. K.</sup> <sup>774 tab. L.</sup> <sup>775 tab. M.</sup> <sup>776 tab. N.</sup> <sup>777 tab. O.</sup> <sup>778 tab. P.</sup> <sup>779 tab. Q.</sup> <sup>780 tab. R.</sup> <sup>781 tab. S.</sup> <sup>782 tab. T.</sup> <sup>783 tab. U.</sup> <sup>784 tab. V.</sup> <sup>785 tab. W.</sup> <sup>786 tab. X.</sup> <sup>787 tab. Y.</sup> <sup>788 tab. Z.</sup> <sup>789 tab. A.</sup> <sup>790 tab. B.</sup> <sup>791 tab. C.</sup> <sup>792 tab. D.</sup> <sup>793 tab. E.</sup> <sup>794 tab. F.</sup> <sup>795 tab. G.</sup> <sup>796 tab. H.</sup> <sup>797 tab. I.</sup> <sup>798 tab. J.</sup> <sup>799 tab. K.</sup> <sup>800 tab. L.</sup> <sup>801 tab. M.</sup> <sup>802 tab. N.</sup> <sup>803 tab. O.</sup> <sup>804 tab. P.</sup> <sup>805 tab. Q.</sup> <sup>806 tab. R.</sup> <sup>807 tab. S.</sup> <sup>808 tab. T.</sup> <sup>809 tab. U.</sup> <sup>810 tab. V.</sup> <sup>811 tab. W.</sup> <sup>812 tab. X.</sup> <sup>813 tab. Y.</sup> <sup>814 tab. Z.</sup> <sup>815 tab. A.</sup> <sup>816 tab. B.</sup> <sup>817 tab. C.</sup> <sup>818 tab. D.</sup> <sup>819 tab. E.</sup> <sup>820 tab. F.</sup> <sup>821 tab. G.</sup> <sup>822 tab. H.</sup> <sup>823 tab. I.</sup> <sup>824 tab. J.</sup> <sup>825 tab. K.</sup> <sup>826 tab. L.</sup> <sup>827 tab. M.</sup> <sup>828 tab. N.</sup> <sup>829 tab. O.</sup> <sup>830 tab. P.</sup> <sup>831 tab. Q.</sup> <sup>832 tab. R.</sup> <sup>833 tab. S.</sup> <sup>834 tab. T.</sup> <sup>835 tab. U.</sup> <sup>836 tab. V.</sup> <sup>837 tab. W.</sup> <sup>838 tab. X.</sup> <sup>839 tab. Y.</sup> <sup>840 tab. Z.</sup> <sup>841 tab. A.</sup> <sup>842 tab. B.</sup> <sup>843 tab. C.</sup> <sup>844 tab. D.</sup> <sup>845 tab. E.</sup> <sup>846 tab. F.</sup> <sup>847 tab. G.</sup> <sup>848 tab. H.</sup> <sup>849 tab. I.</sup> <sup>850 tab. J.</sup> <sup>851 tab. K.</sup> <sup>852 tab. L.</sup> <sup>853 tab. M.</sup> <sup>854 tab. N.</sup> <sup>855 tab. O.</sup> <sup>856 tab. P.</sup> <sup>857 tab. Q.</sup> <sup>858 tab. R.</sup> <sup>859 tab. S.</sup> <sup>860 tab. T.</sup> <sup>861 tab. U.</sup> <sup>862 tab. V.</sup> <sup>863 tab. W.</sup> <sup>864 tab. X.</sup> <sup>865 tab. Y.</sup> <sup>866 tab. Z.</sup> <sup>867 tab. A.</sup> <sup>868 tab. B.</sup> <sup>869 tab. C.</sup> <sup>870 tab. D.</sup> <sup>871 tab. E.</sup> <sup>872 tab. F.</sup> <sup>873 tab. G.</sup> <sup>874 tab. H.</sup> <sup>875 tab. I.</sup> <sup>876 tab. J.</sup> <sup>877 tab. K.</sup> <sup>878 tab. L.</sup> <sup>879 tab. M.</sup> <sup>880 tab. N.</sup> <sup>881 tab. O.</sup> <sup>882 tab. P.</sup> <sup>883 tab. Q.</sup> <sup>884 tab. R.</sup> <sup>885 tab. S.</sup> <sup>886 tab. T.</sup> <sup>887 tab. U.</sup> <sup>888 tab. V.</sup> <sup>889 tab. W.</sup> <sup>890 tab. X.</sup> <sup>891 tab. Y.</sup> <sup>892 tab. Z.</sup> <sup>893 tab. A.</sup> <sup>894 tab. B.</sup> <sup>895 tab. C.</sup> <sup>896 tab. D.</sup> <sup>897 tab. E.</sup> <sup>898 tab. F.</sup> <sup>899 tab. G.</sup> <sup>900 tab. H.</sup> <sup>901 tab. I.</sup> <sup>902 tab. J.</sup> <sup>903 tab. K.</sup> <sup>904 tab. L.</sup> <sup>905 tab. M.</sup> <sup>906 tab. N.</sup> <sup>907 tab. O.</sup> <sup>908 tab. P.</sup> <sup>909 tab. Q.</sup> <sup>910 tab. R.</sup> <sup>911 tab. S.</sup> <sup>912 tab. T.</sup> <sup>913 tab. U.</sup> <sup>914 tab. V.</sup> <sup>915 tab. W.</sup> <sup>916 tab. X.</sup> <sup>917 tab. Y.</sup> <sup>918 tab. Z.</sup> <sup>919 tab. A.</sup> <sup>920 tab. B.</sup> <sup>921 tab. C.</sup> <sup>922 tab. D.</sup> <sup>923 tab. E.</sup> <sup>924 tab. F.</sup> <sup>925 tab. G.</sup> <sup>926 tab. H.</sup> <sup>927 tab. I.</sup> <sup>928 tab. J.</sup> <sup>929 tab. K.</sup> <sup>930 tab. L.</sup> <sup>931 tab. M.</sup> <sup>932 tab. N.</sup> <sup>933 tab. O.</sup> <sup>934 tab. P.</sup> <sup>935 tab. Q.</sup> <sup>936 tab. R.</sup> <sup>937 tab. S.</sup> <sup>938 tab. T.</sup> <sup>939 tab. U.</sup> <sup>940 tab. V.</sup> <sup>941 tab. W.</sup> <sup>942 tab. X.</sup> <sup>943 tab. Y.</sup> <sup>944 tab. Z.</sup> <sup>945 tab. A.</sup> <sup>946 tab. B.</sup> <sup>947 tab. C.</sup> <sup>948 tab. D.</sup> <sup>949 tab. E.</sup> <sup>950 tab. F.</sup> <sup>951 tab. G.</sup> <sup>952 tab. H.</sup> <sup>953 tab. I.</sup> <sup>954 tab. J.</sup> <sup>955 tab. K.</sup> <sup>956 tab. L.</sup> <sup>957 tab. M.</sup> <sup>958 tab. N.</sup> <sup>959 tab. O.</sup> <sup>960 tab. P.</sup> <sup>961 tab. Q.</sup> <sup>962 tab. R.</sup> <sup>963 tab. S.</sup> <sup>964 tab. T.</sup> <sup>965 tab. U.</sup> <sup>966 tab. V.</sup> <sup>967 tab. W.</sup> <sup>968 tab. X.</sup> <sup>969 tab. Y.</sup> <sup>970 tab. Z.</sup> <sup>971 tab. A.</sup> <sup>972 tab. B.</sup> <sup>973 tab. C.</sup> <sup>974 tab. D.</sup> <sup>975 tab. E.</sup> <sup>976 tab. F.</sup> <sup>977 tab. G.</sup> <sup>978 tab. H.</sup> <sup>979 tab. I.</sup> <sup>980 tab. J.</sup> <sup>981 tab. K.</sup> <sup>982 tab. L.</sup> <sup>983 tab. M.</sup> <sup>984 tab. N.</sup> <sup>985 tab. O.</sup> <sup>986 tab. P.</sup> <sup>987 tab. Q.</sup> <sup>988 tab. R.</sup> <sup>989 tab. S.</sup> <sup>990 tab. T.</sup> <sup>991 tab. U.</sup> <sup>992 tab. V.</sup> <sup>993 tab. W.</sup> <sup>994 tab. X.</sup> <sup>995 tab. Y.</sup> <sup>996 tab. Z.</sup> <sup>997 tab. A.</sup> <sup>998 tab. B.</sup> <sup>999 tab. C.</sup> <sup>1000 tab. D.</sup>

Hominis 5.  
Simiarum 7.

Hominis 6.  
Simiarum 8.

b ijs qui  
uicē fecerit  
12 tabula

hominum, in thoracis cavitare situm sibi peculiariter uendicat, extenditurq; per uniuersum pectoris ossis latus, sub tota uerarum costarum cartilaginum regione, propemodum costarum os exteriori ipsius latere contingens. Est autem musculus iste triangularis, ex duobus longissimis lateribus, unoq; breui constructus, & tenuis, omniq; ex parte carnosus. Fibrae sortitur obliquas, ex ossis pectoris lateribus sursum in posteriora protensas, nisi fortassis maius asserere, ipsas à costis ad pectus, à posterioribus deorsum in priora ferri, huncq; musculum huius sedis intercostalibus annumerare. Adnascitur autem omnibus

uerarum costarū cartilaginibus, illas ad pectoris os, in sinus nimirum, quibus illae inarticulatur, attrahens, & eo motu thoracem quoq; arctans, & costarum cartilagine inuicem colligens. <sup>1</sup> Superfunt præter utriq; lateri communem adhuc, utrinq; duo & uiginti, ac deinde duodecim. In singulis enim costarum interuallis, quæ undecim in alterutro latere sunt, bini producuntur musculi, inde intercostales nuncupati. Ad illorum siquidem generationem, per totam costarum longitudinem, ab inferiori regione superioris costæ, in superiorem humilioris, & in descensu proximæ sedem, nervosæ quædam fibræ, mox ab ortu carni committæ, deorsum producuntur. <sup>2</sup> Et rursus à superiori parte inferioris costæ, aliæ fibræ in inferiorem elatioris costæ sedem obliquè sursum procedunt, sic sanè, ut in singulis costarum interuallis duo intercostales musculi habeantur, qui mutuò incumbunt, ac fibras decussatim prorepentes sortiuntur, & per uniuersum interuallum semper carnosè permanent, nec ob loci angustiam in tendinem cessant. ac proinde intercostaliū musculorum alios exteriores, alios uerò interiores non ineptè dicimus. <sup>3</sup> Externi in singulis costarum interuallis, simulatq; costæ à transuerso uertebrarū processu abscedunt, principium habent, ac fibris constant, ex superiori costa in inferiorem obliquè in priora deorsum prorepantibus. Hunc fibrarum ductum, per uniuersa spuriarum costarum interualla, tam quæ inter ossa, quam quæ inter cartilagine consistunt, exteriores musculi seruant: & uerarum costarum musculi, usq; ad costarum partem, qua in cartilagine finiunt, eum quoq; ductum retinent.

*Intercostales  
musculi utrimque  
triginta  
quatuor.*

*Externi intercostales.*

<sup>4</sup> Vbi autem uerarum costarum ossa in cartilagine degenerant, mox fibrarum ductus uariat. ab inferioris namq; costæ cartilagine, sursum in priora obliquè, uersus superioris costæ cartilagine, fibræ inibi procedunt, donec & in hac parte exterior musculus pectoris ossi committatur. Externis his intercostalibus musculis id priuatim accidit, quòd longè magis nervosè excarnesq; ui-suntur in ea costarum sede, quæ à uertebris primū abscedit, quàm per reliquam interualli longitudinem: deinde non solum ab inferiori sede superioris costæ, in superiorem humilioris costæ sedem ducuntur, uerū etiam ab externa superioris costæ incipiunt sede, & in externam inferioris inferuntur. <sup>5</sup> Internorum intercostalium musculorum fibræ, situm prædictis contrarium obtinent: quæ enim uertebrarum corporibus proximè sunt, ex inferioris costæ superioris sede, in inferiorè elatioris costæ sedem, fibras obliquè sursum in priora protensas mittunt. Hanc fibrarum seriem interiores musculi per tota spuriarum costarum interualla retinent: ut & in uerarum quoq; interuallis, ad eam usq; costarum sedem, ubi in cartilagine degenerant: ibidem enim ilico ac interni eò deuenerint, fibrarū ductum emutant. nam à superioris costæ cartilagine, in inferioris costæ cartilagine, fibræ in priora deorsum obliquè protenduntur. Atq; ut semel dicam, in uerarū costarum interuallis musculi, qui inter costarum ossa habentur, omnino his qui inter cartilagine existunt, cōtrario fibrarum situ donantur. quod quum præsiūs Arabes animaduertet, in singulis interuallis

*Interni intercostales.*

e 3 fi. cap.  
19 lib. 1. E  
in 18, aut 18  
aut 7 fig. 6  
net 7  
f specia 2  
tab. V. X.  
e 14. D. E.  
e figuræ  
in tabula  
apposita,  
decem V 11  
tab.  
g 6, 11 tab.  
V.  
h 8 tab. E.

i 6 tab. V.  
X 8 tab.  
D. 11 V.  
h 3 fi. cap.  
19 lib. 1. 4 c  
per fad A.

i cūstlem  
fig. 4 B ad  
E. aut po-  
tius 6 tab.  
T, decem X.

m 3 tab. E.  
E, ac de in  
figura illic  
internæ pe-  
ctoris sedis  
ostendens.



Intercoſtaliū  
muſculorū  
munus.

In ſegmēto de  
Reſpirationis  
cauſis.  
Ad finem li-  
bri de Motu  
muſc.

interuallis non duos, ſed quatuor muſculos eſſe, ueterum quorundam Anato-  
micorum modo tradiderunt: quanquam de ſex tantum uerarum coſtarum  
(quæ ſeptem numero cenſentur) interuallis id uerè aſſeruerint. nam in ſpu-  
rijs coſtis bini duntaxat muſculi numerari queunt. Quum itaque ſex ſint uera  
rum coſtarum interualla, nihil ex fibrarum ſerie obſtiterit, in utroq; latere qua-  
tuor & triginta intercoſtales muſculos enumerare: quemadmodum & ego  
paulo antè, quum adhuc utrinque duos & uiginti, ac deinde etiā duodecim,  
præter<sup>n</sup> muſculum ambobus lateribus communem, enarrationi deeſſe dice-<sup>n 7 tab. 4.</sup>

rem. Intercoſtaliū muſculorum beneficio Galenus pleriq; locis thoracem  
ſtringi & laxari cenſet: at quum duplices hi ſint, exteriores expirationem mo-  
ſtiri prodidit, quod eſt coſtas ſimul adducere, thoracemq; comprimere: inte-  
rioribus autem inſpirandi munus aſſcripſit, quod eſt coſtas ab inuicem abdu-  
cere, amplioremq; thoracis cauitatem efficere. Interdum uerò non ſibi con-  
ſtans, exteriores inſpirationi, interiores autè expirationi præeſſe uoluit. Num  
uerò uel altera, quæcunq; magis tibi arridet, harum ſententiarum ueritati ſit  
conſona, diligenter (at ſepoſito interim affectu) perpendas uelini. Ego enim,  
quantumuis Galeni doctrinæ deditus, neutiq; a ipſius placitis hîc queo aſſen-  
tiri: quandoquidè hætenus, qua ratione intercoſtales, ſiue interiores ſiue exte-  
riores muſculi, coſtas dirimere, ac ab inuicè deducere poſint, hauquaquam  
comperi: quantumuis etiā uiuas Galeni ſectiones animaduertim, & pri-  
mùm ſolus mihi hæc, & deinde in ſcholis eaſdem aggreſſus fuerim: quæ profe-  
ctò contrarium potius Galeni dogmatibus probant, quàm quòd illis ſubſcri-  
bant. Ad hæc, intercoſtaliū muſculorum ſitus, figura, fibræ, aliæq; omnia ad  
eorundem fabricam ſpectantia, dilucidius hos muſculos inuicem coſtas addu-  
cere, quàm laxare ſuadent. Exteriores quidem inter uerarum coſtarū oſſa, &  
per uniuerſa ſpuriarum interualla reſoſiti, inferiorem coſtam ſuperiori addu-  
cere apparent: interiores autem, ſuperiorem inferiori. Deinde exteriores mu-  
ſculos, inter uerarum coſtarum cartilagineſ collocatos, ſuperiorem cartilagi-  
nem inferiori, & interiores inferiorem cartilaginem ſuperiori attrahere exiſti-  
mo. quod ſi ſit, quid id aliud eſt, quàm ſimul omnes thoracè arctare, anguſtio-  
remq; efficere? Neq; mehercule à ratione abſonum eſt, ad expirationem, tho-  
racis ue arctationē, Naturā omnes muſculos intercoſtales produxiſſe: quum  
fortiori motu impetuq; ad efflationem, uocem, tuſim, ſternutationē, ſæciem  
excretionem, ad partum faciliùs excludendum, breuiter ad thoracis compref-  
ſionem, quàm ad inſpirationem, thoracis' ue dilatationem, indigeamus: adeò,  
ut muſculi inſpirationis autores meritò inualidi pauciq; ſint, quorum præci-

Septum tranſ-  
uerſum, ſeu  
muſculus utri-  
que lateri co-  
munis.

puus nunc recenſebitur. Quum itaq; hætenus omnes unius lateris muſculos,  
qui in altero latere pares fortiuntur, explicauimus, opportunum modò erit,  
orationem ad<sup>n</sup> muſculum utriq; lateri communem deſlectere. Eſt autem iſ,  
quem Græci *φρεστας*, & *διαφρεσταινα*, & *διωκυλιαν*, & *παρεπιδια*: Latini uerò ſeptum  
tranſuerſum, nonnunquam & præcordia uocarunt. Hic neq; ſitu, neq; forma,  
ulli totius corporis muſculo reſpondet: ſi quidem amplius eſt, & orbicularis, &  
in ipſius medio<sup>n</sup> caput ſuum, principium<sup>n</sup> ue gerit. Inibi enim ampla latitudine  
exactè membraneus exiſtit, ex qua fibræ inſtar linearum ex centro ad circuli  
circumferentiam educatarum excurrunt, ijs quibus ſeptum inferitur, partibus  
exporrectæ. Hæ peculiari muſculorum carne adauctæ, reliquam muſculi par-  
tem carnoſam efficiunt, quæ paulatim in progreſſu denſior carnoſiorq; pro ſi-  
brarum ductus lōgitudine redditur. Procedunt itaq; fibræ ex membraneo cir-  
culo, ad inferiorem oſis peſtoris regionem, iuxta mucronatæ cartilaginis ra-  
dicem.

o 7 tab. 4.  
1 fig. lib. 6  
1, 12 fig. 6  
R. 3 fig. 4.  
4 Q. 5 6  
n. 0. 12 1  
p 7 tab. in  
ter h. 6 m.  
n.

q Inferio-  
nem uni-  
uerſam 7  
oſſe dit tab.

dicem, deinceps aliq̃ sese succedentes ordine, ad spuriarum costarum extrema inferuntur: non quidem exteriori cartilaginum sede, at interiori, ut costarum cartilagines simul cum mucronata pectoris osis cartilagine, tutissimum septi transuersi propugnaculum efficiantur. Duodecimæ autem costæ cartilagini non solum inferitur, sed toti costæ longitudini carnosus adnascitur, & ad inferiorum costarum extrema, obliquè ascendente abdominis musculo, & longè magis transuerso admodum unitur. Cæterum septi fibræ, ad uertebras dorsii prorepentes, non in undecimam thoracis uertebram, quam spectant, infertio nem moliuntur, quod magna arteria sub septo transuerso repens, & sextus femur mouens musculus, adeò undecimæ uertebræ obducantur, ut septum ipsi connasci nequeat. Ac proinde septi fibræ, quas hic undecimæ thoracis uertebræ connecti oportebat, in duos membraneos, sed perquam ualidos desinunt tendines: qui deorsum ad magnæ arteriæ latera protensi, lumborū musculis inibi coherent: & sensim arctiores redditi, ac arteriæ nonnihil sese subiicientes, tantisper porriguntur, donec lumborum uertebras excarnes reperiant, ipsi s̃q̃ robustissimè & longo ductu inferantur. Vniuersum itaq; septum paulo minus toto orbiculare est, situmq̃; obliquum commoustrat: à pectoris enim osse, per spuriarum costarum extrema, ad eam quam diximus, in lumborum uertebris regionem protenditur, situmq̃; ob id à prioribus deorsum ad posteriora uergentem obtinet. Quinetiam duos sortitur circulos: unum membraneum, qui caput ipsius putatur: alterum hunc succingentem, qui carneus est. Verum quemadmodum hic, quo costis propinuius accedit, sensim carnosior efficitur: ita & ille, quo septi centro uiciniore est, membranosiore euadit: non tamen ambo exacti circuli imaginem referunt, sed, ut ita dicam, lati, & una parte in acutum angulum cessantis. Membraneus enim sursum, atq; in anteriora acutum porrigit angulum: carneus autem deorsum, atq; ad inferiora, illis reticulis quam finillimus, quibus in paruæ pilæ ludo utimur, & præcipuè si eius reticuli capulus dissolutus, modicèq; patescens fuerit, & ipsum lignū (quo breuius & latius reddatur) nõ segniter parietibus attusum. Cæterum uniuersum septi transuersi corpus duabus obducitur membranis. totam enim inferiorem ipsius amplitudinem, qua nutritionis organa spectat, peritonæum succingit: superior uerò uniuersa latitudo, cor pulmonemq; respiciēs, membrana costas succingente obducitur. Quinetiam contra aliorum musculorū naturam, paucis demptis, septum Hippocratis sententia duo esse recensuit: unum, quod uertebris, arteriæ magnæ, & descendēti ad uentriculi orificium stomacho uiam præbet: alterum, quo uena caua in thoracem transcendit. Nobis uerò tria esse obseruantur: primum, ubi ab inuicem deducuntur tendinum illorum principia, quæ solam transmittunt arteriam, & finem uenæ pari carentis, & ramos deinde sexti paris neruorum cerebri, qui ad costarum radices, sub membrana costas succingente propagantur, ac postmodū iecori, lienī, renibus, intestinis & omentum numerosa serie inferuntur. Si quis modò uertebras his cum Galeno adnumerare uelit, permitto quidem, quanquam improprie admodū uertebris septum uiam præbere uideatur: imò uix appositè, uiam, qua arteria fertur, foraminis nomine donamus, quum hæc potius semicirculū in septi transuersi circumferentia exculptum, quam foramen referat, septumq; superiori seu anteriori uertebrarum corporum parti, non autem lateribus cōmittatur. Secundum foramen, ad septi transuersi medium, uersus dextrum tamen cōsistit, uenæ cauæ in thoracem reptanti extructum, cuius corpori septum firmissimè, membra-

Septi foramina.

membranarum ipsi obnatarum beneficio connascitur: quemadmodum & hæ membranæ reliquis quoq; quibus septum iter præbet, pertinaciter committuntur. "Tertium foramen, inferius quàm media septi sedes, ad sinistrum latus modicè uergens habetur, quo<sup>1</sup> stomachus, & sexti neruorum paris rami, ad uentriculi orificium dimituntur: longè profectò secus, ac Hippocrates, Galenus, cæteri q; Anatomicorum proceres arbitrati sunt. Meæ huic sententiæ non sectio duntaxat, sed & ipsa ratio quoq; astipulatur. Arduus enim fuisset stomachi anfractus, si dorso propter duodecimam thoracis uertebam in primo foramine innixus, sursum ad priora in uentriculi superius orificium detorqueretur. Est enim primū foramen paulo inferius, quàm<sup>2</sup> media uentriculi secundum corporis longitudinem metita regio: & ipse uentriculus ea parte, qua stomachus illum ingreditur, teres existit: neq; magis uersus priora, quàm posteriora, stomachus cum ipso cōtinuum corpus efficitur. Cæterum quoni hæc de septi fabrica dixisse sufficiat, meritò nunc ipsius functionem enarrabimus. Plato existimauit ipsum duntaxat concupiscibilis, seu naturalis animæ, & animosæ septum esse transuersum. Aristoteles uerò, quum has animas, unius tantum in cor repositæ partes esse arbitraretur, in hoc septum à Natura procreatum affirmauit, ut cordis sedem à uentre dirimat, & animæ originem inoffensam à ciborum exhalationibus, & caloris aduentitij copia seruet. uerum eiufmodi non modò præstat, sed inter musculos thoracem mouentes, ad respirationem, ac ad propellenda uentris recremēta, in primis cōducit. huius tamen officium, quo thoracem mouet, obscurum est: neq; fat scio, an quispiam uerè id scriptum posteris reliquerit, aut etiam illud condignè tradere aggressus sit. Id enim Galeno (si ausum proloqui) peculiare est, ut quum alioquin prolixissimus sit, id quod maximè explicandum est, nonnunquam tacitus, at non ueluti ex proposito, prætereat, & fabula quapiam, aut aliquo in cæteros conuicio sese surripiat. Porro quantū hætenus assequor, septum transuersum proprio motu ois pectoris inferiorem terminum, & spuriarum costarum extrema, ad suum caput, tanquam ad centrum intrò trahit, nōnihil quoq; sursum uellens. Septi enim transuersi caput in medio mouendarū partium reponitur: & elatiori sui capitis sedi, quæ thoracis amplitudinem respicit<sup>3</sup>, nerui à ceruice decurrentes inferuntur. Quum itaq; septum in se conuellitur, & spuriarum costarum extrema quodammodo ad centrum colligit, solam inferiorem, eandemq; anteriorem thoracis partem, quam spuriarum costarum cartilagine constituant, arctat: posteriorem uerò, quæ ab harum cartilaginibus ad uertebas usq; habetur, dilatat, ac inuicem quinque inferiores costas dirimit, unā cum sexta & septima thoracis costis, quarum etiam cartilaginibus septum applantatur. Hæc igitur ratione inferiorem thoracis partem septum transuersum dilatat, ac distendit. Vt uerò, quod dico, assequaris manifestius, primū utranq; manum notharum costarum cartilaginibus accommodato: & ui attracto spiritu, qui intrò sursumq; cartilaginū extrema uellantur, sentito. deinde hic una manu relicta, alteram posteriori costarum regioni extensam impone: & rursus spiritu assumpto, qualiter iuxta dorsum costæ dirimantur, & cartilagine inuicem cōiueant, examinato: nisi fortassis canis, aliud<sup>4</sup> ue animal ad manum sit, cuius uiua sectio, septi functionem doceat. Atq; in hac administratione cauendum est, ne dum animal intrò spiritum ducit, id expirare arbitreris: quod sanè faceres promptissimè, si duntaxat spuriarum costarum extremis, illisq; sedibus animum adhiberes, quibus septum implantatur. Neque adhuc me latet, quosdā nostræ ætatis præcipuos uiros, qui mihi administrati aliquando obiter

i 7 tab. 7.

h 14, 15 fi.

lib. 3 D cū

T, V ad G.

l 15 fl. lib.

s M. n.

Septimum.

m 23 fig.

cap. 11 lib.

4 B, O. O. 1

fig. lib. 6

P. P.

P. P.



astitere, proprium septi motum ad inferiora fieri contendere: quos præter uiuam sectionem longè euidentissimam, docere oportuit, quòd alium exonerantes, spiritum, ualide còpresso interim thorace, retineamus, non autem continuo inspiremus, & thoracem dilatemus. quod sanè tum faciendū esset, si in thoracis dilatatione septum deorsum duceretur, ut scilicet tunc cum abdominis musculis excretionē opitularetur. Atq; id etiam docet ualidissima inspiratio, quoties illā ita moliri conaris, ac si spuriarū costarum cartilagine sursum introrsumq; moueri non statueres: quandoquidē cum uiillas retines, una atq; altera inspiratione facta, cartilaginū sedes non secus laborat, quàm si ui eam pugnis collisisses. Verum opinor & te quoq; uarijs modis hæc experiri: quemadmodum & ego nunc adeo uarijs respirationibus attento, ut præ lassitudine calamus è manibus ueniat reponendus. Ad dā tamen, & suffocatos, aut alia etiam ratione mortuos, qui extremum spiritū assument, eundem non remittentes (quod & mirū sanè est) liquidò meæ sententiæ subscribere. His namq; septum transuersum, ad superiora attractū conuulsumq; adeò, inter secandū apparet, ut septum in thoracis amplitudinē allatum, iecur & uentriculū in thoracē trahat, difficilemq; illorum sectionem nobis exhibeat: quæ tamen ilico prompta euadit, si thorax alicubi inter costas aut ipsum septū perforetur: id enim tunc statim flaccidum, instar madidi panni deorsum cōcidit, ac plus quàm uoles, iecur & uentriculū propendere sinit. quod quò nam pacto fiat, illi demum non ignorant, quibus musculorum contractionis & laxationis ratio perspecta est. Hactenus omnes musculos, solis costarū motibus subserviētes, explicauimus, qui simul omnes in simijs numero sunt octuagintaquinque, in hominibus autem octuaginta unus. Quum uerò & his octo abdominis musculos, in thoracem cōprimētiū classē prorsus reponēdos subnectimus, in homine omnes sunt octuagintanouem, in simijs autem tres & nonaginta. Obliquè enim descendētes abdominis musculi, si tendantur, admodū humiliorem thoracis sedem cōprimētes, thoracem arctant. Recti uerò, cum obliquè ascendenti bus costas deorsum trahunt, thoracēq; non parum constringunt. Transuersi etiam, intrò costas adducētes, ad arctandū thoracem faciūt. Porro eos qui brachium & scapulā mouent, parum etiam thoracis motibus auxiliari, aliquis arbitrari posset, si aliquādo thoracem fortiùs cōstringerent. uerum ita longè adhuc magis respirationis musculorum numerus excreuerēt, qui omnes non in omnibus respirationibus simul operari creduntur. Sunt autem primū resp rationis duo genera, inspirationū enim alia est naturalis, & non uiolēta, quæ nulla nisi naturali urgente necessitate fit: alia uehemens & uiolenta, quam efflationem nuncupamus. Sic quoque inspiratio alia naturalis, alia ad uocis generationem, aut ad aliud quippiā uiolenta existit: atq; hæc rursus differentiæ plurimum maioris minoris uel ratione inter se uariant. Naturalis inspirationis & expirationis septū duntaxat manifestus autor cēsetur: ipso enim cōtracto, tenso uel, medici thoracē abundè dilatari, inspirationēq; illam perfici arbitrantur. deinde rursus laxato septo, thoracē sua grauitate promptè concidere, expirationemq; moliri affirmant. Atq; id est, quod Galenus naturalem expirationem citra musculorum opem perfici, scriptum reliquit. At si aut cordis caloris qualitas increseat, aut ad uocē aliud uel munus maiori indigueris aere, mox primus, secundus, & hominis tertius & quintus, ac simiarū canumq; tertius, utrinq; unā cum septo ad inspirationē operabuntur, & ex Galeni suffragio interiores intercostales musculi quoq; agent. Quanquam nesciam, num exterioribus, an

*Musculū tho  
racem mouen  
tium enumera  
tio, & quando  
illū suo mouen  
tur officio.*

*Lib. de motu  
musculari, &  
aliter nonnulli  
alicubi lib. 8 de  
admir. scē.*

uerò interioribus musculis intercostalibus inspirandi munus Galenus, quum ita uarius sit, assignauerit. Si autē maioris expirationis efflationis ue, ad uocem, clamores, tibias ac tubas, & id genus instrumēta inflanda, necessitas ingruerit, exteriores intercostalium musculi sese operi accingent, unā cum interioribus. nam & hos quoq; costas inuicem adducere, thoracemq; arctare (quicquid Galenus interim sentiat) autumo. His statim in opere succedet, qui in simijs re-  
 cti abdominis musculi pars esse dicebatur: præterea<sup>a</sup> qui ad lōgissimi dorfum mouentis musculi latus utrinq; porrigitur, &<sup>d</sup> qui in thoracis cauitate sub uerarum costarum cartilaginibus latitat: postremò ipsi abdominis musculi, uix autem aut brachium, aut scapulam mouentium aliqui.

MVSCVLORVM THORACEM MOVENTIUM administratio. Caput xxxvi.



Ligamenta clauiculae ad pectoris os.

Primi musculi administratio.

Tertij canis musculi administratio.

Tertij hominis, & canis.

Quinti hominis, & canis.

MNIBVS musculis, quos hucusq; disseccari docuimus, reiectis, thoracem mouentium administrationem à primo auspicabere, haudquaquam omittens, quin Galeni doctrinæ gratia, simiam, aut si eius non detur copia, canem unā operi adhibeas. Acuto igitur cultello membraneum, sed impense ualidum ligamētum, quo clauicula pectoris osi necitur, primū discindes, mollem nerueamq; cartilaginem expendens, quæ præter cartilaginem osibus obnatam, pectoris os & clauiculam interuenit. Ad hæc, inter reliqua huius articuli ligamenta, ualidum quoddam ligamentum inquires, quod ab humiliori clauiculæ sede enatum, illic pectoris osi inseritur, ubi primæ costæ cartilago pectoris osi adnascitur. Mox clauiculam à prima thoracis costa nunc sursum, nunc deorsum reflectes, ac primi musculi originem & insertionem, simul cum ipsius fibrarum ductu considerabis: & musculo dein à clauicula liberato, illum pectori adhuc adherere fines. Secundus musculus, quoniā scapula modò à thorace dependet, totus sese offert: unde etiam citra aliam operam, à scapulæ basi disseccandus est, & usq; ad insertiones, quas in costas molitur, deducendus. In hac administratione sedulò animaduertes, num secundus musculus, à scapulæ basi in costas porrectus, thoracis motibus suppetias ferat: num uerò à costis initium ducēs, in scapulam inferatur, ipsamq; moueat. Atq; ad hanc speculationem non mediocriter confert, quòd in canibus tot transuersis uertebrarū ceruicis processibus illum aut inseri, aut ab eisdem enasci intueberis. Adempta nunc pariter cum brachio scapula, illam aliquòd repones, quo postmodum hæc ad musculorum brachium & cubitum & manum occupantiū sectionem subseruiat. Cæterum iam tertium canini thoracis musculum aggredieris, & illo à uertebris liberato, ac ad insertionem diuulso, tendinis ipsius naturam ad amussim examinabis. Quum itaq; hunc musculum in cane obseruaueris, in homine quoq; est quærendus, quod ubi frustra aliquandiu præstiteris, ad quartū canis, hominis uerò tertium musculum sectione conferes: huiusq; membraneo principio à uertebrarū, unde prodit, spinis longa sectione liberato, musculū ad suas, quibus inseritur, costas, à subiectis illi sedibus detrahes: nisi fortassis huius principium, quando capitis aggrediebaris musculos, à spina diremeris, & à primo illorum musculorū pari auulseris. Septimum canis, hominis autem quintum, similiter à suis quoq; unde enascitur, spinis auferes: ac ipsum à dorfum hinc mouentibus musculis, & canis sexto, hominis autem quarto thoracem mouentium, ad terminum usq; quo costas implantatur, liberatum, thoraci appédere fines.

fines. Postquam hos prædicta modò ratione administrueris, integrum est, singulos ad suum principium tuis manibus trahere, ipsorumq; motum, quo thoracem dilatare creduntur, obseruare, ac postmodum in totum à thorace illos reijcere. Vt uerò <sup>Quinti canis.</sup> quintum canis ad amussim examines, dummodo abdomi-

nis musculos aggredienti is sese tibi non obtulerit, aut eosdem nondum disse-

cueris, optarim te transuersa linea, recti musculi carnosam<sup>1</sup> partem, quæ pectus confendere incipit, in totum diuidere: ac superiori parte hamulo aut digitis eleuata, eam à costarum cartilaginibus nouacula liberare. Còspicies enim unà cum carnosa musculi recti parte, latum tendinem à costarū cartilaginibus separari, atq; ut dixi, à carnosa recti parte enasci: ac quintum nobis inter thoracis motores enarratum musculum, recti abdominis musculi portionem censendum esse. Atq; id quidem in canibus & caudatis simijs inuenies, in hominibus autem (utpote quibus breuissimum pectus contigit) minimè. Hæc intuitus,

<sup>Quarti hominis, & canis.</sup> quarti hominis, canis uerò sexti musculi caput, ab undecimo dorsum mouente diuides: ac illum à costis omnibus dissecans, qui ipsis inferatur, inuestigabis. Huius itaq; functione obseruata, & ipso musculo à thorace absecto, intercostales musculi exteriores uniuersi manifestissimè oculis sese obijciunt. Quò

autem & interiores contuearis, leui admodū sectione, in uno costarum intervallo, secundum inferiorem costę sedem, conaberis exteriorem musculum diuidere, ac paulatim hamulo eleuatū, ab interiori separare: ilico enim intercostalium natura & fibræ occurrent, inuicem contrario situ incumbētes. quam & interiores, aperto thorace, rursus licebit examinare. Hortor interim, utcumq; eos indagaeris, ut diligentissimè inquiras, num interiores alijs quàm

exteriores fungantur munijs, ac illi inspirationi, hi uerò expirationi (aut contrà) famulentur: an simul omnes, mea sententia, eidem muneri præfiantur, omnesq; thoracē arctent. Quoniam autem iam antea, quæ peritonæo obcun-

<sup>Septi transuersi.</sup> guntur, exempta sunt, iecur inquam, lien, uentriculus, intestina & renes, nulla sectione adhibita, inferior<sup>o</sup> septi transuersi pars còspicua euadit: ubi mox duos inspicis circulos, membraneum unum, & carnosum alterum: ad hæc tria, quæ dixi, foramina, & tēdines, lumborū uertebreis adnatos. Vt uerò fibras ad amussim, reliquamq; sedem septi inferiorē exactiùs intuearis, peritonæum à septo

manibus uenit dirimendum: quod in porcis citra omne fiet negocium, in homine autem & cane non item. Cæterum ut superior septi pars, thoracis amplitudinem respiciens, in conspectum quoq; ueniat, in homine cultro aliquo me

diocri<sup>p</sup> à primæ costæ cartilagine, quā olsi ipsius costæ còmittitur, sectionem ad infimam usq; costam, per cartilagines utrinq; molieris: deinde mucronata cartilagine, sinistra manu eleuata, ab inferiori olsi pectoris regione, & huius loci cartilaginibus, septum transuersum abrades. Deinceps erectis cum pectoris offe cartilaginibus,<sup>q</sup> membranas interiori olsi sedi cónatas, ac thoracis am-

plitudinem intersepientes, & uenas simul & arterias, è iugulo pectori exportectas, absecabis, donec pectoris os ab omnibus liberatum, cum cartilaginibus à thorace commodè auferas. Reposito itaque paulisper pectoris offe, à septo membranæ thoracis amplitudinem intersepientes, & cordis etiam inuolucrum, rescinduntur. quod longè secus, quàm Galenus undiq; arbitratur, magna sui parte septo in hominibus adnascitur, multo sanè aliter, quàm in canibus, & Galeni simijs. Insuper à septo neruos ipsi insertos, uenam cauam, & stomachum uerò, ac menfæ exportectum, rursus, si libuerit, examinabis. Iam pectoris os in manus assumens, in parte ipsius interiori, secundum illius longitudinem



singulos utrinque<sup>s</sup> musculos tenues, carnosos & amplos exportrigi conspicias. s. 1. lib. 1.  
 Licebit hos à pectoris ossè ac cartilaginibus nouacula ac cutiori liberare, & cuius motus autores sint inquirere. Vbi & hos absceueris, interiores intercostalium contemplaberis: ac corde, pulmone, uenis, arterijs, stomacho, & si quæ alia in thoracis capacitate habentur, ablatis, thoracis musculorum administrationi summam manum impones.

## DE THORACIS LIGAMENTIS.

Caput xxxvii.



**T**HORACIS ligamenta notatu digniora, præter ea quæ superiori Capite in clauiculæ ad pectoris os nexu descriptimus, unaq; dissecuimus, ad duodecim thoracis uertebrae spectant: unde & hæc cum reliquis dorsi ligamentis examinanda ueniunt. Costis autem ad uertebrae nullum peculiare ligamentum obducitur, præter membraneum, articulis omnibus commune, quod hic durissimum est, & cartilaginis naturæ particeps: atq; id potissimum inter transuersi processus radicem, seu primum costæ ad uertebrae articulum, & transuersi processus apicem, uel secundum articulum accidit. Dein prima costæ, quod maius ferè cæteris onus sustinet, ualidiori ac ueluti peculiari ligamento primæ uertebrae corpori, quàm decem insequentes, nectitur. Duodecima enim, quum prorsus ab undecima undiq; dehiscit, nulloq; pacto transuerso suæ uertebrae committitur processui, etiam insigniter ualido ac quasi proprio nectitur ligamēto, cuius gratia duodecimā uertebrae priuatum finem (uti & prima, sui ligamenti etiam occasione) nācisci diximus. Costarū cartilagineis suis ossibus non alligantur, quum hæc in illas degenerēt. Vbi autē pectoris ossi oblongis capitulis inarticularunt, nulla quoq; propria sibi uendicant ligamēta, præter mēbranea, alijs quoq; articulis cōmunia. Pectoris etiam os, in ligamentis nihil peculiare obtinet, nam ut & cæteris ossibus mēbrana quædam, quam, quod os ambit, *περιόστεον* Græci uocant, pectoris ossi obducitur, atq; hæc ualida ac quasi duplicata est, & hanc etiam ipsæ costarū cartilagineis, unā cum costarū ossibus cōmunem obtinent. Licebit itaq; eiusmodi mēbranas & ligamēta exiguis cultellis in pectoris ossè & cartilaginibus obseruare. quæ autem costas uertebrae cōmittunt ligamenta, non nisi ablatis dorsum mouētibus musculis, opportunè aggrediūtur.

Ligamentorum  
administratio.

## DE MUSCULIS DORSVM MOVENTIBUS. Caput xxxviii.



**M**USCULORVM sanè uicinitas, ilico musculis caput mouentibus illos qui dorsi motibus præsumt, subiungi oportuisse, nobis insinuat: uerum quum ante thoracis & abdominis musculos, dorsum agentes musculi aptè administrari nequeant, nunc primum eorum quoq; sermonem aggredi tempestiuum fuerit. In quo mehercule (si modò in aliqua musculorū enarratione, ossium cognitio necessaria sit) memoriam in promptu habere oportet eorum quæ superiori libro de dorsi fabrica narrauimus. Non altiùs itaq; uniuersum dorsum in ceruicē, thoracem, lumbos, sacrum os, & coccyx os partiētes, neq; diuersam uertebrae articulationis rationē repetentes, neq; etiā duodecimæ thoracis uertebrae, aut quæcunq; ea sit, quæ suprà infraq; suscipitur, & ossis sacri quietem enarrantes, quod

a s. flagp.  
 19 lib. 1. d.  
 a ad cost.  
 ita ex ossi  
 scilicet, li-  
 gamētum  
 pete. natu-  
 ram, quæ  
 quum mem-  
 brana  
 sunt, pida-  
 ris nullis  
 proprijs  
 nequeant.

Figura 14.  
 14. lib. 1.  
 hæc ferè  
 proponit.

Quot motibus  
dorsum agi-  
tur.

quot motibus dorsum agatur, modò recenseamus. Vniuersum itaq; dorsum, à capite ad sacrum usq; os, instar semicirculi quodammodo in neutrum latum inclinans, flectitur: deinde in rectam ueluti lineam, in neutram uergens partem, erigitur: postea in latus quoque, nec antroorsum, nec retroorsum exporrectum, instar semicirculi quoq; inuoluitur: ut iam quatuor simplices sint dorso totius motus, flexio scilicet, & extensio, & ad dextrum ac sinistrum latus inclinatio. atq; hi motus (si qui alij corporis) in obliquum quoq; seu in alteram partem uergentes fiunt. Flectimus enim dorsum non solum recta, sed etiam dextroorsum aut sinistroorsum magis inclinatum. sic etiam, quum uelut in semicirculum ad latus id inuoluimus, ad anteriora quoq; & ad posteriora, non autem solum recta in latus, illud ducere ualemus: adeò, ut etiam obscurus quidam circuctus simul toti dorso addit. Rursus hos motus, uti iam diximus, simul omnes peragunt uertebræ: aut dorso parte, quæ sub ceruice est, quiescente, sola ceruix eisdem proorsus, quos iam toti dorso tribuimus, motibus pollet: quos non solum quiescente reliqua dorso parte ceruix obit, sed etiam reliquo dorso aut flexo, aut extenso, aut in latus inclinato: quandoquidem laxè admodum & priuatim ceruicem moueri, homini utilissimum fuit, & in primis quum in contrarios oppositos ue motus reliquis dorso partibus ceruix agitur. Vt cunq; enim lumborum uertebras unà cum thorace in anteriora flexeris, atq; in flexione reseruaueris, nihil obstitit, quo minùs ceruix in posteriora ualidè reclinari extēdiq; possit. Lumborum autem uertebrarum motus, à thoracis uertebrarum motu non admodum distinctus est: unà enim ferè mouentur, præterquam quòd lumborum uertebris laxior motus in omni differentia conceditus sit: quòd tum costarum uertebris, thoracis adnexarum occasione euenit, tum etiam musculorum, qui ipsis motibus præficiuntur. Totus enim thorax unà quodammodo in latus inclinatur, quum tamen singulæ lumborum uertebræ priuatim id magis possint. Verum ut hæc omnia oisium articulatio commoueat, ita multo maxime hos motus ipsi dorsales docēt musculi, nimis quam frigide, & nequam omnes à Galeno descripti. Erunt autem omnes utriusq; lateris musculi simul in minimum numerum redacti, sexdecim, octo nimirum paribus complexi.<sup>a</sup> Primus itaq; qui parē in altero latere secundum habet, à quintæ thoracis uertebræ corporis latere, ubi ipsi costa coarticulatur, principium sumit, quod carneum, tenueq; & acuti instar anguli uisitur: & sursum oblique conscendens, uersus medium magis quartæ thoracis uertebræ corporis, obliquo fibrarum ductu proficiscitur. Illæ namq; ab exterioribus facti, inuicem quodammodo contermini fiunt: in exitu autem tantum ab inuicem distant, quanta corporis uertebræ est latitudo. Hanc seriem (ut scilicet ex inferioris uertebræ corporis latere principium seu explantationem ducant, atq; magis uersus medium superioris uertebræ corporis, insertionem moliantur) perpetuò seruant, quousq; sensim mutuò appropinquantes, ad anteriorem primæ ceruicis uertebræ sedem usq; cōscenderint: cuius ibidem extubertati<sup>c</sup> processui, neruosa insertionem simul ambo coeuntes, tanquam trianguli uertice inseruntur, non admodum manifestè occipitis ossi ad anteriorem dorsalis medullæ foraminis<sup>d</sup> sedem implantati. Ego hos musculos, magna ex parte<sup>e</sup> stomacho subditos, duorum duntaxat loco, ut scilicet unus utriusq; habeatur, numero: quamuis ex Galeni sententia singulos, duorum uice, aut trium etiam, nonnulli enumerasse uideantur, quòd quibusdā (uti opinor) inscriptionibus, secundum ipsorum fibrarum ductum exporrectis, instarq;

Sedecim dor-  
sum mouentes  
musculi.  
Primus ac se-  
cundus, seu pri-  
mum par.

<sup>a</sup> Scorsum  
singulos  
adnota-  
bunt.  
<sup>b</sup> 8 tab. A.  
B. 7 tab.  
C, D.

<sup>c</sup> 2, 10 fig.  
cap. 15 lib.  
<sup>d</sup> M.  
<sup>e</sup> 1 fig. cap.  
11 lib. 1 G.  
<sup>f</sup> 7 tab. E.  
et 11, 15 fig.  
lib. 1 A, B.

albæ lineæ apparentibus, animum attenderint. quamuis interim hæ neq; semper eædem, neq; tam paucæ appareant, ut earum beneficio utrinq; solum duo tres'ue recenseri possent musculi. deinde etiam longè minus penetrant, quàm ut in plures musculos alterius lateris musculum distinguere queant. At si fortè musculi principijs insertionibusq; dissectionum proceres animum adhibuerent, multo pluribus, quàm tribus musculis hic noster conformaretur. nam tres musculi ad tres superiores thoracis uertebras referretur, & septem ad septem ceruicis. quare satius longè est, utrinq; unum enumerare musculū, aut, uti iam dixi (quantumuis etiam præter rationem) decem. Duobus his musculis proprio motu ceruix, & uix admodū caput ipsum flectitur: si enim utriusq; musculi partes simul omnes egerint, recta efficitur ceruicis flexio, uertebris scilicet mutuò sese succedentibus: at si alteruter tantum in se colligatur, in contracti lateris ceruix inclinabitur: uti etiam musculorum exortus, insertio, & fibrarum ductus, ipsorumq; continuas, luce clariùs commonstrant. Cæterum hi musculi non solum ceruicem creduntur flectere, at etiam, uti paulo pòst audies, thoracis uertebras superiores. Quòd uerò Galenus parum rectè in decimotertio de Partium usu, hos musculos caput releuare, & sursum ducere docuerit, etiam si non prolixiùs id modò exequar, neminem latere sat scio. 'Ter-

Tertius ex  
quartus.

Præsentī figuræ, musculi, quem hic describimus, fibrarum naturam ex se em, ac latera rindit delineauimus. Significet igitur A ad B, ipsius lateris uertebris ex-porrectum. C ad B, lateris secundum costā ductum.

C autem ad A, latius, quod ab anteriori costæ sedē, oblique sursum ad musculi apicem contendit.



Quintus ex  
sextus.

exhibet. Secundum latus ad ceruicis longitudinem, ipsiusq; in transuersos processus insertionē fertur. tertium uerò, à costæ cartilagine, ad transuersum primæ ceruicis uertebræ processum pertinet. Huius musculi, suiq; coniugis functionem orationi adiciam, ubi quintum & sextū expressero. 'Quintus itaq; qui sextum in sinistro latere sibi parem fortitur, principium in dorso assumit, ex transuersi sextæ thoracis uertebræ processus radice, ad primum eius uertebræ posterioris processus, seu spinæ exortum. Hinc ascendens, ex reliquarum quinque superiorum thoracis uertebrarū transuersis processibus enascitur, sensim crassior ualidiorq; redditus, quousq; admodum pertinaciter in externam sedem transuersi processus septimæ ceruicis uertebræ insertionē tentet: huic enim primū musculus inseritur, & deinde reliquarū omnium ceruicis uertebrarum transuersis processibus, ad<sup>h</sup> exteriorem eorundē sedem. quanquam in<sup>h</sup> transuersum primæ uertebræ processum in ualidam, & non admodum patentem

f. 146. a.  
8 C. 146. b.  
N.

8 f. 146. a.  
cap. 146. a.  
A. B. d. a.  
tissima.

h. 146. ex-  
pressus  
in tabulis  
epitomes  
horum li-  
brorum.

i. 15 tab. b.

h. 150. f.  
cap. 150.  
2. 2. C.  
fig. 146. a.  
r. 146. f.  
l. 2. 3. f.  
cap. 150.  
1. 5.



tentem implantationem (ut neq; etiam tertius musculus) perficiat. Quinto itaq; & tertio musculo, qui dextris uertebrae processibus inseritur, ceruix duntaxat in dextrum latus inclinatur: recto quidem ductu, utrisq; musculis unâ laborantibus: obliquo autem, alterutro duntaxat se colligente. Tertius enim, quiescente quinto, in latus quidem, sed magis antrosum ceruicem inclinat, quintus autem in posteriora magis. <sup>Septimus</sup> Septimus musculus, cui in sinistro latere octauus respondet, à septimâ thoracis uertebrae spinæ radice, deinceps & reliquarum succedentium thoracis uertebrae spinarum quoq; radicibus, ubi inuicem uertebrae articulantur, principium sumit: non autem à spinarum lateribus, quæ musculo occupantur, quem decimum quintum enumerabo. Quando septimus hic musculus, sensim ad ceruicem exporrectus, infimam ceruicis uertebrae contingit, uehementius amplioriq; sede ab illa enascitur, & obscuram admodum insertionem illarum fibrarum, quæ à thoracis uertebrae origine duxere, in illius uertebrae spinam molitur. Reliquis autem ceruicis uertebrae spinis ualide innascitur, atq; ab earundem tranuerforum processuum radice, noua semper initia educit, enatas perpetuo fibras, spinæ superioris uertebrae tantisper inferens, donec ualidissime in totam inferiorem spinæ secundæ ceruicis uertebrae sedem implantetur, dexterq; musculus sinistro coniungatur, uti & toto per ceruicem progressu mutuo accumbunt, herentq; duntaxat uertebrae spinis inuicem dirempti. Horum musculorum fibræ non prorsus rectâ sursum conscendunt, uerum ab exterioribus sursum modicè intrò feruntur: quare etiam & hi quoq; musculi obliquis præsumt motibus. Si enim septimus unâ cum octauo contrahatur, recta ceruicis peragetur extensio: at sinistro laborante, & quiescente dextro, sinister sursum extensio fiet: quemadmodum solius dextri lateris musculo contracto, in dextrum quoq; latus ceruix magis extenditur. Atq; hi omnes, ceruicis potissimum famulantur motibus, ac inter musculos caput agentes subinde recensentur, etiam si caput secundario duntaxat mouent. <sup>Nonus</sup> Nonus autem & decimus, quorum utring; etiam unus est, in illorum musculorum habentur numero, qui *ῥόαι*, & *ὀστροματῆραι*, & *ἀλώπικες* Græcis dicuntur. quanquam Clearchus exteriores quoq; quos undecimum, & duodecimum, & decimum tertium, & decimum quartum in sermonis progressu numerabo, sic appellauerit. Quam uerò dilucidè uereq; Galenus hos musculos, seu lumborum carnes (ut interpretis uoce utar) descripserit, & num etiam simiæ, aut cani (qui hic musculis admodum ab homine uariat) ipsius enarratio, qua ueteres, hominum corpora secantes, immeritò arguit, cōueniat, penes te esto iudicium. ipsa enim simiæ non admodum quadrat, & longè minus homini: quod tum demum abundè intelliges, quādo hæc nostra, adhibitis sectionibus, cum ipsius oraculis cōtuleris. Nolo enim prolixius sermonē uera narrantē, & aliàs satis diffusum, quibusdā disceptationibus hic inturbare: id satis esse ratus, si mea hæc cum Galeno pugnare moneā. In lumborū itaq; interna sede, quando iam omnia intestina simul cum peritonæo resecta sunt, in hominibus utring; tantum duo apparent musculi, quorū alter femoris famulatur motibus, alter uerò huius Capitis, seu dorsum mouentiū nonus erit. Qui femoris motui præest, in Capite musculorū femur mouentiū sextus habebitur. quāuis nunc obiter, Galeni gratia, illum & hic describere, nihil prohibeat ut præsens sermo, Galeni de lumborum carnibus enarrationi abundè cōferri possit. Ab undecimæ itaq; & duodecimæ thoracis uertebrae corporis latere, quo costæ tuberculum excipit, carnosus oritur musculus, qui etiam à duarum, aliquando & trium, superiorum in lumbis uertebrae corporibus carnosus similiter prodit,

Musculi 3, 4, 5, 6 muscu.

Septimus &amp; octauus.

Nonus &amp; decimus.

In quinto &amp; secundo de Ad. ministr. secti.

Qui musculi in anteriori lumborum sede occurrant.

\* unus 7 tab. u. alter u. c. de in 8 u. d. unus, &amp; alter.

8 tab. u.



Iste itaq; dorsum mouentium musculus, ex totius ossis sacri spinæ summo, secundum ipsius longitudinem, & deinde ex spinis quinque; uertebrae lumborum, neruo ualidoq; admodum principio enascitur, quod illi, quem in tota serie decimum tertium appellabimus, insertitur: deinde à tota quoque ossis ilium interna sede,<sup>m</sup> quæ extra transuersam ossis sacri regionē retrorsum prominet, principium hoc carnosum omnino educitur: & ut sedes, à qua musculus hinc exoritur, acuta est,<sup>n</sup> ita quoq; acuti instar anguli musculus inibi uisitur. Hinc sursum ascendens, carnosior paulatim ad externum ipsius latus efficitur, transuersis lumborum uertebrae processibus insertus, ac ueluti teretis musculi imaginem<sup>o</sup> carnosâ sua sede exprimens. Si enim &<sup>p</sup> neruoso ipsius, quod ex uertebrae spinis pendet, principio attenderes, latior multo quàm profundior dicendus esset. attamen externa ipsius sede læuis æqualis<sup>ue</sup> est: interna autem parte, propter suæ carnosæ partis crassitiem, & neruosa tenuitatem, secundum ipsius longitudinem<sup>q</sup> sinus quodammodo illi incisus uidetur, quo decimo tertio nobis enarrando musculo cedit, & locum porrigit. Vbi uerò ad undecimam usq; thoracis uertebrae conscendit, arctior longè redditus, neq; reliquis superiorū uertebrae spinis adeò connatus, sensim ad primam usq; thoracis uertebrae angustior redditur, transuersis omnibus thoracis uertebrae processibus innixus, quibus singulis ex interna sua sede, tendinem instar ansule cuiusdam exporrigit, ipsorum processuum apicibus, & ueluti costæ cum ipsis articuli termino insertum: pari omnino modo, quo quartus hominis thoracem mouēs musculus, qui costis singulis tendinem quoq; offerebat. Verum hie thoracis musculus, ab externo ipsius latere eiusmodi tendines remotus à se dispargit. dorsi autem musculus, non ex altero latere, sed potius ab interna anteriori<sup>ue</sup> sede tendines emittit, non recto tramite, uerum oblique uersus exteriora sursum expansos: quemadmodum etiam musculi fibræ omnes oblique sunt. Vnde quoq; euenit, thoracem lumbosq; horum musculorum, undecimi scilicet & duodecimi ope, rectâ, & etiam in latera extēdi. Ambobus enim æquè contractis, tota illa dorsi pars, cui præfentes musculi inseruntur, in neutrum latus uergens extenditur: at altero tantum contracto, in ipsius latus spina extensionem experta inuoluitur. <sup>Decimustertius</sup> Decimustertius, cui in sinistro latere decimus quartus respondet, sub<sup>u</sup> undecimo occultatur, ab illa ossis sacri sede principium obtinens, quæ ab ipsius spina ad eius cum ilium osse connexionem pertinet. Atque ut illa sedes sursum ascendens, modicè latescit, ita musculi huius quoq; initium infima sede acutum est, & latius modicè effectum, tandem ad transuersum quintæ lumborum uertebrae processum ducitur: & illic rursus reliqua ipsius sede latior redditus, & à transuersis reliquarum uertebrae processibus initiū ducens, ad undecimam usq; thoracis uertebrae spinam conscendit: & progressu gracilior tenuiorq; factus, inibi in acutum finitur angulū. Exortus, quem decimustertius musculus ab osse sacro ducit, sui coniugis musculi exortui contiguus est: quemadmodum etiam per reliquum in altiora progressum præfentes musculi inuicem committuntur, inter spinarum interualla tantum mutuo dehiscences, quanta ligamenti est crassities, quod in spinarum interuallis reponi, secundo ab hoc Capite audies. Horum musculorum fibræ, ab inferioribus sursum uersus interiora oblique assurgunt, & ex inferiorū uertebrae transuersis processibus, & spinarum radicibus enatæ, in superiorum uertebrae spinæ amplitudinem perpetuò sese inferunt. Quotiescunq; igitur utriusq; lateris musculus in se colligitur, suasq; fibras cōtrahit, lumborum uertebrae, & si quæ thoracis sub uertebra utrinq; suscepta reperiantur, spinæ ad se

I 14. tab. T.

m que con  
sistit ad il-  
lium H.  
1; fig. cap.  
29 lib. 1.  
n 14. tab. S.

o 14. tab. Q.  
p 14. tab. R.

q 14. tab.  
inter Q.  
et R.

r 13. tab.  
M, M.

s 12. tab. A.  
deus M, M.

t 14. tab. T.

u 14. tab.  
Q, R, S.  
x 14. tab. V.

y 14. tab. X.

Decimustertius  
et 14.



Decimusquin-  
tus C<sup>o</sup> 16.

ad se inuicem conuiuent: earundemq; interualla cōstringuntur adeò, ut simul contracti muscoli, totam illam spinæ partem, cui committuntur, appositissimè extendant: at altero in se tantum collecto, in obliquum hæc dorſi pars extenditur, lateralemq; illam in semicirculum quodammodo inuolutionem patitur. <sup>a</sup> Decimus quintus & decimus sextus (utrinq; etiam unus) ab undecima <sup>x 144. Y.</sup> thoracis uertebra ad primam usq; ipsius protenduntur, totam spinarum amplitudinem, quæ ab ipsarum radice ad apicem usq; consistit, amplexantes, & si militer ac postremò dicti, carnei, sed ualidissimis interim neruosisq; fibris admodum intertexti. Hi musculi <sup>a luxta X 14 tab.</sup> ad duodecimam thoracis uertebra, aut ad eam quæ suprà infraque suscipitur, tenues sunt, quemadmodum decim tertij quoq; ad eandem uertebra insertio tenuis prorsus uisitur: at sursum exportecti, paulatim crassescūt, <sup>b ad X. 14 tab.</sup> quousq; ad quintæ thoracis uertebra spinam ascendunt. hic enim tota sua mole crassiores euadunt, & sursum tensi, <sup>c propter a 14 tab.</sup> denudè extenuantur, propter primæ thoracis uertebra spinam, parem crassitiem cum illaque ad undecimam est, fortiti. His quoq; musculis interualla spinarum opplen-  
tur, & inuicem inibi cōtigni sunt: quum inter illos nihil mediet, præter membraneum ligamentum, à superiori spina in inferiorem porrectum. Functio uerò horum musculorum potissima est, spinas, quibus inseruntur, mutuo colligere, itaq; eam dorſi partem, cui adnascuntur, cum reliquis musculis extendere. Sed ut præſentes muscoli, inter reliquos dorſi motuum autores, rectis fibris magna ex parte donantur, sic quoq; admodum modicè obliquis motib. præſunt.

MVSCVLORVM DORSVM MOVENTIVM  
administratio. Caput XXXIX.

Administra-  
tio primi C<sup>o</sup> 2.Tertij C<sup>o</sup> 4.Noni C<sup>o</sup> 10.Ad finem & de  
Admin. d. ff.

DORSVM mouentium administradi ratio in promptu iam est, si hucusq; sectionis nostræ seriem obseruaueris. In anteriori enim dorſi parte, illi etiam citra sectionem conspicui sunt, quos <sup>a s tab. A. B.</sup> primum & secundum nominauimus. Si uerò horum ortum & insertionem lubet exactiùs condiscere, illos à suis uertebis paruo & acutiori cultello abrades, deinde <sup>b s tab. C.</sup> tertio à prima thoracis costa liberato, qui trans uerlis ceruicis uertebraſu inſeratur processibus, examinabis. In lumbis, quoniam peritonæum & septum quoq; transuersum dudum ademiſti, licebit musculum, quem nos <sup>c s tab. D. d s z.</sup> primum in lumbis recēsumus, ac femoris motibus famulari diximus, suo principio à uertebraſu corporibus liberare, & ad coxendicis usq; os, à subdito ipsi <sup>d s z.</sup> musculo, qui noster lumborum secundus est, dorsum autem mouentiū nonus, solis manibus diuellere, ut omni ex parte nonus musculus in conspectum ueniat, quem ab osse ilium & sacro osse erasum, à transuersis lumborum uertebraſu processibus, & earundem corporibus, & duodecima thoracis costa acutiori cultello discindes, eius naturā munusq; non oscitanter examinans. At si canis, aut caudata simia ad manū sit, primò illum dissectabis, quem in illis animalibus membraneo nerueoq; principio, à coxendicis ossis elatori sede enasci cōspicies, quiq; oblique uersus interiora sursum ascendens, ac carnea auctus substantia, in superiorum lumborum & inferiorū aliquot thoracis uertebraſu corporibus inseritur, dorſi quoq; flexioni subseruiens, quam canes in circulum magis quàm homines moliūtur. Si enim hunc indagaueris, Galeni de lumborum carnibus enarratio tibi aliquantulo reddetur dilucidior. Hoc igitur, quo homines destituūtur, adempto, reliquos duos, canibus & hominibus in lumbis communes, in cane quoq; dissectabis, ut nonnullam

nullam in illis quoq; musculis differentiam, Galeni intelligendi gratia intuearis. Resupinato iam cadauere, quintum musculum à thoracis uertebri paruo cultello continuè derades, donec illum in omnibus insertionibus còspexeris. Huic septimus succedet, similiter à uertebri deradèdus. At in hac functione cauendum est, ne<sup>e</sup> decimi quinti muscoli portionem, septimi loco abscindas: inuicem enim pertinaciter hærent, & decimus quintus septimi muscoli principium aliquouſq; subit. Nunc nouacula, acutiori<sup>h</sup> ue cultello, secundùm spinarum in lumbis & in osse sacro ductum, tentanda est sectio, quæ undecimi muscoli principium à spinis liberet. Ne uerò simul<sup>k</sup> decimum tertium (ut Galenus proculdubio in simijs, alioquin ad sectionem aptissimis, fecit) imprudens auferas, ac undecimi partem esse arbitreris, sectio illa non altius iniicienda est, quàm ut undecimi duntaxat exortum diuidat: cuius crassitiem facile coniecturabis, si paruo cultello musculum à transuersis lumborum uertebrarum processibus dissectabis, & à decimo tertio subleuatù, ad spinas quoq; uertebRARUM inuerteris. Hoc itaq; musculo à lumborum & osis sacri spinis liberato, cauendum est, ne illum thoracis uertebRARUM spinis adedò connatum arbitreris, ut<sup>i</sup> decimum quintum musculum unà cum ipso undecimo auferas, cumq; reliquis omnibus Anatomicis hallucineris. Postquam igitur internum quoq; musculi latus, utcumq; à subditis cònatisq; sibi partibus diremptù còspexeris, ab ilium etià osse deradetur, & principio ipsius apprehenso, sensim attolletur: ut ipsum ab illis quibus inferitur partibus liberàs, tandem intuearis<sup>m</sup> tendines illos, quos à se palmitis instar, in transuersorum thoracis uertebRARUM processuum apices elegantissima serie digerit. Hoc adempto, citra aliam sectionem<sup>n</sup> decimus tertius, & decimus quintus, sunt in conspectu. Vt tamen illorum naturam ad amussim inquiras, necessum est & hos quoque à uertebri sedulò deradere: quod sanè in spinæ musculis eo operosiùs præstiteris, quo iidem pluribus ossibus & innascantur, & à pluribus ortum ducant. Ob quod laudandus etià uenit rerum Opifex, qui ita musculos hos fabricfecit, ut seorsum unamquamque dorsi partem succedentibus motibus agere possimus: ne simul uniuersum, multas actiones impedituri, semper mouere cogamur. Cæterum ubi & hos abstuleris, transuersam duces sectionem, quæ sacrum os & infimam lumborum uertebRAM, ab anteriori sede, ad dorsalem usque medullam penetret: ut deinde inflexo unà cum costis thorace, dorsum ab osse sacro diuidere queas, uertebRARUM ligamenta iam indagaturus.

DE VERTEBRARVM LIGAMENTIS. Caput XL.



LIGAMENTA primam uertebra capiti, & secundam primæ, & secundam rursus capiti<sup>a</sup> colligantia, superius enarraui: quæ autem reliquas uertebRAS inuicem conuincunt, nunc pertractabo, ab illis quæ uertebRARUM corpora colligant, sermonis facturus initium. Inter secundæ itaq; & tertię uertebRæ ceruicis, ac deinceps inter reliquarum omnium uertebRARUM corpora, substantia quedam reponitur, quam Galenus cartilaginem uocat, & qua uertebRAS inuicem haud colligari, contra eorum qui illum præcesserunt dissectionis Procerum sententiam, asserit. Nam non huius cartilaginis beneficio ipsas committi uult, uerùm tertię dorsalis medullæ tunica, inter uertebRARUM corpora se insinuantis. Cuiusmodi uerò hæc sit, in dorsalis medullæ sermone persequar, tunc nimirum, quãdo præter

Quinti & 6  
administratio.

Septimi & 8.

Undecimi &  
duodecimi


Decimertij  
& 14, 15, 16.

Ligamēta, uer-  
tebrarum cor-  
pora commi-  
tentia.  
Cap. 8 lib. de  
Ossibus.

a fig. cap. 30.  
b Neque  
hæc citam  
ligamenta  
scire quàm  
quis ad os-  
sum circũ-  
scriptionē  
tingere  
possit, pro  
ponere no-  
bis liceat:  
quare etiã  
ad ossis  
conferres.  
c fig. cap. 14  
lib. 1. R. R.

præter duas cerebri membranas, dorsali medullæ proximè adnatas, uertebra-  
rum foramina, seu cavitatem (quæ dorsali uiam præbet) membrana quadam  
ossibus undiq; connata succingi audies. Hæc membrana nihil prorsus, nisi for-  
tassis crassitie ab illa differt, quam circumossalem uulgò dicimus. Num uerò  
Galenî sententiæ, an Veterum illorum, qui in dissectionibus, quantum Galenî  
scripta ostendunt, admodum fuere seduli, accedendum sit, penes te esto iudi-  
cium. Nam etsi humanum cadauer ad manum non sit, non tamen fieri pote-  
rit, quin tibi iam à lectione surgenti, ali-

*Ve leniori negotio, quæ hic pertracto, affequare, duas è tho-  
race uertebra, anteriori facie ex puerili corpore depictas ha-  
bes. In quibus 1. notat  
superiorem uertebra car-  
tilagineam, sui corporis  
inferiorem appendicem,  
ipsamq; corpus interue-  
nientem. 2. eiusdem uer-  
tebra humilioris ap-  
pendicem. 3. cartilagi-  
neum ligamentum, su-  
perioris inferioriq; uer-  
tebra appendices intercedens. 4. superiorem inferioris uerte-  
bra appendicem. 5. cartilagineum, diuiciam modo appendicem suæ  
uertebra capulamentum.*



cuius animalis dorsum mensæ adhibea-  
tur, uel etiam si pisce uescendum erit. ac  
proinde uel ludi causâ (dummodò diui-  
na illa Hippocratis in libro de Articulis  
oracula non fastidiueris) unam uerte-  
brâ ab alia seingito: & quacunq; etiam  
corporis adhibita cartilagine, tecû per-  
pendito, num illa uertebrae cartila-  
go, exquisitæ cartilaginis naturam obi-  
neat, num uerò ligamenti cartilaginosi.

Hac enim ratione manibus pedibusque

in Veterum sententiam, relicto procul Galenî placito, iturus es: neq; tibi per-  
suaderi fines, membranam quandam, cuius beneficio uertebrae inuicem con-  
necterentur, duci inter uertebrae os, & cartilaginē hanc ligamentosam, fibro-  
sam, mollem, mucosam, neq; cartilaginis modo solidam, cōtinuam uē, ne for-  
tè duntaxat de duritie loqui uideamur. Quum tamen hæc expendes, sedulò ca-  
uendum est, ne in agni, aut hœdi, aut uituli spinam incidenti, cartilago inter ap-  
pendicem corporis uertebrae, & ipsum corpus occurrēs, tibi imponat, illamq;  
cartilagineam eam esse arbitreris, de qua hic sermonem instituimus. Quin po-  
tius in illis uertebis perpendito tres cartilaginum, ut sic dicam, ordines, duo-  
bus ossibus inter duas uertebrae diremptos: ac postmodum illis ordinibus a-  
nimaduersis, cartilaginū naturas obserua, firmiusq; adhuc Veterum dogmati  
subscribito. Conspicies enim duas cartilagineas inter utrarunq; uertebrae cor-  
pora, & ipsarum appendices positas, ad amussim esse cartilagineas, nihilq; ab illis  
differre, quæ reliquos appendices & ossa interueniunt. At cartilagineam inter  
appendices mediam, profectò (nisi Galenî nomine oculis parum fidas tuis) ni-  
hil prorsus aliud quàm ligamentū esse dices, quod Asclepiadum familiæ, quæ  
pueros suos in cadauerum sectionibus tanta cura exercebant, *ρολυγονοειδὲς ὄσφυ-  
δισμῶν* appellarunt: atq; huius interuentu, non autem tertiæ dorsalis medullæ  
tunicæ, uertebrae corpora colligari astrues, nulla interim interueniēte mem-  
brana. Quapropter si Veteribus accedis, inter ligamēta, cartilaginis natura pol-  
lencia, has uertebrae cartilagineas cōnumera: expenditoq; pariter magnam  
Naturæ industriam, quæ cartilaginofum hoc ligamentū ita adaptauit, ut dor-  
si quoq; motibus (uti iam prius à me comprehensum est) cedendo assurgē-  
doq; opituletur. Cæterum alijs adhuc ligamenti uertebrae corpora collig-  
antur: per totam enim dorsi longitudinem, ualidissimâ ligamenta toti uerte-  
brae corporum ambitui obuoluuntur: quæ etsi undiq; crassa, spissa & ro-  
busta, sed mucoso interim humore oblita sint, attamen in anteriori corporis  
sede, ad utrunq; latus, ob sui crassitiem conspectiora euadunt. Quum itaq; hæc  
ligamenta, aut (si unius nomine omnia complecti uelis) ligamentum hoc du-  
rum forteq; euaserit, & omnibus uertebis ex æquo obducatur, obstaculo sanè  
est, ne



est, ne in extensione dorsum nimium porrigatur, incuruetur' ue. Dorsum enim, si plurimum reflecteretur, stomacho, arteriæ magnæ, & uenæ cauæ fuisset summè noxium. Rursus ex singulis transuersis processibus in conterminos processus transuersos membraneum ligamentum tota interualli amplitudine porrigitur: & in spinarum interuallis, ab una spina ad alteram, membranea ligamenta continentur, spinas inuicem colligantia, & ueluti muscutorum interstitia. Hæ membranæ in spinarum apicibus adeò crassescunt, ut ad apices simul coeunt, quasi toti spinæ dorfi ligamentum constituant, cartilaginis etiam naturæ compos. Deinde ubi ascendentes uertebrarum processus descendentes coarticulantur, membranea quoq; ligamenta (sed perquam ualida) articulum undiq; ambiunt. Insuper priuatum quoddam, idq; subflauum ligamentum, ex interna sede foraminis uertebræ, quod dorsali medullæ exculptum est, ad radicem spinæ, posterioris' ue uertebræ processus, inter duos ascendentes aut descendentes processus exoritur, semper in subsequenti uertebræ eandem sedem insertum. In canibus, & illis animalibus, quæ rectum tergo leui opera accommodant, & longè laxiores ceruicis uertebrarum articulos, & etiam longiores ceruicis uertebras, quàm homo, obtinent, ligamentum quoddam obseruamus, cuius naturam Galeni gratia hic non grauabor subiungere. In canibus igitur, simulatq; secundum par muscutorum capitis motibus famulantium aggressus es, in ceruice ligamentum sese offert rarum, & nulli in uniuerso corpore respondens, nisi fortassis illis uertebrarum ligamenti, quæ postremo loco recensuimus: id enim cæteris robustius est, & colore flauum, in fibras multas dissolui potest. Enascitur autem id ex apicis septimæ ceruicis uertebræ spinæ lateribus: & sursum ascendens, nulli connascitur uertebræ, quousq; ad secundam ceruicis pertigerit, cuius spinæ lateribus in summo apice inseritur. aliquibus quoq; animalibus, ut ouibus, occipitij ossi inseritur. Ligamentum hoc peculiari inuolutum est membrana, geminumq; apparet, ob impressionem illius longitudini expositam. Porro huius ligamētī naturam discere licebit, quoties uituli, aut porcelli, aut hædi, aut uetustioris etiam bouis ceruix mensæ apponitur. Est enim ligamentū hoc, flauum illud corpus, quod ex carnibus liberatum, canibus offerre solemus. nam inter reliqua corporis ligamenta solum, tanquā esui ineptum, reijcitur. Vnde etiam à robore Bruxelensibus Vast nuncupatur, qui huius esum puellis ad comam prolixiorem conciliandam commendant, hinc (opinor) ipsas ridentes, quòd uelut in flauam pallidamq; comam promptè dissoluitur, præcipuo usu accommodum, ne uertebræ ceruicis suo loco promptè exiliant, quum illæ laxè admodum coarticulentur, & præ cæteris uertebris admodum obliquè agantur. Atq; ita etiam in quibusdam quadrupedibus, secundum totius dorfi longitudinem ferè, utrinque unum amplum huius naturæ ligamentum, inter musculos dorsum mouentes occultatum, secundum spinas ferri conspiciamus, quale Galenus hominibus ferè in libris de Partium usu tribuit. Ligamentorum dorfi administratio peculiare nihil obinet. quum enim dorsales muscoli omnes adempti sunt, in anteriori dorfi parte, secundum omnem corporis uertebrarum circumferentiam, membranea illa, durâq; & mucore quodam imbibita ligamenta in conspectu sunt, quæ cultellis paruis, transuersim ipsis subditis, à uertebrarum corporibus liberare potes: non præteriens, haud unum hic, simplexq; ligamentum apparere, at ueluti multas membranulas inuicem incumbētes, adnatâsq;. Postmodum costis à uertebris dearticulatis, earum quoq; ligamenta inspicies: quemadmodum & membranea illa, transuersorū processuum & spinarum

*Ligamēta alijs  
sedibus quim  
ad corpora uer-  
tebrarū posita.*

*Tropia canum  
ligamēta.*

*ADMINI-  
stratio ligamen-  
torum.*

interualla occupantia. Vt uerò ad amulsim cartilagineum inter uertebra-  
 corpora uideas ligamentum, aliquot uertebrae inuicem sunt cultro aliquo di-  
 rimendae. Dum uerò uertebrae, quarum corpora iam se iunxisti, retrorsum re-  
 flectis, & dorsalem medullam extrahis, tunicam, membranam uel uertebra-  
 rum cavitatem sublinentem, intueris: atque uertebrae ab inuicem prorsus disse-  
 ctis, ualidum illud ligamentum occurret, in medio ascendentium descendenti-  
 umque processuum locatum. Reiectis nunc uertebrae, & aliquod quod adhuc  
 ex reliquo corpore superest, reposito, scapulam & brachium, quod reponi an-  
 tea uolebam, repetes, musculos qui humerum, cubitum & manum amplexan-  
 tur, iam seriatim aggregaturus.

DE MUSCULO, NERVOSA SVA EXILI-  
 tate mediae uolae, & internae digitorum sedis cuti  
 subnato. Caput XLI.

Quo ordine  
 musculi traden-  
 tur, à Galeno  
 in 1 lib. de Ad-  
 ministr. est. et  
 in 2 de  
 sua partium  
 descripti.



VANDO QUIDEM musculos ea doctrinae serie exe-  
 qui institutum est, quo in uno corpore omnes administrare  
 soleo, commodum fore arbitratus sum, nunc musculos in  
 brachio & cubito & manu repositos, priuatis Capitibus  
 aggredi, ac postmodum communi omnium capite, ipsorum  
 confectionem subnectere. Vt itaque Galeni ordini in his mus-  
 culis, quos ceteris omnibus prolixius descripsit, me ac-  
 commodem, à musculo exordiar, qui internae manus regioni, dilatescēte ner-  
 uosa ipsius exilitate subteditur, ac neruoso teretique principio, ex interioris hu-  
 meri tuberculi apice enascitur, medio duorum brachiale flectentium musculorum  
 (qui ex eodem tubere prodeunt) incumbens, adnatusque, non tamen in illorum ca-  
 pitum medio (ut alij scribunt) repositus. Principium hoc illico carnosum cras-  
 siusque redditum, musculi uentre non impenso crassum constituit, qui priusquam ad  
 medium longitudinis cubiti, oblique non nihil uersus medium internae cubiti se-  
 dis ductus prorperferit, denuò tenuis gracilisque factus, in tendinem angustum,  
 sed ampliorem, quam profundum, & nequam prorsus teretē cessat. Hinc ad  
 brachialis usque radicem pertingens, sensim in brachialis interiori sede latefcere  
 incipit, ac manus cuti, ad extremam ferè usque digitorum aciem subnascitur. Atque id  
 fibrosis nexibus adeo ualidis continuisque perficitur, ut internae manus cutem à  
 neruosa tendinis tenuitate, uel etiā acutiori nouacula liberare arduum sit. Ve-  
 rum interim Galeni suffragio acquiescendum minimè est, si hunc toti depili-  
 manas cuti in hominibus subnasci (ut de suis docet simijs) arbitratus fuerit.  
 Siquidem tendo mediae uolae cuti in palma tantum subnascitur, non autē cu-  
 tem cōtingit, musculo obductum, quem paruum digitum à ceteris in obliquum  
 abducere docebimus: neque etiā cuti subtenditur, musculofam carnem inue-  
 stienti, quae primo pollicis articulo incubens, ex pluribus musculis constituitur.  
 Ad haec, nullae huius tendinis portiones in digitorum latera excurrunt: quinimo  
 praesens tendo perquam obscurè internae etiam digitorum regioni obnasci  
 uisitur. Musculus tendinem hunc producens, gracilis est, atque in cubiti medio,  
 super reliquos huius regionis, uti monuimus, exporrigitur: non enim decuis-  
 set hunc magnam extrui, quum nullius ossis motu illum praefici credamus.  
 Vt enim cutis circumactu pertinax depilisque fieret, ac proinde manus ad accu-  
 ratius sentiendum aptior efficeretur, cuti internae manus hunc tendinem sub-  
 sterni (sed nimium forte) nobis persuasum habemus. Conueniebat namque, ut  
 manus apprehendens instrumentum, internae ipsius cuti adipisceretur, non modo

Cuiusmodi in-  
 ternae summae  
 manus cutem  
 parari decuit.

agere

ægrè mobilem, cùm ob alia quædam, tum maximè ob exactiorè tutioremq; corporum comprehensionem, sed reliqua totius corporis cute sensu exactiori præditam. Quanquam non huius tendinis beneficio, manus accuratum tactus sensum nanciscitur, uerùm plurium neruorum auxilio, ex quibus ad singulos digitos<sup>1</sup> quatuor furculos propagari, suo loco docebimus, duos nimirum externæ digitorum sedi, & totidem internæ. Confert quoque non parum ad exquisitum tactum, depilem esse interiorè manus cutem, quod eam à tendine sub illa dilatato præcipuè obtinere Galenus affirmat: si enim admodum pilosa foret, nequaquam sibi appropinquantia tangeret, quòd pili nimirum tangendo corpori ante cutem occurrerent, illiusq; contactum arcerent. Quoniam autem tendo iste etiam huius regionis cutem subduram efficit, cuius manifestum est, & id ad plurimos usus nobis conducere. Horum itaq; gratia, tendo internæ manus cuti subnasci creditur. Ostendi uerò non semel in scholis, hunc quem narramus musculum, certò defuisse, ac portionem<sup>2</sup> tendiniuin brachiale flectentium, priusquam illi brachiale ascendant, in latum tendinem desisisse. Interdum uerò non ab illis tendinibus portionem, quæ latitudinis uicem gerit, porrigi uidimus, uerùm à<sup>3</sup> ligamento transuerso, tendinibus in interna brachialis sede obducto: quemadmodum etiam in hominibus secus atque in simijs, sub pede nullus tendo dilatescit. nam à calcis ossis<sup>4</sup> membranam in homine enasci audies, lati tendinis naturam appositissimè exprimentem. Cæterum interim ob nonnulla Galeni loca haud colligendum est, hos tendines, nerueam<sup>5</sup> ue naturam, cuti citra alicuius interuentum adnasci, aut nullo intervallo cutem à tendine semoueri. Inter tendinem namque & cutem in manu & pede, adeps plurimus còtinetur, cuius naturam iamiam explicabo: neque homines hanc solùm habent, imò canes plurimam quoque obtinent. Vniuersum enim tuberculum, quod ad illorum quatuor digitorum radicem prominet, & quo pedem præcipuè figunt, adiposæ eius substantiæ præsentia extuberat, utcunque interim adipe inter carneam membranam & cutem simiæ ac canes profus alioquin destituantur.

DE CARNEA SVBSTANTIA, INTERIORI  
digitorum regioni, ipsorumq; radicibus, & mediæ sedi uolæ  
superstrata. Caput XLII.

*SVBSTANTIAM præsentis Capite describendam, nulla figura expressimus, neq; illam secus delineare integrum erat, quàm cutem & adipem in dextro pectoris latere fingere conati sumus uigesimaquinta libri quinti figura.*



*a musculi  
p 3 tabula  
anatomica.*

ER uniuersam quatuor digitorum, & secundi tertijq; articuli pollicis longitudinem, ac quatuor manus monticulos, quos in Chiromantia ad quatuor digitorum radices reponimus, & ad uolæ medium, carnea quædam substantia reperitur, quæ inter latum<sup>6</sup> tendinem & cutem partim interiacet, partim (sed minori portione) tendini subijcitur. Cæterum hæc substantia, musculorum carni, aut propriæ peculiariq; illorū substantiæ, aut, ut fortè quispiam diceret, simplici carni, non respondet: uerùm substantia quædam est subalba & duriori, neruosq; (quo id aptius explicem) adipi seu pinguedini quodammodo similes. Opinor enim ab ossium neruofarumq; partium huic substantiæ ac ueluti pinguedini accumbentium tactu & uicino illam duriorè effici, illius adipis quasi modo, qui in ossium articulis subinde colligitur. Quanquam non duritia solùm hæc sub-

*Musculum suum  
tendine late-  
scentem, non  
semel deesse.*

*Inter cutem &  
tendinem, ad-  
ipem reperi.  
Lib. xxi, de  
p. 3. part. 1.  
& lib. de Ad-  
m. 1. 1. 1.*



stantia ab adipe differt, uerùm & frequēti neruolarum fibrarum & tenuium uenarum implexu. Ad hæc, in extremē emaciatis huius semper substantiæ portio quædam occurrit, perinde ac si propria peculiarisq; corporis esset pars, secus ferē, quàm adeps, qui in admodum pueris, & prorsus extenuatis, & marasmode mortuis hominibus, inter secandum uix deprehēditur. Verùm Arabes mihi hallucinari uidētur, hanc substantiam extra musculi corpus, carnem simplicem immixtamq; esse affirmantes, illorum modo, qui nescio quam simplicem carnem in gingiuis ac pene collocant. Haudquaquam enim expenderunt innumeras neruorum fibras, & capillorum modo tenues uenas, hanc substantiam intercurrentes, illamq; nec colore (quum ad album potius quàm rubrum uergat) nec substantia, nec æqualitate continuitatē uē etiam musculorum carnem (quæ alioquin tot fibris implicatur, nihilque ferē quàm fibra quædam est) referre, Natura huiusmodi substantiam, quam non nisi duriusculæ conglobatæq; pinguedini examusim assimilaueris, tanquam stratum aliquod, aut terram præparauit, cui aptē infiniti neruulorum surculi implantentur, quos ob exquisitum tactus sensum, à maioribus neruorum propaginibus, internam manus sedem adeuntibus, diffundi undiq; oportuit. Cæterum et si hæc pinguedo durior, admodumq; neruea sit, nihilominus in uniuersa rerum substantia mollis est: ac proinde occurrantibus cedit, & ad aliud quippiam, neque id minimum, digitis conducit. Media enim inter tendines digitos flectentes, & dura, quæ apprehendimus, corpora reponitur: & aptissimē tendines, ne aut premantur, aut contundantur, munit: unde etiam meritiò huius substantiæ quàm plurimum infernæ pedis cuti subijcitur. præterea ossium rectitudinem tunc corrigit, quando in circulum manus quippiam est comprehensura. Ac proinde externæ digitorū regioni hanc rerum Opifex minimē communicauit, ut quæ ibidem inutile pondus digitis inferret: quum hæc regio, neq; illo absolutissimo indigeat tactus sensu, neq; quicquam in obliquum apprehendat, neque toties subulas, scalpella' uē, & id genus artium instrumenta propellat, multaq; molliat & terat. Quinetiam in interna manus sede, ipsis qui dem articulis minimum, in partibus uerò inter articulos medijs, plurimum huiusmodi substantiæ industrius rerum Conditor produxit. Haudquaquam enim ossium sedes, quibus illa inuicem coarticulantur, huiusmodi substantia indiguerunt, quum flecti, atq; ideo ab apprehendendo corpore abscedere debeant. & substantia ea, præterquam quod nihil commodi in illis præstaret, obstaculo motui fieret, tum grauans, ut superflua: tum etiam prohibens, quo minus articuli in acutos angulos flecti possent. Lateribus autem digitorum Natura tantum eius substantiæ adnutriuit, quantum medias ibidem regiones, quæ ob articulorum tubera uacua mansissent, replere potuit, quo & inde manus, non solum ut diuisum in multas partes organum, sed etiam uelut uariē diuisum, suo munere fungeretur. Adductis enim inuicem digitis, ita eorum media regio ab hac substantia oppletur: ut si quid etiam liquidum manu supina continere libuerit, id non elabatur. Quantum uerò huiusmodi substantia ad corpora summis digitis apprehendenda auxiliij præstet, nemini non perspectissimum est, quem minimē latet, si ossium finibus nihil, quod cederet, appositum fuisset, ea facile debuisset rumpi, nec illis potuisse plurima corpora elcuari: quod modò huius substantiæ, & renitentium illi unguum opera obimus felicissimē.



a Sciatum  
hanc osse  
dunt figu-  
ra. cap. 27  
lib. a.

V V M superiore libro quinq; digitorū ofsium constru- *Digitorum*  
ctionem persequer, longè<sup>a</sup> aliam articuli speciem in pri- *motu.*  
mis quinq; digitorum internodijs, & in secundo pollicis  
haberi scripti, quàm in secundo & tertio quatuor digito-  
rum, & tertio pollicis internodio. Illa namq; mutuò ea ar-  
ticuli specie ingrediuntur, quàm γγγλμορ Græci uocant.  
Superius enim os in suum finum inferioris ofsis tuber ex-  
cipit, ipsumq; inferius os in suis finibus superioris ofsis capitula admittit. Vnde  
etiam simplicem tantum motum hæc internodia obtinent, qui extensione &  
flexione nusquam ne tantillum quidem in latus declinantibus perficitur. At  
quatuor digitorū prima ossa in articulatione cum illis quibus sustententur ofsi-  
bus coarctantur: unicus enim digiti ofsis finus unicum postbrachialis ofsis ca-  
put excipit. quapropter etiam illa prima digitorum ossa, ut & primus quoque  
pollicis articulus, duplici motu agi possunt, quo flectuntur & extenduntur, in-  
superq; ad latera inclinatur, seu, ut semper loqui instituiamus, ad hos illos<sup>o</sup> ue di-  
gitos adducuntur, uel ab ipsidem abducuntur. Cæterum omnes digitorum mo-  
tus, uiginti & octo compleri docebimus musculis: at quum in illorum sermo-  
ne<sup>o</sup> musculus quidam brachiali insertus, necessariò etiam pertractadus uenit,  
hoc Capite nouem & uiginti describentur. 'Primi musculi'<sup>o</sup> principium ter-  
res, & statim ab exortu grande, ac ex carnea nerueaq; substantia mixtum, ab in-  
teriori humeri<sup>o</sup> tubere nascitur: non quidè ex superiori, magisq; prominen-  
te tuberi sede, uerum ab interiore, sub<sup>o</sup> musculi ad internam manus cutem la-  
tum tendinem porrigentis, &<sup>o</sup> duorum, quos brachiale flectere audies, capitib-  
us: præterea & sub<sup>o</sup> illius ferè musculi origine, qui inter radium in pronum  
agentes superior enumerabitur. quanquā potius ex anteriori sede, & inferius  
illa origine, primus hic digitorum musculus initium ducat, mox ab illo latio-  
redditus, & ad ulnæ radij; medium perreptans: quò quum peruenit, exactè  
iam carnosus & teres (in amplitudinè tamen modicè depressus) ad brachiale  
fertur. anteaquàm uerò brachialis radicem contingit, notabili satis interuallo,  
ipsius uenter in angustū magis<sup>o</sup> coactus, in quatuor carnosas partes diuiditur,  
quæ singule neruoliores angustioresq; factæ, ilico in exactos cessant tendines:  
qui examulsi<sup>o</sup> teretes, & simul communi membrana utcunq; tenui mucos-  
aq; inuoluti, brachialis cum cubito articulū, ipsumq; brachiale transcendunt,  
communi omnes<sup>o</sup> ligamento in brachialis sinu obducti. Est autem ligamen-  
tum id ualidum & transuersum, anuliq; formam (quod ad eius cavitatem spe-  
ctat) præcipuè referens, & totam brachialis finus amplitudinem, quā ex ipsa  
originem ducit, succingens. Simulatq; uerò tendines ligamentū id præteriere,  
inuicem diducti, tres acutos & interuallis pares constituunt angulos, & singu-  
li unum quatuor digitorum sibi præpositum adeunt, & latiores membraniq;  
facti, secundi digitorum ofsis radici, & dein toti ofsis longitudini inferuntur.  
Dum uerò prima digitorum ossa perreptant,<sup>o</sup> transuerso quoq; obuoluuntur  
ligamento, quod ex tota internæ ofsis sedis amplitudine enatum, canalem ob-  
longum seu anulum effingit, quo primi musculi tendo, unā cum<sup>o</sup> alio, quem  
huic subijci dicemus, secundum digiti longitudinè securissimè deducitur, ac  
ne sua sede à digito declinet, aut contractus, suo<sup>o</sup> ue munere fungens, eleuetur,  
pulchrè amplectitur: ita tamen, ut tendini liberum iter citra omnem connexum  
per ligamentum pateat. Tendines enim, quā primis digitorum ofsibus

*Digitos mouen-  
tes musculi 28.*

*Primus.*

b 10 tab. h.  
11 tab. p.  
c 5 tab. o.  
4 tab. b. o.  
1 tab. i.  
d 5 tab. a.  
e 12 fig.  
cap. 23 lib.  
1 s.  
f 3 tab. p.  
g 3 tab. a.  
m.  
b 5 tab. o.  
7 tab. q.

i 5 tab. u.  
12 fig. seu-  
jim 5 tabu-  
lum 6  
specta.

k 4 tab. o.

l id fecus  
exprimi ne-  
quis, quia  
digiti a se-  
bulæ id pro-  
ponunt.  
m 6 tab. y.

Lib. 1. de P<sup>ri</sup>mi  
part.

Secundus.

Lib. 1. de Par-  
tium usu.  
Secundi muscu-  
li tendines per  
primi tendines  
transiunt.

porriguntur, neq; transuersis ligamentis, neq; ossibus, uel quouis pacto adnexi  
hærent: sed ligamenta uelut per lubricos & læues anulos, sibi laxè exculptos,  
minimè impediti perreptant. Cæterùm his primi musculi tendinibus, ubi pri-  
mo digitorum ossi incumbunt, & priusquam secundum conscenderunt (quan-  
quam secus Galeno uisum fuit) peculiare rarumq; accidit, quòd longa sectio-  
ne diuisi, alium ipsis substratum transmittant tendinem, de quo statim ac præ-  
sentis musculi functionem sermoni addidero, sum pertractaturus. Functio  
autem ipsius est, secundum quatuor digitorum os flectere, illud brachialis me-  
dio, ubi inuicem adhuc ipsius colligantur tendines, quàm potest proximè ad-  
mouens. Et quemadmodum minimi digiti secundum os, cæteris digitorum  
secundis ossibus minus est, ita quoq; & eius digiti tendi reliquis tribus gra-  
tior uisitur: ut & carnosa musculi pars, tendinem parui digiti promens, cæte-  
ras gracilitate superat. \* Secundus musculus, primo subiectus, ab anteriore  
humeri tubere, sub primi capite, sui initij uix aliquam portionem assumit:  
sed ex anteriori ulnæ processu (quo illa humero coarticulatur) potissimum  
enascitur, idq; præcipuè ab eius processus radice: quandoquidem ipsius supe-  
rior pars, seu apex, illius musculi excipitur insertione, qui cubitum flecten-  
tium est posterior. Secundus itaque musculus hinc prodiens, exactè carno-  
sus & teres (nonnihil latus tamen, & ut primus, modicè depressus) euadit, &  
mediam cubiti sedem comprehendens, ulnæ adhuc adnascitur, à qua exortus  
sui robur non modicum ea sede, asciscit, qua ulnæ membraneo connectitur  
ligamento, inter radium & ulnam tota cubiti ferè longitudine consistenti.  
Quando uerò musculus parum ultra medium longitudinis cubiti descendit,  
aliquanto angustior redditus, in quatuor carnosas portiones similiter ac pri-  
mus finditur. Quæ ante brachiale in teretes cessant tendines, tanto primi mu-  
sculi tendinibus spissiores, quantum secundi musculi moles primi magnitu-  
dinem excedit. Hi tendines communi membrana perquam mucosa, ac cæte-  
ris omnibus non carneis membranis rubicundiori inuoluuntur, simulq;ue  
coherentes, sub primi musculi tendinibus per transuersum internæ brachia-  
lis sedis ligamentum, in manus uolam contendunt, in qua æquales angulos ef-  
ficientes, mox inuicem dirimuntur, singuli ad unum quatuor digitorum ex-  
currentes. Quemadmodum autem per uniuersam cubiti longitudinem &  
brachiale secundus musculus primo substernitur, ita quoq; primi tendinibus,  
secundi tendines subijciuntur, & eodem simul ambo secundum primi ossis  
digitorum longitudinem, transuerso ligamento obducti, æquè inibi atque  
in uola & brachialis sinu spectantur, teretes. Minimè enim ueritati consen-  
sum est, secundi musculi tendinem in primo internodio, ut Galenus alicubi  
asserit, dilatari. \* Porro ut secundi musculi tendines concinnè ad tertium di-  
giti internodium pertingerent, primi iam musculi tendinibus in secundum  
os necessariò insertionem molientibus, operæ precium fuit, secundi muscu-  
li tendines aut ad tendinum primi musculi latera porrigi, aut quum ipsis re-  
tè subijciuntur, incumbentem illis tendinem perforari, hacq;ue ratione sub-  
stratum secundi musculi tendinem transmitti. At quum ossium latitudo, ut  
tendines secundi musculi ad latus declinent, minimè admittit: quumq;ue, si  
fortè ad latus ducerentur, obliquum sanè situm obtinerent, ac proinde obli-  
quo etiam motui præssent: reliquum fuit, longa sectione superiorem tendi-  
nem mirabili industria findi, ut ea sectione secundi musculi tendo uectus,  
ad tertij ossis radicem pertingeret, ipsius flexionis, ut postea dicam, autor. Ve-  
rùm etsi tendines primi musculi perforantur, ob id tamen cum Galeno neu-  
tquam

n ad p. 114.  
aut p. 114.  
d. 7. 6  
tab.

o 6 tab. 2.  
7 tab. 2.  
p 5 tab. 3.  
q 1 si. 1. 2.  
23 lib. 2. 1.  
r 5. 11. fig.  
c. 24. lib.  
1. C. 24. lib.  
5 8 tab. 1.  
2 6 tab. 2.

u 7 tab. 4.  
inter 5. 7  
T.

x 6 tab. 1.

2 7 tab. 1.

2 Hic fo-  
ratum ste-  
lia extre-  
mas manus  
5, 6, 7, 14  
latum.



tiquam credendum est, eos secundi digitorum ossis lateribus inferi, quum maxime internæ illorum sedi implantentur, ac suis apicibus post perforationem, sub secundi musculi tendinibus colligantur: & perinde ac si non fuissent perforati, sed tantum latiores redditi, insertionem moliantur, nonnihil ante hanc insertionem in senibus, impenseque ossibus, ut sic loquar, hominibus, osficulum sibi innatum uendicantes, quod osficulorum sesamo senini comparatorum classi ascribitur, & patellæ genu usum formamque quodammodo, ut & reliqua sesamina osficula, refert, suaq; lubrica superficie (quæ ex tendinis substantia tantum prominet) sinui præponitur, inter duo capitula occurrenti, quibus primum quatuor digitorum os secundi ossis sinus subit. Atq; ut primi musculi tendinibus eiusmodi innascuntur osficula, sic quoq; alia secundi musculi obtungunt tendinibus, priusquam tertijs digitorum ossibus inserantur. Horum tendinum osficulum sinui prælocatur, respodetq; quem in suo medio habent secundi digitorum ossis capitula, tertij ossis sinibus articulata. Quanquam interim omnibus aliàs nobis conspicuis in manu sesaminis osficulis, hæc quæ dictis iam duorum musculorum tendinibus innascuntur, sint minima, obseruatq; difficillima. Cæterum ut in brachiale, & tota primi digitorum ossis longitudine, primi secundiq; musculi tendines transuerso ligamento cinguntur: sic quoq; in tota secundi ossis longitudine aliud ligamentum tendinem secundi musculi hæc porrectum obuoluit, aut, ut semel dicam, eiusmodi ligamentum toti internæ digitorum sedi obtenditur, quod nulla membrana, nullo ue alio uinculo, aut fibra etiam, tendinibus adnascitur, nec ibidem quicquam membraneum inter duos tendines inuicem suffultos interuenit. In uola tamen, priusquam tendines, digitorum ligamenta subeunt, singuli proprijs induuntur membranulis, quæ tendinibus, quibusdam fibrosis nexibus adnascuntur. Tertius musculus à secundo mihi prorsus distinguitur, non anxie interim sollicito, num secundo illum adnumeret, ac secundum tunc in quinque carnosas partes, totidemq; tendines distinctum proferas, dummodo uera tertij musculi descriptio non reticeatur, qui tota cubiti longitudine, superiorilateri secundi musculi exporrigitur, illi nusquam, nisi fortassis ad cubiti cum humero articulum, continuus: sed perinde ac cæteri musculi mutuo accumbentes solent, toto progressu illi duntaxat coherens. Enascitur quidem carneo tertijsq; principio ex ulnæ sede, qua hæc radij capitulum in proprium sinum excipit: & hinc prodiens, radio attenditur, illi uniuersa ipsius propemodum longitudine adnatus, & ab ipso principium cōtinuè ducens, ex ea potissimum sede, ubi membraneum ligamen, secundum cubiti longitudinem porrectum, ex radio ad ulnam enascitur, quod etiam huic musculo principij portione offert. Quum uerò musculus radio ad hunc modum expāsus, ad brachiale properat, in teretem cessat tendinem, peculiari membrana, quam mucor imbuat, obtectum: non autem communi membrana, quæ in brachialis sinu secundi musculi tendines inuestit. Quinetiam tertij musculi tendo nulli quatuor secundi musculi tendinum subiicitur: quamuis interim per transuersum brachialis feratur ligamentum, illius attentus lateri, quod ad pollicis radicem cōsistit: ubi etiam brachialis os, pollicem sustinens, sinum huius tendinis potissimum occasione in sculptum habet, ad quem tendo reflexus, mediusq; inter musculos primum pollicis os & secundum flectentes occultatus, ad secundum pollicis repit internodium, ubi transuerso ligamento in tota secundi ossis longitudine exceptus, tertium os accedit, cui latescens ualidè inseritur, eius ossis flexionis, uti mox subiungā, futurus opifex. Priusquam uerò tertium pollicis articulum

Tertius musculus

tendo iste ad suam usq; insertionem omnino superat, illi sesaminū innascitur osiculum, quod sua læui & lubrica superficie, qua extra tendinem prominet, anteriori sinus sedi præponitur, inter duo capitula cōspicui, quibus secundum pollicis os, tertij ossis sinus subingreditur. In caudatis simijs tertium hunc musculum non reperiēs: uerū in uolæ medio, à<sup>9</sup> tendine secundi musculi, medium digitum petente, exigua portio enascitur, quæ transversim ad pollicem ducta, ultimo ipsius ossi implantatur. Atq; ita hæc tendinis portiuncula peculiarem portionem carnosam, ut cæteri quatuor secūdi musculi tendines, ne utiquam adipiscitur, aut etiam accedenti medium digitum tendini alligatur: at ab ipso prorsus enascitur, super indicis tendinem transversim uecta. Ceterum non caudatæ simiæ, magis humanæ constructioni accedentes, tertium musculum hominis musculo figura ductūq; (nisi quod etiam insigniūs secundo musculo continuus sit) similem nanciscūtur: uerū uti illis quoq; simijs pollex multo minor inualidiorq; quàm homini obtingit, ita etiam tertius ipsarum musculus ad proportionem minor graciliorq; quàm hominis musculus spectatur. Quinimo, quum earum simiarum pollex etiam adhuc breuioribus gracilioribusq; ossibus extruatur, quàm ceteri illarum digiti, tertius musculus graciliorem meritò tendinem in ipsis profert, quàm secundi musculi sunt tendines: quum interim in homine tertij musculi tendo, secundi musculi tendines crassitie insigniter uincat, quemadmodum & humanus pollex mole & robore cæteros anteit digitos. Adeò, ut haud mirum sit, Galenū iam exactiūs dissectiones aggredientem, in primo de illis Administrandis libro scripsisse, tertij nobis ita uocati musculi tendinem illis tendinibus graciliorē esse, qui à secundo musculo producuntur. quod sanè haud fecisset, si hominis perinde ac simiarum historiā posteris tradere studuisset, aut homines alioquin sectioni accommodasset, uel tunc præcipuè, quum Epicuri philosophos, & Asclepiadis medicos, ea quæ hominis pollicis cum simiæ pollice in magnitudine & robore est differentia, tam prolixè irridet, ipseq; eos reprehendēdo facili ostendit, quàm hominis pollicem nunquam secuerit. Porro si insuper nostrum de uera hominis fabrica sermonē permulta hæctenus Galeni placitis in primo de Partium usu libro renitentia adduxisse expenderis, & potissimū illi figmento, quo is adhuc in anatomicis rudior, pollicem non ad brachialis medium, cæterorum digitorum modo, sed super alios, uersus uolæ medium flecti comminiscitur: non me infcitia, aut in Galenum communem præceptorem inpietatis prius infimulato, quàm proprijs manibus (ut & id cum ipso dicam) sectionē obie-ris, aut alteri accuratè illam tractanti, admonitus iam astitis, rem uniuersam diligēter in simijs & hominibus obseruans. Reperies namq; non modò nunc commemorata, Galeni sententiæ doctrinēq; meritò reluctari: sed & id quoq; maximè, quod de secundi ac tertij musculorum functione subnexurus sum. Opinatur enim Galenus, & cum illo omnis resectionis professorum chorus, secundum musculum quatuor digitorum primum tertiumq; os flectere: & quem nos tertium recensuimus, secundi pollicis ossis & tertij flexum moliri: quum tamen ambo suorum digitorum duntaxat tertij ossis, ut primus secundi, flexionis reuera opifices sint. Nullum enim musculum primariò os mouere, nisi eidem inseratur, Galeno cæterisq; Anatomicis firmissimi axiomatis loco habetur. at secundi musculi tendines neq; primis quatuor digitorum ossibus, neq; tertij tendo pollicis secundo ossi, ne obscurissimè quidem inseritur, applantatur uē: ergo nec eorum quodpiam hi musculi agūt. Neminem enim fore arbitror, qui (etsi Galenus id primo de Partiū usu astruat) secūdi musculi tendinem

q. quæsi-  
tendine y in  
6 tab. nota  
to ad s por-  
tio duce-  
tur.

r. 6 tab. u.  
s. 6 tab. u.

Primo libro de  
Partium usu.

Pleraq; hic Ga-  
leni placitis cō-  
traria proponi.

Ad finem x li-  
bri de Admini-  
strat. sect.

tendinem primo osi dilatescentem implantari dicturus sit: quum Galenus in dissectione temporis successu exercitator, tribus interiectis de transverso ligamento uocibus, integrā paginam ibidem restituere conatus fuerit: parum tamen sui memor, quum postea insertiones tendinum in digitos, simul in numerum colligit. Ac proinde si beneficio transuersi ligamenti, quod in primis quatuor digitorum ossibus, & secundo pollicis existit, hæc ossa à secundi & tertij musculi tendinibus flecti, quis pro Galeno certans, illiusq; posteriora uerioraq; sensa capiens contenderit, respondeat is quæso, cur minus & primi musculi tendines, prima quatuor digitorum ossa flectant? quum & hi eodem ligamento contineantur. Non enim quicquam prorsus est, cuius beneficio potius secundi musculi, quàm primi tendinibus prima internodia flecti, quis demonstrare posset. Quinetiam in medium adferat obsecro, quamobrem Galenus non senserit, secundi quatuor digitorum ossis flexionis, tendines secundi musculi omnino autores esse? quum tamen & in secundi ossis radice, totaque ipsius longitudine, hi tendines transuerso obuoluntur ligamento. Ad hæc, illum me docere optarim, quamobrem & primus & secundus & tertius digitos mouētium musculi, etiam brachiale non flectant, quum & in interna brachialis sede<sup>1</sup> transuerso ualidoq; ligamento non mediocri ductus longitudine contineantur. Similiter rationem comminisci uelim, quapropter quamplurimi tibiam occupantes musculi, qui pedem adeuntes, transuersis ligamentis inter tibiæ ossis extremum & calcem, ac rursus inter fibulæ apicem, exteriorem uel malleolum ac calcem obuoluuntur, non illorum ligamentorum etiam auxilio pedem moueant, quum tamen in his omnibus par sit ratio: uti etiam in omnibus cæteris musculis, qui transuerso ligamēto in alio osse, quàm unde principium duxere, induuntur. Ac proinde plerofq; in<sup>2</sup> cubiti exteriori sede, & in<sup>3</sup> tibiæ anteriori regione, tendines ibidem ligamentis circumdatos, in medium, ad robur huic meo paradoxo conciliandum, non adfero. Vt itaq; tres hæctenus ex digitorum musculis enarratos brachiale non flectere, certo certius constat, ita quoq; nisi suorum, quibus inferuntur, ossium flexionis opifices censendi sunt. Si quis tamen nihilominus (etsi præterea Naturam primis quatuor digitorum singulis ossibus<sup>4</sup> duos peculiare musculos, & secundo pollicis osi tres, eorum ossium flexionis autores elargitam esse, mox docebitur) transuersi ligamenti interuentu, primo & secundo musculo primum quatuor digitorum os, & tertio item musculo secundum pollicis os flecti arbitratu fuerit, non oscitanter cuiusq; internodij flexionis uim perpēdat. nam primum internodium, quod ex ipsius sentētia, primi ac secundi musculorum tendinibus, ac dein alijs duobus paulo pōst explicandis musculis inflecteretur, uix firmitus flexionis robur, quàm tertium internodium commōstrat, utcunque etiam unicus tantum tendi huius motus dux censeatur. Insuper si quis transuersorum ligamentorum beneficio flexum peragi contendet, rationem sanè adferat oportet, qui eueniat, tertia & secunda digitorum ossa, extensis & immotis primis, posse flecti: si enim transuersorum ligaminum auxilio secundi musculi tendines prima ossa inflecterent, necessariò tertijs ossibus flexis, prima quoque flexionem semper experirentur, quum contractum tendinem in suum quo obuoluitur ligamentum, perpetuò uim & renixum moliri necessum sit. <sup>b</sup> Tres itaq; nunc dictos musculos, ex disitis regionibus, per totam nimirum cubiti longitudinem Natura produxit: ne si fortè in manu principium assumerent, eam carne obruentes, magnam ponderosamq; redderent: quod quantum ad uaria, quæ manu obeuntur, munia incommodi intulisset, quiuus



*Præfue, forum  
ligamentorum  
v. 156.*

*Mucosarium  
membranarum  
v. 156.*

*Tredicim post  
tertium in nu-  
mero, ordine  
succedentes.*

*Illarū est, qui  
quatuor subje-  
runt digiti.*

quiuīs promptissimē colligit. Deinde robur in flexione maius requirebatur, quā quod breuib. musculis præstari ualebat, qui ex proximis ijs quæ mouenda erant osibus principium ducerent. Atq; hanc pariter ob causam, ut digiti scilicet ualida flexione pollerent, non unius tantum musculi ope tres digitorum articuli flectuntur, sed singuli proprios exigunt. Illi quidē articuli, quos recta duntaxat, & in neutrum latus in clinante flexione agi oportuit, unico eodemq; ualido contenti fuere tendine: illi uerò, qui flexu suo in latera etiam inclinari debebant, pluribus tendinibus musculisq;, & illis non admodum ualidis (ut etiam illorum flexio infirma est) eguerunt. Porro tendinibus transuersa ligamenta secundum digitorum ossa (uti hætenus satis constat) obducuntur: ne quoties secundum aut tertium digitorum os inflectimus, tendines tanquam recti protensiq; funiculi, & uirgulæ secundum ossium flexionem non incuruatæ, à flexo iam osse ad cubitum tensæ exurgerent, & cutem in miram altitudinē eleuantes, manus uolam turpiter implerent. Ligamenta enim, etsi tendines contrahantur, eos tamen osibus, quibus non inferuntur, adiacere cogunt. In uola uerò & brachialis fede mucosis membranarū tendines induuntur, quo tutiores procederent, easq; membranas tanquam propugnacula & muros fortirentur. Sed secundi musculi membranæ alius quoq; usus existit: siquidem<sup>c</sup> musculos oblongos & paruos, quorum opera digitos quatuor pollicem adducimus, ab illa enasci audies. Cæterum iam opportunum erit, musculos prima quatuor digitorum ossa, & primum secundumq; pollicis flectentes, aggre-  
di. Sunt autem hi omnes numero tredicim: ad singulos nimirum quinque digitorum primos articulos bini, & ad secundum pollicis terni.<sup>d</sup> Qui quatuor famulantur digitis, omnes recta secundum post brachialis longitudinem digitos adeunt, omni prope modum ex parte carnei, ac post brachialis ossibus con-  
nati, & deniq; primorū in digitis ossium lateribus interiori in sede inserti. Duo-  
rum igitur paruorum digitorum flectentium<sup>e</sup> unus ab exteriori latere superioris partis post brachialis ossis, quod paruo prælocatur, carnoso principio oritur, etiam nonnihil inibi adnatus brachiali. Hinc recta ascendens, ad primum usq; digiti os carnosus permanet: ubi uerò os contingit, latiusculum tendine exterioris ossis lateri, uersus interiora tamen, inseritur. Alter ex exteriori eiusdē post brachialis ossis latere, ad ipsius iuxta brachiale extremum, originem ducit: & inter id os & sibi proximum ad digitum tendens, carnosum quoq; permanet, donec lato ac ueluti membraneo tendine interiori lateri primi ossis parui digiti implantetur. Quando utriq; musculi colliguntur, primum digiti os in neutrum latus uergens flectitur: si uerò exterior egerit, interiore quiescente, digi-  
tus in exteriorem partem nonnihil inclinans flectitur: at solo interiore labo-  
rante, digitus ad interiora conuiuens, flexionem experitur. Ad hunc sanè modum aliorum trium digitorum musculi habent, adeo ut bini in singulis post brachialis ossium interuallis (quæ tria sunt) reponantur, &<sup>f</sup> is qui indicis inte-  
riori lateri inseritur, interno post brachialis ossis indicem sustinentis lateri ad-  
nascatur, in uolam magis quā in externam manus regionem, & ut ceteri pri-  
mos articulos flectentes musculi, protuberans. Horum musculorum tendini-  
bus, qui admodum breues sunt, & uti iam monuimus, latiusculi,<sup>h</sup> sesamina of-  
ficula illis manifestiora innascuntur, quæ<sup>k</sup> primi & secundi digitos mouen-  
tium musculorum tendinibus peculiariter esse diximus. In mulieribus namque,  
& non admodum exiccatis, senibusq; aut offeisis uiris, ea officula inter diffecan-  
dum etiam facile occurrunt, quæ læui sua & lubrica superficie, qua ex suo, cui  
innascuntur, tendine prominent, anteriorem cōtingunt<sup>m</sup> capitis sedem, quod  
primo

*c. 1. tab. f. 4. d. f.*

*d. f. 4. tab. f. 4. d. f.*

*e. 1. tab. f. 4. d. f.*

*g. 4. tab. f. 4. d. f.*

*h. 1. tab. f. 4. d. f.*

primo digitorū ofsis<sup>a</sup> sinui inarticulatur: ita ut singulis postbrachialis ofsium  
 capitibus unū utrinq; in anteriori ipsius regione præfigatur ofsiculū, eius usu s  
 gratia, quem in primo libro, horum ofsiculorū naturam explicans, cōmemo  
 rari. Cēterūm<sup>b</sup> muscoli, quorum beneficio primum pollicis internodium fle  
 ctitur, unā cum<sup>c</sup> musculo, qui pollicem à cæteris digitis maximè abducere di  
 cetur, carneam molem constituunt, quæ ad pollicis radicē repōita, montem,  
 quem chiromanticorum alij Veneri, alij Marti ascribunt, effingit. Galenus au  
 tem in libris de Vsu partium, hanc molem falso unicum esse musculum arbi  
 tratus est, quem pollicis ab indice abductionis autorem recēssit, cuiq; ualidio  
 rem motum, crassioresq; tendinē, quàm musculo terciū pollicis articulum  
 flectenti, perperam ascripsit. Quemadmodū etiam ueritati parcens,<sup>d</sup> molem  
 illam carneam, quam chiromantici Lunæ monti tribuunt, unum quoq; mu  
 sculum, quo paruus ab alijs abducitur, esse, ibidem docuit, quum interim ma  
 iorem ipsius portionem exterior musculus primum minimi digiti os flecten  
 tium procreet. Primus itaq; pollicis musculus, ex superiori<sup>e</sup> trāuersi brachia  
 lis ligamenti sede carneus enascitur, & toti primi pollicis ofsis longitudini in  
 terna regione attrēsus, perpetuò carneus illi inseritur, perquā obscure secun  
 dum pollicis contingens internodiū. Secundus, qui nuper dicto prorsus occu  
 litur, longeq; minor illo est, ex transuerso quoq; ligamento, & osse brachialis  
 pollicem fulciente enatus, in primi pollicis ofsis radicē implantatur, non ultra  
 mediū longitudinis primi eius ofsis pertingēs. Sunt itaq; hi duo pollicis muscu  
 li inter digitorum motores duodecimus & decimustertius, si modò octo mu  
 sculos, quatuor digitorū prima internodia flectentes, ante hos enumeraueris.  
 Porro qui secundū pollicis os flectunt,<sup>f</sup> tres numero cēsentur, magis differen  
 tem situm ab illis qui quatuor digitorū prima ossa flectunt, obtinentes, quàm  
 duo primi pollicis ofsis flexus opifices. Qui enim quatuor famulantur digitis,  
 rectā secundū manus longitudinē procedunt: qui autem primum pollicis  
 os flectunt, nōnihil obliquē ducuntur: sed muscoli, secundi pollicis internodij  
 flexionis autores, quodāmodo transuersi cernuntur. Operæ precium namq;  
 erat, quatuor digitos uersus brachiale inclinari: pollicē uerò illis in functione  
 oppositum, ad ipsos inflecti. Merito igitur tres muscoli, secundū pollicis os fle  
 ctentes, ex uola, tanquam è quarta circuli parte, principia fortiūtur: nimirum  
 ad eius lineæ circumscriptionem, quæ uitalis & cordis chiromanticis appellari  
 consuevit. quamuis nonnihil ulterius, quàm ea consistat linea, ex uola initium  
 ducant, ad trianguli nimirum illius, quem chiromantici in media uola collo  
 cant, superius & exterius latus. Primus itaq; musculus obliquū latumq; princi  
 pium ducit ex postbrachialis osse, cui medius innititur, modicè subtēr ipsius  
 capitulū digito inarticulatū. Hinc carnosus prorepens, nonnihil angustior red  
 ditur, & mēbraneo tendine, secundi pollicis ofsis lateri, quod indicem spectat,  
 uersus interiora se inserit. Secundus inferiore suo latere iam dicto musculo con  
 tiguus, ex media sede postbrachialis ofsis, quod medio præponitur, originē du  
 cit, nonnihil tamen & os, quo anularis fulcitur, cōtingens. Origo huius quoq;  
 tenuis lataq; est, & statim carnea ad insertionem usq; conspicitur, quam in me  
 dio interioris partis secundi pollicis internodij tentat. Tertius huic proximus,  
 ex postbrachialis ofsis anularē sustinentis radice, quæ brachiali coarctatur, ori  
 ginē pariter latiusculā sumit: & obliquē pollicē accedēs, lateri interiori secūdi  
 pollicis internodij uersus priora implatur, tēdine etiā latiusculo & breui, cui  
 præcipuū maximū<sup>g</sup> ue sesaminorū ofsiculorū circa manus digitos reperorum  
 ofsiculū innascitur: uti & primi secundū pollicis os flectentiū musculorum  
 tendini

Illorū duo, qui  
 pollicis primo  
 ofsi famulantur

Tres, qui secun  
 do pollicis ofsi  
 famulantur

tendini aliud, sed paulo minus, obtingit<sup>2</sup> ofsiculum. Contingunt uerò, aut præ-  
 locantur duo hæc ofsicula, læui & lubrica sua superficie, qua ex tēdinibus pro-  
 minent, anteriori sedi capitis primi pollicis ofsis, quod secundi ofsis sinui inar-  
 ticulatur: itaq; ofsicula hæc eius sedis latera spectant, ut inter ipsa<sup>3</sup> tendinem  
 tertij digitos mouentium muscoli tutò ac citra compressionem, fallacem<sup>4</sup> ue-  
 aliàs sedem, ad tertium pollicis os ferri sinant. Cæterum tres isti muscoli, dum  
 unà contrahuntur, in seseq; colliguntur, fortissimè secundum pollicis interno  
 dium flectunt: primo autem dum taxat agēte, ad superiora uersus indicem pol-  
 lex dirigitur. dum uerò secundus solus contrahitur, ad medios digitos pollex  
 flectitur: quemadmodum infimo ad suum principium contracto, pollicis de-  
 orsum, & magis uersus paruum digitū flexio perficitur. Hos tres, etsi in simijs  
 quoq; obseruetur, Galenus non modò ignorauit, uerum etiam falsas rationes  
 in primo de Partium usu astruit, quibus imperitior aliquis animum adhibens,  
 ne hos quidem inter secandum aggredi tentaret. Neque etiam uerisimile est,  
 quum secundo Administrationes anatomicas emitteret, ac in secundo de Par-  
 tium usu libro lineam unam de musculis primos digitorum articulos flecten-  
 tibus, post illorum librorum indubiè editionem, & non ex totius in ipsis alio-  
 quin occurrentis enarrationis sententia, interijceret, hos musculos ipsi cogni-  
 tos fuisse, quum illos nullibi descriperit: quemadmodū fecerunt Arabes, hos,  
 quantum auguror, cognoscentes, & duos, qui primi pollicis ofsis flexioni præ-  
 sunt, negligentes. Vndecim namq; musculos in manu digitis flectendis extru-  
 ctos recensuerunt, octo quidem ad quatuor digitos, tres autem ad pollicem  
 referētes. Quanquam rursus ambigem, num calu ipsi Vndecim, loco Decem,  
 ex Galeno scripserint: quum citra aliam descriptionē, musculos tantum Ori-  
 basij more enumeret. Quinetiam in primo de Administrandis sectionibus  
 Galeni libro, omnes quos hætenus uidi codices, tres mendas in numeris ha-  
 bent. Octo namq; duorum loco illic legitur, ubi manus muscoli, pollicis in la-  
 tera motibus seruiētes enarrantur. & rursus ad calcem propemodum libri,  
 quo cubitum mouentes muscoli recensentur, Tres scribitur, ubi Duo, in super  
 Duo, ubi Tres scribendū fuerat: non secus sanè, ac malè etiam Primi usus, pro  
 Secundi illic legitur, ubi Galenus in eodem libro ligamentorum usus comme-  
 morat. Verum hæc, cum innumeris sanè alijs, pro mea uirili in Galeno candi-  
 dè sunt restituta, quem nuper Italia & Germania latinum dederūt. Hætenus  
 itaq; sedecim musculos, quibus digiti flectuntur, commemorauī: ac proinde  
 nunc<sup>5</sup> decimus septimus, digitos extendentium primus futurus, opportune  
 describetur, qui<sup>6</sup> principio ex carnea nerueaq; substantia mixto, & utcunq; la-  
 to, à prominentiori sede exterioris humeri<sup>7</sup> tuberis enascitur, & per mediam  
 cubiti sedem magnus & carnosus, & paulo minùs toto teres porrigitur, nulli  
 alteri cōnatus ofsi, neq; aliunde quàm ab humero principium ducens. Quum  
 uerò propter radij extremum, cui brachiale inarticulatur,<sup>8</sup> pertingit, arctior  
 redditus, in tres portiones carnosas finditur, quæ simul communi membrana  
 indutæ, fibrisq; tenuibus inuicem coherētes, in tendinem ilico ab ipsarum à  
 muscoli uentre diductu degenerant: ac unà per<sup>9</sup> sinum, in radij exteriori sede  
 exculptum, ad brachiale contendent. Est autem sinus ille, ex quatuor in exte-  
 riori sede appendicis radij excauatis, radij cum ulna<sup>10</sup> articulo proximus. Huic  
 itaq; sinui utcunq; amplo, & admittendorū corporum magnitudini ad amuf-  
 sim respondentī, tres isti tendines incumbunt, transuersoq;<sup>11</sup> ligamēto ipsis pec-  
 culiari obuoluuntur, ne aliquando ex sinu declinent, & ne contracto ipsorum  
 musculo in altum exurgant. Vbi uerò ligamentum perrepererunt, brachiali-  
 iam in-

Tres secundus  
 pollicis os fle-  
 cientes muscu-  
 li, Galeno igno-  
 rati.

Decimus septi-  
 mus digitos  
 mouentium.

2. sic. cap.  
 23 lib. 1. T.

4. mase.  
 tab. 8. mu-  
 sculi. 1. inf.  
 gnu.

b. 9. tab. 2.  
 2. tab. V. 10.

1. tab. f.  
 c. 9. tab. 4.  
 d. 2. sic. cap.  
 23 lib. 1. P.

e. 9. tab. 6.

f. 24. fig.  
 cap. 24. lib.

g. 1. sic. cap.  
 24. lib. 1. i.  
 aut. polius  
 2. figura. 7.  
 h. 1. 2. tab.  
 ch. 1. 1. 1.



iam infternuntur, lateſcentes, & ab inuicem ſemoti, unus indicem, ſecundus medium, tertius anularem petunt. Mox autem atq; ſuorum digitorum radices contingunt, adhuc multo tenuiores amplioresq; redditi, ac, ut poſtea dicemus, uariè inuicem permixti, primi oſis radici inferuntur, & per totam digiti longitudinè aſcendentes, medio exterioris trium oſium regionis adnaſcuntur, trium illorum digitorum extensionis potiſſimum opifices. \* Decimus-octauus muſculus, gracilis lógusq; eſt, ab exteriorè humeri tubere principium ſumens, inter decimiſeptimi muſculi caput, & exortum muſculi, qui poſt brachialis oſis, quo minimus digitus ſuffulcitur, infertus, brachiale extendit. Hinc itaq; decimus octauus ſecundùm inferius latus decimiſeptimi carnoſus fertur, quouſq; cubiti finem attingat, ubi in unum ceſſans tendinem, còmunì radio & ulnæ ſinu & tranſuerſo ligamento utitur. Tendo iſte ſtatim atq; brachiale ſuperauit, ad paruum còtendit digitum: & latior redditus, nonnihilq; cum tendinis anularè à decimoſeptimo adeuntis portione, ad parui digiti radicem commixtus, & illi quodammodo tendini portione unà offerens, poſteriori trium parui digiti oſium regioni implantatur, illorum extensionis opifex.

Decimus-octauus.

Decimus nonus, duobus ultimò deſcriptis in cubito ſubſtratus, obliquo ductu donatur. A poſteriori namq; ulnæ proceſſu, uſq; ad ulnæ ſedem, qua non multo ante brachiale ueluti exactè teres euadit, continua ſerie, tanquam ex reſta linea, muſculi quidam enaſcuntur, omnes obliquo ſitu præditi. Atque hi tres obtinent radices, principia ue: ac primum quidem, quod elatiſſimum, & brachio uicinius eſt, ad muſculum refertur radio peculiarem. Secundum autem, primo iam ordine ſuccedens, ad pollicem & brachiale ſpectat: cuius ductum, ac in plures ueluti muſculos diſtributionem, muſculorum pollicem extendentium enarratio docebit. Tertiū autem, quo in præſentia potiſſimum egemus, quodq; ſecundo principio ordine ſuccedit, ab ulnæ oſſe ultra medium ipſius longitudinis, uerſus brachiale enaſcitur, exactè carneum, & inſtar oblongæ linæ originem ducens, paulo anguſtius ab exortu redditur: & obliquè deorſum uerſus radij ad brachiale appendicem conſcendens, in duas carnoſas portiones diſcinditur: quarum inferior decimimononū efformat muſculum, à ſuperiori illius principij parte diſtinctum, quam doctriñæ gratia uigeſimum primum, & pollicem uerſus alios digitos evertentē muſculum appellaturus ſum. Hoc igitur tertium principium in duos muſculos diſtinguam: quamuis interim principij ratione nō obſtem, quo minùs ambas ipſius partes, unius muſculi loco quiuis recenſere poſſit. Decimus itaq; nonus, ab ulna eo quo dixi modo enatus, obliquè radij appendicem petit: ac priuſquam hunc contingit, in duos inuicem cohærentes finitur tendines: qui proprio ſinui in radij appendice incumbentes, & peculiari ligamēto tranſuerſum obuincti, ſuper brachiale expanduntur. Sinus autem horum tendinum nomine, in radij extremo ſculptus, inter ſinum, decimiſeptimi muſculi gratia inciſum, & illum conſiſtit, quo bicornis tendo eius muſculi uehitur, cuius beneficio brachiale extenditur. Hic bicornis tendinis ſinus alteram quoque portionem tertij illius ex ulna prodeuntis principij tranſmittit, quam pollicis motibus fanulari audies. Haud enim arbitrandum eſt, ambas tertij principij portiones unico ſinu ac ligamento uti, & huic decimimonono muſculo ligamentū peculiare non obduci. Porrò ubi iam deciminoni muſculi tendines brachiale ſuperarūt, compreſſiq; admodum ſunt, indicis & mediij digiti radicē petunt, illi ut eorum digitorum, ac in primis indicis, à pollice abductionis autores ſint, inferſi. Obliquus namq; totius muſculi ductus affatim at teſtatur, illum nō niſi obliquo præſci potuiſſe

Decimus nonus.

Tres muſculorum radices, ab ulnæ longitudine procedentes, quarum tertia, 10 muſculus eſt parus.

motui: uti contrà, decimum octauum parui digiti extensionem potius, quàm ipsius à ceteris digitis abductionem moliri, rectus ipsius per cubitum incessus, & magis adhuc ipsius situs arguit, qui sub paruo digito neutiquam uersus inferiora obliquus cernitur. Atq; istud non obiter sanè in ipsa relectione tibi spectandum uenit. neq; uulgariter profecto animus adhibendus est uarie, & non omnibus hominibus pari commixtioni, quam tendines ad digitorum radices moliantur, à tribus postremò commemoratis musculis ducti: ut diligenter expendas, quàm multa Galeni placitis pugnantia, necessariò in illorum musculorum historia scripserim. Is namq; decimum septimū musculum, anteaquàm brachiale conscendat, in quatuor tendines scindi tradidit, horum unum paruo quoq; digito tribuens: quum tamen in tres tantum tendines eum musculum dissecari innuerim. Præterea Galenus tendines hos digitorum ossibus illic tantum connasci scripsit, ubi ad articuli cōpagem accedunt, quum tamen toti ossium longitudini æquè adnascantur. Ad hæc, musculum digitos extendentem, per<sup>d</sup> finem, transuersumq; ligamentum ferri ait, quod radio & ulnæ est commune: quum id decimo octauo seruiat musculo, & proprium ligamentum & sinū in radij appendice decimus septimus sibi uendicat. Deinde, quum decimoini musculi fabricam enarrat, multo secus quàm res se habet, huius principium à tota ulnæ, aut ulnæ superiori parte brachio uicina pendere commemorat: quum tamen trium principiorū radicum uē, ab ulnæ feriatim prodeuntium, decimum nonū musculum tertij ac infimi principij humiliorem, ac brachiali propinquiorem esse portionem (uti reuera est) descripserim. Insuper decimo octauo duos tribuit tendines, illumq; anularis & parui digitorum à pollice abductionis autorem statuit, nulla rarè illius à nobis commemoratæ tendinum mixtionis habita ratione: quum ego interim decimum octauum, in primis paruum digitum extendere, dictis antea occasionibus contendam.

*fig. simm.*

Verum quia paruum digitum (ne in contrarijs mihi cum Galeno descriptionibus enarrandis nimis sim) adeò ac uelut ex abundanti à ceteris abduci oportuit, quoties rotundas figuras manu cōplectimur, & quia huiusmodi motus decimo octauo musculo acceptus ferri nequeat, rerū Opifex<sup>k</sup> musculum breuem, sed ualidū in manu reposuit, illi motui præfectū. A<sup>l</sup> quarto enim brachialis osse, quod rectū appellauimus, musculi huius principium prodit, quod per Lunæ monticulū ad paruum digitū pergens, toto ductu carneum uiuitur, muris seu lacertæ formā eleganter exprimens. quippe musculus iste in exortu utcunq; tenuis, in medio teres crassusq; est: in insertione autem, quam in externū primi ossis parui digiti latus molitur, gracilis, tenuisq; & nerueus euadit. sit itaq; hic ordine uigesimus. Ceterum uigesimus primus, pollicis peculiaris censetur: estq; ille altera<sup>m</sup> tertij ex ulnæ pendētis principij portio, quam à<sup>o</sup> decimonono, qui ad indicē potissimum fertur, distinguimus. Ab ulnæ itaq; exteriori sede, iuxta<sup>n</sup> ligamentū membraneū, inter cubiti ossa, qua in uicē dehiscūt, consistēs, & iuxta mediū longitudinis cubiti iste musculus enascitur, uersus radium obliquè properans. Priusquam uerò radij inferiorē contingit appendicem, in paulo minus toto teretem cessat tendinem, qui communi cum bicorni<sup>o</sup> tendine, brachiale mouente<sup>o</sup> sinu, & ligamento plerunq; (nanciscitur enim aliquando proprium) deductus, ad manum contendit, & ilico latescens, totius pollicis longitudini inseritur, non quidem in medio exterioris regionis, sed in exteriori eius regionis latere, quod indicem spectat. Quo tamen tendo magis ad tertium pollicis os contendit, eo magis quoq; medium exterioris sedis pollicis sibi uendicat. Cuius autem motus hic musculus opifex sit, jilico subijciam, atq;

*fig. simm. secundum, qui simul cum 25 re censetur.*

c. 9. tab. 2.  
d. 2. fig. cap.  
24. lib. 1. f.  
c. 2. lib. 2. d. 2.  
rad. 1.  
f. 2. lib. 2. d. 2.  
rad. 2.  
g. 2. fig. cap.  
24. lib. 1. f.  
h. 10. l. 1. f.  
c. 2. capite  
simul d. 2.  
duo prae  
pia.

i. 9. tab. 2.  
h. 1. tab. 2. f. 3.  
tab. 1. lib. 1.  
n. 9. tab. 2.  
l. 1. 3. f. 3.  
ca. 2. lib. 1.  
charact. 4.

m. 10. tab. 2.  
n. 1. tab. 2. f. 3.  
d. 2. cap. f.  
n. 10. tab. 2.  
f. 3.  
o. 10. tab. 2.  
p. 12. tab. 2.  
inter f. 2.  
g.

q. 11. tab. 2.  
sculi a. no.  
tali.  
r. 2. 4. fig.  
cap. 2. 4. lib.  
1. f. 3.  
s. 1. 2. tab.  
charact. 4.

atq; duos sequentes nunc musculos descripero. Ex<sup>1</sup> tribus itaq; musculorum principijs, quæ ab ulna secundum ipsius longitudinem exoriri relata sunt,<sup>2</sup> medium principium utrunq; amplum, longa<sup>3</sup> ue satis linea enatum uisitur: & oblique super radium conscendens, illi infertur<sup>4</sup> musculo, quem bicorni tendine in brachiale extendere docebo. Simulatq; uerò principium hoc eum musculum integit, in<sup>5</sup> duas impares portiones diuiditur, a seculo nullo interuallo distantes, sed mutuò accumbentium musculorum ritu inuicem hærentes. Superior portio aliquandiu carnea permanens, in teretem quodammodo tendinē cessat, insertum exteriori brachialis<sup>6</sup> ossis sedi, quod pollicē sustinet. Inferior autem principij portio, statim ac aliquoufq; in anteriora prorepit, in<sup>7</sup> duas rursus carneas partes distinguitur, quæ singulæ in tendinem finiunt, ac cum superioris portionis tendine, proprio<sup>8</sup> sinui in radij appendice leuiter, sed latè in cifo insident, peculiariq;<sup>9</sup> ligamento tres simul tendines mutuò accumbentes obducuntur: etsi interim nonnunquam singulos tendines singulis anulis, seu transversis ligamentis donari uiderimus. Postquam autem inferioris portionis tendines brachiale superarunt, unus in primi pollicis ossis radicem implantatur, illic in externā ipsius regionem iuxta internū latus finiens. Alter tendo, membranoso tantum nexu primi pollicis ossis longitudini adhærens, in secundi ossis radicē exteriori sede, uersus internū latus inseritur, non totus inibi cessans, uerum ad summum usq; pollicis apicem, secundo & tertio ossibus pertinaciter, ac instar membranæ adnatus. Nobis itaq; integrum erit,<sup>10</sup> principij secundi, quod ulna profert, occasione, unum hic statuere musculum: aut tendinum, ac ueluti carnosum principij<sup>11</sup> diuisionis gratia, tres musculos enumerare, ut scilicet singulis tendinibus singulos ascribamus musculos: aut propter<sup>12</sup> continuitatem inferioris portionis carnosæ, &<sup>13</sup> tendinum ipsius in eundem digitum insertionem, duos tantum recensere licebit musculos: ut scilicet<sup>14</sup> superior portio ad brachiale spectans, unius loco habeatur: &<sup>15</sup> inferior portio suo incessu in duas carneas partes & totidem tendines diuisa, unius musculi uice commemoretur. Quod Galeni etiam sententiæ magis erit accommodum, quum is quauis etiam enumeratione inferiorem portionem unius tantum musculi loco recensuerit, ut qui unicum ipsius tantum<sup>16</sup> tendinem tribus pollicis ossibus communem cognouerit, descripserit<sup>17</sup> ue. quamquam & non caudatæ simiæ eo desituantur<sup>18</sup> tendine, quem hominibus primo tantum pollicis ossi insertum esse diximus. imò caudatarū simiarum, ab hominis fabrica magis adhuc quam non caudatæ uariantium, totum secundū seu medium ex ulna prodiens<sup>19</sup> principium, unicum tantum educit tendinem, qui in brachialis regione modico interuallo primum dissectus, parua portione brachialis ossi pollicem sustinenti inseritur, maiori portione pollicem ita ac in ceteris apparet simijs, accedens. Sit igitur in nostro musculorum numero ac serie, inferior ea medij principij portio, in duos tendines digesta, mouentium digitos musculorum uigessimus secundus: ipsa uerò superior portio ad brachiale pertinens, musculorum hoc Capite hætenus commemoratorum uigessimus tertius: etsi interim is digitorum uix famuletur motibus, uerum cuidam brachialis extensioni & obscuro radij circumductui opem secundariò ferat. Porrò<sup>20</sup> uigessimosecundo (ut tandem ipsius munus explicem) & qui prius descriptus est,<sup>21</sup> uigessimoprime pollex recta<sup>22</sup> euertitur, extenditur ue, quoties ambo musculi unà contrahuntur: quippe uigessimosecundo tantum in se collecto, pollex oblique ac ueluti in latus à cæteris abductus digitis, extensionem patitur, à uigesimo autem primo ad indicem magis euerit<sup>23</sup> solet. Cæterum adhuc reliqui sunt<sup>24</sup> duo laterales

In 1 lib. de Ad  
minif. diff. 11.

Uigessimus  
musculi mu-  
nus, non ad di-  
gitos pertinet.

Adunus 22  
22 musculorū.



Ex musculi di-  
gitos mouentes  
ad hunc reliqui.

pollicis motibus subseruientes musculi: & alij insuper quatuor, quibus qua-  
tuor digiti ad pollicem ducuntur. Pollex enim, quum instar alterius manus, re-  
liquis digitis opponi debuit, meritò musculos sibi uendicat, quorum benefi-  
cio ab illis maximè abducitur, & rursus uariarum actionum gratia, indici pro-  
ximè admouetur. Qui igitur pollicem maximè abducit, ab anteriori sede of-  
sis brachialis, cui pollex innitur, nerueo principio, quod statim carneum eu-  
dit, enascitur: ac deorsum protèsus, secundo pollicis articulo, membraneo ten-  
dine inseritur. Hic musculus, unà cum duobus, primum pollicis internodium  
flectentibus, quibus iste inseritur, carnosam uolæ partem efformat, quæ ad  
pollicis radicem consistit. Galenus autem in libris de Partium usu, præsentem  
musculum non admodum uerè in primum pollicis os inferi, scriptum reliquit:  
quum notabili & uera insertione ipsi non adnascatur, sed duntaxat fibrosis ne-  
xibus inualidè hæreat. Verum non mirum est, Galenum eiusmodi insertionem  
nos docuissè, quum id scribens, duos musculos primum pollicis os flectentes  
ignorauerit, ac illos præsentis musculi partes esse arbitratus fuerit. Musculus  
iste interioris pollicem euertentiū, qui ordine uigessimus secundus erat, actio-  
nem excipit: atq; ita quàm maximè pollicem ab indice remouet, id priuatim  
adeptus, quod inter musculos manum & cubitum occupates, solus quodam-  
modo luceat, propriæ ipsius, quæ crassior est, membranæ gratia. Alter muscu-  
lus, lateralis pollicis motibus seruiens, ex interiori latere, uersus posteriora ta-  
men, osis postbrachialis, quod indici præponitur, initium ducit carneum, &  
secundum totam eius osis longitudinem enatum. Musculus iste inseritur car-  
nea implantatione, toti externo lateri primi pollicis osis, membraneum ten-  
dinem radici quoq; secundi osis porrigens. unde etiam huius fibræ transuersæ  
quodammodo sunt, à postbrachiali ad pollicem ductæ, ac proinde etiam illi indici  
proximè accommodantes, & musculi pollicem ad exteriora euertentis (qui in  
nostra serie uigessimus primus est) actionem excipientes. Porro musculi, qua-  
tuor digitos pollicis adducentes, graciles & teretes sunt, singulis quatuor secun-  
di musculi tendinibus (qui quatuor digitorum tertium os flectunt) singuli ex-  
porrecti: oriuntur enim ex membraneo inuolucro, tendines illos, cum brachia-  
lis finem, & transuersum ipsius ligamentum perreptant, induente. Hinc simul  
cum tendinibus ad digitos procedentes, ac interiori tendinum lateri attensi,  
in digitorum radicem inferuntur, ad internum eorundem latus, uersus inte-  
riora insertionem membraneam moliti. ista namq; sede illos inferi decuit, qui  
in latus ad pollicem quatuor digitos erant inclinaturi. Præsentibus musculis  
hoc fanè rarum, perinde ac oculi musculis obuenerit, quod non ex offe, aut car-  
tilagine, sed ex membraneo tendinum inuolucro originem sumpserint. Iam si  
his quoq; musculis tuum numerum, disciplinæ gratia auxeris, in uniuersum ui-  
gintinouem in hoc Capite descripti exurgent: quorum uigintiocto, digito-  
rum duces sunt, uigesimo tertio interim ad brachiale relato. Porro mirabi-  
tur forsitan aliquis, cur minus musculos, quatuor digitos pollicis adducentes,  
& eum qui paruum à ceteris abducit, primo quatuor digitorum osi dixerim  
inferi, nulla interim mentione succedentium internodiorum osium uel facta:  
quum tamen Galenus in omnibus digitorum osibus, secundum totam illo-  
rum longitudinem, eorum musculorum tendines, membranæ modo inferi,  
connasci; in primo de Administrandis sectionibus studio serioq; scriptum reli-  
querit: secus quàm in libro de Partium usu, ac illo etiam priores Anatomici. Ego  
nequaquam inficias eo, digitorum ossa secundum eorum longitudinem, ere-  
gione insertionis illorum musculorum membranæ obduci, uerum non talibus,  
quales

Ex uigintino-  
uem descriptis  
musculis, 28 di-  
gitorum moti-  
bus sumulari.  
De tendinum  
insertionibus  
nonnulla.

q 6 tab. 1.

f. 7 tab. d.

r 1 tab. 1.

tab. p. 4

tab. m.

s 6 tab. 2.

h.

t 10 tab. m.

m. 11 tab.

q. r.

u 1 tab. h.

2 d. p. 8. 10

t. 11 f. 12. 13

x 12 fig.

esp. 2. 4. 13

11.

p 10 tab. 2.

z 6 tab. 1.

f. 12. 7. 14.

d. ad f.

d 4 tab. d.

b 12 fig.

cap. 12.

e 10 tab. h.

11 tab. p.

d 6 tab. 1.

e 5 tab. 1.

quales commemorati modò musculi porrigere deberent. quandoquidem illæ nullum fibrarum genus, secundum longitudinẽ excurrens ostendunt, neq; parem etiam ductum cum musculorum ex cubito in anteriorem digitorum sedem insertorũ tendinibus retinent. Quinetiam solius primi in quatuor digitis articuli, & primi secundũ quodammodo in pollice beneficio, digiti in obliquum & latus aguntur: cuius causa, dum digitorum ossa persequeretur, articulationis differentia esse commemorabatur. Si itaq; quispiam eiusmodi membranas, musculorũ in latera agentium tendines cum Galeno (quem articulorum in digitis discrimina & differentię latuerunt) esse contenderit, frustra eos & ligamenti tantum uice secundis & tertijs digitorum ossibus commissos fateatur oportet. Rursus studiosior aliquis in Galeni libris uersatus, illumq; admodum contraria de insertione tendinum docere animaduertens, opperietur, donec omnes musculorum digitorũ mouentium insertiones in unum numerum redegero, Galenum in primo de Partiũ usu imitaturus, qui eas parum rectè persequitur: quoniam<sup>o</sup> tredecim musculos, qui in manu locati, digitorum flexus autores sunt, omittens, falso<sup>a</sup> secundi musculi tendines, primo quatuor digitorum ossi implantatos, inibi tradidit. Deinde etiam<sup>b</sup> decimo septimo musculo, &<sup>c</sup> decimo octauo, &<sup>d</sup> decimo nono, alios quàm educit tendines, Galenus tribuit, ac proinde alias quoq; quàm moliantur insertiones. Et sanè nisi uaria illa tendinum, quos tres dicti proferunt musculi, ad digitorum radices cõmixtio, aciporum ueluti in plures furculos diuisa per externam digitorum sedem series, obstaret, quo minus certum illorum omnium insertionũ numerum statuere ipse breui oratione queam, Galenum intelligẽdi gratia, uniuersorum digitorũ mouentium musculorum insertiones tecum in catalogum recenserem.

Musculorum  
insertionum  
collectio.

Si tamen singulis quatuor digitorũ ossibus, ex tribus dictis musculis quasi geminis (quum ego interim quibusdam illorum, & præcipuè parui digiti ossibus, simplicem ferè ascribam) in posteriori ipsorum sede implantationẽ, Galeni nomine, & succinctè orationis causa, ascriberes, omniaq; deinde, ut ex nostra sententia habent, subaudires, sexaginta omnes ueræ insertiones (non accubitus, leues uel annexus dico) erũt: in primum scilicet pollicis articulũ quinque, in secundũ septem, in tertium tres, in minimi digiti primum internodiũ sex, in reliquorũ autem trium digitorũ prima internodia duntaxat quinque, in quatuor uerò digitorũ secundum & tertium internodiũ tres. Quæ porrò eiusmodi sint insertiones, ipse tecum, ut musculos rursus in memoriã, quasi in epilogum contrahas, repetito: ac deinde rursus perpendito, quot uniuersæ essent, si etiam<sup>m</sup> musculi lateralibus motibus præfecti, qui in manu reponuntur, insertiones in succedentia ossa, quæ in latus (nisi secundariò) non aguntur, ex Galeni sententia molirentur: & deinde etiam, si<sup>n</sup> uigefimisecundi musculi utrunq; tendinem, primo pollicis ossi inferi uera insertionẽ admiseris, ut nunc primũ pollicis internodiũ sex admitteret insertiones (qui enim pollicem maximè abducit, in primum ipsius os non uerè inseritur) tertium autem pollicis os quinque, & secunda tertiãq; internodia indicis, medij, & anularis etiam quatuor, parui autem digiti secundum & tertium internodiũ quinque, insertiones obtinerent, confurgẽt omnes septuagintatres. Si etiam dein transuersorũ ligamentorum beneficio factas ossibus applicationes adnumeraueris, & secundum quinque digitorum internodiũ una applicatione, & primum quatuor digitorũ duabus auxeris, inuenies (nisi me additio fugerit) octuaginta sex. nam primo pollicis internodiũ<sup>o</sup> tertij musculi tendinẽ tribuere nequis: quamuis hic numerus adhuc &<sup>n</sup> lati tendinis applicationes sibi uedicare posset, ut tria quatuor digitorũ,

K 3 & duo

f 6 tab. 2.  
g 10 tab. 1.  
r 1 p. 10.

g 6 tab. 1.  
h 7 tab. 1.  
i 10 tab. 1.  
j 10 tab. 1.  
k 6 tab. 1.  
l 9 tab. 1.  
m 9 tab. 1.  
n 10 tab. 1.  
o 10 tab. 1.  
p 10 tab. 1.  
q 10 tab. 1.

m 3 tab. 1.  
p 6 tab. 1.  
q 10 tab. 1.  
r 10 tab. 1.  
s 10 tab. 1.  
t 10 tab. 1.  
u 10 tab. 1.  
v 10 tab. 1.

p 6 tab. 1.  
q 10 tab. 1.  
r 10 tab. 1.  
s 10 tab. 1.  
t 10 tab. 1.  
u 10 tab. 1.  
v 10 tab. 1.  
w 10 tab. 1.

Lib. de rfu  
partium.

& duo pollicis internodia, adhuc una augerentur cōmissione, numerusq; nonaginta octo constitueret. Quem si ad utranq; manum cōferens duplicaueris, quot numeris centum & octodecim Galeni *ἡμύσσης & παραφύσσης* modò superasti? ac facillè expendis, quàm promptū sit, cognita hominis fabrica, in Naturę laudes expaciari, multasq; paginas in partiū ulu diffuse recensendo absumere.

DE MUSCULIS MOTIVVM BRACHIALIS OPIFICIBUS. Caput XLIII.



brachiale mouentium primum.

V M brachiali reliqua manus pars flectitur, ac extenditur: deinde etiam in utrūq; latus agitur, idq; quatuor maxime musculorum beneficio. Quorum<sup>a</sup> primus ex<sup>b</sup> interiore humeri tubere<sup>c</sup> principium ex carne nerueaq; substantia mixtum assumit, hinc totius ulnæ longitudini adnatus, & in progressu ab ipsa exortus sui robur assumens. Expōrigitur autem hic musculus inferiori lateri musculorum,<sup>d</sup> qui

per cubitum repentes, digitorū flexionibus præfunt, unde etiam internam ulnæ sedem<sup>e</sup> magna ex parte amplectitur: quem admodū & medium quoq; inferioris sedis cubiti occupat, cui scribentes innitimur. Reliquum autem inferioris illius cubiti sedis, quod exterius est,<sup>f</sup> alius musculus sibi uendicat, quem ante paruum digitum postbrachiali insertum, illius extensionē moliri audies. Duo enim illi musculi, inuicem fibrosis nexibus ualidè hæretes, uelut stratum quoddam & puluinar, cui cōmodè totum cubitum inniti sinimus, efformāt. Ceterū primus hic musculus, quum ad ulnæ usq; finem prorepserit, paulo ante cubiti cum brachiali articulum, in<sup>g</sup> ualidum, & quodāmodo teretem cessat tendinem, carniformi semper substantia interiori sua sede ad brachiale usq; auctum: ubi uerò id transcendit, prorsus excarnis est, ualidissima insertionē superioris<sup>h</sup> quarti brachialis ossis sedi implantatus: quod rectum cartilaginofumq; appellari, ac<sup>i</sup> unico tantum ossi cōmitti, primo libro diximus. Præfens tendo, quod ulnæ appendice articuloq; brachialis suffulcitur, peculiare ligamentum, quod ipsi transuersim obducatur, nullum obtinet: sed cōmuni omnium musculorum membrana, quæ ligamenti uice est, quamq; inter manus ligamenta quodammodo etiam recensimus, circundatur, & perquam ualidè brachialis cum cubito articuli ligamenti connectitur. Secundus brachiale mouentium musculus, ab interiori quoque humeri tubere<sup>j</sup> exoritur, illius, quod nuper cōmemorauimus, capiti proximus, & instratum quoq; habens<sup>k</sup> caput eius musculi, qui internæ manus cuti dilatescentem exporrigit tendinem. Secundus hic musculus a suo initio ingressu obliquo ad elatius<sup>l</sup> primi digitos flectentis musculi latus contendit, ipsi magna ex parte innitens, radioq; exporrectus.

Secundus.

Ante brachialis autem radicem, in teretem cessat tendinem: qui simulatque brachiale ad pollicis radicem<sup>m</sup> cōtingit, incuriose illum secantibus, ibidem brachialis ossibus inferi putatur. uerū ubi<sup>n</sup> musculus ab indice pollicem abducens, unā cum duobus primum pollicis internodium flectentibus, à brachiali liberatus est, hic brachialis musculus conspicitur internam brachialis sedem præterire, & latescēs in postbrachialis<sup>o</sup> ossis, quod indici præponitur, radicem inferi, internæq; transuersi hic<sup>p</sup> ligamenti sedi ualidè adnasci. Duobus internis alijs totidem externi respondent. unus ab<sup>q</sup> exterioris humeri tuberis radice principium capit, ad latus eius<sup>r</sup> musculi, qui præcipuus extensionis minimi digiti autor est. Plurium enim ex eo tubere certa serie prodeuntium capitum, hic brachialis musculus humillimam & ulnæ proximam sedem obtinet, unde

Tertius.

etiam

d 4 tab. 2.  
i tab. 2. a  
d 3 m. 5. e.  
g 2.  
b 1 fig. cap.  
23 lib. 1. 3.  
c 4 tab. 1. 3.  
d 4 tab. 1. 3.  
e 5 tab. 1. 3.  
f 6 tab. 1. 3.  
g 16 fig. cap. 24 lib.  
i d.  
f 26 fig. cap. 24 lib.  
e 16 m. 4.  
d 4.  
g 9 tab. 1. 3.  
h 10 tab. 1. 3.  
i 10 tab. 1. 3.  
j 10 tab. 1. 3.  
k 10 tab. 1. 3.  
l 10 tab. 1. 3.  
m 10 tab. 1. 3.  
n 10 tab. 1. 3.  
o 10 tab. 1. 3.  
p 10 tab. 1. 3.  
q 10 tab. 1. 3.  
r 10 tab. 1. 3.  
s 10 tab. 1. 3.  
t 10 tab. 1. 3.  
u 10 tab. 1. 3.  
v 10 tab. 1. 3.  
w 10 tab. 1. 3.  
x 10 tab. 1. 3.  
y 10 tab. 1. 3.  
z 10 tab. 1. 3.



etiam & ex<sup>o</sup> posteriori ulnæ processu, qui humero articulatur, hic musculus nonnihil principium ducit, illi infiltratus<sup>o</sup> musculo, qui originem inibi quoq; sumens, radium adit, illumq; in supinum agit. Hinc itaq; tertius brachialis musculus<sup>o</sup> prodiens, humiliorem exterioremq; ulnæ regionem amplexatur, inter primum brachiale mouentium, & eum qui paruum digitum extendit, exportectus. Quando uerò brachiali appropinquat, in teretem finit<sup>o</sup> tendinem, qui<sup>o</sup> sinui in appendice ulnæ exculpto innititur, transuerso ligamento, quod unicum ulna proprium nascitur, obductus. Quum primum superato ligamento, brachiali superuehitur, latior factus, postbrachialis<sup>o</sup> ossis minimū sustinentis radici inferitur, nonnunquam ante insertionē ossiculum sibi innatum obtinens sesaminum, quod nonnihil dictum modò postbrachialis os etiam suffulcire uidetur. <sup>b</sup> Alter exteriorum, qui ordine quartus est, latiusculo<sup>o</sup> principio longè supra exterioris humeri tuber enascitur, ubi humerus uelut in oblongam<sup>o</sup> acutiem lineamq; prominet. Hinc carnosus, & longa utcunq; linea prodiens, radio insertitur, & paulo sub illius longitudinis medio, in robustum desinit<sup>o</sup> tendinem, qui bicornis bipartitus<sup>o</sup> ue statim ab ortu spectatur, utranq; partem paulo minus toto teretem gerens: est enim nōnihil latior, quàm profundior. Hæ partes, aut tendines, etli inuicem dirimantur, non tamen digno notatu interuallo disiti, recto tramite radio exporriguntur, ad illius appendicem iuxta brachiale contententes: quò quum peruenerint, illis exculpto<sup>o</sup> sinui incumbunt, & cōmuni ipsis & illi<sup>o</sup> musculo, qui pollicem uersus indicem euertit, ligamento circumdatur. Quod deinceps superantes, magis tum quàm prius, inuicem distant, in postbrachiale amplis insertionibus (ne fortè crasis & teretibus extra reliquam manus superficiem hic emineant)<sup>o</sup> implantati: unus enim in radicem ossis indicem sustinentis, alter uerò in radicem eius cui medius innititur, insertionem tentat. Quartus hic musculus, unà cum tertio, brachiale, si ambo in se colligantur, extrorsum reflectunt, extendunt<sup>o</sup> ue. hisq; auxiliatur<sup>o</sup> musculus, quem brachialis ossi, quo pollex sustinetur, inferi docuimus, quem superiore Capite illum in tota inibi descriptorum musculorum serie uigessimum tertium nominaremus: & ut his duobus brachiale extenditur, ita etiam duobus interioribus seu primis idem pulchrè flectitur. Dein eisdem musculis, quibus brachialis flexio extensioq; cōcreditur, brachiale ad latera quoq; ducimus. Si enim interior musculus, & exterior, qui indicē spectant, reliquis duobus laxatis contrahantur, brachiale introrsum atq; ad interius latus agit: at si his laxatis, alij duo, qui minimum respiciunt digitū, in se colliguntur, brachiale ad exteriora in latus mouetur. Cæterum præter hos, quos brachiali tribuimus, motus, Galenus ipsi uersionem in prouum ac supinum adscripsit, peculiarem ab ea quam secundariò manus radij beneficio adipiscitur. Mihi tamen manus aut brachialis, quiescente radio, in prouum supinum<sup>o</sup> ue motū aliquem perfici, hæcenus percipere non licuit. Deinde radij sinus, cui brachiale inarticulatur, oblongus est: & ipsum brachiale, quā sinui imponitur, oblongū quoque, neq; ut humeri, aut femoris superius caput, rotundum uisitur: adeo ut hīc ossium articulus confurgat, prorsus ad circumactum ineptus. Verū ut Galenus proprios in prouum & supinum motus brachiali ascribit, ita quoq; quatuor enarratos musculos, illorum autores esse contendit: prout hic nimirum, illē ue contrahatur, aut quiescat. Cuius sententiam si non oscitanter perpendis, hæc illum finxisse, imaginatumq; citius, quàm in refectione perspexisse (ut alia in libris de Vsu partium per Iouem per-  
traque) animaduertes.

Quartus.

Musculorum  
motus.

Brachiale proprio motu in supinum &amp; prouum non agit.

Lib. 2. de Partium usu.



quoties contrahitur, intrò radium ducens, illum cōstituit pronum.<sup>1</sup> Exterior, qui peculiariū radij musculorum quartus est, ductu figurāq; nunc dicto prope modum par,<sup>2</sup> enascitur ab exteriori articuli cubiti regione, ex articulum circundante ligamento, ualidè etiam ex ulnæ posterioris processus externo latere, principij sui portionem sumens. Hinc ad radium in priora conscendit, & radio propter interioris musculi infertionem<sup>3</sup> applantatur. uerùm huius infertio non aequè atq; interioris neruosa est, neq; adeò in radij longitudinè producit. Attamè ductus breuitas hos duos, ut &<sup>4</sup> primum, qui ad brachiale habetur, exacto tendine destituit.<sup>5</sup> Musculus itaq; quem postremò recensui, superiore radij partem extrorsum oblique cōuellens, radium in supinū mouet.

DE MVSCVLIS CVBITVM FLECTENTIBVS & EXTENDENTIBVS. Caput XLVI.

a figure 9  
cap. 24 lib.  
1. cum p  
fig. 1 cap.  
23 lib. 1.  
b 12 fig.  
cap. 23 lib.  
1. K, L, M  
cum C, D,  
E, 12, 13, 14, 15.  
ca. 24 lib. 1.



VE M A D M O D V M radius sui cum humero<sup>a</sup> articuli beneficio pronus supinusq; constituitur, ita quoq; ulnæ cum humero<sup>b</sup> articulus appositissimè cubiti totius flexioni extensioniq; famulatur: & interim radius in eum modum humero est articulatus, ut simul cum ulna ad humerum flecti extēdiq; queat. Musculi uerò, horum motuum duces, si in maximum redigantur numerum, duo flexionem, & tres extensionē perficiunt. si autem ad minorem referantur, aut duo, aut unus, erunt extendentes: duo tamen, utcunq; numeraueris, flectentes. In canibus & caudatis simijs necessariò tres extendentes perpetuò recensentur: quorum etiam descriptionem ilico atq; hominis musculos enarrauerò, subnectam, quo accuratiùs primi de Administrandis sectionibus Galeni libri calcem assequaris. Atq; hos ea tradam lege, ut omnia de cubitū mouentibus musculis figmenta secundi de Vsu partiū libri non cogar recēdere. quandoquidè quum ueram illorum musculorū naturam didiceris, ab uide ea tuo Marte refelles, stupens profectò, qua ratione eiusmodi sensui repugnātia Galenus posteris traderit, ac postea sectione peritior factus, ea cum alijs quibuscūdam in libris de Partium usu non recognouerit.<sup>c</sup> Primus itaq; flectentium, duobus ualidissimis & mutuò distātibus enascitur principijs: <sup>d</sup> unum quidem exactè nerueum, & ad anuissim teres, exoritur ab eminētiori<sup>e</sup> parte ceruicis scapulæ, seu ex superiore supercilio ipsius acetabuli sede. Hoc sub<sup>f</sup> ligamētis humeri articulū continenti bus, & huic principio transuersi instar ligamēti obductis, super humeri caput in anteriora procedit,<sup>g</sup> sinuq; uehitur, ipsi in prioribus capitis & ceruicis humeri regionibus priuatim cælati.<sup>h</sup> Alterum huius musculi principiū, à tota inferiori sede & apice interioris<sup>i</sup> processus scapulæ, quem anchorę comparamus, duplex quodāmodo enascitur, non quidem disiunctū, sed duplicem substantiæ speciem exprimēs, & dicto nuper<sup>k</sup> principio (etsi Galeno secus uisum fuerit) multo latius. Principij enim<sup>l</sup> pars, ab apice processus initiū ducens, exactè neruea est, & crassa, & propemodū teres:<sup>m</sup> pars autem huic continua, ac ex reliqua processus sede prodians, carnea lataq; uisitur. Neutrum istorū principiorum, statim ab exortu deorsum tendens, humeri ossi adnascitur. Verum aliquantulo sub humeri capitis ceruice, ubi ambo<sup>n</sup> inuicē coitura, unum efformare musculum incipiunt, carnosa pars interioris principij, ab interno scapulæ processu enata, humeri ossi lata & utcunque carnea infertione aut nexu adnascitur, priuatam ossis<sup>o</sup> asperitatem, cui aptè committatur, nanciscens. Consistit autem hæc asperitas ad radicem eius<sup>p</sup> sinus, quem externo præsentis musculi principio

Cubitum mouentes musculi aut 3, aut 2.

Primus flectentium.

Lib. 3 de Administrandis sectionibus.

c 14. 15. 16.  
17. Q. 23  
Z. 4. 13. 14.  
7 R. 10. c.  
11 G.  
d 6 lib. m.  
e 1 fig. cap.  
23 lib. 1. A.  
f 1 lib. d. e.  
ad f.  
g 1 fig. cap.  
23 lib. 1. H.  
1.  
h 6 lib. m. o.  
i 12 fig. ca.  
23 lib. 1. E.  
l 6 lib. m.  
m 6 lib. m.  
n 6 lib. o.  
o 1 lib. R.  
p 6 lib. p.

o 1 fig. cap.  
23 lib. 1. f.  
p eiusdem  
fig. 1.



principio incisum diximus. Eiusmodi nexus adeò ualidus inter dum mihi apparuit, & carnosam illam interioris principij partem adeò proceram uidi, ut proprium musculum à scapulæ interiori processu in humerum inferi arbitratu fuerim, qui brachium etiam attolleret. Postquam uerò hic anterior cubitum flectentium musculus, ex duobus illis efformatus principijs, hunc nexum in humero molitus est, ab humero iam abscedens, & ad amussim teretis carnosiq; musculi effigiem, ante refectionem in musculosis egregiè conspicuam præ se ferens, alium conscendit musculū, ipsi toto progressu subtensum: non amplius enim, uel puncto etiam, humerum seu brachij os cōtingit. Cæterum paulo supra cubiti articulum, neruosiore excarnisq; redditus, in robustum & crassum, & ad amussim teretem finit tendinem, qui articulo expansus, & subdito ipsi musculo suffultus, in interiore radij partem modicè latefcens infertur, non nihil & articuli ligamento adnatus. Ut uerò commodior tendinis in radium efficeretur insertio, latum, & modicè prominentem, inæqualemq; admodum in radij superiori fine processum extrui, iam antea diximus. Atque hæc primi musculi est series, hoc sibi cum alijs quibuscūq; proprium uendicantis, quod liuidus comperiat. \* Secundus musculus huic succumbit, omnino carneus, & nusquam insigniter nerueam ostendens substantiam: præterea longè primo musculo breuior, multoq; iuxta humiliorem ipsius sedem latior existit. Ex humero enim ea sede principium ducere incipit, ubi infima musculorum brachij mouentium fit insertio, quam attollens brachium musculi, cum illo qui brachij pectori admoet, molitur. A latere namq; exteriori insertionis brachij attollentis musculi, secundus hic musculus carneum principium ab humero sumit, quod acutū est, & sensim deorsum obliquè in priora humeri tendens, secundum attollentis brachium musculi insertionis formam (quæ transuersa est) dilatefcit, ac ab exterioribus introrsum modicè uersus inferiora declinat. Quum autem principium id ad infimam insertionis brachij attollentis musculi sedem prorepsit, sursum denuò ad internum insertionis latus modicè fertur, non adeò altè cōscendens, atq; iuxta externū ipsius latus enascebatur. Propter medium igitur longitudinis humeri, secundus cubitum mouentium musculus enascitur carneo latoq; principio, quod bicornè est, & in sui medio obtusum exprimit angulum. Quandoquidem principij exortus linea ab externo latere humeri in anteriora deorsum obliquè repit, & hinc ab anteriori parte sursum obliquè uersus internū humeri latus ducitur: adeò ut unum principij cornu in externo humeri habeatur latere, alterum uerò quodammodo in interno, & angulus in antica humeri sede cōsistat. Porro si præsentem obliquæ huius lineæ ductum, illaq; duo principij cornua tanti aestimes, ut duplici principio posteriorem hunc musculum cum nonnullis Anatomicis enasci dicas, nunc me uerisimè, & multo aliter quàm ipsos, huius musculi initia enarrasse putato, atq; mihi unius principij loco duo, quæ ponis, principia haberi finito, ne omnibus latis musculorū exortibus, præter morem pluræ principia cogar ascribere. Nisi enim id mihi donares, omnia lata musculorum principia gemināda, aut, si cum hoc secundi musculi principio conferantur, pleraq; principia etiam decuplanda præter omnem rationem forent. Præfens itaq; musculus hoc enatus principio, sensim crassior carnosiorq; efficitur, deorsum rectè protēsus, & humero ualidissimè adnatus, ex ipsoq; exortus sui robur toto descensu tantisper assumens, quousq; cubiti articulum contingat, quem sua amplitudine carneaq; substantia in tota anteriori sede integens, ualidissimè articuli ligamento, & anteriori ulnæ ac radij sedi, ampla implantatione

secundus, seu  
flectentium  
posterior.

q 6 tab. 8.

r 6 tab. 7.

r 6 tab. 1.

s 6 tab. 4.

t 6 tab. 9.

u 13 fig.

c 10. 14. 15.

14.

x 8 tab. 1.

y 5, 12. N.

3, 13. d. 4. 4.

2, 12. 1. 6. 6.

1, 17. 7. P. 3.

R. 10. d. 11.

g. 12. Y.

7 8 tab. 12.

10. 17. 12.

z 4 tab. 6.

b. 11 tab. 11.

a 11 tab. 1.

b Ductio

in 8 tab. 25.

gulum ab

L ad M.

c 8 tab. 1.

M.

d 1 tab. 25.

*Primi & secundi musculi  
rati humeri*

tione inferitur, ea parte, qua articulum transcendit, montis speciem appositissimè repræsentans. Cæterum ut huius musculi ductus recto perficitur tramite, ita quoque prorsus rectas obtinet fibras, quemadmodum & primus, quem nomenclatione secundi musculi fibris instar X literæ aut decussatim incumbere, aut sim asserere. Et quantumvis accuratè horum musculorum functionè intueor, haud aliud colligo, quàm utrunque rectissimi cubiti flexionis autorem esse, siue ambos unà, siue seorsim singulos duntaxat cōtrahi demus. Et cur, quæso, Galeni dissectionis professorū principis gratia, quas nunquam conspiciamus, cubiti flexiones nos decet cōfingere? ut scilicet cubitum rectà primùm, & deinde in alterum latus inclinantè, flecti dicamus, ac dein utrisque simul musculis rectam flexionem, & insuper singulis priuatam ad latera flexionè tribuamus. quando interim Galenus sibi non constat, utri nam musculo, in internum latus, aut in externum, flexionis munus assignare debeat. Aliter enim lōgè in libris de Partium usu, quàm in libris de Administrandis confectionibus, de horum musculorum dignitate usque sentit. In his namque posteriorem musculum cubiti flexionis in exteriora inclinantis autorem esse censet: anteriorem uerò, flexum moliri tradit, introrsum uergentem. In illis autem, musculum anteriorem extrorsum magis, posteriorem uerò introrsum magis flectere, scriptum reliquit. Verum non ignoro, quum hæc perpendis, te cubiti flexionem sedulo moliri, atque quum digitos summo humero adducis, arbitrari rectam flexionem effici: quum uerò ad claviculam, pectorisque ossis summum, manum ducis, in internum latus flexionem fieri: dum autem uersus scapulam digitos agis, in externum latus inclinantè cubiti flexionem celebrari. Ac proinde, similiter ac ego quondam, Galeno nimium fidens, solebam, pulchrè colligis, ipsam rectissimè has flexionū species proposuisse: quantumvis etiam in enarranda musculorum functione, sibi in cōmemoratis modò libris haudquaquam consentiat. Cæterum paulo post secus autumabis, quando iam humeri quoque in scapulæ acetabulo motum unà expenderis. Conare igitur nudis alicunde ascias ossibus, quæ unà perspiciedo negotio adhibeas, ab omni circumductu tuæ ipsius brachium immotum seruare, atque tum demum stude in eodè brachij situ diuersam cubiti flexionè moliri: quam si tunc obseruaueris, tempus erit, fibrarum decussationem seu interfectionè, & diuersum cubiti flexionis opificum musculorum ductum cum Galeno (etiam si tale quid nihil sit) cōminisci. Porro quum præter rectissimam flexionè aliam nullam fieri conspicias, summi rerū Opificis solertiam encomio celebrabis, quod huic motui duos ualidissimos præfecerit musculos, quia illum ualidū, & ad plurima utilè homini futurū cognosceret, ne insuper alias in medium adferam rationes. Quæ modò de flexione dixi, de extensione quoque: proposita arbitrator: quam etsi uarijs modis experiri queas, nullo tamè melius cubitum ne tantillū quidem in latus agi animaduertes, quàm si exactè protèsum, uel pilo in alterū latus, quiescētè brachio, dimouere frustra conatus fueris. Inter cubitū itaque extendētes musculos, primus ualido latoque: & neruo prorsus principio, ex humiliori scapulæ costa nō procul ab eiusdè ceruice exoritur, peculiare illic, unde prodeat, sinū obtinēs. Principiū id paulo post exortū carne adaugetur, musculūque cōstituit, qui rectà deorsum ad internū latus posterioris sedis humeri fertur, illi nō nisi magno satis sub ceruicis ipsius intervallo firmiter adnatus. Iuxta infimā namque sedē insertionis<sup>a</sup> musculi brachiū ad dorsum uersus inferiora trahētis, iste cubitū mouens musculus primū humero cōnascitur: aut potius<sup>b</sup> alia ex humero inibi enata carnosus musculi pars ipsi cōmiscetur, qua musculus adauctus, deorsum rectà fertur, medio interni lateris humeri,

*Extendentium  
primus.*

<sup>a</sup> c. 11. tab. f.  
<sup>b</sup> c. 11. tab. T. 2.  
<sup>c</sup> p. 11. b. 4. u.  
<sup>d</sup> s. 6. f. 7.  
<sup>e</sup> N. 10. d.  
<sup>f</sup> i. h. cap.  
<sup>g</sup> i. lib. a. Q.

<sup>g</sup> i. tab. d.

<sup>h</sup> c.

<sup>i</sup> c. 11. tab. X.

<sup>j</sup> i. tab. d.

*Carnosa pars,  
qua primus ex  
tendentium as  
getur, quem se  
cundum consti  
tueret lect.*

*Lib. 2. de Ad  
ministrat. scilicet  
Tertius exten  
dentium.*

*Quomodo in ca  
nibus cubitum  
agentes muscu  
li habent.*

humeri, & medio posterioris sedis humeri tantisper adnatus, dum partim car  
neus, partim nerveus, amplissimè in internum latus<sup>i</sup> posterioris ulnæ proces  
sus inferatur, in descensu semper ab ea quam dixi humeri sede ad finem usque  
ipsius, humero adnatus, ac ex ipso principij robor assumens. Integrum itaq; est,  
in homine hunc musculum uniuersum, aut unum dicere, aut duos: ut<sup>h</sup> unus  
quidem à scapula enascatur,<sup>h</sup> alter autem ab humero, qui cum illo cõfunditur,  
cui scapula principium præbet. At Galeni nomine, illos duorum loco nunc re  
censeamus,<sup>h</sup> tertium extendentium enumerantes, qui extendentium à poste  
riori sede cervicis humeri nervosus<sup>m</sup> enascitur, & sensim rectà deorsum de  
scendens, & externam sedem posterioris humeri regionis occupans, carnosus  
euadit, & pertinacissimè humero adnatus, ab ipso principij sui uigorem mu  
tuatur.<sup>m</sup> Priusquam uerò medium longitudinis brachij superauit, duobus nu  
per dictis ita commiscetur, & cum ipsis adeò coit, ut nullo prorsus pacto in ho  
minibus ab illis ad insertionem usq; integer discerni queat, nihilq; aliud quàm  
unum ueluti corpus ex tribus musculis constitui uideatur. quâvis interim ter  
tius musculus, suum seruans incessum, ualidissimè in externum latus postero  
ris ulnæ<sup>p</sup> processus partim carneus, partim nerveus inferatur. Atque ita tribus  
his musculis mutuò coeuntibus, totus ille posterior ulnæ processus amplexa  
tur, in sui sedis inferiori parte,<sup>q</sup> cui innititur, nervosiores insertionis portio  
nem, quàm in lateribus, & superiùs, assumens. Mutuus enim ille musculorum  
concurfus, in posteriori sede admodum liuidus conspicitur, tanto nervosior  
euadens, quanto ulnæ processui propiùs accedit. Vt cunq; uerò inter se muscu  
li hi cõcurrant, nullus tamen ab initio inceptum fibrarum ductum deperdit:  
sed rectæ omnes deorsum, nusquam implexæ, neq; sese decussatim intersecan  
tes feruntur, & eandem omnes functionem obeunt, qua cubitum in neutrum  
latus inclinantem extendunt. Constat igitur, tres hos musculos unius loco re  
censeri posse, qui ex tribus conformatus esset principijs: aut duorum, si uideli  
cet primum & secundū unius loco habueris. At in caudatis simijs & canibus  
fieri id nequit. nam his animalibus, perinde ac equo, & boui, & alijs plerisque,  
quæ anterioribus cruribus innituntur, atq; in ingressu ualida cubiti extensione  
indigent, tres obtigerunt musculi, egregiè conspicui, præter unū gracillimum  
in caudatis simijs, à scapula ad ulnam porrectum, & penitus à Galeno præter  
missum. Quum interim canibus unicus tantum flexionis autor adsit, ut sanè si  
mij duo, illis prorsus similes, qui in homine uiſuntur: nisi quòd posterior nō  
nihil posterius ab humero in simijs procedit, & nervosior in ipsa insertione  
conspicitur, adeoq; Galeni in primo de Administrandis sectionibus libro histo  
riæ per omnia melius quàm hominum musculus conueniat. Cæterum cau  
datis simijs extendentium cubitum musculorum primus ex scapulæ humilio  
ri costâ, ut hominibus, oritur: sed duo principia mox inuicem coeuntia obti  
net: & deorsum tensus, carnosusq; admodum redditus, nulli connascitur mu  
sculo: sed paulo supra cubiti articulum extenuatus, nerveusq; factus, internæ  
sedi posterioris ulnæ processus inferitur. Secundus huic subiacet, & ubi homi  
ni secundus enasci dictus est, exoritur, toti humeri longitudini tantisper adna  
tus, quousq; ualida insertione mediæ & posticæ processus ulnæ sedi inferatur.  
Tertius, ut in hominibus, ab humeri ceruice principium ducit: inde carnosus  
euadens, & nulli musculo, præterquàm fibrosis nexibus, hærens, in exteriorem  
sedem posterioris ulnæ processus inplantatur. Atq; hi sunt musculi, quos post  
scriptos de Vſu partium libros Galenus diligenter secuit, & obscurè in libris de  
Administrandis sectionibus descripsit, etiam si interim prorsus nihil à prima  
editione

*i 1, 11, 12.  
cap 24 lib.  
2 D.*

*h 13 lib. 6.  
i 13 lib. d.*

*m 11 lib. 0.  
2 lib. O. 9  
S. 10 lib. 12  
V. 11 c.  
n 11 lib. d.*

*o 11 lib. 2  
2 lib. Q.*

*p 2 lib. B.*

*q 6 lib. cap.  
24 lib. 1  
triangularis  
in X, Y, Z  
conclusus.*



editione libris de Partium usu, ad musculorum cubitum mouentium historiam adiecisse uideatur, uti aliàs sepe lineas quasdam quo exemplari posteris asseruato immiscuit, quæ tanquam notæ illi fuerunt, quibus per ocium temporisq; rationem libros de Partium usu, perinde ac libros de Administrandis sectionibus, magis ueritati cõsonos reddidisset. Occurrunt uerò eiusmodi lineæ aut notæ, in musculorum, qui in manu & pede positi, primorum digitorum ossium flexioni præfunt, & in transuersorū ligamentorū in digitis, & in musculi in poplite latitantis leui & perfunctoria (sed seria tamen) mentione, & aliàs mehercule sæpius: quemadmodum faciliè constabit, meis in Galeni anatomica annotationibus, iam pridè non infœliciter cœptis, ac seorsum, aut cum Galeni libris, multo quàm antea emendatioribus, aliquando cudendis.

In Galeni anatomica annotationes.

## DE LIGAMENTIS, AB HVMERI CVM

scapula articulo ad extremam usq; digitorum aciem  
consistentibus. Caput XLVII.



**L**IGAMENTA in brachio, cubito & manu occurrunt, quædam omnium ferè ligamentorum differentiarum ac uluum occurrūt. Quæ in horum itaq; numero sint in uolucra, prius enarrauimus, quum singulis tendinibus per brachiale & uolam ad digitos reptantibus, obductas diximus membranas, mucore quodam imbutas, & ligamentorum ritu tendinibus circūdatas. Quæ uerò subditis corporibus munimēta, & ne ex ipsorū cavitatibus declinent, simul quoq; uincula censentur, transuersa sunt ligamēta, tendines in suis finibus, ne ab illis assurgāt, aut uagētur, cōtinentia. Horum uniuersæ propemodū interiori<sup>b</sup> sedi quatuor digitorum unū exporrigitur, & pollicis etiā secūdo & quasi tertio internodio unum eius generis expāditur: illis nimirū sedibus, quibus tendines digitos flectentes, ab illis ligamentis amplexantur, & ueluti anulis cōtinentur. In interna brachialis regione<sup>d</sup> unum cōspicitur, omnes digitorū tendines, qui hāc prorepunt, cōstringens, atq; hoc latū est, & ceteris omnibus huius generis robustius: sed interim neq; postbrachiali, neq; cubito commune. Ceterū ut in externis cubiti partibus, quā brachiali articulatur, sex trāsuersa ligamēta sese offerunt, quorum beneficio tendines in ossiū finibus referuātur. At hæc, si in superficie tantū spectētur, unicum esse uidebuntur, totius cubiti latitudini expansum: quod dissectū, sex spectādos offert anulos, transeuntibus tendinibus obductos. Vnde etiā id in sex ligamēta, perinde ac cæteri Anatomici, distinguimus: non sanè, quòd omnia ipsis cognita fuerint (nam Galenū ut minimū duo latuerunt) sed quòd ipsi hic tot ligamēta recensuerint, quot reperiēre anulos. Primum ex ulna in radiū procedit, & ad cōmunem ulnæ & radio<sup>e</sup> sinū refertur, at non<sup>h</sup> tēdinibus decimiseptimi digiti mouentiū musculi (ut Galenus arbitratur) obuoluitur: uerū illi peculiare est<sup>i</sup> musculo, quem paruum digitum extendere asseruimus, eum digitos mouentium decimomoctauū enumerantes. Secundum, ad externū primi ligamēti latus repositū, soli ulnæ, illiq; musculo propriū est, qui ante paruum digitum postbrachiali insertus, brachialis extensionis opifex censetur. Tertium, ad internum primi ligamenti latus habetur, soliq; radio propriū est, eos amplectens<sup>o</sup> tendines, qui indicis, medij & anularis extensionibus præfunt. Quartum, ad internum latus tertij positis, angustissimum efficit anulum: ut & tendo, quem transmittit, gracilis est, ille enim a<sup>a</sup> musculo procedit, qui indicem & mediū à pollice deberet

Ligamentorum in brachio, cubito & manu occurrentium, que in uolam ad digitos reptantibus, obductas habentur.

Ligamenta, anularia mouendi tendines continentia.

Lib. 1. de Anomaliis.

L abducere.

abducere. <sup>a</sup> Quintum bicorni<sup>a</sup> tendini, quo brachiale extenditur, & illi qui pollicem uersus indicem euerit, uiam largitur: quanquam interdum pollicis musculo priuatum quoq; ligamentum obducatur, adeò ut septem tunc ligamenta in externa cubiti sede reponantur. Alioquin enim<sup>a</sup> sextum<sup>a</sup> tres tendines transmittit: quorum unus brachialis ofsi ante pollicem, alter primo pollicis ofsi, tertius autem secundo & tertio inferitur. Sanè & hos tendines, quum hæc ligamēta ad amussim, magnaq; cura perpendimus, singuos sua ligamenta fortiri, non semel obseruauimus. Præter hæc ligamēta, per uniuersam cubiti longitudinem, omnibus musculis ualida<sup>a</sup> mēbrana obnascitur, musculos inuicem committens, atq; ne sua sede illi dimoueantur, aut inter sese implicentur, transuersi alicuius ligamēti ritu cōtinens: cuiusmodi etiam in tibia quandā haberi audies, omnibus illic repositis musculis eleganter obductā. Quum itaq; & huius mēbranæ ligamenti<sup>a</sup> ue naturā inter dissecandū ad amussim didiceris, id quoq; in transuersorū ligamentorū classē reponito: quanquā non laxē, sed pertinaciter musculis adnascitur, propriæ musculorū membranæ modo. Ligamenta quæ ossa inuicē colligant, in omnibus sunt articulis, nullam peculiarem naturam à cæteris articulos ambiētibus ligamenti ferē fortita.<sup>a</sup> Membraneis enim & articulum solum circundātibus ligamenti, digitorum ne cōtinentur internodia. Post brachiale etiam brachiali ualidis ligamenti per exteriora ductis colligatur. At post brachialis ossa, quā mutuo in ipsarum radice iuxta brachiale se spectant, cartilaginis naturam referētibus ligamenti inuicem committuntur, quæ non orbiculatim ossa tantū ambiunt, uerū & in ipsorū medio habentur, quā, uti diximus, ossa se inuicē respiciunt. Brachialis ossa ualidissimis ligamenti, cartilaginis naturam referentibus, simul unita hērent: atq; hæc ligamenta ipsis undiq; obducuntur, & quibusdam etiam sedibus illa intercedunt: idq; potissimū in illorum ofsiū interuallis, quæ in secundo reponūtur ordine, quibusq; post brachiale coarctatur. Quæ cubitum seu radium ulnamq; brachiali colligant, membraneis reliquorum articulorum ligamenti respondent. sed ab apice<sup>a</sup> processus stylium imitantis, ligamentum huius articuli durius efficitur, quasi hinc peculiare quodammodo teres in brachialis<sup>a</sup> os duce-retur, quod rectū est, & cæteris magis cartilaginofum, unīq; tantū ofsi commissum. Huic ligamento Galenus digniorē, quā ego assequor, usum tribuit. nam ad nullum mihi motum priuatim magis, quā uniuersum huius articuli ligamentum, famulari uidetur. Quinetiam ex apice radij appēdicis simile & insignius quoq; in brachiale fertur, quod liquidissimē eum usum, quem Gale-nus alteri ascribit ligamento, uanum esse comonstrat. Radius uerò & ulna, propter brachiale & cubiti cum humero articulum, ligamenti ualidis, in cir-cuitu ossa ambientibus, alligatur. At accuratissimē tibi in memoriam reuocanda uenit ea<sup>a</sup> cartilago, quā à radio procedētē ulnam à brachiali distinguere diximus, quæ ualidē etiam ulnæ ad radicē acuti illius processus, quasi ligamēti naturam nacta, inferitur. Per totam longitudinē, qua inuicē radius & ulna dehiscunt, ualidū & membraneū<sup>a</sup> ligamētū habetur, ab acutiori ulnæ<sup>a</sup> linea in radij quoq; lineam insertū. Hoc non simplex cōspicitur membrana, uerū (ut pleraq; ligamēta) ex fibris conflātū spectatur, à radio deorsum in ulnā obli-quē prorepātibus. Huius beneficio, præterquā quòd ipso ossa inuicē alligātur, interiores cubiti musculi ab exteriorib; dirimuntur, & ut antea monui, ex ipso<sup>a</sup> musculi etiam nōnulli suorum principiorū robur asciscūt: quemadmodū & ab inuolucris<sup>a</sup> tendinū tertiū quatuor digitorū os flectentiū musculi prodeūt graciles, & hos digitos pollicis adducētes. Radius humeri exteriori tuberi seu

*Mēbrana mus-culis obnata.*

*Ligamēta ossa inuicem com-mittentia.*

capiti

capiti ualidis, sed membraneis ligamentis, perinde ac cæteri articuli, alligatur. Et quamuis tutissimus sit ulnæ cum humero articulus, tamen robustis quoq; ligamentis Natura humerum ulnæ commisit, quæ similiter articulum in circuitu amplexantur. Præter hæc ligamina, in manu aut cubito nulla sunt: nisi & horum albo<sup>b</sup> ligamenta, quæ in musculorum constitutionē ingrediuntur, & proprias ipsorum membranas efformāt, reponere statueris: quæ interdum in tantam pertingunt crassitiem, ut quum musculi caro ipsis subfit, liuorem quandam musculis inducant. Atq; eiusmodi crassius ligamentum uentri obducitur<sup>c</sup> musculi, pollicem à cæteris digitis maximè abducens. Præter hunc, musculis anterior flectentium cubitum, uentrem quoque liuescentem, ob membranæ crassitiem adipiscitur: quemadmodū etiam illi (idq; admodum clarè) qui cubitum extendunt,<sup>d</sup> multo ante ipsorum insertionem, quam in ulnæ posteriore processum, moliuntur.

Ligamenta,  
musculorum  
constitutionem  
substantia.

ADMINISTRATIO MUSCULORVM ET LI-  
gamentorum brachium, cubitum & manum occupan-  
tium. Caput XLVIII.



VNC brachium id cum scapula depromendū est, quod ad musculorū cubitum, radiū, brachiale & digitos mouen-  
tium administrationem, quum thoracis aggredieris mu-  
sculos, aliquod relocandū præcepi. Priusquam uerò sectio-  
nem auspiceris, quot singulis partibus musculi reponātur,  
in memoriā reuoca. Vt autem id promptius facias, nunc  
omnes in cōpendium tibi digerā. In manu itaq; uiginti no-  
bis sunt enumerati:<sup>a</sup> decem nimirū, quibus prima quinque digitorū internodia  
flectuntur, quorū bini ad singulos referūtur digitos.<sup>b</sup> tres, quibus secundū pol-  
licis flectitur internodiū.<sup>c</sup> unus, pollicem maximè à reliquis digitis abducens.  
<sup>d</sup> unus, eundē proximè cæteris digitis admouens.<sup>e</sup> unus, qui minimū à cæteris  
ualidissimè in latum remouet. postremò<sup>f</sup> quatuor illi graciles musculi, quorum  
beneficio quatuor digiti ad pollicē laterali ductu aguntur. Internā cubiti se-  
dem octo musculi occupant: quorum<sup>g</sup> primus latum educit tendinē.<sup>h</sup> secund-  
us &<sup>i</sup> tertius, quibus brachiale flectitur.<sup>k</sup> quartus, secundum quatuor digito-  
rum flectens os.<sup>l</sup> quintus, qui tertiū quatuor digitorū os flectit.<sup>m</sup> sextus, qui ter-  
tij pollicis ossis flexus est autor.<sup>n</sup> septimus &<sup>o</sup> octauus, radiū in pronū ducunt.  
Si uerò musculū, tertium quatuor digitorum os flectentē, unum esse cum illo  
qui tertio pollicis ossi famulatur, putaueris, interna cubiti sedes septē tantū  
musculos habitura est. In externa cubiti regione decē descripsimus: quorum  
primus est<sup>p</sup> decimusseptimus digitorū mouentiū: secundus,<sup>q</sup> decimus octauus:  
tertius,<sup>r</sup> decimus nonus similiter digitorū agentīū. Deinde hic recensuimus<sup>s</sup> u-  
num, qui pollicem ad indicem magis euerit: alium, qui pollicē euerit, eun-  
dem ab indice magis remouet: alium illi proximū, ac ad brachialis extensio-  
nem aliquid accommodantem:<sup>t</sup> duos insignes, brachiale extendentes: &<sup>u</sup> duos,  
quorum ope radius in supinū ducitur. Si uerò<sup>v</sup> tertium principiū, quod ex ul-  
na nasci, & in duas carnosas partes diffundi diximus (quarum altera indicem  
præcipuè, & medium digitū, altera pollicē petebat) unus musculi uice enume-  
ratum esse uelis, hic reponetur nouem: deinde si<sup>w</sup> secundū principium inunx-  
eris,<sup>x</sup> uniusq; musculi loco habueris, octo erunt. nam bis unū, ubi nos duos con-  
stituimus, recenseris. In anteriori brachij sede,<sup>y</sup> duo flectentes cubitū sunt: in  
posteriori autem, aut<sup>z</sup> tres, aut duo, aut unus, extendētes, pro ratione nimirum

Quot musculi  
in manu.

In interna cu-  
biti sede.

In externa.

In brachio.



collectionis in pauciores, uel distributionis in plures: quam tuo arbitratu proponere nihil obstat, si modò accuratè illorum situm, connexum, amplitudinem, compositionem, functionem, & id genus alia secundo didiceris. Eo itaq; quod iam prius dixi, brachio in manus assumpto, cutè primùm cum adipe & membrana, quam carnosam uocare libuit, adimes: atq; id perfecteris commodissimè, si ab externa brachij sede, secundum radij ductum, & pollicis exteriora, sectionem duxeris, quæ cutem membranâq; carnosam simul diuidat. Dein ad cuiusq; digiti latus alia ducenda est sectio, quæ de pilè manus cutem ab exteriori dirimat, ut illa cum brachij & cubiti cute auelli queat, ea quæ internam manus sedem integit, adhuc relicta. Neq; in cute adimenda nunc alio indiges artificio, quàm quo lanij boues exoriant. Quum tamen ad brachialis radicem, in interna manus fede peruentum fuerit, trāsuerſa sectione cutem nunc liberatam, ab illa quæ in uola adhuc reliqua est, reſecabis. hæc namque lateſcentis tendinis nomine aſſeruanda uenit. Priuſquam uerò tendinem illum aggregariſ, accuratè perpendito, totam cubiti ſedem, paulo minus toto liueſcentem, ob membranam, quæ muſculis proximè adnata, illos inuicem committit, neque ſua ſede declinent, amplectitur. In conſpectum enim cubitum occurrentes muſculi iam ueniunt, ſed ita commiſi, ut ſolùm lineas, quæ ipſos dirimant, intuearis: qui tamen mutuò prorſus diſiuncti apparebunt, ſi leues duntaxat ſectiones ſecundùm dictas modò lineas duxeris. Huius uerò membranæ naturam eo obſeruabis diligentius, quo magis perfunctoriè, imò nihil prorſus Anatomici illius meminerint. Cæterùm ut lateſcentem uideas tendinem, animum accòmoda cubiti internæ ſedi, in cuius longitudine ipſius muſculus, & tendo, quum adhuc graciſ ſeſt, exporrigitur. Culſello itaq; à brachialis radice ſectionem leuem, ad tendinis, ſuiq; muſculi latus utriq; uerſus internum humeri tuber molieris, & poſtmodù iuxta brachiale tendinem à ſubditis organiſ liberabis: & culſello tranſuerſim ipſi ſubiecto, & ſiniſtræ manus digitiſ tendine eleuato, uniuerſum muſculum ad ipſius uſque caput à còmiſiſ ipliſ muſculiſ ſeparabis. Deinceps acutiori nouacula cutem manus adhuc reliquam à uola & digitiſ abſecare conator, à brachiali ſectioneſ ſemper tranſuerſas molitus, eadem omnino ratione, qua cutem à carne membranà diuidere iam dudum aſſueuiſti. Quemadmodum enim in illa ſectione membranà corpori aſſixam ſeruas, ita quoq; tendinem dilateſcentè manui iam hæreſe ſiniſ. Quum uerò id tentas, duriuſculus ſeſe offeret adeps, cutem & tendinè illum intercedèſ: qui tanto accuratiùſ quoq; animaduertèduſ eſt, quanto tendinem magiſ à cute dirimit, & tendinè non toti cuti proximè adnatum, ſed duntaxat fibroſiſ nexibuſ, membranæ carnoſæ modo, & ſuimet ipſiſ interuentuſ perti naciffimè còmiſſum oſtendit. Examinaſa cute, muſculi caput ab humero liberatum, à brachiali pendèſe ſineſ, lateſcentè tendinem à ſubditis quoq; aut nouacula, aut paruo & acutiori culſello auulſuſ. Si uerò aliquando uiſum fuerit, licebit tendinem, priuſquam cutem ſeparas, unà cum cute adimere. at tunc arduum erit, tendinem à cute integrum liberare: quamuiſ non adeò, ut Gale-nuſ arbitratuſ eſt, nihil medium inter cutem & tendinem recenſeſ. Porro ſi hic muſculus ſe in interna cubiti ſede non offerat, duorumq; muſculorum, qui brachiale ſectunt, capitibuſ, ad interiuſ humeri tuber, nullum muſculum incumbere uideriſ, præſentem muſculù, à quo lateſcens educitur tendo, deeſſe conijcto: quod ſanè non infrequèter tibi occuſuſ ſcio. Non quòd negligètia illò præterituſ ſiſ, uerùm quòd prorſuſ deerit, eiſ uicè tunc ſupplèſe inferiori, interdù etiã ſuperiori brachiale ſectentiù muſculo, aut tranſuerſiſ brachiali

brachiali ligamenti portione, quam pari modo, ut latum tendinem, indagabis. Iam itaq; omnia cute libera sunt: unde etiam & quosdam manus musculos citra aliam sectionem aggredi possis, eum uidelicet, qui pollicem à reliquis digitis remotissimè abducit, & deinde<sup>m</sup> duos primum ipsius internodium flectentes, &<sup>p</sup> musculum, cuius beneficio paruus digitus à reliquis abducitur, & exte-  
 riorem primum eius digiti os flectentium. At opportuniùs feceris, si, donec omnes manus musculos unà adimere queas, hos seruaueris, ad internamq; cubiti sedem te rursus contuleris, in qua nunc administrandi ueniunt<sup>n</sup> duo brachiale flectentes, quos primum ab ipsorum tendinibus, iuxta brachialis radicem commodè aggredieris. Si enim hos à subditis musculis aliquantisper auulsos eleuaueris, ac deinde transuersis sectionibus illos ad internum usq; humeri tuber à subditis liberaueris, uniuersam ipsorum ferè naturam mediocri negotio spectabis. Inferioris namq; capite absceto, & musculo dein ab ulna liberato, ut is duntaxat ab insertione dependat, ipsum, ut uisum fuerit, illinc aut adimes, aut adhuc appensum fines. Superioris autem tendo à brachiali non est abscendus: uerùm aut musculus suo liberatus capite, in latus est reponendus, aut<sup>t</sup> tendo nonnihil ante brachiale uenit refecandus, ut in sectionis serie, eius tendinis insertio reddatur conspicua. Ceterum nunc<sup>r</sup> primus digitos mouentium sese totus offert, quem uel solis digitis à subito dirimes: quemadmodum etiam omnes, quorum latera non committit neruosa illa membrana, quæ communis ligamèti munere fungitur. Vbi itaq; ipsius capite adhuc ad exortum commisso, quatuor ipsius ante brachiale carnosas portiones inspexeris, ualidus cultellus in transuersum brachialis<sup>s</sup> ligamentū rectè est iniiciendus, ut huius acie antrorsum ducta, id ligamentū diuidatur. Dein eadem ratione secundum indicis longitudinè, transuersum internæ ipsius sedis ligamentum diuides, mentem accommodans, ne hac prorepentes tendines ledas: quod optimè caueries, dummodo cultelli dorsum semper tēdines respiciat, ipseq; cultellus rectus sit. Eandem sectionem in tribus reliquis digitis moliri in præsentia posses, nisi sensim magis magisq; horum ligamentorum naturam aut discere, aut alijs ostendere proposuisset. In indice itaq; duntaxat, aut alio quouis digito hac ducta sectione, primi musculi digitos mouentium caput liberato: & illo apprehenso, & ad te sursum tracto, musculū ex brachialis sinu tantisper reponito, quousq; quatuor ipsius tendines ad quatuor digitos porrigi conspexeris, & deinde priuatim illius tendinis insertionē obseruaueris, qui indici exporrigitur. Hac enim inspecta, & musculo rursus in suam sedem reposito, eius caput trahendum uenit, ut ipsius innotescat munus, intuearisq; , qua ratione primo indicis articulo in flexu secundi, tendo ille adniti nolit: uti sanè reliqui transuersis adhuc ligamentis inuoluti tendines, suis quibus accumbunt ossibus innituntur, proximeq; attenditur. Nunc ligamentis trium reliquorum digitorum, ac cuiusq; tendinis insertionē & perforatione, qua subditum trāsmittit<sup>r</sup> tendinem, notatis, musculum à manu in anteriora reflexum mensæ exporriges: aut si in sinu manum habueris, propendere à digitis fines, eumq; qui tertium quatuor digitorum internodium flectit, suo capite liberabis, quod nonnihil occultatur sub<sup>r</sup> musculo, superiorem radij partem in prouum ducete. Priusquam tamen id ab ulna abradas, conducet ex brachialis sinu quatuor ipsius tendines attollere, & animū adhibere, qui citra omnem operam musculus hos tendines produ-  
 cens, ab illo diuellatur, qui ipsius superiori lateri accumbens, tertij pollicis ossis flexionis autor habetur, adeò ut utrunque musculi unius loco in homine habere nequeas. Liberato itaq; secundi musculi capite, & ipsius quoq; exortu,

*Primi & secundi brachiale mouentium.*

*Primi digitos mouentium.*

*Secundi.*

quem ab ulnæ<sup>a</sup> ligamento affumit (quod inter radium & ulnam, ubi inuicem hæc ossa dehiscunt, obuuium est) uniuersum musculū ex brachialis sinu repones, eius musculosam perpendens membranā, & tendinum ipsius feriem. Cauendum tamen est, ne quum eos attollere studes, gracilem<sup>b</sup> musculū, singulis tendinibus exporrectum, uiolens: is enim, quum tendini committitur, atq; etiam primo digiti osi (eius ad pollicē adductioni subseruiens) implantatur, ad tertium usq; articulum secundi musculi tendinem oscitanter eleuare prohibet.

Quum itaq; hos tendines<sup>c</sup> primi musculi tendinibus traijci, atq; in tertium os inferi uideris, utrunq; musculū in suum locum reponito, examinaturus, num secundi musculi tēdines primum digitorū os flectant soli, aut simul cum ipsis primi musculi tendines, & eius generis reliqua, quæ in horum musculorū functionis enarratione proposuimus. Primo nunc musculo à digitis resecto, ac suis, si quæ habet, sesaminis ossiculis aliquantulum obseruatis, secundum in brachialis sinu transuersum diuides, ut ipsius tendines adhuc in uola reseruentur, illorum gracilium musculorū causa, qui quatuor digitos pollicis adducunt. Mo-

*Tertij digiti  
mouentis ad-  
ministratio.*

dō<sup>d</sup> tertium musculū, pollicis subseruientē, à radio liberabis, & ad tertium pollicis internodiū duces, ipsius tamen transuerso ligamēto, ut in reliquis digitis, prius diuiso. Hunc ubi abstuleris, ac ipsius sesaminum ossiculū animaduertaris, musculi brachiale flectentiū superioris insertionē speculabere, quam in radice postbrachialis<sup>e</sup> ossis indicē sustinentis molitur. Atq; nunc tibi in inter-nu cubiti sede adhuc<sup>f</sup> duo tantum musculi super sunt, radium uidelicet in pronum mouentes: qui quum citra aliam operam cōspicui sint, donec & horum

*Transuersū  
ligamentorum  
in externa cu-  
biti sede.*

oppositos uideas, opportuniū seruabuntur. In præsentī itaq; ad externam cubiti sedem accedas, in ea primum obseruaturus<sup>g</sup> transuersa ligamenta, quæ ac si unum essent, sese offerent. Verū dum tendinibus, quos ligamenta continent, mentem accommodabis, ac seorsum unumquodq; ut in interna digitorum sede præcepimus, dissecueris, ut minimum sex numero occurrent, quæ, antequam musculos separe, diuidere possis, nisi prius in cubito cuiusq; musculi tendinem separare statueres. At commodiū erit, aut simul omnia ante musculos, aut priuatim unumquodq; saltem ante suum, quem transmittit, musculum aggredi. Primus autem esse potest, qui postbrachiali ante paruū digitum

*Tertij brachia-  
le mouentium.*

insertus, id extendit, cuius tendo ex suo<sup>h</sup> sinu eleuabitur: & deinde acuto cultello, aut nouacula, totus musculus ab ulna liberabitur, accuratē interim ab illo, qui superiori ipsius lateri committitur, quiq; parui digiti extensioni potissimum famulatur, diuisus. Vbi itaq; huius caput ab externo humeri tubere dissecueris, illum postmodū à postbrachiali liberabis: nisi appensum ipsi asseruare lubeat, quo tandem brachiale extendentiū & flectentiū musculorū munus

*Decimū septi-  
mū 17 digiti  
mouentium.*

conspicari ualeas. Post hunc<sup>i</sup> is ex suo<sup>j</sup> sinu & ligamēto attolletur, quem decimum octauū enumerauimus, paruūq; digiti extensionis autorē statuimus, cuius tendo ad digitos ducendus non est, nisi ab externo humeri tubere is, cum subsequēti iam in enarratione musculo (qui digitos mouentiū decimus septimus numerabatur) liberatus fuerit. Illum autem diligēter ex suo, quem nos ipsi tribuimus<sup>k</sup>, sinu attolles: atq; ab illis, qui superiori ipsius lateri exporrigūtur, musculis, diuulsū, ab humero quoq; resecabis, nunc sedulo animaduertēs, num in tres aut quatuor ducatur tēdines, & quibus nam digitis illi inserātur, quæq; ipsorum ad digitorū radices sit cōmixtio. Idem in illo qui paruū digiti præcipuē extēdit, molieris, neutrum ab ipsis digitis absecās, nisi & modo<sup>l</sup> subsequen-

*Decimū noni  
administratio.*

tem ad insertionē usq; deduxeris. Occurrēt enim nunc tria illa, quæ ulna producit, musculorū principia: quorum infimum & brachiali proximum, obseruandum

*a 7 tab. v  
inter s, t.*

*b 6 tab. i  
f 7 tab. d.*

*c 6 tab. i  
transmittit  
tēdines z.*

*d 6 tab. a.*

*e 3 tab. a.  
f 3 fig. cap.  
35 lib. a. i.  
g 7 tab. q.  
x.*

*h 2 tab. d.  
i 10 tab. a.  
k 2 fig. cap.  
24 lib. a. v.  
l 9 tab. q.  
2 tab. x.*

*i 9 tab. a.  
2 tab. y.  
k 2 fig. cap.  
24 lib. a. v.  
l 9 tab. q.  
2 tab. x.*

*m 3 fig. cap.  
24 lib. a. d  
sinu. h. p.  
mentem ad  
tem 2 tab.  
charact. a.  
n 9 tab. z.  
2 tab. v.  
o 2 fig. cap.  
24 lib. a. v.  
2 tab. d.  
p 10 tab. p.  
A. z. n.*



uandum uenit, à quo musculus pronascitur, qui indicem & medium à pollice abducit. Huius itaq; principij portione, quæ illum musculū constituit, ab ulna diuides: & ex suo peculiari sinu & ligamēto eleuatam, sensumq; à brachiali & postbrachiali, quibus fibroso nexu hæret, liberatā, ad digitos usq; deduces, adamsim nunc trium illorum musculorū tendines & insertionē perpendens, quæ multo accuratiùs se offeret, quàm ego illam (quum uaria sit) describere possim. Cæterum illis à quatuor digitorū internodijs ad unguis usq; radicem resectis, qui pollicē euertunt, aggredieris. Ab ulna itaq; reliqua tertij principij parte resecta, musculus pollicē uersus indicē euertens, ad ipsius insertionē ducetur: similiter<sup>1</sup> secūdi principij musculi, qui bicornē transcendūt tendinē, ad pollicē & brachiale usq; auellētur, atq; unā cum reliquis à digitis reijciētur.

\* Qui bicorni tendine brachiale extēdit musculus, modò prorsus est cōspiciuus, nisi quod nōnihil sub<sup>2</sup> musculo longiori radiū in supinum mouentiū occultatur. Hic itaq; suo exortu liberatus, ad postbrachiale ducetur: & ipsius examinata functionē, etiā cum ceteris abijci poterit. Super sunt adhuc in externa cubiti sede, duo radiū in supinū agentes, qui citra sectionē etiam, ut & interiores radij duces, occurrūt, longissimi, tantū<sup>3</sup> capite excepto, quod penitiùs nōnihil inter<sup>4</sup> posteriorē cubitum flectentiū musculum, & extendentiū<sup>5</sup> exteriorem latitat, non tamen aded impēse, ut non liceat ipsius capite ab humero resecto, illum ad insertionē usq; cum reliquis radium mouentibus perducere. Si itaq; nunc<sup>6</sup> ligamentū in cubiti longitudine inter ossa obuium animaduertueris, repositos in manu musculos ordine aggredi tempestiuū fuerit: ex quibus<sup>7</sup> quatuor statim graciles euadunt cōspicui, quos Natura<sup>8</sup> tendinibus tertium quatuor digitorū os flectētibus exporrexit. Deinceps<sup>9</sup> ille liberatur, qui pollicē ab indice maximē remouet, mox<sup>10</sup> duo primū pollicis internodiū flectentes. Deinde<sup>11</sup> tres secundū pollicis os flectentes: quos eo diligētius obseruare oportet, quo magis antehac dissectionum professoribus fuerunt in cogniti, quodq; illorum tendinibus præcipua manus sesamina<sup>12</sup> ossicula sint innata. Hos subsequetur<sup>13</sup> qui pollicem indici proximē accōmodat, dein<sup>14</sup> qui paruum ualidissimē abducit: ut tantū<sup>15</sup> octo adhuc sint reliqui, quorum ope prima quatuor digitorum intermodia flectimus, quorumq; tendinibus exigua innascuntur<sup>16</sup> ossicula, quæ sesamo comparamus, quæq; hic in primis sunt perscrutanda. Cæterum nunc digitorum articulos diuidens, ipsorum ligamentorū naturam, eorundemq; speciem perquires: ac brachialis postbrachialisq; nexibus haud neglectis, longē diligētissimē brachialis ad cubitū articulo animum accōmodabis: quod hic<sup>17</sup> cartilago examināda ueniat, ulnam à brachiali dirimēs. Qui etiam perpende, obsecro, stylum imitantē processum, non procerius extra sinū, quo brachiale excipitur, prominere, quàm radij appendicis<sup>18</sup> mucronem. Dein expendito, parem ligamenti huius articuli in utroq; latere<sup>19</sup> formam esse, ut unā mecum omnibus quoq; similem usum ascribas: ne fortē quum Naturam celebrare instituis, illi inartificiosissimam constructionem cum Galeno imponas, Reiecta nunc manu<sup>20</sup>, priorem cubitum flectentium musculum suis principijs liberato, quorum exterius ex suo sinu eleuandum est: &<sup>21</sup> ligamento articuli humeri, ipsū continentē, resecta sectione dissecto, id à scapulæ collo adimetur.<sup>22</sup> Interius ualido quoq; cultello ab interiori scapulæ processu diuidetur: & utroq; principio deorsum reflexo, huius musculi<sup>23</sup> carnosa insertio in os humeri animaduertetur: qua dissecta ad radium usq; sola manu à subdito musculo iste prior auellatur. Vbi uerò huius insertionem in tuitus fueris, is<sup>24</sup> appensus seruabitur, & posterior ab humero derafus, ad ipsius quoque insertionem

21, 22. digitorū mouentium, & deinceps qui in illorum descriptione 23 numeratur.

Quartū brachiale mouentium.

Radiū mouentium administratio.

Musculorum manuum occurrentium.


Ligamentorum reliquorum administratio.

Cubiti mouentium administratio.

ducetur. Posteriorum, seu cubitum extendentium, illum primū ab humero derades, quem tertium nominauimus. dein<sup>d</sup> primus à scapula absecabitur: ut illo postmodum deorsum tracto, secundum animaduertas ipsi innatum, ac sub illo ab humero prodeuntem. Quando itaq; hi ad insertionem producti sunt, neque ullam fibrarum interfectionem animaduertes, cubiti articulum subinde flectito & reflectito, examinaturus, num uel tantillum quidem extra rectum tramitem dimoueri queat. quod quum in articulo solis ligamentis herenti, & iam propemodum luxato, obseruas, quid fieri in nobis arbitrabere, articulo tot musculis adhuc uestito? Vt tamen hæc omnia exactius rimeris, ossa inuicem seiungenda sunt, non solum humeri cum ulna articuli gratia, uerum & radij cum humero, & radij rursus cum ulna. Præter hoc enim, quod nihil utilius sese inspicendū in tota resectione, luxationum gratia offert, nulla profectò eiusmodi articularum inspectione, in uniuersa Anatome mihi iucundior occurrit speculatio.

DE MUSCULIS PENI PECVLIA-  
ribus. Caput XLIX.

QUADRAGESIMINONI CAPITIS TAB-  
ULA, QUATTOR FIG-  
uræ comprehensa.



QUADRAGESIMINONI CAPITIS TAB-  
ula, eiusdemq; figurarum & characterum Index.

Hæc quadragesiminoni Capituli tabula, quatuor complectens figuras, numero insignitas, non huc tantum Capiti, uerum etiam & alijs plerisq; utilis erit. Ne uero dein pluribus præfigenda sit Capituli, hic omnes suarum notarum indices sum explicaturus.

- 1 Prima figura, corporis in mensa proni femora ostendit, in latera admodum distensa, & penis corpus, uniuersa interim (scito cum testibus, cute, adipe, uenis, neruis & arterijs undiq; abscissa.
- 2 Secunda figura, nuda quodammodo commonstrat ossa, quae sacri ossis lateribus committuntur, quibusq; hic femorum ossium portiones adhuc appendent, una cum am & penis musculis, quos ab ipso exortu dependere finximus, ut penis corporum origo, urinaq; & semini communis meatus inibi in conspectu esset, quae sursum sub pubis ossibus flectitur.
- 3 Tertia, penem transversim dissectum in hoc ostendit, ut penis corporum substantia, & eorundem cum urinae meatu connexus oculis subicerentur.
- 4 Quarta figura integrum commonstrat penem, una cum uesica hic exporrectum, ut proprius uesicae cervicis musculus aliquo pacto intueri possit.

A, B 1, 2, 3, 4 Duo corpora, penem quodammodo uniuersum constituentia.

C, C 2, 4 Duorum penis corporum exortus.

D 1, 2, 3, 4 Penis glans.

E, E 3 Fungo sarubraq; penis corporum substantia.

F 3 Mutuus penis corporum connexus, & neruea eorundem substantia, quae orbiculatim fungosam substantiam completitur.

G 1, 2, 3, 4 Uesicae meatus, urinae seminiq; genitali communis.

H, I 1, 2 Duo primi penis musculi, in prima quidem figura suam seruantes sedem, in secunda autem ab eorundem principio dependentes.

K, L 1, 2 Tertius & quartus penis musculi, qui in prima figura integri, in secunda uero ab insertione pendentes conspiciuntur.

M 1, 2 Musculus orbiculatim recti intestini finem ambiens, faciemq; excretioni praefectus.

N 4 Uesicae cervicis musculus, urinam, ne prae ter nostrum arbitrium defluat, cohibens.

O, O 2 Membrana, pubis ossium foramina occupans.

P 2 Teres ligamentum, a coxendicis osse in rotundum femoris caput insertum.

Q 4 Uesicae corpus.

R 4 Glandosum corpus, uasorum semen à testibus deferentium in sectionem excipiens.

S, S 4 Portiuncula meatuum, quibus urina & renibus in uesicam ducitur.

T, T 4 Portiuncula meatuum, semen in uesicae cervicem ei aculantium. Musculos autem in prima figura femur amplexantes, characteribus non insignimus, quod illi in musculorum tabulis diligentissime annotati fuerint.



T S I penis constructionis enarratio in quintum librum, ubi generationis organa commemorabuntur, opportune referuanda uenit, nihilominus tantam huius mentionem modò facere expedit, quanta ad musculorum penis descriptionem ex usu est. Penem itaq; praeter cutem, qua inuoluitur, duo grandia & neruea, & intus spongiae modo caua efformant corpora: quorum dextrum à pubis ossis dextri

penis constructio.

sedē enascitur, paulo inferius quam ubi inuicem pubis ossa dehiscente incipiūt. Hoc uersus sinistrum latus modicè exporrectum, cum sinistro coit corpore, à pubis osse sinistro principium ducente. His corporibus praecipua penis consistat moles. atque haec corpora ad inferiorem ipsorum sedem, qua coeunt, uesicae meatum sibi toto ipsorum ductu ad glandis usque radicem subnatum obtinent, ubi meatum hunc urinae seminiq; communem, corpora illa in unum penitus corpus confusa amplexantur, quemadmodum quinto libro auditurus es prolixius: ad quatuor enim penis musculorum descriptionem, modò dicta abundè sufficiunt. Ab anteriori itaq; anularis musculi sede, quem recto intestino, ut excrementorum praestit egestionem, obnatum esse docebimus, duo carni enascuntur musculi, illis prorsus similes, qui à pectoris osse ad os uerrens porriguntur. Ambo enim inuicem proximi sunt, & internis lateribus mutuo committuntur: rectaq; sursum in priora, ad urinarum corporibus illis ad superiora reflexum ascendentes, eius meatus lateribus inseruntur: & inuicem dirempti, corpora penis nonnihil digitorum modo amplexantur.

Primi duo penis musculi.

Alij

a 10. fig. lib. 5. r.  
b praef. n. l. cap. fig. rarit. A, B.  
c 3. fig. E. E.  
d 2. fig. cap.  
e 10. lib. 1. q. uerit. hic  
f 4. fig. C.  
g exortus notatur.  
h 1, 2, 3, 4. fig. G.  
i 1, 2, 3, 4. fig. D.  
j 1, 2. fig. M.  
k 1, 2. fig. H. I.  
l 4. tab. S. T.  
m 1, 2. fig. G.



*Terius &  
quarta.*

*Musculorum  
officium.*

<sup>1</sup> Alij duo utrinq; habentur singuli, ab<sup>m</sup> appendice oſis coxendicis, paulo inferius quàm penis corpora, principium ducentes: quod carneum, ac gracile, sursum obliquè procedentem efficit musculum, qui carnosus semper permanēs, sui lateris corpori non procul ab exortu inferitur. Quatuor his musculis penis radix uoluntario impetu trahitur, hinc & erectionis tentiginis<sup>ue</sup> quandam uim, præter naturalem facultatē ipsi insitam, obtinens. Quamquam duo priores musculi in urinæ feminisq; excretionibus, communem illum urinæ feminisq; meatum ueluti digiti quidam aperire uideātur, ne meatus in obliquo hoc inflexu restrictus, eiufmodi humorum expulsionē prohiberet, & potissimum feminis, cuius eiaculationē (etsi urina multo crassius sit) Natura impetu perfici uoluit. Nisi enim fortē hi musculi inferiorem meatus sedem in hoc reflexu deorsum uellerent, in penis tentigine totus meatus occluderetur, quod ipsius superior pars à distentis corporibus adeò pertinaciter huc illuc alliceretur.

*ADMINI-  
stratio.*

Porro ut musculos hos commodè aggrediaris, reliqua cadaueris pars, quæ adhuc ex quadagesimo Capite superest, refumetur: ac distentis quàm maximè possis fenoribus, orbicularem sectionem in ani ambitu duces, qua cutem ad adipem usq; (quem hic habes copiosissimum, maximeq; humidum) diuidas. Deinde longam sectionē per futuram, in penis inferiori sede ac scorto conspicuam, in cute per perinæum (quod interfemineum alij uocant) molieris, quæ ad anteriorem usq; orbicularis lineæ sedem pertingat. Postmodum cutem hamulis aut digitis eleuatam, hinc inde à subditis organis nouacula diuelles: & musculos, qui sese absecta cute offerunt, paruo cultello à suis exortibus liberatos, ad insertionē usq; perduces, non per transfennam singulos seorsum expendens, cum calculorum eruendorum gratia, tum fistularum ulcerumq; nomine, hac sede non infrequenter homines infestantium. Deinde eo obseruandi sunt quoq; exactius, quo minus aliquid à Galeno de his proditum habemus. Quandoquidem locus, in quo illos in opere de Administrandis sectionibus profecutus est, unā cum quinque & dimidio eius operis libris, incuria temporum intercidit, simul cum ipsius de Musculis peculiari libro. Quantum uerò ex libris de Partium usu augurari possumus, uidetur hoc Capite à me descripsi<sup>m</sup> musculi parum à Galeno fuisse animaduersi, quum in ibi nullos ad penem referat, quàm duos, secundum<sup>m</sup> meatus urinarij longitudinem per totum penem digestos, & à me haftenus (quod lubens fateor) non repertos. Ut modò taceam, Galenum penis<sup>o</sup> corporum originem non rectè assēcutū esse, quum is unum duntaxat, idq; prorsus cauum, & nullo humore intus imbutum proponens corpus, illud ex superioribus pubis oſiū sedibus pronasci<sup>a</sup> doceat non expendens, penis præcipuam molem inferius multo, quàm humillima pubis oſium<sup>m</sup> cōmissuræ consistit sedes, enasci, penemq; mox<sup>m</sup> ad anum & per scorti regionem æquè crassum corpulentumq; esse, atq; ea parte, quæ à superiori pubis oſium sede propēdet, aut erigitur. adeò, ut quum penis origo Galenum lareret, neque is fecus quàm Anatomes imperitus aliquis de illa senferit, uerisimile sit, ipsum quoq; eos non aggressum esse musculos, qui peni non multo ultra ipsius initium exporriguntur.

*Lib. 15 de Partium  
usu.*

H 1, 2 fig.  
K, L.  
M 1, 2 fig.  
N 1, 2 fig.  
O 1, 2 fig.  
P 1, 2 fig.  
A, B, C.  
D, E.  
F, G.  
H, I.  
K, L.  
M, N.  
O, P.  
Q, R.  
S, T.  
U, V.  
W, X.  
Y, Z.

## DE CERVICIS VESICAE MUSCULO.

### Caput I.

*H v i r s* musculi effigiem in uiris quarta figura tabulae precedenti Capiti præposita demonstrat, N<sup>o</sup> li-  
tera notatam: quemadmodum & uigesima secunda & uigesima tertia figura libri quinti, ad characterem g.  
Nuclebris uerò uesicæ musculum proponit uigesima quinta & libri quinti figura g.

A D

a 4 ff. cap.  
49 Q.  
b eiusdem  
fig. R.  
c eiusdem  
fig. M.  
d inter M.  
e G. & fig.  
cap. 49.



e 25 ff. lib.  
f eiusdem  
fig. A.  
g eiusdem  
fig. 7.  
h 17 ff. lib.  
i L.

i 3 tab. B.  
4 tab. P. 5  
Δ. 6 Δ.  
h 7 tab. Δ.

D uirilis<sup>a</sup> uesicæ finem, ubi in collum ceruicem<sup>b</sup> ue terminatur<sup>c</sup>, glandosum quoddam corpus ipsi obnasci, quintus liber declarabit. Musculus autem iam nobis propositus, inter glandosum id corpus &<sup>d</sup> reflexum præcipue consistit, quem uesicæ ceruicem<sup>e</sup>, posteaquam modicè descendit, sursum ducta, sub pubis osse primùm molitur. Musculus enim totam hanc meatus sedē ambit, orbicularis, & oblongi anuli, aut oblongi rotundiq; meatus effigiem exprimens, ac fibris transuerſim circularibus intertextus, & superiùs iuxta glandosum corpus, quàm inferioriùs, crassior. In mulieribus uerò, quarum<sup>f</sup> uesicæ<sup>g</sup> ceruici eiusmodi corpus glandosum non adnascitur<sup>h</sup>, musculus totum meatū ambit, qui à uesicæ corpore in superiorem sedem colli uteri, non procul à pudendo<sup>i</sup> subingreditur.

Virilis uesicæ  
musculus.

Mulieris.

Musculi usus.

Musculus iste in mulieribus & uiribus parēni præstat usum, in hocq; primariò à Natura cōditus est, ut meatui uesicæ præficiatur, obstaculo futurus, ne transuerſæ uesicæ fibræ motu suo naturali urinā, quoties aut copia, aut praua qualitate illi molesta esset, præter nostram uoluntatem, illa mox profluat. Operæ precium enim fuit, egerendis ex corpore recrementis motus præesse uoluntarios. si casu enim naturali duntaxat motui excrementorum propulsio committeretur, cōtinuò recrementa emanarent: quod non duntaxat fœdissimi mum esset, uerùm insuper plurimis munijs, quæ tota uita obimus, insignes noxas inferret. Quo minus igitur urina non nostro arbitratu profluat, Natura meatui uesicæ hunc musculum circundedit, instarq; fidi ianitoris præfecit, qui sese colligere ac stringere posset, quum pressam alioquin à uesicæ, & abdominis musculis, &<sup>k</sup> septo transuerſo, urinam emittere nolumus: quiq; etiam cum communi musculorum ratione sese non contrahit, sed media sua (ut sic dicam) habetur figura, pressæ à superioribus corporibus urinæ cedit, seque extra figuram illam & habitum ab ea educi laxariq; patitur. Quum uerò supernarum partium cessat compressio, ipsa ue urina uniuersa effluxit, musculus sese colligens & constringens, quicquid ex urina reliquum meatui adhuc inhæret, protrudit. Relinquantur autem tres quatuor ue guttulæ, quæ emissâ continuo fluxu, & patente prorsus meatu urina, promanare solent. Atque is urinæ, quæ meatui adhuc fortè inhæreret, aut sensum tantum promanaret, compressus, alter præsentis musculi usus habetur. Quòd uerò ad excretionis promptitudinem uelocitatemq; quicquam (ut Galenus asserit) alioquin auxilietur, quodq; is præcipuus ipsius sit usus, satis assequi nequeo. Quanto enim magis remittitur, suamq; comprimendi uim impensius laxat, seseq; non secus ac quiescentes, & ab alijs oppositis producti musculi, educi dilatariq; permittit: tanto liberiore reddidit meatum, qui apertus & amplus, maiorem urinæ à superioribus sedibus pressæ copiam transmittit, quàm si musculus non prorsus laxatus, solutus ue, non nihil suas fibras, ad expulsionem fluente urina, intenderet: ac nescio qua ratione per uniuersum egerendi tempus, musculorū munere, quod cōtractione fit, fungeretur, meatum angustiore necessariò reddens, scelericioremq; aut crassiores urinæ excretionem uitians: quicquid hic tandem de urinæ acrimonia, prauaq; qualitate, laxiorem alioquin & magis solutum musculū requirentibus, comminiscemur. Cæterùm quòd ad urinæ retentionem, præter hunc musculum, meatus longitudinem & circumactum cōducere Galenus attestatur, in uiris fortassis locum habebit, nam muliercularum<sup>l</sup> meatus breuis omnino est, rectaq; deorsum pro-

Lib. 15 de r'sa  
partium.

l 25 ff. lib.  
i 25 ff.

Problemata 22  
sectionis 10.

sum protensus, nusquam deflectitur, aut conuoluitur. Quod Aristotelem la-  
tuisse uidetur, quum foeminarum uescam, adeò in corporis alto repositam,  
non uerè arbitrat.

## DE RECTI INTESTINI MUSCULIS.

Caput LI.

## QUINQUAGESIMIPRIMI CA-

PITIS FIGURA.

QUINQUAGESIMIPRIMI CAPITIS FI-  
gura, eiusdemq; characterum Index.

**R**ECTI intestini hic delineatur portio, cum suis musculis à corpore resecta, quam alius ferè, dum reliqua  
eximimus intestina, in corpore adhuc relinquere solemus.

**A** Rectum intestinum, quod in libri quinti figuris euadet cõspicuum, præsertim autem octaua figura, & uigesima.

**B, C** Duo musculi, intestinum post egestionem sursum trahentes.

**D** Nodulosa substantia, penis radice adnata, in mulieribus porro ad infimam pudendi partem commissæ.

Insuper **D** sedes notatur, à qua in penem musculi duo pronascuntur.

**E** Circularis musculus, ne præter arbitrium excrementa deiciantur, præcauens.



Musculi sedem  
attolentes.

**A** V D A T A nunquam satis Natura,<sup>2</sup> recti intestini extre-  
mo musculos largitur, qui in faciũ excretionē protrusum  
recti intestini finem, alacriter sursum reuellūt: dein alium  
ipsi dedit musculum, qui in tempestiuam inuoluntariamq;  
excrementorum egestionē prohibet.<sup>b</sup> Musculi itaq; sedem  
sursum attrahentes, lati & tenues, neq; admodum carnosì  
aut rubentes sunt, uix ab aliquibus ossibus originem ducen-  
tes. **A** ligamētis enim ex pubis ossibus, & coxendicis ossē, & sacro exortis, quæ  
huius regionis musculis obducuntur, ipsaq; demum peritonæi infima sede, u-  
trinq; singuli enascuntur musculi, qui deorsum protensi, rectum intestinum  
amplexantur,<sup>c</sup> extimæ ipsius tunicæ inserti. Præsertim musculi, quum lati ad-  
modum sint, & suis finibus totam intestini latitudinē ambiant, ipsorum<sup>d</sup> por-  
tio radici quoq; penis, mulieribus uerò uteri collo adnascitur. Quod nonnulli  
perpendentes, tres sedem sursum agentes musculos recensuerunt. Vt cunq; ue-  
rò sit, omnes horum musculorũ partes pari præficiuntur muneri, quo sedem  
ilico ab excretionē sursum alliciūt, qui deorsum pellebatur ui abdominis mus-  
culorum, & septi transuersi: auxilian tibus etiam subinde omnibus thoracem  
arctantibus, spiritumq; cõtinentibus musculis. Ceterum his qui anum sursum  
ducunt musculis, nullus eregiōnē opponitur cõtrariæ functionis opifex, quæ  
admodum in omnibus ferè alijs partibus, musculi equidem opponi consueue-  
runt. Neq; ofcitanter hic Natura priuatim ab aliorum musculorum constru-  
ctione

a s. fig. 1.  
ab x. ad 1.  
c. 10. fig.  
lib. 5. o. c.  
22. n.  
b. n. c. c.  
8. fig. lib. 5.  
b. c.

c. 9. fig. lib.  
s. l.  
d. d.



E. C. s  
 fig. lib. 5. d.  
 C. 1. 2. fig.  
 cap. 49. lib.  
 2. M.  
 3. tab. F.  
 G. H. E. 4  
 tab. M.  
 8. 1. 2. fig.  
 cap. 49. G.  
 b. 25. lib.  
 5. X.  
 i. 1. 2. fig.  
 cap. 49.  
 H. 1.  
 8. 1. 2. fig.  
 cap. 49. lib. 1.  
 G. H. 1. K.  
 i. 10. tab. 7.  
 6.

Musculus orbis  
 culatim intesti-  
 ni obducitur.

m. 3. tab. 6.  
 4. tab. P. 5.  
 tab. 6.  
 tab. 6.  
 8. 7. tab. 6.

o. 4. fig. cap.  
 49. N.

ctione aberravit: quum à musculis octo abdominis, unà cum septo transuer-  
 so, sedes adeo interdum propellatur, ut ne à relatis quidem musculis promptè  
 queat retrahi. Alius præterea musculus extremū recti intestini amplectitur,  
 qui prædictis similiter non admodum carneus, sed mucore quodam oblitus  
 existit, fibras orbiculares transuerfas<sup>u</sup> ue adeptus, & elatiori sede quàm inferiori  
 crassior, & quā cuti (ut laborum<sup>u</sup> musculi) permiscetur, conimune cum  
 ipsa corpus efformans. Cohæret autem fibrosis nexibus<sup>u</sup> meatui uesicæ in ui-  
 ris, in mulieribus uerò<sup>u</sup> cervicis uteri principio. quanquam etiam<sup>u</sup> duorum  
 musculorum, quibus in uiris principium porrigit, interuentu, peni commit-  
 tatur. Cæterum posteriori sua regione<sup>u</sup>, quatuor ad ovis sacri finem locatis  
 osificulis (quæ coccyx os nuncupauimus) adnascitur. Ex lateribus connecti-  
 tur teretibus<sup>u</sup> ligamentis, à sacro osse, in coxendicis os pronatis. Præfens mu-  
 sculus non adeo atque medentium uulgius arbitratur, breuis est: sed longus, se-  
 cundumq<sup>u</sup>; magnum recti intestini longitudinis interuallum exporrectus ui-  
 situr, mirè sedem attollentiū musculorum insertioni commixtus. Quod non  
 perfunctoriè ab illis uenit pendendū, qui sedis fistulas & excrescentias sub-  
 inde scindere uerentur, huius musculi muneris abolēdi metu. Licet enim mu-  
 sculi portio aut ferro diuidatur, aut quauis alia occasione diuulsa laceretur, ta-  
 men quum latior secundum intestini longitudinē sit, eius usus non ita prom-  
 ptè, atque uulgo arbitratur, in eiusmodi administrationibus deperditur.  
 Musculus iste circulatim intestinum ambiens, quum in media sua figura, ac ue-  
 luti quiete consistit, intestini recti finem ita collectum, in seq<sup>u</sup>; cōcidentem ser-  
 uat, ut excrementa suo duntaxat pondere defluentia, & non magnū conatum  
 ad excretionem molientia, haudquaquam transmittat: dein si quando illa ab  
 intestinis, aut abdominis etiam<sup>u</sup> musculis, & septo transuerso cōprimuntur,  
 uimq<sup>u</sup>; ad egressum tentant, musculus propria functione sua, extra mediam fig-  
 uram & habitum ita colligitur, cōstringiturq<sup>u</sup>;, ut non uoluntariā excremen-  
 torum educationem concinnè prohibeat. Quæ si fortè est tempestiua, muscu-  
 lumq<sup>u</sup>; proprio munere fungi noluerimus, is extra mediam figuram sic sese ex-  
 euntium ui laxari educiq<sup>u</sup>; permittit, ut excrementis egressus pateat: post quem  
 musculus denuò cum cute, intestiniq<sup>u</sup>; substantiā, in mediam redit figuram, cer-  
 uicis uesicæ<sup>u</sup> musculo, ut imagine, substantia & conformatione, ita quoq<sup>u</sup>; fun-  
 ctione respondens, sedulique ianitoris uices gerens, & perinde ac ille σφιγκτηρ  
 Græcis, Latinis autem constrictor & anulus nuncupatus.

## COLLI VESICAE ET ANI MUSCV- lorum administratio. Caput LII.

4. 3. fig. lib.  
 5. O.



OLLI uesicæ & ani musculorum administratio, ab ipsa  
 uesica inchoabitur: hanc enim à peritonæo, quā internæ  
 pubis ovis regioni obtenditur, cultello aut nouacula libe-  
 rare adeo conuenit, ut ipsa non amplius aliqua sua sede pe-  
 ritonæo sit continua. Deinde penem à pubis ovisibus diri-  
 mēre oportet: quod, ubi inuicem hæc cōmittuntur, me-  
 diocri negotio perficies, quum nerueis duntaxat & fibro-  
 sis nexibus penis ibidem hæreat. At ubi inuicem ossa remouentur, penisq<sup>u</sup>; cor-  
 pora<sup>u</sup> initium ducunt, acutiori cultello horum corporū initia proximè ab ex-  
 ortu sunt abradēda, ut penis ab ovisibus liber pendeat. Mox cultro aliquo pubis  
 ossa inuicem dirimes, sectione per ipsorum cartilaginem ducta. quam sanè le-  
 uiori opera, quàm plerique autumant, perfeceris, si modò osium medium ad

In uiris admi-  
 nistratio.

b. 2. fig. cap.  
 49. C. C.  
 e. ultime  
 fig. lib. 1. 5.

M amussim

amufsim tetigeris. Hæc sectio, quoniam prius femora in penis musculorum administratio erant distensa, ilico ut inuicem ossa abscedant, occasio erit.

<sup>a</sup> Quo uerò remotiùs ossa disiungas, uehementiùs quoq; adhuc femora abducenda sunt. quod feceris longè commodissimè, si uno cadaueris crure à mensa pendente, & reliquo adhuc illi incumbente, os sacrum in mensæ latus acutum<sup>d</sup> ue collocaueris, & deinde utrinque femoribus & ilium ossibus reflexis, ossa pubis, quantum lubet, diduxeris. Nunc uestica uniuersa cum pene in conspectu ad eò iacet, ut etiam<sup>e</sup> musculù uesticæ collo obductù, promptè animaduersurus sis. Vt autem sedis<sup>f</sup> musculos pariter intuearis, cultello sensim uestica simul cum ipsius ceruicæ à recto intestino transuersis sectionibus separanda est. In quo opere sanguinem, si is ex uenis & arterijs profluxerit, spongia sedulò elues. Vix enim (nisi fortassis admodum operose omnia uasa uinculis ita interceptare possis) fiet, quin inter dissecandù, uas aliquod, aut casu punctim ictum, aut transuersim necessarìo incisum, sanguinem profundat. Ablata igitur uestica, & connexu recti intestini musculorum ad penis radicem, & ad musculum uesticæ propèso, ipsius intestini musculos aggredieris: qui sanè citra operosam sectionem sunt summè conspicui, si modò diligenter ab ipsis sanguinem, qui

*In mulieribus.*

#### DE MUSCULIS TIBIAM MOVENTIBUS. Caput LIII.



ROXIMVM quidem nunc erat, femur mouentes musculos describere, si demum explicatis antea musculis, situ uiciniores aggredi institutù fuisset: uerùm quando sectionis potius, quàm uicinie seriem sequi propositum est, ante musculos femoris motuù opifices, tibiæ motores in præsentia ueniunt pertractandi. nam quousq; hos asseruas integros, commodè illos administrare nequis. Cæterùm quo

*Galenus in lib. 3  
de usu part. de  
tibiæ mouen-  
tibus musculis  
sententia.*

tibiæ mouentes musculi insigniores & proceriores, magisq; conspicui sunt, eo etiam minus Galeni sententiæ passim assentiri queo, quamuis interim etiam non omni ex parte is sibi consentiat. Haud procul enim à calce tertij de Vsu partium, tibiæ motuum opifices musculos recensens, eos hac breui oratione

- » nouem enumerat. Tres, qui anteriore femoris sedem occupant, atq; omnium
- » huius loci musculorum maximi sunt, rectà ad genu feruntur: horum quidem
- » unus implantatur patellæ carnosæ apprehensione: duo autem reliqui unum
- » maximum procreant tendinem, qui latescens, implantatur toti patellæ, strin-
- » gens eam exquisitè, & continens cum subiectis. Deinde autem præteruectus
- » articulum, anterioribus tibiæ partibus inseritur, eam, si iubeatur, exten-
- » dens, unà cum toto ipsius genu articulo. Alij uerò duo musculi, utraque

prædi-

*Quoniam  
in crurio-  
nis serie ti-  
biæ mouen-  
tes muscu-  
los secus  
singulos  
pertracta-  
bimus, an-  
te calicem*

prædictorum parte, hic quidem externus, ille autem internus, in tibiæ lateribus inferuntur, ambo obliqui motus opifices. Qui namq; internus est, crus intrò adducit, alter autem extrorsum abducit. Enascitur autem ille quidem ex commissura ossium pubis, hic uerò ab extremis partibus ossis coxendicis: optime enim sic utriq; crus ad motus obliquos abducenti erant. In medio autem inter hos spacio, aliæ tres sunt musculorū explanationes, paruis motibus ipsum genu mouētes. Flectit enim genu, & ad interiora adducit tibiā, is qui est continuus interioribus: abducit autem extrorsum simul flectēdo, uelut inuoluens eam, is qui tangit externos. Reliquus, qui & medius omnium est, in femoris caput internum insertus, flectit quidē totum quoq; femur, cum eo autem simul & totam tibiā euellit, immittēs se eis quæ articulum ambiunt (ligamentis) usq; ad alterum maximorum musculorum, qui in tibia reponuntur, ut simul quoq; tibiā ipsam totam trahat. Reliquus uerò nouem musculorum articulum genu mouentium, gracilis & longus, ex ilium osse enatus, tibiā sursum extendit, in ea potissimum figura crus totū statuens, in qua mollientes, ac subigentes, pedem ad inguina alterius cruris sursum ducimus. Post hæc uerba Galenus, Naturā in horum musculorum cōstructione laudaturus, proculdubio in primis exemplaribus subiunxerat, Mirificē & hīc Naturam omnia prouidisse: & quæ reliquo contextu subsequūtur. At eum<sup>b</sup> musculum, quem in poplite latitare innuit, temporis successu, & in refectione fimiariū peritior, cognoscens, hæc quoq; suo, quod ad nos demanauit, exemplari interiecit: Præter autē hos omnes, est paruus musculus in poplite, genu quoq; flectens. ut simul omnes ab ipso hac serie enarrati, numero decem censeantur. Hæc sanē ipsius oratio clarissima est, ex qua quiuīs etiam citra inspectionē, cuiusmodi enarrat musculos, imaginatione sibi pulchrē cōfingit: at quā sit ueritati cōsona, partim ab ipso in secundo de Administrandis sectionibus, partim uerò ex ipsa inspectione discito. Verūm quando ipsius orationis series in secundo de Administrandis sectionibus longior est, quā ut tota hīc describi debeat, ego femoris musculos eo ordine, quo ibidem recēsentur, enarraturus sum, Galeni sententiā post musculi cuiusq; descriptionē continuò ferē subiiciens, ac pariter addens, quotum in præscripta ex libris de Partium usu oratione unumquemq; enumerauerit. Priusquā uerò musculos aggrediar, id summo studio abs te contendo, ut quot motibus tibiā agas, accuratē examines. Galenus enim in libris de Vsu partiū, ut præcedens attestatur oratio, tibiā extendi simpliciter dixit: non adiungēs, eam magis aut introrsum, aut extrorsum, aut prorsus in medium rectā extēdi. At flexionem uidetur triplicem enumerare: unam, qua tibiā retrorsum, seu in posteriora sursum uersus exteriora duci innuit: alterā, qua introrsum illam sursum tractam agi dicit: tertiam, qua tibiā in neutrū latūs inclinantē, rectā flectimus. quanquam tertiu hunc ductum duntaxat flexionis nomine, & præcipuē in secūdo de Administrandis sectionibus donare uideatur. Deinde in præscripta ipsius oratione, secus atq; in libris de Administrandis sectionibus, tibiā in latera moueri affirmat, quum unum musculū hanc extrorsum abducere, aliterum introrsum adducere scribit. Verūm tamen in ambobus libris, tibiē motum assignat, quo hæc sursum obliquē, uelut ad alterius cruris femur ducitur: & quo tibiā agi ab illis conspiciamus, qui pedibus coria in ligneis stratis emolliunt, aut quum pistores massam apud pleraq; nationes calcant. Hos motus omnes ita Galenus enarrat, ut proprios prorsus tibiæ illos esse arbitretur, ipsiq; peculiares musculos assignet: quum interim tibiā, quiescentē femore, rectissim-

Galeni in 2 de  
Admin. sect.  
sententia cum  
uera musculorum  
descriptio  
ne enarratur.

Tibia motus.



ma flexione & extensione solum agatur. Si enim tibia cum pede in latus digna animaduersione ducitur, id sanè femoris fit beneficio. Neq; est quòd huic paradoxo corroborando prolixius insistant, quum ipse iam admonitus, luce clariùs animaduertas, tuam tibiam, immoto prorsus femore, duntaxat reëctissimo tramite flecti, extendiq; Quamquam quum motus hos, adhibitis etiam nudis ossibus, examinas, non perfunctoriè animus femoris motibus adhibendus sit. nisi enim gnauius attēderis, te infcio femoris caput in coxēdicis offe situm mutabit, moxq; alia tibiæ flexio extensioq;, quàm prius, apparebit. Cæterum

*Primus tibiæ  
momentum.*

iam tempestiuum fuerit, musculos ipsos aggredi: quorum primus acuto exortu<sup>a</sup> principium, è neruea substantia & modica carne cōmixtum ducit, ab anteriori ossis ilium spinæ sede, seu ab ilium ossis appendicis anteriori extremo. Hic musculus non procul ab origine totus carneus euadit, & modicè dilatēscens, gracilis permanet: eius tamē latitudo, ipsius crassitiem spissitudinem uēduplo (ut sic dicam) superat. musculusq; hac forma deorsum obliquè uersus interiora sensim adeò prorepat, ut internū femoris latus iuxta medium longitudinis femoris exquirite occupet: hinc adhuc magis in interiora retrorsum paulatim procedens, eregionē<sup>i</sup> interni femoris capitis iuxta genu tandē consistit: ad quod ueluti obliquo ductu reflexus, & angustior excarnisq; redditus, antrosum descendit, tendinem educens, qui non latus, sed ad amulsum (quicquid Galenus, suis fidens simijs, asserat) teres est, tibiē ossi ad internū latus acutæ suæ<sup>b</sup> lineæ, secundum ipsius longitudinē exporrectæ, insertus. Hunc musculum Galenus in secundo de Administ. sectionibus primū enumerat, in præscripta autem oratione nonum. & utrobique huius musculi beneficio tibiā sursum ad alterius cruris inguina, aut ad femur allici arbitrat: qui motus nō huius solum musculi opera, uerū femur mouentium & tibiæ musculorū auxilio unā perficitur. Tibia namq; suis musculis flexa, & femore deinde suorum musculorum opesursum in anteriora flexo, & simul extorsum ualidissimè circumactō, motus ille succedit. Nisi enim flexa prius tibia, dictum iam femoris motum sequeretur, eiusmodi motu tibiā nequaquam alterius cruris femori aut tibiæ obduceretur. <sup>a</sup> Secundus musculus amplo & prorsus nerueo principio ex pubis ossē enascitur. Vbi enim pubis ossā inuicem<sup>c</sup> cartilagine committuntur, per commissuræ longitudinem duo sibi contigua oriuntur musculorum principia: quorum alterum ad dextrum crus, alterum uerò ad sinistrum defertur, secundum hunc musculum cōstituens. Tanta itaq; huius musculi principij est amplitudo, quanta ferè pubis ossium cōmissuræ est longitudo. Principium hoc non procul ab origine strictius, sed crassius, carnosumq; prorsus ita efficitur, ut eius latitudini crassities uix cedat, & musculus paulo minus toto teres euadat: qui deorsum per femoris interiora descendens, sensim gracilior efficitur, ut iam internū femoris caput non procul à genu articulo contingens, in exactum teretemq; tendinem finiat, eadem sede, qua primi musculi tendo, tibiæ innatum: sed tanto interiùs, seu posteriùs, quanta primi musculi tendinis est crassities. Hic musculus in parum obesis mulieribus, si quando femora diducunt, rigidum quoddam & durum ligamentum, seu neruus, aut tale quid esse apparet, eo quòd excarnis quodammodo in illis musculus nerueam substantiam duntaxat habeat, nulloq; obtegatur adipe. Præfentis musculi beneficio Galenus in præscripta oratione, tibiam ad internum latus duci attestatur, illum in serie quintum enumerans. In secundo autem de Administ. sectionibus, tibiam elatiùs & interiùs musculi huius auxilio attolli prodidit.

*Lib. 2. de Administ. scilicet.*

*Secundus.*

<sup>b</sup> 16. 14. A.  
<sup>c</sup> 17. 17. 1.  
<sup>d</sup> 18. 18. 1.  
<sup>e</sup> 19. 19. 1.  
<sup>f</sup> 20. 20. 1.  
<sup>g</sup> 21. 21. 1.  
<sup>h</sup> 22. 22. 1.  
<sup>i</sup> 23. 23. 1.  
<sup>j</sup> 24. 24. 1.  
<sup>k</sup> 25. 25. 1.  
<sup>l</sup> 26. 26. 1.  
<sup>m</sup> 27. 27. 1.  
<sup>n</sup> 28. 28. 1.  
<sup>o</sup> 29. 29. 1.  
<sup>p</sup> 30. 30. 1.  
<sup>q</sup> 31. 31. 1.  
<sup>r</sup> 32. 32. 1.  
<sup>s</sup> 33. 33. 1.  
<sup>t</sup> 34. 34. 1.  
<sup>u</sup> 35. 35. 1.  
<sup>v</sup> 36. 36. 1.  
<sup>w</sup> 37. 37. 1.  
<sup>x</sup> 38. 38. 1.  
<sup>y</sup> 39. 39. 1.  
<sup>z</sup> 40. 40. 1.

prodidit. hoc est (si modò rectè ipsius sententiam assequor) musculum hunc tibiam uersus interiora maximè inclinantè flectere. quod enim attollere ipse dixit, mihi flexum insinuat. Perficeres autem eiusmodi motù, si erecto prius corpore, dextram tibiam sinistro popliti, aut flexuræ genu nonnihil transuersum subijceres: qui motus nuper dicto, ac quem Galenus primo musculo tribuebat, tanto minus respondet, quo femur in exteriora minus est circumuersum: adeò ut & præsens motus, flexa tibia, & femore in anteriora subleuato, extrorsumq; simul circumactò, fieri debeat, quod sanè à Galeno haud perfunctoriè obseruandum fuerat.

Tertius, cum alijs ut minimùm tribus musculis, ex infima coxendicis ossis sede enascitur. Ab eius namq; ossis<sup>a</sup> appendice (quæ nobis stantibus, in eius ossis infima sede: in simijs uerò & canibus, quum anterioribus innituntur pedibus, in extima, & maximè postica habetur) ordinata serie, multorum musculorum capita principium ducunt, quorum tertius hic musculus omnium<sup>a</sup> postremum obtinet. Ab elatiori enim, & maximè posteriori eius appendicis<sup>a</sup> sede, nerueum gracileq; principiū educitur: quod deorsum descendens, aliquantulum sub origine carneum fit, teretem quodāmodo constituens musculum, suo principio iam longè crassiores. Hic deorsum per femoris posteriora prorepit, aliquantulum obliquè tantisper ductus, donec ad posteriorem sedem interni femoris capitis propter genu pertingat. Ibidem enim extenuatus, & in teretè quoque (non uerò, ut Galenus docet, ac in simijs ferè occurrit, latum) degenerans<sup>a</sup> tendinem, in tibiæ anteriora reflectitur, eadem regione, qua nuper commemorati, insertionem tentans. Sed eius musculus tendo hoc sibi priuatim uendicat, quòd anteriori tibiæ sedi ad internū acutæ illius lineæ latus hærens, ad medium usq; longitudinis tibiæ properet, alijs tendinibus tibiæ insertis, haud æquè descendētibus. Galenus nulli musculo tibiam mouenti, adeò obliquum adsignat ductum, atq; huic tertio, non animaduertens, primum<sup>a</sup> musculum longè obliquiùs duci, quum is scilicet ab ilium ossè antrorsum, & hinc in interiora femoris ad posteriora usq; propemodū descendat, & inde rursus obliquo ductu in priora tibiæ feratur. Deinde<sup>a</sup> musculus, qui ordine quartus erit, obliquior tertio uisitur. illū namq; similiter atq; hunc à coxēdicis ossè pronatū, in anteriora tibiæ, secundum femoris externū caput, prorepere audies. Vnde etiam tanto obliquiorē ipso tertio quartus iste situm nanciscitur, quanto coxēdicis ossis sedes, unde uterq; principium sumit, femoris interiora magis spectat. Tertius musculus, in præscripta Galeni oratione sextus est, quem inibi inquit tibiam in internum latus inclinantem flectere. In libris uerò de Administrandis sectionibus, ut obliquissimum illi ductum assignat, ita quoque obliquissimi motus ipsum autorem statuit. Necesse enim (inquit) est, tibiam hac tractam ansa, retrorsum fursumq; ferri, & hac in orbem conuolui. Atq; hunc quidem motum obimus, at non quiescente femore: necesse enim est, hoc motu tibiā flecti, & femur extrorsum non leuiter circum-

Tertius.

Lib. 2 de Administrat.

Quartus.

Lib. 2 de Administrat.

uertit. Quartus musculus non æquè latum principium, atq; tertius, ex coxendicis ossis<sup>a</sup> appendice ducit. Huius enim<sup>a</sup> principium gracilius est, sed spissum tamen. Deinde ad tertij musculi<sup>a</sup> externū latus, nonnihil sub ipso occultatum enascitur. Veritati enim parū consentit, quod à Galeno in quinti musculi enarratione, de capitibus à coxendicis ossis appendice principium ducentibus asseritur, quum quatuor capitum, ab illo ossè originem ducentium, quarti huius musculi extimum esse, & deinde tertij musculi caput succedere scribit. Cæterum principium quarti musculi paulo sub exortu primum efficitur carneum, exacti musculi formam multo quàm tertij crassiores, ac per femoris

posteriora sensim deorsum uersus exteriora descendens. Quum uerò musculus medium lōgitudinis femoris superauit, tenuior redditur, & externa suis fedibus nerueus admodum, quasi tendinem educturus, apparet. In interna autem sede, alia pars carnosa, ex femore pronata, ipsi, ubi tendinem uidetur procreaturus, ita adnascitur, ac si alius hic oriretur musculus, qui quartum auget: simulq; ex ambobus unus efformaretur musculus, qui denuò crassescens, carnei cuiusdam musculi imaginē exprimit, & deorsum protensus, exterioriq; parte admodum neruosus, insigni tendine fibulæ implatur, ualidam insertionem in<sup>4</sup> processum superioris appēdicis illius pertinaciter molitus. Huius enim tendinis occasione, fibula acutū huiusmodi processum, quā tibie coarctatur, exerit. Quinetiam femoris externū caput, in externo ipsius latere oblongum<sup>5</sup> finum gerit, tendinis huius occasione, ut aptē ac tutō ueheretur, priuatim exculptum, læuiq; & lubrico ligamento incrustatum. Cæterum siue quartum hunc musculum unius loco, aut duorum enumeres, nihil interest: quanquam Galeni gratia, ne ordinē perturbes, unicū opportuniū statues. Is enim, quum hunc musculum in homine non uiderit, unicū duntaxat ipsum recēset, utq; in caudatis simijs illum ego reperi, describit. In simijs enim nulla à femoris offe enascens portio, quarto musculo admiscetur: sed is unicus est, admodum insignis & latus. unde etiam Galenus illum perpetuò latum, in libris de Administrandis sectionibus appellat. Hunc musculū præscriptæ ex tertio de Partium usu orationis, septimum collocabimus, quo Galenus asserit tibiam extrorsum simul cum flexione abduci, & quodammodo inuolui. In secundo autem de Administrandis sectionibus, totam tibiam huius ope simplici motu in externam partem agi attestatur, eorum quæ in libris de Usu partiū tradiderat, oblitus, & proculdubio huius musculi naturam exactissimē, propter cursorem illum, cui hunc in certamine autulum putauit, cognoscens. Verisimile enim est, Galenum illo cursoris (cui alij tibiam flectentes adhuc famulabatur) symptomate allectum, sedulo huius musculi naturam in simijs perpēdisse, atq; tunc (ut sanē debuisset in omnibus) didicisse, hunc simplici, quod ad genu articulum attinet, motui à Natura fuisse præfectum, & flexionem in neutrum latus inclinantem moliri, utcunq; etiam obliquo ductu quartus hic musculus ad tibiam prorepat: quem sanē ossium situs compositionisq; ratione, & femoris formæ gratia, potius quàm ut non recto præesset motui, obtinet. Verum interrim ego Galeni sermonem, quo in exteriora tibiam simplici motu hoc quarto musculo duci scribit, ita interpretor, ac si per exteriora, posteriora intellexisset, itaq; flexionem, non uerò in externū latus ductum innueret. Aliàs enim Galeni sententia à ueritate nimium declinaret: quum tibiam in externū latus, idq; simplici motu, neutiquā agi, certo certius sit. Quintus musculus etiam à coxendicis ossis appendix pronascitur, initium ducens inter<sup>6</sup> capita tertij & quarti musculorum tibiam mouentium, & caput eius musculi, quem femur agentium quintum enumerabimus, cuiq; quartum caput eorū quibus coxendicis ossis appendix initium præbet, ascribemus: uti huic quinto tibie motibus præfectorum musculo, tertium<sup>7</sup> caput merito tribuimus, quod prorsus nerueum est, & non nisi longè sub exortu carneum euadit, crassescitq; hoc sibi præ cæteris corporis musculis rarum & peculiare uendicans. Nullus namq; alius tam longo ab ipsius principio ductu nerueus uisitur, præterquàm quod in posteriori sua sede, etiam ultra medium longitudinis femoris, impense liuidus appareat, sinumq; sibi elegāter & cōcinne insculptum habeat, secundum longitudinem musculi teretem, cui anterior<sup>8</sup> tertij tibiam mouentiū musculi

Lib. 2 de Anatomia scilicet.

Quintus tibiam mouentium.

pars



pars ita pulchrè innititur, ut prorsus existimem, tertium muscolum cum quinto, unius musculi uice à multis Anatomicis ablatum dissectumq; fuisse. Vt uerò tertius musculus, mox ab exortu crassus, carneusq; & teres deniq; efficitur, ac longè supra genu articulū extenuatur, in tendinemq; cessat: ita contrà quintus musculus, ut superiori sede diu nerueus permanet, sic humiliori sede crassescit, ac ueluti carneus & teres cōspicitur, ad posteriorem primū regionem<sup>n</sup> interioris capitis femoris, iuxta genu, tendinem<sup>o</sup> producēs teretem, qui ad id femoris caput cum tertij musculi tendine reflexus, interiori lateri anterioris tibiæ osis sedis insertatur, non ad eò in tibiam descendens, uel etiam antrorsum prorepens, ac trium primorum tibiam mouentium musculorum tendines, quos hac in sede insertionem<sup>n</sup> moliri scripsimus. Quamquam uerò quinti musculi tendo non æquè demissam insertionē, atq; nuper dicti tentet, non tamen interno femoris capiti, iuxta<sup>n</sup> initium musculi inseritur, quem pedem mouentium primum enumeraturi, ab interno illo femoris capite principiū ducere testabimur. Et quemadmodum quinti musculi tendo in illud femoris caput non implantatur, ita neq; tibiam femori committentibus<sup>n</sup> ligamenti præcipuo nexu firmatur, aut inseritur. Quod sanè haud oscitanter Galeni gratia est obseruandum, qui quinto suo musculo, in secundo de Administrandis sectionibus libro, in femoris caput & articuli genu ligamēta insertionem tribuit, & miris modis de huius musculi officio & munere sollicitus, sibi parum constat. Primò enim ait, quinto loco enumeratum ab ipso muscolum, tibiam sensim in exteriora circumuertere, ac motu tertij musculi fungi, quamuis non æquè magno. Secundò autem inquit, si hunc muscolum ad caput suum tendas, cum femore etiam tibiam retrorsum introrsumq; ferri uidetur. Tertiò uerò scribit, se propemodum dicturum, quantum ipsi enarratum muscolum, tibiæ flexus solum auctorē existere: addens, ipsum non magis tibiam flectere, quàm ad internam regionem abducere uideatur. Quartò addit, hunc muscolum leuiter & obscure quodāmodo genu articulum mouere, aut flectere, ac<sup>n</sup> alium quandam in poplitis articulo latenter repositū esse, qui uel solus ipsum flectere potest, uel maxima potentia præditus est: eum subaudiens muscolum, quem nos in poplite latitantem ferè nuncupamus, quemq; priuato Capite post nouem tibiam mouentium musculorū historiam describemus, cuiq; Galenus dignissimi munus, quòd primus illum obseruauerit, immeritò ascribit. Ad hæc, in secundo de Administrandis sectionibus libro, Galenus ueteres (qui<sup>n</sup> quintum nostrum musculū, simul cum tertio fortassis, cum ita mutuò hæreāt, unumq; quasi muscolum efformare uideantur, unius musculi loco, inter dissicandum unà abstulerunt) non semel irridet, quòd quandam femur mouentem musculum, tibiam flectere scripserint: illum insinuans<sup>n</sup> muscolum, qui omnium corporis musculorum crassissimus est, & femur mouentiū quintus mihi, perinde ac Galeno in libris de Vsu partium, enumerabitur: qui eundē in libris de Administrandis sectionibus, femur mouentium primum recenset, & in tibiam non pertinere admodum uerè asserit. Vnde etiam miror, quī tertium de Vsu partium librum in præscripta oratione tum non restituerit, quum in poplite latitantis<sup>n</sup> musculi, post libros iam indubiè prius editos, mentionem fecit. In præscripta enim oratione, octauī musculi loco, non secus quàm Veteres factitasse innuit, unum enarrat, quem ego prorsus arbitror esse, posteriorem quinti femur mouentium musculi<sup>n</sup> portionem, suo tendine in internum femoris caput insertam, iuxta initium primi pedem mouentium musculi. quamquam interim illi eius quinti femur mouentiū musculi portioni cum tibiæ motibus

*Galenus de quinto musculo sententia.*

*Lib. 15.*

nihil prorsus sit commune: uti<sup>r</sup> quintus tibiae mouentium musculus mihi enarratus, solius tibiae flexioni, non uerò femoris motibus, famulatur. Ac proinde si quando (ne hic in Galeni sententijs recensendis nimius sim) humani corporis fabricae cognitione adeptus eris, unà mecum promptè iudicabis, ex sedula dissectione Galenum potius posse intelligi, quàm ex ipsius libris adeò diffusis, illà posse ad amussim & uerè disci. At nunc deinceps reliquos tibiae mouentes aggrediamur, Galeni communis praeceptoris, & Anatomes professorum facile principis autoritate ob oculos semper posita. <sup>a</sup> Sextus itaque musculus (quem primo loco, nisi Galeni habita fuisset ratio, descripsissem) eo accuratiùs uenit inspiciendus, quo rariorem inter reliquos musculos naturam adipiscitur. A latere enim externo primi<sup>b</sup> musculi, ab ilium ossis spina enascitur, intus acutum carneumq<sup>c</sup> caput obtinens, quod muris lacertae uel modo latefcens, deorsum ad regionem coxendicis articuli fertur, ubi rursus caput id seu musculus angustior redditur, & priusquam magnum exterioremq<sup>d</sup> femoris<sup>e</sup> processum perrepat, non<sup>f</sup> amplius carneus cōspicitur. adeò ut sextus musculus aliud nihil tandem sit, quàm longissima & latissima membrana, tendinis naturam referēs, cui nunc descripta & carnei exactiq<sup>g</sup>; musculi formam representans pars innascitur. Statim enim ab initio in exteriori parte, instar latae membranae in conspectum uenit, aliquoufq<sup>h</sup>; coxendicis articulum amplexantibus musculis obductae. Quum uerò membrana magnū femoris processum superauit, totam anteriorem femur amplexantiū musculorum sedem, deinde & posteriorem & exteriorem cutis quasi modo tantisper integit, quousq<sup>i</sup>; ad genu articulum descendat: quem ubi similiter quoq<sup>j</sup>; membrana obuoluit, ipsa in anteriorem tibiae sedem & externum illius latus inferitur. Cæterum huius membranae, seu tendinis, utcumq<sup>k</sup>; appellare lubeat, non eadem undiq<sup>l</sup>; est crassities. Tota namq<sup>m</sup>; pars, quae anteriori femoris sedi, & posteriori obducitur, tenuissima est: atq<sup>n</sup>; hac tanto tenuior conspicitur, quanto interiori femoris regionem uiciniùs accedit. Ea uerò membranae pars, quae externo femoris lateri exporrigitur, ualida crassaq<sup>o</sup>; est, & accuratè lati tendinis speciem exprimit. Huius fibrae recto tramite, quousq<sup>p</sup>; anteriori tibiae parti ad latus magis externum & ad fibulam inferantur, decliues descendunt. Tendo autem hic ad insertionis sedem illis tendinibus commiscetur, qui cum ipso quoq<sup>q</sup>; tibiae extendere dicuntur. Praesens namq<sup>r</sup>; musculus extendentium numero uenit ascribendus. quanquam insignem usum femur ambientibus musculis etiam praestet, transuersi cuiusdam ligamenti ritu omnes quos amplectitur musculos, in sua sede (ne aliquo scilicet permutentur) continens. Atq<sup>s</sup>; ita eius membranae uices gerit, quam cubitum occupantibus musculis circulatim obnasci, prius insinuauimus. Quàm uerò perfunctoriè Galenus hunc musculum describat, tria, quibus illum dignatur, uerba, in secundo de Administrandis sectionibus ostēdunt. Arbitror enim hunc in libris de Vsu partiū Galenum latuisse, quum in trium, quos ibidem recenset, tibiae extendentium classē illum non repositū fuisse, quumq<sup>t</sup>; quarti praescriptae orationis musculi ortum sermoni addiderit. Si enim simpliciter (ut de cæteris musculis loquitur) quarti insertionē & motum tantum expressisset, arbitratu fuisset, hunc sextum ab ipso eius musculi loco haberi, quem in externum latus tibiae abducere tradidit. Quod sanè hic musculus, si sitū ipsius ductumq<sup>u</sup>; spectes, praestaret, modò tibia uel minimū in latus ageretur. Verū quum explicatiùs de quarto musculo locutus, eius originem sermoni addidit, liquidò Galenus conuincit, se sextum hunc non proponere: quandoquidē hic non ab<sup>v</sup> appēdice coxendicis ossis, cum<sup>w</sup> tertio, quarto

z 114. y.

Sextus.

d 1. 1. 2. 3.

e 1. 2. 3. 4.

f 1. 2. 3. 4.

g 1. 2. 3. 4.

h 1. 2. 3. 4.

i 1. 2. 3. 4.

j 1. 2. 3. 4.

k 1. 2. 3. 4.

l 1. 2. 3. 4.

m 1. 2. 3. 4.

n 1. 2. 3. 4.

o 1. 2. 3. 4.

p 1. 2. 3. 4.

q 1. 2. 3. 4.

r 1. 2. 3. 4.

s 1. 2. 3. 4.

t 1. 2. 3. 4.

u 1. 2. 3. 4.

v 1. 2. 3. 4.

w 1. 2. 3. 4.

x 1. 2. 3. 4.

y 1. 2. 3. 4.

z 1. 2. 3. 4.

aa 1. 2. 3. 4.

ab 1. 2. 3. 4.

ac 1. 2. 3. 4.

ad 1. 2. 3. 4.

ae 1. 2. 3. 4.

af 1. 2. 3. 4.

ag 1. 2. 3. 4.

ah 1. 2. 3. 4.

ai 1. 2. 3. 4.

aj 1. 2. 3. 4.

ak 1. 2. 3. 4.

al 1. 2. 3. 4.

am 1. 2. 3. 4.

an 1. 2. 3. 4.

ao 1. 2. 3. 4.

ap 1. 2. 3. 4.

aq 1. 2. 3. 4.

ar 1. 2. 3. 4.

as 1. 2. 3. 4.

at 1. 2. 3. 4.

au 1. 2. 3. 4.

av 1. 2. 3. 4.

aw 1. 2. 3. 4.

ax 1. 2. 3. 4.

ay 1. 2. 3. 4.

az 1. 2. 3. 4.

ba 1. 2. 3. 4.

bb 1. 2. 3. 4.

bc 1. 2. 3. 4.

bd 1. 2. 3. 4.

be 1. 2. 3. 4.

bf 1. 2. 3. 4.

bg 1. 2. 3. 4.

bh 1. 2. 3. 4.

bi 1. 2. 3. 4.

bj 1. 2. 3. 4.

bk 1. 2. 3. 4.

bl 1. 2. 3. 4.

bm 1. 2. 3. 4.

bn 1. 2. 3. 4.

bo 1. 2. 3. 4.

bp 1. 2. 3. 4.

bq 1. 2. 3. 4.

br 1. 2. 3. 4.

bs 1. 2. 3. 4.

bt 1. 2. 3. 4.

bu 1. 2. 3. 4.

bv 1. 2. 3. 4.

bw 1. 2. 3. 4.

bx 1. 2. 3. 4.

by 1. 2. 3. 4.

bz 1. 2. 3. 4.

ca 1. 2. 3. 4.

cb 1. 2. 3. 4.

cc 1. 2. 3. 4.

cd 1. 2. 3. 4.

quarto & quinto nobis enarratis principium ducit: ut ipse tamen innuebat, ab extrema sede osis coxæ dicis abducentem musculū exoriri affirmans. adeo sanè, ut fateri cogamur, hunc musculū Galeno in præscripta oratione incognitū fuisse: & quemadmodū falsos tibiæ motus sibi effinxit, ita quoque musculum aliquem, sua imaginatione excogitatum, nobis tradidisse. Tres, qui adhuc enarrandi super sunt, dilucidius fortassis recenserentur, si quem Galenus postremū numerat, nunc septimi loco describeremus: uerū quum hoc Capite Galeni ordinem sequi uisum sit, eos etiā qui adhuc reliqui sunt, sua serie aggrediamur.

Septimus itaque; neruea, lataque & ampla origine ab externo femoris osis latere nascitur, totam radicē magni femoris processus in orbē amplexus. Origo hæc statim ab initio crassā carnosaque efficitur: & ilico à femoris osse abscedēs, illi insertitur musculō, quem octauū nominabimus. Is namque aliqua sui portione huic septimo subiectus, in causa est, quo minus septimus tota femoris longitudine ipsius osis, quemadmodū ipse octauus, adnascatur. Septimus itaque; musculus sua amplitudine totum externū femoris latus citra omnē, præterquā in exortu, ad os cōnexum amplectitur, magnā quoque; anterioris & posterioris sedis femoris partē occupans. Hic toto descēsu carnosus uisitur, paulo supra molā aut patellam in amplū tendinem desinēs, quem octauū musculi & noni tendinibus cōmixtum, simul cum illis patellā apprehendere, tandemque; in anteriore tibiæ sedē inseri audies. Quanquā etiam septimi musculi tendinis posterior pars ualidē sexti musculi permisceatur tendini, qui huius septimi externam sedem præ cæteris femur occupatibus musculis integit. Posteriori autem septimi sedis quartus tibiā mouentiū musculus attenditur, quemadmodū anteriori is qui nonus omnium futurus est. Quotus uerò ordine septimus hic musculus in præscripta Galeni oratione habēdus sit, ubi & duos alios adhuc absoluerō, ipse augurabere. Octauus musculus totam propemodū femoris osis amplitudinem obcingit. In posteriori enim duntaxat sedē, iuxta femoris lōgitudinis medium, nudam relinquit lineā, cui maximus totius corporis musculus, seu femur mouentiū quintus, inseri docebitur. Dein ad radicē quoque; inferiorum femoris capitum, posteriore osis femoris amplitudinē octauus hic musculus non integit, cuius principiū à femoris osis ceruice nerueum exoritur: sed sensim carne adauctum, à femoris quoque; magni processus radice ipsius portio ita enascitur, ac si eius obliqui ductus gratia, duo principia obtinere nō perperam diceretur: ac unum quidem femoris ceruici, alterum uerò magno illius processui ferendum esset acceptum. Vt cūque; sit, musculus obliqua hac & ampla origine enatus, deorsum descendit, femoris os, uti diximus, adeo ambiens, ut duo ipsius latera in posteriori femoris regione paulo minus toto sint cōtigua. Quo uerò magis descendit, crassior semper carnosiorque; efficitur, quousque; ad internum latus anterioris in femore regionis, quodāmodo in crassum & admodum carneum semicirculum propter patellam extuberet, ex quo latus ualidusque; enatus tendo, patellam, sicuti paulo post dicam, amplectitur. Hic musculus tota ipsius longitudine è directo semper illius carni semicirculi & ceruicis femoris carnosior crassiorque; apparet, quā quā septimo musculo subternitur: sub illo enim tenuior eualit, attamen carnosus inibi quoque; permanet. Quando itaque; secundū femoris longitudinem in anteriori ipsius sedis interno latere octauus musculus procerius extuberat, & septimi quoque; anterior pars è directo lateris exterioris eius sedis femoris, quæ anterior est, exporrigitur, in medio anterioris femoris sedis septimus unā cum octauo sinum efformant impenſe liuidum, cui tota femoris longitudine musculus innititur, quem



Nonum.  
Lib. 2 de Ad-  
ministrat. scilicet  
alter lib. 15 de  
Vsu partium.

quem ordine nonum esse dicam, simulatq; octauum musculum in Galeni ora-  
tione proculdubio primum esse addidero: quandoquidem adhuc quodam-  
modo carnosus, molæ seu patellæ iniicitur. <sup>f 4 tab. 3.</sup> Nonus (cui Galenus exortus se-  
dem perperam assignat) non ex femoris ossæ enascitur, uerum ex iliū ossis <sup>5 tab. che-  
re. 1. 1. 1.</sup> tu-  
berculo, in anteriori ipsius regione, super coxendicis ossis acetabulum promi-  
nente. Ab hoc enim tuberculo nonus musculus <sup>3 tab. 1. 1. 1.</sup> principiū nerueum acutumq;  
assumit, & deorsum rectā in femoris anteriora descendēs, lacertæ murisq; for-  
mam adipiscitur, carnea substantia auctus, & illi sinui incumbens, quem septi-  
mum musculum cum octauo efformare nuper retulimus. Priusquā uerò no-  
nus medium longitudinis femoris descendendo superarit, <sup>8 1/2 tab. 3.</sup> arctior graciliorq;  
sensim efficitur, multoq; supra genu articulū <sup>cap. 25 lib. 1.</sup> in <sup>1 3.</sup> tendinem finit utcumq; <sup>h 4 tab. 3.</sup> am-  
plum, sed tenuem: qui rectā patellam accedens, in anteriori ipsius sede denuo  
dilatur, <sup>i 4 tab. 3.</sup> tendinibus septimi & octauī musculi permixtus. Attamen hic ten-  
do alijs non adeo ualidē, atq; septimi & octauī musculi tendines inuicem, con-  
admodum laceratus, a subditis tendinibus ad anteriore usq; tibiæ sedem auelli  
potest. Vt cunq; sit, ex tribus postremo enarratis musculis, unus hic tendo con-  
flat, cui patellæ corpus uniuersum innascitur. Nihil enim patellæ ipsius ten-  
dine non obducitur, præter interiorē posteriorem uē ipsius superficiem, quæ  
læui cartilagine incrustata, sinum inferiorum femoris capitum respicit, mu-  
tuoq; ingressū cum illo respondet. Quum uerò tendo iste ad eum modum pa-  
tellā amplexus, & posteriori ipsius sede, qua femoris ossi non connascitur, mul-  
to duriusculoque adipe, & mucoso ac uiscido humore imbutus, genu articu-  
lum transcendit, arctior & crassior efficitur, ualidissimē in anteriorē tibiæ <sup>1 spec. 2</sup> se-  
dem, non procul sub articulo, implātus. In caudatis uerò simijs non æquē ar-  
ctatur, neq; etiam pariter crassescit: sed membranæ quodammodo, tibiæ in-  
feriūs multo, quā hominibus, inseritur. Deinde illis quoq; simijs reliqui ten-  
dines in tibiam implantati, membranosiore latioresq; quā hominibus obti-  
gerunt. Quod uel Galeni nomine expendendum est diligētissimē, qui omnes  
propemodum teretes tibiam mouentiū musculorum <sup>31 lib. 1. A.</sup> tendines, ac si lati am-  
pli; essent, ut in simijs uiderat, describit, ac aliorum ueluti Anatomicorum in  
hominum corporibus exercitatorum oscitantiam præter meritum subnotat. <sup>B. 4. 1.</sup>  
Si igitur septimum & nonum secundi & tertij loco in præscripta ex tertio de  
Vsu partium oratione enumerari uoles, per me quidem licet: si modò neq; nu-  
mero duntaxat nimium attentus, neq; libris plus æquo fidens, rem ipsam ag-  
grediaris, aut alteri sedulo administratū astes. Quod non solum in nouem enar-  
ratis tibiæ motoribus præstabis, uerum etiam in <sup>11 1/2 tab. che-  
re. 1. 1. 1.</sup> musculo sub alijs in poplite  
recōdito, cuius naturā secundo ab hoc Capite ipsi dedicādo sum explicaturus.

# TIBIAM MOVENTIUM MUSCULORVM administratio. Caput LIIII.



SECTIONEM tibiam mouentium musculorum in il-  
lo crure aggredieris, cui, dum pubis ossa in ani musculo-  
rum administratione se iungeres, sacrum os adnexum fi-  
uisti. Ab ilium igitur ossis summo, ad medium usq; tibiæ,  
longa ducetur sectio, cutem, adipē, & carneam membra-  
nam diuidens: absque omni enim arte cutis cum carnea  
membrana, laniorum artificio, ad medium usq; longitudi-  
nis tibiæ auferēda est. Mox secundum femoris longitudinem in interna ipsius  
parte

parte obseruabitur<sup>r</sup> sexti musculi membrana, seu tendo, quem cutis modo à subiectis liberare conuenit. Eius igitur parte, quæ anteriorem femoris sedem ambit, ad externum femoris latum deducta, eam quoq; quæ posteriorem femoris sedem integit, similiter uersus externū latum à subditis dirimere necessum est: quo manu transuersum inter ipsius tendinē &<sup>b</sup> septimum musculū interiecta, & sursum deorsumq; mota, tendinis insertionē, & sui quoq; musculi originem expendas. Vbi originis locum inueneris, nouacula aut cultello hanc ab ilium osis spina absecabis: & illam digitis attollens, ad tibiā usq; totum musculum auelles, accuratè tendinis istius amplissimi naturā, & carnosam huius musculi partem inspiciens, & musculum à sua insertionē pendentem relinquens, quo postea ipsius functio, præter insignem illum, quem cæteris musculis præstitit, usum, rectius innotescat. Post hūc, primi musculi caput ab anteriori summaq; osis iliū parte cultello liberabis: & ipsius capite digitis apprehenso, absq; negotio ad insertionē usq; à subditis diuelles. Mox nouacula à pubis ossē, quā id alterius lateris pubis osi cartilaginis interuentu cōmittebatur, secundi musculi initium dirimes: & illo similiter digitis apprehenso, musculum uniuersum ad insertionem usq; perduces. Iam nonum aggredi liceret: uerū commodius feceris, si uerso crure, illos<sup>g</sup> qui à coxendicis ossē oriuntur, prius administrueris. Quod ut rectè succedat, necesse est<sup>h</sup> insignem musculum, qui alteram natem constituit, auferre: qui à spina osis coccygis & posteriori parte osis ilium spinæ & dorsi enatus, magno femoris processui potissimum inferitur, femur, uti suo loco audies, moturus. Nouacula igitur huius musculi carneum principiū ab illis, unde prodit, ossium sedibus est abradendū, ut à subditis musculis quoq; eleuatum, in latum commodè uersus suam insertionem reflecti possit: aliās enim ex coxendicis osis appendice pronati musculi, sese suis capitibus non ostenderent, quæ sua exortus ferie iam ueniunt dirimenda. Cæterum ut exactius uoti compos fias, digitis in posteriori femoris sede musculi inuicem seiunges, ut capitum mutuō incumbentiū crassitiem leuiori cura coniectari queas. Animum itaque hic adhibebis, num<sup>i</sup> tertij musculi caput, ut ego dixi, quarti insertatur capite: num uerò tertij caput, quarti musculi capiti, ut Galeno uidetur, succumbat, & quo<sup>i</sup> nam pacto eregionē illa inuicem magna ex parte situentur, connascanturq;. Quod ubi præstiteris, utrunque à coxendicis ossē absecabis: & tertij capite in manum sumpto, illum ad ipsius usque insertionem à subditis detrahes, hoc solum perpendens, qualiter<sup>m</sup> quinti à me commemorati musculi sinui incumbat. Quum uerò quarti etiam musculi caput similiter diuellis, sedulò attendendum est<sup>n</sup> illi carnosæ parti, quæ à femore pronata, quartum auget. Hæc enim cultello à femoris ossē liberanda est, priusquam totus musculus ad insertionē perducī possit. Posteaquā igitur tertij musculi<sup>o</sup> caput ab osis coxendicis appendice resectum erit, ac totus<sup>p</sup> musculus à<sup>q</sup> quinto tibiā mouentiū, ad ipsius usq; insertionem distractus, quinti<sup>r</sup> caput ab exortu liberabitur: & ubi uniuersum musculū à<sup>r</sup> quinto femur mouentium diuulseris, ipsius insertionem sedulò expendes, quo cōstet, num in internum femoris<sup>s</sup> caput, & articuli genu<sup>s</sup> ligamenta, ut Galeni est sententia: an in tibię os, uti ego scripsi, musculus inseratur: modò Galeni quintum musculum eundem cum meo esse statuas: & non fortè quinti tibiā mouentiū loco, posteriorē partem quinti femur mouentiū musculi, Galenum habuisse, haud admodum fortè præter rationem existimes. Cæterum uerso nunc crure, noni musculi principiū, altius nonnihil inter<sup>u</sup> quosdam femoris motores reconditum, ab osis coxendicis<sup>v</sup> tuberculo separabis. quod ubi digitis attraxeris, ad genu

Septimi musculi administratio.

Primi.

Eorum qui à coxendicis ossis appendice enascuntur.

Tertij & quarti.

Libra de Administ. scilicet.

Quinti.

Noni.

genu usq; citra sectionem adimetur. & liuida ipsius substantia, quæ<sup>b</sup> sinui octau-  
 ui & septimi musculi insidet, unâ cum ipso sinu spectandâ sese exhibebit. No-  
 septimi. no hoc musculo ad genu relicto,<sup>c</sup> septimi musculi exortum ab osse sedulò de-  
 rades: & musculi principio sensim in exteriora reflexo, ab octauo musculo il-  
 lum ad patellam usq; liberabis.<sup>d</sup> Octauum uerò operosius à femore deradere  
 conuenit, quum undiq; ferè ossi adnascatur: ubi tam en ad patellam usq; abra-  
 sus, unâq; cum septimo & nono à femoris osse reflexus erit, operæ precium fe-  
 ceris, si singulorum musculorum motum expenderis: quod pari ratione atq;  
 in alijs musculis, præsiturus es, illorum scilicet capitibus ad sedes, unde prona-  
 scuntur, attractis. Verùm hîc tibîæ motuum consideratio propter frequentia  
 in genu & femore uulnera, tibi tanta esse debet, ut pede à tibia absccto, & tibîæ  
 carnibus quàm possis examulsiim citra musculorû tibiam mouentium, in eo-  
 rum insertionibus læsionem, ipsos nonnunquam aggredi debeas, ut num ego  
 de tibîæ motibus immeritò secus atq; alij omnes senserim, dicas. Neq; tunc sa-  
 nè pedem cum tibîæ carnibus ademptum esse, sat foret: imò nihil æquè con-  
 duceret, atq; omnem carnem coxendicis articulo incumbentem unâ auferre,  
 ne femoris motus tibi cum alijs Anatomicis in hoc opere illuderet. Nudo e-  
 nim articulo, semper unâ intuebere, num femoris caput uel tantillum in suo  
 sinu mutetur. Et quo minus præter rectam flexionem extensionemq; , tibia,  
 immoto femore, aliam ullam moliri cõspicaberis, expede quanto minus id in  
 nobis tibia præstet, quum tot carnibus undique femur circumuestitur. Porrò  
 extendentium tibiam<sup>e</sup> tendinum permixtio nouacula inquirenda uenit: ut sci-  
 licet intuearis, quis musculorum insigniorem commixti tendinis portionem  
 obtulerit. Quinetiam attendendum erit, cuiusmodi patellæ in illo tendine ne-  
 xus sit: ac demum, qui nullius ligamenti beneficio, imò nullius prorsus corpo-  
 ris interuentu, patella femori innitatur.

DE MUSCULO IN POPLITE OCCULTATO,  
 qui non rectè Galeno præcipuus tibîæ flexionis autor  
 habetur. Caput LV.

Libra de Al-  
 munt, 67.



INTER tibîæ motuum duces, Galenum quendam<sup>a</sup> mu-  
 sculum in poplite latitantē recensuisse, antè diximus: mo-  
 dō autem, qua sede is contineatur, cuiusq; formæ, ductus,  
 & magnitudinis sit, narrabimus. Ex ligamētis itaq; femur  
 tibîæ connectentibus (quorum naturam peculiari Capi-  
 te, unâ cum coxendicis articuli & pedis ossium ligamētis  
 persequar)<sup>b</sup> unū in externo genu articuli latere habetur,  
 admodum ualidū & crassum, à cuius posteriori parte nerueum musculi<sup>c</sup> prin-  
 cipium exoritur, quod sua amplitudine in exteriori latere posteriorē genu ar-  
 ticuli sedem contingit, femoris ossi nusquam interim pertinaciter cõnatum.  
 Hinc carnosus adauctum fibris, admodum obliquè deorsum uersus interiora  
 descendit, musculum efformâs paulo admodum longiorem, quàm amplum.  
<sup>d</sup> Finis enim huius, seu insertio, iuxta radicem<sup>e</sup> appendicis tibîæ ossis, in ipsius  
 posterioris sedis interno latere adeò ampla cõsistit, atq; totius musculi uisitur  
 latitudo. Deinde ut musculus hic obliquus est, obliquam quoq; molitur inser-  
 tionem: à posterioris enim tibîæ sedis externo latere musculus iste deorsum  
 uersus internum latus obliquè ita descendit, ut minima ipsius pars genu liga-  
 mentis, maxima uerò tibîæ cõmittatur. Præsenti musculo alius nullus, aut in  
 exortu, aut in insertionē subijcitur: sed articuli ligamentis & ossibus proximè  
 attentus,

d 14. lib. 7.  
 13. lib. 7. A.  
 13. lib. 7. C.

b fig. cap.  
 1 V.  
 c 14. lib. 7. A.

d 14. lib. 7.  
 e 2. fig. cap.  
 13. lib. 7. A.  
 B.





Secundus se-  
mur mouen-  
tium.

dens, & magnam, eandemq; ualidam sui tēdinis<sup>e</sup> portionem, in processu<sup>e</sup> tūius radicem, longa linea secundūm femoris posteriora inferens. <sup>a</sup>Secundus magna ex parte<sup>e</sup> primo substratus, ab anteriori superiori<sup>e</sup>q; osis ilium spinæ regione, lato quoq; & carneo exortu enascitur,<sup>e</sup> totam ferē ilium osis spinæ sedem occupans, à qua primus initium non mutuauit. Verūm hac tantūm sede secundus musculus non cōtentus, ab ilium osis dorso, ubi primus musculus ab osse primūm abscedit, sub illo quoq; enascitur: adeò, ut huius quoq; initium tantūm ex semicirculo prodeat, posteriori sua inferiori<sup>e</sup>q; sede primo musculo subiectum. Ex his osis ilium regionibus, musculus deorsum obliquē non nihil ad latus descendit: & sensim arctior redditus, primum musculum totus subit, articulum quoq; coxendicis integens: è cuius regione in membraneū, sed ualidum cessat<sup>m</sup> tendinem, qui elatori magni femoris processu<sup>e</sup> parti implantatus,<sup>e</sup> anteriorem quoq; processū regionem aliquantulum comprehendit, latam transuersamq; insertionem (si cum primo conferatur) molitus. Quum itaq; primi musculi fibræ, quasi transuersim in latus, minimūm scilicet deorsum inclinatæ, prorepant: secundi autem fibræ, recto quasi ductu decliues, & modicē admodum in latus propagentur, utriusq; musculi fibræ sibi mutuo X literæ modo decussatim incumbunt. Hic musculus, similiter ac primus, nulla ex parte aut crassior, aut carnosior conspicitur, quā ubi ab ilium osse (unde

Tertius.

principium ducit) primūm abscedit, ac<sup>e</sup> tertio interni musculo incipit, qui tanto minor est secundo, quanto secundus primo. Subijcitur autem penitus secundo,<sup>e</sup> initii ducens ab<sup>e</sup> externis demissioribusq; osis ilium dorsi sedibus, ubi id coxendicis osis nomen primūm obtinet: atq; id tertij musculi initium similiter latum & semicirculare est, & ut duorum primorum principia, carneum, crassūq; Præterea, hoc in priora modicē deorsum procedens, coxendicis articuli<sup>e</sup> ligamento fibrosi nexibus hæret: & arctius quoq; redditum, in latum robustūq; cessat<sup>e</sup> tendinē, qui maiori femoris processu<sup>e</sup> expansus, anteriori ipsius<sup>e</sup> parti, atq; adeò apici innascitur. Hic musculus admodū, idq; præcipuē in musculosis, & non insigniter obesis, liuidus apparet: in quibus & secundus, quā tertio incumbit, pariter liuet: ut etiam tota ipsius pars, primo musculo non obiecta, quę præterquā quod liuet, etiam ualida membrana obducitur, superiori lateri primi musculi pertinaciter ea sede connata, qua illum subit. In obesis autē & præpinguibus, nimis quā parum liuent: imò plerūq; neruæ fibræ, per hos musculos exporrectę, in mulieribus per totam musculi carnosam partem, adipe enutritæ cōspiciuntur, ita cōmodiūs stratum sedenti

Quartus.

bus futuri. <sup>a</sup>Quartus musculus, magna etiam ex parte liuidus, & paulo minus toto teres, nō autem dictorū modo amplius exiit, neq; ceterorū ritu ab ilium osse principiū adipiscitur: at à lateribus<sup>e</sup> trium inferiorū osis sacri ossium, quibus ilium ossa non coarctantur, carneum crassūq; educit caput, non quidem duntaxat ab illorū ossium lateribus enatum, at nonnihil quoq; ita ex illorū interna sede prodians, ut utriusq; lateris musculi sese initijs aliquando in interna ea sede contingant. Hinc ad femoris magnū processum transuersim excurrēs, carneus aliquousq; permanet: & tandem arctior redditus, priusquam femur cōtingat, in teretem cessat<sup>e</sup> tendinē, posteriori maioris femoris processu<sup>e</sup> sedi implantatum, iuxta ipsius<sup>e</sup> summum & apicem. <sup>a</sup>Quintus musculus, sub<sup>b</sup> tribus capitibus, quæ à coxendicis osis appendice pronata, tertium, quartum & quintum tibiā mouentes musculos constituere scripsimus, suum obtinet<sup>e</sup> initium. A<sup>e</sup> tota namq; appendicis<sup>e</sup> sede, tribus modò dictis capitibus non occupata, ad pubis usque regionem, qua inferior pubis ossium<sup>e</sup> commissuræ sedes

Quintus.

habetur,

g 10 12. d.  
uerfus n.  
h 10 12. d.  
2 tab. 3. d.  
tab. 4. d. 3.  
o. 11. d.  
i 10 12. d.  
h 11 c. 1.  
f. 11 c. 1.  
f. 11 c. 1.  
f. 11 c. 1.  
f. 11 c. 1.  
x.

m 10 12. d.  
n 11 c. 1.  
10 12. d.

o 11 12. d.  
6 11 12. d.

p 11 12. d.  
2. c.

q 11 c. 1.  
29 11. d.

r 11 c. 1.  
i.

s 11 c. 1.  
p. 11.

t 11 c. 1.  
30 11. d.

u 11 12. d.  
12 tab. 3.

x 11 c. 1.  
18 11. d.

y 11 12. d.  
2 11 12. d.

z 11 c. 1.  
30 11. d.

a 11 12. d.  
2. c. 1.

b 11 c. 1.  
10 p. 11 c.

c 11 12. d.  
d 11 c. 1.

e 11 12. d.  
29 11. d.

f 11 12. d.  
g 11 12. d.





Quing. prima-  
rum femorum  
musculorum  
munus.

me posteriore[m] huius quinti musculi partem, quæ radici interioris capitis femoris implantatur, oscitante[m] spectasse arbitreris, quòd illam tendine insertionem moliri scripserim, quum interim carneam insertionem in caudatis simijs tentet. Hacenus commemoratis quinq[ue] musculis, tensio femoris primario conceditur, & ijdem quoque femori in motu, qui in latus, & qui circumactum fit, famulantur. <sup>1</sup> Primus enim ualidæ extensionis autor est, femur retrorsum, ac quasi extrorsum in latus magis agens, prout ampli sui principij hanc illa uer partem, aut se simul uniuersum colligit. Secundus autem extēdit quoq[ue] non segniter: sed multo magis quàm primus, femur uersus exteriora in latus sursum agit. <sup>2</sup> Tertius & <sup>3</sup> quartus sursum modicè, ac in posteriora trahentes, femur extendunt: uerum & ad femoris in exteriora circumactum uterq[ue] (sed magis quartus) pulchrè iuuat. At interim ambo infirmius multo huic qui in gyrum fit motui subministrat, quàm musculi, quibus hoc munus peculiariter ac ueluti proprium delegari, paulo post audies. Cæterum <sup>4</sup> quinti musculi fibræ posteriores, seu inusculi illius posterior pars, rectis donata fibris, crus firmum stabilit, ac terræ affigit, femur extendens. Anterioris autem partis posterior portio, non minus id ipsum suis fibris præstat, cum modicâ tamen femoris ad interiora, ac uelut ad aliud femur adductione. Altiores uero fibræ, quæ ofsis pubis <sup>5</sup> cartilagini uicinæ sunt: aut potius anterioris musculi partis prior portio, introrsum ducit femur, flexionisq[ue] quodammodo autor euadit.

Sextus.  
Lib. 2. cap. 1. de  
Anatom. sect.

Nunc enarratis quinque musculis, flectentes opponuntur, qui illis pauciores sunt: nempe tres tantum proprii, quos sextum, septimum & octauum, memoriæ iuuandæ gratia uocabimus. <sup>6</sup> Sextus itaque is est musculus, quem, dum dorsum mouentes recensere[m], ac de lumborum musculis sermo incidisset, Galeni gratia descripsi, quòd is in lumborum musculorū, seu carniū enarratione, ab hominum cōpositione, suis simijs delectatus, aberrauerit. Hic igitur musculus, ex undecimæ & duodecimæ thoracis, & primæ & secundæ & tertiæ lumborum uertebrarū lateribus, carne o enascitur <sup>7</sup> principio: quod simulatq[ue] prodijt, musculum teretem constituit, deorsum obliquè uersus exteriora descendentem. Procurrit enim per interiora ossis ilium, semper carnosus permanens, <sup>8</sup> quousque ad eam ofsis pubis <sup>9</sup> regionem deuenit, quæ coxendicis ofsis nomen assumit. Hic namque in ualidum & teretem cessans tendinem, dictam nunc pubis ofsis sedem transcendit: & deorsum productus, tandem interiori seu minori femoris <sup>10</sup> processui <sup>11</sup> implantatur, elatiorē processum occupans. Musculi huius gratia, ubi pubis ofsi expanditur, sinus aliquis ofsi inculpitur, ligamento læui & lubrico, ac ex osse nato, obductus: ut simul tutò, nec errabundus, hæc sexti musculi tendo descenderet, nec intensus laxatus <sup>12</sup> ue, ofsis duritie uitaretur. <sup>13</sup> Septimus ex tota interiori ofsis ilii <sup>14</sup> regione, tanquam ex semicirculo quoq[ue] carnosam originē accipit: & lato hoc eductus principio, paulatim arctior crassiorq[ue] redditur, deorsum in priora corporis procedens. Ex omnibus enim lati principij fibris, teres efformatur musculus, qui per altiorē ofsis coxendicis <sup>15</sup> regionē uectus, adhuc carnosus, ad minorē femoris processum descendit. Vbi uerò processui uicinius appropinquat, in tere tem quoq[ue] cessat <sup>16</sup> tendinem, qui humiliori eius processu parti, prædicto nunc tendini proximus inseritur. Porro quæ hic musculus super coxendicis ofsis elatiora deorsum tēdit, cauitatem quoq[ue] quodammodo & sinū similiter læuæ & lubricum, ne uagabundus feratur, in osse obtinet: eaq[ue] parte, qua musculus iste finem eū contingit, liuidus, nerueusq[ue], ac ualidus est, ut facilius in hoc ac reflexu, <sup>17</sup> quoties cōtrahitur, laxatur <sup>18</sup> ue, ofsis impetū & duritiē sustineat. <sup>19</sup> Octauus musculus,

musculus, oscitanter secantibus femur mouentium<sup>a</sup> quinti portio censetur,  
 ex pubis osse carneo amploq; initio in homine enatus. Ex tota enim ossis pubis  
 linea, ab anteriori coxēdicis ossis acetabuli sede, ad ossium pubis usq; com-  
 missuram extuberāte, musculus hic principium ducit, quod ad posteriora ad-  
 modum obliquē descendens, æquē amplum tantisper asseruatur, donec bre-  
 uis, sed amplo tendine femoris ossi<sup>p</sup> inferatur. Fit uerò ipsius insertio eregionē  
 parui femoris processūs, in interiori femoris latūs, obliquē deorsum uersus po-  
 steriora tendens. Hic musculus in hominibus liuidum se spectandum offert:  
 at non æquē atq; in caudatis simijs, quibus musculus iste minor, & non simili-  
 ter lato principio enatus conspicitur.<sup>b</sup> Tribus his musculis Natura, ut simul fe-  
 mur flecterēt, & in trorsum uersus alterum crus admouerent, cōmisit. Sextus  
 enim, quem flectentium primum recensuimus, sursum ualidē femur attrahit,  
 flectitq; ad interiora id agens. Septimus similiter femur sursum attollendo fle-  
 cit, sed multo minus sexto uersus interiora admouet. Octauus modicē sur-  
 sum femur contrahit, infirmāq; flexionis autor censetur: uerū femur uali-  
 dē in trorsum uellit, ita profectō, ut flectentes & extendentes musculos, duo-  
 bus quoq; reliquis, ijsque lateralibus ad interiora exterioraque motibus Natu-  
 ra præficeret. Galenus, quum femur flectentium munus in libris de Vsu par-  
 tium recenset, unum tibiā mouentium, femoris quoq; flexionis opificem  
 facit, eum uidelicet, quem nos nonnum enumerauimus, quiq; elatius quā co-  
 xendicis est articulus (quod<sup>c</sup> septimo & octauo tibiā mouētibus haud eue-  
 nit) principium mutuatur: non quod proprio motu musculus id efficeret, sed  
 secundario. Num uerò id ueritati consentiat, tecum expendito, unā animad-  
 uertens, an cæteris quoq; tibiā mouentibus, qui elatius quā femur consi-  
 stit, aut non ab ipso femore principium mutuantur, aliquod in femoris moti-  
 bus officium ascribere uelis. Ego, quo minus id faciam, ex multis musculis ra-  
 tionem sumo, qui non ex osse, quod mouendo, aut cui inferuntur ossi proxi-  
 mum est, originem ducunt: cuiusmodi in tibiā & cubito & brachio occurrūt  
 permulti, quibus secundarium munus (uti hic fecit Galenus) à nemine, idq;  
 meritō, attribuitur. ut taceam, si uera esset Galeni sententia, debuisse femoris  
 flexionem cum tibiā extensione semper cōcurrere, aut saltem homini femoris  
 extensionem, extensa tibiā, molestam esse: quemadmodum flexis in uolani  
 digitis, ægrē brachialis extensionē ferremus: aut brachio retrorsum acto, non  
 lubenter cubitum flecterēmus. Posthabitis itaq; secūdarijs illis, aut ex acciden-  
 te euenientibus Galeni musculorum functionibus, duos, qui adhuc supersunt,  
 ac femur contorquent, musculos sermōni addamus, eos nonum & decimum  
 enumerantes. Nonus igitur sub<sup>e</sup> octauo nobis cōmemorato occultatus mu-  
 sculo, anteriorem<sup>f</sup> foraminis ossis pubis regionem sibi uendicat, hicq; ex ossis  
 & membranæ foramen occupātis amplitudine principium ducit carneum,  
 & anteriori sede liuens, elegantisq; musculi speciem præ se ferens: qui transuer-  
 sum in exteriora, secundum posteriora coxendicis articuli, & ceruicis femoris  
 superiora ductus, ac sensim angustior redditus, ualido satis & utcunq; amplo  
 tendine insertionem molitur, in magni femoris processūs<sup>g</sup> sinum, qui femo-  
 ris ceruicem & caput, ossis coxendicis acetabulum subintrans, è directo respi-  
 cit. Decimus internam dicti nuper foraminis sedem occupat, & nono lon-  
 ge ualidior, principium ducit à tota<sup>h</sup> linea, quæ ab interna ilium ossis sede, qua  
 primi ossis sacri ossis transuerso processui committitur, per internam coxen-  
 dicis ossis & pubis ossis regionem, ad pubis usq; ossium cōmissuræ elatiorem  
 partem procedit. Latum hoc principium, quod ueluti tribus lineis seu inscri-

Sextus, 7. et 8.  
munus.Nonum aliqui  
musculi secun-  
dario femur  
flectant.  
Lib. 15.

Nonum.

Decimus.

ptionibus insignitur, carnosum est: & totam internam ossis pubis & ossis coxendicis sedem occupans, liuidumq; apparens, sensim ad eam arctatur, ut eius amplitudo coxendicis ossis interuallū non uincat, quod inter acutum ipsius processum, & posteriorem sui appendicis sedem habetur. Ad hoc enim interuallum, quod amplum sinum sibi insculptum gerit, decimus musculus extrorsum<sup>6</sup> reflectitur, magnum femoris accedens processum. Hunc sanè reflexum magna Cōditoris industria musculus molitur: quā enim ad<sup>h</sup> sinum hunc circumuoluitur, externa parte carnosus est: ea autē parte, qua sinū tangit, omnino neruofus cōspicitur, & ueluti tres teretes cōmonstrat tendines, serie quadam ad sinum reflexos. Tendines hi in musculi substantia, paulo anteaquā musculus sinum contingat, lati existunt: sed quā sinui obuoluūtur, strictiores euadunt, singuli rursus in magno hoc sinu peculiarē sinum sibi uendicantes. Amplius enim sinus duas leuiter extuberantes ostendit lineas, quæ transuersim ductæ, illum ueluti in tres partiūtur, tribus eius musculi tendinibus cælatos. Tendines, ubi sinum superarunt, inuicem collecti, in unum finiunt tendinem, sinui magni femoris processus unā cum nono musculo implantatum. Quum itaq; tres hos tendines, qui exteriori parte carnem obnatā habent, intueberis, facile colliges, hic Naturam decimo musculo robur additum uoluisse: ne si carneus omnino esset (uti & de septimo femur mouentiū musculo superius monuimus) in reflexu & motu, ossis duritia compressus laceraretur. Vnde etiam sinui ligamentum, seu crassa ualidaq; membrana obnascitur, ne ossis contactus musculum in reflexu uitaret. Ad hæc, ligamentum id læuē admodum, & uiscido unctuosq; humore oblitum est, quo facilius musculi ad sinum efficeretur circumacti. Quod Naturæ artificium in rotulis & cardinibus sedulo imitatur, non solum motum accelerantes, uerū ut seriū, qui reflectitur funis, attritu corrumpatur, studentes. Præterea ut solo rotulæ sinui funem non committimus, sed rotulam in trochlea aut furcula (ne ex sinu funis labatur) firmamus: ita quoq; Natura, ossium sinu non contenta, à superiori sinus parte unum, & ab inferiori alterum eduxit musculum: qui ambo unā cum decimo porrecti, illum, quo minus sua sede declinet, quodāmodo asseruant. Ab acuto enim coxendicis ossis<sup>m</sup> processu carneus enascitur musculus, superiori parti decimi musculi, ad ipsius usq; insertionem adnatus. Deinde ab<sup>h</sup> appendice quoq; ossis coxendicis, alius similiter carnosus & gracilis prodit, inferiori decimi musculi sedi ad insertionē usq; exporrectus. Vterq; enim in sinum magni femoris processus, insertionē cum decimo molitur, & cum ipso circūductui femoris subministrat. Cæterū subinde non solum eiusmodi musculos ad elatiōē & humiliorem reflexus seu orbitæ sedem pronasci conspicias, imò etiam ab interna regione, ubi iam flexus ac orbita non amplius obliquatur, carnosam substantiam à coxendicis ossē enasci obseruaturus es: quasi<sup>p</sup> tres illi tendines in<sup>q</sup> carnem à coxendicis ossē pronatam substantiam, post illorum circumactum immitterentur, itaq; inuoluti, ad magnum femoris processus contenderent. In tuo igitur est arbitrato, aut hos musculos, aut carnem molem, tendines excipientem, decimo iungere, itaq; proprios femoris musculos decem enumerare: aut si mauis, utrunq; distingues, & duodecim recēsebis. Rursus si quintum musculum in tres diuiseris, omnes erunt quatuordecim. In nostro itaque numero decimus unā cum duobus illis gracilibus femur in posteriora circumagit, nonus uerò in anteriora, nihilo secus, quā si baculum inter duas manus extensas repositū, alternatim in priora & posteriora ductis manibus, circumuerteres. Hactenus itaq; quā potui uerissimè, femur mouentes musculos recensui:

*Carnea portio-  
nes, decimo mu-  
sculo asseruæ.*

*Quæ femur  
mouentes mu-  
sculi possint  
consistui.*

e 15 tab. 7  
G cox  
clatur ad  
H.  
f 2 fig. cap.  
29 lib. 1 in  
ter d 7 h  
g 12 tab. 4.  
h 12, 13 fig.  
cap. 29 lib.  
1 h 12, 13, 14, 15.  
i 13 tab. 6  
t. u.

h 1 fig. cap.  
30 lib. 2 h.

l unum m  
tab. 2, 12 h.  
13 x. 14 f.  
alter eum  
dem tab. 4.  
2, 3, 4.  
m 1 fig. cap.  
29 lib. 1 d.  
n 1 fig. cap.  
29 lib. 1 h.

o 13 tab. 7.

p 13 tab. 6  
t. u.  
q 13 tab. 6.  
2, 3.



quem horum  
musculorum or-  
dine Galenus  
instituit in li-  
bro de Admini-  
stratione differt.

cenſui: quos poſteaquam diligenti ſectiōe uideris, ac ſimiam hic hominis fa-  
bricæ adhibueris, licebit ſecundum librum Galeni de Adminiſtrandis ſectio-  
nibus accuratè euoluere, augurariq; quam iſ tandem ſeriem in horum muſcu-  
lorum enarratione obſeruet. Diuinandum enim potius, & cōijciendum inibi  
eſt, quàm certò aliquid ſtatuendū, in primis, quum nemo non ſibi hodie con-  
ceſſum putet, ſibiq; non deroget, Galeni ſcripta ex libito emutare, & non uul-  
gariter deprauare: quum alij ipſius ſcripta neſcitūq; aſſequantur, alij autem  
illa homini, non autem ſimijs conuenire cupiant: id tandem præſtituri, ut neq;  
homini, neq; ſimijs, Galeni ſcripta à ſtudioſis in poſterum accommodari poſ-  
ſint. Quo tamen per ea, uti adhuc ſeſe habent, meliùs, & tanquam filo quodam  
ducariſ, addam, me ipſius ſententiam ſic modò aſſequi, ut arbitrer Galenum  
eum muſculū primo loco enarrare, quem quintum appellauimus: dein ob-  
iter eum deſcribit, quem nonū ſtatuimus, quemq; poſtea Galenus plenius ag-  
greditur. Poſt hunc octauum, in ſimijs aliter quàm hominibus conſpicuum,  
pertraçtat: & inſuper ſextum & ſeptimū ſibi proponit, at uariè admodum,  
& ob hominis hic cum ſimijs diſcrimē, per quàm obſcurè. His ſuccedunt pri-  
mus, ſecundus, tertius, & quartus, in ſimijs quoq; aliter quàm in hominibus  
ſeſe offerentes: ac denuò nonus, & poſtremo decimus. Quàm uerò interim  
& horum muſculorum hiſtoria & munus à Galeno inibi commemorentur,  
promptè dijudicabis, ſi, quemadmodum prius monui, mea ſcripta cum Gale-  
ni ſententia, quæcunq; tandem fingetur, & quouis pacto ipſius libri indies ma-  
gis uitabuntur, ſedulo, adhibita quoq; rerum inſpectiōe, contuleris.

MUSCULORVM FEMVR MOVENTIVM  
adminiſtratio. Caput LVII.



ORVM qui femoris motibus præſunt muſculorum ad-  
miniſtrationem, ab extendentibus merito in illo crure, in  
quo tibi motores aggreſſus es, exordieris. Aſſumpta itaq;  
ex minis fragili ferro nouacula, quæ oſis impetū aliquan-  
do ſuſtineret poſſit, primi muſculi caput (ſi modò, dum  
mouentes tibi muſculos diſſecares, illud non abſtuleris)  
ab oſſe coccyge, & ilium oſis ſpina dorſoq; tranſuerſis ſe-  
ctionibus nitèris abradere, quouſq; in ſecundum muſculum incidas. Quan-  
do autem uniuerſi muſculi principium ab oſſe deaſum erit, licebit hoc refle-  
ctere, & ſolis manibus (niſi nouacula quoque uti uoles) à ſubditis partibus ad  
magnum uſque femoris proceſſum liberare. Quod ubi præſtiteris, ipſius lon-  
gam intueberis inſertionem, procul etiam ſub magni femoris proceſſus ra-  
dice deſcendentem. Hæc enim non uulgariter uenit perpendenda: uti neque  
huius muſculi forma, ſubſtantia, fibrarum ductus, & munus, uel abſceſſuum  
duntaxat nomine, quos crebrò in ipſo, & præcipuè iuxta magnum proceſſum,  
in illius tendine incidimus. Secundus dein pariter ab ilium oſſe nouacula di-  
rimendus eſt, mente adhibita, ne tertij quoq; principium unà adimatur. exor-  
tus enim cōtinuitas, quæ linea duntaxat interſtinguitur, utrunq; muſculū unà  
facile auferri ſinit. Vbi itaq; ſenſim reflexo ſecūdi muſculi initio, & tranſuerſis  
ſemper ſecundum iliū oſis dorſum factis ſectiōnibus, ad tertij muſculi princi-  
pium deuenieris, ſecūdus iam totus uenit reflectendus, & manibus attractus, ad  
inſertionē uſq; ad tertio diuellendus. Tertius quoq; eadē ratione ab oſis iliū dor-  
ſo, poſt ſecundū abradetur: atq; hoc ad ipſius etiā inſertionē deducto, quartus  
ab oſis ſacri laterib; cultello auferetur, & manibus apprehenſus, ad magnū uſq;

Primi muſculi  
adminiſtratio.

Secundi.

Tertij.

Quarti.

femoris processum, à ligamento, cui innititur, & coxendicis articulo, dirime-  
 tur. Facillima enim horum quatuor musculorū, postquam primū administra-  
 ueris, est aggressio: qua obita, licebit singulorum motibus examinatis, omnes  
 abijcere. <sup>Quintum</sup> post hos musculū à coxendicis ossis infima sede, & pubis  
 osse, acutiori nouacula simul totum callidè abrades: & hunc ad suam in femur  
 insertionem perducēs, eam accuratè obseruabis, non neglectis ipsius musculi  
 inscriptionibus, seu delineamētis, fibrarumq; ductus differētia. Animū etiam,  
 dum hunc præscindis, accommoda, ne simul quoq; <sup>o</sup> octauū musculū, tanquam  
 quinti partē, incautus auferas. <sup>Quinto</sup> itaq; à femore rescisso, acutiori cultello  
 à lateribus corporū undecimę & duodecimę thoracis uertebrarū, & trium  
 primarum lumborū, sexti musculi caput uenit liberandū: & capite eius appre-  
 hensō, totus musculus ad parū usq; femoris processum, à subditis est dirimen-  
 dus: quod, si uoles, solius manus ope perfeceris. nisi fortè & hunc musculū,  
 quum dorsum mouētes administrares, iam dudū inspexeris. Postquam uerò  
 ipsius tendinē, & quo super pubis os fertur, sinū indagaueris, septimus oppor-  
 tunè aggreditur. Hunc itaq; nouacula trāsuēris ductis sectionibus, ab interna  
 ossis ilium sede, ad coxendicis usq; os, quā descendit, erades: & musculo mani-  
 bus eleuatō, ad minorē usq; femoris processum, ipsius insertionē consideratu-  
 rus, detrahes, non præterita interim sinus sui, quo deducitur, inspectione. Mox  
 octauum trāsuērsā lineā à pubis osse abscētū, usq; ad insertionē, quæ similiter  
 suo principio lata est, diuelles: obseruās interea, ne nonū quoq; imprudēs adi-  
 mas. Duo qui adhuc supersunt musculi, quoniā pubis ossā, dum uesicæ & fe-  
 dis spectares musculos, dirēpta sunt, atq; iam unum tantū crus, in quo tibiam  
 mouentes musculi administrabas, ad manū habes, facillè secabūtur. Nonū itaq;  
 & decimū à pubis osse & coxēdicis abrades, & ipsorū connexum & in maio-  
 ris femoris processum sinum implantationē examinabis, nequaquā perfuncto-  
 riē præteries decimi reflexū, & quæ ad huius latera undiq; nascitur, musculo-  
 sam substantiā, cum decimo musculo ad insertionē usq; ipsius exporrectā. His  
 femur circūuertentibus resectis, mēbrana se spectandā offert, totū pubis ossis  
 foramen comprehendens, & hoc loco sibi utrinq; incumbētēs musculos diri-  
 mens. Similiter etiā ab acuto coxēdicis ossis processu, in quinti sacri ossis latūs  
 durū ligamentū produci cōtueberis, cui quartus femur mouentiū musculus  
 innitebatur, quodq; hæc ossā firmiūs cōmittit. Deinde aliud iādudū sese obtu-  
 lit, ab eodē sacri ossis latere, cui nuper dictū inseritur, enatū, atq; in posteriore,  
 illicq; elatiore coxendicis ossis apēdicis sedem insertū, quod recti intestini,  
 ut & mox in enarratione præcedēs, musculorū firmamentū efficitur. Articuli  
 uerò coxēdicis ligamēta, unā cum genu articuli & pedis ligamētis, in unū Ca-  
 put reijciā, pedē & ipsius digitos mouentiū musculorū sermoni subnectendū.

DE LATESCENTE TENDINE, CVTI  
 plantæ subnato. Caput LVIII.



Ordo in reli-  
 quorum adhuc  
 musculorū tra-  
 ctatione obser-  
 uandus.

MNES quos hætenus non commemorauimus muscu-  
 li, in tibia & pede reponuntur, pedis ipsiusq; digitorū mo-  
 tibus famulantes. Quo autem & hi aptiūs pertractentur,  
 primū pedis motores recensēbimus, & deinde qui digi-  
 torum duces existunt: ut tunc postmodum, quot quaq;  
 sede reponantur, unā colligentes, eorundem administra-  
 tionem subnectamus. Verū quanto Galeni oratio in se-  
 cundo de Administrandis sectionibus obscurior imperfectiorq; est, & non un-  
 diq;

*Magna simia  
ad hominem  
differentia.  
Lib. 3 de Ad-  
ministr. sect.*

*4 15 musc.  
lib. 9. de in-  
S. 1.*

diq; suis in tertio de Partium usu placitis respondet, tanto eiusmodi musculo-  
rum diligentior nobis sermo instituendus uenit. Neq; profectò cum Galeno  
arbitrari conuenit, simiam ab homine duntaxat in pedis digitorum diductu  
differre: quòd scilicet simia longiores & magis discretos digitos, quàm homi-  
nes, adipiscatur: & insuper quòd<sup>1</sup> unico tantum tendine simia hominem uin-  
cat, quem Galenus ad tarsum reflecti, cartilagineumq; inibi fieri, ac in pedij os,  
pollicis præpositum, inferi docet, musculi tendinem intelligens, quem nos pe-  
dem mouentium septimum statuemus: quiq; talem in homine profert tendi-  
nem, qualem Galenus priuatim simiæ tribuit, & quo hominem, falsam propo-  
nens differentiam, priuat: facileq; attestatur, quàm hominis pedem nunquam  
sectione aggressus fuerit. Verùm aliàs homini cum simia in musculis, eorun-  
demq; tendinibus, magnum est discrimen: quod si non uniuersum, ne proli-  
xior siam, explicuero, prout tamen orationis series, in eorum qui adhuc com-  
memorandi supersunt musculorù historia, suppeditabit, id quod animo mihi  
obuersabitur, lubens enarrabo, amicè studiosos hic admonens, ut non solum  
uera hominis musculorum enarratione & inspectione còtenti, simiam quoq;  
aggrediantur, quo Galenum (qui nusquam æquè ac in Anatomie arduus est)  
facilius intelligant: ne quum hunc (ut profectò debemus omnes) profiteri  
instituerint, suos præceptores imitati, elegantissimam maximamq; ipsius libro-  
rum copiam, qui Anatomica còplectuntur, negligant: & solum illis quos qui-  
uis mediocriter in liberalibus studijs eruditus, citra omnem præceptoris ope-  
ram assequitur, sese totos dedant: memores, quàm turpiter in leuib; Galeni  
operibus pedem, qui sese Galenicis hodie appellitât, retrahere cogantur, quo-  
ties in sectionis & corporis partium mentione Galenus incidit. Incidit autem  
creberrimè, tum quòd dissectionibus mirificè oblectabatur, tum quòd medi-  
co in corporis quòd sibi curandum proponit, mentione subinde sit prorum-  
pendum. At age, tendinem plantæ cuti subtensum aggrediamur, in quo in pri-  
mis homo à simia egregiè differt. Hæc namq; propriû, qui hunc producat ten-  
dinem, obtinet musculus, ab externi femoris capitis radice in posteriori sede,  
carnoso principio enatum, & sub<sup>2</sup> duobus musculis occultatum, qui ab infe-  
rioribus femoris capitibus enati, prominentem in sura partem efformare, atq;  
in calcis os inferi dicetur. His itaq; musculis is simiæ musculus coopertus, deor-  
sum carnosus fertur,<sup>3</sup> illi forma perquam similis, qui latum in manu producit  
tendinem. Postquam uerò ad medium usq; longitudinis tibie descendit, in gra-  
cilem cessat tendinem, qui duobus illis musculis non amplius obtectus, ad ho-  
rum tendinis, quem ipsi producant, internum latus porrigitur, declius ad po-  
steriorem calcis sedem descendens: quæ priuatim in caudatis simijs, ut & ca-  
nibus, sinum sibi exculptû gerit, quo hic tendo non errabundo ductu tutò ue-  
hitur: calcis osi interim, nisi fortassis transuersi alicuius, quo obducitur, liga-  
menti interuentu, non adnatus: atq; in hoc à Galeni descriptione in primo de  
Administrandis sectionibus libro uarians, quòd in duas non discindatur par-  
tes, altera quidem calcis insertus, altera uerò in latum tendinem explicatus. Cal-  
cem enim totum superat, & in pedis plantam dilatur,<sup>4</sup> musculo, quem secun-  
dum quatuor digitorum articulum flectere audies, obnatus, manifestusq; in  
inferiorem quinq; pedis digitorù sedem protensus, quàm latus manus tendo  
digitos accedit. Deinde ut latus tendo manus cuti citra alicuius corporis me-  
dium non adnascitur, ita neq; in pede: quandoquidè multus adeps tendinem  
& cutem intercedit, idq; potissimum in hominibus, quibus nullus omnino  
musculus latum tendinem educit. Verùm ab infima calcis parte, qua terræ in-  
nitimur,

*13 tab. m.  
14 f.*

*15 tab. 8.  
16.*

*17 tab. 1.*

*18 tab. 2.*

*Simia ab ho-  
mine in tendi-  
ne pedis subna-  
to differentia.*



nititur,<sup>1</sup> ualidum ligamentum prodit, totam inferiorē pedis amplitudinem subiens, si unum utrinq; musculū exceperis, cui id non obducitur. In interno quidem pedis latere is<sup>2</sup> musculus est, qui pollicem à cæteris abducere dicitur: in externo autem,<sup>3</sup> qui minimum digitum à cæteris amouet. Obnasçitur itaq; hoc ligamentum longè manus tendine crassius & robustius, toti inferiori fedi eius<sup>4</sup> musculi, quem secundos quatuor digitorū articulos flectere docebimus. Atq; id eo fit pacto, ut quis propriam eius musculi membranā hoc ligamentum diceret: nisi iuxta digitorum radices, quā eius musculi tendines transuersum quatuor digitorum ligamentū subeunt, id à musculo abscederet: & dein transuersis digitorum ligamentis obductum, ac in quinq; partes discretū, inferiori quinq; digitorum fedi obnasceretur. Ceterū (uti etiam paulo antè monuimus) plurima duriusculi adipis copia ligamentū id (aut utcumq; appellare tibi uisum sit) & cutem intercedit: quanquam interim fibrosis nexibus admodum frequentibus ipsi cōmittatur. Eiusmodi itaq; ligamentum priuatim homines tendinis lati uice fortiuntur: quod si fortè ab aliquo ducendum fuisset tendine, profectò illum ualidum crassūq; admodum procreari oportuisset. Nam si manus tendinem cum hoc corpore ligamentoso contuleris, quadrupla tendinis per cubitum exporrecti crassities in tibia neutiquā suffecerit. Nilominus tamen in posteriori hominis tibiæ sede<sup>5</sup> musculus reponi audies, qui carnosio principio ab exteriori femoris capite enatus, & carnosus, priusquam bene poplitem superauit, esse desinens, tendinē producit, longè illo qui manus latum tendinem emittit, graciliore. Verū hic tendo, pedis plantam hæcenus mihi neutiquam subire uisus est: at interno calcis lateri, ad posteriorem ipsius sedem implantatur, neutiquam summè posticam calcis sedem, ut ille caudatarum simiarum musculi tendo, attingens, multoq; adhuc minus finem in hac calcis osis sede sibi uendicans, quo non errabūduſ uehatur. Quod uerò mihi commemoratum in hominis pede ligamentum, & simiæ latus tendo, parem usum cum lato, qui manum subit, tendine præsent, conformationis similitudo argumento est. atq; id eo adhuc firmius persuadet, lati in manu tendinis non infrequens defectus. Haud semel enim illum in manu deesse, & transuersum in interna brachialis sede repositum ligamentū, sui portionem porrigere, quæ tendinis lati uicem supplebat, in homine secus multo quā in simijs comperi. Vti etiam à<sup>6</sup> tendinibus brachiale flectētibus, eum tendinem produci, interdum obseruatum est, nunc ab illo qui quarto brachialis osi inferitur, nunc ab illo qui per transuersum brachialis internæ sedis ligamentū ductus, post brachialis osi indicem suffulcienti multo antè inferi dicebatur.

DE MUSCULIS PEDEM MOVENTIBUS. Caput LIX.

Pedis motus.



Trinus pedem mouentium.

EDEM uniuerſum perinde ac manū flectimus & extendimus, & deinde in latera ducimus. Quibus autem id fiat articulis, in pedis osium enarratione, superiori libro non obiter percurrimus: hic pedem mouētium musculorum historiam, à posteriore tibiæ sedem occupantibus, opportunè inchoaturi. Primus itaque à radice interni femoris genu articulum<sup>7</sup> capitis, unico enascitur principio, si modo ipsius continuitate spectes. si autem substantiæ animū attenderis, id principium duplex apparebit: unum quidem superius, & magis iuxta femoris medium interius:<sup>8</sup> alterū uerò inferius, & nonnihil exterius, pari omnino modo, quo re-

d 13 tab. 9.  
1 d 13 tab. 1.  
8 p. 9. 1. 16  
7. 14. 11. 16  
d.  
b 1 p. 1. 1. 1. 1.  
30 d 13 tab. 1. 1.  
e 13 tab. 1. 1.  
d 13 tab. 1. 1.

11 tab. 5. o. quo rectum abdominis musculum<sup>e</sup> enasci retulimus. Superior namq; princi-  
 pij huius musculi pars, carnea lataq; est: & deorsum protensa, paulo sub genu  
 articulo cum reliqua initij parte cōfunditur, quæ exactè neruea liuidaq; in ex-  
 ortu erat: & deorsum recta per genu articuli posteriora descendens, ualde car-  
 neum crassumq; efformat musculum, qui formam exacti (ut sic dicam) mu-  
 sculi refert. Priusquam uerò ad medium tibiæ lōgitudinis, iam angustior red-  
 ditus, pertingat, carnosus esse definit, & ex suæ inferioris partis amplitudine  
 tendinem latum educit, in cuius medium aliquandiu adhuc carnosa musculi  
 pars porrigitur. Hic itaq; musculus in interno posterioris tibiæ sedis latere du-  
 citur: in externo autem latere<sup>e</sup> secundus musculus consistit, qui ab externo fe-  
 moris capite enatus, deorsum fertur, omni ex parte primo musculo similis. *Secundus.*  
 Quum uerò utriq; à femoris capitibus deorsum tendunt, non procul ab exor-  
 tu sese<sup>h</sup> contingunt, inuicem fibrosis nexibus hērentes. & quo magis deorsum  
 prorepunt, eo ualidiùs connascuntur: ut iam tendo, quem ambo producant,  
 unus omnino existat. Interior tamen, seu primus musculus, prolixiùs nonnihil  
 carneus, quàm secūdus, deorsum ducitur: quod in musculosis citra cōfectio-  
 nem est euidentissimū. Duo enim in sura prominentes musculorum uentres,  
 carneæ partes sunt præsentiu musculorum, suræ magnam molem efforman-  
 tium. Tēdo autem ab ambobus musculis enatus, & paulo angustior redditus,  
 in caudatis simijs in posteriorem calcis sedem ualidissimè inferitur. In homini  
 11 tab. 1. u. bus uerò non multo sub carnosa musculorum sede, subiecto cuidam<sup>k</sup> muscu-  
 lo<sup>l</sup> adnascitur, quem quartum inter pedis motores recēsebimus. Atq; hic con-  
 nexu adēdō est pertinax, ut nulla ratione hunc tendinem ad calcem usq; à sub-  
 iecto musculo dirimere queas, & asserere cogaris, ab hoc tēdine & quarti mu-  
 sculi tendine<sup>n</sup> unum efformari, in posteriore calcis sedem insertū. Ac proinde  
 etiam fortè Galeno succensebis, dum alios sectionis professores falso increpat,  
 quòd duorum primorum musculorum tendines tertio cuidam tendini com-  
 misceri, neq; alteri non connexos in calcem inferi scripserint. Hoc namq; uerè  
 de hominibus illi prodiderunt, parum solliciti, num tendines secus in simijs cal-  
 ci implantarentur. Duobus his musculis hoc priuatim inter cæteros ferè to-  
 tius corporis obigit, quòd in ipsorum capitibus non procul ab exortu singula  
 innascuntur sesamo comparata ossicula, quæ lēui sua & lubrica superficie, qua  
 ex musculorum eminent substantia, læuem spectant inferiorum femoris ca-  
 pitum superficiem, cui innituntur, cuiusq; uim & impetum excipiūt, sic com-  
 muni sesaminorum ossiculorum usu ad robur musculorum haud obiter con-  
 ducentia. <sup>o</sup> Tertius musculus ille est, quem superiori Capite tendinē insigni-  
 ter gracilem producere diximus. Ab externo enim femoris capite teres enasci  
 tur principium, iamiam in ipso exortu carneum & gracile. Ab ortu tamē non  
 ita procul dilatescit, exacti musculi uentrem utcunq; crassiusculum referens:  
 uerūm mox sub poplite uenter iste<sup>o</sup> gracilescens, summè gracilem tenuemq;  
 educit tendinem, qui quemadmodum & musculi uenter, sub duobus nuper  
 commemoratis musculis occultatus, & super quartum expansus, sensim obli-  
 què deorsum prorepat, quousq; ad internum duorum primorū musculorum  
 tendinis latus<sup>o</sup> elabatur, ubi is quarto musculo ualidissimè cōnecti incipit. Ter-  
 tij musculi tendo hinc deorsum ad internum usq; calcis latus fertur, iuxta po-  
 steriorem calcis sedem ipsi implantatus, non autem pedis plantam subiens, il-  
 lius musculi modo, quem in simia latum plantæ tendinem educere, priùs re-  
 censui. <sup>o</sup> Quartus non solūm suram cōstituentium musculorū, uerūm etiam  
 omnium tibiam amplexantium maximus, posteriorem tibiæ regionem sua  
 ampli-

Lib. 2. de Ad-  
minif. scil.

Tertius.

Quartus.

amplitudine occupat. <sup>r 13 tab. A</sup> Enascitur enim ex posteriori sede <sup>s 1 fig. 4 p.</sup> coarticulationis fibulæ ad tibiam, nerueo & ualido initio, quod deorsum modicè ductum, adeò dilatescit, ut latitudinem tibiæ ossis & fibulæ uincat: non tamen æquè crassus est, ac latus, amplius uè. Ex hac uerò amplitudine, priusquàm medium tibiæ longitudinis superauit, sensim arctatur, & paulo supra calcis regionem in ualidissimum & crassum degenerat tendinē, non solum ab ipso <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> formatū, sed etiam à primi & secundi musculi tendinis concursu. Ex tribus itaq; his musculis procreatus tendo, uniuersæ posteriori calcis <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> sedi implantatur, quam Natura, quo facilior promptiorq; tendinis perficeretur insertio, depressam asperamq; effinxit. Cæterum quia calcis os extra tibiæ ossis rectitudinem <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> \* prominet, & ipse quartus musculus propemodum toto progressu tibiæ ossi & fibulæ incumbit, paulo ante insertionem tendo à tibiæ ossē procul <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> abscedit, triangulam efformans cavitatem, cuius basis est longitudo calcis extra tibiæ ossis rectitudinem prominentis: alia autem duo cavitatis latera cōstituuntur, unum quidem tendinis ipsius anteriori sede, alterum uerò posteriori regione illorum <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> musculo rum, qui sub quarto reconditi, posteriorem tibiæ regionem occupant. Atque hæc ea demum est cavitās, cui Homerus Achillem in Hectoris crure funem traiecisse, illumq; ad currum religatum, circum moenia Troiæ traxisse cecinit. Quod etiam lanios, quum boues aut oues iugulatas attollunt, imitari conspiciamus, baculum transuersim sub hoc tendine transmittentes. Porro quartus musculus externa posteriori <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> ue sede, qua primi duo, illi incumbūt, admodum liuidus est: quemadmodū & primus quoq; & secundus, ea potissimum parte, qua quartum respiciunt musculum. Interna uerò, seu anteriori sede, quartus non admodum luet: & ipsius etiam tendo in anteriori sede longius carniformi substantia enutritur, quàm in posteriori. Non enim à fine carniformis musculi huius substantiæ, ad calcem usq; <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup>, insigne interuallum in hominibus uisitur, quamuis & id quoq; notatu dignum sit. In simijs uerò quartus hic musculus quodāmodo etiam carneus calci inferitur: quod Galenus animaduertens, alios Anatomicos insinuat, quos hominum cadauera, non autem cum ipso duntaxat insimiarum, secuisse, uel ex ijs constat, quæ præter meritum illis à Galeno imponuntur, digno sanè qui interdum (nisi ipsius obstat autoritas, & quam illi tribuimus fides) à nobis notaretur, idq; tunc potissimum, dum pro hominum Anatome, suarum simiarū historiam, secus ac ueteres illi, nobis obtrudit. <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> Quintus pedem mouentium musculus, in posteriori etiam tibiæ sede locatus, sub <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> duobus musculis adhuc occultatur, quos digitorū pedis flexui famulari docebimus. Priusquam enim quintus in conspectū ueniat, <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> quatuor commemoratos iam pedis musculos, pariter cum duobus illis, digitorū flexui subseruientibus, ademptos esse conuenit. Quintus namq; <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> ligamento membraneo proximè incumbit, quod secundum tibiæ longitudinem, tibiæ ossi fibulam colligat. Principium siquidē quinti musculi, à tibiæ ossē & fibula, quæ hæc ossa inuicem dehiscere incipiunt, exoritur, & statim ab exortu carneum latumq; uisitur, eadem prorsus latitudine ad inferiorem usq; tibiæ ossis appendicem progrediens. Hac latitudine præfens musculus posteriorem illius membranei ligamenti sedem, & magnam quoq; posterioris tibiæ ossis regionis partem integit, ligamento interim & interno fibulæ lateri adnatus, ab ipsiq; toto progressu, exortus sui robur asciscens. Cæterum ilico atq; inferiorē tibiæ con <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> <sup>u 2, s. fig. cap. 33 lib. 1.</sup> tigit sedem, & propemodum æquè latus adhuc, atque in media tibiæ regione conspicitur, ab interno ipsius latere teretem profert tendinē, qui iam aliquotusq; in musculi carniformi substantia incipere uidebatur. Est enim hic musculus ex

lib. 2 de Ad-  
minis. lib. 2  
3 lib. de resu  
partum.

Quintus.

f 15 tab. B







integritur: sed in priora prominens, anteriori septimi tendinis lateri attēditur, & sinui in posteriori fibulæ appendicis sede exculpto incumbens, transuerso etiam ligamento circumdatur. Hinc rursus in priora descendens,\* processui pedij ossis ualidissimè inseritur, quod tesseram referenti ossi adnexum, paruum pedis digitum sustinet. Verùm hic tendo, aliorū hactenus dictorum ritu, non simplicem<sup>7</sup> insertionem perficit: uerū nōnihil ante ipsius insertionem tendo bicornis redditur, duplici & lata (ne fortè tereti & simplici nimium extuberaret) insertionem dicto ossi implantatus. Neq; est, quòd quispiā Galeno confusus,<sup>8</sup> sextum nobis commemoratum musculum, in duos quoq; tendines diuidi arbitretur. Hominibus enim ad eum quem scripsi modum, sextus musculus habet, aliter sanè, quàm in caudatis simijs obseruatur: non enim in his tantum duplex tendo uisitur, uerū etiam duo sunt musculi, admodum conspicui, quorū anterior posteriore minor est, ambo in pedij os pollicis præpositum implantati. Cæterū quando his (etsi ad Galenum intelligendū iuuent) non admodum concinnè sermonē uera enarrantem interpellimus,<sup>9</sup> nonum musculum iam prædictis addamus: quem quis proprium per se musculum recensere poterit, alius uerò cuiusdam<sup>10</sup> alterius partem non ineptè dicet: prout nimirum ille motui & insertioni, hic uerò connexui & principio attenderit. A musculo enim, qui in anteriori tibie sede locatus, quatuor pedis digitos extendit,<sup>11</sup> carnosa quēdā portio iuxta medium tibie longitudinis, ab externo ipsius latere enascitur: quæ deorsum ducta, in tendinem degenerat, qui<sup>12</sup> transuersum anterioris tibie sedis ligamentum subit: & superiori pedis regioni expor rectus, fibrosusq; nexibus<sup>13</sup> musculis succumbentibus commissus, in duas portiuunculas bipartitur, quas pedij ossi, paruum digitum suffulcienti, latè inserit, non procul ab eius ossis superiori sede, quæ imitanti tesseram ossi alligatur. Nihil itaq; prohibet, hunc musculum aut partem digitos extendentis recensere, aut illum numero ab extensionis opifice distinguere, illumq; nonum pedem mouentium musculum enumerare: ut hactenus descripti, nouem censeantur, pedis motibus famulantes: quorum primus & secundus & quartus,<sup>14</sup> qui suram seu tibie uentrem præcipuè efformant, robustissimi pedis motus autores sunt. Calcem enim sursum in posteriora trahunt, pedemq; terræ firmant, seu in posteriora deorsum reflectunt. atque his<sup>15</sup> quintus suppetias fert, pedem quoq; terræ admouēs, & interdum, ut summis tantum digitis erigi queamus, in posteriora ducens. Quod uerò munus tertio pedem mouentium<sup>16</sup> musculo concedatur, non ita affirmare possum. nam latum tendinem in pedem non producit, & sanè inualidior uisitur, quàm qui cum insignibus illis quatuor musculis in pedis extensione conferri queat. Si tamen hunc tantum opus subire posse quis crediderit, id addendum prorsus erit, eum obliquo & in internum<sup>17</sup> latus, pedis motui suppetias ferre. Cæterū<sup>18</sup> sextus & septimus, unā cum<sup>19</sup> octauo & nono, contrarij quàm primus, secundus, quartus & quintus musculi, motus, quum simul tenduntur, duces sunt: pedem enim sursum ad tibie anteriora flectunt, motu sanè non æquè atq; posteriores digno & ualido. Si uerò isti alternatim cum musculis posteriore tibie sedem occupantibus contrahantur, in hoc illud<sup>20</sup> uel latus pedem agunt: atq; ita, qui flexionis extensionisq; autores sunt, etiam motus in latera appolitisimè obeunt, quemadmodum de brachialis<sup>21</sup> motoribus abundè proposuimus.

Nonum.

Nonum musculorum pedum mouentium musculus.



*Pedis digi-  
torum motum.*



*Primus pedis  
digitorum mo-  
uentium.*

*Secundus &  
tertius.*

**D**IGITI pedis iisdē prorsus motibus aguntur, quibus qua-  
tuor manus digitos duci relatum est. Pedis enim pollicis  
(qui duobus tantum ossibus donatur) primum internodium  
pari omnino ratione cum primis reliquorum digi-  
torum internodijs flectitur: non autem, ut in manu, oppo-  
sito flexu alijs digitis obducitur. Atq; hic primorum arti-  
culorum flexus, aut rectus est, aut in alteram partem mo-  
dicè inclinans, quemadmodum primos quatuor manus digitorum articulos  
moueri diximus. Secundum autem pollicis internodium, & secunda quoq; &  
tertia reliquorum digitorum internodia, simplici duntaxat, ac in neutrum la-  
tus uergente donantur flexione ac extensione, nullo interim proprio motu in  
latus prædita, quum interim prima internodia & adductionis & abductionis  
motum insuper nanciscantur. Cæterum ut motus digitorum manus & pedis  
par quodammodo est ratio, ita ferè etiam similis musculorum in utrisq; est se-  
ries. unde etiam in illorum descriptione non inopportune eundem ordinem,  
quem in manus musculis obseruauimus, aggrediemur. <sup>a 14 tab. a.</sup> Primus itaq; is futu-  
rus est, qui quatuor digitorum secunda flectit internodia, in hoc à manus<sup>b 3 tab. a.</sup> mu-  
sculo uarians, quòd breuior sit, & pro sua mole amplior & depressior, quodq;  
non ex tibia (quemadmodum musculus digitorum manus è cubito) porrigi-  
tur. Totus namq; infernam duntaxat pedis sedem occupat, uniuersè ipsius car-  
nosæ substantiæ pertinaciter subnatū habens<sup>c 13 tab. m.</sup> ligamentum, quod lati in manu<sup>d 3 tab. mu-  
sculi p.</sup>  
tendinis uices gerere, iam antea proditū est. Ab inferna itaq; calcis ossis sede, &  
anteriori illius calcis tuberculi parte, quod terræ innititur, primus hic muscu-  
lus<sup>e 2 fig. cap.</sup> principiū ducit partim nerueum, & partim carneum, quod ilico ab exor-  
tu prorsus carnosum euadēs, sensim dilatatur, multo latius quàm crassius red-  
ditum. Quum uerò mediam pedis longitudinem, ad digitos repens,<sup>f 14 tab. s.</sup> supera-  
uit, in quatuor carnosas portiunculās dirimitur, quæ inuicem diductæ, & æqua-  
les cōstituentes angulos, singulè unum producunt tendinem, ad sibi præposi-  
tum digitū excurrentem. Tēdo iste, similiter ac in manu, ad primi digitorum  
internodij radicē transuerso ligamento excipitur, quousq; longa sectione diui-  
sus, & subiecto sibi tendini<sup>h ut in 14  
tula m. u.</sup> uiam præbens, in secūdi internodij radicē implan-  
tetur, & toti ossis sui lōgitudini latescens innascatur. Huius musculi beneficio,  
secundum quatuor digitorū flectimus articulum, eum quàm possumus proxi-  
mè uersus calcem protrahentes. <sup>i 14 tab. a.</sup> Secundus uerò & <sup>15 O.</sup> tertius digitorū muscu-  
li, tertij quatuor digitorum & secūdi pollicis articuli flexus opifices sunt. Atq;  
hi integri non in pedis planta reponuntur: sed in tibiæ etiam posteriori sede lo-  
cati, totam illius ferè longitudinem perreptant. Sunt porrò hi, quos<sup>k 14 tab. m.</sup> quarto pe-  
dem mouentium musculo, qui suram constituentium maximus est, proximè  
substerni, &<sup>l 13 tab. v.</sup> quinto pedem mouentium musculo incumbere diximus. Vt ue-  
rò eandem cum eo musculo sedem occupant, ita quoq; illi forma admodū si-  
miles sunt. latiores enim, quàm spissiores uisuntur: deinde toti propemodum  
carnei, in tibiæ regione existunt. & quum ad calcem usq; descēdere, ab interno  
tantum<sup>m 15 tab.  
D, E.</sup> latere non admodū prius arctati, unum singuli teretē promunt ten-  
dinem. Eorū itaq; posterior, suræq; (ut sic dicam) uicinior, qui digitos mouen-  
tium secundus censebitur, à posteriori sede cōnexus fibulæ ad tibiā<sup>n 14 tab.  
d, n.</sup> enascitur,  
statim ab ortu carnosus, & latus utcunq; uersus tibiæ extremum prorrepens.  
Toto hoc progressu, maximo surā efformante<sup>o 14 tab.  
A, 15 O.  
p 14 tab. v.</sup> musculo cōtegatur: anteriore  
autem

1 15 tab. B autem sua sede, posteriori fibulæ<sup>r</sup> parti attenditur, ipsi etiam aliquandiu adna-  
 2 15 tab. C tus: deinde qui ordine<sup>r</sup> tertius digitos mouentium futurus est, externo suo la-  
 3 15 tab. P tere ipsi secundo hic quoq; subiicitur. Illico uerò atq; secundus ad infimam ti-  
 4 15 tab. B biæ sedem descendit, ab interno ipsius latere<sup>r</sup> tendinē edit teretem, qui<sup>r</sup> prius  
 5 15 tab. A aliquandiu in carne pronasci uisus est. Huius tendinis nomine, ad internū cal-  
 6 15 tab. G cis latus, ubi talum excipit,<sup>r</sup> sinus in sculpiitur, qui transuerso<sup>r</sup> ligamento obdu-  
 7 15 tab. C ctus, præsentis musculi tendinē tutissimè deducit. Postquam tendo ligamen-  
 8 15 tab. A tum id superauit, pedis inferiora obliquè subintrat: & inter<sup>r</sup> illos qui quatuor  
 9 15 tab. N digitos pollicis adducere dicuntur, &<sup>r</sup> eos quibus primum digitorum internodi-  
 10 15 tab. L um flectendi munus ascribitur, prorépit, totus propemodum ad pollicem  
 11 15 tab. Q contendens. A<sup>r</sup> præsentis enim tendinē, circiter plantæ medium,<sup>r</sup> portiuncula  
 12 15 tab. B diffunditur, quæ aliquot<sup>r</sup> tendinibus eius quem tertium digitos mouentium  
 13 15 tab. A numerabo, commiscetur, atq; unā cum illis ad tertij indicis, & quasi ad mediij  
 14 15 tab. C quoq; digiti, articuli flexionem auxiliatur. Reliqua autem tendinis secundi di-  
 15 15 tab. G gitos mouentium musculi portio (quæ profectò ualidissima est) ad pollicem,  
 16 15 tab. L uti diximus, obliquè perfertur, secundumq; primi pollicis ossis longitudinem  
 17 15 tab. Q transuerso ligamento excepta, in secundi pollicis ossis longitudinem lata infer-  
 18 15 tab. B tione implantatur, flexionis eius ossis autor. Huic tendini, priusquam secundo  
 19 15 tab. A pollicis ossi inferitur, scilaminum accedit<sup>r</sup> ossiculum utcumq; grande, & lubri-  
 20 15 tab. C ca sua & læui superficie sinui præpositū, quem in sui medio habent primi pol-  
 21 15 tab. L licis ossis capitula, secundi ossis sinus subeuntia. <sup>r</sup> Tertius musculus, qui quinto  
 22 15 tab. Q pedem mouentium insertitur, pari prorsus cum secundo digitorum muscu-  
 23 15 tab. B lo ratione, in posteriori tibie sede exporrigitur, ad internū magis latus, quā  
 24 15 tab. A secundus, respiciens: lōgè enim<sup>r</sup> magis tibie ossi, quā fibulæ innititur. Quum  
 25 15 tab. C autem ad calcem ferè descendit, atq; adhuc latus conspicitur, ab interno ipsius  
 26 15 tab. L B latere teretempromit tendinem, cui peculiarem<sup>r</sup> sinum & transuersum li-  
 27 15 tab. Q gamentum Natura fabrefecit, in medio duorū qui hic quoq; habetur sinuum.  
 28 15 tab. A 2. Tertij itaq; musculi tendo, hoc ductus sinu, teres adhuc pedis inferiora subit,  
 29 15 tab. C secundi musculi<sup>r</sup> tendini uersus plantæ cutem subiectus, & cum illo X literæ  
 30 15 tab. L imaginem efformās. Secundi enim musculi tendo ab exterioribus interiorum  
 31 15 tab. Q obliquè in anteriora fertur: tertij autem tendo quodāmodo ab interioribus  
 32 15 tab. A extrorsum contendit, ob idq; in plantæ medio cum secundi tendine decussatim  
 33 15 tab. C constituitur. Tertij musculi tendo, pedis plantam hoc modo subintrans,  
 34 15 tab. L aciam in pedis ferè longitudinis medio repositus, modicè<sup>r</sup> dilatatur, ac in qua  
 35 15 tab. Q tuor alios tendines digeritur, ad quatuor digitos excurrētes, illisq; manus<sup>r</sup> ten-  
 36 15 tab. A dinibus respondentes, qui tertium quatuor digitorum inflectunt articulum.  
 37 15 tab. C Sub primi enim musculi tendinibus occultati, digitorū radices subeunt, unā  
 38 15 tab. L cum<sup>r</sup> primi musculi tendinibus, transuerso ligamento, ut in manu quoq; ob-  
 39 15 tab. Q ducti. Ut uerò ad tertium usq; os proreperēt, primi musculi tendines sectione  
 40 15 tab. A per longum diuisos permeant: & latiores redditi, tertij ossis longitudini im-  
 41 15 tab. C plantantur. Cæterum tendini indicē adeunt, & interdum illi pariter, qui medio  
 42 15 tab. Q exporrigitur, hoc priuatim obtingit, ut in plantæ medio<sup>r</sup> portiunculam  
 43 15 tab. A secundi musculi tendinis ad pollicem proficiscens nanciscantur, quæ cum il-  
 44 15 tab. C lis digitorum tendinibus omnino coit & permiscetur. Interdum uerò, quan-  
 45 15 tab. L tumuis accuratè singula obserues, à secundi tendine nihil porrigi, sed hunc to-  
 46 15 tab. Q tum in pollicem absumi conspicias. Atq; ita sanè tres digitorum primi habent  
 47 15 tab. A musculi, quorum primus secundum quatuor digitorū flectit internodiū: re-  
 48 15 tab. C liqui autem duo, ultimi quinq; digitorum internodij flexionis opifices sunt.

Verum hic non ambigo, studiosissimum quemq; qui accuratissimè Galeni

Lib. 3 de v'su  
part.  
Lib. 2 de Ad-  
muni'scit.

loca iam pridem euoluit, & illum sibi haud cōformia dicere, librosq; ipsius hīc quoq; utiatis esse intelligit, auidē expectare, quam obrē à Galeno dissentiam. Cui in præsentia aliud nihil additum esse uelim, quā uerissimam e haftenus de pedis digitorū musculis in hominibus enarrauissē, & Galeni loca (ut iam, si mulatq; aliquid de musculorum functione addidero, audies) uix simijs conuenire. Trium itaq; dictorum musculorū functionem, cum manus digitorum musculis communem esse censui, quum<sup>o</sup> secundus musculus secundi pollicis internodij flexus autor poneretur, nulla primi articuli, quod ad flexū attinet, facta mentione: quemadmodū<sup>o</sup> tertij musculi beneficio tertium reliquorum digitorum internodium moueri, iam antea scripsi: quum interim ex Galeni sentētia, primos etiam articulos duobus posterioribus musculis flecti, dictum esse oportuerit. Arbitratur enim Galenus, eandem hīc atque in manu horum musculorum functionē esse. imò exactē in secundo de Administrandis sectionibus, suum ipsius perpendens placitum, quo transuerforum ligamentorum ope primos manus digitorum articulos flecti innuerat, dixit, ab illis qui tertio digitorum internodio inferuntur in pede, non solum tertios primosq; articulos in flexionem duci, uerūm primum, secundum & tertium internodiū ipsorum ope flecti. quod sanē necessum esset, si modò transuersi ligamenti uindices illa quibus tantum incumbunt, non autem inferuntur, ossa mouere donaremus. At ita non sufficisset adhuc illis<sup>a</sup> tendinibus, quos nos tertium internodium flectere diximus, à Galeno insigne illud flectēdi munus ascribi: quin etiam<sup>o</sup> primum musculum, qui secundis quatuor digitorum internodijs inferitur, prima quoq; internodia flectere, orationi addendum uenerat, quum & illius musculi tendines eodem cum alijs tendinibus in primo digitorum osse ligamento obuolentur. Quia igitur transuerforum ligamentorū gratia, oportere ossibus motum ascribi, non admodum concedimus: haud mirum quoq; esse debet, nostrum placitum à Galeni decreto dissentire. Ceterum functione postposita, qualiter in caudatis simijs præsentes musculi habeāt, enarrare non grauabor: haud interim inmemor Galeni loci, quo tendines non eodem semper modo permisceri tradidit: ne fortē quis me ipsius dogmata nimis perfunctoriē arbitretur expendere. Simiē igitur primum musculum, quo secunda digitorum flectuntur internodia, cum hominibus communem habent: at tanto longioribus donatum tendinibus, quanto interuallo simiæ pes hominū pedem unā cum digitis in longitudine pro proportionē superat. Secundus quoque & tertius in tibia eodem modo simijs atq; hominibus collocantur. quum tamen tendinem educūt, non ex altero latere illum promunt: sed cæterorum musculorum modo coarctati, illum emittunt: quod etiam in simiarum quinto pedem mouentium musculo usuuenit. Vnde etiam haud mirum uideri nobis debet, si Galenus rarē illius peculiarisq; tendinum educationis nullo prorsus modo meminerit. Verū interim tendines caudatarum simiarum, pedis plantam, ut in hominibus, subeunt: & ubi X literæ instar in sectionē moliantur, secundi musculi tendo tendini tertij musculi prorsus permiscetur, atq; ex ambobus unus quodammodo confurgit tendo, à quo transuersim portioncula ad pollicem fertur, illi prorsus similis, quam in caudatarū simiarum manu, à tendine indicem accedēte, è uolæ medio ad pollicem ferri retulimus. Reliqua uerò huius tendinū permixtionis pars in quatuor tendines diuiditur, eam portionem, quæ pollicis exporrigitur, mole uincens. Hi ut in homine sub primi musculi tendinibus deducūt, & hos permeantes, tandemq; latiores redditi, tertio internodio inferuntur.<sup>o</sup> Musculi primos quinque digitorum pedis articulos flectentes,

Primus & 2<sup>o</sup>  
& 3<sup>o</sup> musculi  
quomodo in  
simijs se habeāt.

Hæc ex  
bō  
minis  
fū  
brica  
sunt  
obuia.

551 lib. 2  
de iis.



6 1 tab. sub  
 2. *flexentes, in homine illis respondent, qui in manu inter postbrachialis ossa*  
 repositi, primorum quatuor digitorum ossium flexioni præfunt: quamvis in-  
 11 2 fi. cap.  
 33 lib. 5 19. *terim in pede non ita exacto numero, atq; in manu, comprehendi distinguí ue*  
 queant. Rudis enim indigestaq; moles in planta conspicitur, quæ ad amussim  
 ducta, & illius quoq; interualla opplens, in quinque digitorum radicem implan-  
 tatur, utrinque ad primi internodij latus uersus interiora inferiora ue infertio-  
 nem tentans. Hanc itaq; carneâ molem ex sententia in musculos proprios sub-  
 diuidere nequeo, quantum uis etiam sibi implicatas quasdâ inscriptiones com-  
 monstret. Vt cunq; tamen sit, hæc non minus quàm in manu ualida est, & pri-  
 miorum articulorû flexionem perficit, quam primus pollicis articulus parem  
 cum cæteris digitis adipiscitur. Vnde etiam carneæ illius molis pars, ad polli-  
 cem porrecta, illis respondet partibus, quæ reliquos adeunt digitos. Atq; huius  
 etiam partis tendinibus admodum breuib; & latiusculis, maxima totius cor-  
 poris sesamina innascuntur<sup>v</sup> ossicula, quorum interiori exteriori longè maius  
 esse diximus. Hæc lubrica sua & læui superficie inferiorem terram ue spectan-  
 tem contingunt sedem capitis pedij ossis, quod primo pollicis ossi inarticula-  
 tur, utrinque ad eius sedis latera mutuo recedētia, hacq; secundi digitos mouen-  
 2 14 tab. off.  
 2. *tium musculi<sup>v</sup> tendini iter quodammodo parantia. His dein sesaminis ossicu-*  
 1. *lis longè<sup>a</sup> minora reliquis etiam tendinibus carneæ huius in pede molis innexa*  
 4. *sunt: adeo, ut ad singula reliquorû pedij ossium capita digitis inarticulata, duo*  
 1. *reponantur sesamina ossicula, illis grandiora, quæ ad quatuor manus digito-*  
 1. *rum radicem, musculis eorum prima ossa flexētibus innata scripsimus. Quan-*  
 1. *doquidem igitur carneæ huius molis tanta cum musculis quatuor digitorum*  
 1. *manus primos articulos flexentibus est similitudo, in integrum sanè erit, hic de-*  
 1. *cem musculos, primis quinque digitorum articulis in flexione famulantes, enu-*  
 1. *merare, ut bini ad singula referantur digitos, atq; hi decem tribus reliquis flex-*  
 1. *ionis autoribus ascribantur. <sup>e</sup> Decimus quartus itaq; cui quatuor digitos ex-*  
 1. *tendendi munus conceditur, in anteriori tibiæ sede locatus, & sub<sup>d</sup> sexto pe-*  
 1. *dem mouentium musculo reconditus, à tibiæ ossē, qua id fibulæ sub genu artic-*  
 1. *ulo connectitur, nerueum sumit<sup>e</sup> principiū, quod ilico ab exortu carneum*  
 1. *euadens, recto tramite deorsum uersus pedem descendit, in medio propemo-*  
 1. *dum<sup>f</sup> ductu carnosam quandam sui<sup>g</sup> portionem ab externo latere diffundēs:*  
 1. *quæ deorsum protensa, ea est, quam nonum inter pedem mouentes musculos*  
 1. *recensuimus. Postquam uerò eam eduxit portionem, reliquo suo corpore car-*  
 1. *nosus adhuc deorsum tantisper fertur, dum transuersum<sup>h</sup> ligamentum, ante-*  
 1. *riorem tibiæ sedem occupans, contingat. Ibidem enim in<sup>i</sup> tendinem degene-*  
 1. *rat, qui per id ligamentū, ueluti per anulum proripit. Priusquam tamen liga-*  
 1. *mentum prætergreditur, in quatuor alios scinditur tendines, qui inuicem di-*  
 1. *ducti, ac per pedis superiora æquales angulos cōstituentes, ad quatuor digitos*  
 1. *pertingunt, & toti illorū longitudini, ampliores reddit, inferuntur, tres simul*  
 1. *ipsorum articulos extendentes. <sup>a</sup> Decimus quintus musculus ad pollicem spe-*  
 1. *ctat, & in anteriori tibiæ sede collocatus, partim nuper cōmemorato<sup>i</sup> muscu-*  
 1. *lo subiicitur, partim uerò illius in interno lateri exporrigitur. A<sup>i</sup> tibiæ enim ossis*  
 1. *externo latere, ubi membraneum<sup>m</sup> ligamentum in tibiæ lōgitudine fibulam*  
 1. *tibiæ ossi colligās, ab ipsa educitur, hic musculus principiū sumit, quod carno-*  
 1. *sum in ea sede exoritur, qua tibiæ os à fibula primū dehiscit. Musculus hinc*  
 1. *deorsum protensus, ac ligamento illi pertinaciter adnatus, anteriorem tibiæ*  
 1. *ossis sedem adit: ac in<sup>n</sup> tendinem finiēns, per transuersum<sup>p</sup> ligamentum, in an-*  
 1. *teriori*

Musculi pri-  
 mus articulus  
 flexentes, qui  
 tertium muscu-  
 lum in numero  
 succedunt, ac  
 decem nobis  
 enumerantur.

Decimus quartus.

Decimus quintus.



*x 14 tab. D.*  
*μ 17 tab. N.*  
*y 16 tab. D.*  
*dein r.*  
Post decimum itaq; octauum, in homine\* quatuor tantum adhuc enarrandi  
superfunt musculi, quatuor digitos in internum latus ducentes: qui similiter  
atq; in manu, illis<sup>r</sup> tendinibus exporriguntur, qui tertium digitorum flectunt  
internodium. quamuis in hoc pedis musculi à manus uariant, quòd illi non à  
tendinum inuolucris horum modo, sed à calcis osse exoriantur. A<sup>r</sup> ligamenti  
namq; ossa tarfi posterioribus pedis ossibus in plâta colligâtibz, musculofum  
corpus enascitur, quod in quatuor postea graciles diductū musculos, interno  
quoq; lateri quatuor digitorum inferitur. Si itaq; carneam hanc molem, qua-  
tuor musculorum loco habueris, omnes pedis digitorum in homine musculi,  
duo erunt & uiginti: si uerò unius loco id corpus numeraueris, tantum erunt  
*z 6 tab. N.*  
decem & nouem. Rursus, prout id<sup>r</sup> corpus, quod pollicē & tres ipsi proximos  
digitos in externū latus abducit, in plures diffecueris, numerū quoq; augebis.

DE LIGAMENTIS, ILIUM OSSA SACRO COL-  
ligantibus, & coxendicis ac genu articularum, deq; reliquis omnibus, quæ  
in tibia & pede habentur ligamentis. Caput LXI.



*Ligamenta sâ-  
eri ossis, & ipsi  
adnexorum  
osium.*  
LIGAMENTVM, ilium ossis ad sacrum os cõtextum  
ambiens, membraneum quidem est, sed admodum robu-  
stum. Ligamenti autem portio, sese ubi ossa inuicem com-  
mittuntur, inferens, ita ualidū crassumq; euadit ligamen-  
tum, ut cartilaginei ligamenti naturam prorsus representet:  
cuius beneficio, & demū cartilaginis quoq; interuētū,  
ilium os sacro ualidissimè nectitur. Quemadmodū enim  
cartilaginis intercessu, & ligamēto orbiculatim cõmissuram ambiente, pubis  
ossa inuicem cõtextuntur, ita quoq; ilium os sacro coarctatur. Præter hæc sacri  
ossis ligamenta,<sup>a</sup> aliud ex latere cõnexus quinti ossis sacri cum sexto quodāmo-  
do teres enascitur, in acutum processum coxendicis ossis insertū. Quinetiam  
*b 10 tab. A.*  
ab eadem sacri ossis sede, in ossis coxendicis appendicem, aliud<sup>b</sup> ligamentum  
fertur, quod unā cum prædicto ossa hæc firmius connectit, & præterea recti  
intestini, & musculorum ipsius fulcrum existit. Postremò, in pubis ossis fora-  
mine<sup>c</sup> membrana uisitur, illi<sup>d</sup> ligamento omnino similis, quod secundū quibit  
longitudinem radium ulnæ colligat: substantia enim huic ad amussimū res-  
pondet, & fibris constat deorsum in latus obliquè procurrētibus. Ligamenta  
*c 14 tab. B.*  
*d 7 tab. V.*  
*inter S. T.*  
femur coxendicis ossi adnectētia, duo magis præcipua censentur,<sup>e</sup> unum orbi-  
culatim articulū amplectens, cuiusmodi etiam alijs articulis est cõmune. Cæ-  
terum ne aliquando femoris caput luxaretur, quoties uarijs motibus femur,  
magnam corporis molem sustentans, mouetur, ligamen hoc quod diximus,  
crassissimum robustissimūq; euasit, nulli ligamēto ex his quæ articulos circun-  
dant, crassitie secundū. Et tanti momenti ususq; id ligamentū Græci esse puta-  
runt, et etiam totius articuli nomine illud *ἰχίον* appellare non dubitauerint.  
Quin etiam huic ligamēto articulū ambienti, non solum priuata crassities du-  
ritiesq; accessit: uerūm hoc peculiariter sibi uendicat, quòd neq; capitis femo-  
ris, neq; acetabuli ossis coxédicis supercilio inferitur, aut ab illis prodit: totam  
enim femoris ceruicē ambit, illi nusquā quā ad magni femoris processus ra-  
dicem orbiculatim circumnatū: reliquæ autem parti tantum citra omnē con-  
nexum incūbit. dein de acetabuli supercilio non adnascitur, sed paulo supra su-  
percilij radicē ossi coxendicis. Atq; hīc prouidē Natura ab aliorū articulos am-  
bientium ligamentorū fabrica reclinauit. nam si hoc coxédicis ligamentū alio-  
rum ligamentorū ritu supercilij cõnatum fuisset, neutiquā oblongū femoris  
caput

*Ligamenta sâ-  
eri ossis, & ipsi  
adnexorum  
osium.*

*Membrana,  
pubis ossis fora-  
men occupans.*

*Femoris ad co-  
xendicis ossis li-  
gamenta.*



caput aptè moueri permisisset. quod sanè ad amulsi spectabis, quum inter se candum femora inuicè adducere, & rursus abducere conaberis. Mirum enim dictum est, quàm femoris caput antrorsum extra sinum feratur, dum alterius pedis calcem, ueluti perpendiculi lineam, medio interioris lateris alterius pedis adhibemus: quod in illo pedum situ fieri cernimus, quum in choreis notam, quam bis simplicem uocant, hocq; signo. <sup>f</sup> indicant, erecti fingimus. Ad hæc, præterquàm quòd coxendicis ossis sinus admodum cauatus est, aliud adhuc ligamentum, etsi non colliget, orbiculatim sinus supercilio adnascitur, quod finum adauget, & eorum ligamentorum naturæ participat, quæ cartilaginea sunt. Verùm id cauitatem non solum auget, sed etiam in causa est, cur minus ossis supercilium in uehementibus femoris motibus, quum fragile sit, abrum-patur: sua enim duritie ligamentū impetui resistit, & sua mollitie cedens, eundem exoluit. Porro <sup>1</sup> aliud coxendicis articulo peculiare ligamentum, teres est, & adeò durum, ut cartilagineus neruus merito ab alijs appellatus fuerit. Hoc ex medio capitis femoris enatum, non in acetabuli centrum inferitur, at in humillimam ipsius sedem, <sup>2</sup> ubi adeps, non autè cartilago sinui oblinitur, ipsumq; coxendicis ossis acetabuli supercilium <sup>3</sup> deficit. In genu uerò articulo, præter commune ligamentum, omnibus obductum articulis, alia quædam ualida robustaq; (potissimum quum illud uniuersum articulum certis rationibus ambire non posset) rerum Opifex fabrefecit. quando enim quinque sunt genu articuli regiones, anterior, posterior, interior, exterior, & media, singulis peculiare quippiam Natura præposuit. Anteriori quidem, quæ membraneo ligamento prorsus destituitur, & tamen regio admodum fallax, & summopere laboratura est, <sup>4</sup> mola patellæ uel simul cum illam continentibus tendinibus præten-ditur: quæ quum abundè articulum stringat, nullo hîc opus erat ligamento, neq; etiam (ut dixi) membraneo, omnes articulos ambiente, quod malè inter femoris os & patellam fuisset repositum. Posteriori similiter laboraturæ, robustum neruosumq; ligamentum præponitur, quod ex media posteriori tibiæ regione originem capiens, rectà sursum fertur, & bifidum <sup>5</sup> utrorumq; femoris capitum posteriori sedi, qua maximè illa dehiscunt, implantatur. Cæterùm mediæ regioni duabus nuper dictis digniori maioriq; egenti firmamento, Natura ualidissimum & cartilagineum largitur ligamentū, quod ex tota prominentiori inter duos tibiæ sinus <sup>6</sup> parte enatū, femoris posteriori parti, quæ ipsius capita maximè inuicem distant, cum paulo antè dicto inferitur. Verùm præter hoc ligamentum, interdum adhuc mucosum quoddam & gracile reperias, in medio genu articuli locatum, ad anteriorem iam dicti ligamenti regionem, quod similiter à tibiæ in femur pronascitur. Exteriori genu regioni iniurijs magis quàm interior patenti, crassum quoq; & quodammodo teres obductum est ligamen, femoris & fibulæ tibiæq; ossa inuicem colligans. Huius ligamenti humilius extremum, capiti <sup>7</sup> mufculi substernitur, cuius tendinem ad posteriora inferioris fibulæ appendicis perreptantem, uersus pedij ossis pollicis prepositum protendi relatum est. Porro interior genu regio, quæ cæteris omnibus in tibiæ motibus minus debebat dehiscere, & ijs quæ cruri occurrant, minus obuiam ire, ligamen nanciscitur, iam dicto tum gracilius, tum mollius, quod etsi ex interiori femoris latere enascatur, in tibiæ tamen latus non insertatur, sed uelut ad aliud exterius ligamentum in tibiæ priora maiori sua portione contendit. Cæterùm præter hæc omnia, peculiaris huic articulo, quemadmodum superiori libro scripsi, cartilago injicitur, quæ duritiæ exquisitæ cartilagini nonnihil cedit, & cum ligamento quippiam commune obtinet. Quantum uerò ad

Ligamenta genu articuli.

f. fig. cap. 1  
o. 7. 1. fig.  
cap. 4. 2. p.

g. 1. 2. fig.  
cap. 19. 1. b.  
h. 1. 2. fig.  
cap. 19. 1. b.

i. 1. b.  
i. 1. b. cap.  
cap. 1. 1. b.  
v. 1. b.

k. 1. b.

l. 1. b. cap.  
10. 1. b. 1. b.  
v.

m. 1. b. cap.  
11. 1. b. 1. b.  
1. b.

n. 1. b.

o. 1. b. cap.  
11. 1. b.

articuli

articuli genu securitatem ea cartilago ualeat, illic quoq; diximus. nunc autem in exteriori ipsius circumferētia, qua quodammodo ex articulo eminet, membranis ligamētis ex ipsa prodeuntibus, femori & tibiæ colligari, additum esse uoluimus.<sup>p</sup> Ligamen fibulam tibiæ iuxta genu articulum colligans, forte quidem est: sed ut in aliorum ossium commissuris, ab exteriori tantum parte, ossium connexum circumdat. Quæ uerò tibia fibulaq; inuicem dehiscunt, per ossium longitudinem<sup>q</sup> ligamentum membraneum habetur, illi par, quod in cubito repositum esse commemorauimus. atq; id à tibiæ osse in fibulam porrigitur, fibris intertextum, à tibiæ osse deorsum oblique in fibulam excurrentibus. Quemadmodum uerò conformatione hoc tibiæ ligamentum cubiti ligamento respondet, ita etiam parem cum illo usum præstat: fibulam enim tibiæ alligat, & interstitij ritu anteriores tibiam occupantes musculos à posterioribus dirimit, illisq; qui ipsi adnascuntur, exortus robur porrigit. Pedis ligamentorum nonnulla prius exposita sunt, transuersa nimirum, quæ tendinibus obducuntur: quorum quædam ad ossium commissuram simul faciunt, alia uerò duntaxat munimenta quædam tendinū, & ne illi è suis sinibus exurgant, uincula ac anuli existunt. Sunt uerò transuersa pedis ligamenta, si obiter considerentur, tria. Primum in anteriori tibiæ sede, ad ipsius cum pede articulum consistit, & ad tibiæ os & fibulam refertur: hoc enim ossa connectit, & plurimos tendines transmittit. Istud utcumq; perpendas, ossiumq; etiam colligationi auxiliatur: si uerò exactè diuidatur, tres anulos, & ueluti tria ligamenta efformare uisitur, quæ priuatim ad suos quosq; spectant<sup>r</sup> sinus, trium tendinum nomine, ut & ipsi tres sunt, exculpro: quorū calci proximus,<sup>r</sup> musculi tendinem admittit, qui pollicis secundum flectit interno dium. Sinus huic accumbens, secundusq; tendini uiam præbet, tertios quatuor digitorum articulos flectenti. Tertius uerò sinus, unà cum ligamēto in posteriori interioris malleoli sede repositus, à Natura illi tendini præparatus est, quem<sup>a</sup> musculus efformat, inter pedis motores quintus.<sup>b</sup> Tertium porrò transuersum pedis ligamentum, à fibula in calcem fertur, itaq; ad ossium colligationem iuuat: quæ autem duobus, quibus commune est, sinibus obducitur (quum illi sinus in uno duntaxat cauentur osse) tantum tendinibus famulatur, septimi & octaui musculorum pedem mouentium. Ad hæc, in inferna pedis digitorum regione, transuersa ligamenta perinde consistunt, ac in manu. Verum præter transuersa ligamenta, quæ etiam prius expressimus, in pede alia permulta habentur. Primum ex tibiæ osse in fibulam procedens, inferius tibiæ ossi fibulam colligat, membraneum similiter ac aliorum articulorum ligamēta existens. Deinde & aliud quoq; reliquis articulorum ligamētis respondet, quod uniuersum articulum tibiæ cum talo amplectitur. Post hæc, quatuor sunt ligamenta cartilaginosa, ex quibus nonnulla in alto conduntur, alia exterius ossa ambiunt: quæ simul omnia talum quatuor, quibus firmatur, ossibus cōnectunt. Primum ex internis tali par tibis, quibus interno malleolo excipitur, originem obtinet, & in tibiæ ossis partem, quæ talum respicit, innascitur, id os talo colligans. Secundum exterius est, interioriq; respondet, fibulam talo nectens. Tertium cæteris robustius, & admodum insigniter cartilagineum, ab inferiori tali sede, propter ipsius cervicis radicem, nimirum quæ calci is committitur, principium ducit, & calci inter duas, quibus talo articulatur, commissuras innascitur. Quartum, tali caput ossi nauiformi connectit: ex tali enim cervicis termino originē ducens, iam dicto ossi inseritur, uniuersumq; ambit articulum. Verum præter cartilaginea hæc, membra-

Ligamenta fibulæ tibiæ ossi committentia.

Pedis ligamenta transuersa.

Alba pedis ligamenta, ossa sanium committentia.

Hæc nullibi picturis propoliata, sed ex ossium deli mentionibus petuntur, ex figuris scilicet cap. 31 et 33 lib. 11.

membraneum aliud ligamentum omni ex parte calcis cum talo obducitur connexu, & ualidum quoq; aliud à tali ceruice in tesseram imitans os implan-  
tatur. Porro ligamen, calcis os huic tesseræ simili osi committens, robustum  
quoq; est, & cartilagineum, sed duntaxat articulum amplectitur. Quemadmo-  
dum uerò in manu brachialis ossa inuicem durissimis cartilagineisq; ligamen-  
tis colligantur, ita quoq; tarfi ossa tum inuicem committuntur, tum etiam of-  
si cymbam imitanti. Validissimum autem & peculiare uinculum in inferiori  
parte tarfi ossa obtinent, quod non solum extrema uincit, imò penitus singu-  
lis insertum, ossium quoq; media inuicem constringit. Pedij autem & digito-  
rum ligamenta, manus ligamentis correspondent. Sunt enim omnia mem-  
branea, his tantum exceptis, quæ superiori pedij ossium interuallorum parti  
immittuntur: illa siquidem cartilaginea sunt, & in profundo seu medio arti-  
culi genu repositi, ligamenti naturam referunt.

fig. cap. 1  
X.

MVSCVLORVM IN TIBIA ET PEDE SEDEM  
obtinentium, & ligamentorum omnium quæ hactenus non refe-  
cta sunt, administrandiratio. Caput LXII.

Quot musculi  
in posteriori tibi-  
a sede consti-  
stant.



I modò omnes musculos, pedis ac digitorum motibus fa-  
mulantes, memoriæ cõfirmandæ causâ, in suis sedibus or-  
dine recensere, in posteriori tibiæ sede primum<sup>a</sup> duo oc-  
current, à radice inferiorum femoris capitum ducentes  
originem, & suræ non mediocrem portionem efforman-  
tes. Post hos sese exhibet,<sup>b</sup> qui totius corporis longissimum  
promittendinẽ. Sub hoc suræ<sup>c</sup> maximus, seu pedem mo-  
uentium quartus consistit, in calcem cum nuper cõmemoratis insertus. Huic  
succumbit,<sup>d</sup> qui pollicis secundum internodium flectit: deinde, qui quatuor  
digitorum tertij internodij flexionis præcipuus autor est. Omnium autem in-  
timus habetur, qui pedem mouentium quintus enumerabatur, uniq; tarfi os-  
sium implantatur. adeò, ut iam omnes posterioris tibiæ sedis musculi septena-  
rium cõstituant numerum, præter<sup>e</sup> musculum in poplite latitantem. Si enim  
& illum posterioribus tibiæ amplexatibus musculis adnumerare uisum fue-  
rit, octo tunc in posteriori tibiæ sede constitues. In anteriori tibiæ sede, unâ  
cum illis<sup>f</sup> qui propriè externum ipsius latus occupant, sex numero descripsi-  
mus: primum quidem, qui pedij ossi pollicem sustinenti inseritur, ac pedem  
mouentium sextus recensebatur: secundũ, qui quatuor digitos extendit. hu-  
ius autem<sup>g</sup> portio, quæ in pedij os minimo prælocatum digito inseritur, ter-  
tius erit. Aut si hanc portionem à secundo non distinxeris, iam duo duntaxat  
hactenus tibi in anteriori tibiæ sede habentur. At age, tres esse dona, ac<sup>h</sup> quar-  
tum enumera, cuius ope pollex extenditur: quintum uerò, qui fibulæ expor-  
rectus, pedisq; inferiora lubiens, in os pedij pollicem sustentans inseritur: se-  
xtum autem, qui iam dicto succumbens, pedij ossi ante minimum collocato  
implantatur. In inferiori pedis sede<sup>i</sup> ligamentum primum sese offert, lati ten-  
dinis uicem gerens: postmodum<sup>j</sup> musculus secundum quatuor digitorum os  
flectens: deinde<sup>k</sup> utrinq; ad huius latera unus, hic quidem pollicem introsum  
ducens in latus, ille uerò minimum extrorsum abducens. Post hos in conspe-  
ctum ueniunt<sup>l</sup> tendines, tertia quatuor digitorum internodia flectentes: qui-  
bus exporriguntur<sup>m</sup> quatuor muscoli, quatuor digitos pollicis admoventes.  
Omnium autem intimi illi cõsistunt,<sup>n</sup> qui primos digitorũ articulos flectunt.

Quot in ante-  
riori tibiæ sede.

Quot in pede.

In superiori autẽ pedis sede illud duntaxat<sup>o</sup> musculosum corpus reponitur,  
quod



quod pollicem & tres illi proximos digitos in latus externum abducit. Ceterum dicta iam musculorū series, etiam sectionis rationem cōmonstrat, quam in eo crure aggredieris, in quo iam antē tibiam mouentes musculos reseculisti. Per suræ itaq; longitudinē sectio in cute & adipe & carnosā membrana ad calcem usq; ducetur: deinde alia ab interno pollicis latere ad calcem usq; & hinc per pedis exteriora ad paruum usq; digitū tentabitur. aded, ut uniuersam tibie & pedis cutem auferre possis, ea tantum relicta, quæ plantā induit. Quum primum igitur laniorū more hoc præstiteris, acutiori nouacula à calce cutem ad imes, per adipem transuerfis semper ductis sectionibus. In quo opere, attento animo cutis connexus spectandus uenit, qui ad liuescentem perficitur<sup>r</sup> sedem musculi secundum quatuor digitorum os fleētēis, num scilicet tendo aliquis (uti quorundam uidetur esse sententia) citra adipis interuentū cuti proximē adnascatur: ac deinde, quum nullus erit tendo, cuiusmodi ligamentum id censere debeas, quod ego nunc primus lati tendinis in manu uices gerere dixi. Vbi hæc (adhibita sectioni quoq; simia) in pedis planta eo diligentius, quo ego hic plura recensuerim paradoxa, intuitus fueris, ad tibiam te conferes, ligamento illo, uel membrana, utcunq; id tandem appellare tibi uisum est, à musculo, qui secundos quatuor digitorū articulos flectit, nondū derafo. Atq; hic omnium primū spectabis, qui ex tota excarni tibię ossis<sup>r</sup> sede membranē ualidumq; ligamentū prodit, quod pertinaciter omnibus in tibia repositis musculis obnascitur, & eorum summas superficies unā connectit, & ueluti uinculi usum præstat, cuius beneficio musculi in sua sede non errantes, cōtinentur. Mox nouacula aut cultello à femoris inferioribus capitibus,<sup>a</sup> duorum musculorū principia liberabis, quos primos in posteriori tibie sede dicebam occurrere. In horum capitum dissectione aliud nihil cauendum est, quā ne cum externo musculo, tertij<sup>b</sup> musculi caput ab externo femoris capite unā imprudens auferas. Illud enim caput opportunissimē seruetur, donec primos duos à quarto eoufque diuulseris, ut iam non amplius communem illorum tendinem à quarto<sup>c</sup> dissecare ualeas. Reflexis itaque his duobus musculis, & sesaminis, quæ illis innascuntur, ossiculis unā quoq; obseruatis, tertij quoq; caput liberabis: quod in manu sinistra assumens, à quarto<sup>d</sup> musculo deorsum uelles. atq; id citra negocium tantisper feceris, dum ad quarti musculi internum latus peruenias: hic enim cultello acutiori à subditis ad calcem usq; est dissecandus. Dein ipsius infertio tanto accuratiū est animaduertenda, quanto hæc in hominibus à simijs magis uariat. Hoc itaq; musculo à calcis osse resecto, pedem mouentium quartum, & totius suræ maximum suo exortu libera, & utrinq; ad ipsius latus, quā subditis incumbit corporibus, longam sectionem ducito, quæ membraneum id ligamentum inuolucrum<sup>e</sup> uel diuidat, cuius auxilio musculos inuicem externa superficie connecti diximus. Siquidem ilico atque musculum suis lateribus & capite liberaueris, promptissimum erit, illum à subditis ad calcem usq; detrahare. Vt uerò accuratiū infertionem spectes, profuerit illum proximē à calcis osse acutiori nouacula separare: & dein studiose expendere, num fortassis tendinis huius portio latum in pede produceret tendinem. nam & id quoque semel Galenus uidetur innuere. Tempestiuum nunc erit, à<sup>e</sup> musculo quatuor digitorum secundum internodium flectente, ligamentum illud abradere, quod ego tendinis lati uicem gerere protuli. Deinde sedulō à calcis osse<sup>f</sup> musculus ille liberabitur, qui paruum digitum in externum latus abducit, & statim ille<sup>g</sup> qui pollicem in internum latus à cæteris digitis amouet: ut<sup>h</sup> musculus quatuor digitorum secundum articulū flectens, sese offerat, isq; à calcis

Ligamenti lase-  
reptentis tendi-  
ni uicem sub-  
euntis.

Primi ex se-  
cundi pedem  
mouentium.

Tertij.

Quart.

Libra de Ad-  
monit. scilicet.  
Primi digitorum  
mouentium.  
Decemseptimi.  
Decimoclaui.

P osse li-

osse liberari, ac postmodum ad digitorum radices duci queat. In tendinum uero ipsius administratione, pari modo, ut in manu fieri precepimus, cultello ex quo transuersum digitorum ligamentum per ipsius longitudinem diuides: ac deinde, qualiter id subditos tendines transmittat, ac qui in secundos articulos illi inferantur, spectabis, sectionem rursus ad tibiæ posteriora conferens. Iam enim in poplite latitans<sup>k</sup> musculus, adeò pulchrè occurrit, ut ipsius naturam non minus, atq; ego illam describere possim, intueri ualeas: & non olicitanter animaduertere integrū sit, num uel minimū tibiæ flexioni opitulari queat. Hæc intuitus, illum à genu articulo liberabis: & nisi articulum ad ligamentorum inspectionem seruare propositum sit, nihil prohibet, à tibia femur liberare, quo commodiùs tibiam & pedem postmodum pertractes. Absecto igitur, aut relicto, ut ut lubet, femore,<sup>l</sup> musculum, pollicis secundum flectentem internodium, suo principio liberatum, à subditis ad calcem usq; detrahes. Deinde & illum quoq; similiter auelles,<sup>m</sup> qui tertium quatuor digitorū os flectit: ut iam utriq; ad suos sinus deductis, transuersa ipsorum ligamenta, longa sectione diuidere, ac postmodum illorum X literæ instar incubitum examinare liceat. Ille enim euestigio obuius est, quum ex suis sinibus detractos tendines, à pedis planta deorsum reflectis. Neq; ita duntaxat incubitus ille conspicitur: imò etiam<sup>n</sup> portiuncula se offert, à musculi pollicem flectentis tendine, illi admixta tendini, qui tertium indicis internodium flexurus est. Quinetiam hac administratione occurrunt<sup>o</sup> musculi, quatuor digitos pollicis adducentes: quos à calcis osse liberatos, atque ad insertionem perductos, unà cum tendinibus, quibus illi porriguntur, adimere conuenit, ut<sup>p</sup> carnea moles, primos digitorum articulos flectens, inspicatur: quam ex tuo arbitratu, aut prorsus à pedij ossibus abrades, aut illis connexam fines: neutiquam hic præteriens sesaminorum ossiculorum examen, quæ carneæ illius molis tendinibus diximus esse peculiaria. Iam<sup>q</sup> musculus, qui adhuc in posteriori tibiæ fede reliquus est, quiq; pedis motibus famulatur, à fibula & tibiæ osse, & horum membraneo ligamento, ad posteriorem usque interni malleoli sedem liberabitur: ac proprio ipsius transuerso ligamento longa sectione diuiso, musculus ille ad insertionem usque ducetur. Cæterum iam opportunum est, & anteriores tibiæ musculos aggredi, hicq; omnium primū transuersum in humiliori sede tibiæ iuxta pedem occurrens<sup>r</sup> ligamentū longa sectione diuidere. In quo opere magna tendinū congeries sese exhibebit, quorū (ut singulos ordine intuearis) primū attolles, qui à<sup>s</sup> sexto pedem mouentium musculo producitur: cuius capite, aliorum musculorum modo, ab exortu liberato, is ad insertionem usque ducendus est. quod mediocri sit negocio, si utrinque musculi latera ab ipsi connatis cultello aut nouacula diuideris. Post hunc, totū sese ostendit quatuor digitos extendens<sup>t</sup> musculus, unà cum portione illa, quam nonum pedem mouentium enumeraui. Vbi hic à tibia liberatus, ad insertionem ductus erit, is aggredietur,<sup>u</sup> qui pollicem extendit: quem similiter à tibia liberatum, ad insertionem ducere expedit: mente adhibita, quī eius musculi tendo, quā caput pedij ossis primo pollicis ossi inarticulatum superat, calli in modum indurefcit, perinde ac quā prini pollicis ossis sedem secundum os subeuntem contingit. eo namq; usu, quo innumeris sanè tendinibus sesamo comparata ossicula innascuntur, teudo iste cartilagineus, & in senibus penè ossesus, dictis nunc locis efficitur. quod etiam cæteris tam manus quàm pedis digitos extendētibz tendinibus inibi quodam modo euenit, ubi ossium læuem & cartilagine obcrusta tam tangunt superficiem, quæ ossibus articulatur, quibus tendines, ut illa moueant,

*Ansuli in poplite latitantes.*

*Secundi & tertij digiti mouentium.*

*Musculorum tres digitos pollicis adducentes, & primi quinq; digitorum ossa flectentium.*

*Quinti pedem mouentium.*

*Sexti pedem mouentium.*

*Decimiquartij digitos mouentium, unā & noni pedem mouentium.*

*Sesaminis ossibus in tendinibus digitos pedis & manus extendentibus respondentium sedis examen.*

*k 14. 14. p.*

*l 14. 14. p.*

*m 14. 14. p.*

*n 15. 14. Q.*

*o 14. 14. p.*

*p 14. 14. p.*

*q 14. 14. p.*

*r 14. 14. p.*

*s 14. 14. p.*

*t 14. 14. p.*

*u 14. 14. p.*

*v 14. 14. p.*

*w 14. 14. p.*

*x 14. 14. p.*

*y 14. 14. p.*

*z 14. 14. p.*

*aa 14. 14. p.*

*bb 14. 14. p.*

*cc 14. 14. p.*

*dd 14. 14. p.*

*ee 14. 14. p.*

*ff 14. 14. p.*

*gg 14. 14. p.*

*hh 14. 14. p.*

*ii 14. 14. p.*

*jj 14. 14. p.*

*kk 14. 14. p.*

*ll 14. 14. p.*

*mm 14. 14. p.*

*nn 14. 14. p.*

*oo 14. 14. p.*

*pp 14. 14. p.*

*qq 14. 14. p.*

*rr 14. 14. p.*

*ss 14. 14. p.*

*tt 14. 14. p.*

*uu 14. 14. p.*

*vv 14. 14. p.*

*ww 14. 14. p.*

*xx 14. 14. p.*

*yy 14. 14. p.*

*zz 14. 14. p.*

*aaa 14. 14. p.*

*bbb 14. 14. p.*

*ccc 14. 14. p.*

*ddd 14. 14. p.*

*eee 14. 14. p.*

*fff 14. 14. p.*

*ggg 14. 14. p.*

*hhh 14. 14. p.*

ueant, inferuntur. Superfunt adhuc in tibia<sup>7</sup> duo pedis motibus famulantes musculi, qui fibulæ exporriguntur: quorum administratio à<sup>8</sup> ligamentorum transuerforum, inter calcem & fibulam existentium, dissectione inchoabitur: & deinde illorum tendinibus eleuatis, uniuersum musculorum corpus à fibula dirimetur, ut postmodum ipsorum insertionem liquidò uideas: ac denum<sup>9</sup> musculosum corpus, quod superiorem pedis sedem occupat, suis principijs liberatum, ad ipsius tendinum insertionem perducas: atq; ita uniuersæ musculorum fabricæ unâ nunc mecum summam manum imponas, ac ligamentorum, quæ adhuc reliqua sunt, naturam spectes, quorum administratio priuatim nihil, aut peculiare exigit. Si enim iam<sup>10</sup> ligamenta, ex latere ossis sacri, ubi quintum os sexto committitur, prodeuntia, simul cum<sup>11</sup> membrana, pubis ossis foramen occupante, inspexeris, integrum erit, ilium os à sacro, impetu abrumperè, & cômmissuram ambiens ligamen simul cum cartilagineis ligamentis intueri. Mox ad coxendicis articulû accedens, orbiculatim ipsum ambiens, ligamentum acutiori cultello transuersim diuidito, eiusq; crassitiæ & ortum & insertionem inspicio. Si modò femur in exteriora modicè duxeris, ex acetabulo ipsius caput elabetur, & teres<sup>12</sup> ligamentum sespectandum exhibebit: quo transuersim dissecto, acetabulum accuratè obseruandum uenit, propter iam commemorati ligamenti insertionem, & id ligamentum, quod sinum au gere diximus. Priusquam uerò genu<sup>13</sup> ligamenta administrètur, opportunum est perpendere, anteriori articuli sedi, præter<sup>14</sup> patellam, cum extendentibus tibiâ tendinibus nullum ligamentum præponi. id enim ubi constabit, exterius ligamentum à femoris capite liberatum, ad fibulam deduces. Post hoc, internum quoq; à femoris interno capite liberatû, similiter uersus anteriora tibiæ dissecabis: posterioris uerò regionis ligamentû, opportunè à tibia dissectum, ad ipsius in femur insertionem perducas. Diuiso postmodum omni ex parte ligamento articulum ambiente, in latus tibiâ postmodum reflecte, ac cartilagineum huius articuli ligamentum ad amussim obserua, cartilagine tibiæ ossis sinum augentes, ab articulo acutiori cultello separans. Ligamenti, quod tibiæ fibulam alligat, natura, si ad commissuram id diuidatur, citra negotium conspicitur. Membrana quoq; isthæc ossa, quâ inuicem distant, intercedens, sese iam citra ullam sectionem offert. Transuersa omnia modò dissecta sunt: atque idcirco superest duntaxat, fibulam à tibia disrumpere, & ligamen hac humiliori sede ambo ossa colligans inquirere: dein acutiori cultello fibulam à talo, & postmodum à tibiæ ossè talum liberare: ita enim duo sese offerunt tali ligamenta, cartilaginis speciei donata. Duo autem reliqua disces, si cultello talum ab ossè cymbam imitante diuideris, & à calce talum abraferis: quod difficulter, idq; nisi acuto cultello perfeceris. Ad hunc modum reliqua pedis ligamenta aggredieris, nempe ipsis secundum ossium commissuras circumsectis. Quàm uerò concinnè hæc omnia sint formata, ex cuiusq; ossis usu, & generali ligamentorum facultate, cuius notum esse arbitror. Quapropter neq; hic, neque aliàs sæpius ad summi rerum Opificis encomia digressus sum, ne eadem semper aut de musculis aut ligamentis repetenti, in nimiam molem hæc excrescerent. præcipuè, quum nihil facilius sit, quàm prolixè in usus enarrationem excurrere: si modò partium munus & officium, à me semper descripta, non lateant.

LIBRI SECUNDI FINIS.

P 2 ANDREAE

Septimi et e  
pedem mouen-  
tium.Decimi sexti di  
gitus mouen-  
tium.Ligamentorum  
adhuc reliqua  
rum adminis-  
tratio.



## ANDREAE VESALII

DE CORPORIS HUMANI FABRICA LIBER  
TERTIVS, QVO VENARVM ARTERIARVMQVEper uniuersum corpus series describitur, & peculiare ipsi figu-  
ræ, quibus potissimum conueniunt, Capiti-  
bus præponuntur.QVID VENA, ET QVAE IPSIVS SVB-  
stantia & usus. Caput 1.Quid tertio li-  
bro docendum.*Andreas*

SSIV musculorumq; historia superio-  
ribus libris enarrata, proximum uidetur,  
uenarum arteriarumq; per uniuersum cor-  
pus distributionem aggredi: siquidem Ga-  
lenus in primo de Administrandis sectioni-  
bus libro, hunc in Anatome discenda ordi-  
nem obseruandum rectè præceperit. Nam  
alius fortasse quispiam earum partium, quæ  
peritonæo & costas succingente membrana  
& caluaria continentur, descriptione, non  
uenarum modò, ac arteriarum, uerùm &  
neruorum quoq; descriptionem oportere

officium  
hæc 54. 7  
librorum  
figura.

necessariò præcedere, haud ineptè arbitrabitur: quòd absq; earum partium no-  
titia, omnis de uenis, arterijs & neruis sermo tam difficilis futurus sit, ut ego  
nequaquam improbauerim, hunc librum, & quartum, qui neruis dedicabitur,  
quinto libro, sexto ac septimo subijci, eosq; præsentè anteire: atq; id maximè,  
cum quis sectionum prorsus rudis, in istos libros primùm inciderit, & non in  
nostra Epitome uel obiter sese exercuerit. Ne tamen longiùs in præsentia à Ga-  
leni & cæterorum qui ipsum præcessere dissectionis professorum placito de-  
clinem, hunc librum uenis arterijsq; consecrabo, à uenis, quòd plures sint, arte-  
rijsq; magna ex parte internantur, sumpto sermonis exordio, liberaq; senten-  
tiam lectori in nostris libris transponendis relicta. <sup>b</sup> Vena igitur pars est instru-  
mentaria, teres, fistulæq; instar cauata: & sanguinem, corporis partes enutritu-  
rum, unà cum naturali spiritu, insigniter (si quis modò sit) caliginoso, deferens.  
Hæc unica peculiari propria ue constat tunica, quæ colore, ac quodam modo  
crassitie & forma membranis respòdet, sed aliàs ab illarum natura plurimum  
discrepat. Membrana namq; simplex ac simile corpus censetur: & omni ex  
parte, quomodo cùq; discerpatur, perpetuò membranæ nomen retinet. Venæ  
autem tunica, corpus est instrumentariu, ex similaribus partibus, fibris uideli-  
cet, conformatum. Quemadmodum enim membrane musculorū tendines  
ferè unico fibrarum genere intexuntur, atq; hac occasione non in similarium,  
sed instrumentaliu partium classẽ reponuntur, ita uenæ tunica triplici fibra-  
rum genere constituitur. Huiusmodi fibræ Græcis *ues* nuncupantur: & substan-  
tia quidem, forma & colore, musculorū fibris respondent, actione autem plu-  
rimum ab illis uariant. Hæ enim maxima ex parte, carnea musculorū substan-  
tia oblitæ, arbitrario: illæ uerò nulla eiusmodi carne implicite, naturali motui  
præficiuntur. quippe ut motus è nostro arbitratu pendentes, fibrarū in musculis  
auxilio perficimus: sic naturales motus, uniuerso corpori subseruientes, fibris  
quibusdam obeuntur, quæ organis toti corpori famulantibus intertextæ sunt.

Quanquam

Fibrarum quæ  
naturalis motui  
presunt, ab ijs  
quæ arbitrario  
famulantur,  
differentia.

Vene corpus  
in quo à mem-  
brana differat.


Quid uena.

Nomen  
specie.

b fig. cap.  
5. fig. cap. 6.

Quamquam naturales motus non omnes, sed materiæ duntaxat alicuius attractio, retentio & expulsio, huiusmodi fibris adimpleantur. Voco autem in præsentiarum uim attractricem, retentricem & expultricem, non quæ singulis partibus ad sui nutritionem à Natura est ingenita, sed qua quædam corporis partes commune aliquod uniuerso corpori munus præstant. Etenim prorsus alia mihi censetur attractio cibi per stomachum in uentriculum, & sanguinis è caua uena in dextrum cordis sinum, & aeris ex arteria uenali in sinistrum cordis sinum, & seminis in uterum, & sanguinis in uenas, & spiritus in arterias, quam attractio, cuius beneficio partes illæ nutrimentum sibi familiare, & quo priuatim aluntur, ad sese pelliciunt. Rursus longè alia excretrix facultas est, qua uentriculus cibum à se confectum, in intestina propellit, & qua rursus intestina superiora eundem in inferiora protrudunt, & qua cor sanguinem in pulmones, uitalemq; spiritum simul cum sanguine, impetu per corpus ruente, in magnam arteriam mittit, & qua sanguinem una uenæ pars in subsequenter continuè deriuat, & qua uterus foetum & uesica urinam excernunt: quàm ea sit, qua nunc dictæ partes proprii nutrimenti recrementa à se abigunt. Ad hæc, prorsus alia putatur cibi potusq; in uentriculo, & foetus in utero, & urinæ in uesica, & sanguinis in uenis, & spiritus ac sanguinis pariter in corde retentio: quàm ea sit, cuius beneficio cor, uentriculus, uesica, uterusq; familiare nutrimentum sibi seruant & retinēt. Motus igitur omnibus similiter partibus proprii, atq; alijs non subministrantes, insita partibus duntaxat ui, citra fibrarum opem omnino sunt. Sed partes, quas aut attractionem, aut retentionem, aut expulsionem partibus alijs, uel toti etiam corpori subseruientem & commodam obire necessum est, ad eam functionem fibras quasdam sibi uendicant, quarum auxilio illam complent. Et quemadmodum tres specie sunt motus, ita quoq; triplex fibrarum genus à Natura constructum esse credimus: rectum uidelicet, obliquum, & transversum. Ac rectæ quidem fibræ attractioni conducunt, obliquæ autem retentioni, transversæ expulsionem. Rectæ enim sunt, quæ secundum organi longitudinem expanduntur. Obliquæ autem, quæ secundum obliquum organo obducuntur. Atq; hæc circulares sunt: sed quoniam in duplici sint differentia, inuicem contrariantur, ac se mutuo X literæ, aut potius duorum inuicem implexorum circularum modo decussatim interfecant, ita commodè, quicquid organi cauitate comprehenditur, retinentes. Transuersæ secundum corporis latitudinem exactè transversim locantur, corpusq; orbiculatim, quemadmodum obliquæ, ambiunt: quamquam transversæ interim, circulares orbicularesq; priuatim nuncupentur. Discet porro quiuis fibrarum naturam, si quum uentriculus, aut intestina alicuius animalis, mensæ apponentur, unguibus illorum fibras inuicem diuellere, eaq; corpora nihil præter fibras quasdam inter se ordine, & prout parti ex usu erat, intertextas esse, expendere haud grauabitur. Idem spectabit, dum nuper mactati bouis uesicam, aut anserum ingluuiem inflari intuebitur: quandoquidem triplex illud fibrarum genus in modicè distenta iam uesica manifestè sese spectandum offeret. Contrà, si membranam aliquam, ut quæ costas succingit, aut peritonæum, int manus quis assumpserit, leui negotio discet, hanc simplex simulareque corpus

Fibrarum species & iunctio.



es accuratius proponet.

Quid fibrarum delineatio, in qua attractio uersa indicat, B autem C utriusque obliqui generis differentias, D uero rectas. At E triplicem fibrarum generum implexum quodammodo exprimit, quem mox subsecutur uena effigies.

Vene composi-  
tionis usus.

esse omni ex parte fibi par, nullisq; eiusmodi fibris conformatum. Quum itaq; uena organum sit, uniuerso corpori in sanguinis administratione utiliter subseruiens, Natura corpus ipsius membraneum, ac fistulæ instar cauum constituit, ac certis quibudam fibris, non autem ut fors ferebat, intertexuit: ijs nempe, quas sanguinis administrationi utiles fore cognouit. Quamobrem quum

*Pene caue portio,  
a dextre cordis  
suis ad regulis usq;  
conscendens; quæ si  
brar' in unguem  
corpore nativæ de-  
flerine gratia stu-  
dijsse finimus. Si  
forte interim ramo-  
rum hic passim ab-  
struccionum ratio  
nem expetis, hæc  
nena portione inte-  
græ caue uenæ deli-  
neationi quinti Ca-  
pituli suis subiectione confer, in illa quid D, E, G,  
H, I, K, N, S, T, G<sup>r</sup> a indicent, perpendens.*



*Ascutitia* &  
non peculiaris  
vene tunica.

apertum. Præter hanc peculiarem tunicam, uena aliam subinde afficit, pleriq;  
etiam corporis partibus communem. Quandoq; enim uenæ longo tra-  
mte aliquò ducuntur, aut ofsi, aut duriori cuiuspiam corpori incumbunt, aut alicu-  
bi suspenduntur, tum ex conterminis membranis alia quædam inftar mem-  
branæ tenuis tunica ipsi obuoluitur, cum tutioris ductus, tum ad uicinas par-  
tes firmioris nexu gratia. Cæterùm uenæ uisceri alicui infertæ, aut per muscu-  
li corpus digestæ, huiusmodi tunica toto infertionis progressu desituuntur,  
eâq; neuiquam indigent, quòd abundè in illis corporibus firmetur: quodq;  
ea tunica impedimento esset, quo minùs promptè sanguis ex uenis sudaret:  
aut ut sanguis in uenis collectus, substantiæ alicuius uisceris uim tardius expe-

*Veneris usus.*

riretur. Omnes uenas primariâ ratione, ut sanguinem singulis corporis partibus deferant, ac ueluti canales & ductus sint, ex quibus partes omnes suum alimentum fugant, rerum Opifex procreauit: quanquam quibusdam earum ramis, ut<sup>e</sup> portæ uenæ propaginis, ad succi in uentriculo elaborati ad iecoris portas attractionem, ceu alijs, ad excrementorum (ut<sup>a</sup> quæ in renes fuerum sanguinem deferunt) repurgationem quoque utatur, quas omnes suo loco commemorabimus. Num uerò ipse (ne sanguis frustra nullam à uenæ corpore elaborationem sentiens, per uenas deflueret) quandam sanguificationis uim uenis indiderit, non adeò promptè assertum uelim, quantum uis id omni bus confessum sit dissectionis professoribus. & si fortassis hæc uirtus uenis tribuitur, ea non rubicundum parabit sanguinem, sed uenæ corporis instar album: siquidem in omni naturali corporis nostri partium concoctione, con-

Lib. 4 de vsu  
part.

coctum necessario sibi concoquentis colorem afficit. Verum iam  
tempestivum erit, ex quibus nam partibus arteria  
fabricetur, persequi.

c fig. cap.  
5. fi. 12 lib.  
5 k.  
d fig. cap.  
6 6. 7 fig.  
22 lib. 1 m,  
n.

QVID



## QVID SIT ARTERIA, QUÆQUE IPSIUS

substantia &amp; usus. Caput II.



**A**RTERIA uas est, similiter ut uena, membraneum, tere, ac fistulæ modo cauum, quo uitalis spiritus, & impetu uens calidusq; sanguis per uniuersum corpus diffunditur: quorum beneficio, accedente arteriæ ipsius motu (qui dilatatione ac cōtractione fit) naturalis singularum partium calor, uitalisq; spiritus refocillatur. Porro Hippocratis adhuc, & Platonis & Aristotelis tēpore, arteria nuncupabatur, qua inspirantes, è naribus aut ore aerem in pulmones attrahimus: quaq; rursus expirantes, è pulmonibus eundem educimus. Nobis uerò uocatas arterias, illi uenas appellabant: atque arterias à uenis nonnulli ea ætate distinguebant, quum has quidē non pulsantes, illas autem pulsantes appellarent. Ad hunc sanè modum Hippocrati secundo de Vulgaribus morbis libro, arteria uenæ nomine donatur: cuius agitatio, quum in infantis partu uelox & magna & ualida reperitur, ualidam, ac uegeto feruidoq; calore præditam, in corde irascibilem uim esse testatur. Cæterum sexto libro satis innuit, arterias subinde calidas uenas fuisse appellatas: uti arteriæ etiam nonnullis nominabantur uenæ, flauum & spirituosum, ac per corpus impetu diffusum, & tenuis subtilisque substantiæ sanguinem uniuerso corpori deducentes. Ita enim Platoni arterias, uenas uocare libuit, quando in Timæo attestatur, cor simul & uenarum fontem esse, & sanguinis, qui per omnia membra uehementer circumfunditur. Aristoteles autem in libris de Animalium partibus, & eorundem historia, subinde arterijs uenarum nomen elargitur. Nam ut reliqua præteream loca, is magnam arteriam cauæ uenæ comparans, in tertio historiæ de Animalibus, illam minorem uenam crebrò appellat. Sed successu temporis, eam quæ ex ore in pulmones pertingit, asperam uocare ueteres cœperunt: uasa autem pulsantia, naturalēque calorem recreantia, leues arterias nuncupauere. Verum nunc sola quæ ab ore in pulmones diffunditur, suum nomen seruauit, aspera; arteria uocatur. Arteria itaq; cuius modò historiam instituimus, similiter ac uena, membraneo cōstat corpore, comprimi, ac in se collabi, & rursus distendi idoneo: at longè solidiori, durior, ac ex pluribus tunicis conformato. Arteria enim duas peculiare sibi uendicat tunicas: quarū exterior profectò robore ac crassitie uenarum peculiari tunica respondet: interior autem, plurium dissectionis procerum suffragio, ipsa exteriori tunica quintuplo ferè putatur crassior: & dein totum arteriæ corpus ad uenam collatum, sextuplum censetur. Interior tunica quibuscūq; quia durior, & quauis membrana longè crassior existit, *χονδρῶδης*, seu cartilaginea appellatur. Vnde etiam Arabes forsitan, arteriam neruum pulsatilem uocauerunt. Tunicæ arteriæ, si-

*Quid arteria  
& quis eius  
usus.*



Arteria magnæ, quæ ex corde pronascitur, portionem hic diffusi apertamq; finitima, ut arteria conspiciuntur tunicæ, ac A qui dem locum indicat, in quo potissimum ea occurrit tunicæ, quam aranea tela assimilamus. B autem C & D in anteriorem notant arteriæ tunicam. Numerus autem ille 1, 2, 3, insinuat tres membranas, magnæ arteriæ orificio præfictas, ac in decima sexti libri figura B, C, D notandæ. Sic uerò E & D duarum coronarū arteriarum originem ostendunt. Foramina autē in arteriæ trunco ad uertebrae dorsum de flexo conspicua, eam propagant, sunt o a, quæ costis, deui septo, & alijs ad renes usq; organa digeruntur. Verum hæc suo loco erunt dilucidatæ: in præfati enim figura tantis arteriæ tunicis oliter adnotare uisum fuit.

*Arteriæ corporis  
quale, &  
duæ ipsius pec-  
uliares tuni-  
ca.*

*Affinitia  
arteriarum tunicae.*

*Arteria con-  
sensu rati-  
onis.*

milititer ut uenae, fibris cōformantur: ac interior quidem transuersis duntaxat intertextitur, exterior uerō rectis, & quibusdam mediocriter obliquis, transuersis autem nullis constat. Interior arteriæ tunica, ceu cutem quandam internæ intestinorum & uentriculi superficiei modo continet, latæ cōtinuæq; araneorum telæ manifestò persimilem, & in grandioribus arterijs præcipuè conspicuam, & à nonnullis tertiæ arteriæ tunicæ loco descriptam. Quarta uerò alia peculiaris nulla est: sed ueluti quibusdam uenarum, ita quoq; arterijs alicubi membrana tenuis obhærescit & circumtenditur, contegens eas, aut stabilis, connectens uel ipsas proximis partibus, quemadmodum de altera uenarum tunica retulimus. Atq; hæc omnia iustissimè à summo rerū Opifice sunt extructa. Fibras enim arteriæ corpus, eiusdem quo uenæ usus gratia sortitur: ac plurimas quidem transuersas obtinet, ut ocyus ipsi ex sinistro cordis sinu immissum sanguinem & uitalem spiritum toti corpori dispenset, neq; alium in transmittendo recipiendoq; rhythmū, quàm cor ipsum, efficiat. Ad hoc namq; munus magnopere transuersæ cōducunt, quas expulsionī à Natura præfectas esse, dudum asseruimus. Quia autem expulsionī admodum obsunt oblique, ut quæ materias retineant ac referuent, Natura paucissimas obliquis arterijs elargitur. Quæ quum tenuiorem rarioremq; & uelociori impetu ruentem substantiam, quàm uenæ, erant amplexuræ, ac dum uiuit animal, perpetuò dilatandæ, constringendæq; meritis etiam duriori & crassiori, pluribusq; tunicis conformato corpore extruuntur.

*c. Pateat in  
9. & 10. fig.  
lib. 6.*

### QVIS VENARVM ET ARTERIARVM numerus. Caput III.

*Ad hoc Caput omnes simul uenarum & arteriarum spectant imagines: uerim quia alijs locis opportunis quàm hic, reponende ueniunt, ab interiori margine ad illas commodè remittere.*



*Quatuor uenae  
in maximum  
numerus re-  
dactæ.*

**Q**UOT in uniuersum corpus uenæ, & item arteriæ deriuentur, si uniuersæ soboles, uasorumq; omnes prorsus distributiones enumerandæ sint, indicare arduum est, propemodumq; impossibile. At si uenæ arteriæq; propriam obtinentes circūscriptionem, ac proprijs ueluti terminis finitæ duntaxat, numero quodam sint complectendæ, in procinctu illarum est numerus. In natis enim absolutisq; hominibus omnes uenæ ut plurimum quaternario numero comprehenduntur, quæ cæterarum omnium radices censentur. Atq; una, ex caua iecoris se deprodiens, in bilis uesiculam, uentriculum, lienem, intestina, mesenterium & omentum excurrit. Secunda, ex gibbis iecoris, aut ut quibusdam uisum est, ex dextro cordis sinu originè sumens, in reliquum corpus, solis duntaxat exceptis pulmonibus, innumera ramorum serie dispensatur. ita tamen in iecoris substantia huius rami, primæ enumeratæ uenæ propaginibus attenduntur, & quibusdam ferè sedibus eum in modum conuenire, uniriq; suis mucronibus & terminis uidentur: ut quidam non dubitauerint, primam uenam secundæ esse continuam, astruere, utcunq; duarum uenarum loco iam dictæ nobis recenscantur. Tertia itaq; è dextro etiam cordis sinu pronata, frequenti admodum propagine in pulmones digeritur. Verum hanc uenam hoc sibi priuatim uendicare audies, quòd arteriarum constat corpore, hinc etiam arterialis uena nuncupata: quæ etsi cauæ uenæ corpori citra alterius substantiæ medium non est continua (quum scilicet ambas uenas, quæ inuicem proximæ sunt, cordis quædam substantia intercedat) in cōmunem nihilominus ambæ spectant

*a. s. cap. 6.  
fig. 1. lib. 1. h.*

*b. figura 6  
capit. præ-  
posita. 1. s.  
fig. lib. 6.*

*c. Pateat in  
9. & 10. fig.  
lib. 6.*

*d. s. fig. cap.  
15. & 6. fig.  
lib. 6. l. 1. s.  
8 fig. C. D.  
e. s. fig. cap.  
15. B. C.*

cauitatem,

cauitatem, quam dextrum cordis sinum esse, in sexto libro docebimus. His  
*f. 3 fig. lib. 5 p. 7.* quarta forte adnumerabitur, quæ ab umbilico, ut sic dicam, repēs, in iecur ab-  
*8 fig. capti- uo præ- posita g. 2 s. filib. 5 K. L.* sumitur, ad fortis enutritionem duntaxat animali subseruiens, unde etiam hic  
 in uenarum classe uix haberi debet, & potissimum uenæ circūscriptione pro-  
 pria finitæ loco: quum si ad amfusi singula examinentur, hæc non minus in  
 iecoris uenas pertineat, quàm foetui peculiare<sup>s</sup> arteriæ, in magnam arteriæ  
 truncum, ipsius<sup>s</sup> ue ramos aperiri, ac tanquam trunci illius quodāmodo propa-  
 gines esse spectantur. A<sup>s</sup> commemoratis itaq; uenis, utcunq; eas in numerum  
 redigere uoles, totius corporis uenarum soboles distributionesq; pendent, ac  
 ipsis reuera sunt continuæ. Arteriæ uerò, in maximum etiam numerum re-  
*8 fig. capti- uo præ- posita g. 6 A. i s. filib. 11. 6 C. C.* ductæ, duntaxat binæ censentur: una, quæ ex sinistro cordis sinu originem ca-  
 piens, in uniuersum corpus, præterquàm in pulmones, dispergitur. Altera ex  
 eodē cordis sinu pronata, in solos pulmones distribuitur: quæ quia uenæ con-  
 stat corpore, uenalis arteriæ nomen obtinuit. Cæterum si foetus interim arte-  
 riæ & uenæ peculiare quid nanciscuntur, id suis locis, ubi uasorum foetus tra-  
 detur historia, fiet obuium. iam enim operæ precium est, à perfectorum uenis  
 exordium sermonis fumere: ac singularum enarrata serie, ipsarum usum, dis-  
 tributionisq; rationem subiungere, simulatq; nonnulla de glandulis addide-  
 ro, quas Natura sectionis partitionis<sup>s</sup> ue uasorum robori præesse uoluit.

Dua arteriæ.

DE GLANDVLIS, VASORVM DIDVCTIBVS  
 roboris gratia immixtis, adnexisq;. Caput IIII.

PRÆSENTI Capiti nullam figuram duxi præponendam, quòd quàm plurima huc simul locari de-  
 buissent quinti ac sexti & septimi librorum figura, præter aliquot etiam musculorum tabulas, ad quas ab in-  
 teriori margine opportune remitteris.



A V D secus quàm Natura uenæ & arteriæ, propter pro-  
 prias ipsarum tunicas, aliam subinde membranam circun-  
 dedit, cuius beneficio illæ conterminis partibus aptè alli-  
 gentur, tutoq; prorepant: sic quoq; quum minimè igno-  
 raret, unū quodq; uas inibi noxijs opportuniùs expōitum  
 esse, ubi in ramos discinditur, tutæ scissionis gratia, substantiam  
 in super quandam utcunq; mollem, & nonnihil cedentem  
 condidit, qua nodorum in arboribus ritu, uasorum diuaricationes sic  
 passim repleuit, hancq; ramorū scissionibus substravit ac circundedit, ut nulla  
 ipsarum facillè findi, uel inualida fieri possit. At quoniam uiolentiori motu ua-  
 sorum diuaricationes iniurijs potissimum patēt, & super molli mediocriterq;  
 cedente substantia suauius uasa quiescunt, & demum eius auxilio, quamuis mo-  
 ueantur uehementiùs, impercussa integraq; custodiuntur: haudquaquam, ut  
 fors ferebat, singulis uasorum distributionibus huiusmodi substantiam (quæ  
 communi nomine Græcis *ἀδύπ & ὄγκος*, Latinis uerò glans & glândula & glan-  
 dium, & interdum caro dicitur) Natura interiecit. Quandoquidem illa pau-  
 cissimam, aut nullam propemodum diuisionibus, quæ neq; suspensæ ferun-  
 tur, neq; articulis, uario admodumq; laxo motu præditis, incumbunt, commu-  
 nicauit, quòd illas uasorum partitiones ex uiolento motu nihil passuras, ei per-  
 spectum esset. Verùm ubi diuisiones quapiam membrana suspensæ, aut super  
 articulos, qui in acutos mouentur angulos, longius porriguntur, cæq; plures in  
 istiusmodi sedibus numero habētur: Natura hanc, de qua agimus, substantiam  
 non mediocri copia illis uasorū diuisionibus circūdedit: uti per uniuersam  
 uenæ portæ distributionem est cernere, quòd hæc nimirum uniuersa mem-  
 branis

Cur &amp; quan- do uasorum di- strictionibus glandule im- mittantur.

a Spectat id  
 in 3 figura  
 lib. 5, ex in-  
 4 ad n. 11.  
 6 ad n. 11.  
 10 fig. lib.  
 11. 6 C. C.  
 L. M. M.



branis duntaxat suffulta, ad uentriculum, lienem & intestina excurrit. Pari in-  
super ratione in<sup>b</sup> membranis cavitatem thoracis intersepientibus, & in<sup>c</sup> cere-  
bro, super<sup>d</sup> cerebri testes, ac<sup>e</sup> in anterioribus cerebri uentriculis (quod inibi ua-  
sa in membranis suspensa feratur) hanc, quæ distributionis robori præest, sub-  
stantiam progigni, ex refectione doceberis: perinde ac<sup>f</sup> aliam, huic non admo-  
dum dissimilem, inter uteri superficiem, exteriusq; foetum integens inuolu-  
crum, cõtineri audies, quæ multiplici, uariæq; uasorum, de nouo in foetus pro-  
ductione generatorum, distributioni & ductui implicatur, attextiturq;: ac de-  
mum illorum uasorum, quæ membranis quodammodo suffulcienda erant,  
robori miris modis auxiliatur. uti & umbilici<sup>g</sup> uasis eiusmodi substantia usui  
est, quâ ab interiori foetus inuolucro in ipsius umbilicum pertinent. Ceterum  
<sup>h</sup> sub superiori pectoris ossis fine, <sup>i</sup> sub auribus, in axillis, in cubiti flexu, <sup>k</sup> in ingui-  
nibus, in poplite, & alijs nonnullis corporis sedibus, propter adiacentium par-  
tium motus, numerosæ uasorum distributioni glandulosam hanc substantiam  
attexi adhiberiq; cernimus: etiam si illa cavitatibus quoq; quibuscum implen-  
dis, infarciendisq; ea qua reponitur regione, subseruiat. quemadmodum & glandu-  
las quasdam, ad uasorum securitatem ac robur etiam auxiliantes, alicuius  
maioris usus, quàm tuendorum uasorum gratia, à Natura procreatas scimus.  
Cerebri enim glans, nuci pineæ aut coni imagini comparata, & cerebri testi-  
bus incumbens, præterquàm quod<sup>m</sup> partitionis ipsi incumbentium uasorum  
robori cõfert, in causa etiam est, quo minus ea uasa deorsum dependetia, meatus<sup>n</sup>  
initium obstruant, qui ab anterioribus cerebri uentriculis ad quantum per  
cerebri testes natesq; <sup>o</sup> ducitur. Item<sup>p</sup> glans non nihil quadrata, ac ossis cuneum  
referentis<sup>q</sup> cavitati seu sinui in interna caluarie sede incumbens, <sup>r</sup> ad stratis ipsi  
arterijs uasis uel aliquid accomodat, sed potissimum excipiendæ cerebri pi-  
tuitæ gratia procreatur. Dein<sup>s</sup> glandulæ superiori asperæ arteriæ laryngis uel  
sedi in faucibus appositæ, ac amygdalis cõparatæ, in super<sup>t</sup> quæ laryngis radici  
totæ propemodum carneæ accumbunt, etij uasorum distributioni conducunt,  
in hoc tamen magis creatæ sunt, ut saluam parent, faucesq; humore imbuant:  
uti & mamillarum propria<sup>u</sup> substantia quodammodo glandulosa, lactis gene-  
rationi præest. imò<sup>v</sup> glandosæ substantiæ, in omento & mesenterio passim oc-  
currenti, à dissectionum professoribus uis quædam tribuitur, qua humorem  
quendam irrorandis intestinis aptum progignunt: non secus quàm stomachum  
humectat<sup>w</sup> glandosum corpus, in medio stomachi ductu ad cordis sedem disse-  
cantibus subinde occurrens. Rursus mulierum<sup>x</sup> testes, etij insigniter uasorum  
uterum adeuntium distributioni consulere uideantur, attamen ad seminis ge-  
nerationem in primis conducunt. Virorum uerò<sup>y</sup> testes, quantum uis fortè in  
glandularum classe recenseri possent, uasorum tamen distributioni parum con-  
ferunt: et si interim Aristoteles hos ideo potissimum creatos attestetur, ut tan-  
quam texttricum planulæ uasa erecta & dependentia feruarent.<sup>b</sup> Glandosum  
autem corpus, ad uesticæ ceruicem. <sup>a</sup> in uiris positum, etij uasorum inibi uariæ  
partitioni opem ferat, excipiendis tamen uasis seminarijs, & peculiari humore  
procreando, potissimum famulatur. Quandoquidem uerò singularum glandu-  
larum formam, substantiã, & proprium priuatumq; usum, suis locis sumus  
pertractaturi, harum hic longior non est instituendus sermo, oratione nunc  
ad uenarum seriem conuertenda: simulatq; addidero cõmemoratis iam glandu-  
lis, non duntaxat illarum distributionis robori prospectum esse, uerum etiam  
uenarum corpus inibi<sup>c</sup> crassius compactiusq; cõspici, ubi ramus aliquis ueluti

Nō omnes glan-  
des, uasorū di-  
stributioni ac-  
commodas, huic  
tantum munus-  
ri subseruire.

Quæ proprii ua-  
sorum corporis  
in horis distri-  
butionis crassi-  
tie conuerti ro-  
bori Natura  
proplexerit.

fig. v. c. 26 fig. F. a 22, 23 fig. lib. 5 f. b eundem fig. f. c Tale quid apparet sub interiori A & B figure 3 cap. 6 inferie,

à cau-

s M. C. 25

6 f. lib. 6

circa H. N.

M. O. C. 2

fi ad E. G.

G. I. L.

c 4 fig. lib.

7 H. 7 f. V.

d 7 fig. lib.

7 M. N.

c 4 fig. lib.

7 O. O. C.

6 fig. F. G.

H. I. K. L.

M. N.

f 1 tabella

fig. 10 lib. 5

E. E. 2

14. 1. 1. fi.

31 lib. 1 A.

A. fi. 31 lib.

8 B. B.

8 Noduli

apparentes

in A. tabell.

14 f. 30 lib.

5 ad X. X.

3 fig. lib.

6 f. uate

B. C.

i i muscal.

tab. A.

R i muscal.

tab. L.

17 fil. lib. 7

Lincolncet.

M. N. C. 10

fig. D. fa-

pra E. G.

m 6 fil. lib.

7 H. C. 7

fig. V.

n 7 fig. lib.

7 K.

o 8 fig. lib.

7 K ductu

per M. O.

et P. Q.

aut 10 fig.

B. C.

p 16, 18 fi.

lib. 7 A.

q 6 fi. cap.

6 lib. 1 H.

r 16 fil. lib.

7 E. F.

s 6 muscal.

F. C. 14 fi.

lib. 5 E. E.

t 6 muscal.

L. C. 11 fi.

cap. 21 lib.

2 M.

u 15 fil. lib.

s C. D. D.

x 3, 4 fig.

lib. 5, 4, 11

fig. lib. 5 f.

i. C. 10, 11

fig. L. L.

M. M.

y 14, 15 fi.

lib. 5 F.

z 24 fil. lib.

à caudice diducitur, aut truncus aliquis in ramos partitur: adeò, ut protuberàs quid in ipsis ramorum orificijs occurrat,<sup>d</sup> crassiori uentriculi substantiæ non ab simile, quam instar circuli cuiusdam in ambobus ipsius orificijs non leui industria, roboris occasione procreatam audies. Imò uenarum hæc crassior substantia, quum uenæ sanguine inanitæ, intus conspiciuntur, flaccidæq; secundum ipsarum ductum dissectæ propendent, ita uersus uenarū amplitudinem conuiet, ut inter secandum altantium nonnulli eam instar<sup>e</sup> membranei corporis procreatam, aliquando contenderint, quod urinam in<sup>f</sup> meatus, hanc à renibus in uesicam deferētes, refluere retrudi<sup>g</sup> ue prohibet: uti etiam nonnumquam eminentem illam uenarum corporis substantiam<sup>h</sup> membranæ comparare studuerūt, quæ magnæ arteriæ & uenæ articulis, ubi hæc è corde prodeūt, spectantur orificijs. perinde sanè, ac si è uena sine pari, & è uenis brachia, caput, renes & crura adeuntibus, eiusmodiq; compluribus uenis, sanguinem in cauæ caudicem, uel in sanguinis misione, & uarijs animi motibus, eiusmodiq; occasionibus remeare, refluere<sup>i</sup> ue, secus multo quàm ego existimo, foret impossibile: qui crassiorem eam uenę corporis in ipsa ramorum dissectione occurrentem substantiam, roboris cuiusdam gratia à Natura procreatam esse, in scholis contendere soleo, prauū quorundā iudiciū haud ignarus, qui integris ucnis ne flatum quidè è uena pari carēte in cauę caudicē duci posse, turpiter cōfingunt.

VENAE PORTAE PROPAGINVM  
series. Caput v.

NVDAE VENAE PORTAE DELINEATIONIS, QVAM  
sequens proponit pagina, characterum Index.

*A, A, &c.* QVINGRE his characteribus, portæ uenæ propagines indicantur, per icoris corpus diffusæ, & hic ueluti icoris formam secundum cauam ipsius sedem exprimentes.

*B* Vena portæ, quæ primū à icoris substantia liberæ & amplissima cernitur, ac ueluti suam caudicē constituit.

*C, C* Duo ramuli, bilis uesiculam aduenies.

*D* Vena ad posteriorem inferioris orificij uentriculi sedem excurrentis.

*E* Hac sede uenæ portæ in duos maximos bipartitur truncos.

*F* Truncus sinister & elatior.

*G* Truncus dexter & humilior maxime distributionis uenæ portæ.

*H* Vena dextram fundi uentriculi sedem perreptans, & geniculatim illi sedi ac superioris membranae omenti dextre parti ramulos præbens.

*I* Vena duodeno intestino & ieiuni principio exproptia.

*K* Vena, in dextram regionem gibbi uentriculi, quæ id dorsum respicit, aliquot furculis digesta.

*L* Vena, in dextram sedem inferioris omenti membranae, & colum intestinum, quæ hæc fertur, excurrentis.

*M* Soboles quædam à sinistro trunco in glandosum corpus inferiori membranae omenti innatum, sparsæ.

*N* Vena insignis sub uentriculo, ubi dorso is innuitur, uersus elatius ipsius orificium obliquè conscendens: quò pri-

*O, O.* usquam pertingat, utriusq; unam educit propaginem, *O* insignitam, & in uentriculum hac sede, quæ dorso in-

*P.* cumbit, digestam. *P* uero indicat præsentis uenæ reflexum, quem per dextrum orificij uentriculi latus in ante-

*Q.* riorem uentriculi sedem mittitur. *Q* autem reliquam præsentis uenæ seriem notat, quæ instar coronæ id orificium amplexatur.

*R* Ramus uenæ superius uentriculi orificium ambientis, qui secundum elatiora uentriculi procedens, inferiori orificio furculos exhibet, soboles etiam satius frequentes in progressu ad anteriora posterioraq; uentriculi dispergens.

*S* Grandis uticunq; uenæ, in inferiorem omenti membranæ & colum intestinum, quæ uentriculo exporrigitur, numerosa sobole procurrens.

*T, T* Sinistri trunci, ubi is iam lienem est accessurus, partitio.

*U* Venula in sinistram sedem inferioris membranae omenti radicem in integræ figuræ (quod subinde desit) delineauimus, cuius seriem hac peculiari figuræ, quam margini adhibemus, exprimentes, in qua *T* uenam, quæ lienem exporrigitur, demonstrat utriusq; ab truncatam præsentis uero uenula, & insignitam.

*X, X* Vena ab illis quæ elatior a lienis petunt, in sinistrum uentriculi latus dispersata.



Y Einsf.

VENAE PORTAE, AB VNIVERSIS QVIBVS COMMITTITVR PARTIBVS LIBERAE, INTEGRA delineatio, in ea proportionē expressā, ad quam secundū præsente[m] figuram aliquis iecur, bilis uesiculam, uentriculum, lienem, omentum, mesenterium & intestina, ex ipsorum magnitudine, ac insuper in illorum situ depingeret.



*Y* Eiusmodi etiam uena hic, qualem utrūq[ue] *X* indicabat, inscriptur.

*Z* Uena in sinistram fundi uentriculi sedem perreptans, multasq[ue] soboles uentriculo superioriq[ue] omenti membranae offerens.

*a, a, a* Venarum in lienis substantia distributio, adeo frequens, ut lienis imaginem facile ostendat.

*b, b, b* Prima dextri portae uenae trunci in mesenterium series, quae dein sane est infinita, & impēse uaria, priusquam suis extremis in intestina implicetur.

*c* Uena colo intestino, quā recto continuatur, exprorecta, ac à uenis duducta sinistram mesenterij partem potissimum intercurrentibus.

*d, d* Uena



d. d. Vena sub recto intestino propens, & ramulos illi in progressu offerens.  
e. e. Venularum soboles, recti intestini sinem amplexantes.

Præter hanc figuram, cuius modo characterum indicem absolui, alie complures, quinto libro dedicate, præfenti Capiti subseruiunt, quibus illa exprimuntur organa, in quæ portæ soboles diffunduntur. Præcipue autem hæc spectant secunda, tertia, quarta, decima, duodecima, decimatercia, decimaquarta, decimaquinta. Quinetiam ad præsentem historiam maxime facit figura ex horum librorum Epitome sumpta, quam ad huius libri calcem in hoc subiectam, sui uenarum & arteriarum mutua series oculis obuerfetur.



N iecoris substantia, ab omnibus<sup>a</sup> demissioribus, & quæ orbiculatim consistunt, extremis ipsius partibus<sup>b</sup>, exiguæ admodum, numerosæq; uenarum propagines incipiunt, quæ uersus iecoris medium porrectæ, sensim in maiores soboles, & inde in grandiores adhuc tantisper coeunt, donec omnes (quæ profectò sunt quàm frequentissimæ) in caua iecoris regione, uersus eius<sup>c</sup> medium, ad interiora ta-

Portæ ramorū  
in iecoris sub-  
stantia series.

e. 12. fig. lib.  
s. inter N.  
N. O.  
b. A. A. A.

e. 12. fig. lib.  
s. inter N.  
N. O.  
b. A. A. A.

b. D. 15. fig. lib. 5. d.

i. E. parti-  
tur in F. & G.  
G.

k. 6. 8. fig. lib. 5. d. P. ad Q.

l. H. 14. 15. fig. lib. 5. c. O. 2. fig. lib. m. 2. fig. lib. s. V. 4. fig. p. P. P. 12. fig. lib. 5. ad T.

o. Z.

men & posteriora, iuxta dorsum magis, unitæ, ac in maiores ramos congressæ, unam grandem & impenſe amplam cōstituunt uenam, quæ nobis portæ uenæ nūcupabitur. Hæc ad eum modum ex iecoris cauo enata, aut (si non minus uerè, quàm clarè loqui uoles) omnes nuper dictos ramos, soboles & propagines in iecoris substantiam<sup>a</sup> dispergens, obliquè sinistrorsum descendit, in multos uenarum uelut ad bilis uesiculam, uentriculū, intestina, lienem, omentum, mesenterium, enarranda iam serie digesta. Primum<sup>c</sup> duos ualde exiguos ramulos ex superiori, seu anteriori sui corporis parte, bilis uesiculæ ceruicis distribuit: qui eam ceruicem amplexantes, ac in furculos capillorum modo prætenues diducti, in uniuersum uesiculæ corpus eo pacto excurrunt, quo in<sup>e</sup> alba adherentē uel oculi tunica uenulas porrigi cernimus. Post hos aliquanto inferius ab elatiori quoq; & anteriori uenæ corporis sede, uersus dextrum tamen latum magis<sup>b</sup>, alius promitur ramus, nuper commemoratis insignior, qui humilior uentriculi orificium, & uentriculi portionem, huic iuxta dorsum proximam, aliquot ramulis adit, nulla prorsus sobole anteriorem uentriculi sedem perreptans. Portæ uenæ caudex, postquam hos diffudit ramos, deorsum magis protensus, in duos maximos bipartitur truncos: quorum elatior (quem & sinistrum, doctriinæ studio, opportunè nominabimus) propemodum uniuersus in uentriculū & omentum, & quandam colli intestini<sup>c</sup> regionem, quæ secundum humiliorem uentriculi sedem fertur, deinde & in lienem absunuitur. Alter, qui & humilior & grādiore est, ac dexter meritò appellabitur, totus, præter unam aut alteram sobolem, in mesenterii & intestina exhauritur. Ab huius namq; dextro latere, iuxta ipsam caudicis portæ in duos truncos distributionem, utcunq; insignis soboles uenæ uel uentriculo exporrigitur, quæ omenti membrana superiori suffulta, & sub dextra uentriculi fundi sede transuersim producta<sup>m</sup>, exiguas frequentesq; uenulas certo ordine, ac quodam modo geniculatim uentriculo diuariat, qui & anteriorem & posteriorem fundi uentriculi regionem multis furculis aliquo usq; intertexunt. Hæc uenæ, ubi<sup>n</sup> ad mediam fundi uentriculi sedem proceſsit, in quosdam exiguos ramulos finitur, illi uenæ contiguos, quam non multo pōst reliquam fundi uentriculi regionem occupare audies. Porro quemadmodum hæc uenæ plurimas uenulas seriatim ex elatiori ipsius sede uentriculo offert, ita quoq; innumeræ uenularum soboles per totam dextram superioris membranæ omenti regionem diffundit, illis ferè numero (quanquam non longitudine, & uario per omentum implexu) correspondentes, quas in uentriculi fundum spargi, paulo antè dicebā.

Portæ caudicis  
extra recur di-  
stribuitur.  
Ad bilis uesi-  
culam.

Ad uentriculi  
humilioris orifi-  
cium.

Portæ caudicis  
in duos præci-  
piuos truncos  
scisso.

Ad dextram  
uentriculi fun-  
di sede, & ipsi  
proximam o-  
menti partem.

Q

Verum

Verum præsens uena<sup>a</sup> interdum, neq; id sanè infrequenter, à portæ uena, supra quam illa in duos grandes truncos bipartitur, originè obtinet: imò quandoq; à sinistro portæ trūco non semel hanc ipsam pronasci obseruauimus. Quen-  
*Ad duodenū  
intestinū.* admodum uerò hæc subinde in ortu uariat, ita etiam<sup>a</sup> uena quæ ipsam subse-  
quitur, non idem semper principium exigit. nunc enim à dextro dextri trunci  
latere, nunc uerò à latere dextro uenæ portæ caudicis, priusquā is in duos eius-  
modi truncos dirimitur, uena quædam originem ducit, quæ<sup>a</sup> primum intesti-  
norum, quod duodenum uulgo uocamus, numerosa serie implicat. Hęc enim  
intestinum id ad medium ferè ipsius longitudinis prinūm contingens, deor-  
sum ad reliquam intestini longitudinē paulo ultra ieiuni<sup>a</sup> principium expor-  
gitur: & superiori membrana omēti, & glandoso corpore huic intestino ad-  
nato suffulta, geniculatim intestinorū sedi, quam perrepat, ramulos dispergit,  
non negligens interim glandosum, quo sustinetur, corpus. nam & illi, & mem-  
branz, quā prorepat, furculos quosdam impartitur. <sup>a</sup> Sinister portæ truncus  
*sinistri trunci  
serici.* transuersum ad inferiorē omenti membranā, quā hæc posteriori uentriculi  
subiicitur regioni, prorepat: hacq; omēti sede, dein & glandoso corpori, huic  
membranæ innato, sustinetur, apteq; suffulcitus, in plurimas notat dignas so-  
boles digeritur. Non procul enim ab ea sede, quā à portæ caudice truncus iste  
discinditur, inferioriq; omenti membrana implicatur, ab elatiori ipsius regio-  
ne<sup>a</sup> uenam germinat, quæ non admodum frequentiam orū serie in gibbum  
uentriculi, quā dextram dorsi sedem id spectat, diffunditur. Ab humiliori au-  
tem trunci sede,<sup>a</sup> alia diducitur uena, nuper dictæ quodāmodo in ortu respon-  
dens, quæ deorsum in dextram inferioris omēti membranæ regionē furculos  
aliquot deriuat, & in colum in testinū, quā hac omēti membrana id cōtinetur,  
quibusdam ramulis pertinet. Porro ulterius in sinistri trunci uersus lienē pro-  
gressu, præter<sup>a</sup> exiguas soboles, quas is priuatim glanduloso ipsum suffulcien-  
corpori elargitur, ab elatiori sua sede<sup>a</sup> uenā promit, omniū uentriculū adeun-  
tium facile capacissimā, quæ inferiore etiam omenti membrana cōtinetur, &  
obliquè sinistrorsum sub uentriculo, quā dorso id innititur, confendens, mox  
uentriculo<sup>a</sup> duos cōmunicat ramos, utrinq; singulos, in hanc uentriculi sedem  
multis etiam furculis dispersos. Reliquum uenæ sursum ad<sup>a</sup> elatius uentriculi  
orificium, per uentriculi posteriora exporrectum, ad dextrum orificij latus, ad  
anteriora ipsius orificij<sup>a</sup> emergit: & totam anteriorem sedem ambiens, per si-  
nistrum eius latus denuò in posteriora retorquetur, ac (ut semel dicam) coro-  
næ prorsus modo uentriculi superius orificiū concinnè (quod in canibus spe-  
ctatu est iucundissimū)<sup>a</sup> perrepat, in progressu ramos rectā deorsum in uen-  
triculi corpus geniculatim offerens, qui magnam uentriculi sedem occupant.  
A<sup>a</sup> superiori autem sede, uena hæc ramulos etiam diffundit, sed exiguos pror-  
sus, & in stomachi terminū, quā is uentriculo cōtinuatur, excurrentes. Porro  
inter cæteras propagines, ab hac uena coronę instar elatius uentriculi orificium  
succingēte exortas, utcuq; insignis uena ab ipsa pronascitur, quā à posteriori  
uentriculi regione secundum dextrum orificij latus antrorsum cōtendit. Atq;  
hæc propago, à dextro eius uenę latere nata, secundum superiorem uentriculi  
sedem, inferius uentriculi adit orificium, id frequentibus utcuq; furculis am-  
plexans, & in progressu geniculatim ramulos in priorem posterioremq; uen-  
triculi sedem spargens. Iam cōmemoratæ uenæ tot propaginibus in uentri-  
lum pertinenti,<sup>a</sup> alia respondet, ab humiliori sede sinistri uenæ portæ trunci  
prodies, ac inferiori omenti mēbrane implicita, quę non lōgè ab initio in duos  
ramos plurimū ab inuicē discēdētes bipartitur, ex quibus denuò quāmplures  
furculi

furculi deorsum prorrepunt, in coli intestini partem (quæ inferioris membra-  
næ omenti beneficio, tanquam à mesenterio ad dorsum committitur) excu-  
rentes, & nonnullis propaginibus in partem inferioris membranæ omenti per-  
tingentes, quæ intestinis incumbit, ac ueluti à colo intestino pronascitur. Atq;  
hæc quidem de hominibus me dixisse arbitrator. nam à sinistro portæ trunco  
ne minima quidem soboles canibus ad colum intestinum digeritur, uti etiam  
in ipsis colum intestinum nulla ex parte omento alligatur. adeò, ut neq; miran-  
dum sit, si hac orationis serie interdū à Galeni placitis recedam, qui funiarum  
uenas (uti ipse etiam ad Antisthenem scribit) ex professo docens, hominū ue-  
nas non persequitur. Cæterum postquam sinister portæ truncus commemo-  
ratus eduxit propagines, ad lienem transuersum accedens, in<sup>m</sup> duos secatur ra-  
mos, qui rursus in alios partiuntur: atque hi duo in alios tantisper dirimuntur,  
quousq; inferiori membrana omenti perpetuò suffulti, numerosa serie in<sup>n</sup> ca-  
uam simam uel lienis sedem recta linea secundum totam ipsius longitudinem  
implantentur, & infinita sobole uenulas oppidò quàm graciles, inuicemq; im-  
plexas, per uniuersum lienis corpus digerant. Ab infimo ramo, lienis inferiora  
petente, priusquam sinister portæ truncus in frequentissimas soboles illas di-  
spargatur, interdum<sup>n</sup> tenuis uena prodit, quæ in sinistram inferioris membra-  
næ omenti sedem uno atq; altero furculo dispensatur: idq; tunc potissimum,  
q s. quando primus<sup>n</sup> maioris in humiliore omenti membranæ pertinentis uenę  
diductus, angustior est, quàm ut commodè uenæ membranæ inibi furcu-  
los communicet. Præterea à ramo quoque illorum qui ad superiorem lienis  
regionem repunt, quum is iuxta lienem consistit, uena exoritur, quæ dextror-  
sum lata, & omenti membranæ superiori intertexta, in eam uentriculi sedem  
pertingit, quæ elatiori lienis sedi propinquior uisitur. Hæc quandoque, sed ra-  
rius, in uentriculi tunicas adeò excurrit, ut non admodum procul à sinistra se-  
de superioris orificij uentriculi distet. Quod autem hæc uena illud contingerit  
(ut ingenuè fatear) uidi nunquam. Neq; etiam præsens uena ab elatissimo lie-  
nem aduentiū ramo promitur, sed ab illo qui ferè huic proximus est. Quemad-  
modum uerò hæc iuxta eminentiorem lienis partem principium ducit, sic à  
maiusculo ramo, in eam lienis sedem accedente, alia exurgit uena, utcunq; in-  
signi amplitudine donata: quæ perinde atq; nuper dicta dextrorsum retor-  
quetur, & sinistram uentriculi fundi regionem perreptans, illi accuratè con-  
uenit uenæ, quam ad fundi<sup>x</sup> mediū usq; dextram eius sedem amplecti retuli-  
mus: ambæ enim iuxta hoc mediū in exiguos desinunt ramulos, mutuoq; im-  
plicantur. Dein sinistra, perinde ac dextra in suo latere, ad sinistram fundi uentri-  
culi sedē furculos geniculatim antrorsum retrorsumq; dispergit, ac superiori  
membranæ omenti in sinistram ipsius partem oblongas frequētesq; soboles com-  
municat. Cæterum canes ea quam fundi uentriculi dextram sedem adire cōme-  
morauī, destituūtur: & illius uicem ea supplet, quæ sinistram fundi sedem ramis  
conferit. Atq; ad hunc modum frequētissimè sinistram portæ uenæ truncum  
absumi spectabis. non rarò autem adhuc in hominibus, ex singulis ferè uenis  
concauę lienis regioni iam inserēdis, singulas uenas in uentriculū ad eum mo-  
dum digeri cōperies, quo<sup>n</sup> duas nuper cōmemoratas, à uenis lienem accedēti-  
bus propagari scripsimus. Atq; hīc sedulò obseruandū uenit, huiusmodi uenas  
ab eis quæ lienem accedunt, in uentriculū digestas, & lienem pertinaciter uen-  
triculo colligantes, neq; distributionis forma, neq; colore, neq; implantationis  
specie, quicquā ab alijs in uentriculum excurrētibus uenis differre. Dexter ue-  
næ portæ truncus (quē in intestina potissimū diffundi narrabā) quā primum

Dextri candi-  
ci portæ trun-  
ci series.



mesenterio à dorso nascenti committitur, in<sup>b</sup> tres præcipuos discinditur ramos: qui in alias denuò innumeras uenarū soboles distribuit, inter duas mesenterij membranas producitur, ac inferiorem posteriorem<sup>c</sup> ue intestinorū partem, quæ mesenterio alligatur, & quam dissectionū professoribus cauā uocare libuit, amplectentes, in ieiunū, ileum, cæcum, & dextrā coli sedē, qua id dextro reni & iecori adiacet, finiūtur. Et à tertio dextri portæ trunci ramo, qui in sinistram partem medij mesenterij potissimum discinditur, insignis uena in<sup>d</sup> sinistram mesenterii, quod colon à lienis regione ad rectum usq; intestinū dorso alligat, porrigitur: atq; nunc dictis uenis, in intestina diffusis similiter, in plures deriuata ramos, eam coli regionem, quæ à uentriculi sinistra sede, ad rectum usq; intestinū pertinet, adit. Cæterum omnium horum sinistri mesenterij uenæ ramorū, unus insigni magnitudine inter duas sui mesenterij membranas intertextus, secundum coli finem deorsum sub recto intestino prorepat, multas uenulas ex superiori anteriori<sup>e</sup> ue ipsius sede, ad eam intestini partē, qua porrigitur, depromēs. Hic ramus, quum ad recti intestini extremū usq; contendit, non amplius rectā sub intestino deducitur: sed in<sup>f</sup> plures utcunq; exiles diffusus furculos, finem recti intestini orbiculatim amplectitur. Porrò et si frequentissime sint trium nunc dictorū dextri portæ trunci ramorum soboles, tamen plures numerosioresq; in gracilia, quàm crassiora intestina distribui, cuius ex dissectione obuium est. Quo enim intestina uentriculo sunt magis cōtinua, eo pluribus uenarū implicantur furculis: quoniam ex illis plus succi, quàm ex sedi uicinioribus sit exegendum. Quemadmodum uerò nonnullis prius enarratis uenæ portæ ramis, corpora quædam glandulosa, atq; ad amussim quodammodo carnea attendi circumduciq; dicebam: sic etiam ramorū per mesenterium ad intestina diffusorū sectionibus, glandulæ quædam interiacent, proportionem in magnitudine cum distributis propaginibus seruātes. In grandioribus enim propaginū diductibus (quemadmodū ubi dexter portæ truncus in tres primos ipsius ramos finditur) magnæ reponuntur glandulæ, in subsequentibus uerò horum ramorū diuicationibus minores: quæ omnes capillorum modo prætenues uenulas, à uenis quas interiacent, mutuantur. In has igitur propagines portæ uena digerit, quæ omnes aut ad nutritionē, aut incrementi alicuius expurgationem, aut in uentriculo excocti cibi in iecoris portas deductionē, propagatæ censentur: quippe<sup>i</sup> quas bilis uesiculæ oblatas dixi, alimentum illi subministraturæ, ad eam excurrūt. Pari modo<sup>k</sup> propagines numerosa sobole in omentum diffusæ duntaxat, ut illud enutriāt, multoq; adipe imbuant, à portæ uena deriuantur. Sirculi etiam, capillorū modo tenues, in glandulas digesti, duntaxat sanguini ad enutritionē deducēdo utiles sunt. Pro pagines uerò lienem petentes rerum Conditor fecisse cōiicitur, ut simul lienii alimentum deferant, atq; ex iccore faculentū sanguinem, seu melancholicum succum, in ipsum expurgent. Quum enim crassius sanguificationis recrementum his propaginibus in lienē uehatur, & quum hæc illud lienii porrigant, simul quoq; necessario lienii nutrimentū offerunt. Siquidem, ut in quinto libro, non sine religione tamen quadā, & metu (quum de his impenſe dubitem) scripturus sum, lien atrum illud sanguificationis recrementū in sui nutritionē conficit, & lien per<sup>n</sup> uenas, ab illis quæ ipsi inserūtur, in uentriculū profusas, quod illi ex faculentiori sanguine reliquū est, neq; sibi concoquere ac adaptare ualet, in uentriculū eructat, id non (ut dissectionū professores malè arbitrantur) in superioris uentriculi orificiū diffundēs, sed ad fundū præcipuè, quod huc<sup>o</sup> maior uena, à uenis lienē adeuntibus, exorta, in uentriculū pertinet. Cæterum<sup>p</sup> reliquæ omnes portæ

Vena portæ  
distributionis  
ratio.

b b, b, b.  
dcm ff. c. 14  
10, 11, 12  
fig. lib. 5, 7.

c c, c, 10, 11.  
lib. 5, 11.  
d 11 ff. lib.  
5, 11, 12.

e d, d, o, 11.  
lib. 5, 11, 12.

f c, 11.

g 11, 12 ff.  
lib. 5, 11, 12  
fig. 4.  
h 10, 11 ff.  
lib. 5, 11, 12.

i c, c.

k 4 ff. lib. 5.  
10, 11, 12.

l m.

m 11, 12.

n x, y, z.

o z.

p d, h, k, 11, 12.

portæ propagines, in uentriculum & intestina digestæ, duplici nomine extruuntur, partim ut illis nutrimentū subministrant, partim ut suis finibus & osculis, in uentriculum & intestina hiantibus, confectum à uentriculo cibum, ex ipso ac intestinis exugant, atq; ad iecur, tanquam concoctionis officinam toti humano corpori communem, transferāt. Ingressus autem & ascensus in hanc regionem, ex multis, quæ nunc narrauimus, strictis itineribus unus præparatur: ipse nimirum portæ uenæ<sup>9</sup> caudex, quem ueterum quispiam Naturæ o-

perum peritus, ante Hippocratem πύλας nuncupauit, à quo in hunc usq; diem portæ uenæ nomen ad nos manauit, ipsaq; (ut & Galenus testatur) à nonnullis porta iecoris, ab alijs ianitrix appellatur. Verùm nonnulli totam uenam hoc nomine donari nolunt, sed partem ipsius duntaxat, quæ primū à iecoris substantia cernitur libera. Dicitur & caudicis nomine σελεχάρις: quod etiam nomen Galenus interdum cauæ uenæ, quæ iecori est proxima, & præterea magnæ arteriæ, quæ è corde pronascitur, tribuisse uidetur: quemadmodum, & in quinto libro de Administrandis sectionibus, & quinto de Partium usu, portam uenam Magnam appellauit. Dein portæ uena ab alijs etiam iecoris manus nuncupatur, quod iecur ea ad elaborati in uentriculo cibi attractionem tanquam manu utatur. Sunt qui lacteam appellant, quod succus, quem hæc ab intestinis iecori defert, lacteus sit. Porro uenam portæ, succum eum, quem è uentriculo, præcipuè autem ex intestinis ad se allicit, & in iecur deducit, iecoris modo in ipso deductu concoquere, ac eidem præparare, & in rudem sanguinem mutare, haud facile concessero, quantumuis grauius id in quarto de

Lib. 6 de Ple-  
tisi.

Portæ uenam  
sanguinem non  
conoscere.

Metacholicum  
suctum per por-  
tas ramus pur-  
gari.

Est uen.

Vsu partium libro Galenus asserat. Nullam enim sanguificationis uim membraneo & coriaceo uenæ corpori assignare possum: & si quæ esset, illa profecto album pararet sanguinem, non secus quàm à uentriculo emutata, lacteum colorem referunt: uti & uentriculi substantiam albam, non autem iecoris modo concreti sanguinis instar rubram esse liquidò cernimus. Atque hoc Galeni placitum, non semel ab ipso repetitum, altius refellerem, nisi Galenus ipse sexto de Dogmatibus Hippocratis & Platonis, eam mutasset sententiam, suisque ipsius, quo acrius Aristotelem oppugnaret, oblitus. Ramum portæ, quem sub recto intestino decliuem, ac mesenterio suffultū porrigi scripsimus, nonnunquam ad feculentum sanguinis per ani uenulas, sanguine interdum manantes, expurgationem plurimum conducere arbitror. Quandoquidem dum aut ob lienis obstructionem, aut aliud quodcunque ipsius uitium, feculentum sanguis non uniuersus, uel nullus planè in lienem absumiitur, uel lien eundem ad uentriculum eructare nequit, huius rami beneficio, certis quibusdam intervallis, uti mulierum menstruæ purgationes solent, per anum excerni credo. Rariùs enim ex uniuerso corpore, hæmorrhoidum uitio laborantibus, ad uenæ cauæ ramulos, in sedem pertinentes, lutosum eiusmodi sanguinem regurgitare, uerisimile nobis uidetur, dum ueram uenæ portæ distributionem perspectam habemus. Quippe ex hac coniecturari est promptissimum, qui is sanguis, à liene non attractus, aut ob meatuum obturationem non admissus, unde fluebat, rursus regurgitet, atque sua grauitate per ramum ad intestinum relictum pertinentem, deorsum procumbat: ibiq; tantisper referuetur, colligaturq; donec nimium turgētes uenæ, osculis reueratis, per anum manare illum finant. Huic meæ sententiæ magnum robur adiecit is, quem hoc sanguinis defluxu per interualla laborem, non ita pridem reseuimus. Huic enim minor, sed durior lien fuit: & uena sub recto intestino excurrens, pollicis quasi crassitiem superauit: eoq; modo sanguine turgebat, quo iam parturientium

Q 3 anima-


r fig. cap.  
6 B, f.  
6 fig. 12 cap.  
A, C.

t d. d.

fig. cap.  
6 ad y.

AND. VESALII DE CORPORIS  
INTEGRA ET  
PARTIBUS  
*suae causae*

AB OMNIBVS  
LIBERA  
*deliratio.*





animalium uenas, uterum amplexantes, insigniter amplas distentasq; cernimus. Verum hæc paulo latius à nobis relata sunt in epistola, qua dextram axillarem in laterali morbo (si modò dextram aut sinistram feces, quicquam interfit) aperiendam docui. ac proinde nunc ad uenæ cauæ seriem est accedendum: nam portæ uenam secandi modum, ad finem quinti libri reijciendum duxi, in quo omnium nutritionis generationisq; organorum administratio- nem unà persequar.

CHARACTERVM TOTIVS VENAE CAVAE DE-  
LINEATIONIS, ADEOQVE FIGURAE QVATVOR  
Capitibus iam seriatim subfequentibus communis, Index.

- A, A, A* Tres isti characteres, in regione, qua iecur in huius figuræ proportionem consisteret, obuij, propaginem notant, à uena caua in iecur perquam numerosa ramorum serie sinistrorsum distributâ. Alteram autem propaginem, in dextrâ iecoris sedem similiter diffusam, characteribus non insignimus: uti etiam nullas dextras uenæ cauæ soboles, quæ pariter utriusq; habentur, & priuatim nihil in altero latere sibi uendicant, ne fortassis characterum copia delineationem obsecrarem.
- a* Graciles soboles, à caua iecoris sub grandibus illis propaginibus *A* indicatis digesta.
- B* Uenæ cauæ sedes, inter iecoris gibbum & septum transversum consistens.
- C* Sinistra propago duarum, quas caua septo transverso offert, & à quibus etiam furculi in cordis inuolucrum se- pro obnatum pertinent.
- D* Cauæ uenæ orificium, in dextrum cordis sinum pertinens, ipsum uel forsan cauæ initium.
- E* Uenæ, coronæ modo cordis basim amplectens, ac deorsum per cordis substantie exteriora ad ipsius usq; micro- nem furculos à se deriuans.
- F, F* Uenæ coniugis exers, quæ à caua dextro latere supra cor prodit, declinans secundum dextrum uertebrarum latus ad secundam serie lumborum usq; uertebram descendit.
- G, G* Uenæ paricarentis propagines, quæ costarum offeruntur interuallis, ac postmodum in dorsalem medullam, & in musculos uertebræ, ipsiq; costis instratos, ac etiam in membranas, thoracis cavitatem intersepientes, furcu- los promunt.
- H* Cauæ sub pectoris ossis elatiori sede iuxta ingulum bipartitio.
- I* Uenæ, primæ thoracis costæ innixa, atq; ad alam transversam perducta, brachijq; axillarem, postquam aliquot propagines diffudit, constituens.
- K* Exilis uenæ, in sui lateris succingentem costas membranam soboles deriuans, ad trium serè superiorum costæ- rum interualla.
- L* Uenæ sub pectoris ossis sinistro latere ad abdominis usq; superiora descendens, ramosq; uerarum costarum carti- laginum interuallis, ac demum thoracem intersepienti sui lateris membrane, ac etiam musculo pectori instra- tis, & abdominis cuti ramos exhibens. Præcipuum autem ramum sub recto abdominis musculo dispergit, qui supra umbilicum in aliquot finiens furculos, alterius uenæ, ab imo sursum ascendentes, ac *Γ* notandæ, terminos
- M* respicit, ea nimirum sede, ubi *Δ* ascriptimus.
- N, N* Uenæ per foramina transversis processibus uertebrarum cernicis insculpta, ad caluariam properans, ac dorsali medulla geniculatim ramos offerens: ut & in musculos quoq; imbi cernicis uertebræ adnatos, soboles disponat.
- O* Uenæ musculi humilioris cernicis, & superiorem thoracis sedem iuxta uertebræ occupantibus, multiplici utriusq; sobole exporrecta.
- P* Uenæ ad musculos pectori instratos, & huius regionis cutem, & mamillam excurrens.
- Q* Uenæ in posteriora thoracis proficiens, ac in cauam scapule sedem, uicinosq; musculos deriuata. Hæc proximæ sunt uenule in glandium axilla excurrentes, quarum hic una inter *P* & *R* est expressa.
- R* Propago secundum thoracis latera deorsum ducta, & potissimum distributa in musculum, quo posterior axillæ cavitatis sedes constituitur, brachiumq; in posteriora deorsum uellitur.
- S* Interior ingularis, quæ graciles furculos assera arteriæ lateri, & hæc deductis nervis spargit, quod uero ipsius præter aliquot propagines reliquum est, in caluariam prorepit, & uariè, ut in cerebri usq; forum descriptione pro- sequar, imbi discinditur.
- T* Exterior seu superficialis ingularis.
- U* Exterioris uenæ ingularis iuxta fauces in duos ramos distributio.
- X* Exterioris ingularis ramus, oris interiora subiens, ac uariè in laryngem & ossis *v* referentis musculos, linguam, palatū, narium cavitatē, ac demum in caluariâ tribus propaginibus, ac etiam aliquot furculis in oculos digestus.

*Y* Exterior ramus divisionis externae ingularis, iuxta fauces facie, qui numerosa uenarum serie in facie musculi *Z* los & cutem, deinde ad tempora, & post aures, uniuersamq; capitis cutem digeritur. Ac *Z* quidem portionem

9. a. huius rami *Y* notati insinuat, quae in faciem exporrigitur. Character uero *g* sponis uenam indicat, a. portio-

nem secundum tempora sinum repentem. & \* cam notat, quae post aures & ad occipitis cutem fertur. Reliqua uenarum hic in capite series, ad cerebri uas spectat: quam ob id characteribus non insignimur, quod haec peculiari figura, decimo quarto Capiti praeposenda, explicabitur. Quanquam interim si quis hanc cauae uenae effigiem characteribus occupare uoluerit, ad eum modum, quo nos illa sinximus, quae huius libri adhibita calce, uenas simul cum arterijs ostendet, primum characterē apponere licebit dextro lateri: ut in dextrum, seu primum, mihi sic appellandum, durae cerebri membranae sinum hic, quasi instar semicirculi porrectum, indicaret. Secundus character sinistro, seu secundo eius membranae sinui inscriberetur, qui in sinistro latere semicirculi quoq; modo fertur. Tertius character tertio durae membranae sinui adhiberetur, qui illic incipit, ubi primus & secundus sinus, seu duo illi semicirculi inuicem congreduuntur, & ubi ab ipsis alius semicirculus quodammodo sursum exporrigitur, cuius posterior pars, occipitio propinquior, adumbrata cernitur: anterior autem, quae frontem adit, lucida. Quartus autem durae membranae sinus, quem ex anteriori sede trium dictorum sinuum concursus proficisci, atq; recta antorsum duci, suo loco audies, hic non est delineatus. in figura tamen, huius libri calce insita, y insignitur. Praeterea tribus illis characteribus quartus succederet, qui in primi durae membranae sinui radice positus, ingressum indicaret uenae *N* notatae: deinde ingressum rami interioris ingularis etiam insinaret, qui per foramen sexto neruorum cerebri pari praecipue exculpitum, caluariam subit. Quinto characterē interne ingularis ramus per proprium foramen in latera durae cerebri membranae excurrere insigneretur. Sextus ramum exterioris ingularis notaret, qui proprio foramine ad radicem posterioremq; sedem processus mamillaris temporum ossis exculpitum, caluariā subit. Ad haec, praeter alios characteres, etiam unus illis uenulis inscribi posset, quae sub frontis sinu *g* insignita, hic umbrata fertur: ut scilicet uenae etiā indicarentur, quae per caluariam sedem, cui ossis organa incumbunt, & per foramen, secundi neruorum cerebri parū gratia calatam, in caluariam repunt.

a. a. Utrumq; a uenam humerariam indicat, uerum superiori a ipsius exortus ab externa ingulari *T* notata significatur: inferius autem a humeraria sedem notat, quae iam humeraria ex alto in brachij superficiem cutemq; emerget. Verum quando hanc tabulam delineauimus, profecto meis oculis fidem derogans, & Galeno nimium credens, hunc ortum humerariae uenae tribui, quum alioquin hanc a uena *I* insignita, ad externum latius characteris *N* debuissim deducere: uti in sinistro latere eius figura factum cernis, quae ad finem huius libri posita, post praesentem est picta, iam me in propria sententia aperienda audacior. unde etiam hunc meum errorem, meae in Galenum pietati ascribes.

b. Humerariae propago, ab ipsius elatiori sede, non procul ab exortu, in posteriores cervicem occupantium muscululos, ipsamq; huius regionis cutem sparsa.

c. Humerariae propago, in gibbam scapulae sedem frequenti uicunaq; sobole excurrens.

d, d. Venae ab humeraria, priusquam ipsa penitus sub summo humero contorquetur, pronatae, ac in summi humeri sedis cutem, & superficiem musculi brachium attollentis, interdum quoq; & ad mamillam digesta.

e, e. e. Tenuis uenule, ab humeraria in externa brachij sedis cutem, anterioremq; regionem musculi cubiti flexionem prioris propagatae.

f. Humeraria iuxta externum humeri tuber in ramos partitio, qui inuicem amplitudine inaequales insuntur.

g. Ducta humerariae partitionis ramus, non semper conspicuus, qui in altum immerget, iuxta musculos internum cubiti articuli latus ad inferiora occupantes, mox absistitur.

h. Alius ducta nuper partitionis ramus, qui sub cute deorsum oblique ad media sedem flexus cubiti deductus, cum axillaris uena ramo e notando coit, ac cum illo uenam communem constituit, cui a. ascriptum est.

i, i. Humeraria ramus, per radium in externa cubiti regione oblique cōtendens, ac uenulas passim in proximam k. ipsi cutem dispergens: inter quas serē praecipua superiori *k* insignitur, quam ad exteriorem cubiti articuli sedis cutem ad posteriora quodammodo digerit. Quando praesens ramus, in eum modum oblique repens, ad brachia-

l. lis usq; radicem eregionē appendicis ulnae pertingit (nimirum ubi hic l. spectatur) axillaris uenae propaginis x notandae soboles ipsi commiscetur, ac una ab hac axillaris sobole & humeraria ramo uena confurgit, brachialis & postbrachialis sedem sub paruo digito, ipsamq; adeo paruum digitum, & quodammodo anularem, uaria ramulorum serie in externa manus sede accedens.

m. Axillaris uena, cuius nomina paulo post, perinde ac humerariae, recensentur.

n. Axillaris uenae ramus, in capita deriuatus musculorum cubiti extendentium.

o. Ramus nuper dicti musculi & posteriori brachij sedis cuti exporrectus.

p. Insignis propago, oblique deorsum sub humero, brachij uenae esse, uersus exterius illius tuber ducta, quae musculi hinc principium ducentibus ramos exhibens, aliquonq; in externam cubiti sedem cum quarto brachium petentium neruo fertur.

q. r. Axillaris

*q* Axillaris uena in duos truncos distribuitur: quorum alter binis *q* insignitus, in alto semper, totoq; ipsius ductu occultatur, ac eodem prorsus modo, quo manus arteria digeritur, quam in totius magnae arteriae figura, duodecimo Capiti preponenda, licebit intueri. Alter uero axillaris truncus (cui *r* inscribitur, & quae tota orationis serie nobis axillaris uocabitur) passim sub cute excurret, ac in uarias soboles dispensatur. Ceterum hanc axillaris uena distributionem etiam superius fieri, quam hic delineauimus, obseruabis.

*f* Uena ab axillari in interiori brachij sedes cutem, & nonnihil quoq; in posteriori sedes cutem digesta.

*t* Anterior axillaris uena ramus, eius diuisionis, quae hic iuxta interiori humeri tuberi cutē est conspicua. Praefens ramus, *t* insignitus, oblique ad mediam cubiti articuli flexus sedem sub cute fertur: ac cum humeraria ramo *h* notato coeans, communem efformat uenam, & indicandam.

*u* Axillaris iuxta interiori humeri tuberi bipartitionis posterior uena, quae plures easdemq; uarias à se soboles diffundit.

*x, x* Posterior uena *u* notata ramus, qui sub ubra deorsum ad brachiale porrigitur, & passim in cōterminam ipsi cutem digestus, sobolem offert humeraria ramo, brachiale iuxta minimum digitum descendenti.

*y* Uena *y* posteriori articuli cubiti sedes cutem excurrens.

*z, z* Notatur multiplex uenarum series, in interiori cubiti sedes cutem diffusa, & dein in interiori manus sedes cutem excurrens. At superius quidem *z* uenam notat, ab axillari uena ramo *t* insignito principii ducentem. Inferius autē *z* indicat propagines, quas axillaris uena ramus, *x* & *x* insignitus, internae cubiti regioni offert.

*q* Venularum Veneris monticulum implicantium, cum ramo *Δ* notando coeans, est namq; ramus *q* propago illarum uenarum, quae externam manus sedem inter pollicem & indicem perreptant.

*α* Uena communis, ab axillari ramo *t* insignito, & humeraria ramo, quem *h* notauimus, constata: quae per internam cubiti sedem, deorsum oblique radium descendens, exporrigitur: ac tandem radium supergressa, in exteriori cubiti sedem, propter inferiori ipsius regionem, excurret, ramulos quosdam in progressu ad proximam ipsi cutem dispergens.

*β* Communis uena iuxta humiliorē radij partem, quae brachiale respicit, diuisio, *γ* aut *Υ* aut *Δ* non absimilis: cuius quidem alterum crus, *γ* insignitum, externam manus sedem, pollicis ac indicis subiecit, ipsamq; pollicem & indicem accedit, & ramulum *Δ* indicatū, in internam manus sedem digerit. Alterum autem crus, *z*

*α*, insignitum, uersus medium & anularem potissimum absumitur.

Ramus externam manus sedem aduentibus, uaria à nostris medicis imponuntur nomina: quae quum inter se admodum pugnent, & passim sint obuia, aliquid de ipsis iam dicendum arbitror, hunc characterem indicem lubentius barbaris nominibus occupaturus, quam orationis, quae has uenas describam, seriem. Graeciguius & Latiniore medici, in cubito & manu paucas uenas propriis nominibus appellauerunt. Venam namq; per brachij interiora alantq; excurrentē, ac *r*, aut etiam *m* notatam, in utroq; brachio, quia axillam seu alon perreptat, axillarem uocauerunt: quemadmodum & cubiti interiorē, quod scilicet per cubiti interiora potissimum exporrigatur. Verum priuatum dexteri brachij axillarem, iecorariam uocarunt, quod in iecoris affectibus illam di uidere soleant. Sinistri autem brachij axillaris, lienaria ipsi dicitur, quod in lienis morbis hanc plerumq; aperiant. Sic rursus *ω* uocata, seu humeralis, *a* insignita, simpliciter suum nomen obtinuit, quod per humerum in manum feratur. & cubiti etiam exterior est nuncupata, quoniam cubiti exterius latus perreptat. Hippocrates in libris de Articulis, hanc uidetur crassam uenam nuncupasse. Quia uero haec capitis morbis mederi creditur, etiam capitis uena uocatur. Ramos uero *h* & *t* notatos, & uenam communem, quam *α* notauimus, constituentes, medius uenas nuncupauerunt, quod scilicet ad flexus cubiti medium ducerentur, aut quod inter cubiti exteriorē uenam & interiorē essent mediae. Ab obliquo autem ipsorum ductu, obliquas quoq; illas uocarunt. Communem (quae *α* insignitur) nuncupauerunt, quae ab illis ramis *h* & *t* notatis confurgit, atq; interiori & exteriori cubiti uenis communis est. Praeter haec nomina, uix alia apud illos reperis. At si Arabum libros leges, nominum acernū passim occurrent, eidem uena uix unquam accommodatorum. Quo autem aliquid certius de his quoq; depromam, studiosorum gratia, qui me his nominibus in Anatome remorari solent, non grauabor. Auicenna interpretis nomina hic recensere, quae Fen prima libri primi, doctrina quinta, Capite quarto leguntur. In quo Capite & Auicenna ex proposito brachij uenas describit, earum seriem à Galeni libro tertio de Administrandis sectionibus, aut potius ab Oribasio petens. Auicenna igitur, aut ipsius interpres, Spatularē uocat humeraria partem, à iugulari externa ad eam usq; sedem ductam, quae humeraria brachij cutem primū subit, quae pars duobus *a* in nostra delineatione complectitur. Quā autem humeralis brachio exporrigitur, illam Cephalicam, quasi capitis uenam nuncupat. Haec inter inferus *a* & *f* continetur. Humeraria ramum, quem *i* insigniuius, Funem brachij appellat. Axillaris ipsi *Ascellaris* dicitur. Communis uero, *α* notata, Nigra: ubi autem haec oblique ad radium contendit, Basilica ipsi uocatur. Alterum communis uenae diuisionis, quam *β* notatam, *γ* aut *Υ* assimilauimus, crus *ε* insignitum, ac anularem & medium quodammodo petens, in postbrachialis sede Syelen Auicenna appellatur. Verum aliis subinde apud Arabes & barbaros illam

Uaria uenarū  
brachij, cubiti  
& manus cutem  
perreptantium  
nomina.



illam Syalem uocari obseruabis, quæ iuxta brachiale ab humeraria ramo i notato, & axillaris uena propagi-  
ne x insignita, constituitur, & l notatur, cui eadem quæ axillari medicorum vulgus nomina imponit, hanc  
quoq; Saluatellam & Salubrem uocans. Quamquam rursus communis uenæ ramum y notatum, uersus polli-  
cis & indicis regionem exporrectum, alij Saluatellam uocent, huic eadem quæ humeraria nomina largientes.  
Ad hac, axillaris medicis potissimum Basilica, interdum & Nigra, aliquando & Funis brachij nuncupatur.  
Humeraria etiam ocularis & auris, quod scilicet earum partium inflammationibus medetur. Nisi forte ho-  
rum nominum impositores adeo stulti fuerint, ut cum Aristotele, & illi qui hodie uenas, à me recte antea pi-  
ctas, turpiter in lucem suo nomine emisserunt, arbitrati sint, humeraria ortum sub aure primum esse. Ceterum  
communis uena, etiam Media, Mediana, & Corporalis uulgo dicitur.

3 UENAE causa portio, qua partibus sub iecore positis nutrimentum administratur.

h Uena in pinguem membranamq; sinistri renis tunicam, conterminasq; sedes excurrrens.

θ Grandis uena, ad dextrum renem exporrecta.

i Grandis uena, sinistrum renem petens.

κ Propago à uena in dextrum renem deducta, in pinguem renis dextri tunicam excurrrens.

λ, λ Seminalis uena sinistra.

μ, μ Seminalis uena dextra.

ν Seminalium uenarum sedes, quæ hæc primum implicari, uaricumq; modo conuolui incipiunt.

ξ Uenæ geniculatim à caua in dorsalem medullam, quæ lumborum uertebri continetur, ac demum ad ipsas lum-  
borum uertebrias, ipsiq; accumbentes musculos & peritonæum digestæ.

ο Uenæ caue supra os sacri initium in duos truncos distributio, Δ, aut in uerso v, aut V non absimilis.

π Ramus transuersus in peritonæum & lumborum carnes, abdominisq; musculos distribuit.

φ Ramuli aliquot, in superiora os sacri foramina missi.

ρ, ρ Sinistri tronci magnæ illius super os sacrum bipartitionis in duos ramos distributio, quorum interior ρ nota-  
tur, exterior s.

τ, τ Interioris rami, quem ρ notauimus, exterior propago, in musculos exteriorem ilium os sedem occupantes, &  
in clunium cutem conterminasq; partes frequenti ramorum serie transuersim digestæ.

υ Interioris rami ρ insigniti interior propago, eiusq; propaginis rami humilioribus sacri os foraminibus distribu-  
ti, x uero & ρ reliquis interioris huius propaginis soboles, uti hac parua tabella eas delineare datum est, ex-  
primunt. Porriguntur autem illæ ad ani musculos, uesicæ fundum & cernicem: mulieribus etiam ad humilio-  
rem fundi uteri sedem, ipsiq; adeo uteri collum.

ω Uena ab exteriori ramo, quem s indicatum conspicis, deprompta, atq; cum reliquo interioris rami ρ notati  
coiens, quæ id pubis os foramen perreptat.

ei Hac sede uenæ, pubis os foramen permeans, præter alios ipsius surculos, uenulam in coxendicis acetabulis por-  
rigit, hicq; in istius regionis musculos disseminat.

z Uenæ pubis os foramen transeuntis ramus, cutem ad internam femoris sedem subiens.

xx Congressus dicte nuper uenæ, cum ramo magnæ in cruribus distributæ uenæ, quem z notabimus.

Γ Uenæ ab elatori sede exterioris magni illius tronci rami s insigniti, quæ u peritonæum perforat, principium dis-  
cens, quæ peritonæo & abdominis musculus cutiq; ramos offert: quorum præcipuus sub recto abdominis muscu-  
lo sursum ascendit, & supra umbilici regionem in aliquot diffusus surculos, eas respicit soboles, quæ huc, ubi  
ac consistit, à uena sub pectoris osse deducta pertingunt.

Δ Propago uenæ in cruribus tendentis, quæ transuersim ad genitalia conterminasq; sedes excurrit.

Θ Prima magnæ cruris petentis uenæ propago, per interiorem femoris tibiæq; sedem sub cute deorsum ad summum  
usq; digitorum pedis perreptans.

Λ Propaginis Θ insignita ramus, femoris interiora ad inguina accedens.

Ξ Dicte propaginis ramus, ad anterioris femoris regionis cutem uersus exteriora digestus.

Π Propaginis Θ insignita ramus, primo tibiæ mouentium musculo oblatum.

Σ Dicte propaginis soboles, in anteriorem & posteriorem genu sedes dispersæ.

Φ Hac sede propago Θ indicata, per sedem tibiæ interiorem, sub cute in uarios multiplicisq; ramos discinditur,  
hicq; opportune, dum sanguinem mittimus, aperitur.

Υ Hac ad anteriorem interioris malleoli sedem nuper dicte propago ducitur, atq; uti cernere est, in pedis superio-  
ra terminatur.

Ω Ramus à grandi uena cruris petente, in anteriorem coxendicis articuli regionem exporrectus, eiusq; sedis muscu-  
lis & cuti soboles uicinas frequentes deriuans.

1 Ramus septimo nonoq; tibiæ mouentium musculis, & cuti femoris iuxta externâ ipsius sedem surculos deductæ.

2 Grandis ramus, in quintum femoris mouentium musculum digestus.

- 3, 4. His duabus propaginibus inuicem coeuntibus uena constituitur, quæ inter musculos posteriorem femoris sedem  
 5, 6. occupantes excedens, sursum in femoris cutem ramos 5 insignitos porrigit, & maiori præcipuâq; sua portione 6  
 7, 7. indicata, sub cute per poplitei genui uel flexum fertur, & in suræ cutem ad calcem usq; digeritur, 7 & 7 notata.  
 8. Urimq; ad characterem 8 conspicitur soboles, à magna cruris petente uena musculus oblata, qui ab inferioribus  
 femoris capitibus principium sumunt. Atq; ita præiens character uenam inibi notat, ubi inter commemorata  
 nunc femoris capita repens, in duos truncos discinditur.  
 9. Exterior truncus bipartitionis à magna uena in poplite facta.  
 10. Ramulus exterioris trunci 9 insigniti, ad genu anteriorem exterioremq; regionem sub cute exporrectus.  
 11. Portio exterioris trunci secundum fibulæ internæ septimi & octauæ musculorū pedem mouentium sedi oblata.  
 12. Portio exterioris trunci, externam tibiæ pedisq; sedem sub cute perperans. Cæterum ubi hæc portio externa pe  
 13. dis sedi exporrigitur, cæteri q; pedis cutem ad euntibus uenis commiscetur, 13 inscriptum obtinet.  
 14. Interior truncus diuisionis, quam magna uena in poplite molitur.  
 15. Ramus interioris trunci 14 insigniti, per internam tibiæ sedem, uersus posteriora tamen magis, in furculos disse  
 16. dit, huius pedisq; internum latus sub cute accedens, ubi etiam 16 inscriptum habet.  
 17. Ramus interioris trunci, secundum quartum pedem mouentium musculum in tibiæ digestus.  
 18. Interioris trunci propago, quæ inter tibiæ os & fibulam, uersus anteriores tibiæ amplexantes musculos ducta,  
 per transuersum ligamentum in anteriori tibiæ sede iuxta pedem occurrens fertur, ac in musculos finitur, digi  
 19. to in externum latus mouentes.  
 19. Reliquum interioris trunci, quod inter musculos reconditur, post anteriorem malleolum inferiora pedis subit,  
 ac tandem in omnes digitos absumitur.

Præter hanc uenæ caue nudam delineationem, cuius characterum indici modo finem imposui, ac dein ple  
 rasq; quinti, sexti & septimi librorū figuras, huc in primis ea spectat, quæ ad tertij huius libri calcem, uenarum  
 artiarumq; simul seriem exprimere conatus sum. Quotiescunq; igitur in quatuor subsequentiū Capitum  
 interiori margine simplex character occurrerit, illum ad nudam caue delineationem referendum putato.

### QUONAM PACTO VENÆ CAVÆ SOBOLES

in iecoris substantia, portæ uenæ propaginibus committantur, quaq;  
 ratione uena caua iecori eas soboles offerat. Caput VI.

PROTIES alicubi in interioribus marginibus scribimus, fig. cap. 6. lib. 3. nudam uenæ caue deline  
 ationem, quæ modo præcessit, indicamus: non enim semper prolixè scribendum putauimus, Figuræ sexto Capiti  
 libri tertij præposita.

A tota fig.  
 ratione ca  
 pitij præpo  
 sita.



ROLIXE' admodum de uenæ caue exortu agendum  
 esse, si quis autorum controuersiam in medium adferen  
 dam arbitraretur, cum pleraq; Galeni loca, ipsius operibus  
 passim interiecta, tum maximè textus de Hippocratis &  
 Platonis dogmatibus liber attestantur, quem uniuersum  
 huic quæstioni, ex quo nam uiscere uenis origo ducatur,  
 dedicauit. Si enim ex proposito eadè disceptatio mihi ag  
 gredienda foret, nequitia Galeni argumēta oscitanter præterire liceret: quin  
 singula seorsim essent accuratissimo studio examinanda, & quæ uera & quæ  
 falsa ducerem, enarranda. Haudquaquam enim adeò Galeni uerbis est acqui  
 escendum, ut omnia quæ illic in Aristotelem congerit, uera indubitataq; esse  
 dicamus: uti iam in sermonis progressu, qui ueram uenæ caue seriem enarra  
 turus est, cuius reddetur obuium. quippe relicta de uenæ caue ortu contentio  
 ne, ipsius distributionem aggrediar: quam quidem à corde auspicarer, si mo  
 dō à maxima amplissimaq; uenæ caue sede hanc inchoandam opinarer. Nam  
 contra Galeni placitum, in Aristotelicæ sententiæ robur, uelimus nolimus, no  
 bis quantum uis etiam ringētibus, fatendum erit, uenæ caue orificium, quod  
 ad dextrum cordis sinum pertinet, multo amplius esse, quàm uenæ caue cor  
 poris amplitudinē, quacumq; etiam ex parte hanc metiendam duxeris. Deinde  
 subsequens Caput commentum Galeni falsum esse docebit, quo cauam, quæ  
 iecoris gibus committitur, amplissimam esse astruit: quodq; illam statim ab  
 exortu

Prolixam asse  
 ribus de uenæ  
 caue ortu esse  
 disceptationē.

Galeni argu  
 menta de uenæ  
 caue ortu in  
 Aristotelem  
 scripta, non  
 omnia ex tri  
 pade dicta.

c 7 fig. lib.  
 e C, C.  
 d D am  
 plius est,  
 quàm B, 2.

exortu in duos truncos, arteriæ magnæ modo findi, ac unum superiora petere, alterum uerò deorsum explicari, & postmodū ex illis truncis eum qui deorsum secundum lumborum uertebras fertur, grandiorē esse tradit. unde etiam ilico in Galenum propria ipsius iacula, quæ ex fontium fluuiorumq; ductibus & arborum radicibus tanta industria & callidè texuit, repellēda ueniunt. Eodem modo Galeni dogma prorsus est respuendū, quo uenam cauam ex corde prodire inficiatur: quòd illic non similiter, ut magna arteria, enascatur: hoc est, quòd mox ab ortu in duos truncos non diuidatur, sed rectà secundum cordis latus ducatur. Primum enim, ut falsum, & dissectionis professori indignissimum est, Galeni axioma, quo uenam è iecoris gibbo pronatam, in duos truncos, perinde ac magnam arteriam, partiiri affirmat: ita etiam non sua demonstratiua methodo concludit, hac occasione cauam à corde non oriri, quòd rectà secundum cordis latus porrigatur. Nam si quis arteriæ ortum attentè examinauerit, animaduertet profectò, illam è cordis basis medio, tanquā ex ipsius centro enasci: ac proinde si arteriæ pars aliqua deorsum ducenda fuerit, non ita multo post ortum arteriā necessariò diuidi oportuisse. Venam autem, quæ ex cordis basis latere (utpote uas mollius quàm arteria) secundum Aristotelis sententiam enascetur, non oportuit in duos truncos statim ab ipso ortu disindi: quum citra diuisionem peropportunè sursum deorsumq; repere possit, illaq; diuisio incassum fieret, præterquàm quòd prorsus esset inartificiosa. Nam si hinc prodians uena, arteriæ modo bifurcetur, primum ipsius origo & caudex aliquousq; in dextram thoracis sedem omnino proreperet, ac inde

e h. cap. 12  
C. diuisio  
in i ac V  
cum D.

f. Hic con-  
fir s. h. lib.  
6 C. D. F.  
cum O. P.  
R. figure  
6. Dein se  
da hanc se  
dem in nli  
ma 3 lib. si  
gura.

*H. A. C. figura sinx caua seriem, quam necessariò melioretur, si uno principio aliquousq; procedenti enata, in duos truncos ad cordis dextrum latus discederet. Quò autem hoc Galeni argumentum toties ab ipso repetitum, & hactenus optima demonstrationis loco habitum, accuratius obserues, consice præsentem figuram cum aliquot sexti libri, & postissimum cum quinta, & etiā cum totius causæ figuræ, ut animaduertas, quā illam citra diuisionem ad huc obliuari oportuerit, ut ex dextro dorso latere ad ipsius medium tandem pertingeret.*



tandem diuideretur, eiusq; diuisionis trūci denuò sinistrorsum deberent duci: si modò uersus corporis medium (ut nunc fit) cauæ partes porrigi debuissent. Accedit huc Galeni argumentū, nunquam non grauissimè ab ipso resumptū:

Si cor uenarum esset principiū, omnes uenas necessariò oportuissè ad cor pertingere, uti sanè ad iecur pertingunt. quasi uerò<sup>a</sup> arterialis uena ad iecur non minus, quàm<sup>b</sup> portæ uena ad cor, accederet: quamuis interim ramulos non paucos uenæ portæ cum cauæ uenæ propaginibus in iecore ita uniri uideamus, perinde ac si cauam uenam quis non immeritò portæ uenæ continuam esse, hacq; ratione etiam portæ uenam cordi communicari assereret, secus nimirum, quàm arterialis uena ad iecur pertingit. At si fortè Galeni sententiæ suffragaturi, contenderimus, arterialem uenam ob id ad iecur non pertinere, quòd arteriæ constet corpore: cōcedamus rursus oportet, uenalem arteriam uenæ corpore efformari, atq; ab illa sinistri cordis sinus sede principium petere, à qua caua è dextro cordis sinu nascitur. Adde & hanc non secus ab origine, citra unius caudicis aliquousq; productionem & incessum, in dextram pulmonis sedem & in sinistram duci, quàm caua sursum ac deorsum à corde fertur. ac dein adijce, uenam arterialem aliquandiu unum caudicem ab ortu feruare, ac postea in duos truncos diuidi: perinde sanè ac magnam arteriam, quæ similiter ut uena illa arterialis è cordis basis medio pronascitur. quod sanè Galeni etiam anatomici argumenti robur ostendit, quo conatur docere, uenam cauam arteriæ magnæ modo debuissè diuidi, si illa à corde, non autem à iecore initium duceret. Quod uerò ad Galeni rationem spectat, uenas omnes ad cor, perinde

g. 1 fig. 1  
cap.  
h. fig. 1.

i. 2 fig. 44.  
15.  
h. cōfir. c  
r. fig. 116. 6  
cum G. 5 si  
gura, ubi  
aliā seriem  
etiā mde-  
bis 1 quon  
G.



cor, perinde ac ad iecur, non pertinere afferentem, aliquid sanè de umbilici uena in medium adferrem, si uenam in humano foetu examinassem, quæ in canum foetibus ab umbilici uena, maiori sua portione iecur petente, in mesenterium ac lumbos dirigitur. hæc namq; doceret, umbilici uenam non debuissè in cor inseri, etiamsi cor uenarum statueretur initium, præcipuè quum umbilici arteriæ non in cor cessent: sed sat ipsis fuerit, magnæ arteriæ illic continuas euasisse, ubi hæc in crura est deducenda. Pari quoque occasione, de primo in foetus generatione organo nihil dico: quandoquidem et si cæterorum Anatomicorum inuicem, sibiq; met ipsis pugnantium decreta faciliè in multis improbare refellereq; queam, nihilominus quod mihi ipsi undique sanum ac indubitatum uideretur, nihil adferrem, adeò de foetus formatione, cordisq; mehercule usu præcipua quædam mihi sunt obscura, & dubijs plena. Verùm irrefutabilis illa (ut Galenus inquit) demonstratio, quam in Aristotelem de animalibus dextro cordis sinu destitutis contextis, minimè efficax est: quandoquidem illis animalibus caua uena unico cordis sinui eum in modum tunc committitur, ut in alijs dextro sinui, quum & his animalibus sanguis à iecore ad cor, arteriarum saltem nomine (etiamsi non pulmonis occasione) diffundatur. Et quis obsecro eò uenit stupiditatis, ut Aristotelem cauam uenam eiusmodi animalibus ex dextro uentriculo, quem non habent, exoriri uoluisset, cum Galeno dicat: & non cognoscat, Aristotelem aliud orationis genus de animalibus pulmone destitutis, quàm de illis quæ hoc non priuantur, institutum fuisse? Ad hæc, quis uel perfunctoriè in dissectionibus uersatus ambigit, argumentum quod à membranulis uenæ cauæ orificio præfectis ducitur, per uenalis arteriæ membranas dilui possè? Neq; sat scio, quid de auium uenæ cauæ distributione Galenus comminiscatur, quum nihil peculiare in uenæ cauæ serie in illis obseruem: nisi quòd iecur duabus fibris seu lobis ipsis priuatim constituatur, à quibus si caua principium ducit, profectò arteriæ magnæ ritu ab origine in duos truncos non diuiditur. Insuper Galeno, quum cauam à corde non oriri asserit, eo quòd arteriæ modo non pulset, animaduertenda uenerat arterialis uenæ ac uenalis itidem arteriæ natura. Pariter quando obijcit, cor sanguificationis uim iecori per cauam non offerre, quòd illa coriacea sit, ipsi expendendum erat, quàm breue interuallum inter cor & iecur consistat: & quo pacto ipse in quarto libro de Partium usu, toti uenæ portæ sanguificationis facultateni, iecoris uirtuti simillimam tribuerit. Cuius uenæ distributionis seriem Anatomici à iecore incæperunt recensere, non autem ab intestinis & uentriculo, à quibus cõsectum ex cibo & potu succum in iecur deducit: qui quum ex ipso sanguis, urina & bilis, lienemq; petens recrementum, consurgant, neutiquam proportionè illi respondet sanguini, qui per portæ uenam remeans, illis quibus hæc cõmittitur partibus alimentum suppeditat. Adeò, ut planè rhetoricum sit argumentum, quod Galenus à quorundam Anatomicorum in uenarum serie enarranda descriptionibus, cõtra Aristotelem colligit. Sed ne hîc Galeni dissectionis, atque adeò totius medicinæ principis placita uilipendere, ac seriatim ipsius argumenta refellere uidear, à iecore seriem uenæ cauæ iam auspicabor, quòd ab hoc sanguinè in cauam deriuari, aut saltem ex portæ propaginibus in cauæ soboles assumi adhuc credam: etsi cauæ ortum hinc esse, non ita annuam, neq; quicquam à me de ipsius origine assertum uelim, quicquid etiam casu mihi inter scribendû exciderit: ne hircosis quibusdam medicis calumniadi ansam ipse suggeram, qui non nisi huius generis nugæ morantur, & ossium interim ac musculorum cognitionè, &

R

uaforum

venæ cauæ distributionis descriptionem à iecore incipientem.


Caua in iecore  
seriet.

Caua uena no-  
mina.

Præfens figuræ iecoris gib-  
bum, posteriorisq; ipsius sedem  
construat. ac A quidem  
et A indicant elatiorem gib-  
bi regionem, septo transuerso  
ad eam cõspicitur, et  
moisq; primum  
proferat.

In qua iecoris  
fede caue cau-  
bi regionem, septo transuerso  
ad eam cõspicitur, et  
moisq; primum  
proferat.

Hæc figura uene caue portionem oculis subiicit, po-  
steriori iecoris sedi exporrectam, quam longa scissione  
secundum posteriorem uene sedem ducta dissecta, ac dein  
diffundit, ut propaginum foramina, quæ caua in iecore  
diffundit, aut quæ caua constitunt, in conspectum  
uenirent. Ac utrinq; A propaginis, quæ a caua in  
dextram iecoris sedem diffeminatur, orificiis, et ipsam  
deniq; propaginem notat. B uero et B propaginem in-  
dicant, quæ per sinistram iecoris sedem statuitur. C au-  
tem et C paruas soboles insinuant, quæ iecori etiam à  
caua, præter duas maximas propagines, diffunduntur.  
Nihil enim interesse uelim, an propagines hæc, et so-  
boles, à iecore enatas, caua constituerent, an à caua in  
iecoris substantiam diffusas esse dicam. Cæterum D caua uene sedes notatur, quæ hæc se-  
ptum permeat, ipsiq; ramos depromit.



coris sedem, rectè quodammodo deorsum porrectam, & duntaxat iecoris cui-  
dam sinui innatam ingrederentur, ipsi continuantur. Sunt autem hi<sup>u</sup> duo in-  
signiores

u Alter A  
insignitur.

p 7 fig. lib.  
6 C, C, C,  
alg. itz in-  
uicem con-  
fer 6, 8, 9,  
10 figuræ  
lib. 6.  
q fig. cap. 1  
A, A, A, A  
fur B.

r A, A, A  
ad B.

B, I.

t 11 fig. lib.  
5 Z incas-  
bit Y.

signiores rami, propter iecoris elatiora, in anteriorem cauæ sedem, non autem latera, aut posteriorem sedem, subingredientes, & neutiquam cum uenæ cauæ amplitudine comparandi. imò si non nimis anxie in Galeni uerba mecum iuraueris, proculdubio asseres, uenam cauam à corde deorsum per iecoris posteriora ferri, atq; ab huius anteriori sede duas insignes uenas pullulare, numerosa serie in iecoris substantiam diffusas, portaq; uenæ ramulis continuatas. Præter has insuper uenæ, quæ à caua iecori offeruntur, in reliquo ipsius per uisceris posteriora descensu (qui sanè breuissimus est)\* paruulos etiam spectabis ramulos, ab anteriori cauæ sede etiam in iecoris substantiam excurrentes, & in omnibus hominibus numero neutiquam pares. Atque hæc omnia hominem accuratè secanti, adeò sunt obuia, ut nullus nunc uenæ cauæ seriem spectans, non multo magis probauerit hanc, quod ad seriem attinet, oportere à corde primùm describi, ac demum ipsius ad superiora inferioraq; ductum enarrari. Sed quum sanguinem, qui in caua passim continetur, à iecore confici, cum Galeno adhuc arbitramur; uenæ cauæ ramorum distributionem à iecore quodammodo cum ipso auspicati sumus, deinceps eam uenæ partem descripturi, quæ supra iecur consistit.

EIVS VENAE CAUAE PARTIS, QVAE SV-  
pra iecur consistit, distributionis series. Caput VII.



A V D Q V A Q V A M Galeno satis fuit, nescio quàm uerum uenæ cauæ ortum à iecore comminisci: ac, ut ab Aristotelis placito uerius, magisq; ex merito declinare uideretur, fingere, uenam cauam mox à suo è iecoris gibbo progressu, in duos truncos, arteriæ magnæ modo bipartiri, unumq; ad superiora corporis, alterum uerò ad inferiora duci: quinimò, ut etiam probaret, sanguinem in corde

a resson-  
det B. s.  
b s figlib.  
6 B.

Cauæ partem  
sepiù transeun-  
tem, illa quæ  
sub iecore con-  
sistit, non ar-  
tiores esse.

non generari, adjicere non est ueritus, truncum qui superiora petit, multo strictiorem esse, minusq; amplum illo qui deorsum porrigitur. Sed iam asseruimus, cauam in eiusmodi truncos non diuidi.<sup>3</sup> Et etiam ueritati neutiquā consonum est, cauæ uenæ partem, quæ inter iecur,<sup>b</sup> dextramq; cordis aurem conspicitur, angustiorē illa uideri, quæ sub iecore lumborum uertebis explicatur. quod non perfunctoriè inter diffecandum obseruari uelim. Nam si quis obiter sectioni studium impendat, & iecur, aut cor, aut aliud membrum inter secandum mouens, plus sanguinis in uenæ partem, uertebis lumborū exporrectam, quàm in illam quæ supra iecur habetur, propulerit, is sanè Galeni sententiæ subscribet: at si uicissim ex hac uenæ parte sanguinem cōpressum, in illam sursum duxerit, leui opera Galeno non amplius assentietur. Quum uerò hæc sectione constabunt, cōduxerit Galeni rationem presius expendere, qua conficit, ascendente uenæ partem multo oportere minore esse descendente, quòd hæc scilicet plures quàm illa partes enutriat. Nam si ista Galeni ratio uera est, etiā citra sectionē ipsius commentū nulli non innotescet: quandoquidem ascendens pars plus sanguinis, cōtra Galeni dogma, quàm inferior, quæ lumborum uertebis exporrigitur, requirit. unde etiam mox inferendū est, hanc partem illa angustiorē merito oportuisse cōfici. Primū enim neq; bilis uesicula, neq; uentriculus, neq; intestina, neq; omentū, neq; mesenteriu, neq; lien, ramulum aliquem à caua assumunt, hæcq; sub iecore collocātur. Verū soli renes, altera uesica, testes & crura, & inferior abdominis pars, ab ea quæ descendit caua parte sanguinem adipiscuntur. Ab ascendente uerò, septum transuersum, &





latere pronata, deorsum ad quartæ propemodum thoracis uertebrae corpus contorquetur: & decliuis secundum dextrum uertebrium latus porrecta, suo<sup>i</sup> fine unâ cum magna arteria, sub septo transuerso ad aliquot usq; lumborum uertebrae pertingit. Hæc uena, cauæ uicē toto progressu gerit, quo ipsius caudex uertebrae ita<sup>a</sup> atq; in lumborum regione nequiuit contingere, ac geniculatim ramos ad uertebrae, ipsasq; adeo dorsi partes offerre. Merito igitur caua hanc uenam à se tam grandem deprompsit, ut arteriæ magnæ ritu utrinq; ad costarū interualla<sup>a</sup> ramos germinare possit, quos quidem à lateribus non diffudit, sed ex<sup>a</sup> media regione posterioris ipsius sedis, quæ uertebri innitur. Quia uerò coniuge priuatur, neq; in altero latere parem asciscit à caua propaginem, Græci eam *ἄσφυον*, nos uenam absq; coniuge, & paris expertem nominamus. Oritur autem potius à dextro cauæ latere, quàm à sinistro: quod secundum dextram dorsi sedem explicari debuit, sinistra nimirum sede, & media quodammodo à magna arteria dignissimo organo occupandis. Ab anteriori etiam caua sede non enascitur: ne frustra tunc longiori ductu, quàm modò, uerus dextrum reflecti, itaq; spinam accedere deberet. A' posteriori quoque principium sumere nequiuit, quod hæc sedes alijs incumbat organis, quodq; hinc uenam coniugis expertem dextrorsum magis deduci, quàm nunc, oportuisset. Ab hac igitur uena utrinq; geniculatim pullulant propagines, singulae ad nouem costarum inferiorum singula interualla perreptantes, quæ in uerarum quidem costarum interuallis ad eam usq;<sup>b</sup> sedem contendunt, ubi hæ in cartilaginem degenerant: in spuriarum uerò costarum interuallis, etiam in anteriora magis abdominis, quàm interualla pertinent, propagines hæ pertinent, abdominis musculis etiam<sup>c</sup> implicitæ. In ipso autem per costarum interualla progressu ramulos diffundūt, qui in musculos illi thoracis sedi, quam ipse perreptant, incumbētes, dispergūt. Præterea ab hac sine pari uena, ad omnes secundum quas deducitur uertebrae, soboles quædam pertinent, quæ in uertebrium corpora, & dorsalem medullam, & in musculos his sedibus accumbentes excurrunt. Insuper<sup>d</sup> membranis thoracem intersepientibus, quæ illæ dorso continuantur, ab hac uena furculi etiam offeruntur. Deinde non obaudiendum est, ab hac uena, quum primum ab ortu uertebrae contingit, subinde ramum quoq; educi: eumq; in tenues propagines diuisum, etiam sui lateris superiores costas adire, atq; inibi in membranam costas succingentem numerosis, sed gracilibus furculis distribui. atq; hi non seriatim ac rectè secundum costæ ductum ferūt, quemadmodum propagines inferioribus costis digestæ, uerum errabundo incesso excurrunt. Atque id adeo frequenter in hominibus (quod his scilicet multo breuior thorax, quàm quadrupedibus, à Natura datus sit) usuuenit, ut præsentī anno in publica sectione, uiro & item mulieri omnes thoracis costas uenæ sine pari propaginibus enutrirī, hic Patavij uiderimus. Et Bononiæ etiam (ut priuatas fileam sectiones) quum primum illic dissectioni præessem, atq; de uenæ sectione in laterali morbo satis pertinaciter contendere, una eademq; sectione tria nobis obtigerunt hominum cadauera, quibus omnes thoracis costas huius uenæ ramis enutrirī, nemo ex tanto eruditorum uirorum cœtu inficiari potuit. Atque ut id subinde obseruatur, ita sanè interdum hanc sine pari uenā, quum ad nonam ferè thoracis pertingit uertebra, in duos truncos diuidi cernes: quorum unus quidem dextri lateris costarum radicibus, alter autem sinistri exporrigitur, suiq; lateris costis, quæ proreperit, ramos offert. Interdum uerò à sinistro uenæ pari carentis latere, in eadem propemodum regione, grandem uenam pronasci obseruabis, illi ramo prorsus si-

*Paria uena pari carentis sectione.*

milem, qui à portæ uenae inferiorem omenti membranam adeuntium facile maximus est. Hæc enim ubi primum transuersum uertebrae illius, cui expor-

Duales  
hæ figuræ  
geminæ ue-  
næ pari ca-  
rentis feri-  
es expresse-  
mus, quæ ab  
illa variatæ,  
quam inte-  
gra uenæ ca-  
uæ delineat-  
io indica-  
uit. Notat  
autem hic A  
uenæ sine pa-  
ri truncum.  
B ipsius ra-  
mum, qui in  
sinistrâ du-  
ctus, in plu-  
res digeri-  
tur propagi-  
nes. C uero  
priuatim in  
inferiori fi-  
gura, insi-  
nuat caua  
uenæ caudi-  
cis portionē.



gitur, corpus transcendit, in duos ramos diffunditur: quorum alter sursum, alter deorsum secundum costarum radices fertur, ac suarum costarum interuallis pro pagines deriuat. Non secus sanè, quàm si Natura aliquādo maluisset, unum grandē ramum à dextro latere hic ad sinistrum porrigi, quàm super singulas uertebrae unum tenuem gracilemque ramulum ferri. Adeò, ut mihi etiam persualum sit (quamuis id nunquam uiderim) interdum à sinistro cauæ caudicis latere, ubi iugulum contingit, uenam depromi, quæ secundum sinistrum uertebrae latas decliuus ducta, sinistris costis ramos offerat, illa quam sine pari uenam nūcupamus, dexteras costas duntaxat alente. Atque huiusmodi uenæ ortū non tantum à iugulo primum posse fieri, sed paulo inferius, etiam agnus attestatur, in quo tale aliquod semel obseruauit. Verum eiusmodi non nisi rarissimè occurrentes uenarum series, Anatomes studiose non aliter expendendas putauerim, quàm si interdum sextum in manu digitum, aliud uel monstruosum se spectandum offerret. Adeò, ut si quando in publicis sectionibus hæc obseruo, ea tanquam non essent, tacite præteream, ne artis candidati in omnibus corporibus hæc obseruari arbi-

trarentur. Idque tanto, non in sectionibus solum, sed modò in absoluti hominis historia persequenda, faciendum duxi studiosius, quanto ipsos monstruosa illa magis admirari, experientia non semel didici. Porro iam sermone adijciendum est, mihi hæc in homine nihil esse prætermisum: uti sanè arbitrabitur, qui Galeni placita sedulo euoluens, primum à me quintâ pulmonis fibram seu lobum requireret, quo caua in interuallo inter septum & transuersum cordis inuolucrum, ex Galeni sententia suffulciretur. Quippe quum hunc lobum Galenus in simijs reperisset, oscitantia alios dissectionis proceres arguit, quasi illum ignorassent: uti sanè & Galenum is latèret, si hominum cadauera potius cum illis, quàm simiarum secare aggressus fuisset. Quum enim in homine nulum sit interuallum ductus uenæ cauæ à septo in cordis inuolucrum, sed hæc duo simul connata, unà semelque perforentur, nullus sanè pulmonis lobus hic consistere potest, qui in illo interuallo uenam sustineret. In caudatis uero simijs, & magis adhuc in canibus, amplum occurrit interuallum, inter septum transuersum, & inuolucrum cordis mucronem: ac hinc inter membranas thoracis intersepientes, inane uacuum uel est spacium, per quod caua prorepat, sibi substratum habens pulmonis lobum, quo is cauæ caudex mirabili Naturæ beneficio tanquam manu apprehenditur & suffulcitur. Proinde quando Galeni descriptionem canibus, nostram autem hominibus conferes, utranque ueram esse fatebere. Verum Galeni sententia nusquam non à caua, priusquam ad cor pertingat, uenas in membranas thoracis intersepientes, deduci ac distribui docens, ueritati parcat: quum hæc membranae uenas assumant, partim ab illis ramis, quos à iugulo ad has ferri audies, partim à uena sine pari. Caua autem, quum ad cor fertur, intersepientes thoracis cavitatem membranas ne contingit quidem: tantum abest ut ramulos ipsi ita tenues, ut in illas digeri debet, priuatim offerat.

Lib. 7 de Ad-  
minist. sect.

Lib. 6 de Placi-  
tis. lib. de Sect.  
uena. lib. 7 de  
Admin. c. 2  
Commentario  
rum in Hippoc.  
de Plistis rat.  
in morbis  
acutis.

Licet hic  
6 libri 5, 4  
5, 6 figu-  
ras, & ali-  
um huius  
libri spe-  
ctant.

f. L. 1 fig.  
lib. 6 N.  
N. Q.



offerat. Præterea alius, Galenum in libro de Venarum sectione probè affecutus, mirabitur, quî, priusquam cauæ supra cor progressum attingerem, à caua statim atq; in cor pertingit,<sup>g</sup> uenam arterialem in pulmonem porrigi, non ascripserim: quum interim illud Galeni sit dogma. quod quàm ueritati consentiat, ipsa uasorû uicinia arguit. quippe quum nihil ab alio pronasci uerè dicamus, nisi id ei sit contiguum, aut saltem attiguum, arterialem uenam à caua principium ducere, neuti quam quis asseret. Præterquam enim quòd arterialis uena sextuplo crassiori constat<sup>h</sup> corpore, quàm caua, illa hanc non cōtingit, & non mediocris cordis substantiæ portio inter cauæ orificij elatiorem sedem, & dextram orificij arterialis uenæ, intercedit. Dein arterialis uenæ orificiū non minus in cordis dextrum sinum, quàm orificiū cauæ orbiculatim liberumq; pertingit: nihilq; minus apparet, quàm soboles aliqua, à caua ad arterialem producta. Vnde etiam hæc, quia propriam obtinet circumscriptionem, non minus priuatim, quàm caua uenit pertractanda. Dein quis forsā me culpabit, quòd coronalem uenam dixerim esse (uti quoq; profectò existit) insignem: quum in libro de Venarum arteriarumq; sectione Galenus illam scripserit esse exiguum: uti contrā in septimo libro de Administrandis sectionibus, hanc perpetuò geminam reperiri tradidit. Huc accedit Galeni, de uenæ pari carētis principio, sibi non constans sententia. Primū enim in commentario decimo secundi libri in Hippocratem de Victus ratione morborum acutorum, sibi ipsi ter pugnat. nam in initio sermonis de uenæ cauæ per thoracem distributione, uniuersim inquit uenam octo inferiores costas nutriendem, à caua pronasci, antequam ad cor pertingat. Mox subiicit, in quibusdam animalibus supra cor hanc à caua depromi: in homine autem ex ea cauæ sede eandem emergere, quæ hæc dextram cordis aurem contingit. Rursus sui oblitus, aliquanto inferius subneſcit, hominis infernas costas à uena enutrirî, quæ sub corde à caua exorditur. Huic sententiæ propemodum conformis est, quæ in sexto libro de Hippocratis & Platonis dogmatibus legitur, quum scribit, cordis inuolucrum, simul cum omnibus membranîs, quæ tum thoracis cauitatem intersepiunt, tum quæ pulmonem ambiunt, alimentum ex caua, priusquam ad cor deferatur, sumere. In libro de Venarum sectione, uenam sine pari à dextra auris sede ad sinistras thoracis partes proficisci, atque ad quintam thoracis uertebra perferri in quibusdam animalibus, attestatur. In simijs autem, paulo supra aurem in dextris partibus hanc poni docet: pluraq; hic quàm in libro de Victus ratione, costarum interualla præsentî uena enutrirî fatetur. Eandem sententiam in septimo de Administrandis sectionibus complectitur, nisi quòd hîc ipsam à uena, quæ iuxta dextrum cordis sinum consistit, pronasci simpliciter tradit: quum illic ad sinistras thoracis partes illam proficisci, malè adiecerit. Quinetiam alio septimi eius libri loco hanc sine pari uenam ex dextro cordis sinu, non secus ac<sup>i</sup> coronalem pronasci docet: quamuis id in simijs haud euenit. At non est quòd prolixius alia huius ordinis loca ex libro de Fœtus formatione & aliunde in mediū adferam, quum ex modò propositis, Galeni de uenæ pari carentis ortu progressuq; sententia utcunq; constet: quæ quàm ueritati consentiat, ex nostra enarratione, ueram eius uenæ seriem prosequente, petere licet. In homine enim non minus quàm in simijs, & canibus, & suis, & bobus, & quotquot uidi quadrupedibus, uena pari carens à caua procedit, postquam hæc cordis inuolucrum superauit, ac eousque pertingit, ubi nullus amplius, qui uasorum interuentu perficitur, pulmonum apparet connexus. Et si quis sectioni fidem derogans, rationem huius uenæ exortus petierit,

*unde uenam  
pari carentem  
enasci oportue-  
rit.*

illam sanè adinueniet ex nostro sermone, qui Naturæ artificium in illius uenæ propagatione superius enarrauit. Haudquaquam enim hæc pari carens uena, à cauæ caudice sub corde enasci potuit: tum quòd nimium periculose suspensa fuisset, propter ingens interuallum, ab ea uenæ caue sede ad uertebras usq; conspicuum: tum etiam, quòd si illinc uena pari carens exoriretur, tota dorſi pars sub corde, & ea sede, qua eius uenæ principiū nunc exporrigitur, consistens, uenæ indiga relinqueretur: aut Natura denuò aliam uenam illinc, unde nunc illa enascitur, producere debuisset, illi dorſi sedi alimentum subministraturā. Eregione autem<sup>k</sup> dextræ auriculæ pronasci nullo prorsus modo quiuuit: quòd uas<sup>k s fig. lib. 6 B.</sup> pulmonem ad eūtia, uenalis scilicet arteria, & arterialis uena, & aspera quoq; arteria, illam ad dorſum ferri prohibuissent, nisi ipsa aliquouſq; prius aut dorſum aut sursum prorepens, aptam descensus sui sedem callidè inuenisset. Præterea si e regione dextræ cordis auriculæ uena paræ expers diffunderetur, ipsa etiam cordis inuolucrum peculiari foramine, secus atq; nunc, permearet. unde etiam uel hinc affatim docet, quàm procul à corde principium ducat. Neq; est quòd ad huius sententiæ robur, hominis dorſi, quā id corſpectat, obliquitatem adferam: quæ quum multo maior in homine, quàm quadrupedibus aut auibus sit, facilè liceret conficere, sine pari uenam homini etiam altius quàm illis animalibus à caua oportere enasci, quòd his scilicet succinctior ductus erectione dextræ auris ad dorſum, quàm illi uiſitur: uti profectò interſecandum non solum iucundum est expendere, sed etiam promptum. Quamobrem uerò Galenus ita uariè, & de hominis uena pari carente, ipsi nunquam indubiè uisa, magis perperam adhuc, quàm de ſimiarū uena ſenſerit, in ea Epistola utcunq; perſtrinxi, qua dextri cubiti axillarem in laterali morbo (ſi quòd interſit, cuius lateris uenam diuidas) ſecandam docui. Galenus enim aliquam rationem alicunde comminiſci ſtudit, qua Hippocratis ſententiam probabiliorem redderet, qua is ſanguinem non mittendum docet, quum dolor inferiora ac ſub ſeptum petit. Quasi uerò Hippocrates arbitratus fuisset, à<sup>i f.</sup> uena ſi<sup>m m. p. u.</sup> ne coniuge per phlebotomiam nihil educi poſſe, aut eam remotius ab<sup>i f.</sup> axillari diſtare, quàm ut hæc aut alia quæuis, illius gratia aperiri poſſet. quum interim in pulmonum, cordis, iecoris, uentriculi, lienis & renum affectibus, uenam in cubito non Hippocrates ſolum, ſed omnis medicorū chorus ſecet. Cæterum quoniam Epistola nuper commemorata, hæc prolixius cum aliquot alijs paradoxis perſequitur, cauæ uenæ diſtributionem deinceps, ſed quàm minimè potero interrupta ſermonis ſerie, aggrediar. Vena igitur caua, poſtquam ſine pari uenam à ſe diduxit, ad iugulum rectà ſub pectoris oſſe<sup>n ab f. d. H. 02 fig. lib. 6 F.</sup> conſcendit, membranis thoracem interſepientibus eleganter ſuffulta, molleq; & glandoſum corpus hic in iugulo paſſim adſtratū obtinens, quod Græci *θυμωρ*, Latini uerò communi glandularum nomine glandium uocant. Eſt autem glandium id in elatiſſima thoracis ſede extructum, ut ab omni noxa frequētiffimas uasorum diſtributiones hic ſuſpenſas, immunes ſeruaret. Vena enim caua<sup>p H.</sup> inibi primū in duos inſignes truncos tota diſcinditur: & à ſiniſtro trunco, quæ admodum & à dextro, grandis uena promitur, quæ primæ thoracis coſtæ innixa, poſtquam aliquot à ſe diſparſit ramos, ſub clauicula in axillam<sup>q l. r ut f. ſab E in ſig. r d lib. 6. s K.</sup> properat. Ab huius etenim radice<sup>e</sup> exilis uena enaſcitur, deorſum per coſtarum radices ad tertiam uſq; coſtam exporrecta, & exiguas ſoboles tribus, aliquando autem duntaxat duobus, ſuperioribus coſtarum interuallis deriuans. Præſens uena non ſemper ab eius quæ axillam petit radice pronāſcitur: uerū nonnunquam à caua, priuſquam in duos illos grandes truncos bipartiat, principiū ducit. Quinetiam interdum

*Caua ad iugu-  
lum neceſſaria,  
& ipſum inibi  
bipartita.*

*Pene axillam  
adeuntis arteria.*

*Vena ſuperio-  
ra coſtarum in-  
terualla petit.*

f. H.  
u Altera L.  
insignitur.  
dein utraq;  
fig. lib. 6  
B, C.

x G, G.

7 f. fig. lib.  
5 K. 6. mus.  
tab. a. ubi  
enim rectū  
musculum  
f. insignitū  
fig. lib. 6.

z M.

a r.

b ab I.

c f. fig. lib.

6 Q.

d f. fig. lib.

6 P, P.

e F.

f 13 f. cap.

14 lib. 7

u, u.

g 12 licet

colligere

ex 12 fig.

lib. 6.

h 1.

i N, N. ul-

time fig. f.

h 2 f. cap.

15 lib. 1 T.

7 fig. x, s

fig. a.

vena sub pe-  
ctoris osse deorsum  
repentes

Aliquot rami  
à uena axillam  
petente spargi,  
priusquam bra-  
chium subeat.

interdum hanc penitus abesse obseruaturus es, aut araneæ filorum modo præ-  
tenuem existere: quum breuiora illarum costarum interualla, ab ipsis incum-  
bente uena, quæ axillam petit, aliquando autem à uenæ pari carentis propagi-  
nibus (idq; potissimum in dextro latere) satis nutrimenti assumant. Ab ante-  
riori sede illius<sup>e</sup> magnæ in iugulo bipartitionis, duæ prodeunt uenæ, quæ an-  
trorsum ductæ, ad elatiorē pectoris ossis sedem contendunt, secundum ipsius  
latera, quibus costarū cartilaginee coarctantur, deorsum ad abdominis usq; supe-  
riora perrepates, numerosasq; soboles diffundentes. In progressu enim, ad sex  
superiorum utriusq; lateris septem costarum interualla, singulas distribuunt  
propagines, quæ ad terminū ossis costarum, ubi uenæ cōiuge carentis<sup>r</sup> ramos  
cessare diximus, finiunt. Quemadmodū uerò à ramis uenæ pari carentis, pro-  
pagines extra thoracis cavitatē ad musculos costis infratos excidere relatu est:  
sic quoq; à uenis ad cartilaginū in terualla disseminatis, ramuli notatu digni, in  
musculos pectori incumbētes, ipsasq; adeò mamillas propagantur, si modò ad  
has à uenis pectoris ossi exporrectis, furculi deriuantur. Porro quod ex uenis  
sub pectoris osse deductis<sup>r</sup> reliquum adhuc est, ad latum mucronatæ cartilagi-  
nis deorsum in carnosam rectorum abdominis musculorū partem distribui-  
tur. Venæ enim è thoracis cavitare prolapsæ, sub rectis musculis ad mediā usq;  
abdominis sedem feruntur, ramulos quosdā in proximas partes utrinq; trans-  
mittentes: quorum præcipuus ad abdominis cutem subit, atq; obliquē secun-  
dum costarum cartilaginum terminos propagatus, in gracillimas & capillo-  
rum modo subtiles uenulas cessat. Cæterum insigniores uenarum rami, sub  
rectis musculis exporrecti, in plures furculos<sup>r</sup> supra umbilici sedem terminan-  
tur, qui rectorum abdominis musculorum substantiæ implexi, illarum uena-  
rum terminos finesq; spectant, quas in sermone progressu, ab inno sursum sub  
rectis musculis conscendere audies. Harum uenarum sub pectoris osse reptan-  
tium originē, ex anteriori mediāq; in iugulo bifurcationis sede, ut plurimum  
educi animaduerti. interdum uerò eas ab<sup>b</sup> axillariū uenarum radicibus, post-  
quam illæ nōnihil à iuguli medio in latera recefferāt, enatas obseruau: quem-  
admodum aliquando alteram ipsarum, & præsertim sinistram, ab axillari, al-  
teram uerò ab ipsa bifurcatione pronatam uidi: quemadmodum etiam non  
infrequenter occurrit ab anteriori uenæ cauæ sede, ubi in duos insignes trun-  
cos partitur, unicam pronasci, quæ sursum ad pectoris os ducta, in duas discin-  
ditur uenas: ac unam dextro pectoris ossis lateri, alteram sinistro exporrigit.  
Ab his quoque uenis, secundum pectoris os deductis, membranæ thoracis ca-  
uitatem interdiuidentes primos mutantur furculos: ac subinde etiam à ca-  
ua, ubi nunc dictas promit uenas, graciles quasdam propagines sibi uendi-  
cant, secundum totam membranarum longitudinē, cum<sup>u</sup> neruis septi trans-  
uersi exporrectas. Quinetiam, ut & antea monui, a<sup>a</sup> uena pari carente, in mem-  
branas thoracis cavitatem intersepientes, furculi accedunt, uenis quæ<sup>e</sup> adhæ-  
rentem oculi tunicam implicant, quàm simillimi. A uenis dein has thoracis  
membranas intertexētib; etiam soboles in cordis inuolucrum, ubi illæ<sup>s</sup> hoc  
continent, pertingunt. Cæterum<sup>b</sup> uena axillam accedens, priusquam è tho-  
race procidit, non ita procul ab ipsius initio, ex elatiori sede, uenam utcunque  
amplam promit, quæ sursum obliquē in postiora tendens, ad transuersos uer-  
tebrarū cervicis processus deducitur: & per<sup>r</sup> foramina illis priuatim exculpta  
conscendens, in musculos uertebris proximè adnatos, soboles spargit. At præ-  
ter illas, certo ordine, & ueluti geniculatim singulas soboles unicuiq; foramini  
neruorum exortibus in cervicis uertebris inciso deriuat, dorsaliq; medullæ,  
ipsisq;



ipsisq; adeo uertebreis alimentum suppeditat. Quod uerò eius uenæ reliquum est, in caluariam contendit, peculiare sibi cum sua coniuge arteria foramen obtinens, quod ad posteriorem occipitis ossis capituli sedem excauatur. Cæterum quando uena in caluariæ amplitudinem pertingit, in secundum seu sinistrum duræ cerebri membranæ sinum, uti postea auditurus es diffusius, exhaustur. Præter hanc uenam, alia adhuc ab illa quæ in axillâ contendit, priusquam è thoracis cavitare omnino labitur, ex ipsius posteriori regione principium ducit, quæ in musculos, humilioribus ceruicis & thoracis elatioribus uertebreis adnatos, ac capitis dorsiq; & thoracis motibus famulantes, dispensatur. Simulatq; uerò axillam petens uena, inter primam thoracis costam & clauiculam, ex thoracis cavitare est egressa, musculumq; perforauit, qui secundi paris dorsum mouentium alter est, eam, uti post audies, promit uenam, quam humeralem uocabimus: & ilico atq; decliuus ducta, glandulas in axilla ad firmam uasorum distributionem à Natura procreatas contingit, quas nunc dicam, à se diducit propagines. Primum utrinq; singulas emittit uenas: ad thoracis quidem anteriora unam, ad posteriora alteram. Quæ antorsum exportigitur, in musculos à pectoris osse & costis ad brachij os & scapulam pertinentes diffunditur, & pectoris cutem simul & mamillas frequenti admodum ramorum serie in mulieribus adit. Vena autem retrorsum proficiscens, in musculos cauam scapulæ sedem occupantes, uicinasq; sedes multiplici etiam sobole digeritur. Cæterum nonnunquam à priori, & quæ pectus accedit uena, interdum uerò ab ipso qui in axilla consistit trunco, alia grandis utcunq; uena exoritur, quæ deorsum secundum thoracis latum exportrecta, potissimum absumitur in musculû, cuius beneficio brachium decliue dorso admoouemus. Præter hos ramos, maior uena, quæ in axilla habetur, exiguos ablegat furculos glandulis & membranis, quæ inibi uasorum distributionibus, eorundemq; colligationibus præfunt. Quæ autem serie axillaris uenæ reliquum, in totum brachium excurrat, peculiari Capite mox atq; cæteras ascendentes uenæ cauæ partis soboles absoluerit, expediam. Proinde ad iugulum rursus sermone conuerso, cæteros truncorum magnè illius in iugulo diuisionis ramos aggrediar. Vena itaq; cauæ, ad eum quem dixi modum, priusquàm pectoris ossis summum transcendat, in duos truncos diducitur: ac statim à diuisione, nuper commemorata uena, quæ axillam petit, principium obtinet. quod autem alterius diuisionis illius trunci adhuc superest, à media iuguli sede, cui prius innitebatur, modicè recedens, sursum extra thoracem protenditur: & simulatq; clauiculam pectorisq; ossis summum superauit, in duos impares ramos scinditur. Interior namq; exteriori gracilior est, & secundum asperæ arteriæ latus ascendens, nonnullas uenulas, in speciem capillorum exiles, asperæ arteriæ contemnisq; membranis communicat. Hæc interior censetur iugularis, quæ cum sui lateris soporali arteria uersus cerebrum fertur, ac in ascensu graciles ramulos membranulis sexti neruorum cerebri paris in collo, & in faucibus etiam septimi paris neruos colligantibus digerit, uniuerso ductu soporariæ arteriæ, ad caluariæ usq; basim comissa: quod cum peruenit, in duos inæquales amplitudine ramos discinditur: ac amplior obliquè retrorsum, secundum caluariæ basim ductus, caluariam simul cum quodam soporalis arteriæ ramo ingreditur, foramine utens, sexti neruorum cerebri paris gratia exculpto. Quæ uerò serie in caluariæ cavitare præfens ramus digeratur, in cerebri uasorum descriptione affatim persequar: modò autem sat erit, ad caluariæ usq; cavitatem uenas, quæ eò pertingunt, sermone deducere. Ab ampliori hoc iugularis internæ

ramo,

Caua per col-  
lura capiti  
series.

Interior iugu-  
laris.

l. 1. fig. cap.  
12. lib. 1. f.  
m. fig. cap.  
13. f.  
n. ult. fig.  
l. 1. c. 7. f.  
lib. 7. Q.  
Q. o.

p. musc.  
tab. C. aut  
potius que  
re eum mu-  
sculum in  
Epitrocin  
tabulis.

q. a. d.  
r. ut in ult.  
fig. sinist.  
latere a. c.  
a. oritur,  
est h. h. f.  
g. u. h. f.  
in parte ce-  
teris ue-  
rior.

s. p.  
t. Q.  
u. 3. musc.

tab. d. 4.  
x. p.  
y. m.  
z. R.  
a. 10. musc.  
tab. 6.  
b. inter P.  
c. R.  
c. H.

d. l.

e. s. & t.  
f. ult. fig. d.  
ad E.

g. fig. cap. 11.  
Z. aut X.  
aut potius  
seriatim  
hic specta-  
ult. fig.  
h. 2. fig. cap.  
2. lib. 4. c. 6.  
dein n.  
i. fig. 14.  
cap. A.  
h. eiusdem  
fig. c. 11. l.  
l. 1. 1. fig. cap.  
12. lib. 1. c.


ramo, quum (uti diximus) in posteriora secundum caluariæ basim is contendit, propago diducitur, in elatiorem sedem musculorum pertinens, qui anteriorem ceruicis uertebRARUM regionem occupant, stomachoq; subiacent. Gracilior uerò internæ iugularis ramus, soporali arteria penitus relicta, priuato foramine caluariam subit, quod iuxta foramen tertio & quarto pari neruorum cerebri commune, cælatur. Priusquam uerò ramus ille in duram cerebri membranam pertingit, totusq; in caluariam mergitur, sobolem non admodum insignem ad auditus organum depromit, eam per foramen quoddam transuersum mittens, quod huic soboli & neruulo cuidam quinti paris neruorum cerebri commune censetur. Porro exterior, idemq; grandior supra iugulum factæ diuisionis ramus, ab exteriori ipsius latere, postquā musculorum dorsum mouentium secundi paris alterum perforauit, insignem ex Galeni sententia profert uenam, quæ deorsum uersus clauiculā reuoluta, ad summum humerum, ipsumq; adeò brachium contendit, humerariamq; nobis nuncupatam uenam constituit. Quam tamen propter Aristotelem, qui humerariæ ortum sub aure esse, falso tradiderat: & Galeni locorum, quibus uenarum in iugulo & collo seriem persequitur, obscuritatem, studiosius solito humerariæ originem indagatus sum, uenam hanc non ita ut Galenus censet, ab externa iugulari, seu maiori, quem paulo antè narrare cœpi, ramo, enatam uidi: uerum ab ea uenâ, quam transuersim supra primam costam in axillam tendere scripsimus. uti sanè rationi uidebatur cõsonum, quæ tritius unum caudicē, quàm duos ramos, mutuò æquè distantes, aliquousq; simul progredi attestatur. Oritur autem humeraria, ab eius uenæ medio ferè ductu, qui à iugulo ad axillam metiri posset. Atq; hinc humeraria sub summo humero trāsuerim brachium petit, illa uerò sub humeri articulo magis obliquè in axillam descendit. Cæterum priusquam humeraria brachium subeat, non procul ab ipsius ortu ramum edit, qui in cutem posteriori ceruicis sedi obductam, & externos eius sedis musculos, numerosa uenularum serie digeritur. Præter hunc, alium quoq; grandio rem depromit ramum, in gibbam scapulæ sedem frequenti etiam sobole dispersum. Deinde quando ad summum pertendit humerum, atq; sub illo in brachium prorepat, priusquā penitus demergitur, in summi humeri cutem propagines deriuat, quarum præcipuæ in cutem digeruntur, quæ musculum integit brachium attollentem. Eiusmodi propagines interdum, idq; potissimum in mulieribus, ad mamillarem usq; cutem excurrunt, deorsum in priora secundum clauiculam errando progressu deductæ, & ante sectionem in plerisq; mulieribus uirescente quodammodo aut cæruleo colore conspicuæ. Qua autem serie eius uenę brachium adeuntis reliquum digeratur, posterius dicam, quando peculiari Capite, ipsius axillarisq; uenæ distributionem persequar. Cæterum maior ramus, quem supra clauiculam haberi, atq; ab externo suo latere, secundum Galeni placitum, humerariā germinare diximus, sub lato buccas mouente musculo, per colli latus ad fauces porrigitur, exterior efformans iugularem, quæ non pari semper modo (uti in uociferantibus, aut aliàs ui spiritū retinentibus, & uetulis, indies obseruamus) per colli cutem fertur: sed ferè quadruplicem, aut magis adhuc uariam distributionis speciem proponit. Prima (quam frequētius est cernere) ea est, qua unus tantum ramus hic sub cute ad fauces usq; procedit, in ipso progressu nullibi insigniter discissus: sed duntaxat graciles ramos, in musculos, conterminamq; cutem partim rectā, partim obliquè, & interdum transuersim cõscendentes, uariè spargens. Secunda autē ea uisitur, qua in medio ductu iuxta colli longitudinis medium,

*Exterior iugularis, humerariæq; ortus, priusquam brachium subit, seriet.*

*Exterior, iugularis seriet.*

iugularis in duos insignes ramos dirimitur: & unus quidem in priora, alter in posteriora quodammodo sursum properat. Tertiam cōspicimus, qua propter

P R I-  
mam distri-  
butiōis ex-  
terna iug-  
ularis ue-  
næ serie,  
nuda causa  
delinatio  
docet: re-  
liquas ve-  
rō tres, pri-  
mam et  
nunc seria-  
tim hic re-  
positis for-  
mulis ex-  
pressi, ac  
earum pri-  
mæ esdæ  
characte-  
res, quos in  
tegra deli-  
neatione, ac  
commoda-  
ui, rati  
ex illa hūc  
ita facilius  
posse per-  
pendi.



claviculam adhuc exterior iugularis in duas propa-  
gines diffunditur, quæ sursum sub cute inuicem distan-  
tes ferūtur. Quarta ex tertia paratur: aliquoties enim  
illæ propagines inuicē perpetuō distant, ac nusquam  
se mutuō cōtingunt: interdum uerō ad humiliorem  
faucium sedem mutuō rursus coeunt, ac ex ambabus  
una constituitur uena, quæ mox bipartita, uti modō  
subiungam, in ramos cessat. Verūm subinde & ex ter-  
tia serie alia adhuc confurgit differētia. Nam aliquan-  
do altera, neq; illa sanē minor propago, cuti non sub-  
tenditur,<sup>b</sup> musculō recōdita, qui à pectoris ovis sum-  
mo & clavicula pronatus, mamillari temporis ovis  
processui inferitur. atq; ea propago in eum modum  
submersa, frequenter ad eō insignis occurrit, ut etiam  
nonnulli dissectionum professores hanc internam iu-  
gularem uideantur appellasse: illam<sup>i</sup> uerō interim ne-  
gligentes, quæ secundū asperæ arteriæ latus expor-  
rigitur. Vt cumq; uerō exterior iugularis, aut unica u-  
trinq; aut in medio per collum ducta, aut statim à cla-  
uiculis gemina ascēdat, semper cuti, quā proreperit, in-  
signes notatūq; dignos offert furculos: ac quum ad  
fauces usque, iuxta inferioris maxillæ humiliorem se-  
dem, sub aurium regione<sup>k</sup> contendit, sui<sup>i</sup> portionem

b 4. mufc.  
tab. 6.

i s.

k v.

l x.

m y.

n x.

o 1. mufc.

tab. A.

p 6. mufc.

tab. L.

q Hifibile  
nata lingua  
conspicua  
tur.

r fig. cap.

14 E. et ul

time fig. 2.

s 23 fig. cap.

12 lib. 1. g.

t sub 9. et

ult. fig. 14.

et fig. 14. cap.

14 G. H.

u 123 fig.

cap. 12 lib.

1 G.

x 3 fig. cap.

12 lib. 1. l.

y Y.

z Z.

a 9.

ad oris interiora & duram cerebri membranam transmittit:<sup>m</sup> reliquum uerō  
ipfius, in faciei cutem, & illius musculos, & ad tempora, & post aures, & uni-  
uerfam breuiter capitis cutem transfunditur.<sup>n</sup> Portio interiora oris subiens, in  
primis suis scissionibus<sup>o</sup> glandulas obtinet interiectas, quas tertium glandula-  
rum in faucibus consistitium genus in sexto libro numerabimus. His glandu-  
lis, quæ uasorum hic præfunt distributionibus, ab interiori externæ iugula-  
ris portione ramuli dispensantur: mox notatu digni in laryngem, &<sup>p</sup> glandu-  
las ipsi proximè adnatas, & musculos ovis<sup>v</sup> referētis, & linguæ, & uniuersim  
ad omnes faucium sedes, furculi deriuātur: quorum insignis sub lingua, secun-  
dū ipfius longitudinē proreperit, in multiplices & errabunda serie prorepē-  
tes<sup>a</sup> ramulos scissus. Quinetiam ab hac iugularis portione, præter grandem  
ramum, qui in caluariam per<sup>r</sup> foramen subit, ad posteriorem mamillaris pro-  
cessus sedem cēlatum: rami etiam in palatum, & tunicam narium cavitati ob-  
ductam, digeruntur, à quibus postmodum non negligēdæ<sup>s</sup> soboles caluariam  
petunt. Vna enim per<sup>t</sup> foramen, quod secundo cerebri neruorum pari inscul-  
pitur, caluariam accedens, in duram membranam aliquot furculis excurrit:  
quemadmodum & altera soboles duræ membranæ offertur, caluariam ingre-  
diens per grandius foramen<sup>x</sup> illorum quæ in octauo capitis offe, odorum gra-  
tia exculpuntur. Hæ soboles, quum caluariam ingrediūtur, furculos quosdam  
oculo elargiuntur, in frontis cutem interdum disseminatos.<sup>y</sup> Exterior exter-  
næ iugularis portio, per capitis exteriora passim repens, mox glandulas suis  
quoq; distributionibus præfectas obtinet, quæ inibi sub aure reponuntur, ubi  
inferior maxilla superiori articulatur. Præfens portio inter has glandulas bipar-  
titur: &<sup>z</sup> uno ramo in buccas, narium alas, & ad<sup>a</sup> frontem uariē exporrigitur,  
altero



<sup>b</sup> altero autem tempus & auris regionem adit. Hic enim ramus denuò in duos  
<sup>c</sup> præcipuos furculos diuisus, unum in sui lateris tempus admodum errabun-  
<sup>d</sup> do & inuoluto ductu digerendum offert: <sup>d</sup> alterum uerò post aurem & ad oc-  
 cipitis cutem diffundit. Exterioris iugularis soboles, in faciem ac capitis cutem  
 digestæ, hoc sibi priuatim uendicant, quòd dextri lateris uenæ, sinistri lateris  
 uenis, quibusdam sedibus permisceantur, ac inuicem coeant, idq; potissimum  
 in facie & uertice, & in primis adhuc in fronte. adeò, ut frontis uena plerunq;  
 ab utrarumq; iugularium propaginibus, per internos oculorum angulos fur-  
<sup>e</sup> sum deductis, conflatur. Ad hæc, per <sup>e</sup> exigua uerticis ofsium foramina & fu-  
<sup>f</sup> turas, <sup>f</sup> gracillimæ uenulæ in caluariam procidunt: non aliter atque rursus ex  
<sup>g</sup> caluaria in cutem alias emergere tum dicam, quando cerebri uasorum seriem  
 priuatim enarrabo. Quippe hæc opportunè tantisper dum in caluariam arte-  
 rias quoq; sermone perduxero, asseruabitur, quòd uaria cerebri uenarum ar-  
 teriarumq; sit commixtio: quam incognito adhuc arteriarum ad caluariam  
 deductu, arduum foret percipere. Quanquam interim cuiuis integrum sit,  
 Caput decimumquartum, cerebri uasis dedicandum, aut hîc, aut suo, quo id  
 reponam, loco aggredi.

### VENAE AXILLARIS ET HVMERARIÆ per brachium cubitumq; & manum series.

Caput VIII.



<sup>a</sup> ENAS<sup>a</sup> duas à caua in brachiū propagari, prius relatum  
 est, quibus una eademq; radix à iugulo extra thoracē usq;  
 extitit. Gracilior, quæ ueluti ab alia crassiore<sup>b</sup> enascebatur,  
 quòd<sup>c</sup> sub summo humero, ipsaq; adeò clauiculā, in exter-  
 nam brachij sedē procidat, humeraria & cubiti exterior  
 dicitur: crassior autem, amplior<sup>d</sup> ue, quòd per axillā inter-  
 namq; brachij sedem prorepit, axillaris interiorq; cubiti  
 uena nuncupatur. & quanto hæc grādiōr ampliorq; humeraria uisitur, tanto  
 etiam in frequētiore numerosioresq; soboles diffunditur. Humeraria namq;  
<sup>e</sup> illos quos præcedente Capite recensuimus ramos dispergens, ad posteriorem  
 clauiculæ sedem cōtorquetur: ac sub summo humero, uti diximus, prorepēs,  
<sup>f</sup> inter internum latus musculi brachium attollentis, & ualidū tendinem mus-  
 culi brachiū ad pectus ducentis, in brachiū procedit. Dein carnea membrana  
 sub cute suffulcitur: deorsumq; porrecta, etiā ante sectionē in omnibus euadit  
 conspicua: nisi fortē graciliores omnino uenas homo obtineat, obefior<sup>g</sup> ue sit.  
 Porrigitur autem recto tramite per anteriore (uersus exteriora tamen magis)  
 brachij regionem, secundū exterius latus<sup>h</sup> musculi cubitum flectentiū ante-  
 rioris. In descēsu uerò ad cubiti usq; articulū, <sup>i</sup> graciles duntaxat ramos utrinq;  
 in cutem sibi proximam, anterioremq; dicti musculi sedem dispensat, qui par-  
 tim rectā, partim oblique & transuersim in cute ita prorepunt, ut interdum  
<sup>b</sup> uersus internā brachij sedem ad axillaris uenæ<sup>b</sup> soboles in cutem digestas per-  
<sup>c</sup> tinere, cum illisq; coire uideantur. <sup>d</sup> Quando humeraria cubiti attingit articu-  
<sup>e</sup> lum, iuxta<sup>e</sup> exterius humeri tuber, in tres ferè ramos tota diducitur. Primus  
 (quem frequentissimè, & potissimum in hominibus, deesse conspicies) quo-  
 tiescunq; se offert, gracillimus uisitur: & penitiùs quàm sub cute immergens,  
 exteriori sedi capitū<sup>f</sup> musculorum præcipue offertur, qui quatuor digito-  
 rum secundos & tertios flectunt articulos, & interno lateri eius<sup>g</sup> musculi, qui  
 radiū in supinum mouentium longior existit. Ramus iste, mox in paucos  
 S furculos

*Humerariæ se-  
 ries iuxta cu-  
 biti articulum.*

Lib. de Venarum diffectio potissimum 3 lib. de Admitt. 67.

furculus dissectus, cessat: neq; ut Galenus scribit, alicui axillaris uenæ ramo ita commiscetur, ut<sup>o</sup> præcipuū humerariæ ramum, qui enarratione secūsus erit, cum<sup>o</sup> quadā axillaris uenę propagine, in cubiti flexu sub cute uniri mox audies. o h. p. t. uniuers. cū h. ad a. q. q. q. alt. fig. 1. f.

Vt enim Galenum axillaris uenæ<sup>a</sup> præcipuam portionē, in alto inter musculos reconditam, minus uerē descripsisse, ex sedula resectione obseruabis: sic quoq; primi huius humerarię rami (si quando is unquam cernitur, & Natura præter consuetum sibi artificiu, à cute ad corporis penitiora, non autē ab his, utpote se dibus ad uasorum custodiā tutioribus, uersus corporis superficiē, cutemq; uenas porrigi uoluit) seriem non est affecutus, aut imaginationē illam sibi admodum inartificiosam cōfinxit. quamquam interim pereleganter uerēq; eas Galenus enarrauerit uenas, quæ citra sectionē in nudato (uti in uenæ sectione fit) brachio, plurimū & frequēter illi occurrerunt. Quas quum simijs cōuenire uidit, quam illarū corpus humano simile sit, longa oratione inducere conatus est, nullam, nisi ante dissectionē omnibus obuiam, sibi perspectā habens differentiam: quum interim tam uarias & innumeras hætenus in ofsibus, musculis, & uenis quoq; proposuerim, mihiq; inde non uulgariter persuadeā, humanum corpus nunquā à Galeno fuisse aggressum.<sup>r b.</sup> Secundus itaq; & præcipuus humerariæ ramus, eorum in quos iuxta exterius humeri tuber ea discinditur, obliquē sub cute, ad cubiti cum humero articuli flexus medium descendit: ac cum axillaris uenæ<sup>a</sup> ramo, quem postmodum commemorabo, coit:<sup>t f.</sup> unaq; ex ambobus ramis, humerariæ nimirū & axillaris, uena cōfiatur.<sup>t a. u i. x 6 mof. tab. 12. tab. 3.</sup> Tertius humerarię ramus,<sup>u i.</sup> musculū qui radio iuxta brachiale insertus, radij in supinū motus autor est, cōscendit: & paulatim deorsum prorepēs, obliquus per radium ante medium ipsius lōgitudinis in externā cubiti regionē perfertur: quam ubi attingit,<sup>y h. h.</sup> furculos quosdam, ut & reliquo, quem hætenus cōfecit, ductu, in proximam sibi cutem depromit: quorum non<sup>o</sup> infimus esse solet, qui ab ipso educitur, quā humeraria in tres illos ramos iuxta externū humeri tuber partitur. Ceterū tertius hic ramus sensim obliquē uersus ulnæ appendicem, brachialisq; radicem prorepēs, tandem<sup>a</sup> alteri cuipiam inibi<sup>b</sup> cōmiscetur uenæ: hacq; adauctus, externam brachialis sedem conscendit: & in aliquot furculos, errabundo in cessū sparfos, dissectus, regionem intercurrit, quæ ante paruum digitum & anularem habetur, externa etiam illorum digitorū sede soboles quasdam ab hoc ramo sibi uendicante. Cuius uerō uenæ propago illa demum sit, quam tertio humerariæ ramo uniri iam scripsimus, subiungam, ubi primū aliquot axillaris uenæ propagines absoluerō: quippe à quodam axillaris ramo, sub cute per totam ulnæ longitudinē exporrecto, illius propaginis initiū pendet. a x. x. b l.

Axillaris itaq; quum primū axillā superat, brachiumq; subingreditur, inter musculos brachij os amplexantes delitescit, præcipuē uerō inter anteriorem sedem<sup>a</sup> primi cubitum extendentiū, & posteriorem sedem tendinis<sup>a</sup> musculi, quo brachiū pectori admouetur, & dein iuxta musculorū cubitum flectentium<sup>a</sup> posteriorem. Hęc primū capitibus<sup>a</sup> musculorū, quorum ope cubitus extenditur,<sup>a</sup> propaginem offert, illis<sup>a</sup> uenulis eregiōnē educitam, quæ ab ipsa in glandulas hic repositas digeruntur. Post hanc, demissius axillaris ex posteriori sua sede<sup>a</sup> uenā ipsam musculis dispēsat, à qua mediocris etiā magnitudinis soboles in externæ brachij sedis cutem diffeminātur. Ab externo latere axillaris uenæ,<sup>a</sup> alia notatu dignæ amplitudinis propago diffunditur, obliquē deorsum sub humero, seu brachij offe, ad<sup>a</sup> externum usq; huius tuber descendens, ac sub musculis cubitum extendentibus occultata: musculorumq; capitibus, ab externo humeri tubere pronascētibus, ramulos quosdam exhibens: ac demum aliquoufq;

Axillaris in brachio consistens series.

d 4, 12 mof. tab. T. e 3 tab. 1. f 3 tab. 5. g 11 tab. h n. i inter P. m 2 si cap. 23 lib. 1. p. n 9 mof. tab. T. 5. o eiusdē 14. y, z, 3, 4.

aliquouſq; ſemper profundè occultata, in externam cubiti ſedem proprepens, ſimul cum<sup>p</sup> neruo, qui brachium petentiū quartus opportunè enumerabitur. Has propagines axillaris adhuc in alto latitans edit, ipſaq; in<sup>q</sup> duos truncos diſcinditur, quos ſanè accuratiſſimè examinatos uelim, non tantum Galeni nomine, quem hæc axillaris diuiſio latuit, uel quam iuxta cubitum, atque adeò in brachij extremo fieri ſcripſit: ſed eorum quoque occaſione, qui ſe operæ precium aliquod in Anatome arbitrantur præſtitiffe, dum ſectiōnem ſemel atq; iterum aggreſſi, ſimul cum axillari uena humerariā porrigi, ſe animaduertiſſe ſcribunt, oſcitater humerariam (quæ etiam uel ante ſectiōnem notiſſima eſſe debuit) unā cum carnea membrana à brachio auferentes, & poſtmodum<sup>r</sup> alteram axillaris uenæ partem (quam modò perſequar) humerariæ loco deſcribentes. Axillaris itaq; hominis uena, non procul ab ipſius è thoracis cavitare in axillam egreſſu, in duos quodammodo pares diſcinditur truncos: quorū alter, qui ferè & craſſior uiſitur, toto ductu in profundo latitat, arterięq; in brachiū exporrectæ perpetuò attenſus, eadē ferè cum ea diſtributionis ſerie digeritur, ſimul etiam neruo brachium adeuntiū tertio cōcomitatus. Inter<sup>u</sup> duos enim cubitum ſectētes muſculos, deorſum ad mediam ſedem flexus articuli cubiti porrigitur, illis muſculis, & dein membranis, quibus nerui induūtur, ramulos ſpargens. Quando autem cubiti articulum ſuperauit, atq; inter muſculos digitorum flexus autores ferri incipit, in<sup>x</sup> duos dirimitur ramos, qui modicè ab inuicem recedentes, ac muſculos quos perreptant ſurculis implicātes, unā cum tendinibus internam manus ſedem petunt, qui per<sup>y</sup> ligamentum, in interna brachialis regione anuli modo conſpicuum, porriguntur. Rami inibi in alias ſoboles partiti, ſub<sup>z</sup> tendine feruntur, qui lateſcens, uolæ cuti ſubnaſcitur: atq; hinc ita in internam digitorum ſedem digeruntur, ut binæ ſoboles pollicis, & totidem indiçi, & una medio offerātur, à ramo qui ſecundum radium per cubitum porrigitur. Ab illo autem, qui ulnæ attenditur, binæ ſoboles anulari & minimo, & una medio exhibentur: ab illoq; ramo ſurculus<sup>a</sup> muſculos adit, externam uolæ ſedem occupantes. atque ita ab altero etiam ramo ſurculus in muſculos penitiūſ pertinet, qui primo pollicis oſi cōnaſcuntur. <sup>b</sup> Alter axillaris truncus ſenſim ex alto ad internæ brachij ſedis cutem emergit, uerſus humeri<sup>d</sup> interius tuber properans, ac ante ſectiōnem ſub media brachij longitudinis ſede, non minus quam humeralis ſupra cubitum, conſpicuus. Vbi autem interiori humeri tuberi ferè incumbit, ad elatiore<sup>e</sup> eius tuberiſ ſedem, in<sup>d</sup> duas magnitudine propemodū æquales partitur uenas: quarum anterior cuti ſubſtrata (quemadmodum & omnes præſentis trunci ſoboles) oblique deorſum ad mediam cubiti articuli flexus ſedem repit, ac cum<sup>f</sup> ſecundo humerariæ ramo ad humiliore<sup>g</sup> mediamq; flexus illius ſedem coit, unaq; inibi ex ambabus conſurgit uena, quam cōmunem, quia ex axillari & humeraria cōſtituitur, meritò appellamus. uulguſ tamē medianam uocat: etiamſi Græci, & Latinorum præcipui<sup>b</sup>, ramos qui hanc cōmunem efformant, medias, ut & obliquas, nuncupauerint. uerū interim Galenus in primo libro de Curandi methodo ad Glaucōnem, mediam uidetur appellare, quam aliās cōmunem uocitat. Poſterior uena illius axillaris truci iuxta interius humeri tuber bipartiōnis, frequētes ramos deriuat inferioris cubiti ſedis cuti, & interioris iudē exteriorisq; ſedis humiliorū, ac ſecundum ulnam ſitarum regionū cuti. Ramorum per has ſedes excurrentiū<sup>k</sup>, unus primarius, ſecundum ulnæ inferiorē ſedem, ad exteriora tamen magis declinās, uerſus brachiale porrigitur, & ipſius ſoboles cum humerariæ<sup>l</sup> ramo illuc contendēte<sup>m</sup> coit: cōſurgensq; ex ramo hoc & ſobole

Lib. 3 de Admuniſſiō.

Præcipua axillaris in duos truncos diſtribuitur.

Axillaris uenæ partiōnis cutem ſubueniſſe ſeriet.

Communis uena conſiſtitia.



illa propago, perinde ac prius enarratum est, in externam manus sedem dirigitur. Interdum autem illo humerariae ramo deficiente, ea axillaris uenae soboles abunde eius rami uices in manu gerit. Rursus ramorum<sup>n</sup> posterioris illius uenae<sup>n</sup> trunci axillaris, qui sub cute consistit,<sup>o</sup> alius haud negligendus cutem adit, quae posterior cubiti articuli sedes induitur: quanquam is in externam cubiti sedem non admodum procul perreptet. Insuper<sup>p</sup> alij etiam rami notatu digni, ab hac posteriori uena in internae cubiti sedis cutem digeruntur, qui uario & admodum incerto implexu, modo inuicem permiscuntur & coeunt, modo iterum mutuo abducuntur, furculos à primario illo<sup>q</sup> ramo, quem ulnae exporrigi dicebamus, assumentes, aliosque rursus illi furculos impartientes. His furculis & propaginibus in eum modum per cubiti interiora reptantibus, alia frequentissime accedit non contemnenda, quam axillaris uenae<sup>r</sup> ramus, communem uenam cum humerariae ramo efformans, ab humiliori sede & ex medio progressu emittit. Hec interdum recta, interdum uero errabundo ductu ad brachiale contendit, aliosque huius sedis propaginibus commiscetur: quae adeo graciles sunt, uariisque inuicem implicatur, ut interna cubiti regio non minus frequenter quam tibiae uenter, seu sura, uariis molesteretur, hicque quidpiam retis imagini non absimile demonstraret. Propagines haec nequaquam ad brachiale terminantur: sed partim oblique, partim recta, partim uero transversim, & modo inuicem commixtae, modo rursus diremptae, totam manus internam cutem perreptant, ipsi cuti passim conatae. Porro harum propaginum, quae pollicis radice, seu Veneris, aut ut alijs uisum est, Martis collem accedunt, priuatim id sibi uendicant, quod ipsis<sup>t</sup> ramus ab illis uenis<sup>h</sup> permiscetur, quas à communi uena in externam pollicis regionem diffundi, iam dicturus sum.<sup>x</sup> Communis enim uena ilico atque<sup>y</sup> duabus illis axillaris & humerariae propaginibus costatur, oblique deorsum ducitur, ad elatioris cubiti sedem paulatim contendens, quousque radium paulo ultra ipsius longitudinis medium transcendat hinc inde: neque id eodem semper modo, in progressu ramulos diffundens, & nonnunquam à propaginibus, internam cubiti sedem sub cute perreptantibus, alios, qui cum ipsa coeunt, assumens, donec tandem in internam cubiti sedem pertingat. Vbi itaque communis uena eam sedem attingit,<sup>z</sup> supra radium<sup>a</sup> nonnihil ante illius cum brachiali articulum, in<sup>a</sup> duos ramos discinditur, sectionemque ostendit, quam non inopportunè Græcorum γ, aut Υ, aut Λ, non autem Γ assimilaues.<sup>b</sup> Alter istius sectionis ramus, qui elatior est,<sup>c</sup> portunculam ad internam brachialis sedem, uersus pollicis radicem dispensat, quae dictis nuper hanc sedem perreptantibus furculis<sup>d</sup> commiscetur. Quod uero<sup>d</sup> elatioris rami reliquum est, exterius inter pollicem & indicem sursum repit: atque hic in uarias soboles, inuicem nunc unitas, nunc autem rursus seiunctas, dispergitur.<sup>e</sup> Alter ramus, qui inferius γ aut Υ caput constituit, indicis & medij, & aliquousque anularis sedem petens, in uarias quoque soboles exhauritur. Quippe haec uenarum in manus cutem series adeo uaria est, pugnantisque, ut hanc explicare prorsus arduum sit, praesertim quum inter quamplurimos homines, uix duos aequali correspondentique uenarum in ramos distributione inuenias. Adde, eiusdem hominis dextram sinistram raro admodum congruere. Operae precium itaque fuerit, uenarum in manum propagines non hinc, sed ex sectione, & ante confectionem, in brachijs uinculo interceptis, quum uenam diuidimus, condiscere: atque ad amulsim expendere, quam in uenarum sectionibus nostri, si dijs placet, Aesculapij hallucinetur, qui grauiter num humeraria, aut communis, aut axillaris in manu diuidenda sit, ridicule contententes, humeraria sese aperire existimant, quoties uenam inter pollicem & indicis

Communis uenae series.

Uariam manus cutem implicantium uenarum esse seriem.

& indicis radicem aperiunt: & axillarem, si uenam ad anularem & minimum digitos exporrectam incidunt. Ad hæc, quis non conspiciat, ipsos in cubito pro-  
 f. t. pemodum nullam, præter axillaris uenæ<sup>1</sup> ramum, ad communem uenam ex-  
 porrectum, diuidere? utcunq; etiam ante uenarum sectionem (quod sanè ab-  
 sonum est, & parum anatomicum) de aperienda uena non secus contendat,  
 quàm si peculiaris quæpiam uena, à singulis partibus, quas inflammatione, aut  
 aliter affectas suspicantur, in brachium duceretur, & non, uti nos docuimus,  
 ab<sup>5</sup> uno trunco, ex magna cauæ uenæ in iugulo partitione educto, omnes quas  
 hoc Capite descripsimus uenæ pullulent. Quanquam ridiculæ huic uulgi me-  
 dicorum opinionis, Hippocratis, aut eius qui libros de Morbis conscripsit auto-  
 ritas satis congruat, qua hepatitis & splenitis ipsi uocatarum uenarum ductus  
 & series, imaginatione tantū traditur: & fortè qua nos de uenæ sectione per-  
 petuò disceptates, tantopere deuiamus, reſtitutionis fundamentum iacitur.  
 Cæterum ut in manus cute (ne fortè aliò quàm ad humani corporis fabricam  
 lubens nostra expacietur oratio) etiam in eodem homine uenarum distribu-  
 tio uariat, pari quoq; ratione & in cubito subinde diuersam uenarum propa-  
 gationem uidere est. Interdum enim<sup>h</sup> duarum mediarum ad communis uenæ  
 generationem concursus non in cubiti fit flexu, sed multo humilius, non pro-  
 cul à medio longitudinis cubiti. Aliquando humerariæ ramus, communem  
 accedens, occultatur, axillaris ramo uisum non fugiente. nonnunquam rursus  
 contraria est ratio. Contingit etiam non semel, axillaris ramum, qui ad com-  
 munem fertur, humerariæ ramo longè aut graciliorem, aut ampliorem esse:  
 & interdum hunc, aut illum geminū uideri. Quandoq; (& id non infrequen-  
 i i. ter)<sup>1</sup> tertius humerariæ ramus, externam cubiti sedem accedens, omnino de-  
 h. a. est, ipsius uicem ramulis tunc suppleantibus, qui à<sup>k</sup> communi uena in cutem  
 t. x. excurrunt, ac subinde etiam axillaris<sup>1</sup> ramo, qui toti ulnæ longitudini exporri-  
 gitur. Ne uerd hanc orationis seriem barbaris nominibus implerem, ac alio-  
 quin satis obscuram, difficiliorem redderem, in uenæ cauæ delineationis cha-  
 racterum indice, eiusmodi nominum ratio mihi fuit instituta.

venarum se-  
riem cerebro  
uariare.

## VENÆ CAUÆ PORTIONIS AD PARTES

infra septum transuersum locatas distributæ series.

Caput 1X.



IMVLATQVE uena caua secundum posteriorem ie-  
 coris sedem deorsum<sup>1</sup> prorepens, non amplius iecori con-  
 nascitur, non nihil obliqua ex dextris quodammodo cor-  
 poris partibus introrsum, ad mediū dorsi fertur, illico<sup>b</sup> ra-  
 mum non admodū grandem ex sinistro latere promens,  
 qui potissimum numerosa uenularum serie in pinguem  
 membraneamq; sinistri renis tunicam digeritur, quæ à pe-  
 ritonæo pronata, renem inuestit, eundemq; dorso alligatum continet. Hic ra-  
 mus infrequenter ex dextro cauæ caudicis latere, uenam coniugem adipisci-  
 tur: quod<sup>d</sup> uena dextri renis pinguem tun<sup>1</sup>cam, conterminasq; ipsi peritonæi  
 sedes accedens, non à cauæ caudice principium ducat, sed ab elatiori regione  
 d. e. eius uenæ, qua dextro reni ferosum sanguinem deferri audies. Caua enim, ubi  
 e. a. i. u. 20  
 fig. lib. 5 X.  
 d. e. 1. u. 20  
 fig. lib. 5 d.  
 b. 22, 23 fig.  
 m, n,  
 Ad renis imo  
lucum uena.  
 Ad renis cor-  
pus uena.  
 harum propaginum exortus è directo sibi neutiquam correspondet. Quando  
 S 3 enim

d. f. 20  
 fil. lib. 5 Q.  
 22 fig. g.  
 23 P.  
 b. u. 20  
 fig. lib. 5 X  
 ad V.


e. u. 20  
 fig. lib. 5 X.

d. e. 1. u. 20  
 fig. lib. 5 d.  
 b. 22, 23 fig.  
 m, n,

enim dexter ren (uti plerunque accidit) sinistro elatius locatur, dextri lateris propago altius quàm sinistri renis, principiū ducit: si uerò sinister ren dextro superior sit, propago quoq; in ipsum repens, elatius quàm dextra propago, à caua caudice exoritur. Atq; tunc etiam uena sinistri renis, pinguem implicans tunicam, ex medio huius propaginis ductu originē sumit, ea quæ dextri renis offertur tunica, à dextro cauæ uenæ latere initium mutuante. Hæ itaq; propages, ferofum sanguinem ad renes, ut illum excolant, ac ab urina liberent, deferentes, ob idq; emulgentes uulgò dictæ, admodū crassæ sunt: ac quamprimū concauam renum sedem contingunt, hominibus in duos ramos partiuntur: ac dein in renum substantiā, mirabili quodam artificio, hætenus nemini Anatomicorum cognito, digeruntur. Quod nam uerò id sit, in quinto libro perstringam, unā quoq; rationem additurus, cur harum propaginum ortus nunquam è directo sibi respondeat. Cæterum priuatim ab humiliori sede<sup>e</sup> propaginis sinistri renem petentis, iuxta ductus ipsius ferè medium, uena pronascitur, in uiris ad sinistram testem tota excurrans: præterquàm quòd graciles exiguosq; furculos in peritonæū, quā porrigitur, ac in membranas tunicas uenæ sinistram testem & feminaria ipsius uasa ambientes, producat. Hæc enim uena peritonæo, quā id lumborum<sup>k</sup> carnibus insternitur, adnata, deorsum super pubis os incedit. quod quum superauit, atq; ex magna peritonæi cauitate elabitur, in uarios anfractus gyrosq; conuoluitur: quorum basis, superiori testis sedi connata, ramulos in tunicam, testis substantiam proximè continentē, digerit, & alijs frequentioribus ramis in testis substantiam passim diffematur: quemadmodum quintus liber, ubi generationis organa persequar, diffusius docebit. Vena hæc, sinistram testem accedens, aliquando propaginem à cauæ caudice, sub uenæ ad sinistram renem exporrectæ, principio enatum asciscit: quæ non procul ab exortu sinistrorsum descendens, cum

seminalium  
uenarum in  
uiris series.

Quoniam in nuda integrâ caua uena figura, uenarum ad renes, eorundemq; pinguem tunicam pertinentium, ac dein seminalium uenarum originem, ita atq; frequentius secantibus occurrit, expressimus: præsentibus figura quondam differentiam, qua hic describitur, pingere iussum est. Notet itaq; A, A, a, n, b, c, d, e, f, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, id quod in nuda eandem figura. B. uerò ramum, à caua caudice ad sinistri lateris feminalem uenam porrectum, ac cum ipsa coeuntem. C. ramulum significet, à uena pronatū, quæ dextro reni offertur, atq; u. ramus dextra seminali uena commiscetur.



Lib. de Renarum  
sectione.

Mulieris  
seminalium uenarum  
series.

reliqua testem petente coit, unaq; seminalis uena ex ambabus cōsurgit. Vena autem dextrum accedens testem, non à uena in eius lateris renem protensa, originem sumit: at à cauæ caudice, aliquanto inferius quàm uenæ renibus oblatæ, principium ducunt. Huius seminalis uenæ exortus, non ut reliquarum ferè propaginum, in cauæ consistit latere: uerū ex ipsius eminentiori anteriori uesede, uersus dextrum latus nonnihil, extuberanti ac ueluti rotunda origine nascitur. Præsentī uenæ ramulū quoq; ex ea quæ in dextrum renem procurrit, accessisse, ac simul cum ea coiuisse, Galenus sibi semel obseruatum testatur. Et nos quoq; totam dextri testis uenā, à uena quæ reni offertur pronatam, semel uidimus. In mulieribus alia<sup>a</sup> harum testes adeuntium uenarum est distributio. quamuis enim illis par cum uirorum uenis sit exortus, ipsæ tamen ex magna peritonæi cauitate haud elabuntur, neque ad pubis ossa pertingunt: uerū ad mulierum<sup>p</sup> testes, pinguibus membranis suffultæ porriguntur, non uniuersæ in feminaria uasa cessantes, aut totæ in testes exhaustæ. Nam priusquam ad

f. Spectat  
in 20, 21,  
23, 25 fig.  
lib. 5. in re.  
num cauo.

g. 4.

h. 11.

i. 20. fig. lib.

5. g. ab e. m.

de etiâ, uel

ex 22.

23. figuris.

huius uenæ

scribitur.

h. u. m. f.

tab. 9, 2.

1. u. aut. p.

lib. 5. 21. fig.

lib. 5. 21. fig.

ant. 23. fig.

den. Q.

et T.

m. p. r.

20. fig. lib. 5.

f. 21. 21.

fig. 4. b.

n. 6.

o. 25. fig. lib.

5. c. d.

p. 25. fig. lib.

5. r.

q. in 26. fig.

lib. 5. h. e. c.

u. s. s. p. e.

flantur.



quam ad testes deueniunt, utriusq; lateris uena bipartitur: ac una portio, uenæ uirorum testi implicitæ modo, seminariū uas efficitur. Altera uerò, membranæ quoq; pinguibus intertextæ, in uteri latera digeritur, elatiore ipsius fundi sedem potissimum implicans. Præter commemoratas propagines, caua, ubi lumborum uertebri, ac magnæ arteriæ colligatur, ab ipsius inferiori sede, quæ uertebrias spectat, uenas geniculatim diffundit, per foramina, neruis in uertebRARUM lateribus exculpta, ad dorsale medullam digestas, & ramos dein à se spargētes in musculos uertebrias adnatos, à quibus rursus aliæ soboles in abdominis musculos orbiculatim ad abdominis usq; latera conscendunt, & illis quas perreptant sedibus alimentū elargiuntur. Quum primum uerò caua ad sacri ossis usq; summum descēdit, atq; iam magnæ arteriæ (quæ ipsi prius ad sinistrum subijciebatur) tanquam digniori organo cedens, ipsi arteriæ se substernit, in duos æquales partitur truncos: quorū hic dextro cruri, ille sinistro (ubi eas quas modò dicam depròpsere soboles) offerūtur. Sinister enim truncus, perinde ac dexter quoque, statim in ipsa partitione, aut potius ubi caua in duos truncos supra os sacrum diuiditur, ab exteriori ipsius latere uenam promittit maiorē ijs quas ad lumborū uertebrias, & abdominis musculos, & aliosibi dem dorso cōnexos, dissēminari diximus. Vena hæc etiam interdū altius ac ante cauæ supra os sacrum partitionē, principiū ducens, transuersum lumborum carnibus insternitur, ipsis & peritonæo abdominisq; musculis ramulos dispergens, & in canibus multo quàm in hominibus manifestior. Posteaquam sinister truncus hanc deriuauit uenam, obliquè deorsum uersus exteriora fertur, figuram cum dextri lateris trunco  $\Lambda$  literæ, aut  $Y$  in hunc modum  $\chi$  inuersi si non ab similem constituens, & aliquot furculos superioribus sacri ossis foraminibus offerens. Deinde mox in progressū in duos impares ramos finditur: interior namque gracilior est exteriore. ac mox duas edit propagines, quarum alteram interiorē, alteram exteriorē, manifestioris doctrinæ gratia appellare consueui. Exterior itaque propago tota quodammodo inter sacrum & coxendicis os, quā maximus neruorum crus petentium ducitur, in exteriora transuersum prorepat, & numerosa ramorum serie in omnes huiusmodi, ab ilium ossis externa sede pronatos, femorisq; motibus famulātes, dispensatur, furculos etiam deorsum in musculos diffundens, qui ab inferiori coxendicis ossis sede principiū ducunt: atq; ita articuli coxendicis ossis cum femore posterior sedes, & clunium cutis, ab exteriori hac propagine uenas mutuātur. Interior autē propago ab interiori ipsius latere exiguas soboles sacri ossis quoque foraminibus dispensat: & alias his maiores, in recti intestini musculos, ceteraq; ani digerit, quæ feculentum sanguinem hæc expurgant, si quando is per uenam cauam huc decumbat, eodemq; colligatur. Deinceps hæc interior propago notatu dignum diffundit ramum, qui in uiris dextrum uesticæ latus amplectitur: & in plures scissus furculos, uesticæ ceruicē seu penem adit, in eumq; numerose digeritur, easemper serie, ut ceruici uesticæ crassiores ampliioresq; furculi, quàm ipsius fundo, exporrigātur. In mulieribus uerò præsens ramus, ab interna diductus propagine, pingui mēbrana suffulcitur: ac quibuscūq; furculis uesticā quidem adit, uerū frequētiorebus inferiorē fundi uteri sedē intercurrit, ramulos quoq; spectabiles in uteri ceruicē dispergens, per quos uirginibus mēstruas purgationes defluere, hæctenus medici sunt arbitrati, hymenem in puellis corpus quoddā sibi confingentes, non peruiū, & obstans, quo minus quicquam ex uteri fundo per ipsius ceruicem defluere possit. ac proinde colligunt, sanguinē illum oportere per uenas manare, sub hymene uersus ceruicis

Caua rami,  
lumborum uer-  
tebræ carni-  
bus, oblati.

Quæ caua arte-  
ria magna su-  
pra sacri ossis  
iniuium subij-  
ciatur ipsiusq;  
hic series.

uteri os, pudendum' ue spectantes: qui alioquin iam mulieribus, ac ex coitu, alio' ue petulant affricu, lacerum abolitum' ue hymenem obtinētibus, ab uteri fundo, aut uenis hymene superioribus distillaret. Verū si medicis hymenis fabrica, natura ue, quam quinto libro cum uteri descriptione meritō pertractabimus, cognita esset, neutiquā alias uenas uirginibus, quā mulieribus sanguinem menstruum emittere contēderent: quum hymen carneam membranam transuerſim in uteri ceruice repositam referens, oblonga ſeſtione ita ſit peruius, ut sanguinem illum faciliē tranſſinittat: perinde ac album illud profluuium, inuoluntario feminis fluxui non abſimile, quod etiam admodū puellis nonnunquam obuenire Ariſtoteles ueriſſimē docuit. Cæterū ut medici hymenis conſtructionem non ſunt aſſecuti, ita quoq; Arabum nonnulli parum rectē ſcripſerunt, quinq; numero uenulas in medium longitudinis uteri ceruicis diffundi, & dextrarum uenarum ora cum ſiniſtrarum oris cōiungere, committiq; ac ab illis puellarum hymenem cōſtitui, quam uenarum huc pertinentium copiam, centonē nuncupant. Quod uerō interioris rami ſiniſtri trunci eius ſupra os ſacrum factæ diuiſionis adhuc poſt' duas iam ipſius cōmemoratas propagines reliquum eſt, ad pubis os contēdit, & ab externo ramo trunci uenæ cauæ ſobolem aſſumit, quæ cum eo interioris rami reliquo cōgreſſa, unam cum ipſo uenam efformat, quæ primū peritonæum, ac dein' decimum ſemur mouentium perforat muſculum: & oſis pubis' foramen permeans, propriū ſinum in elatiori eius foraminis ſede ſibi uendicat, quo ſimul cum ſua coniuge' arteria, ac item' neruo fertur: ac foraminis eius' membranam, & nonum ſemur mouentium muſculum tranſiens, illis quos perreptat muſculis ramos porrigit. Quando autem in crus pertēdit, in elatiorem' ſecundi tibiæ mouentium muſculi ſedem, & in' quinti ſemur mouentium muſculi partem, à pubis oſſe pronatam, ac poſtmodū in' octauum ſemur agentium, & penis' muſculos, ramis nonnullis diffunditur, à quibus' ſurculi nimis quā exiles in femoris internæ ſedis cutem in inguinum regione prodeunt. Præter hos ramos, unus etiam articulum coxendicis accedit, proprio' ſinu coxendicis oſis acetabulū priuatim ſubiens. Et utcunq; multifariam hæc in crus prolaps uena digeritur, modicē tamen medium longitudinis femoris ſuperat: & interdum præcipuus ipſius ramus quinto ſemur mouenti muſculo diſpenſatus, propagini' commiſcetur, quæ huc pertinet, à maiori uena in crus deducta. Exterior uenæ cauæ diuiſionis ſupra os ſacrū factæ trunci ramus, quum obliquē crus accedit, priuſquam peritonæū perforat, ab elatiori ipſius ſede' uenam mediocris magnitudinis expromit, quæ ſuſum ad abdominis anteriora per peritonæum ducta, ipſi ramulos quosdam utrobique communicat. Vbi hæc ad iſtum modum peritonæo connexa, ad rectum abdominis muſculum' conſcendit, peritonæum permeans, in internam poſtერიorem' ue recti abdominis muſculi ſedem inferitur, & utrinq; uarias ſoboles in tranſuerſum abdominis muſculum, & ipſi incumbētes obliquos, reliquaſq; proximas ſedes diſtribuit, recto tramite ſuſum ſub recto muſculo protenſus. Vbi uerō ad abdominis medium paulo ſupra umbilici regionē prorepiſit, ipſius extremum in plures ſurculos diſſeminatur, qui ramulos ſpectant, quos à uena ſub pectoris oſſe ab elatiori thoracis ſede delata, diſfundi commemorauimus. Huius uenæ interuentu, mamillis cum utero communionem conſortiumq; exiſtere uulgō creditur. eius quippe beneficio, ex mamillarū uenis in uterum, quum foetus enutritur, ſanguinis retractionē: quum autem mulier lactat, ex uteri uenis in mamillarum uenas menſtrui ſanguinis reuulſionem perfici, medicis pariter conſeſſum

Vena, è quibus ſaſto uirginibus meſtrua purgationes manare creduntur.

Vena per pubis oſſe foramina ſemur petens.

Inferiori abdominis ſedi exprorecta uena.

r. p.  
s. r. n.  
t. à r. o. r.  
tur u.  
u. a.  
x. 16 muſc.  
ta. 2. g. h.  
7. 4. 7. 3. ſig.  
cap. 29 lib.  
2. r.  
2. caru.  
dem ſig. f.  
a. ſig. cap.  
12. r.  
b. 2. ſic. cap.  
11. lib. 4.  
ch. 2. a. 66.  
c. 14. muſc.  
tab. b.  
d. 8. muſc.  
tab. v.  
c. 16. ta. a.  
f. 8. ta. a. a.  
g. 8. tab. x.  
h. 4. 2. ſig.  
c. p. 29 lib.  
2. h. 1. 1.  
i. 2.  
k. ad regio.  
nem a.  
l. 2. ſic. cap.  
29 lib. x. h.  
m. ad 2.  
n. ch. 2. a. 6.  
o. 6.  
p. r.  
q. 8. muſc.  
tab. c. ad ſ.

r. m.

s. l.

cessum est omnibus. Quid uerò me, cur minus in eam sentētiam totus descendam, remoretur, in mamillarum & uteri historia explicabo. Vena interim ab imo sursum conscendens, non ita procul ab uteri uenis originem ducit: & al-  
 \* Exterior enim uenæ cauæ sinistri trunci, quem nunc describimus, ramus, quando supra coxendicis os in femur procidens, peritonæum transiit, ab interiori ipsius regione aliam promit uenam, quæ ad osium pubis medium, quæ inuicem<sup>r</sup> cartilaginis interuentu hæc uniuntur, accedens, uiris in penis<sup>r</sup> inuolucrum & scortum, mulieribus autem in pudendi colliculos, & in<sup>r</sup> coriaceas carunculas (quas *νυμφή* uocant) uicinasq; sedes numerosa ramorum serie digeritur. Porro reliquum<sup>r</sup> rami illius sinistri trunci, quod in crus copiosa propaginum serie digeritur, peculiari nunc Capite prosequemur, illo uniuerfam cauæ uenæ distributionem absoluturi.

## VENÆ CAVÆ SOBOLES IN CRVS

digestæ. Caput x.



R A E T E R cauæ<sup>r</sup> propaginem, secundum posteriorem coxendicis ossis sedem, in femur aliquousq; propagatam, ad crus duæ descendunt uenæ: una quidē gracilior, quam per pubis ossis foramen ad quosdam interiora femoris amplexantes musculos perrepentem, ad medium longitudinis femoris<sup>r</sup> cessare, iam antea narrauimus. Altera uerò crassior, cæterarumq; uenarum in crus excurrentium caudex, ab<sup>r</sup> externo ramo alterius trunci uenæ cauæ supra os sacrum factæ partitionis pendet: & simulatq; è peritonæo elabitur, per<sup>r</sup> superiorem coxendicis ossis regionem, ad internum latu<sup>s</sup> sedis, qua sextus & septimus femur mouentium<sup>r</sup> musculi descendunt, in inguina fertur, anterioremq; (uersus interiora tamen magis) femoris regionem subit: & nullo occultata musculo, sinui caui tati<sup>r</sup> ue inlidet, quæ in inguine efficitur, à<sup>r</sup> longo graciliq; musculo, tibiam mouentium primo, & octauo femoris motuum autore. Vena itaq; huic cauitati incumbens, in plures ramos discinditur: atque quo iniurijs minus redderetur obnoxia, primis suis distributionibus Natura<sup>r</sup> frequentes glandulas (uti in axillis, ac sub auribus) hic circumposuit, quæ firmam stabilemq; uenæ propagationem redderent, & quam diximus cauitatem cum uena simul, & arteria, neruoq; hac descendentibus opplerent, propugnaculumq; quoddam his uasis efficeretur. Prima huius uenæ propago insignis est, ac ab interiori ipsius latere principium ducens, ad cutem femoris interiora inuestientē properat, & hæc deorsum per genu interiora, & hinc rursus per internam tibiæ regionem uersus<sup>r</sup> malleolum interiore sub cute exporrigitur: ac demum in pedis superiora descendens, uariè inibi digeritur, alijs huc pertinētibus uenarum furculis cōmixta. Hæc propago, quæ interiori exporrigitur malleolo, uniuerfim non eundem seruat ductum. quandoquidē nonnunquā ab interna tibiæ sede, secundum anteriore malleoli regionem, ad pedis superiora<sup>r</sup> excurrit: aliquando uerò (sed rariùs) sub malleolo cōtorquetur, illac pedis superiora conscendens. Deinde in ramorū ad pedis digitos & supra pedion seme plurimum uariat: aliquando enim alijs quibusdam ramis hic cōmixta, ad minimum digitum, ipsiq; proximū præcipue deducitur, aliquando uersus pollicē & indicem excurrit. Breuiter, in eodem homine uix parem unquam reperias huius propagationis ramorum in utrisque pedibus seriem. Rami quoque, quos in descensu profert,

Quæ uenarum  
radices se  
perant.

Alterior femo-  
ris uena feriet.

1. 5. pro  
cal. 2. 10. aut  
25. fig. lib. 5.  
non pro-  
cul ab 9.  
u. 10.  
x. 1.

7. ult. fig.  
lib. 1. 1.  
2. 10. fig. lib.  
5. 1. 1.  
25. fig. lib.  
5. 1. 1.  
b. 1.

a. 1.  
b. 1.

c. ad 9.  
d. trunci  
inter 10.

e. 1.  
f. 1. 1. 1. 1. 1.

g. carmide  
fig. 1. 1.

h. 1. 1. 1. 1. 1.

i. 1. 1. 1. 1. 1.

k. 1. 1. 1. 1. 1.

l. 1. 1. 1. 1. 1.

m. 1. 1. 1. 1. 1.

n. fig. cap.  
12. 1. 1.

o. 2. fig. cap.  
11. lib. 4.

p. 1. 1. 1. 1. 1.

q. ultimæ  
fig. lib. 1. 1.

r. 1. 1. 1. 1. 1.

s. 1. 1. 1. 1. 1.

t. 1. 1. 1. 1. 1.

u. 1. 1. 1. 1. 1.

v. 1. 1. 1. 1. 1.

w. 1. 1. 1. 1. 1.

x. 1. 1. 1. 1. 1.



profert, rarissimè inuicem aut numero, aut amplitudine correspondent: siqui-  
dem inordinatè ad cutem permeant. ut plurimum tamen in superiorem in-  
ternæ femoris regionis cutem, non procul à suo ortu, utrobiq; unam emittit  
fobolem. ac<sup>1</sup> interior quidem, femoris interiora & inguina, ipsumq; quasi pe-  
rinæum seu interfemineum accedit:<sup>2</sup> exterior autem, quæ & crassior est, fe-  
moris anteriora & exteriora sub cute perreptans, similiter ac interior, in furcu-  
los quosdam cessat. Quum<sup>3</sup> grandis hæc propago ad medium femoris longi-  
tudinis quasi deuenit, notatu dignos ramos hic etiam in cutè dispergit, & in-  
ter cæteros<sup>4</sup> unum<sup>5</sup> gracili longoq; musculo porrigit, quem tibiā mouen-  
tium primum recensuimus. Cæterum quando ad genu articulum, uelut ad  
posteriora orbiculatim ea propago nonnihil conuoluitur,<sup>6</sup> duas quoq; emittit  
foboles, mutuò quidè mole pares, sed exiguas. una in anterioris genu sedis cu-  
tem secundum patellam dispergitur: altera interioris genu sedis, uersus genu  
flexum, cutem accedit. Hæc posterior foboles aliquādo penitus deest, aliquan-  
do impenſe gracilis reperitur: tunc scilicet, cum<sup>7</sup> propria genu flexus cutem  
accedens uena, solito amplior uisitur.<sup>8</sup> Ad interioris sedis tibiæ cutè, à magna  
hac propagine, & antrorsum & retrorsum ramuli diffunduntur, qui impari  
numero sparsi, rursus cum proximis uenis uariè coeunt, inuicemq; rursus diri-  
muntur. Præter istam propaginem, maxima crus subiens uena, e regione il-  
lius<sup>9</sup> aliam promit, quæ extrorsum ducta, in anteriorem articuli coxendicis cu-  
tem, & eius sedis musculos quoq; distribuitur. Postquam uerò maxima uena  
has edidit propagines, penitiùs inter musculos femoris os amplexâtes immer-  
gitur, & insignem ramum<sup>10</sup> septimo & nono tibiā mouentibus musculis  
cōmunicat, à quo etiam tenues furculi in cutem deriuantur. Deinceps<sup>11</sup> alium  
magis in profundum distribuit ramum, nunc cōmemorato ampliorem, qui  
per<sup>12</sup> quintum femur mouentiū musculum digeritur, fobolesq; in<sup>13</sup> octauum  
tibiæ motuum autorem dispensat. Ab hoc etiam ramo plures uenarum furcu-  
li in uniuersos propemodū hic femoris os ambientes musculos propagantur:  
inter cæteros autem præcipuus finem eius<sup>14</sup> uenæ, quam per pubis olsis fora-  
men in femur delabi dictum est, ad se<sup>15</sup> assumit: eoq; adauctus, deorsum magis  
ad genu usq; quodammodo, inter musculos occultatus, descendit. Cæterum  
maxima uena sensim ad femoris os uersus posteriora contorta, ramulos oppi-  
dò quàm exiles<sup>16</sup> grandioribus femur petentibus neruis offert, qui in membra-  
nas neruis obductas digeruntur. Dein<sup>17</sup> aliam emittit propaginem, quæ in po-  
steriorem femoris cutem excurrens, furculos etiam sursum cutem subeuntes  
deriuat. Huic propagini frequenter à<sup>18</sup> ramo, quem in quintum femur mouen-  
tium musculum dispensari diximus, foboles quædam accedit, quæ unā cum  
ipsa commiscetur: & uena ex duabus confluens, sicuti relatum est, cutem adit.  
Crebriùs tamen<sup>19</sup> duæ à grandi cruris uena enascuntur propagines, una humi-  
lior altera, & ex posteriori magis sede, quàm ex latere enata. Hæ in progressu  
inuicem unitæ, eam cōstituunt uenam, quæ hic in cutem promitur: ac ubi<sup>20</sup> ra-  
mulos sursum in posteriorem femoris cutem germinauit, recto tramite deor-  
sum per mediam flexus genu sedem, seu poplitem, ad suræ cutem<sup>21</sup> descendit,  
ipsi numerosam ramulorum seriem porrigens, quæ sibi in omnibus minimè  
correspondet. Verùm ramulorum alij rectà, alij obliquè, alij transuersim in cu-  
tem excurrunt: & denuò nonnulli inuicem coeuntes, permiscētur: & deniq;  
cum aliarum uenarum, quas sub cute<sup>22</sup> tum internum latius suræ,<sup>23</sup> tum exter-  
nam tibiæ regionem perrepere mox audies, propaginibus, subinde uniuntur.  
Atq; ita præfens, quæ per poplitis flexū sub cute delabitur, uena, nonnunquam  
ad calcem

ad calcem usq; duntaxat<sup>r</sup> incedit: nōnunquam uerō & ramulos in externum pedis latus depromit, nullibi interim in altum submersa. Cæterum grandis crus subiens uena, posteriori femoris sedi, quemadmodum diximus, accumbens, exigua sobolem<sup>r</sup> utrinq; diffundit in exortus<sup>r</sup> musculorū, qui pedem mouentium tres primi enumerātur, hicq; ex humilioribus femoris capitibus prodeunt. Vbi autem uena in horum capitum medio iam ferē<sup>b</sup> existit, in duos impares discinditur truncos: quorum<sup>r</sup> exterior, qui<sup>d</sup> interiore longē est gracilior, obliquē uersus fibulā cum tibię ossē iuxta genu connexum fertur, ramulum in cutem externā & anteriori genu regionī obductam digerens: ac mox inibi in<sup>r</sup> duas portiones dissectus, quarum<sup>r</sup> præcipua posteriori interioriq; sedē musculorum pedem mouentium septimi & octauī sese insinuat, secundū fibulam deorsum tantisper protēsa, ac dicti nuper musculi carnei permanent, secundūq; posteriorē malleoli exterioris sedem reflecti incipiūt: inibi enim portio hæc cessat, in progressū ipsis musculis soboles offerens, & nullibi ad cutem emergens.<sup>r</sup> Altera uerō, eademq; tenuior portio uniuersa cutem adit, & secundū externam tibię sedem, exterioremq; malleolum, ad pedis superiora, uersus externum ipsius latus contendit, in progressū pari cum<sup>k</sup> uena sub poplitis cute furam accedente, modo, furculos uariē diffundens, ad cōterminam, quā descendit, ipsi cutem. Et quanquā eiusmodi furculi proximis uenulis permisceantur, insignior tamen huius portionis coitus, & mutuus denuō diductus, in superiori pedis regione cum illius<sup>r</sup> propaginis furculis spectatur, quam à magna crus petente uena, non procul ab inguine pullulantem, per femoris tibięq; interiora, ad pedem ferri narramus. Ab illius enim propaginis, & istius quam modō narramus portionis ramulis, uariū ille uenarum confurgit implexus, qui in pedis superiori sede, & digitis ipsis, ante sectionem sub cute est conspicuus, nec sibi semper uel in eiusdem hominis pedibus respōdet. Verūm interim, uti externum pedis latus uenulas sibi nonnunquā à uena, per poplitis flexum sub cute deducta, assumit: ita quoq; internum pedis latus à calce ad pollicem usq; ramulos perpetuō sibi uendicat, ab ea<sup>r</sup> uena, quæ sola tibię cutem adeuntium adhuc nobis est enarranda. ° Interior enim & crassior truncus diuisionis, quam grandis uena in poplite recondita molitur, rectā deorsum tendens, ab interno ferē ipsius latere<sup>r</sup> ramum depromit, qui ex alto emergens, per internam tibię sedem, uersus posteriora tamen magis, ad internum usque calcis ac pollicis denique latus, sub cute disseminatur, & suis furculis conterminarum uenarum ramulis ita permiscetur, ab eisdemq; rursus diducitur, uti hætenus de tribus cutem implicantibus uenis recensere conatus sum. Confurgit enim (ut semel dicam) eiusmodi harum uenarum implexus & digestio, ut crebrius cutem hanc, perinde ac temporū & cubiti manusq; cutem uaricibus infestari, haud mirum cēseri debeat. Videtur enim Natura sub cute undecunq; propemodū multiplici illo uenarum implexu seu coitu, & rursus earundem diductu, perpulchrē luisse: ne quum uenæ per cutem latæ, crebrō multisq; occasionebus sunt uulneradæ, & transuersim absecadæ, mox contermina & subsequēs sectioni cutis, alimēto defituatur. Porro<sup>r</sup> interior ille truncus diuisionis, quam grandis uena in poplite tentabat, posteaquā ramū illum, quem postremū tibię cutem petentiū enarrauimus, à se deprompsit, uniuerso suo incessu recōditus, & in alto latitās, illico<sup>r</sup> ramū educit, qui secundū posteriorem<sup>r</sup> quarti pedem mouentiū musculi sedem exporrectus, exiguosq; furculos à se diffundens, paulo humilius cessat, quā<sup>r</sup> duorum primorum pedem mouentium musculorū tendo, quarti musculi tendinī cōmiscetur. Atq; ut is

ramus

ramus ex posteriori ferè interioris trunci sede pronascitur, ita quoq; simulatq; is inter quartum & quintum pedem mouentium, & secundum tertiumq; pedis digitos agentium musculos recondi incipit, ad eamq; regionem pertingit, ubi fibula à tibiæ ossè primum dehiscit, notatu dignæ amplitudinis educit<sup>b</sup> propaginē, ab anteriori sua sede enatam. Hæc antroꝝsum ducta, ligamentum, fibulam tibiæ ossi, quā mutuò distant, membranæ modo colligans, permeat, & secundum tibiæ longitudinem inter musculos anteriorem tibiæ sedem occupantes prorepat, præcipuè attensa<sup>a</sup> musculo quatuor digitos extendenti, & illi qui pollicis extensioni præficitur. In hoc descensu, propago nonnullos furculos proximis sibi musculis exporrigit: & per<sup>c</sup> transuersum, quod in anteriori tibiæ sede occurrit, ligamentum ducta, in superiori pedis sede terminatur: & musculosæ substantiæ, cui pollicem tresq; ipsi proximos digitos in externum latus ducendi munus ascribimus, ramulos offert, ligamentis ossium hac in parte attensa, & cutem nullibi subiens. Quod autem<sup>d</sup> trunci interioris, per tibiæ posteriora descendens, adhuc<sup>e</sup> reliquum est, & inter dictos hac in sede musculos exporrigitur, simul quoq; cum illorum tendinibus inter calcem & anteriorem malleolum, pedis humiliora petit, & modicas soboles in conterminas ipsi sedes digerit, inter<sup>f</sup> musculum secundos quatuor digitorum articulos flectentem, & tendines repens, quorum beneficio ultimi digitorum articuli flexū experiuntur: Atq; ita huc pertinens eius trunci reliquum, in multos ramulos feriatim absumitur, quorum ferè bini inferiorem cuiusq; digiti sedem perreptant. Hacigitur propemodū serie uenam cauam in crus digeri, sedula refectione didicimus. Quàm uerò nostra historia, Galeni descriptionibus undiquaq; conueniat, illi demum intelligant, qui hanc cum tertio libro de Administrandis sectionibus, & libro de Venarum arteriarumq; sectione, non oscitanter conferent, ac pariter expendent, quàm pulchrè Galenus in duobus illis libris sibi consentiat, non leuiter, neque uno tantum loco à uera humani corporis uenarum descriptione aberrans. Longum namq; foret, pugnantia ea loca hic commemorare, præsertim quum præter compendia, nostræ ætatis medici uix quicquam perlegāt, prolixè interim de superficialiys pedem adeuntibus uenis, si quando earum aliquam aperiendā existimant, perinde disceptantes, ac si illæ ab uno trunco inguina subeunte tandem non deriuarentur, sed peculiare, sibiq; non continui essent riuuli, expriuatis uisceribus, corporis ue trunci sedibus educti. Quum enim alicubi<sup>m</sup> quatuor uenas ad pedis superiora pertinere, in Galeno legerunt, totidem uenas pedi tribuunt, singulis rarum propriumq; sanguinis educendi munus ascribentes. ac primam statuunt, quæ internum perreptat malleolum, & Saphena & matricis uena & uirginalis ipsis uocatur. Secundam exteriori assignant malleolo, Schiaticam illam nuncupantes. Tertiam in superiori pedis sede recensent, ex uenarum ramulo quopiam, pollicis porrigendo eductam, illiq; Popleticæ uenæ nomen accommodant. Quartam renalem uocant, ipsam ex ramulis quibusdam confin-gentes, qui minimo digito sunt proximi. Verum interim uenas in poplite & sub genu, in sanguinis missione magis quàm pedis uenæ aperiendas, negligunt, uti & omnes in corporis alto reconditas. Quæ autem uenæ cauæ series refectione sit perdiscenda, sedulo ad quinti, sexti & septimi librorum finem cōmemorabo, ubi earum partium, quas cauæ uenæ soboles implicant, perreptantq; administratio describetur.

Galeni de uena  
cauæ per  
crus serie de-  
scriptiones ue-  
riæ, & parum  
hæc.

Ad finem tra-  
ditionis uena-  
rum, in libro  
de sectione ue-  
narum & art.

x 15 mase.  
tab. D.E.  
y 14 mase.  
tab. A.  
z 14 mase.  
tab. B.  
a 15 mase.  
tab. ubi s  
distat ab  
R.  
b char. 11.  
c 15 mase.  
tab. T.  
d 4 mase.  
tab. V.  
e 5 mase.  
tab. O.  
f 15 mase.  
tab. A.  
g 5 mase.  
tab. V.  
h char. 14.  
i char. 15.

li 14 mase.  
tab. O.  
l 14 mase.  
tab. A. A.  
d. 14.

m Quam  
medici sibi  
tam parū  
conferunt,  
uix quasi il-  
li propo-  
nat uenas,  
in figura  
indicare  
quæ.



UMBILICI uenam, ut & alia eiusdem uasæ, quæ in natiuitate fetus corpore relinquitur, secunda figura libri quinti refert, ad literas E, F, G, dem K, L & M. Series uerò umbilici uenæ, quæ extra fetum adhuc in utero repositum, inter dissectandum conspicitur, in quatuor tabellis figuræ trigesima libri quinti occurrit, ad literas E, E, I, L, L, N, R, S, S, X & X.



N uenarum historia, dissectionum professores, umbilici uenam nuncupant, quæ ex uarijs uteri fundû petentibus uenis collecta, & tandem per fœtus umbilicû subiens, in ipsius potissimum iecur exporrigitur, sanguinemq; ad fœtus nutritionem perinde defert, ac cæteræ matris uenæ illis quas perreptant partibus sanguinem cõmunicant. Quandoquidem uerò hæc peculiaris quædã, & à<sup>b</sup> cauæ & por<sup>tæ</sup> uenarû corporibus quodammodo distincta putatur: ac post partû, quicquid ipsius in corpore adhuc remanet, aridû, ac ueluti exanguæ, solidiorisq; instar fuculi efficitur: nõ inopportunè me facturû existimo, si priuato Capite ipsius historiam uel obiter saltè persequar: quòd quum umbilici etiã arterijs, quæ fœtui quoq; quum utero geratur, tantum sunt utiles, nõnihil cõmune esse debet, ipsum sanè ad finè usq; præsentis libri asseruassẽ, & Capiti quod uenæ arteriali, ac arteriæ uenali dedicabitur, adhibuissẽ: nisi arterias umbilici promptè cum magnæ arteriæ ramis describere liceret, quum illæ tanquã huius propagationes omnino haberi queant. Quocunq; igitur hoc Caput trãspones, necessum sanè fuit, fœtû tantisper dum in utero cõsistit, perinde à matris uenis enutriti, & ab eiusdẽ arterijs illius calorẽ temperari, ac rursus aliquod ora in uterû matris, suis uenis arterijsq; frui nouimus. Quum itaq; semẽ tam maris quàm fœminæ in uterû sinum receptû est, ac ueluti formationẽ integram in se primû assumit, etiã ab ipso mēbranula generatur, quæ semini tanquã crassiori quopiam iam refrigeratũ iusculo circûdata, alicui uteri parti ualidius nouo quodã uasorum interuētũ adnascitur. Vteri enim uenæ ac arteriæ sese in huius nexus regione aperiūt, & cõmunes statim fiūt cum uasis in mēbranula ea formationẽ assumētibus, quæ tot numero primû sunt, quot uasorũ ora in uterû tunc sese aperiūt, uasisq; illis nouis cõtinuantur: adeò, ut hîc ferè umbilici nobis uocatæ uenæ statuendũ sit initiũ. Frequẽtes enim uenæ, in uteri sinũ ita pertinẽtes, ac per exteriorẽ illam membranã (quæ exterius fœtũ ambiens est inuolucrũ) exporrectę, sensim (ne omnes simul diuersis sedibus fœtũ subeuntes, illum innumeris foraminibus perforarẽt) in se colliguntur: atq; ex pluribus gracilioribusq; propaginibus semper crassiores paucioresq; eũ in modũ exurgunt, ut tandem omnes in duas quasi uenas coaceruẽtur, quæ ab exteriori fœtus inuolucro proficiscẽtes, interius inuolucrũ permeat: & posteaquã illi exiguos ramulos per ipsius amplitudinẽ sparsos obtulerũt (quicquid hac de re parũ rectè sentiat Galenus) in unã mox homini coeunt uenã, quæ tandẽ ad fœtus umbilicũ longo incessu, instar funis aut cordæ properat, arterijs duabus, & meatu, quo fœtus urina expurgatur, concomitata, & quasi cõmuni corpore firmata. Post ipsum autem per umbilicũ ingressum, uenã ab arterijs eoq; meatu recedit: & anteriori peritonæi sedi in interna eius superficie nexa, uersus iecur cõtendit, & homini per propriã peculiaremq; rimã, ac dein foramẽ in iecur fertur, ad ipsius usq; cauum illuc pertingẽs, quã portæ uenæ caudex è iecore labitur. Vbi hæc umbilici uenã bipartitò scissã (si quid iudico) in quendã portæ uenæ ramũ inseritur, illius uerò ramis cõmunis efficitur, perinde atq; in canibus, & quibuscũ alijs animalibus, ab umbilici uenã, posteaquã umbilicũ subij, ramum quoq; ad mēterij centrũ deduci cernimus, qui portę uenæ præcipuo trunco in mēterium

Quid umbilici uenæ appellatur.

Vnde umbilici uenæ exurgat initiũ, & quæ ipsius series.

Terium

umbilici arteriarum series.

terium disperse committitur: quanquam sanè obscurius quàm umbilici arterias, magnæ arteriæ communes esse conspicimus. Dicitis namque uenis undecunq; ab interna uteri superficie, ad fœtus usq; umbilicum, arteriæ attenduntur, prorsus eandem cum uenis seriem seruantes. quum tamen peritonæi cauitatem duæ arteriæ ingrediuntur, ab inuicem diductæ, ac anteriori peritonæi sedi in ipsius interna regione nexæ, deorsum feruntur: ac secundum<sup>u</sup> uenificæ latera (uti suo dicemus loco) prorrepêtes, in magnæ arteriæ<sup>x</sup> propagines paulo pòst per pubis ofsium<sup>v</sup> foramina prolapsuras, ita inferuntur, illisq; propaginibus ita communes fiunt, ac si ab ipsis principium ducerent, illarumq; ramiac soboles essent. Cæterum quia in quinto libro, ubi generationis organa prosequemur, de fœtui peculiaribus uasis & inuolucris, eiusmodiq; alijs quibusdam agendū erit, iam totius magnæ arteriæ seriẽ opportunè aggrediemur.

u = fig. 12.  
x N.  
v fig. 13.  
f. continetur inter I & r.  
v = 133 fig.  
cap. 19 lib.  
r.


TOTIVS MAGNÆ ARTERIÆ DELINEATIONIS, adeoq; figuræ duobus proximè sequentibus Capitibus communis, characterum Index.

- A* Arteriæ magnæ initium, quo ex sinistro cordis sinu educitur.  
*B, B* Duæ arteriæ, cordis basin coronæ modo succingentes.  
*C* Magnæ arteriæ caudicis in duos truncos bipartitio.  
*D* Arteria obliquè sursum ad primam sinistri lateris costam contendens.  
*E* Ramus, qui quatuor superiorum sinistri lateris costarum intervallis soboles derivat.  
*F* Ramus per transversos cervicis uertebrae processus ad calvariæ usq; prorrepens, & geniculatim dorsali medulle vicinisq; musculis soboles offerens, ac in sinistram duræ membranæ sinum cessans.  
*G* Ramus sub sinistro pectoris ofsis latere ad umbilici usq; sedem excurrrens, à quo surculi digeruntur in ueriarum costarum cartilaginum intervalla, & hinc in musculos pectori instratos: insuper in sinistram, qua thoracis cauitas intercipitur, membranam, & abdominis musculos.  
*H* Ramus posteriores cervicem occupantium musculos accedens.  
*I* Ramus ad cavam scapulae regionem ac adspiratos illi musculos prorrepens.  
*K* Ramus ad humeri cum scapula articulum & summi humeri inferiora propagatus, nusquam interim ad cutem excidens.  
*L* Propago in musculos anteriorem thoracis sedem integentes sparsa.  
*M* Propago secundum thoracis latera deorsum procedens, ac musculo brachium deorsum trahenti intertexta. Inter *L* & *M* ramulus occurrit, eorum unus qui hic in alæ glandulas dispersuntur.  
*N* Arteria simul cum interiori axillaris uenæ trunco in brachium excurrrens: ac primi illi surculi, sub *N* mox conspicui, in musculos humerum seu brachij os amplexantes propagantur.  
*O* Ramus secundum posteriorem humeri sedem, una cum quarto in brachium pertinente nervo, aliquousq; in exteriorem cubiti sedem reuolutus, ac undiq; in alto interim latitans.  
*P, P* Iti ramuli articuli cubiti cum humero sunt peculiæres.  
*Q* Arteriæ brachij petentis ramus, radio exporrectus, ac tandem pollicis & indici medioq; digitis surculos offerens.  
*R* Surculus ab arteriæ ramo *Q* insignito, uersus manus exteriora, inter primum pollicis os, & postbrachialis os, quo index suffulciitur, deductus.  
*S* Ramus ulnæ exporrectus, & paruo, anulari, medioq; digitis soboles communicans.  
*\* Ramulus musculis elargitus, externum uolæ latus constituentibus.*  
*T* Arteriarum in manu series.  
*U* Amplior ascendens arteriæ trunci portio, quæ rectâ ad iugulum cõtendens, in duos impares ramos dirimitur.  
*X* Sinister graciliorq; diuisionis in iugulo factæ ramus, sinistram soporalem constituens arteriam.  
*Y, Z* Duobus his characteribus dexter in iugulo factæ diuisionis insignitur ramus, sinistro longè amplior. Verùm *Y* priuatim propaginem indicat, quæ in dextro latere prorsus in eandem soboles digeritur, in quas arteriam *D* insignitam, in sinistro latere disseminari conspiciat. *Z* autem priuatim dextram soporalem notat, quam, uti & sinistram, Arabum interpretes apoplepticam, & somni, & letargicæ, & subeteni, & decolationis uenam appellant, quæ nomina pleriq; iugularibus uenis accommodant.  
*a* Sinistra soporalis arteriæ in faucium regionibus in duos ramos distributio.  
*b* Exterior diste iam & a insignite distributionis ramus, in faciem & tempora posterioraq; auris excurrrens. Interiorẽ uero ramum, sub characteribus *c* & *d* nunc explicabimus.  
*c* Arteriarum ad laryngem, fauces & linguam series.

*d* Soporalis

INTEGRA TO  
ARTERIAE AB  
TIBVS LIBERAE

TIVS MAGNAE  
OMNIBUS PAR.  
DELINEATIO.





- d Soporalis arterie pars, calvariā petens, atq. iuxta basim calvariā in duos distributa ramos: quorum alter, qui sinistrum duræ membranæ sinum subit, hic quā in calvariā mergitur, abtruncatus est: quod præsentī figuræ eius membrana sinus non duxerim delineandos, eos postmodum cum integrā cerebri vasorum serie, ad frontem decimiquartī Capitis, peculiari figurā exhibiturus: ex qua etiam alterius rami, soporalis arterie calvariā ingredientis, distributionem petes. & si uisum fuerit, huic delineationi ex illa characteres adicies, qui fere essent, L, q, r, s, u, x, æ, ß, γ, δ.
- e Propago rami paulo antè b indicati, penitus inter faciei musculos excurrens.
- f Rami b insigniti sub auri radice distributio: cuius anterior ramus, q notatus, per tempora fertur: posterior uero, cui h inscriptus, secundum auri posteriora sub cute pariter atq. ille spargitur.
- g, h. T r n c v s magnæ arteriæ, deorsum ad dorsi uertebras explicatus.
- k, k, k Propagines utriusq. ad octo inferiorum costarum inter ualla protense, a quibus dorsali etiam medulla, ac musculi dorso & thoraci adnatis, ramuli offeruntur.
- l Septi transversī arterie.

Verius ne characterum copia integrā magnæ arterie delineationem, alioquin hic satis obscuram, penitus corrumpere, priuata hac effigie mōdo uendum duxi: quæ superius, ubi septo transverso arterie l indicata offeruntur, inferius uero ad seminalium arteriarum, quæ i & u indicabimus, exortum, nclui ex magnæ arterie caudice dissecta cernitur. In præsentī itaq. figurā, iam enarrandis propaginibus duas radices pinxi, quum integrā arterie delineatio iunctam (ut frequenter etiam occurrit) m. tantum habeat. Indices igitur m utriusq. aut unus duntaxat n, o. radices exortum. n dextrum ramum. o surculum in humiliorē rem omenti membranā hic exportectum. p propaginem in dextram uentriculi sedem, quā dorsum spectat, atq. inferius orifi cium educit, excurrentem. q ramum duodeno intestino & iens r. ni initio exportectum. r propaginem ad dextram fundi uentriculi sedem deductam, uentriculoq. & superiori membranæ omenti ramulos exhibentem. s bilis uesicula ar t, u, x. ceriolas. t arteriam iecori distributam. Ceterum u insignitur sinister ramus, qui potissimum lienem adit. x propagio secundum posteriorem uentriculi sedem, ad ipsius usq. elatius orificium progrediens. y eius propaginis z ramuli, in uentriculum, quā dorso innititur, derivati. z ramus, orificium uentriculi superius corone modo cin æ, ß. gens. æ ramus, secundum elatiorem uentriculi sedem inferius illius orificium accedens. ß grandis in demissio y rem omenti membranā excurrens propago, quæ etiam colo intestino multis surculis implicatur. γ surculus δ. in humiliorē omenti membranā hic ad sinistram latūs excurrens. δ & δ arteria, lienis cauum subuen tes. ε arteria sinistram fundi uentriculi sedem petens, ac uentriculo ipsiq. superiori membranæ omenti soboles z. derivans. z ramuli ab alijs lienem accedentibus arterijs, in leuium uentriculi latūs deprompti.

3 In integrā delineatione, & ea quam hic indici adhibuimus, aliud 3 occurrit, quo insignitur arteria, in superio rem ac propemodum uniuersam mesenterij sedem propagata, & suis propaginibus in iecunum intestinum, & ilium, & coli partem, a iecore ad dextrum renem conspicuam, sparsa.

n Dextra renem accedens arteria.

θ Arteria, quæ in sinistram renem exporrigitur.

i, i Dextri lateris seminalis arteria.

u, u Sinistri testis seminalis arteria.

λ Arteria humiliorē mesenterij sedem subiens, ac potissimum in colon intestinum excurrens, quā id a lienis ratiōne ad rectum intestinum pertinet, cui etiam a præsentī arteria soboles diffunduntur.

μ, μ Propagines geniculatim lumborum uertebras accedentes, & in peritonæum & musculos uertebris adnatos di stribute. Propago autem ad humiliorē μ consistens, ceteriq. grandior, ad abdominis usq. latera excurrit.


v, v, v Detragne arterie supr a os sacrum in duos truncos distributio. Verum isti characteres etiam surculos notant, ab humiliori arterie regione in ossis sacri foramina derivatos.

ξ Interior ramus sinistri trunci iam dictæ diuisionis.

o Interioris rami exterior propago, in musculos excurrens, qui externam ilium ossis sedem & coxendicij articu lum integunt.

π Interioris rami ξ notati interior propago, in humiliorē ossis sacri sedem, uescam, & uescicā cernicem, ipsiq. penem: in mulieribus uero, in inferiorem uteri fundi regione, & pariter in illius cernicem, surculos diffundens.

ε, ε Hic etiam arterijs appropinquamus, quarū sinistra ab umbilico hic inter ξ & s ad interiorem ramum ξ insignitur perinde



perinde pertinet, ac si uersus umbilicum ab ipso deriuaretur.

Interioris rami & insigniti reliquum, quod ab externo ramo trunci diuisionis quæ supra os sacrum fit, portionem asciscens, per pubis ossis foramen in crus delabitur: & inibi in musculus pubis os occupantes digestum, suo termino cum alia arteria, mox signanda, coit.

Propago exterioris rami, sursum ad rectum abdominis sui lateris musculum conscendens, atq. præcipua ipsius sobole umbilici regionem petens, reliquos autem surculos transuersim in humiliorē abdominis sedem dispensans.

Surculus transuersim secundum pubis os ad pudenda prorepens.

Sedes exterioris rami, quæ iam modo in crus delabitur, in ipsamq. disseminari incipit.

Ramus maioris cruris petentis arterie, in musculos propagatus, anteriorē femoris sedem occupantes.

Ramus ad quintum femur mouentem musculum, & eos qui internam femoris sedem occupant, digestus, unoq. ipsius surculo, inibi ubi eo repositum est, cum illius arteria coiens sine, quam per pubis ossis foramen procidere diximus, ac s. insigniuimus.

Ramus in musculos posteriorem femoris sedem occupantes excurrrens.

Hic grandis arteria inter duo humiliora femoris capita reconditur, & utriusq. ramulum offert genu articulo & pedem mouentium musculorum capitibus, inibi principium ducentibus.

In poplite iam consistens magna arteria, ipsiusq. in impares portiones diuisio.

Ramus fibule exporrectus, sub septimo & octauo pedem mouentium musculis.

Præcipua magnæ arterie crus aduentis portio, per tibiæ posteriora descendens.

Ramus quarti pedem mouentium musculi posteriori sedi oblatu.

Ramus, qui per membranæ ligamentum, tibiæ ossi fibulam colligans, in tibiæ anteriora excurrit, pedisq. superiora inibi ubi & insignitur, per transuersum anterioris sedis ligamentum accedit.

Propago internam pedis sedem uersus eius superiora petens.

Arteria in humiliori pedis regione ad digitos series.

Subsequentibus modo duobus Capitibus non solum hæc, cuius indicem absoluiimus, figura cõuenit: sed etiam huc attinet, præter crebras quinti libri & sexti & septimi figuras, ea quam huius libri fini subiungam.

### VNDE ARTERIA MAGNA PRINCIPIVM ducatur, & in quos ramos ipsius ascendens pars digeratur. Caput XII.

Quando in interiori margine alicubi scribitur, fig. cap. 12. ea subaudienda est, quæ integram arteriæ magnæ seriem ante præfens Caput proposuimus.



ONGE minor medicorum philosophorumq. proceribus, de<sup>a</sup> grandis arteriæ, quàm de uenarum neruorumq. principijs, est dissensio. Hippocrates namq. Plato, Aristoteles ac Galenus pariter, cor arteriarum fontem ac originem (uti sanè est) statuunt. Et falsa prorsus est Pelopis Galeni præceptoris sententiâ, arterias simul & uenas cum neruis è cerebro nasci docēs, & ab eo autore propemodum tradita, qui spurium tractatulu de uenis, Hippocratis libro de Natura humana in teriecit. Quandoquidè, ut cætera taceam, cerebrũ uitalis spiritus, & sanguinis feruidi, ac impetu per corpus ruentis, quemadmodum cor, non est principium:

Non prolixam de arteriæ magnæ ortu esse dissertationem.

arteriaq. nullibi, quàm ubi è corde pronascitur, amplior occurrit. Dein hæc quoq. illorum dogma improbant, qui arterias ab extremis summisq. corporis partibus non secus passim oriri arbitratur, quàm si quis ab extremis arborum uirgulis illarũ initium recēset. Cæterum etiam philosophiæ & medicinæ principes, cor arteriarũ fontem statuerint, nihilominus tamen de cordis sinu, à quo grandis arteria pronasceretur, nõnihil inter se dissentiunt: quum illi quidem ex cordis medio sinu, hi autem ex sinistro eam oriri contendunt. Quia uero eiusmodi controuersia, de cordis uentriculis sinibus uè potius, quàm de arteriæ exortu, accidit, quumq. duos tantum cordis esse sinus, uerè censeamus,

Arterias neq. à cerebro, neq. extremis corporis partibus nasci.

ex elatiori sede finistri sinus, propter basis cordis constrictum, magnam arteriam originem ducere attestabimur. quæ etiam sede (post dextram nimirum membram,

Arteria ortus sedes.

T 3 branam,

a Tota figura hinc caput præposita.

b A. & fi. uo lib. 6. A.

c Patet in fig. lib. 6. quam conpites eam 7 figura.

d A. & fi. lib. 6. H. 6. fig. O.

e 7 fig. lib. 6. L. ponitur post E.

f Arteria A. quonq. insignitur.

branam, arteriæ uenalis orificio præfectam) Aristoteles tertium cordis sinum uentriculum<sup>1</sup> uereposuit, instar peculiaris ac à reliqua sinistri sinus amplitudine discretæ cavitatis. Neutiquam enim Galeno in libro de Venarum arteriarumq; dissectione assentiri queo, quum tertium cordis sinum, cui Aristoteles arteriarum originem tribuit, ad dextrum cordis refert uentriculum, eiusq; non autem uti ego iam sinistri, portionem esse affirmat. Magna igitur arteria (quam Aristoteles, eo quod neruofam ipsius partem uel in mortuis conspici posse diceret, instar uaginæ fortassis Macedonibus *ἄορῆς* nuncupatæ, *ἄορῆς* appellauit) in hoc ortu<sup>2</sup> orbicularis est, hicq; ipsius amplissima sedes & durior & cartilaginofior consistit. Ipsa autem arteria simulatq; enascitur,<sup>3</sup> duos graciles promit furculos, qui coronæ modo, cordis basim unā cum coronali uena amplectentes, cordi secundum ipsius longitudinē<sup>4</sup> ramulos transfundunt: quorum plures amplioresq; inibi se offerunt, ubi cordis substantia crassior uisitur. est autem id potissimum in ea cordis sede, ubi sinistrum ipsius sinum cōtinet, & quā septum utrifq; sinibus commune porrigitur. Coronalium arteriarum ortus post membranulas consistit, quas resumptionem spiritus sanguinisq; ex ipsa arteria in sinistrum cordis sinum prohibere credimus. Verū et si utrarumq; coronalium arteriarum par quodāmodo sit amplitudo, ea tamen amplior lōgiorq; cernitur, quæ ex dextro magnæ arteriæ orificij latere originem ducit. una namq; hinc à tergo dextræ membranæ pronascitur, altera autem à posteriori arteriæ orificij sede principium sibi uendicat, à tergo uidelicet posterioris membranæ, à sinistræ interim, ut sic dicam, membranæ tergo, aut sinistra orificij arteriæ sede, nulla pronascente coronali arteria. Postquam uerò magna arteria coronales deprompsit, à cordis basis centro sursum quodāmodo sub uenæ arterialis caudice cōscendit: ac cordis inuolucrum perforans, bipartitū scinditur, ac<sup>5</sup> unam ipsius partem, quæ grandior est, deorsum ad quintam thoracis uertebra, & deinde per reliquā dorli sedem detorquet, in omnes quæ cordi subsunt regiones, ramos exhibiturā. At minor pars, sedibus supra cor repositis distribuēda, sursum cōtendit: ac statim in progressu asperæ arteriæ<sup>6</sup> innitens, ac uenæ cauæ inter membranas thoracis interfepientes substrata, ex sinistro ipsius latere<sup>7</sup> ramum distribuit, obliquē sursum ad primā sinistri lateris costam exporrectū. qui quidem, quā pulmōni accūbit, atq; sinistræ thoracem interfepiēti membranæ alligatur, nullas deriuat propagines: uerū simulatq; primam thoracis attigit costam, ab humiliori ipsius sede<sup>8</sup> propaginē deorsum diffundit, quæ costarum radicibus attensa, in tria quatuor superiorum costarum sinistri lateris interualla singulas soboles spargit: à quibus rursus furculi in dorsalem medullam, & musculos thoraci uertebriisq; hic instratos excurrunt. Ceterū ab elatiori sede<sup>9</sup> eius obliquē ad primam costam cōscenden tis rami, alia enascitur propago, nuper cōmemorata multo amplior, quæ ad sinistrum septimæ cervicis uertebrae latus repens, in huius lateris transuersi processus foramen se inserit: ac deinde per transuersorum reliquarum uertebRARUM processuum<sup>10</sup> foramina conscendens, perinde atq; hac<sup>11</sup> excurrrens uena digeritur. Nam in progressu dorsali medullæ furculos communicat, ea subingredientes foramina, quæ neruis emittendis rerum Opifex exculpsit. Deinde & musculus cervicem hic occupātibus, ab illa propagine ramuli quoq; sparguntur. Quod uerò eius reliquum est, simul cum comite uena per<sup>12</sup> foramē in posteriori sede sinistri capituli occipitis ovis insculptū, caluariam subit, atq; in<sup>13</sup> sinistrum duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Præter hanc propaginem uertebriæ exporrectam, arteria primam adiens costam, aliam ab anteriori ipsius sede pullulat,

Coronales arteria.

Caudicis arteria bipartita.

Ascendens pars series, ac primam arteriæ ad sinistri lateris primam costam obliquē tendens.

f. Aut. 11. fig. lib. 6. S. S.

g. B. B. 10. fig. lib. 6. E. E. post. B. C.

h. fig. lib. 6. E. 4. D.

i. 10. fig. lib. 6. D.

k. fig. lib. 6. O. sub. 1. l. 4. fig. lib. 6. H. per A. m. i.

n. fig. lib. 6. R. post. Y. aut. spec. da. sedulo. ulima fig. prescens libri. o. D. p. E.

q. D. r. E.

s. 2. fig. cap. 15. lib. 1. T. 7. fig. x. 8. fig. 4. i. fig. 6. cap. N.

u. 2. fig. cap. 12. lib. 1. f. x. 7. fig. lib. 7. Q. Q. 9. fig. T. T. y. D. z. G. 2. fig. lib. 6. E.



pullulat, quæ pectoris osis summum accedens, ac sinistrae thoracem intersepiens membranæ adhærens, declivius perfertur secundum pectoris osis sinistrum latus, quâ ipsi costarum coarctantur cartilagines. Hæc propago in eisdem omnino ramos digeritur, in quos uenam hæc repentem dispensari retulimus, præterquam quod nullæ soboles à præsentī propagine cutē accedant: nisi forsitan obscurissimæ, & mihi hætenus parum repertæ, in mamillæ<sup>b</sup> corpus pertingant. Quâ itaq; hæc arteriæ propago pectoris osi exporrigitur, uerarum costarum cartilaginum interuallis ramos offert, à quibus alij ramuli in musculos assurgunt, cartilaginibus incumbentes. Deinde & ab hac propagine in sui lateris membranam, quæ thoracis cauitatem intersepit, & in glandium in iugulo repositum, surculi mittuntur. Quod autem ipsius<sup>d</sup> reliquum est, secundum sinistrum mucronatæ cartilaginis latus, thoracis cauitatem egreditur: & recto hic abdominis musculo subnatum, ad umbilici quodammodo regionem concedit, in progressu utrinq; ad superiores abdominis partes ramulos offerens, & iuxta umbilicum in plures dissecctum soboles, alteriusq; arteriæ terminos respiciens, quam huc ab imo sursum contendere docebimus. Vbi<sup>f</sup> arteria obliquæ ad primam protensa costam, hætenus cômemoratas edidit propagines, sinistram aditura axillâ, & musculum perforatura dorsi motorum secundi parvis sinistrum, ab ipsius elatiori parte, priusquam penitus è thorace labitur, notatu etiam dignæ magnitudinis<sup>h</sup> ramum deriuat, qui in posteriores ceruicem occupantes musculos ad occipitium usque discinditur, nullibi interim cutem subiens. At quem primùm illa arteria, thoracis cauitatem & primam costam euicit, iamq; uicino<sup>i</sup> axillæ redditur, ex posteriori ipsius sede<sup>i</sup> ramum utcunque insignem spargit in cauam scapulæ regionem, & eius sedis musculos absumendum. Post hunc, ex superiori ipsius regione<sup>k</sup> aliam, sed non adeò crassam, depromit sobolem, quæ ad humeri cum scapula articulum, iuxta summum humerum & scapulæ gibbum, in ramulos digeritur: quorū unus cum<sup>l</sup> humerali uena, ubi adhuc in alto reconditur, aliquousq; prorepat. Huic soboli<sup>m</sup> alius succedit ramus, nonnihil demissiùs ab axillam petente arteria enatus, ac in musculos anteriori thoracis sedi instratos, numerosa utcunq; propagine digestus. Dehinc<sup>n</sup> ramuli in glandes axillæ cauitatem opplentes, ab hac arteria admodum rari sparguntur. Quinetiam priusquam tota arteria in brachium feratur, propago quædam thoracis lateri exporrigitur, potissimum in<sup>o</sup> musculum excurrrens, cuius beneficio brachium decliue dorso adigitur.<sup>o</sup> Quod præsentis arteriæ iam superest, axillari uena concomitatum, ac in brachium procedens, penitiùs occultatur: & primùm<sup>p</sup> graciles ramos internæ musculorum humerum amplexantiū sedi, & membranis neruos hic continentibus distribuit. Insuper deorsum sensim adhuc prorepens, & cōtinuò<sup>q</sup> interiori axillaris trunco attensa, aliam emittit propaginē, quæ secundum<sup>r</sup> posteriorem humeri sedem, quâ ipsi cubitum extendētes muscoli adnascuntur, oblique prorepat, ad externum humeri tuber cōtendens. Hæc enim propago, unâ cum<sup>s</sup> uena, quam hæc duci retulimus, & dein cum<sup>t</sup> quarto brachiū petente neruo, ad externam cubiti sedem pertingit, & sub musculorū capitibus aliquousq; deducta cessat, quâ hic ab humeri externo tubere principium ducunt: & partim radij, partim autem brachialis, partim uerò digitorum motibus famulatur. Vbi autem sinistri brachij<sup>u</sup> arteria has soboles digessit, inter<sup>v</sup> duos cubitum flectentes musculos recondita, ipsiq; ramulum præbens, ad medium cubiti articuli flexus prorepat, hic utrinq; sobolem ipsi articulo exhibens, & musculi cubitum flectentis posterioris<sup>x</sup> insertioni innitens, hicq; subinde pulsum euidentem edens. Hinc

*Sinistram axillam petens propago iacet.*

Arteria ra-  
mus cuius pul-  
sum ante bra-  
chiale expla-  
ramus.

Naturam ar-  
teriarum reco-  
dere.

Series maioris  
portionis ma-  
gna arteria  
partis, qua su-  
periora corpo-  
ris petit.

Sinistra so-  
poralis.

Dextrum bra-  
chium petens  
arteria.

Dextra so-  
poralis.

arteria inter<sup>e</sup> musculum secundos quatuor digitorum articulos flectentem, & illum qui tertios eorumdem digitorum articulos flectit, mergitur: ac ubi nonnihil per cubiti internam sedem prorepit, bipartitò scissâ<sup>a</sup> unum ramum radio,<sup>b</sup> alterū ulnæ exporrigit. Qui secundum radium fertur, cuiusq; pulsum indies in ægris exploramus, non procul à brachialis radice sobolem deriuat, quæ sub<sup>k</sup> tendinibus pollicem extendentibus, ad manus externam sedem procurrat, in<sup>l</sup> musculos digesta, qui inter primum pollicis os, & postbrachialis os indicem sustinens, collocantur. Quando ramus radio exporrectus, illam emittit sobolem, unâ cum tendinibus digitos flectentibus,<sup>m</sup> transuersum brachialis ligamentum transgreditur, & sub<sup>n</sup> dilatescente in manu tendine, similiter ac pertinens huc<sup>o</sup> uenâ, &<sup>p</sup> neruus quoque illi attensus, in tres ramos discinditur: quorum unus, in duas diremptus propagines, internam pollicis regionem accedit, secundus uerò duplici ramo internam indicis sedem implicat: tertius autem indiuisus, internum latus interioris medij digiti sedis conscendit.<sup>r</sup> Ramus arteriæ, qui ulnæ exporrigitur, similiter per transuersum brachialis ligamentum, manus uolam subit: & duos ramulos minimo digito, & totidem anulari, unum autem medio offert: sed interim nullam sobolē in externam manus sedem dispēsat, quamuis interim<sup>s</sup> unam<sup>t</sup> illis musculis porrigat, qui externum latus postbrachialis ossis occupant, quo minimus digitus suffulcitur. Rami ulnæ exporrecti motum haud manifestò percipimus, nisi homo admodum gracilis ac macilentus, aut magno pulsu præditus fuerit. Quippe Natura, ut omnes propemodum arterias, hunc quoq; ramum in alto retinet, tendinibus magis quàm in qui radio exporrigitur, occultatum: atq; ita nusquam earum portionem Natura in cutem conspicuè emittit, quemadmodum soboles à uenis passim & frequenter perferri, prius commemoratum est. Meritò igitur nullam in externa manus sede aliam à nuper<sup>u</sup> dictâ, quam pollicis ac indicis ascripsimus, reperiens arteriam. Ad hunc sanè modum<sup>x</sup> primus arteriæ magnæ partis superiora petentis ramus diuaticatur, qui ad primam sinistri lateris costam contendit.<sup>y</sup> Maior autem ampliorq; ascendens arteriæ partis portio, asperâ<sup>z</sup> innitens arteriæ, rectâ sursum ad glandium in iugulo repositū properat: id enim arteriæ huic, similiter ac uenæ, lectuli modo adsternitur, ipsiusq; beneficio ramorum scissio iniurijs innoxie ferendis promptior efficitur. Quum uerò in hunc modum arteria sursum tendit, priusquam elatiorē pectoris ossis sedem superat, adhuc in thoracis cauitate, in<sup>b</sup> duos impares ramos finditur.<sup>c</sup> Sinister, qui gracilior est (amplius tamen & ipse) nonnihil obliquè in læuum deflexus, sursum cum<sup>d</sup> interiori iugulari, secundum asperâ arteriæ sinistram latus, per ceruicem exporrigitur, ipsaq; soporalis eius lateris arteria censetur. Dexter<sup>e</sup> ramus, sinistro crassior, similiter sursum tendit: & simulatque primam thoracis costam contigit, ex dextro ipsius latere arteriam pronit, in easdem prorsus soboles discissam, quas à<sup>f</sup> ramo, qui sinistræ axillæ offertur, distribui scripsimus: ad superiorum uidelicet costarum interualla, ad transuersos ceruicis uertebra rum processus, ad pectoris os, ad posteriores in collo locatos musculos: & ut rem in pauca contraham, arteria illa dextrorsum ducta, in eosdem omnino ramos digeritur, in quos sinistri brachij arteriam desinere commemorauimus.

<sup>h</sup> Quod uerò maioris dextriq; rami illius in iugulo diuisionis adhuc superest, crassitie illi congruit<sup>i</sup> ramo, quem secundum asperâ arteriæ sinistram latus prorepere, paulo antè diximus. atq; ut iste illac exporrigitur, ita & illud dextri rami reliquum, secundum asperâ arteriæ dextrum latus sursum conscendit, huius lateris soporalem efformans arteriam, quæ, uti & sinistra, Græcis *ναρῶν* nuncupa-

nuncupatur. Quum autem sinistri lateris arteria (perinde ac dextri etiam) ad fauces usq; pertingit, in duos discinditur ramos: quorum grandior, idemq; interior, fauces subit: ac mox laryngi & linguae soboles deriuans, ad caluariæ basin<sup>m</sup> properat: priusquam uerò in caluariam mergitur, in duas impares diducitur propagines. maior per<sup>o</sup> peculiare foramen, nulla cōcomitante uena, caluariam inibi ingreditur, ubi<sup>o</sup> glandula, cerebri pituitam excipiens, in quodam ossis cuneum referētis<sup>o</sup> sinu ponitur. Hęc propago mox in ipso ingressu utrinque singulas emittit soboles: ac<sup>o</sup> unam per<sup>o</sup> proprium foramen ad narium cavitatem dispenfat, quæ suo extremo inter nasi cartilagines, adeoq; ad nasi usq; extremum ita cum aliquot faciei arteriis deperditur, ut tactu, ipsius quoque motum inibi percipiamus. Altera maioris eius propaginis soboles, in latus sinistrum duræ cerebri membranæ multipliciter discinditur. ipsa autem propago, iam caluariæ cavitatem ingressa, bipartitur: & caluariæ basi suffulta, in anteriora nonnihil tantisper repit, donec denuò colligatur. Subinde uerò hucusq; non diuisa, neq; collecta rursus, sed simplex prorsus fertur. Vt cumq; autem sit, siue simplex huc pertingat, siue prius in duas partes diuisa, hîc se rursus colligat, inibi<sup>o</sup> insignem utcumq; ramum per<sup>o</sup> secundi neruorum cerebri paris<sup>o</sup> foramen, ad oculum & interiorem<sup>o</sup> temporalis muscoli sedem, distribuit. Quod uerò ipsius<sup>o</sup> reliquum est, duram cerebri membranam<sup>o</sup> perforat: ac<sup>o</sup> partim in tenuem cerebri membranam, partim ad sinistrum cerebri uentriculum conscendit, plexum inibi faciens, quem secundinis, potissimum uerò exteriori factus<sup>o</sup> inuolucro tum comparabimus, quando cerebri uasorum seriem secundum ab hoc Capite persequemur, inibi etiam paulo diffusius nunc postremò commemorata explicaturi. Altera propago interioris crassiorisq; rami eius diuisionis, quam soporalis arteria in faucibus molitur, cum<sup>o</sup> coniuge uena in posteriora secundum caluariæ basin fertur, & ramulum<sup>o</sup> musculus ceruicis uertebrae anteriorum sedem occupantibus, iuxta primæ secundæq; uertebrae interuallum offert, ac dein caluariam ingreditur: & commune foramen cum<sup>o</sup> sexto cerebri neruorum pari nata, simul cum uena in<sup>o</sup> sinistrum, seu secundum duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Porro<sup>o</sup> exterior graciliorq; dictæ nunc in faucibus<sup>o</sup> diuisionis ramus, genis seu buccis<sup>o</sup> sobolem offert, penitus latitantem. Insuper in duas propagines sectus, unam sinistro tempori, alteram secundum sinistræ auris posteriorem sedem digerit, pulsum etiam edentes sensibilem. Atque in hunc sanè modum ascendens arteriæ pars in ramos finitur.

## AMPLIORIS DESCENDENTIS QVE MAGNÆ

arteriæ trunci in suos ramos series. Caput XIII.



R V N C V S magnæ arteriæ, deorsum ad thoracis uertebra<sup>s</sup> explicatus, ab inferiori posteriori<sup>o</sup> ue ipsius sede, qua uertebrae incumbit, non autem lateribus, utrinq; propagines in octo inferiora thoracis interualla deriuat: quæ similiter ac<sup>o</sup> uenæ cōiuge carentis rami, secundum interuallorum ductum, ad costarum usq; cartilagines in ueris costis prorepunt, spuriarum uerò costarum interualla excedunt, in abdominis latera magis quàm ipsæ costæ per tinentes. Ab his propaginibus ramuli in dorsalem medullam, per<sup>o</sup> foramina, neruorum



H A C figura portione arteriæ ad tergo sinistri ueni, ut aliquo pacto serui proponere, utriusque hanc ueni costarum interuallum ex posteriori ueni sede digerit.

Ad inferiora uertebrae interualla arteria.

a. i.  
b. h. k.  
c. f. cap. 6  
d. fig. cap. 14 lib. 9.



Ad septum  
transuersum  
arteria.

Arteria ma-  
gnarum, ome-  
ntum, iecur, bi-  
lis uesicula, ven-  
triculum, lie-  
nem, duodeni,  
& coli partem  
accedentes.

neruorum gratia in uertebri sculpta, ac dein ad musculos uertebri thoraci;  
adnatos sparguntur, pari omnino serie, qua uenam coniugis expertem disse-  
nari, superius proditum est. Ipse autem arterie truncus, sinistræ uertebrarum  
corporum sedi quodammodo innitens, deorsum<sup>1</sup> sub septo transuerso, quæ id  
undecimæ thoracis uertebre corpus respicit, extra thoracis cavitatē labitur:  
ac mox utrobique septo transuerso<sup>2</sup> unam offert propaginē, quæ in plures secta  
furculos, in humiliorem septi iuxta uertebbras sedem præcipuè deperditur, exi-  
guas soboles fursum ad septi elatiora, adeoq; ipsum cordis<sup>3</sup> inuolucrum, quæ id  
septo adnascitur, spargens. Post commemoratas propagines, magna arteria, ex  
elatiori sui corporis sede<sup>4</sup> unum promit truncum, soboles in uentriculum, ie-  
cur, bilis uesiculam, lienem, omentum, & duodeni<sup>5</sup> intestinum, & colon quo-  
que, ubi uentriculo id exporrigitur, hunc in modum offerentē. Præsens trun-  
cus simulatq;<sup>6</sup> prodijt, elatiori sede inferioris membranæ omenti suffulcitur:  
ac in duos magnitudine propemodum æquales ramos diremptus, hunc<sup>7</sup> qui  
gracilior paulo est, dextrorsum,<sup>8</sup> illum uero qui modicè amplior uisitur, fini-  
strorsum mittit. Dexter ramus uenæ portæ, in<sup>9</sup> glandoso corpore, quod sub  
uentriculi posteriori sede huic omenti membranæ intertextum cernitur, ad-  
nexus, fursum ad iecoris cauum cõtendit, in medio ductu ex humiliori ipsius  
sede<sup>10</sup> furculum inferiori omenti membranæ, ipsiq; adeo colo intestino hic of-  
ferens. Post hunc, ab elatiori parte<sup>11</sup> sobolem uentriculo exporrigit, quæ in po-  
steriorem ipsius sedem, quæ is dorsum spectat, pauculis ramulis digeritur. Ex  
humiliori rursus sede, dexter arteriæ ramus, ad iecoris cauum tendēs, duas de-  
nuò profert soboles.<sup>12</sup> unam cum uenæ portæ ramo intestino diffundit, quod  
duodenum appellamus, secundum cuius mediam longitudinē, & aliquousq;  
adieiuni intestini initium, ea soboles porrigitur.<sup>13</sup> altera soboles, nuper comme-  
morata paulo amplior, ad dextram fundi uentriculi sedem retorquetur: & su-  
periori omenti membranæ innexa, ex elatiori sede in anteriora & posteriora  
fundi uentriculi, ramulos frequenti serie spargit, perinde ac ab inferiori sua se-  
de alios in omenti superiorem membranam educit.<sup>14</sup> Atq; hæc arterie soboles,  
cum portæ uenæ ramo hæc exporrecto, ad medium fundi uentriculi cessat.  
Quod uerò dextri arterie rami adhuc superest, postquam<sup>15</sup> duos insigniter exi-  
les furculos bilis uesiculæ transnifit, in<sup>16</sup> ramulos aliquot sectum, ad iecoris ca-  
uum terminatur, non admodum altè in iecoris substantiam excurrens. \* Simi-  
liter ramus, quem<sup>17</sup> dextro modicè crassiores esse dicebamus, inferiori quoq;  
omenti membranæ, ipsiusq; glandoso corpori cõmittitur, seq; ramo uenæ por-  
tæ hæc excurrenti sociat, in totidem quot ille soboles digerendus. Mox enim  
præsens arteriæ ramus ab eminentiori sede<sup>18</sup> propaginem uentriculo, qua dor-  
so innititur, offert, quæ primùm<sup>19</sup> sobolem unam utrinq; in mediam uentricu-  
li sedem eius quæ dorso incumbit regionis exporrigit: deinde fursum ascen-  
dens, uenæ portæ<sup>20</sup> modo, superius uentriculi orificium coronæ instar apposi-  
tissimè<sup>21</sup> cingit, ramulos uentriculi corpori, & graciles furculos stomachi ter-  
mino, quo is uentriculo continuatur, distribuens. Inter reliquos autem ramu-  
los,<sup>22</sup> unus secundum uentriculi superiora dextrorsum exporrectus, uentriculi  
humilius adit orificium, furculos quoq; in progressu, anteriori & posteriori se-  
dibus uentriculi depromens.<sup>23</sup> Sinister dein ramus, ad lienem properans, ab hu-  
miliori ipsius sede<sup>24</sup> propaginem in inferiorē omenti membranam diffundit,  
quæ paulo post exortum in duos ramos inuicem ualde diductos discinditur,  
numerofam arteriarum sobolem deorsum in nunc dictam omenti membra-  
nam & colon intestinū propagantes. Hac edita propagine,<sup>25</sup> sinister ille arteriæ  
ramus

e. i.

f. 7. m. f. tab. 2. in a.

g. l.

h. 3. fig. lib. 6. C. D. E. F. G.

i. Spectes. mul cum in tegra deli- neatione si gerat ipsius artia infer- tam m.

h. 3. et 4. fi. lib. 5. h. uenæ cili bu- dius arterie scriben pe- tes, uenæ portæ ra- mis expor- rectam.

l. u.

m. u.

n. 3. 4. fig.

lib. 5. 2. 3. 4.

o. o.

p. p.

q. q.

r. r.

s. 2. fig. lib.

5. R. ad T.

aut. 14. 35. fi.

lib. 5. c. uen-

arum si hec

in quinto li.

bro specta-

re uisum

est, recurri

to ad mar-

ginem por-

tæ descri-

ptionis, ne

hic nimis

in notando

sim.

t. f.

u. t.

x. u.

y. n.

z. x.

a. y.

b. 14. 35. fi.

lib. 5. d.

c. z.

d. u.

e. u.

f. b.

g. u.

ramus sinisterfſum magis ducitur, & uenæ ipſi attenſæ ritu, in duas diffunditur arterias: & hæ rurfus in alias tantisper dirimuntur, donec frequenti ramorum ſerie, lienis cauo ſecundum rectam lineam implantentur. Priuſquam uerò omnes arteriæ in lienem ceſſent, ab humiliore parte eius quæ demifſiore lienis ſedem adit, plerunque ramulus inferiori membranæ omenti offertur. Deinceps ab illa arteria, quæ infimæ lienis arteriæ proxima eſt, priuſquam hæc in lienem deperditur, <sup>k</sup>propago pullulat, quæ ſuperiori membrana omenti ſuffulta, dextrorſum ad uentriculi fundum contorquetur: ſiniſtramq; uentriculi ſedem perreptans, geniculatim ramulos anteriori & poſteriori ſedibus, ac dein ſuperiori membranæ omenti ſoboles ſpargit. Item ab alijs lienem adeuntibus arterijs <sup>l</sup>ramuli enaſcuntur, qui ſiniſtrum uentriculi latus illo proriſus modo adeunt, quo à uenis lienem petentibus propagines eodem pertinere, ſuperius commemoratum eſt. Cæterum à magna arteria, paulo inferius quàm truncus, cuius iam ſeriem abſoluimus, principiū ducit, ab elatiori quoque anteriori ue arteriæ corporis parte, <sup>a</sup>alia promitur arteria, quæ in ſuperiorem meſenterij ſedem in plurimas ſoboles diſſuſa, uenæ portę modo excurrit in ieium & ilium, & coli inteſtini partem, quæ à iecoris cauo ad dextrum renem uſq; pertinet. Poſt hanc, inferius paululum ab utroq; magnæ arteriæ latere, <sup>p</sup>ampla educitur arteria, in ſui lateris renem, quemadmodum & uena, tranſuerſim prorepens. Hæ arteriæ ortu, quum una elatius quàm altera, renem ſitus occaſione, pronalcatur, è directo ſibi non correfpondentes, integræ in renes abſumuntur, uixq; uenarum modo ramulos notatū dignos in <sup>q</sup>pinguem renem tunicam diſſeniant. Inſuper ab arteria ſiniſtrum renem accedente, ſiniſtra <sup>q</sup>ſeminalis arteria non depromitur: ſed frequentiffimè (ut & dextri teſtis arteria) ab arteriæ magnæ quaſi caudice originē ducit. Aliquantulo enim humilius quàm dextræ ſeminalis uenæ <sup>l</sup>initium à caua exurgit, ab anteriori arteriæ magnæ ſede, ſeminaliū arteriarum <sup>u</sup>exortus pendet, quæ ſuis principijs exortibus ue inuicem ſunt conterminę: ac dextra quidem cauæ uenæ corpus tranſcendens, dextræ ſeminali uenæ attenditur, quouſq; pubis os ſuperans, ac ex magna peritonæi cauitate excidēs, ipſi uenæ permisceatur, atq; cum illa anfractus gyroſq; efformet, quorum baſis, humilior ue ſedes, ſuperiori teſtis regioni implantatur, ac teſtis ſubſtantiæ & hanc proximè inuoluenti tunicæ ramos præbet. Ad hunc quoq; modum ſiniſtra ſeminalis arteria ſiniſtræ congre ditur uenæ, & in mulieribus quoq; arteriarum ſeries earundeni uenarū diſtributioni penitus congruit: ut ſcilicet <sup>a</sup>media arteriarum pars teſtes adeat, ſeminaliaq; uafa conſtituat; altera autem fundum uteri implicet. Enarratis hæc <sup>a</sup>Ad humiliorum meſenterij ſedem arteria, ætenus propaginibus <sup>e</sup>alia ſuccedit, inferius quàm ſeminales arteriæ, ab anteriori etiam magnæ arteriæ ſede principium ducens, & in humiliorem meſenterij ſedem diſtributa, ac in colum inteſtinū, quā à liene ad rectum uſq; inteſtinum prorepit, ac dein in ipſum quoq; rectum in primis digeſta. A poſteriori autem ſeu inferiori magnæ arteriæ ſede, qua hæc uertebriſ committitur, geniculatim <sup>d</sup>rami utrinq; ad ſingulas lumborum uertebraſ promuntur, qui deinceps in medullam & muſculos uertebriſ hic adnatos excurrunt. Atq; huiuſmodi rami inuicem ferè amplitudinis ductuſq; ſpecie conueniunt, ſi modò <sup>e</sup>unicum utrobq; ramum exceperis, qui quum cæteris inſignior multoq; craſſior ſit, ac iuxta ſacri oſis ſummū præcipue prodeat, non ſolum muſculos uertebriſ attenſos accedit, uerum tranſuerſim per peritonæū abdominisq; muſculos ad latera uſq; abdominis exporrigitur. Hactenus magna arteria in lumborū regione ſiniſtro uenę cauę lateri ſuccubuit: quū uerò ſacri oſis principium

*Præcipua meſenterij accedens arteria.*

*Renum arteria.*

*Seminales arteria.*

*Ad humiliorum meſenterij ſedem arteria.*

*Ad lumborum uertebraſ & carnes abdominisq; latera.*

*ſoſtendit hæc 20, 21, 22, 23, 24 fig. lib. 5.*

*Arteria magna supra sacrum os diuisa, arterieq; super cauum ascensu.*

*Truncus diuisus supra os sacrum in duas series.*

*Umbilici arteria.*

*Arteria pubis ossis perueniens.*

principium attingit, uenæ superflernitur, in<sup>o</sup> duos grandes truncos instar Y ad hunc modū  $\lambda$  in uersu bipartita. Fit uerò situs huius permutatio propter arterie dignitatē: quum enim hæc dignior nobiliorq; cēleatur, nō immeritò ipsam magis quàm uenam recondi, occultari, & in alto corporis ferri, ac denum iniurijs ferendis pertinacem effici oportuit. Ne uerò hic ab excarni ovis sacri initio ea in dorsi motibus promptè lædatur, subditam prius arteriam inibi uena superiorem esse, illamq; hanc conscendere, persuasum est omnibus: ut scilicet uena instar subftrniculi cuiusdam arteriæ inibi subderetur. unde etiam, priusquam uenæ cum arterijs in crus delabuntur, quum iam sacrum os uasa superarunt, uenæ arterijs superiores uehuntur: arterieq; quoniam digniores sunt, sub uenis reconduntur. Cæterum rami, qui à magnæ arteriæ supra sacri ovis initium diuisione prodeunt, uenarum ramis exactissimè correspondēt, si<sup>o</sup> exiguos fortè furculos secluseris, qui ab humiliori arteriæ sede, quā hæc primum bipartitò scinditur, deorsum ducti, ac ossē sacro suffulti, ipsius<sup>o</sup> foramina subeunt, hæc dorsalem medullam posterioremq; sacri ovis sedem petentes. Sinister itaque, quemadmodum & dexter, huius supra os sacrum factæ diuisionis truncus, non procul à diuisione in duos grandes partitur ramos, quorum<sup>o</sup> interior<sup>o</sup> exteriore gracilior est: ac ilico duas à se diffundit propagines, quarum<sup>o</sup> unam rursus interiorem, alteram uerò exteriore, doctrinæ studio non ineptè appellaueris. Exterior simul cum<sup>o</sup> uena inter sacrum os & coxendicis os, quā hæc inuicem dehiscunt, in exteriora transuersim exporrigitur, & frequenti ut cunq; sobole musculosilum os amplexantes, ipsumq; adeò coxendicis articulum implicat. Interior autem propago, soboles in uiris quidem uesicæ fundit, & ceruici ipsius, seu peni, & paucas admodum etiam podici offert: in mulieribus autem (quibus hæc<sup>o</sup> propago grandior obtigit) in humiliorem fundi uteri regionē numerosa serie distribuitur, muliebremq; uesicam & uteri ceruicem ramulis quibuscūq; intertextit. Quod interioris rami, qui binas nunc explicatas eduxit propagines, reliquum est, deorsum repit, sui lateris arteriam, quæ per umbilicū fertur, admittens. Arteriæ etenim ab umbilico secundum fundi uesicæ latera deorsum ductæ, ac in natis hominibus coriaceæ inanesq; redditæ, sui lateris arteriæ portioni<sup>o</sup> continuantur, quam modò ab interiori illo ramo reliquam esse, deorsumq; ferri dicebam. Hæc namq; non minus quàm uena ipsi attensa, pubis ovis<sup>o</sup> foramen petit: priusquam uerò id transiit, propaginem assumit ab externo trunci magnæ supra os sacrum factæ diuisionis ramo, ubi is iam in crus est prolapsurus. Præsens itaque interioris rami portio, ea propagine adaucta, per pubis ovis foramen ducitur, & in musculos foramen id occupātes, & illos qui à pubis ossē principium sumunt, dispergitur, perinde ac<sup>o</sup> uena, pubis ovis foramen transiens. Ac quemadmodū hæc paulo infra longitudinis femoris mediū, extremo quodam ipsius furculo, alteri uenæ in<sup>o</sup> quintum femur mouentium musculum dispēsata<sup>o</sup> cōmiscetur: ita sanè & arteria per pubis ovis foramen procidēs, suo fine cum alia<sup>o</sup> coit<sup>o</sup> arteria, quam illi musculo à maxima crus petēte arteria distribui, non ita multo post subiiciam. Exterior namq; ramus sinistri trunci eius<sup>o</sup> diuisionis, quam supra os sacrum fieri dicebam, per inguina in læuum crus<sup>o</sup> descēdit: antequam uerò peritonæum permeat, propaginem sursum ipsi exporrigit, quæ ad rectum abdominis sui lateris musculum accedens, furculos in cōterminas sedes transuersim utrinq; digerit: & sursum ad umbilici usq; regionem properans, in ramulos tandem discinditur, qui<sup>o</sup> arteriæ eodē à pectoris regionibus tendentis soboles spectant. Quum uerò grandis arteria in crus descendens, peritonæum superauit, ramulum



1 v. ramulum ad pubis ofsium commissuram mittit, qui exiguus est, neq; ut eò ex-  
 m fig. cap. currens<sup>m</sup> uena, in multas soboles dispergitur: quarum ne una quidem cutem  
 10 10 subit, nisi fortè exilis quepiam in penis<sup>m</sup> inuolucrū diffundatur. In crure autem  
 0 0 arteria<sup>p</sup> ramum in anteriores femoris os amplexantes musculos digerit, qui  
 0 0 etiam si in frequētes scindatur soboles, nullam tamen cuti exporrigit. Deinde  
 0 0 à grandi arteria<sup>a</sup> alius educitur ramus, in quintum femur mouentium muscu-  
 0 0 lum, & eos qui internā femoris sedem occupant musculos, ad genu usq; quo-  
 0 0 dammodo in propagines sparsus, & quadam sua sobole illius<sup>r</sup> arteriæ extremo  
 0 0 commixtus, unitusq; , quam per pubis ofsis foramē in crus pertingere scripsi-  
 0 0 mus. Cæterum ipsa grandis arteria sensim deorsum prorepens, secundū fem-  
 0 0 oris os ita cōuoluitur, ut ab anteriori inguinum sede<sup>r</sup> inter duo inferiora fe-  
 0 0 moris capita in poplite feratur, nusquā non<sup>a</sup> uena grandiori, quæ crus accedit,  
 0 0 concomitata. In hoc per femoris posteriora descēsu, arteria<sup>x</sup> propaginē educit,  
 0 0 quæ in musculos posteriorē femoris sedem occupantes excurrit, & aliquousq;  
 0 0 cum illis uenarū<sup>r</sup> propaginibus deducitur, quas uenam efformare docui, quæ  
 0 0 per genu flexum, seu posteriorē ipsius sedem, in surā cutem sparsa sobole per-  
 0 0 tingit, arteriæ interim nulla propagine ad cutem emergente. At grandis arte-  
 0 0 ria in ipso poplite, uti diximus, recondita<sup>a</sup>, utrinq; propaginem emittit, in alto  
 0 0 quoq; occultatam, & in genu articuli latus penitiūs digestam, illisq; musculo-  
 0 0 rum capitibus pariter cōmunem, quæ à femore inibi principiū ducunt, ac tres  
 0 0 primos pedem mouentiū musculos efformant. Posteaquā uerò<sup>b</sup> arteria ti-  
 0 0 biam primū subit, ab externo ipsius latere notatu dignę amplitudinis depro-  
 0 0 mit<sup>e</sup> ramum, fibulæ ofsis externo lateri præcipuè attensum, ac sub<sup>a</sup> musculis  
 0 0 pedem mouentiū septimo & octauo reconditū, illorumq; internæ sedi surcu-  
 0 0 los exporrigentem. Hic ramus tantisper deorsum fertur, ac musculi illi adhuc  
 0 0 carnei permanent, & secundū exteriorē malleolum contorqueri reuoluiq;  
 0 0 incipiunt. Dein paulo humilior quā dictus modò ramus initium ducit, ex  
 0 0 posteriori grandioris arteriæ sede, alia educitur<sup>e</sup> propago, per posteriorē<sup>r</sup> quar-  
 0 0 ti pedis motuum aitoris musculi regionē ad eum usq;<sup>b</sup> locum excurrentes, quo  
 0 0 duorum primorū pedem agentium musculorū tendo, illi quarto musculo ua-  
 0 0 lidè connatus cernitur. Ipsa uerò grandis arteria, sese inter quartū eum pedem  
 0 0 mouentium, &<sup>h</sup> secundum &<sup>i</sup> tertium musculos, qui pedis digitorū motibus  
 0 0 præficiuntur, &<sup>k</sup> quintum pedem mouentium submergit: & mox simulatq;  
 0 0 eam tibiæ sedem contingit, qua tibiæ os à fibula primū se iungitur, ramum  
 0 0 educit, qui per<sup>m</sup> membraneum ligamentū tibiæ ofsi fibulam toto intervallo,  
 0 0 quo inuicem hæc ossa dehiscunt, colligante, in anteriorem tibiæ sedem fertur,  
 0 0 musculis inibi repositis occultata, præcipuè autem<sup>n</sup> sexto pedem mouentium,  
 0 0 & alijs duobus: quorum<sup>o</sup> uni quatuor pedis digitos,<sup>p</sup> alteri pollicem extendēti  
 0 0 munus concreditur. Verū hic ramus cum carnea illorum musculorū sede  
 0 0 haudquaquam cessat: quinimò cum eorundem tendinibus per<sup>a</sup> transuersum  
 0 0 ligamentum in anteriori tibiæ sede obuium, ad pedis superiora<sup>r</sup> cōtendit, obla-  
 0 0 tus<sup>s</sup> musculis, quorum beneficio digiti in externum latus abducūt. Atq; hic  
 0 0 ramus inibi non adeò submergitur, reconditur<sup>r</sup> ue, quin plerunq; hac in parte  
 0 0 ipsius motum pulsūq; tactu deprehendamus. Quod uerò<sup>r</sup> crassioris arteriæ  
 0 0 adhuc reliquum est, ac inter secundum & tertium pedis digitos mouentium  
 0 0 musculorum, & quintum eorum qui pedis motibus præfunt, reponitur, rectā  
 0 0 deorsum incedit, ac cum illorum musculorū tendinibus inter calcem & mal-  
 0 0 leolum interiorem, pedis humiliora subit, in progressū<sup>s</sup> ramulum internæ  
 0 0 pedis

Arteria in se-  
more series.


Arteria per ti-  
biā & pedem  
distribuit.

pedis regioni offerens, qui\* musculo pollicem in internum latus ducenti com-  
 municatus, ad ossis scapham referentis usq; sedem, superiora pedis perrepat.  
 Ipsum autem arteriæ<sup>x 6 musc.</sup> reliquum, inter<sup>tab. 28.</sup> primum digitos mouentium muscu-  
 lum, &<sup>y a.</sup> tendines secundi & tertij musculorum digitos quoque mouentium,  
 iam cōsistens, ita in furculos digestum cessat, ut bini ferè ramuli ad inferiorem  
 cuiusq; digiti sedem contendant. Huiusmodi itaq; magnæ arteriæ per crus se-  
 rieri diligenti refectione didicimus. quandoquidè uerò Galeni scriptis hanc  
 omni ex parte neutiquam respondere, facile expendes, optauerim sedulò ob-  
 seruari, quàm Galenus in tertio de Administrandis sectionibus, & in libro de  
 Venarum arteriarumq; sectione sibi respondeat: ut dein partium anatome si-  
 mul quoq; adhibita, tandem constet, quoties ex merito nostra humani corpo-  
 ris fabricæ historia, ijs quæ Galenus posteris reliquit, parum conueniat: quod  
 insuper. manifestius cerebri uasorum indicabit series, quam modò opportu-  
 nè aggrediemur.

VENARVM ARTERIARVMQVE CE-  
 rebri series. Caput XIII.

DECIMIQUARTI CAPITIS

FIGVRA.



DECIMIQUARTI CAPITIS FIGVRAE,  
 eiusdemq; characterum Index.

PRESENTI figura, uasorum cerebri nuda proponitur delineatio, à uenis arterijsq; incepta, prius-  
 quàm ille penitus in caluariam merguntur. Ne autem ramorum frequentia, pleraq; obscurarentur, unus dum-  
 taxat lateris uasorum seriem (nisi quandoq; res secus exigat) delineatam conficiis.

A Interior

A Interior iugularis, quā iam caluariae proxima est.

B Sopor alis arteria.

D Prima caluariam petens uena.

E Quarta uena.

K Prima caluariam ingrediens arteria.

M Dexter seu primus durae membranae sinus.

N Sinister durae membranae sinus, quem secundum nuncupamus.

O Primi & secundi sinuum congressus.

P, P Tertius durae membranae sinus.

Q Tertij sinus finis, osseo commissus septo, quo os factus organorum sedes interdiuiduntur.

R Quartus durae membranae sinus.

S, S Ductus à dextro sinu in durae tenuissimae membranae sedes ipsi proximae excurrentes.

T, T Ductus ex tertij sinu latere in tenuem membranam diffusi, & ac si abtruncati essent, hic depicti.

U, U Ramuli ab infimo tertij sinus angulo in eum dura membranae processum deriuati, qui dextram cerebri partem à sinistra seungit.

X, X Tertij sinus furculi, cum illis commissi uasculis, quae per uerticem caluariam subingrediuntur.

Y, Y Exique propagines, ab elatissimo quarti sinus angulo in durae membranae processum aliquousq; excurrentes, qui dextram cerebri partem à sinistra hic supra cerebellum interdiuidit.

a, a Ductus à dextro quarti sinus angulo deprompti, & in duram cerebri membranam, quā cerebello hic incumbit, ac dein in tenuem & cerebelli & cerebri membranam diffusi.

b Ductus à quarto pendens sinu, ac secundum totam longitudinem, humiliorēq; sedem eius durae membranae processus excurrentes, qui dextram cerebri partem à sinistra dirimit.

c, c A quarto sinu propagati ductus, qui uenarum prorsus modo, tenui membrana suffulti, secundum cerebri longitudinem, supra callosum cerebri corpus ducuntur. Ac unus quidem d insignitus, parti dextrae cerebri attenditur: alter uero e notatus, sinistrae parti exporrigitur.

f Ductus à quarti sinu humiliori sede in tenuem cerebelli membranam propagatus.

g Ductus f notati propago, per cerebri anfractus & yrosq; in humillimam dextri cerebri uentriculi sedem pertinens, ac cum hac ascendente arteria, quam y notabimus, coiens.

h Ductus f notati propago reuersum repens, uarieq; in tenuem cerebelli membranam dissectus.

i Praecipua quarti sinu propago, sub cerebri corpore, fornicis camerae uero modo extructo, ad interiorē usq; sedem tertij uentriculi cerebri procurrens, & uarie in ramos dissecta, rursusq; instar reticuli cuiusdam in se collecti, & carnea quadam substantia undiq; intertexta, quae illi respondet, quam inter uterum & externum satus inuolucrum haberi cernimus.

k Propaginis i notatae in duas partes dissectio: in qua l partem indicat dextro exporrectam cerebri uentriculo, l, m. m uero eam quae sinistram adit, hicq; abtruncata cernitur.

n Tertia caluariam ingredientis uenae furculus, ad audius organum exporrectus.

o, o, o Series sinus durae membranae, in quem i: uia uena exhauritur, cui perpetuo sinus attenditur, in quem tertiae arteriae ramus r notandus absinitur.

p, p Propagines eorum quos iam ultimo commemorauimus sinuum, in tenuem cerebri membranam sparsae.

q Diuisio tertiae & maximae caluariam subeuntis arteriae, quam mox ab ingressu molitur.

r Ramulus tertiae arteriae, qui in dura membranae sinum absinitur, secundum cerebri latera excurrentem, & o, o, o notatum.

s Ramulus tertiae arteriae, per proprium foramen in narium cavitatem digestus, & quodam furculo t insignito, t. nasi extremum accedens.

u, u Duo grandes rami eius diuisionis, cui q inferbitur.

x Propago ex grandium illorum ramorum, quos u & u notauimus, coitu, per secundi parui nervorum cerebri foramen, ad oculum praecipue excidens.

α Propago crassior dicti modo congressus, quae duram cerebri membranam perforat, ac mox in duos ramos bipartitur, β & γ insignandos.

β Ramus propaginis α notatae, in tenuem cerebri membranam frequenti sobole hic dispersus.

γ Ramus propaginis α insignita, dextrum accedens cerebri uentriculum, & plexum efformans, qui secundinis d. confertur, & hic d. notatur.

Præter hanc figuram, cuius modo characterum indicem absoluiimus, huc ferè spectant omnes septimi libri figurae: & ea quosq; quam huius libri cacti adhibemus.





alicubi uerò trianguli formæ cavitās hæc accedit, cuius tres simul costę æqualiter introrsum obliquantur. Sinus isti non solum uenarum usum, sed & arteriarum quoq; præstant. quanquam id à Galeno, cæterisq; dissectionum professöribus, haud animaduersum fuerit, quum illi hos sinus uenarum munere tantum fungi arbitrentur: neq; sinus eos arteriarum ritu pulsare, è uiuorum sectione, aut uulnerorum inspectione obseruauerint. Quinetiam ipsis non uidetur perspectum fuisse, in istos sinus & uenas, & arterias pariter exhauriri, suamq; quam amplexantur & continent, materiam infundere: uenas quidem sanguinem crassiores, arterias uerò uitalem spiritum, unā cum sanguine, impetu per corpus diffuso. Præter istos sinus, in duræ membranę processibus excavatos, ipsa alios quamplurimos obtinet: ex quibus (quemadmodum & nuper commemoratis)<sup>a</sup> frequentes ductus in tenuem cerebri membranā, ac cum hac quoq; in cerebri uentriculos excurrūt, qui omnes exactè teretes uenarum modo cavitates referunt. non tamen uniuersi parem animanti usum præbent: quum nonnulli uenarum pariter arteriarumq; munere fungantur, alij uenarum duntaxat, alij solum arteriarum. Atq; hæc duo, cerebri membranæ inter reliquas corporis partes peculiaria, rara & priuata sortiuntur: eandē nimirum ipsarum cavitatem, ductum uel, arteriæ ac uenæ pariter munus obire, & interrim in membranarum corporibus paratos ductus, seu sinus, neq; uenam, neq; arteriam propriè censerī possē: uerū proprias quasdam, talesq; omnino fistulas sinus uel existere, quales quis formaret, quando stylos crassiori cuiuspiam corio secundum ipsius crassitiem in longum, quasi uenarum sinus extructurus, impingeret. Horum itaq; sinuum, aut fistularū, aut cavitatum, aut uenarum, aut arteriarū, si mauis, seriem enarraturo, uariè nunc hac, nunc illa uoce, prout negotio accommodum uidebitur, uti, quid prohibebit? In dextro igitur latere (quod & de sinistro, quum utrorūq; eadem sit ratio, subaudies) caluariam sex ingredi diximus uenas, & tres arterias. ac prima uena, simul cum prima arteria, deinde secunda uena, & secunda arteria, omnes simul in dextri duræ cerebri membranæ sinus initium confluunt, qui ad earū quas modò retulimus uenarum & arteriarū in caluariam ingressum<sup>o</sup> incipit, ad latus nimirum maximi in occipitis ossē foraminis, quo dorsali medullę uia præbetur: deinde & ad eminentiorem foraminis sedem, quod sexti paris neruorum cerebri gratia insculpitur. Sinus hic occipitis ossi semper attensus, secundum cerebelli circumscriptionem ex prioribus uersus exteriora obliquè retrorsum sursumq; conscendit, & ilico in progressu quartā assumit uenam, quam ab externa iugulari proprio foramine caluariam ingredi recensuimus. Præfens sinus hinc rursus retrorsum modicèq; sursum instar quartæ circuli partis protenditur, quousq; elatissimam cerebelli partem occipitis ossi contiguam attingat: ibidem enim dextri lateris sinus cum sinistro coit, atq; ex ambobus una communis cavitās efficitur. Iste amborum sinuum congressus, occipitis ossi, quemadmodum & sinus ipsi, contiguus est, non quidem ad amussim sub elatissima parte eius futuræ, quam  $\Lambda$  assimilamus, uerum multo humiliori, & propemodum in media regione consistit, quæ inter postremā foraminis, quo dorsalis medulla ducitur, sedem, & dictæ modò futuræ uerticem habetur. Ex mutuo hoc amborum sinuum congressu, alij duo exoriuntur sinus, longitudine & cavitatis forma inuicem uariantes: quippe unus longior est, & caluariæ semper, quemadmodum prædicti duo, contiguus, secundum capitis longitudinem antrorsum procedit. Ex eminentissima enim sede congressus dextri sinus & sinistri principium ducēs, sub elatissima futurę  $\Lambda$  imitatis parte, & sub ea quæ secundum

*Duræ cerebri membranę sinuum usus. Lib. 5. de Admitt. scilicet.*

*Cuiusmodi cerebri membranarum sint sinui.*

*Uena & arteria in primum duræ membranæ sinui exhausa, ipsiusq; sinui ierit.*

*Primi & secundi sinui congressus.*

*Tertius sinus.*

capitis longitudinem fertur, & deinde sub frōtis ofsis medio, sinus ille protenditur usq; ad\* osseum septum, ab octauo capitis ossē, in caluariæ cavitatem deducto. Quemadmodum uerò dexter & sinister sinus (nisi maius illum primum, hunc uerò secundum nuncupare) inter cerebrum & cerebellum, quæ hæc ofsi proxima sunt, in dura cerebri membrana feruntur: ita quoq; tertius finus, quem priorem ex mutuo duorum primorū congressu enatum recensui, in ea duræ membranæ cōsistit<sup>b</sup> sede, quæ in ipsius<sup>c</sup> processu, dextram cerebri partem à sinistra dirimentē, secundum totius capitis longitudinē est eminentissima, & caluariæ semper cōtermina.<sup>d</sup> Alter uerò sinus, ex cōmuni duorum primorum sinuum congressu pronatus, & qui opportunē quartus enumerabitur, dissectionum proflores, quantum coniectōr, latuit. Porrhigitur autem ab anteriori sede communis primi secundiq; sinuum cōgressus, recto tramite uersus priora cerebri, nusquam deorsum neq; sursum uergens. Consistit enim in dura cerebri membrana, ubi secundum cerebelli longitudinem id & cerebrum, ad eas usq; cerebri<sup>e</sup> sedes intercedit, quas testium & cluniū imagini asmilamus. Quartus itaq; sinus suo ductu cerebelli longitudinē, & duræ cerebri membranæ inter cerebellū & cerebrum processum haud excedit, dextræ & sinistra cerebri partibus & cerebello æquē cōterminus: ac proinde id sibi priuatum uendicans, quod sit breuissimus, & nusquam caluariæ uicinus. Præterea

QUARTUS SINUS.

Cuiusmodi  
quatuor sinūs  
sunt cavitates.

TRIANGVLVS  
species, cavitati quartū sinuū  
respondens.



TRIANGVLVS,  
cavitati respondens primū, secundū & tertij duræ membranæ sinuum.



priores sinūs, duas costas introsum, tertiā uerò extrorsum obliquatas gerunt. Horum enim sinuum costa, ofsi attēsa, extrorsum curuatur: quandoquidem istorum duræ membranæ sinuum, & reliquorū ipsius uasorū seu ductuum, qui passim per alias membranæ sedes excurrunt, occasione, Natura caluariā exculpsit, sinūs quosdam efformās, secundum semicirculi cauum incisos, qui duræ membranæ sinūs ea parte, qua caluariā spectant, cōuexos gibbosq; excipiunt & admittunt: ac deniq; in causa sunt, quo minus membranæ sinūs à caluaria comprimantur, ipsorum uemotus, qui artieriarum modo fit, impediatur. Verum reliquæ duæ trium primorū sinuum costæ introsum curuantur: in primo quidem sinu & secundo, à cerebello & cerebro: in tertio autem sinu, à dextra & sinistra cerebri partibus. Hæc enim, perinde ac cerebellū, quæ ipsi sinūs accumbunt, obtusos & ueluti in quartam circuli partem extuberātes angulos efficiunt. Quas uerò propagines, quatuor nunc commemorati sinūs, deinceps in duram cerebri membranā & tenuem, ac demum ad cerebri uentriculos diffundant, subsequens modò sermo enarrabit. A' primo itaq; & secundo duræ membranæ sinibus, in' uniuersam eius membranæ partē, qua cerebellum operitur, uarij furculi deriuantur, inстар uenarum sinuati & sparsi. Ab his deinde furculis, & ipsis, dextro inquam sinistroq; sinibus, extra duram cerebri membranā, ductus aliquot, uenarum corpore donati, propagantur, in tenuem, quæ cerebellum ambit, membranā, & eam quæ cerebrum, quæ id cerebello innititur, implicat, excurrentes. Porro à tertio sinu plurimi, ijdemq; ampli ductus utrinq; ex lateribus pronascūtur, non quidem ulterius in duram

Propagines à  
1 & 2 sinibus  
enata.

Propagines à  
tertio.

4 2 fig. cap.  
22 lib. 1. 1.

b 1 fig. lib.  
7 C, C, C.  
c 3 fig. lib.  
7 D, D.

d R. 7 fig.  
lib. 7 T  
ab R.

e 7 fig. lib.  
7 O, O, O.  
f ciuilem  
fig. M, N.

g 4 fig. lib.  
7 medium  
R. 9 fig. C.  
h 3 fig. lib.  
7 A, A, A  
B, B.

i 3 fig. cap.  
22 lib. 1. 1.  
h 4 fig.  
h 1, 1, 1.  
h 1 fig. lib.  
7 C, C, C.

l 7 fig. lib.  
7 O, O, O.  
8 fig. V, V.  
9 fig. P.  
Q, R.  
m S, S.  
n 8 fig. lib.  
7 X, X.  
o T, T, T.  
fig. 2 lib. 7.  
C, C, D, D.  
fig. 3 E, E.  
unde etiam  
tenius mem  
brana et  
cerebri an  
fractura nat  
ura petet.

cerebri



cerebri membranam, uerum in tenuem, quā hęc dextram sinistramq; cerebri partes secundum elatiorem cerebri sedem amplexatur & cōtinet. Præsentes ductus, quemadmodum & alij, paulo antè commemorati, simulatq; tenuem membranam contingunt, numerosa admodum serie, uarijsq; anfractibus per eam excurrunt, dispergunturq;. Quā uerò id fiat ratione, quisq; ductuum sit numerus (quia multiplex is uisitur, raroq; eandē retinet seriem) hic non enitar prolixius commemorare, quum id etiam ex cerebri anfractuuum, instar<sup>p</sup> tenuium intestinorum inuolutorum, forma numeroq; pendeat. Præter hos ductus, à tertio sinu in tenuem membranā dispersos,<sup>q</sup> graciles aliquot furculi ex demissiore cavitatis tertij sinus sede, in eum duræ membranæ processum decliues propagātur, qui dextram cerebri partem à sinistra interdiuidit. Deinde ex elatissima tertij sinus sede,<sup>r</sup> tenues admodū portiunculæ illis cōmittuntur uenis, quæ ex uerticis cute in caluariā per<sup>s</sup> exigua ipsorum occasione insculpta foramina procidunt. Quartus duræ membranæ sinus frequētes etiam educit propagines, pari quodammodo serie perpetuò diffusas. Quum primum enim hic sinus ad eas cerebri<sup>t</sup> particulas, quas clunibus & testibus cōparamus, pertingit, atq; iam<sup>u</sup> ramulos quosdam exiles ex elatissima ipsius sede in eum quocq; duræ membranæ processum, qui dextrā sedem cerebri à sinistra determinat, ac dein ex lateribus in eam duræ membranæ sedem, quæ cerebellū integit, in progressu obtulit, ex superiori ipsius regione<sup>x</sup> propaginem educit, cavitata uenis simillimam, & quæ in humillimam dicti iam duræ membranæ processus regionem, secundum capitis longitudinē, usq; ad<sup>y</sup> septum sinuū olfactus organorum perfertur, & in itinere<sup>z</sup> furculos ex elatiori sua sede sursum in eundem duræ membranæ processum diffundit. Præter hanc notatu dignam propaginem, quartus sinus ex eadem sede, qua illam deprompsit, utrinque secundum dextram & sinistram cerebri partem, unum edit ductum, uenarū corpori similimum, qui<sup>a</sup> calloso cerebri nobis uocando corpori proximè secundum capitis longitudinem propagatus, tenuiq; membrana suffultus, in progressu tenui membranæ ramulos aliquot cōmunicat: ac dexter quidem ductus dextræ cerebri parti, sinister uerò sinistram exporrigitur. Quemadmodū uerò quartus sinus ad utramq; cerebri partem nuper dictas deprompsit soboles, sic quoq; ab infima ipsius sede, propter suum iuxta cerebri testes terminū,<sup>c</sup> propagines distribuit in tenuem membranā cerebellum amplectentē. Harum propaginum nonnullæ retrorsum tenfæ, superiorē cerebelli sedem perambulāt: nonnullæ uerò per humiles cerebri anfractus, qui iuxta cerebri testes cōsistunt, etiam ad anteriores cerebri uentriculos repunt, plexui quem illic haberi docebimus, cōmiscendæ. Ceterum præter has quartū sinus propagines, is<sup>e</sup> aliam insignem & amplā educit, quæ ex sinus ad cerebri testes extremo, recto tramite antrorsum uersus cerebri uentriculos excurrit,<sup>h</sup> plexum efformatura, quem Græci secundinis fetus cōparantes, *χοροειδῆς* nuncupant. Hęc namq; propago, simulatq; è quarto sinu prodit, aut ubi ipse sinus in hanc propaginem degenerat, illa præter proprium ipsius corpus, à tenui membrana processum quosdam, seu membranulas adipiscitur, quæ ipsi obuolutæ, tutò illius ramos atq; implexus colligant, ac suspensos aptè suffulciunt. Simplex namq; & absq; cōiuge ex quarto sinu enascitur,<sup>i</sup> testium medio supertensa: quod ubi attigit, uelut in multos discinditur furculos, qui unius retis instar in uicem dirimuntur & coeunt. Hęc propago<sup>k</sup> glandulam, cerebri testibus innixam, & nucis pinæ seu turbinis formæ haud absimilem, transcendit, ac sub<sup>l</sup> ea cerebri particula prorepat, quæ caneræ aut testudinis imaginī à ueteribus fuit comparata. Quum uerò propago ad

Propagines à  
quarta

Processus à  
quarto sinu,  
cerebri petens  
uentriculos.

anteriorē usq; communis dextri & sinistri uentriculorum cerebri cavitatis, tertij<sup>m</sup> ue cerebri uentriculi sedem<sup>m</sup> pertingit, bipartitō scinditur, unā partem dextro offerens uentriculo, alteram sinistro. Cæterum quō<sup>m</sup> nam modo partes hæ, retis semper forma quasi contextę, & membranulis ipsis adnatis, ac carnea ueluti substantia quadam contentę, arterijs eodē pertinentibus commisceantur, opportunē subiungam, ubi arterias sermone in illos quoque uentriculos deduxero. At arbitrabitur fortassis quispiam, in hac duræ membranæ sinuum enarratione aliquid à me prætermisum, quod nulla adhuc mentio regionis inciderit, à torculari *κλωπ* Græcis nuncupatæ: quam sanè non præterissem, si modò quæ<sup>m</sup> nam pars ita appellata fuerit, mihi certō constitisset. Apud Galenum namq; ambiguum est, an<sup>o</sup> communem primi secundiq; duræ membranæ sinuum congressum, à quo & tertius & quartus prodeunt, ita primum Græci appellauerint: num uerò quarti duræ membranæ sinus<sup>o</sup> terminum, cerebri testes respicientem, atq; in uentriculos exporrectum. uidetur namq; Galenus modò huic, modò illi parti, torcularis nomen accommodare: uti sanè utramq; torcular dici, nihil obstat. Concursum enim ille in quartum & tertium sinum, sanguinem tanquam uinum è torculari promit: perinde ac terminus quarti sinus, in omnes quas emittit propagines, sanguinem dispensat. adeo, ut per me liceat, quamuis sinuum sedem torcular appellare, ac in illis regionem constituere, in qua Arabes sanguinem extra uenas consistere putarunt, modò sinuum ac cerebri uasorum seriem non perturbes: quorum quia iam primæ, secundæ & quartæ uenarum, & item duarum primarum arteriarum distributionem exequutus sum, modò proximum est, reliquarum uenarum & tertiæ arteriæ seriem subnectere. Tertia igitur uena, quæ minor est internæ iugularis portio, simulatq; ramulum per foramen ipsi & neruulo cuidam quinti paris commune, ad auditus organum transmissit, caluariam ingreditur: ac duram contingens cerebri membranam, in<sup>o</sup> sinum uenæ prorsus modo cauatur & prorepentē cessat, qui nullam arteriæ sobolem in suis ipsius cavitatem admittit, sed passim alium sinum sibi comitem asciscit, in quem tertiæ arteriæ<sup>o</sup> ramum exhauriri mox dicam. Præfens sinus, in quem tertia absumitur uena, uarias soboles in totam duræ membranæ sedē, cerebri basi substratam, diffundit, à quibus denuò<sup>b</sup> ductus aliquot in tenuem cerebri membranam deducuntur. Inter cæteras autem huius sinus propagines, per duram membranam excurrentes, una secundum cerebri latus sursum ad uerticē usq; contendit, uenæ modo in multam sobolem deriuata. Ad hanc quoq; speciem<sup>a</sup> quinta uena per foramen secundi neruorum cerebri paris ingressa, dein & sexta, per maius octauī ofsis capitis foramen, quā illi olfactus<sup>o</sup> organa incumbunt, caluariam petens, in proximam sibi duræ membranæ sedem exhauritur. Harum utrarumq; & tertiæ uenarum sinibus (quia illi caluariæ perpetuū attenduntur) caluaria aptis<sup>o</sup> cavitatibus cedit, quas ipsi elegantissimè insculptos, primo libro recēsumus. Tertia arteria, peculiari transuersoq; foramine in caluariā ingressa, in duos graciles & totidē crassos dirimitur ramos. Vnus gracilium, qui exterior est, tertiæ uenæ mox attenditur, & in duræ membranæ sinum exhauritur, illi undique attensum & commissum, in quem tertiam uenam absumi diximus. Alter gracilium ramus, qui interior humiliorq; uisitur, per<sup>o</sup> propriū & sibi duntaxat exculptum foramē rectā ductus, in narium cavitatem procurrit: atq; in plures dissectus ramulos, unum nasi extremo offert. Verū<sup>m</sup> duo grandes rami in dextro latere (quod, nisi aliud subiunxero, de sinistro quoq; intelligendum est) nonnihil inuicem deducti, & adhuc caluariæ

Quid cerebri  
torcular.

Tertia caluariam  
petens  
uena series.

Quinta ac  
sexta uenarum  
series.

Tertia arteria  
series.

m. h. 6. fig.  
lib. 7. l.  
n. l. 6. fig.  
lib. 7. k.  
o. m. 6. fig.  
lib. 7. l.  
p. 7. obl.  
quæ ueritas  
est feruor. 6.  
7. 8. fig. lib.  
7. E. G.

q. 0. 7. fig.  
lib. 7. R.  
r. ante i. 7.  
fig. lib. 7.  
ante V.

s. F. ult. fig.  
alter ramus  
dini-  
sionis i. in-  
figura. i.  
t. n.  
u. i. fig. cap.  
12. lib. 2. V.  
x. i. fig. cap.  
2. lib. 4. b.  
y. 13. fig. lib.  
7. K.  
z. r.

a. 0. 6. 0. u.  
trig. sinu  
simul con-  
missi no-  
tantur et  
fig. lib. 7.  
D. D.  
b. 1. p. 2. fig.  
lib. 7. G.  
G. G.  
c. 11. fig.  
lib. 7. H.  
d. 11. 11. fig.  
lib. 7. 11. G.  
quod amo-  
do ad F.  
e. 13. fig. lib.  
7. L. L.

f. 3. fig. cap.  
12. lib. 1. T.  
f. 4. fig.  
T. T.  
g. L. ult. fig.  
hic pariter  
16. fig. lib. 7.  
h. r. proce-  
dens cum  
per 0. 0. 0.  
et i. fig. lib.  
7. D. D.  
i. f.

k. 3. fig. cap.  
12. lib. 1. X.  
l. t.  
m. n. n. u.  
ult. fig. 2. r.

uariæ instrati, antrorsum prorepūt, & mox in<sup>n</sup> unum denuò cœeunt, statimq;  
 à congressu in duos impares ramos diuiduntur.<sup>p</sup> Minor quidem<sup>p</sup> commune  
 cum<sup>p</sup> secundo neruorum pari foramen sibi uendicans, tandem cum<sup>p</sup> uisforio  
 neruo ad oculum proripit, internæq; temporalis musculi sedi furculos com-  
 municat.<sup>q</sup> Grandior autem ramus, sursum cōscendens, duram perforat mem-  
 branam ad latus<sup>r</sup> glandulæ cerebri pituitam excipientis. Quum primum ue-  
 rò in duræ cerebri membranæ cavitatem contendit, in duos denuò ramos  
 partitur: ac horum<sup>s</sup> unus multiplici sobole in tenuem membranam, hîc cere-  
 bro obductam, spargitur: \* alter uerò tenuis membranæ portiuncula conco-  
 mitatus, in uariis furculis inuicem complicatos discinditur, ac in cerebri an-  
 fractus tantisper ascendit, dum in humillimam dextri uentriculi sedem per-  
 tingat. Hinc in posteriora primum sursum ad postremam usque eius uentri-  
 culi sedem fertur, in ascensu<sup>x</sup> portiunculam propaginis cuiusdam assumens,  
 quæ à quarto duræ membranæ sinu, cerebri anfractibus inibi offertur. Quum  
 uerò hic arteriæ ramus, retis quasi modo implexus, posteriorem dextri uen-  
 triculi cerebri sedem<sup>z</sup> superauit, secundum eius uentriculi ductum in ante-  
 riora porrigitur, donec ipsi<sup>z</sup> altera pars eius propaginis misceatur, quam sub  
 cerebri corpore, fornicis aut cameræ modo extructo, à quarto duræ mem-  
 branæ sinu huc pertingere, dictum est. Ab hac itaq; arteria, & dextra eius pro-  
 paginis parte, plexus ille, implicato sibiq; inuoluto reti admodum sanè similis,  
 ac hinc forsan aliquando primumq; reticularis plexus à primis dissectionum  
 professoribus appellatus, in dextro cerebri uentriculo conflatur, quem etiam  
 Græci *χρυσωδής* nuncupant, comparatione assumpta à membranea inuolucro-  
 rum fœtus substantia, uasorumque per illam excurrentium serie: dein à fusca  
 quadam & subrubra<sup>b</sup> carne, glandulosa<sup>b</sup> ue substantia, quæ huic cerebri plexui  
 quodammodo intertextitur, & aliquid commune obtinet cum<sup>c</sup> ea substantia,  
 quæ inter uterum & exterius fœtus inuolucrum reperitur, uasorumq; distri-  
 butionibus pulcherrimè præest.<sup>e</sup> In sinistro cerebri uentriculo, plexus iste se-  
 cundinis assimilatus, constituitur ex præcipuo tertiæ eius lateris arteriæ ra-  
 mo, & eodém tendente altera parte eius propaginis, quam ad cerebri uentri-  
 culos à quarto sinu pertinere, superius scriptum est. De reticulari uerò Galeni  
 plexu nihil hic mentiendum duxi, quòd iam cerebri uasorum seriem mihi  
 perspectam esse haud dubitem. Atque ideo minus quoque modò aliquid con-  
 fingendum est, quòd nouimus Galenum, boum cerebri dissectione delusum,  
 non hominis cerebrum, uti neque ipsius uasa, sed bouis, idq; etiam parum ex-  
 actè, recensuisse. Si enim tertiæ caluariam petentis arteriæ seriem in homine  
 examinaueris, illam, uti ego nunc enarraui, comperies: interdum tamen uni-  
 cum obseruabis esse ramum, duos illos, quos aliquosque protensos, inuicem  
 coire dixi. Cæterum si bouis arteriam indagaueris, duramq; cerebri membra-  
 nam iuxta glandis pituitam cerebri excipientis latera diuiseris, aliquid Galeni  
 reticulari plexui simile comperies. Verùm hæc ad septimum spectant  
 librum, qui principis animæ sedi consecrandus, horum  
 uasorum dissecandi rationem lucidif-  
 sinè persequetur.


*Plexus in pri-  
 mis cerebri  
 uentriculis  
 constitutus.*

*Quis Galeni  
 reticularis sit  
 plexus.*



AND. VESALII DE CORPORIS  
DE VENA ARTERIALI, ET AR-  
teria uenali. Caput xv.

PRIMA DECIMIQUINTI  
CAPITIS FIGURA



PRIMAE DECIMIQUINTI CAPITIS FI-  
gura, eiusdemq; characterum Index.

*P R I M A* figura exhibetur nuda, & ab omnibus partibus libera uena arteriose delineatio: cuius orifi-  
cium apertum fixi, ut tres membrana, sanguinem è pulmone in dextrum cordis sinum regurgitare prohiben-  
t, 2, 3. tes, in conspectum uenirent. notantur autem ille notis 1, 2, 3.

*A* Sedes, qua arterialis uena ex cordis dextro sinu originem ducit.


*B* Interior arterialis uenae tunica, quintuplo propria uenae tunica crassior.

*C* Exterior uenae arterialis tunica, peculiari uenarum tunicae crassitie respondens.

*D* Arterialis uenae caudicis in duos truncos diuisio. ac *E* quidem dextrum truncum indicat, multiplici sobole  
*E, F.* dextrae pulmonis se di distributum. *F* uero sinistrum indicat truncum.

*G, G* Arterialis uenae per pulmonis substantiam series.

SECUNDA DECIMIQUINTI  
CAPITIS FIGURA



*HÆ c figura nude omnibusq; partibus liberæ uenalis arteriæ delineationem proponit, ipsiusq; characteres ita se habent.*

*H Uenalis arteriæ à corde pronascens initium. Huius uasis orificij membranas, quia in corde consistunt, hic simul cum uase, ut in arteriali uena, non expressimus.*

*I Indicatur crassities simplicis arteriæ uenalis tunice.*

*K, L Prima uenalis arteria in duos truncos diuisa, mox in ipsius ortu facta.*

*M, N Series uenalis arteriæ, per pulmonis corpus innumeris propaginibus digesta.*



ELIQUA adhuc in uenarum arteriarumq; sermone duo sunt uasa, quæ singula duabus uocibus à diffectio-  
num peritis explicantur: ac unum quidem uenam arte-  
rialem, alterum uerò arteriam uenalem appellant, no-  
men nimirum ab usu, & appendicem ab ea qua constant  
substantia indentes. Vena itaque arterialis, uas dicitur, ex  
elatori sede dextri cordis uentriculi in pulmonem nu-  
merosissima ramorum serie digestum, sanguinemque in eo cordis uentricu-  
lo elaboratum, pulmoni subministrans. Atque hoc uas non uenæ, sed arteri-  
æ constar corpore. unde etiam quia sanguinem uenarum modo defert, ue-  
næ nomen obtinuit: quia uerò arteriarum tunicis conformatur, appendix  
iste arterialis illi adjicitur. Porro alterum uas, à sinistro latere basis sinistri cor-  
dis uentriculi egressum, sparsa etiam sobole in pulmonem discinditur, ac aere  
ex pulmone in sinistram cordis uentriculum deferendo potissimum famu-  
latur, & interim uenarum corpore constituitur. unde quia aeris deductui  
subministrat, spiritalēq; organum est, arteria appellatur: à substantia autem &  
conformatione, uenalis dicitur. Quamobrem uerò hæc uasa & ortu & usu ac  
substantiæ conformatione à uena arteriaque discrepent, deinde cuiusmodi  
membranæ ipsorum orificijs præfiantur, in sexto libro, qui uitalis animæ  
partibus dedicabitur, exequemur. Nobis uerò huic libro finem imponen-  
tibus, nemini mirum uideri debet, prolixum Caput hinc non subnecti, quod  
uenas citra arteriæ consortium in corpus diffusas, item arterias citra uenæ con-  
sortium excurrentes, recenseret. Quandoquidem si quis earum desideret (uti  
sanè debent omnes) enumerationem, ilico hanc ex uenarum & arteriarum  
tabulis, cum has mutuò conferet, spectabit. Integræ enim magnæ arteriæ de-  
lineationi nuda uenæ cauæ effigies proportionē respondet, ambasq; in ean-  
dem circumferentiam digestissimus. Cæterum quo minus hac in parte meam  
operam quis requirat, ad tertij huius libri finem, præsentis Operis Epitomes  
tabulam impono, uenas & item arterias unâ exprimentem: ac proinde etiam  
non obiter commonstrantem, quæ nam uena citra arteriæ consortium, &  
quæ rursus arteria absque uena coniuge per corpus digeratur. Verum quum  
uenarum seriē superius prosequeretur, non semel sanè ad uenæ sectionis, qua  
sanguinem minuiamus, tractationem, sermo lubens prorupisset: modò uenam  
huic illi ue parti uiciniorē, modò remotiorē, eamq; aut grandem aut exi-  
lem, & secundum rectitudinem, undecunque hæc tandem petatur, fibra-  
rumq; tam rectarum quàm transuersarum consensum, huic aut illi parti cor-  
respondentem, enarraturus: & non uulgariter admoniturus, sanguinem è se-  
cta uena fluentem, in totius uenæ corpore completi: deoq; non partium  
uenis accumbentium situm, sed uenarum ductum atque distributionem in  
illa quæ

*Vena arte-  
rialis.*

*Arteria ue-  
nalis.*

*VNDE ue-  
narum & ar-  
teriarum simul  
aut citra & con-  
sortium excurrentium petenda  
sit hystoria.*

a = fig.  
b = fig.

c = fig. tit.  
d = fig. tit.  
e = fig. tit.  
f = fig. tit.  
g = fig. tit.  
h = fig. tit.

i = fig. lib.  
k = fig. lib.  
l = fig. lib.  
m = fig. lib.  
n = fig. lib.


o = fig. lib.  
p = fig. lib.  
q = fig. lib.  
r = fig. lib.  
s = fig. lib.





VENARVM ET ITEM ARTERIARVM OMNIVM INTEGRA DELINEATIO, IN HOC  
POTISSIMUM PARATA, UT IN CONSPICUO ESSET, QUAE NAM VENAE CUM  
arterijs porrigantur, & quae abq[ue] arteriarum consortio per corpus repant, ac rursus cuiusmodi arterijs Natura coniugibus uenis desituerit.

1. *Amus tenuem adiens membranam, cerebri basi obvoluit.*  
2. *Ilexus, quem scissus involucri comparamus.*  
3. *Sexti parii nervorum cerebri dexter nervus, illis abq[ue]ssus, quia secundum laryngi  
latu deorsum fertur.*  
4. *Dexter recurrens nervus.*  
5. *Sexti parii nervorum cerebri truncus sinist[er].*  
6. *Recurrens nervus sinist[er].*  
7. *Nervulus, cordis basim accedens.*  
8. *Posteriora cervicis & occipitum adiens uena.*  
9. *Scapulae posteriora petens uena. Peritum est postea arteriam privatim non insigni-  
mentem, praecipue ex delineatione liquet, cui nam uena arteria exporrigatur.*  
10. *Vena ad cutem, quae summus humerus integritur, excurrunt.*  
11. *Humeraria, quae cutem subit, cultumq[ue] adit.*  
12. *Humeraria ramus, aliora cubiti articuli admodum rari petens.*  
13. *Ramus ad humeraria ad communem uenam constitutionem repens.*  
14. *Peritum modo conducent potius minoris latius charactere est  
more, ne quum arthrometici characteres geminandi essent, plura  
ipsi obliuerent.*  
15. *Humeraria ramus, per radium cubitiq[ue] exteriora ad ulnae appen-  
dicem & brachiale properans, axillarisq[ue] rami p[er] notandis, illis  
ubi n[on] uisunt, autq[ue] & parum digitiq[ue] deinde & anularum  
praecipue accedens.*  
16. *Axillaris ramus, cui anterioriorem interioriq[ue] brachij sedem  
insufflenti diffunditur.*  
17. *Ad musculi cubitiq[ue] extendentes oblata propago.*  
18. *Ramus quartum brachij nervum ad cubiti usq[ue] exteriora con-  
comitans.*  
19. *Axillaris in duos truncos partito.*  
20. *Truncus in alto latitans, & arteria undiq[ue] concommitatus, & per  
cubiti flexum in cubitum tendens.*  
21. *Disti trunci ramus, radio exporrectus, & surculus pollicis, indicis  
& medio exhibens.*  
22. *Arteria disti ramum concomitantis s[ub]oles, externam manu  
sedem inter indicem ac pollicem accedens.*  
23. *Reconditi illius trunci ramus, ulnae exporrectus, & parus digiti,  
anulari & medio s[ub]oles deprensus.*  
24. *Sub cute excurrit axillaris trunci iuxta cubiti articuli diuisio.*  
25. *Axillaris ramus, communem confluentem uenam.*  
26. *Communis uena.*  
27. *Communis uena insular T diuisio, ac dein ipsius per externam  
manus sedem gr[ati]a.*  
28. *Surculus communis uena, internam manus adiens sedem, & hic  
alij commixtus ramulo.*  
29. *Axillaris ramus, ulnae exporrectus, varieg[us] in eius dist[ri]ctus, &  
suo extremo cum quada[rum] humerariae amo cutis, ubi n[on] possimus.*  
30. *Series uenarum internam cubiti cutem & uenam implentium.*  
31. *Emilicis portio.*  
32. *Vena ab umbilico in iecur exporrecta.*  
33. *Atatus, uinum scissus inter exteriori ipsius inuolucrum & inter-  
norum deferens.*  
34. *Arteriae scissus peculiaris.*  
35. *Portioncula nervi, iecoris caue[is] & uentriculi ueris deproprie.*  
36. *Atatus bilis uesiculae diuisione inestino inferius.*  
37. *Vena porte caudex.*  
38. *Recur inferia arteria, & nervus quoz illi exporrectus arteria.*  
39. *Arteria & nervus, bilis uesiculam accedentes.*  
40. *Vena bilis uesiculam adueniens.*  
41. *Vena & item arteria, posteriori uentriculi sedem iuxta ipsius inferiori orissem accedentes.*  
42. *Vena uentriculum petens, quae posterior ipsius sedes dextram spectat regionem.*  
43. *Vena, arteria, nervus, dextram fundi uentriculi sedem implcantes, ac & etiam notati.*  
44. *Minor porta maxima distributionis truncus.*  
45. *Grandior truncus maxima partitionis uena porte.*  
46. *Vena & arteria, diuisione intestini potissimum exporrecta, & ipsi atq[ue] corpore glanduloso suffulta.*  
47. *Vena cum coniuge arteria, dextram sedem adiens inferiori membranae omenti.*  
48. *Radix arteria in iecur, uentriculum, lienem & omentum, & bile uesiculam digesta.*  
49. *Vena cum coniuge arteria, superius uentriculi orissem corona modo tandem cingens.*  
50. *Vena & arteria, praecipuam inferiori membranae omenti sedem petentes, & colon, quae uentriculo  
exporrigitur, implcantes.*  
51. *Glandulosum corpus, usq[ue] foris distributioni hic praefectum.*  
52. *Inferioris omenti membrae sinistram sedem accedens uena.*  
53. *Vasorum series ad lienem.*  
54. *Vasa ab illis quae beniniferunt, sinistram uentriculi sedem adueniunt. Peritum praecipua n[on] indicantur,  
sinistram sedem fundi uentriculi implcantis.*  
55. *Series uenarum & item arteriarum intestini propriarum.*  
56. *Radix praecipua arteria intestini petentis.*  
57. *Atatur arteria intestini propria.*  
58. *Glandulae in mesenterio posita, & nuper narratos usorum diu[er]sus corroborantes.*  
59. *Foramen septi transversij, per machum transmittens, atq[ue] ad sinum iecoris, stomacho cedens.*  
60. *Iecoris ligamentum, quae sinistram ipsius pars septo n[on] situr.*  
61. *Magna arteria, septum permeans, atq[ue] adeo ipsius ramus, in dextram septi partem excurrunt.*  
62. *Cana uena caudex.*  
63. *Vena, sinistri renis pinguem accedens tunica.*  
64. *Vena & arteria reni dextro oblata.*  
65. *Vena, dextri renis pinguem tunica intextens.*  
66. *Sinistram renem accedens uena & arteria.*  
67. *Sinistram feminalis uena.*  
68. *Dextra feminalis uena.*  
69. *Arteriarum feminalium ortus.*  
70. *Sinistram feminalis uena & arteria congressus.*  
71. *Sinistram testem una cum tunica ad uis ipsi propria, atq[ue] & periteneo praeuata, & n[on] notatis, deinde  
uimus, ita ut amica tunica hic est diffusa, aperta, ut nihil, quo minus testis apte curuatur, impediatur;  
imò etiam musculi illi tunica innatus communistratur, & indicatus.*  
72. *Hic uena & arteria feminales peritonei amplius ueni egreduntur.*  
73. *Paricofum corpus, ipsaq[ue] adeo uena & arteria uaria & admirabilis implicatio.*  
74. *Sinist[er] testis, tunica ipsi proxima oblectus.*  
75. *Vas[us] semen deferens, ad testem reuolutio.*  
76. *Vas[us] semen deferens, ad pubis usq[ue].*



77. *Sinist[er] uis[us] semen deferens, ad pubis osq[ue] posteriora reflexus.*  
78. *Dextri uis[us] semen deferens reflexus.*  
79. *Dextri sinist[er]q[ue] usq[ue] foris semen deferentium coitus.*  
80. *Vasorum semen deferentium inferius.*  
81. *Glandulosum corpus, usq[ue] foris semen deferentium inferiorem excipiens.*  
82. *Atatus, uinum scissus communis.*  
83. *Musculus orbiculatus disti iam meatu obductus.*  
84. *Femur, atq[ue] adeo ipsius s[ub]oles corpora.*  
85. *Vena & arteria, lumborum uerterib[us], illisq[ue] aduasi musculi, & abdominis lateribus exporrecta.*  
86. *Vena cana & arteria super os sacrum partito.*  
87. *Arterioles, sacri osis foramina petentes.*  
88. *Sinist[er] disti partitionis trunci diuisio.*  
89. *Interiori rami disti diuisionis propago, nates & extendens osi aduasi petens.*  
90. *Disti rami propago, tandem uesica & utero digesta.*  
91. *Pars arteria, scissus peculiaris, quam antea ad uesica latera ueni, cui hic  
quoz in maiori figura & portione notauimus.*  
92. *Portioncula exteriori rami disti antea diuisionis, ad reliquum accedens in  
teriori rami.*  
93. *Reliquum interiori rami, per pubis osis foramen in musculis interiori se-  
mori sedem occupantes distribuitum.*  
94. *Sedes, quae s[ub]oles disti reliqui alteri uena coniungitur. Peritum & hic quoz,  
ex talula prompte animaduertis, quando & arteria subaudiendum est,  
quum scilicet uena arteriam attendit ceruix.*  
95. *Exteriori rami propago, abdominis inferiorem sedem ad umbilicum usq[ue]  
perpetens.*  
96. *Vena per femoris & tibia inferiora sub cute ad digiti usq[ue] pedis distribu-  
ta, & in progressu uariis edens surculis.*  
97. *Vena, extendens anteriora petens sub cute tamen.*  
98. *Musculus & cutem femoris exterioriorem sedem occupans inter-  
texenti uena.*  
99. *Vena musculi anterioriorem sedem femoris occupantis di-  
gesta.*  
100. *Disti modo uena congressus cum ea quae per pubis osis for-  
amen sinur adit.*  
101. *Hic praecipua semor petens uena secundum femoris os in po-  
teriora estelatur.*  
102. *Propagines musculis posteriori femoris sedem occupantes,  
& cutem huius sedis ad suram ac uulsi calem usq[ue] ac-  
cedentes.*  
103. *Diuisio in poplite, atq[ue] adeo rami in musculis & femoris  
capitulis hic praeuocantes distribuiti.*  
104. *Atatur disti diuisionis truncus ueni, externam tibiae  
cutem ad summum usq[ue] pedis implcans.*  
105. *Vena & arteria, s[ub]oles exporrecta, ac inter muscu-  
los latitans.*  
106. *Atatur disti diuisionis trunci ramus, cutem, inter-  
nam tibiae sedem ingens, ad digiti usq[ue] uariis subit.*  
107. *Ramus disti rami suam ad calem usq[ue] petens.*  
108. *Propago gradatim trunci inter mu-  
sculos, tibiae anterioriorem sedem ueni  
panes, ad pedis usq[ue] superiora &  
digiti digesta.*  
109. *Truncus grandioru reliquum, inter  
musculos posterioriorem tibiae sedem  
s[ub]oles uenientes deorsum repens,  
& inter tibiae ac calem pedem  
subiens, & ramulos digitoru in-  
ferioru sedi communicans.*



Q V O N I A magna figura cum ipsi annexae partitiones, ueni uenas ac arterias omnes  
proponit, haud me studiosi incommodaturum duxi, si mulierum usq[ue] foris tantum scirem hic  
proponerem, quanta a uirilibus usq[ue] illa differt. Quod duxit ad infeminalium usq[ue] foris ad re-  
bet ductu perficitur, & ueni arterijsq[ue] uterum implcantis ueni, quae omnia praesenti figura simul  
cum muliebri uesica proponuntur: uis iam subseque[n]s characterum edocebit index.  
1. *Ramuli a uena & arteria in membrana ecurrentes, quae illi peritoneo committuntur.*  
2. *Portio uena & arteria testem adueniunt, superiorem fundi uetri sedem petens.*  
3. *Commixtio uena & arteria feminalium, quae insit pyramidi testis, & uariisq[ue] asimilatur.*  
4. *Testis sinist[er].*  
5. *Vas semen a teste in uterum deferens.*  
6. *Obitus uteri fundi angulus, in quem uas semen deferens inferiorem molitur.*  
7. *Hic sede fundus uteri (quem R. indicat) in ceruicem terminatur, hac regione ipsius constitit  
orisium.*  
8. *Uteri ceruix.*  
9. *Hic uesica ceruix, cui x. inscriptum, in uteri ceruicem producit ac definit.*  
10. *Vasa inferiorem uteri fundi sedem & ceruicem committunt.*  
11. *Ceruicis uteri oris collucit.*  
12. *Die uis uirinum & ueni ueni uasculum deducens, quouam hic abunde sit, usq[ue] foris rationem  
adnotauit, ac non reliquorum omnium charact[er]um hic non sufficiunt rationem habere.*

CHARTA, PARVAS ALIQVOT FIGVRAS COM-  
PLECTENS, QUAE FIGURAE AD COMMONSTRANDAM  
PENARVM ARTERIARVMQVE SIMVL COMMISSARVM SERIEM  
parata, ac in pagina X, aut numero 502 insignita obuia, ueniunt agglutinande.

PRIMA.

TERTIA.

SEXTA.

PRIMA figurae hac char-  
ta impressa, commode suis  
sedibus glutinetur, illaq; ua-  
lidores reddatur, primis  
presenti charta membrana  
nisi subglutinabitis singu-  
laris deus figuras à super-  
flua papyro rescindis.

PRIMA deinceps  
ana pari carnis distribu-  
tionem proponit, magne fi-  
gura tergo illic ueniunt com-  
mittenda, ubi caua caudex  
eum uenam promit, ac o in  
uicis figuris scriptis spe-  
ctatur. SECUNDA  
nisi à redundanti papyro  
circumfusa erit, duas par-  
tes constituit, quarum su-  
perior uenam arteriarumq;  
dextri lateris exprimit,  
sub peluvis ossis superiore  
abdominis sedem petentes.

SECUNDA.

Finem itaque partis q. ad  
magne figure q. in ingu-  
lo accurrens spectatur, &  
ad ueniunt qui ad dextrum  
latus & m in magna  
figura ibidem occurrunt. Ce-  
terum humilior pars, ue-  
nam arteriarumq; exprimit,  
qua inferiorem abdominis  
sedem implicat, illic est iun-  
genda, ubi eorum radices  
iuxta l. in dextri quodam-  
modo cruris initio, ac su-  
pra inguina spectantur.

TERTIA cate-  
ri dignior, uenam porta di-  
stributionis, simul cum ar-  
terio illi concomitantibus,  
magnoq; inferiori mem-  
brana ueniunt portione &  
linea pariter exprimit, ad  
cauam uicoris sedem maiori  
figura nectitur, ubi o, p,  
n, & contermini aliquot  
chorales in utriusq; fi-  
gura spectantur.

QUARTA por-  
tionem gubna sedis icoris  
proponens, non inutiliter  
notat ex puncto illic gluti-  
nabitur, ubi A inter S &  
E maiori figura consistit.

QUINTA, pre-  
ter testes, ipsorumq; inuo-  
lucra, & urinarum me-  
atus, uenas arteriarumq; femi-  
nales ostendens, illic est co-  
mittenda, ubi u in amba-  
bus figuris obuium est, aut  
ubi uena femoralis arterie  
primis iungitur, meatusq;  
urinarum illis subiungitur.

SEXTA, quae est nulla membrana ipsi subglutinetur, satis ualida ex illis, primum sub SEPTIMA ueniunt agglutinanda Septima enim uesicae &  
penis anteriorem sedem proponit, una cum uasis qua umbilico ascribimus. Sexta autem humilior penis superficie in hoc expressimus, ut tota figura ex am-  
bat uis illis consurgens, charactere q. super quinta figure q. necti queat, ac postmodum ad languidi penis formam insit. S. implicari.

OCTAVA figura, mulieris uesicam, & umbilici uasa, urinariorumq; meatus portionem continens, maiori non est committenda, sed illi figuræ,  
quæ in charta tergo, ubi maior impressa est, uterit & ipsius uenas & arterias feminariasq; uasa cõmonstrat. Iungitur itaq; octaua ad paruum illam figuram,  
ubi u occurrit, uenasq; feminales arterie committitur: nexu uero fiet urinarum tantis mentibus, proportionem à uesica sua sumpta, ut scilicet x ad w respõdeat.



# ANDREAE VESALII.

507

DE CORPORIS HUMANI FABRICA LIBER  
QUARTVS, NERVIS PROPRIIS, AC IPSI

peculiares figuras in Capitum, quibus præcipuè  
conueniunt, fronte exhibens.

QVIBVS CORPORIS PARTIBVS NERVI NO-  
men tribuatur, ac quid propriè neruus uocetur, & demum quid is sit,  
unà cum ipsius differentia & usu. Caput 1.



ERTIO libro uenarum, sanguinem à ie-  
core in uniuersum corpus deferentium, &  
arteriarum quæ uitalem spiritum simul cum  
sanguine, impetu diffuso à corde, corpori  
subministrant, distributionis seriem com-  
plexus sum. nunc uerò proximum est, ner-  
torum à cerebro animalem spiritum mem-  
bris, qui illo ad ipsorum munia indigent, com-  
municantium propagationem persequi, à  
generali neruorum differentia sumpto ser-  
monis exordio. Dissectionum enim periti  
triplicem neruorum differentiam (uti &

fig. cap. 1  
lib. 2.  
b. 1. fi. cap.  
1. lib. 2. P.  
c. passio  
in musculo  
rū tabulis.  
c. passio in  
1. fig. cap.  
2. c. 2. 1. fi.  
cap. 11.

antea alicubi monimus) Itatuunt: quandoquidem<sup>a</sup> ligamenti ossa colligan-  
tibus, & non minimam musculorum portionem cōstituentibus, nerui nomen,  
perinde ac uulgi, accommodant. dein<sup>b</sup> tendines, & uniuersas musculorum  
eneruationes, sub neruorum nomine, uulgi quoq; ritu complectuntur. & ter-  
tium insuper neruorum genus enumerant, quod nos in præsentī aggredien-  
dum duximus: organa uidelicet longa, teretia, nullamq; intus cauitatem, quæ  
sensu dignosci queat, sortita, & animalem spiritum à cerebro ad corporis par-  
tes deferentia. Atq; hæc organa dissectionum professores nerui nomine citra  
appendicem præcipuè dignantur. quod à Græcis ad nos demanauit, qui à fun-  
ctione seu munere unicum instrumētum duobus nominibus nuncuparunt,  
ὄνειον id à ὄνειον, & τένον à τείνειν appellātes, quod musculi neruorum potissimum  
ope & nutare & tendere ualeant: quippe quod nulla corporis particula neq;  
motum arbitrariū, & qui è nostra pendet uoluntate, neq; sensum sine neruo  
nanciscatur: ac quod neruo præciso, aut laqueis intercepto, aut alioquin corru-  
pto, cōpresso uel pars quam is accedit, confectum motu & sensu priuetur, con-  
cessum est omnibus. Quod autem cerebrum, dorsalis medullæ origo ac prin-  
cipium sit, quodq; nerui partim ex cerebro, partim à dorsali medulla oriatur,  
minimè omnibus notum exploratumq; fuit. Alij enim cor neruorum iudica-  
runt esse principiū, nonnulli duram crassam uel cerebri membranā: nullus in-  
terim iecur, aut aliud eius generis uiscus. Verum Hippocrates, Erasistratus, He-  
rophilus, Galenus, cæteri q; Anatomicorum præcipui, ex his quæ in corporū re-  
sectione conspiciuntur, uerissimè asserunt, cerebrum neruorum esse initium: &  
præterea neruos ab illo spiritum animale assumere, atq; ad eas partes, quæ illo  
aut ad sensum aliquem, aut motum arbitrariū indigent, deriuare, est quoq; fa-  
tendum. A corde enim neruos (ut Aristoteli potissimum, & alijs non paucis  
uifum est) neuiquam principiū ducere, uel hinc liquidò colligitur, quod disse-  
ctione nullus neruus ab illo pronasci uideatur. Nullus namque omnino cordi

Ligamēta, ten-  
dines & pro-  
cessus cerebri,  
dorsalisq; me-  
dullæ, neruos  
generatim  
uocari.

Organum ner-  
ui nomine pri-  
uatum nuncu-  
patum.

Neruorum ar-  
tus à cerebro.

Non à corde.

X comit-



committitur, præter<sup>a</sup> unum impenſe gracilem, ac uix tandem ſummo ſtudio à me inuentum, & à ſiniſtro ſexti paris neruorum cerebri neruo diſtributum.

Quà enim neruus ille per ſiniſtrum cordis latuſ decliuſ fertur, atque ſiniſtræ pulmonis parti, ac item cordis inuolucro ramuſculos prætenues offert, neruumq; recurrentem ſiniſtrum conſtituit, à ſe neruulum deducit, qui cordis inuolucrum, ubi ſiniſtræ<sup>c</sup> arterialis uenæ ſedi id adnaſcitur, permeat, in cordis baſim, iuxta ſiniſtram poſterioremq; arterialis uenæ ſedem abſumptus.

Quum itaq; huiuſmodi neruulus perinde cordi à ſexto cerebri neruorum pari exhibeatur, ac reliquis uiſceribus uniuerſis neruulos offerri docebimus, quumq; cordis neruulus maximè graciliſ ſit, promptè colligitur, cor ne ſiniſtro quidem ſexti paris neruo principium dare. tantum abeſt, quodd cæterorum omnium neruorum origo neruulus ille haberi poſſit. Præterea fibræ, quas cordis carni intertextas nouimus, non magis nerui ſunt, quàm aliorum organorum, puta uentriculi, inteſtinorum, uenarum ac arteriarum fibræ. Ad hæc, fibræ, quæ in cordis ſinibus uentriculiſ<sup>e</sup> ue excarnes occurrunt, quia duntaxat membranarum proceſſus ſunt, in neruorum etiam numero minimè ueniunt reponendæ. Nam fibræ in dextro cordis uentriculo ſe offerentes, trium membranarum proceſſus cenſentur, uenæ cauæ oriſicio præſectarum. Fibræ autem in ſiniſtro cordis uentriculo apparentes, proceſſu ſunt duarum membranarum, quas arteriæ uenaliſ oriſiciuſ ſibi peculiareſ uēdicat. Quum itaq; eiufmodi cordis fibræ neutiſquam in eorum neruorum claſſem referendæ ſint, qui animaleſ ſpiritum tanquam riui ſi quidam ad corporiſ parteſ perferunt: annuendum quoq; eſt, fibrarum illarum gratia, non poſſe cor neruorum cenſeri initium, præcipuè quum ab illiſ membranarum proceſſuſ,

extra cordiſ ſubſtantiã nihil prorſuſ aliò educatur. Cæterum qui ex<sup>b</sup> dura cerebri membrana neruorum originem pendere affirmarunt (in quorum numero ad extremum uſque ſenium fuit Eraſiſtratuſ) exterioreſ nerui partem duntaxat conſpexere à dura cerebri membrana enatam. Vnuſquiſque enim neruus<sup>i</sup> triplici conſtat ſubſtantiã: nimirum media quadam, & intimæ arborum medullæ quàm ſimillima, quæ haud dubiè à cerebro initium ducit, coagulata<sup>i</sup> indurataq; cerebri ſubſtantiæ omnino reſpondens. exterioreſ duabuſ: una, eademq; intimæ ſubſtantiæ propinquioreſ, quàm à<sup>k</sup> tenui membrana cerebri: altera, quàm à dura oriri, compertum habemus. Non aliter enim quàm cerebrum duabuſ illiſ membranaiſ induitur, ita quoque proceſſuſ à cerebro propagati (ipſi nimirum nerui) illiſ integuntur, ſicq; inuoluti per corpus excurrunt. Adeo ſanè, ut neino ſuiſ oculiſ fidem non dero-

gans, inſiciari poſſit, neruorum principium à cerebro pendere. ac proinde etiam uix ambigere licet, num neruiſ à cerebro, an uerò à corde animalis ſpirituſ, quem partibuſ deducunt, inſuat. Nonnulli enim (ut inter cæteroſ Chryſippuſ) etiamſi cerebrum neruorum darent eſſe principium, non tamen id ſenſuſ motuſq; arbitraiij principium ſtatuebant. Quoſ proſectò uiua ſectio plus ſatiſ redarguit, in qua<sup>l</sup> omnia à corde ad cerebrum pertinentia colliduntur, aut laqueiſ intercipiuntur, aut etiam præſecantur. Hæc namque, ſi debite à adminiſtretur, uti in publiciſ ſectiõnibuſ non ſemel à me eſt tentata, edocebit ſanè, quantum cordiſ munere, hoc eſt, uitali ſpiritu, cerebrum indigeat: non minus ſcilicet, quàm cor illum quem inſpiramus aërem, & iecoriſ ſanguinem, ad ſua officia exigit. Dein ea ſectio oſtendit, cor neruiſ non magiſ animaleſ ſpiritum porrigere, quàm uitaleſ ſpiritum cordi à iecore

d 6 fg. lib.  
a b d d  
diſſectum.

c eiufdem  
fig. 1.

f eiufdem  
fig. 1.

g 7 fg. lib.  
6 ſub K. L.  
M. ex 9 ſ.  
G. G ſub  
E. E.

b 1 fg. lib.  
7 A, B, C.  
B. 2 fg. B.  
H.

i 17 ſi. cep.  
14 lib. 7 a.  
B. 3.

k 2 fg. lib.  
7 E. 3  
fig. O. O.

l illa ſimul  
omnia pul-  
cbrē oſten-  
dit ultima  
fig. 1. lib.  
in collo.

Neruus non e  
dura cerebri  
membrana  
oriri.  
Quibus parti-  
bus neruus  
conſtet.

unde neruiſ  
ſpirituſ anima-  
luſ præbeat.

*Nervorum di-  
scrimen à molli-  
tie & duritie,  
quorum gratia  
multa oriuntur  
nervorum dif-  
ferentia.*

*Cur alij nervi  
alij molliores  
aut duriores  
reddantur.*

*Natura in ner-  
vis digerendis  
scopus.*

à iecore deduci cognoscimus. Verùm quia huiusmodi disceptatio ad cordis  
cerebriq; historiã potiùs quàm ad nervorù naturam spectat, hac modò postpo-  
sita, nervorum propriè dictorù differentias aggrediemur. Quemadmodum  
igitur cerebri, & ex ipso pronascētis medullæ dorsalis substantia, omni ex par-  
te non eandem servat duritiem: ita quoq; nervi ab his originem sumentes, in-  
uicem substantia non correspondent, sed duritie ac mollietate plurimùm variant.  
Principij enim, à quo nervi prodeunt, substantiæ occasione, uisoriij nervi, per-  
inde ac linguæ insigniter<sup>a</sup> molles censentur: qui autem à dorsali medulla, ubi  
hæc in sacro osse cōsistit, originem sortiuntur, durissimi sunt. Deinde aut pro-  
pter longiorem uel succinctiorem progressum, nervi uel molliores uel durio-  
res comperiuntur. uisus namque, gustus & auditus, nervi molles sunt, quòd  
breuissimo prorepant intervallo. Gratia itineris uerò, uiaq; anfractuum occa-  
sione, tertij nervorum cerebri paris<sup>a</sup> ramus, uitis aut cucurbitæ capreoli instar  
inuolutus, durior euadit. Præterea nervi per durum aut molle corpus transi-  
tus, eiuscē ue corporis contactus, illum molliorem aut duriolem efficit. Viso-  
rius etenim nervus breuissimo ductu per<sup>r</sup> foramen in osse cælatum fertur:  
quemadmodum & præcipua quoq; tertij nervorù cerebri paris portio, quæ  
idcirco ex ossium contactu, perinde etiam ac uisorijs nervus, minimùm indu-  
ratur. At quinti nervorum paris<sup>r</sup> furculus, qui<sup>r</sup> cecum tortuosumq; temporis  
ossis foramen perreptat, & unus tertij paris nervorù cerebri ramulus, ab oculo  
si sed e ad genas, ac<sup>r</sup> alius item, ad humilior labrum procidentes, quia longo ite-  
nere per os incedunt, ossis cōtactus beneficio quàm ipsorum principia  
indurefcunt. Pari quoq; causa, ob itineris longitudinem, & durarum membra-  
narum cōtactum, omnes propemodum nervi musculis exporrecti, duriores  
fieri conspiciuntur, quàm ubi primùm à principio prodeunt. Quæ omnia mi-  
rabili industria à rerum Opifice sunt excogitata. sensus namq; organum ner-  
uo indiget molli: nervo quidem, quia sensus est instrumentũ, quodq; ad suum  
munus obeundum multo animali spiritu indigeat: molli autem, quoniam af-  
fici & disponi quodãmodo oporteat, & pati aliquid ab extrinsecus occurrente  
sensibili. Est enim ad patiendum quidem aptius molle, ad agendum uerò &  
ad robur (quo nervus in longo ductu indiget) durum. Propterea igitur sensus  
organa necessariò mollibus, ceteræ partes, quas moveri necessum est, duriori-  
bus nervis donantur. Vnde etiam sensus instrumenta, quæ motu aguntur arbi-  
trario, ut oculus & lingua, duplex nervorum genus sibi uendicant: unum qui  
dem sensui, alterum uerò motui præfectum. Meritò itaq; nervorum ex cere-  
bro & dorsali medulla processus, non eandem exortus sedem nanciscuntur,  
neque ijdem ductus meatusq; mollibus ac duris nervis exculpuntur: illi enim  
ex mollibus & anterioribus cerebri basis sedibus, hi uerò ex posterioribus,  
ipsaq; dorsali medulla principium ducunt: rursus illi quidem rectà, hi autem  
tortuose longq; itinere prorepunt. Cæterùm Naturæ triplex in nervosi ge-  
neris distributione uidetur fuisse scopus. Primus, gratia sensus in sensorijs orga-  
nis: secundus, occasione motus ad partes, quas moveri operæ precium fuit: ter-  
tius autem in cæteris partibus uniuersis ad tristantium dignotionem. nisi forte  
cuiuspiam magis uisum sit, & tertium hunc scopum, quia ad sensum pertinet,  
eundem cum primo constituere. Sensus igitur nomine, oculis, linguæ, auribus  
maximi offeruntur nervi: uti etiam<sup>b</sup> internæ manus sedi, & elatiori orificio  
uentriculi, quæ uelut propria præcipuaq; tactus, sicut oculi uisus, & lingua gu-  
stus, organa non ineptè censerentur. Per manus enim magis exacta, quàm per

m 1, 2 fig.  
cap. 2 G.  
n eadem  
fig. M.  
o 1 fig. cap.  
11 de F ad  
G.  
p 1, 2 fig.  
cap. 2 G.  
M. 4.  
q 1 fig. cap.  
2 R.

r 1, 2 fig. cap.  
2 B.  
s 1, 2 fig.  
cap. 2 B.

t 1, 2 fig.  
cap. 2 C.  
u 1 fig. cap.  
11 lib. 1 b.  
x 1 fig. cap.  
2 O.  
y eadem  
fig. V d T  
pronatim.

z 1 fig. cap.  
2 G. de in  
de M. Y.  
a 1 fig. cap.  
2 de in d  
M. 4.

b Specta  
manus 2 fig.  
cap. 11.  
c 14, 15 fig.  
lib. 5 V, T.

aliam partem, quamuis plures sentiant, est tactus ipsius dignotio. In ore autem uentriculi sensum penuriæ esse credimus eorum quibus animal nutriendum est, quem famem nuncupamus: in omnibus enim ijs tanquam sensus instrumentis, maximi inseruntur nerui. Motus uerò causa nerui ad musculos arbitrarij motus instrumenta dispensantur: qui propterea quòd corporis partibus mouendis extructi sunt, grandes neruos admittunt, aut saltem circumtenso habent. At quoniã ex necessitate tactus sensus omni adest neruo, propter hoc musculos & sensus organa uirtus amplior, quàm egebant ad tactilium dignotionem, subsecuta est. Reliquis autem partibus, tactus sensu tantum indigentibus, ex proportionem nerui offeruntur. Visceribus enim, ut<sup>d</sup> pulmōi, iecori,<sup>d</sup> lienī, quia in alto latitant, graciles tantum neruorum furculi offeruntur: in cūtem uerò, quòd prima extrinsecus occurrantibus obuiam eat, complures soboles passim digeruntur. Porro neruorum originis species, forma ue, non eadem undiq; uisitur.<sup>e</sup> aliqui enim, & præcipuè molliores, continuo neq; quasi in plures furculos ducto corpore exoriuntur, proceduntq; in quorum numero uisoriū nerui, & secundum quoq; cerebri neruorum par, habentur.<sup>h</sup> Alij, tanquam plures funiculi inuicem connexi, ex cerebro prodeunt: quales sunt tertij & quarti & quinti paris nerui.<sup>i</sup> Alij etiam in ipso ortu furculos hos, ueluti funiculos inuicem distantes, ac singulos propria tenuis membranæ portione circumdatos habent: qui quum caluariã egrediuntur, omnes inuicem commisi, unica duriori membrana induuntur. atq; id potissimum in<sup>k</sup> pluribus dorsalis medullæ neruis obseruatur, ut & in sexto pari & septimo neruorum cerebri. Vnde etiam in multorum neruorum distributionis in ramos enarratione nihil interesse uidetur, siue prædictorum funiculorū frequentiam solui dicas, an totum neruum in ramos ad diuersas partes exporrectos discindi. At nescio qua fronte quidam Anatomicorum principes asserere ausi fuerint, ex huiusmodi furculis funiculis<sup>l</sup> ue alios quidē motui, alios autem sensui seruire: haud secus sanè, quàm si quosdam neruorū furculos tactus sensu Natura destituisset. Atq; huiusmodi funiculorum imaginem discēs, si inter edendum alicuius animalis ex axilla, aut in guine dissecta caro, mensæ apponatur, atque in illa nerui aliquam portiunculam uena & arteria plerumque concommitata spectaueris. Cernes enim nerui extremum alicui chordæ crassiori respondere, quæ ex pluribus torta funiculis, transuersim obtusiori cultro diuisa sit. Cæterum à neruorum cauitate uix ullam ausum petere differentiam, quum ne<sup>m</sup> uisoriū quidem neruum unquam cauum perforatumq; uiderim: etiam si neruos non minus quàm uenas & arterias, uasa uocari, haud dubitem, uisoriq; nerui distributionum professoribus forati dicantur. Ab ipsa autem serie, seu distributione, hunc in modum differentiam sumere licet, quòd alij integri in aliquam partem absumantur, ut uisoriū nerui in oculos: alij in plures dirempti furculos, quosdam musculis offerunt, quosdam cuti, quosdam ossibus, quosdam sensus organo:<sup>n</sup> ut tertium neruorum par,<sup>n</sup> quod quum linguæ quodammodo sit propriū, etiam musculis quibusdam, ut inter cæteros<sup>o</sup> temporali, motus gratia,<sup>o</sup> & cuti, sensus nomine, ad labra nimirum, & dentibus quoq; dirigitur. Alij rursus incommixti, neq; cum alijs neruis coeuntē uniti<sup>p</sup> ue feruntur: ut secundum cerebri par nulli neruo commiscetur, ac uerè cōgreditur, licet ipsi minor tertij paris radix in progressu attendatur. Alij uerò inter se commiscuntur, ut primi paris neruus dexter sinistro<sup>q</sup> permiscetur. Alij alijs cōmiscuntur: ut<sup>r</sup> qui brachium adeunt nerui, simulatque è uertebreis profilierunt, non secus

*Differentia ab  
originis forma.*

*Nerui omnem  
tactus sensu  
præditum.*

*Differentia à  
neruorum  
cauitate.*

*serie.*

<sup>d</sup> 2 sic. cap.

<sup>e</sup> q.

<sup>e</sup> 2 sic. cap.

<sup>f</sup> 2 sic. cap.

<sup>g</sup> 2 sic. fig.

<sup>h</sup> 2 sic. fig.

<sup>i</sup> 2 sic. fig.

<sup>j</sup> 2 sic. fig.

<sup>k</sup> 2 sic. fig.

<sup>l</sup> 2 sic. fig.

<sup>m</sup> 2 sic. fig.

<sup>n</sup> 2 sic. fig.

<sup>o</sup> 2 sic. fig.

<sup>p</sup> 2 sic. fig.

<sup>q</sup> 2 sic. fig.

<sup>r</sup> 2 sic. fig.

<sup>s</sup> 2 sic. fig.

<sup>t</sup> 2 sic. fig.

<sup>u</sup> 2 sic. fig.

<sup>v</sup> 2 sic. fig.

<sup>w</sup> 2 sic. fig.

<sup>x</sup> 2 sic. fig.

<sup>y</sup> 2 sic. fig.

<sup>z</sup> 2 sic. fig.

<sup>a</sup> 2 sic. fig.

<sup>b</sup> 2 sic. fig.

<sup>c</sup> 2 sic. fig.

<sup>d</sup> 2 sic. fig.

<sup>e</sup> 2 sic. fig.

<sup>f</sup> 2 sic. fig.

<sup>g</sup> 2 sic. fig.

<sup>h</sup> 2 sic. fig.

<sup>i</sup> 2 sic. fig.

<sup>j</sup> 2 sic. fig.

<sup>k</sup> 2 sic. fig.

<sup>l</sup> 2 sic. fig.

<sup>m</sup> 2 sic. fig.

<sup>n</sup> 2 sic. fig.

<sup>o</sup> 2 sic. fig.

<sup>p</sup> 2 sic. fig.

<sup>q</sup> 2 sic. fig.

<sup>r</sup> 2 sic. fig.

<sup>s</sup> 2 sic. fig.

<sup>t</sup> 2 sic. fig.

<sup>u</sup> 2 sic. fig.

<sup>v</sup> 2 sic. fig.

<sup>w</sup> 2 sic. fig.

<sup>x</sup> 2 sic. fig.

<sup>y</sup> 2 sic. fig.

<sup>z</sup> 2 sic. fig.

<sup>a</sup> 2 sic. fig.

<sup>b</sup> 2 sic. fig.

<sup>c</sup> 2 sic. fig.

<sup>d</sup> 2 sic. fig.

<sup>e</sup> 2 sic. fig.




secus uniuntur, quàm pictores galerorum funiculos delineare solent. Verùm quum hæc in priuatis neruorum descriptionibus abundè sum persequuturus, iam tempestiuum fuerit; singulorū neruorum seriem oratione cōplecti: ac prium paria, quæ à cerebro exoriūtur, deinceps quæ dorsalis medulla educit, recensere. siquidem nullus neruus neq; à cerebro, neq; à dorsali medulla coniugatus prodit: sed perpetuò alter ad dextram, alter ad sinistram eadem prorsus serie situm obtinet. eodemque prorsus modo dextri ac sinistri nerui in ramos diffunduntur, si sextum cerebri neruorum par exceperis, quod nonnihil secus in dextro latere, quàm sinistro,\* digeri audies.

Neruus coniugatus enasci.

\* Cōfer in  
fig. cap. 2  
dextrā ner-  
uum sinis-  
tro.


*DUARUM FIGURARUM, QUAE NOUEM SUBSEQUENTIBVS CAPITIBVS COMMUNES ERVNT, PRIOR figura, qua totius cerebri & cerebelli à membranis ipsa inuoluentibus liberorum basis exprimitur, ut neruorum cerebri exortus opportunè oculis subiceretur. Itic enim simul cum primis illorum neruorum exortibus, tota ea dorsalis medulle pars delineata est, quæ à primo ipsius principio ad eam usq; sedem pertinet, quò hæc in ceruicis uertebras labitur.*



## D U A R U M

FIGURARUM,

novem modo subsequen-  
tibus Capitibus commu-  
nium secunda, dextrum  
latus proponens integri  
cerebri ac cerebelli, di-  
etq; in priori figura  
dorsalis medullæ par-  
tis, cum nuda septem  
cerebri nervorum pa-  
rium serie, in dextro la-  
tere expressa. Quan-  
quam & sinistros septi-  
mi sextiq; parium ner-  
vos hic quoq; delineave-  
rimus, propter variam  
sexti paris in utroq; la-  
tere seriem. Ceterum  
universa figura propor-  
tio, ea depicta est magni-  
tudine, qua corpus cir-  
cumscriberes, cuius ne-  
sica in infima figura se-  
de consisteret, & cuius  
thorax & abdomē ex  
anteriori parte conspice-  
retur, facie interim ver-  
sus sinistru humerum  
conversa, prorsusq; ex  
dextro latere sese  
offerente.



- A, A 1, 2 Cerebrum notatur.  
B, B 1, 2 Cerebellum.  
C 1, 2 Substantie cerebri tuber, huius lateris, cui characteres adhibiti sunt, mamillarem cerebri processum vulgò nuncupatum efformans.  
D 1 Dorsalis medulle principium, ex cerebri pendens basi.  
E 1, 2 Dorsalis medulle pars, tam calvarie amplitudinem egressura, & in utriusq; figuris inibi abbreviata, ubi hæc elastissimam subit vertebram.  
F 1, 2 Olfactus organo subservientes processus, nervi similes: at calvarie cavitatem, qua cerebrum continetur, notatis digna portione non egredientes.  
G 1, 2 Visory nervi, seu primum cerebri nervorum par. In prima figura sinistri nervi principium G insignitur, in altera autem dextri nervi in oculi sedem ductus.  
H 1 Visory nervorum nervorum coitus.  
I 1, 2 Oculi tunica, in quam visory nervus expanditur.  
K 1, 2 Secundum nervorum cerebri par.  
L 1, 2 Terty nervorum paris minor & gracilior duriorq; radix.  
M 1, 2 Terty paris maior crassior'ue radix.  
N 2 Minoris radices terty paris propago, frontis musculosam cutem accedens.  
O 2 Minoris radices terty paris propago, ad superiorem maxillam procidens.  
P, P 2 Propago minoris terty paris radices, in narium degenerans tunicam, quæ humiliori P priuatim indicatur.  
Q 2 Minoris radices terty paris propago, in temporalem musculum digesta.  
R 2 Maioris terty paris radices ramus, capreoli utis instar convolutus, qui in temporalem inseritur musculum: ac duos à quinto nervorum pari ramos, b & c notandos, admittens, in marsorium musculum, & buccarum musculum, & cutem quoq; diffunditur.  
S 2 Maioris terty paris radices ramus, superiorum molarium dentium gingivis, ipsiq; adeò dentibus soboles seriaticim distribuens.  
T 2 Maioris radices terty paris propago, in maxilla inferioris os prorepens.  
U 2 Propaginis T insignita ramus, inferiori labro multiplici sobole oblatus.  
X, X 2 Sirculi à propagine T notata ordinatim in dentium inferiorum radices diffusi.  
Y, Y 2 Maxima maioris terty paris radices portio, in tunicam lingue soluta.  
Z 1, 2 Quartum nervorum cerebri par. Verùm humilium Z in secunda figura palati tunicam denotat.  
a 1, 2 Quintum nervorum par, auditu indicatum. Φ autem in utraq; figuræ priuatim huius paris portionem indicat, Φ. quæ in concavitatem temporis ossis, auditus organi gratia insculptam, expanditur.  
b 1, 2 Ramulus quinti paris, ex ipsius anteriori parte enatus.  
c 1, 2 Quinti paris ramulus, qui per cæcum repens foramen, tandem, ut & ramulus b insignitus, cum terty paris propagine, capreoli modo intorta, ac R in secunda figura notata, coit.  
d 1, 2 Nervus non procidit à quinti paris principio enatus, qui ab alijs Anatomicis professoribus præteritis, in musculos maxillam inferiorem mouentes exporrigitur, nobisq; minor quinti paris radix quodammodo appellatur.  
e 1, 2 Sextum nervorum cerebri par, cuius utrorumq; nervorum series in secunda figura exprimitur. ac sinister quidem nervus est, qui umbrofus sub quinto pari quodammodo ducitur. Dexter autem magis candicat, & ipsi aliquot subsequentes characteres priuatim adhibitos cernit.  
f 2 Sexti paris ramus, musculos posteriorem cervicis sedem occupantes accedens.  
g 2 Sexti paris ramuli, in quosdam laryngis musculos hic in descensu transuersim propagati.  
h 2 Sexti paris ramus, costarum dextri lateris radicibus exporrectus.  
i 1 Portuuncule intercostalium nervorum, sexti paris ramum hæc descendentem adaugentes.  
k, k 2 Rami nervorum sexti paris, in musculorum depronpti capita, quæ à superiori pectoris ossis sede, & claviculis principium ducentia, sursum seruntur.  
l 2 Dextri nervi sexti paris ramuli, recurrentem dextri lateris nervum efficientes.  
m 2 Dexter nervus recurrens, seu reuersus.  
n 2 Soboles dextri recurrentis nervi, laryngis dispensatæ musculis.  
o 2 Sinistri sexti paris nervi soboles, recurrentem sinistri lateris nervum constituentes.  
p 2 Sinister nervus recurrens.  
q 2 Sexti paris ramuli, in pulmonis tunicam excurrentes.  
r 2 Ramuli sexti paris, membraneo cor dis involucri impliciti. A sinistri nervi sirculi, ips quos r indicauimus,



correspondentibus, cordis nervulus principium ducit.

- f 2 Sexti paris nervorum portio, quæ stomacho committitur, & series quoque, quæ utrinque lateris nervus bipartitus scinditur, ac dexter sinistra superioris ventriculi oris sedē adit, sinister vero eius orificij dextre parti implicatur.
- 1 2 Sexti paris furculi, in superioris ventriculi orificium & proximas illi ventriculi sedes disseminati.
- 1 2 Ramus sexti paris nervorum dextram orificij ventriculi sedem aduentium, qui secundum elatiorem ventriculi regionem ductus, tandem in iecoris cauum absorbitur, ubi x ascriptum conficitur.
- y 2 Prima propago rami nervorum sexti paris, qui dextri lateris costarum radicibus exporrigitur, atque ut proximi aliquot characteres ostendunt, in ramulos diffunditur.
- z 2 Ramulus propaginis y notatæ, qui in dextrâ sedem inferioris omenti membrana & colon intestinum hic digeritur.
- α 2 Soboles primæ illius propaginis, duodenum accedens intestinum, & ieiuni initium.
- β 2 Soboles dextram fundi ventriculi sedem perreptans, ac frequentes furculos ventriculo & superiori omenti membranae dispergens.
- \* 2 Propaginis y notatæ series, in iecur & bilis vesiculam.
- γ 2 Propago dextrum accedens renem.
- δ 2 Propago in dextram mesenterij regionem, & huius sedis intestina frequenti serie diffusa.
- ε 2 Nervorum series, dextram vesicæ regionem subinde implicans.
- ζ 2 Prima propago nervi sexti paris rami, sinistra lateris costarum radicibus exporrescit.
- h 1 2 Duæ propagines ζ insignitæ soboles, quæ inferiori membrana omenti, & colo intestino, quæ sub ventriculo repositæ, offeruntur.
- y 2 Series nervorum qui lienem inferuntur.
- † 2 Hac cruce a nem propaginis ζ notatæ insigniui, qui sinistram fundi ventriculi sedem perreptans, ventriculo & superiori membranae omenti furculos derivat.
- κ 2 Propago in sinistram mesenterij & eius sedis intestina excurrens.
- λ 2 Sinistram renem accedens propago.
- μ 2 Series ramulorum sinistram vesicæ latus admodum obscure implicantium.
- ν 1, 2 Septimum cerebri nervorum par. In secunda etiam figuræ ambo huius paris nervus delineauimus, v insignitos.
- ξ 2 Septimi paris propago, musculus dispensata, à stylo imitante temporum ossis processu enatis.
- ο 2 Septimi paris cum sexto coitus.
- ω 2 Septimi paris series, complexibus lingue ac ossis v referentis, & laryngis musculus intertexta.
- 1, 2, 3 Numeri characteres in priori figuræ ad dorsalis medullæ principium iuxta D conspicui, tria indicant foramina: quorum duo lateralia, 1 & 3 insignita, illa demum sum, per quæ arteriarum liquor rami ad dextrum & sinistram cerebri accedunt ventriculos. Necdum vero foramen, 2 indicatum, illud est, quo pituita ex tertio cerebri ventriculo ad pelum ducitur, quæ pituita excipit.

## QVOT NERVORVM PARIA A' CEREBRO ET

dorsalis medullæ parte adhuc in caluaria consistente, originem sumant. Caput 11.

S 1 quando in totius Operis contextu, in margine interiori scripsimus, fig. cap. 2. lib. 4. duas, aut illarum alteram ad indicauimus, quas presenti Capiti ad primi Capitis finem præpositas cernis.

Quæ cerebri sedes & partes in septimo libro distinguuntur.



Quæ ventriculi seu sinus cerebri.

I B R O septimo, quum cerebri pertractabitur constructio, duplex id esse docebimus: unum anterius superiusque; quod cerebrum dicitur, uniuersam propemodum implens caluariam: alterum posterius ac humilius, & cerebellum nobis appellatum, ipsoque cerebro etiam decuplo minus. Deinde anterius cerebrum tota superiori sua sede geminum esse, dextrum uidelicet & sinistrum, asseremus. inferiori autem parte, quæ caluariæ basis innititur medio, unicum indiuisumque esse, & dorsalem medullam ab hac, non autem (ut Anatomicorum præcipui scribunt) à cerebello enasci, & cerebellum potius dorsali medullæ inniti, & tenuis membranae, parum uero suæ substantiæ interuentu, medullæ committi, quàm illius principium esse, ostendemus. Ad hæc, addetur præter alios quosdam cerebri sinus, meatusque, duos cerebri existere uentriculos: unum quidem dextrum, alterum


d 1, 2. fi. A.  
Aunt quic  
quid cere-  
bri in 7 li-  
bri figuris  
occurrit,  
præter ce-  
rebrellum 7  
fig. insigni-  
tum X, 2.  
8 fig. R, R.  
R. 9 fig. B.  
C. D. 10  
11 fig.  
b 1, 2. fi. B.  
c 3 fig. C.  
7 A, B, C  
B, D.  
d ut in 1 fi.  
speciat.  
e 1, 2. fig.  
D, B.  
f 4, 5. fi. B.  
7 L.



Anteriori cerebri uentriculorum ductum.

Cæterum quàm probè hi sentiant, ex dissectione discas licebit, dextri sinistriq; cerebri uentriculorum constructionem formam uè inspiciens: quam mehercule multo alià esse, in septimo libro intelliges, quàm hæctenus dissectionum periti tradiderunt. Quandoquidem uentriculi in posteriori ipsorum sede nequitiam lati conspiciuntur: & in priora procedentes, paulatim in angustum co-  
guntur, inibiq; olfactus organa educunt. neq; etiam ad olfactus organorum sedem pituitam externūt, multoq; minus ipsa olfactus organa instar canalium cerebri pituitam, uel quantumuis maximè abundantem, eodè deducunt.  
Præfentes namq; cerebri uentriculi, secundum cerebri longitudinem, superius ampli existunt, anteriori sede nequaquam angustiores redditi, imò potius magis quàm in ipso medio latefcentes. In posteriori autem parte ampli quoq; uisuntur: at hinc cornu modo per cerebri substantiam deorsum descendentes, atq; antrosum porrecti, tantisper angustantur, donec ad eam usq; cerebri per-

HP I P S M O D I ferè dextri sinistriq; uentriculorum ductus uisuntur. ac A. & B. superiorem sinistri uentriculi indicant sedem, A quidem anteriorem eius scdri partem, B uero posteriorem. C regionem notat quæ decliuus antrosum ducit, ad D, quod uentriculi extremum terminumq; hac in parte indicat. At hac in cerebrum expri-  
mentibus septimi libri tabulis sunt longe euidentiora, potissimum autè in quarta, & quatuor illis seriatis subsequētibz.



Processus qui aut olfactus organū sunt, aut ipsi præcipuè subministrant, ortus.

cebam. Eiusmodi itaq; dextri & sinistri uentriculorum cerebri ductus uisuntur. A sede uerò, ubi uentriculorum angustos terminos definere dicebam, olfactus organa, aut saltem cerebri processus, animalem spiritum præcipuo olfactus instrumento deferentes, ac ipsi etiam uisorijs nerui enascuntur. Hinc enim utrinq; à cerebro alba mollisq; prodit substantia, quæ in progressu etiam cerebro, tenuis membranæ interuentu colligatur, quousq; ad sinus octauī capitis ois pertingat, qui his processibus excipiendis priuatim parantur. Ad posteriorem enim horum sinuū sedem albicātes cerebri processus, à cerebro abscedunt: neq; amplius tenui membranæ connati, in suum singuli porriguntur sinum: & adhuc antrosum magis protensi, ad sinuum finem, seu anteriorem illorum sedem definunt, sinibus suffulti, ac cerebro interim proximè accumbentes. Nam et si cerebro in sinuum regione non amplius adnascantur, nihilominus ipsi perpetuò attenduntur, illiq; sunt contermini. Hi cerebri processus ductu, colore, formaq; neruis correspondent: quamuis interim longè neruis, ipsis molliores sint, pauloq; (quod ad teretem spectat formam) latiores, quàm profundiores. Verum quia illi reliquorum neruorum ritu, extra caluariæ, ut neq; etiam extra duræ membranæ cauitatem, non prociidunt, nerui nomine eos Herophilus haud dignatus est: ut neq; etiam Marinus, neq; Galenus, licet Anatomicorum nonnulli hos interim in neruorum habuerint numero, ipsos primum neruorum par recēfentes. Porro in horum processuum, qui canibus & ouibus multo grandiores quàm homini obtigerunt, natura non negligerter considerandum est, quoniam pacto illi duræ membranæ suis finibus adnascantur, & quæ foramina hinc à dura membrana, & oisū sinibus, quibus processus innituntur, ad nuper commemoratas frontis ois & cuneiformis ois cauitates pertingant. Ac demum expendendū quoq; uenit, quod nam uerum sit olfactus organum, similitudine quadam sumpta ab auditus instrumento, dissectionum quoq; ac philosophiæ professoribus nimis perfunctoriè cognitum. Verum de auditus instrumento, & olfactus quoq; & aliorum sensuum instrumentis,



strumentis, in septimo libro abundè pertractabimus. Modò autem sat fuisse uidetur, processus illos cerebri commemorasse, quos aliqui etiam mamillares & papillares nuncuparunt: qui sectione paulò diligentius aggressi, dicta prius cerebri<sup>9</sup> tubera, mamillarum imagine prominentia, nihil ad olfactus organi constructionem auxiliari cognouerunt.

## DE PRIMO NERVORVM A CEREBRO

originem ducentium pari. Caput IIII.

a 1, 2 fi. F.

b 1, 2 fi. G.

c 2 fi. esp.

11, 12, 13 fi. G.

d 3 fi. esp.

12 fi. 13 fi. 14 fi.

e 16 fi. lib.

7 A.

f 1 fi. H.

13 fi. lib.

7 M.



NIBI unde<sup>9</sup> processus albos, & nervorum instar progredientes, à cerebri basis medio initium sumere scripsimus, utrinq; unus exoritur nervus, omnium corporis nervorum facile mollissimus, & circumferentia cæteris (dummodo illi ex uarijs non permisceantur nervis) crassior. In crure namq;, & item in brachio<sup>o</sup> nervos quidem hoc primo pari crassiores reperijs, sed qui ex pluribus consuntur nervis, inuicem coeuntibus. Vterq; primi paris nervus sub cerebri basi, quã<sup>d</sup> sinui innititur, cui<sup>9</sup> glandula insidet, cerebri pituitam excipies, antrorsum nonnihil oblique fertur, dextro quidẽ neruo sinistrorsum, sinistro autem dextrorsum protenso. In progressu, moxq; ab ipso ortu, ambo inuicem<sup>9</sup> coeunt, atq; in eum permiscuntur modum, ut dextrum à sinistro nulla prorsus ratione queas discernere. adeò sanè, ut uana penitus sit quæstio, num dexter nervus in hoc congressu dextram obtineat sedem, an uerò sinistrorsum continuo ductu feratur. Quandoquidem ille nervorum coalitus non aliud est, quàm commune corpus, à quo utriq; nerui diceretur pronasci, modò istius corporis ex cerebri substantia origo non indagaretur, atq; illic initia nervorum seiuncta non appa-

Primi paris  
ortus.

Primi paris  
nervorum  
iunctus.

g 13 fi. lib.

7 N. O.

h 1, 2 fi. G.

esp. 12 fi. lib.

1 E.

i Conspici-

tur in 1 fi.

esp. 12

lib. 1.

h 13 fi. esp.

14 fi. 7 fi.

aut simul

cum mem-

branis in 18

1. in 17 12.

13.

i 1, 2 fi. G.

aut 1 fi. G.

14 fi. 7 E

crenum C.

In oculum in-  
gressus, & in  
tunicam quam  
reti comparamus,  
dilatatus.

Nam uisorijs  
sunt perforati.

rent.<sup>9</sup> Nerui à congressu è caluaria ducendi, inuicem mox dirimuntur: & per foramina, ipforum nomine insculpta, in oculorum<sup>9</sup> sedes extra caluariæ cauitatem procidunt, & integri in oculis absuntuntur, non quidem accuratè in posterioris oculi sedis centrum implantati: sed neruus dextru petens oculum, ad dextru magis latus posterioris eius sedis implantatur: qui uerò sinistro oculo proprius est, ad latus sinistrum centri posterioris sedis oculi ingreditur, ac (quemadmodu & dextri oculi nervus) quando oculum subijit, in latam degenerat expanditur ue tunicam, uitreo humori proximam, & mediam oculi sedem duntaxat ambientem, & dilatata cerebri substantiæ admodum similem, ac proinde mollem, nihilq; minus quàm membraneã. unde etiam Anatomicorum nonnulli hanc tunicam, quæ à retis quadam imagine ἀμφιβλυσθηδὸς dicitur, Tunicam appellare haudquaquam dignati sunt. Quòd uerò hæc tunica (aut quomodo cunq; ipsam appellare uisum sit) præcipuum uisus organum à multis habeatur, in oculi constructionis enarratione persequar. In præsentia enim neruos hos, aut oculos prolixius aggredi, omnino præter institutũ foret: quum hic suffecerit dixisse, uisorios neruos illum quem recensuimus ductum citra omnẽ ramorum propagationẽ obseruare: hoc enim (perinde ac dextri nerui cum sinistro mox ab exortu coitum) peculiare rarumq; uisorijs nerui sibi uendicant. Quinetiam inter reliquos corporis neruos, hi duntaxat meatu, qui sensu dijudicari possit, perforati dicuntur, hincq; Græcis νεροὶ διασφαῖ nuncupantur. Cæterum ego huiusmodi meatum mihi aliquando occurrisse, neuti-quam queo asserere: quantum uis etiam canum adhuc uiuentium, & aliorum grandium animalium uisorios neruos, uel hac solũ occasione aggressus sum: & hominis, cuius caput adhuc à decollatione calebat, uixq; quarta horæ parte, quum iam

*Nervorum con-  
gressus ratio.*

quum iam cerebrum pateret, abtruncatum fuerat, nervos non oscitanter spectauerim, ac calente aqua sedulò fouerim. Atq; ut eiusmodi meatus toto nervorum progressu me penitus latuit, ita sanè in mutuo nervorum coitu is nevtiquam se obtulit. utcunq; tamen hunc inibi oportebat esse insignem, si modò nervi ob hoc ex Galeni sententia congregarentur, quo minus simplicia, nobis gemina esse perperam uiderentur. Porro ijs qui de cōgressu hoc meatuq; acriter citra partium inspectionem indies altercantur, non grauabor duo, quæ in congressu animaduerti, hic adijcere, quò & hinc suarum nugarum habeant argumenta. Patauij itaq; adolescens suspēdio necatus, publicæ sectioni adhibitus fuit, cui ante annum dexter oculus à carnifice erutus fuerat: deinde mulier, eodem supplicio affecta, nobis obtigit, cui dexter quoq; oculus ab ineunte ætate emarcuerat, sinistro interim integerrimo. Mulieri dexter nervus toto progressu longè tenuior sinistro uisebatur, non solùm extra caluariæ cavitatem, uerùm in exortu quoq; & in dextra congressus nervorū sede. ac præterquàm quòd dexter tenuis erat, durior quoq; & rubicundior cernebatur, uti sanè & in adolescente: sed dexter non admodum neq; crassitie, neq; mollitie adhuc finistro cedebat. His ille accessit, cuius nervos uisorios illo de quo hic sermo est congressu inuicè non connasci, neq; sese contingere uidimus: sed dexter nonnihil ea sede, qua caluariam egressus fuerat, sinistrorsum, & sinister nonnihil dextrorsum reflectebatur. quasi non coalitus occasione nervi cōgrederentur, uerùm ut cominodè per suum foramen è caluaria prociderent: potissimùm quum etiam hoc ductu progredientes, in oculi posterioris sedis medium non inferātur. Quàm sedulò autem ac sollicitè eius uiri, cui in eum modum nervi dehiscabant, familiares, num illi omnia gemina perpetuò oculis obuersarentur, interrogauerimus, neminem Naturæ operum cognitione flagrantem ambigere fat scio: at nihil aliud resciscere licuit, quàm ipsum de uisu nunquam conquestum fuisse, uisūq; præstanti semper ualuisse, familiaresq; de uisorum duplicatione nihil unquam intellexisse. Quòd uerò Celsius, & alij nonnulli, quum causam rimantur, quamobrè dextra cerebri sede uulnerata, aut alioquin læsa, corporis sinistra pars nervorum resolutione infestetur, integra parte dextra, afferrant, nervos omnes in ortu decussatim ferri, seu nervos à dextra cerebri & dorsalis medullæ sede pronatos, in sinistram corporis regionem distribui, & econtrà nervos è sinistra sede ortos, in dextrū latus ferri, apud me elegantissimum, & inter somniansum ab illis problematum interrogatoribus excogitatum figmentum habetur. quum<sup>m</sup> secundi paris nervorum, ac dein<sup>n</sup> tertij & quarti

*PRÆSENTI  
figura, nervorum quos  
hic describimus ductus  
exprimitur, ac A ce-  
rebri portuuncula in-  
dicat.*



parium, dextri exortus à sinistris aliquot digitorum amplitudine inuicem distent: ut modò de alijs nervis nihil dicam, idq; pariter fileam, quæ uisorios porcorum nervos subinde non continuos, sed perinde ac crurum nervos, quasi è multis funiculis conflatos spectarim: ne in aliam quampiam prolixiorem dissectionationem sermo desleat, præcipuè cum illis dissectionum professoribus, qui dextrum cerebrum penitus à sinistro diremptum, posteris falso tradiderunt.

*m : fig. K.  
n : fig. M.  
L.  
o : fig. Z.*

a 1. 2. fig. K.  
14. 15. fig.  
lib. 7. G.  
b 1. fig. G.  
aut ad cha-  
racteres 1.  
2. 3.  
c 1. fig. G.



ONIV GII<sup>a</sup> secundi exortus, nequaquam ex infima me-  
diaq; <sup>b</sup> quodammodo (quod ad latera spectat) basis cere-  
bri sede, ut <sup>c</sup> uisforiorum pendet. Dein præsentis coniugij  
nerui plurimùm uisforijs crassitie cedūt: quamuis interim  
duritia eos superent, usq; ab illis multum uariant. Paulo  
posterius enim quàm uisforij, ex cerebri basis laterib. prin-  
cipium ducunt, quod hæc cerebri regio nonnihil durior  
illa sit, à qua uisforiorum origo sumitur. Atq; id meritò accidit: siquidem secun-  
di paris neruos musculis inferendos, ipsis uisforijs duriores esse oportuit. Defer-  
tur enim neruus dexter (quod & de sinistro, nisi peculiariter sermoni quid ad-  
datur, in neruorum serie semper subaudiendum est) sub cerebri basis latere ad  
<sup>a</sup> foramen in oculi sedis radice sibi cum alijs aliquot<sup>a</sup> uasis commune. Quam-  
primùm autem è caluariæ excidit cavitare, in ramos dissectus, septem <sup>f</sup> muscu-  
lis oculo proprijs offertur, illorum motibus subministrans.

DE TERTIO PARI NERVORVM  
cerebri. Caput vi.

d 1. 3. fig.  
cap. 12. lib.  
1. G.  
e fig. cap.  
14. lib. 3. G.  
de a x. 7  
1. 2. fig. cap.  
2. lib. 3. L.  
f figura  
ca. 11. lib. 2.



ERTIVM par duplici radice in utroque latere princi-  
pium sumit: una quidem crassiore, cui opportunè tertij  
paris nomen accommodaueris: <sup>b</sup> altera autem longè tenuio-  
re & duriore, & neq; in ipso exortu, neq; etià in progressu,  
crassiori radici commissa. Huius enim initium non modico  
in posteriora intervallo, ab illius exortu distat: adeò sa-  
nè, ut uerius graciliore hanc radicem peculiare par, quàm  
tertij paris portionem, quis esse assereret. At quum omnes Anatomicorū pro-  
ceres hanc tertio pari ascripserint, nihil sanè obstitit, manifestioris doctrinæ  
studio, & me etiam cum tertio pari tenuem illam posterioremq; radicem ag-  
gredi: prius tamen studiosos admonentē, in libro de Neruorū sectione (quem  
Galen libri uix fragmentū censuerim) parum rectè tertium par secundo mol-  
lius esse tradi: & in nono de Partium usu libro Galenū parum uerè astruxisse,  
tertiū par in duos truncos, aut in eas quas hic enarrare statuimus radices, tum  
primùm distribui, quum duram cerebri perforauit membranam, perinde ac  
si utrisq; radicibus unicus tantum esset caudex, unicumq; principium. Exoritur  
itaque gracilior hæc tertij paris radix à latere basis cerebri, ubi dorsalis me-  
dulla ab ipsa <sup>f</sup> initium ducere auspicatur. Hinc recto tramite sub cerebri basi an-  
trorsum progrediens, duram cerebri membranam perforat: & secundo dein  
neruorum pari attensa, cum ipso per <sup>f</sup> commune foramen in oculi sedem pro-  
cidit, ilico in quatuor dissecta propagines: quarū <sup>f</sup> prima sursum in adipe oculi  
musculis obducto excurrans, per <sup>f</sup> peculiare foramen ad frontis cutem & mu-  
sculos huius sedis substantiam digeritur, frontis cutis & palpebræ superio-  
ris motibus præfectam. <sup>a</sup> Secunda propago deorsum ducta, mox in <sup>b</sup> foramen  
sibi priuatim exculptum fertur, quousq; in anteriorem superioris maxillæ se-  
dem prolabatur, ac multiplici serie dispensetur in <sup>c</sup> musculos superius labrum  
& nasi alam extrorsum in suo latere mouētes, ac demum in ipsum labrum, &  
incisoriorum dentium gingiuas. <sup>m</sup> Tertia propago, <sup>n</sup> foramine etiam priuato  
utens, post <sup>o</sup> carunculam in interiori angulo oculi conspicuam, narium adit ca-  
uitatem, inibi in narium degenerans <sup>p</sup> tunicam, & ramulū exporrigens <sup>a</sup> tenui  
Z & mem-

Duplex utrin-  
que tertij paris  
radix.

Tenuioris va-  
dis ortus &  
series.

a 1. 2. fig. M.  
14. fig. lib.  
7. L.  
b 1. 2. fig. L.  
14. fig. lib.  
7. H.

e 1. fig. D.  
d 1. 2. fig. K.  
e 1. 2. fig. ca.  
12. lib. 1. G.  
f 1. fig. N.  
4. musc.  
tab. H.  
g 1. 2. fig. cap.  
12. lib. 1. A.  
h 1. musc.  
tab. A. de-  
in C.  
i 1. fig. O.  
4. musc. ta. I.  
h 1. fig. cap.  
12. lib. 1. B.  
l 1. musc. ul.  
tab. H. F.  
m 1. fig. P.  
n 1. fig. cap.  
12. lib. 1. C.  
o 1. 2. fig. ca.  
14. lib. 7. D.  
p 1. fig. inf.  
rior p.  
q 1. musc. ul.  
tab. K.



*Craſſioris radi-  
cis origo, & di-  
ſtributio ſe-  
ries.*

& membraneo musculo, in troſum naſi alam contrahenti. Quarta propago, iam dictis craſſitie non inferior, per<sup>r</sup> foramen, ſeu ſciſſuram potius, quæ inter primum maxillæ ſuperioris os, & cuneum imitans os, in extimo latere ſedis oculi conſpicitur, ad internam ſedem<sup>r</sup> temporalis muſculi contendit, tota in eum muſculum abſumenda. Craſſior tertij paris radix, à latere baſis cerebri, anteriùs tamen, & penitiùs, ſeu iuxta dextri & ſiniſtri medium magis, quàm enarrata modò radix, principium ſumès, rectà deorſum tendit, foramē, quod ipſi & quarto neruorum pari cælatur, perlabens. Hæc ſtatim ab egreſſu<sup>r</sup> propaginem diffundit, quæ uitis aut cucurbitæ capreoli pampini<sup>r</sup> ue inſtar inuoluitur, duriorq; paulatim efficitur, ac<sup>r</sup> binos tandem quinti paris neruorum cerebri ramulos (quorū ſeriem poſtea recenſebo) in conſortiū admittens, ipſiſq; unitus, in temporalem muſculum inferitur: ac in<sup>r</sup> illum quoq; qui à iugali oſſe enatus, priuatim manſorius nobis dicitur, ramulos porrigit: deinde & muſculis buccas mouētibus, ipſiq; demum faciei in buccis cuti etiam furculos offert. Poſtquàm uerò craſſior tertij paris radix propaginē hanc capreoli modo in-tortam exprompſit, nonnihil deorſum magis deſcendens, furculum deriuat, qui antrorſum repens, gingiuē molarium dentium, ipſiſq; adeò dentibus ſoboles ſeriatim diſtribuit. Dein priuſquàm maior hæc tertij paris radix decliuſ du-cta, linguam cōtingat, ramum poſteriori ex parte germinat utcūq; inſignem, qui muſculo in ore deliteſcenti, & maxillam inferiorē attolenti inſertus, infe-rioris maxillæ<sup>r</sup> foramen adit, hic ubi is muſculus ipſi inſeritur cōſpicuum. Ra-mus ille in foramē delapſus, antrorſum fertur, ſuiq; lateris dentium inferioris maxillæ radicibus<sup>r</sup> ſingulas ferè ſoboles offert, quorum beneficio dentes inter cætera hominis oſſa euidentiùs triſtantium occurſum ſentire credimus. Neq; uerò ramus hic uniuerſus in dētes abſumitur: imò non minima ipſius portio per<sup>r</sup> foramen in anteriori maxillæ ſede inſculptum excidit, dextræ ſedi infe-rioris labri cōplures furculos deriuans. At<sup>r</sup> maior portio craſſioris tertij paris neruorum radicis, quando linguæ baſi cōmittitur, cum alterius lateris neruo lin-guæ tunicam efformat, aptum ſaporibus dignoſcēdis inſtrumentum. Deinde & exiguos quoque furculos penitiùs in linguæ ſubſtantiam diſpenſat. Horum enim & tunicæ linguæ producendorum gratia, tertium par potiſſimū à re-rum Opifice creatum arbitramur: atq; ut<sup>r</sup> primum par uiſui, quintum uerò auditui ſubſeruit, ſic hoc tertium guſtui ſamulari annuimus.

#### DE QVARTO PARI NERVORVM cerebri. Caput VII.



**H**O C<sup>r</sup> par craſſiore tertij paris radice nonnihil gracilius du-riusq; eſt. exoritur autem à dorſalis medullæ principio, poſteriori paulo quàm tertium par: ſed antrorſum modicē tenſum, poſteriori tertij paris ſedi committitur, atq; unā cum illo per<sup>r</sup> commune ipſis foramen ex capitis cauitate, ſeu cerebri ſede, ad palatum elabitur: quò ſimulatq; perue-nit, in furculos quorūdam partitum, in palati degenerat<sup>r</sup> tu-nicam: quæ quum linguæ tunicā aliquantulo ſit durior, iure etiam palati tu-nicam ſenſu hebetiore quàm linguæ<sup>r</sup> tunicam donari credimus.

#### QVINTI

QVINTI NERVORVM CEREBRI

paris series. Caput VIII.



VINTVM<sup>a</sup> par nonnihil quarto crassius, ac ueluti pluribus enatum furculis, inuicem mox ab ortu cōnexis, principium ducit, ex media propemodū dorsalis medullæ sede,<sup>b</sup> eius partis, quæ à medullæ exortu usq; ad eam regionem pertinet, quā hæc è caluaria in uertebbras labitur, ac dorsalis spinalis uel medulla uerè nuncupatur. Hoc quintum par uniuersum per<sup>c</sup> foramen fertur impense tortuosum, & priuatim ipsi incisum, quousq; in cauitatem pertingat, auditus organo præparatam, in qua quintū par uariè discinditur, & propagines quasdā membranæ modo<sup>d</sup> dilatatas, eius cauitatis sedibus offert, auditus organi nō infimam partem cōstituens. Preter has uerò propagines, duos educit neruulos, seorsum singuli per propriū foramen elabentes. Vnus quidem per<sup>e</sup> transuersum ducitur foramen, quod etiam admittit<sup>f</sup> uenulam in auditus organū excurrentem: atq; hic neruulus non procul ab egressu tertij paris<sup>h</sup> ramo commiscetur, instar uitis capreoli inuolutus. Alter uerò neruulus per<sup>k</sup> foramen repit impense arctum, & insigniter quoq; tortuosum, & immixtam ipsi setam aut plumbeum filum non admittens, ob idq; etiam Anatomicis cæcum appellatū. Neruulus iste transuersum supra<sup>i</sup> musculū ducitur, qui à iugali osse pronatus, inferiorem maxillam mouet: ubi uerò ad anterius usq; eius musculi latus antrorsum prorepit,<sup>m</sup> dicto iam & capreoli forma implexo tertij paris ramo cōmiscetur, in genarum cutem & musculos buccæ motuum autores digerēdus. Atq; illi demum duo sunt neruuli, quos illi tertij paris ramo commisceri, superius dicebam. Porro quemadmodū<sup>n</sup> iuxta præcipuam tertij paris radicem, alia quædam radix enascitur, tertio pari ascripta: simili etiam ratione iuxta quintū neruorum par, interius paululū<sup>o</sup> alia exoritur radix, quinti paris radice multo gracilior, ac quo dammodo durior. Hæc sursum uersus priora sub cerebri basi aliquandiu protensa, duram cerebri membranam perforat: ac per<sup>p</sup> proprium foramen, sub secundi paris foramine exculptū, è caluaria procidēs, in<sup>q</sup> temporalem musculum, illumq; digeritur, qui in ore delitescens, inferioris maxillæ ad superiora motus unā cum alijs autor censetur. Hanc radicem cum sua cōiuge liceret peculiaris cōiugij loco censere. quo minus tamen aliorum Anatomicorum (qui eas radices prorsus ignorarūt) numerū perturbem, ipsas quinto pari ascribam: ad eum uidelicet modum, quo minorē tenuiorem uel tertij paris radicem tertio pari superius adnumeratā reliqui. Ad temporalē itaq; musculum<sup>r</sup> quinq; neruorum pertingunt propagines: prima quidem à graciliori tertij paris radice, secunda à maiori radice, tertia autem & quarta à quinti paris primario educuntur neruo: quinta autem is demum neruus est, quem iam quinto pari connumerabam. Neq; sanè frustra, atq; ut fors fert, tot neruorum soboles temporali musculo Natura uidetur porrexisse: sciebat enim, hunc musculum pro sua mole omnium corporis musculorum ualidissimam functionem obiturum. Item quum haud ignoraret, quā molles illi essent nerui, quos à cerebro eduxit, summa mehercule prouidētia illos, quantum licuit ex ossium contactu, itinervisq; longitudine, uoluit indurescere. Nulli enim non obuium est, quā callidè furculum instar capreoli inuolutum, duriores effecit, quòd is solus ossi minimo spacio contiguus sit: alios autem non inuoluit, quòd longo interuallo ossibus attendantur, ipforumq; nonnulli per tortuosos & inuolutos ossium meatus etiam porrigantur.

Neruum iuxta  
quinti paris ra-  
dicem princi-  
pium ducens.

Quot neruorū  
propagines  
temporali mu-  
sculo offerantur.



**N**TER cætera neruorū paria, in caluariæ cauitate principium ducentia, nullum æquè sparfam ramorum edit sobolem, neq; in tam multas easdemq; uarias inferitur partes, atq; sextum cerebri neruorum coniugium, quod paulo inferius quàm quintum par, aliquot distinctis & à se inuicem diremptis furculis initium sumit, qui mutuo mox ab initio commissi, unum efformant neruum, qui per<sup>r</sup> foramen caluariæ egreditur, quod<sup>r</sup> minorem arteriæ soporalis ramum, & grandio-<sup>r</sup> diorem internæ iugularis uenæ ramum, simul admittit. Neruus hic non procul ab egressu in musculos posteriorem ceruicis sedem occupantes<sup>r</sup> propaginem diffundit, numerosa utcunq; serie in soboles digestam: quarum præcipuè<sup>r</sup> musculo exporriguntur scapulam mouentium secundo. Ipse autem sexti paris truncus, soporiæ arteriæ, & internæ iugulari, ac<sup>r</sup> septimo pari coherens, & simul cum ipsis membranæ interuentu connexus, ad laryngis usque latera protenditur, inibi portionem à septimo pari<sup>r</sup> assumens, illaq; se adaugens. Deinde sextum par, quum hanc adciuit portionem, laryngis musculis<sup>r</sup> ramulos transuersim exhibet. Sunt autem illi musculi, duo primæ laryngis cartilagini duntaxat proprii, qui ex stomacho, gulæ<sup>r</sup> ue posteriori sede pronati, eius cartilaginis lateribus inferuntur. deinde<sup>r</sup> duo, tertiæ cartilaginis basim occupantes, &<sup>r</sup> duo primam cartilaginem secundæ cōmittentium. Hinc uerò sextum par, soporali arteria & interna iugulari<sup>r</sup> concomitatum, ad thoracis usque elatiorem descendit sedem, ac mox<sup>r</sup> insignem utcunq; propaginem ad primæ thoracis uertebræ latus deriuat, quæ sub membrana costas succingente, secundum costarum radices prorepens, à<sup>r</sup> neruis in costarum interualla ex dorsali medulla porrectis, furculos quosdam assumit. Quum uerò hæc propago, eiusmodi adaucta furculis, septum transuersum prætergressa<sup>r</sup> est, in organa nutritioni subseruientia, uti mox audies, dispensatur. Præter hanc propaginem, sexti paris neruus iuxta superiorem thoracis sedem<sup>r</sup> ramulos<sup>r</sup> musculo offert, à pectoris osse & clauicula ad manillarem capitis processum deducto, & capitis motibus subseruienti. deinde &<sup>r</sup> musculo, qui hinc à pectore os<sup>r</sup> u referens accedit. præterea &<sup>r</sup> illi, qui hinc ad infimam cartilaginis primæ laryngis sedem perfertur. Huiusmodi sanè utrorumq; sexti paris neruorum, priusquam thoracis cauitatem penetrit subeant, occurrit series. Quæ autem adhuc enarranda superest, mox atq; hic figuram contextui interiecero, describetur.

*Q uia nuda septem neruorum cerebri parium delineatio, ad finem primi Capitis posita, omnem sexti paris seriem ostendat, atq; ita pariter neruos recurrentes exprimat, non abs re me facturum arbitror, si peculiararem eorum tabulam unâ cum arteria magna & aspera partibus, quantum scilicet ad ipsorum seriei ostensionem attinet, hic contextui Capiti interiecero, quoniam horum neruorum adeo frequens medicis sit mentio, & intuitus pariter ob summum Naturæ miraculum nulli non sit longè iucundissimus.*

*A Arteria magna ex sinistro cordis uentriculo exortus, ubi hæc duas coronales promittit arterias.*

*B Arteria magna truncus, deorsum ad spinam reflexus.*

*C Arteria magna ramus, oblique sursum ad primam sinistri lateris costam tendens, ac in sinistrum postea brachium excurrent.*

*D Arteria magna portio, iugulum petens.*

*E Arteria transuersim in dextrum brachium procedens. Quas uerò hæc, & illa quam D insigniuimus, soboles diffundant, ex nuda arterie magna figura, decimo Capiti tertiæ libri subiuncta, petas licebit.*

*F, F Soporalis dextri lateris arteria.*

*G, G Sinistra soporalis arteria.*

*H Aspera*



H *Asperæ arteriæ caudex.*

I, K *Duo asperæ arteriæ trunci, in quos hæc primum ad pulmones fin-  
ditur.*

L *Larynx, asperæ uel arteriæ caput.*

M *Glandula, laryngis radici ad latus utring, connata.*

N *Dexter sexti nervorum cerebri paris caudex.*

O *Sinister sexti paris caudex.*


P *Dextri nervi ramuli, ad arteriam quæ dextræ exporrigitur axil-  
le, reuoluti, & in unum coeuntes nervum, quia interdum unico con-  
stat ramulo.*

Q, Q *Dexter nervus recurrens.*

R *Sinistri sexti paris caudicis furculi, qui ad arteriæ magnæ truncum  
uersus inferiora corporis deductum, reflectuntur.*

S, S *Sinister nervus recurrens. Reliquæ uero sexti paris nervorum pro-  
pagines, hic passim detruncatæ, in nuda cerebri nervorum tabula  
spectandæ sunt.*

Quum itaq; dexter sexti paris nervus, thora-  
cis cavitatem ingreditur, ac inter arterias & ue-  
nas in iugulo repit, ab interiori ipsius latere mo-  
dò tres, modò duos inuicem succedentes dif-  
fundit ramulos, reuersum dextri lateris ner-  
uum constituentes. Ramuli enim isti ad<sup>a</sup> arte-  
riam, quæ in dextram alam exporrigitur, ueluti  
ad trochlei rotulam reuoluti, simul coeunt,  
nervumq; unum efformant, ad dextrum aspe-  
ræ arteriæ latus sursum excurrentē. mox nam-  
que ex illis ramulis (quorum loco interdum  
simplex uisitur) unus conflatur nervus, qui dextrum asperæ arteriæ latus pe-  
tit: & membranæ interuentu ipsi adnexus, ad dextrum usq; laryngis latus pro-  
perat, glandulæ incumbens, quæ alijs glandulis neq; colore, neq; substantia re-  
spondens, laryngis radici hic in dextro latere (uti in sinistro altera) connasci-  
tur. Ilico autem atq; nervus laryngem contingit, in plures partitur soboles, in  
sui lateris musculos digerendas. Qui uerò illi sint, posteaquàm sinistrum recur-



Dexter nervus  
recurrens.

a P. 6. 2  
fig. 1.  
b 6 fig. lib.  
c 6 b.  
c Q. 2.  
fig. m.  
d 6. 1. cap.  
12 lib. 3. Y.

f O. fig. 6  
lib. 6. d.  
g C. 1. cap.  
12 lib. 3. D.

b D. 1. cap.  
12 lib. 3. i.  
i R. 2. fig. o.  
h 6 fig. lib.  
c 6.  
l S. 2. 1. fig.  
p 6 fig. lib.  
c 6. g.

m 1. 7. cap.  
21 lib. 2.  
P. R.

Sinister re-  
current.

rentem nervum sermone ad laryngem deduxero, subiungam. Sinister itaque  
sexti paris nervus, iam thoracis cavitatem ingressus, arteriæ in sinistrum bra-  
chium propagandæ ramulos, qui sursum reflecterentur, exporrigere nequit:  
quod ea obliquè sursum, non autem dextræ arteriæ modo, trāsuerlim, in alam  
contendat. Haudquaquam enim æquè tuta ad obliquum atq; ad transuersum,  
chordæ alicuius reflexus perficitur: imò hæc, si ad obliquum baculum reuol-  
uitur, sensim sursum conscendit, eandem reflexus sedem nunquam seruans.  
ac proinde sinister nervus tantisper uersus cordis basim descendit, quousque  
extra cordis inuolucrum arteriæ magnæ contingat<sup>a</sup> truncum, ad spinam de-  
orsum explicatum. Atq; hîc mox<sup>1</sup> tres, aut etiam<sup>2</sup> pauciores à nervo educun-  
tur furculi, qui ad arteriæ truncum, quæ is ad spinam deflectitur, reuoluti, inui-  
cem uniuntur, sinistrumq; recurrentē nervum constituunt: qui sursum pro-  
perans, membranæ beneficio asperæ arteriæ sinistro lateri adnectitur: ac cum  
primum laryngem contingit, non minus quàm dexter nervus in ramos deri-  
uatur, qui omnes in sui lateris musculos, deorsum capita habêtes, cessant. Sunt  
autem<sup>3</sup> hi, si utriusque lateris musculos iunxeris, quatuor, secundæ cartilagini  
tertiam nec tentes, quorum beneficio tertia cartilago retrorsum atq; in latera  
Z 3 ducitur,

*reuerſui ner-  
ui cur facti  
credantur.*

ducitur, & laryngis<sup>n</sup> lingula adaperitur. Præterea<sup>o</sup> duo tertiam cartilaginem primæ iungentes, qui laryngis rimulam seu lingulam claudunt, ac soli prope- modum tunc expirationi obſtant, quum egerentes, ui ſpiritu retinemus, ac in- terim quantum poſſumus, cæteris muſculis expirationem molimur. His præter alios nonnullos accedunt linguæ<sup>p</sup> muſculi, ab oſis v referentis medio, ut lin- guam moueant, pronati. Quum itaq; præſentes muſculi inferius ſua ſortiuntur capita, atq; mouendum corpus deorſum attracturi erant, neceſſum eſſe credi- mus, animalẽ ſpiritum ab inferioribus partibus ſuſum quodãmodo ipſis de- duci. Quod quanta in duſtria immenſus corporis noſtri Opifex in horum ner- uorum (qui Græcis *ἀλυστομοῦντες* uocantur) cõuolutione molitus fuerit, etſi ex ipſa diſſectione, & ſuccincta hac neruorũ diſtributionis narratione digno- ſcere poſſis: nihilominus Galenum, qui hos neruorũ inflexus omniũ primũ a ſe in uetos aſſerit, adeundũ hortor, ubi in ſeptimo de Partium uſu, ueros Deo celebrat hymnos, magiſq; attentam requirit mentem, quàm ſi Eleuſinia & Sa- mothracia, uel aliam quamcunq; celebrationem diuinam, æquis auribus aſtans, in tentuſq; ijs quæ ſuorũ dicunturq; à ſacerdotibus, audias. Iure enim Galenus ſibi perſuadet, celebrationem inibi traditam his nulla parte inferiore eſſe, neq; minus oſtendere incredibile ſapientiam uirtutemq; omnium conditoris Dei.

*Reliqui ſexti  
paris in thoraci  
amplitudi-  
ne ſerues.*

Porrò ſexti paris nerui, poſtquàm reuerſiuos exprompſere, ac iam cordis ba- ſim ſpectat, ramulos notatu dignę craſſitudinis<sup>q</sup> in pulmonis tunica<sup>r</sup> & mem- braneum cordis inuolucrũ diſpergunt. Item à ramulis ſiniſtræ cordis inuolu- cri ſedem implicatibus, atq; à ſiniſtro ſexti paris neruo depromptis, ſurculus quidam cordis inuolucrũ inibi permeat, uel id ſiniſtro lateri<sup>r</sup> arterialis uenæ unitur. Atq; hîc ſurculus oppidò quàm tenuis, & non niſi accuratiſſimè ſectio- nem adminiſtrati obuius, ipſi arteriali uenæ adnaſcitur: & ad ſiniſtrũ ipſius la- tus, uerſus poſteriora tamen magis, exporrectus, in cordis baſim fertur, inibi mox in ſoboles capillorũ modo gracillimas cõſumptus, ac cordis baſis ſuperfi- cie uix proprius. Quod nunc ex neruis ſexti paris<sup>n</sup> reliquũ eſt, deorſum ad ſto- machum deſertur: ac dexter quidem dextro ipſius atteditur lateri, ſiniſter au- tem ſiniſtro. Mox uerò atq; nerui ſtomacho, membranæ interuētu laxè adne- ctuntur, ſinguli in binos partiuntur ramos, adeò oblique ſecundũ ſtomachum conuolutos, ut dextri nerui rami ſiniſtræ ipſius ſedem in progreſſu obtineant, ſiniſtri autem rami dextram ſedem amplexentur. Atq; ita quatuor præſentes

*Sexti paris  
nerues in nutritio-  
nis organi.*

rami ſeptũ tranſuerſum unà cum<sup>a</sup> ſtomacho permeat, nullos prorſus in tranſ- greſſu ſepto ſurculos offerentes. uerũ ſparſa admodũ ſerie ſuperius uentriculi oſ<sup>v</sup> ambiunt, ramos in priora & poſteriora corporis uentriculi ſpargentes. Ab ijs ramis, qui dextrum huius oriſcij latuſ implicat, propago utcunq; in ſignis depromitur, quæ per uentriculi ſuperiora ſecundũ ipſius latitudinẽ in ſerius uentriculi oriſcium accedens, in progreſſu anteriori poſterioriq; uentriculi ſe- dibus ſoboles quaſdam diſſundit. Quum uerò illa propago in ſerius oriſcium ſuperauit, uenæ portæ inſtrata, in iecoris cauum<sup>r</sup> properat, ibidẽ in iecoris tu- nicam abſumẽda. Dextri nerui ſexti paris<sup>n</sup> ramus, quem ante recurrentium neruorum principia, coſtarũ radicibus ſub tunica coſtas ſuccingẽte exporrigi, aliorumq; neruorum per earundem interualla excurrentiũ congreſſu augeri docuimus, ſimulatque ſeptum tranſuerſum unà cum<sup>a</sup> grandi arteria præter- greſſus eſt, propagines diſſundere incipit: ac<sup>r</sup> primam quidem inferiori mem- branæ omẽti offert, tranſuerſim iecoris cauum adeuntẽ. Hæc in ipſo ductu in- feriori membranæ omẽti<sup>r</sup> ramum exhibet, qui deorſum tenſus, & in ſurculos diſſectus, tum ipſi membranæ omenti in dextra parte implicatur, tum etiam

*n in ſi. 11,  
12, 13 cap.  
21 lib. 2.  
o 8, 10 fig.  
cuiusde cap.  
4, 6.  
p 12 fig.  
cap. 10 lib.  
2 D, D.*

*q 2 fig. q.  
r 2 fig. r.  
s 6 fig. lib.  
6 h.  
t cuiusdem  
fig. 1.*

*u 2 fig. f.  
v 14, 15  
fig. lib. 5  
T, V.*

*x 7 muſc.  
tab. x.  
y 2 fig. t.  
z 2 fig. u.  
v 15 fig.  
lib. 5 X.  
a 2 ſi. x. c.  
12 fig. lib. 5  
T. c. 15  
fig. X.  
b 2 fig. h.  
c 2 fig. lib.  
d 7 muſc.  
tab. q.  
e 2 fig. y.  
Deimpe-  
ria ſeria-  
tim 3 c. 4  
ſi. lib. 5. ubi  
cum uena  
arteria  
horũ ner-  
uorũ occur-  
rit ſerius.  
f 2 fig. z.*

colo

colo intestino, ubi id huic membranæ tanquam ad mesenterium cõmittitur. Deinde<sup>e</sup> alius ramus ab illa propagine duodeno intestino, & ieiuni initio deducitur, adeò gracilis, ut interdum conspici nequeat. Post hunc alius longè<sup>b</sup> crassior superiori membranæ omenti depromitur, qui dextram sedem fundi uentriculi perreptans, multas soboles uentriculo & ipsi omento cõmunicat. Quod autem primæ illius propaginis adhuc<sup>c</sup> superest, iecoris cauo & bilis uesiculæ furculos præbet. Secundam uerò<sup>d</sup> propaginē sexti paris ramus, dextri lateris costarum radicibus attensus, in dextrum renem & pinguem membranam ipsi obductam digerit.<sup>m</sup> Tertiam porrò dictis iam grandiorē diffundit ad dextram mesenterij sedem, & in intestina mesenterio hic connata spargendā. Quod autem eius rami<sup>n</sup> reliquum est, subinde in uescam, & in mulieribus in uteri fundum dextra ex parte nonnihil cessat: uescica enim & uterus suos quoq; nervos à dorsali medulla in sacro osse deducta mutuātur. Ad eundem ferè modum sinistri sexti paris nervi ramus, costarū exporrectus radicibus, digeritur.<sup>o</sup> Propaginem enim inferiori membranæ omenti largitur, transuersim in lienis cauum porrectā: quæ in progressu, antequam lienem cõtingat,<sup>p</sup> duos diffundit furculos, in humiliorē omenti membranam, & colum intestinū, quā uentriculo hic attēditur, dispersos. Deinde<sup>q</sup> aliam sobolē emittit, illis furculis crassiorē, quæ sinistram fundi uentriculi sedem perreptans, uentriculo ipsiq; superiori membranæ omenti (qua etiam soboles ipsa suffulcitur) per multa germi na deriuat. Mox quoq; à<sup>r</sup> propaginibus, lienis cauo fe inferentibus, exiles ramuli sinistrum uentriculi latius accedunt, illis concommitati uenis ac arterijs, quas à lienem petentibus uasis huc reflecti, antea diximus. Secundam propaginem ramus ille sinistris exporrectus costis, sui lateris mesenterio, ipsiq; commissis intestinis offert, & post hanc<sup>s</sup> tertiam sinistro reni exhibet, ac demum ipsius<sup>t</sup> reliquo sinistram uescicæ ac fundi uteri sedem interdum amplectitur. A<sup>u</sup> propaginibus in mesenterium sparsis, interdum cum<sup>v</sup> feminalibus uenis & arterijs furculos ad testes usque deductos me animaduertisse arbitror. Huiusmodi itaque sexti paris neruorum cerebri est series.

DE SEPTIMO PARI NERVORVM  
cerebri. Caput x.



ERVORVM cerebri<sup>a</sup> septimum ac ultimum par, uti cæteris paribus durius est, sic quoque ex duriori enascitur principio: incipit enim aliquot inuicem distantibus furculis à dorsali medulla,<sup>b</sup> ubi modò caluariam est egressura. Hinc in anteriora modicè tensum, & ipsius furculis in unum coeūtibus, per<sup>c</sup> foramen procidit, sibi priuatim exculpum. Simulatq; uerò septimum id par è caluaria lapsum est,<sup>d</sup> sexto cohæret pari, &<sup>e</sup> propagines aliquot dispensat<sup>f</sup> musculis, qui à processibus stylium imitantibus principium ducunt: ex quorum numero est alter tertij paris musculorum ovis<sup>g</sup> u referentis peculiariam, isq; qui inferiorem maxillam deorsum trahit, & alius lingue proprius. Septimum par hinc ad linguæ usq; radicem descendens, in plures diducitur<sup>h</sup> soboles, quæ in linguæ musculos, & ovis<sup>i</sup> u referentis, & in omnes laryngis musculos, superiori Capite non enumeratos, implicantur, eorumq; musculorum motibus præsent. Verùm præter illas soboles, septimum par non minimam ipsius portionem<sup>j</sup> sexto pari neruorum cerebri iuxta linguæ radicem inibi<sup>k</sup> offert, sextum par illa portione adaugens.



PRIMA TRIVM FIGVRARVM, QVAE  
SVBSEQUENTIBVS CAPITIBVS  
communes habentur.

*PRAESENS* figura duabus modo consequentibus figuris, quæ nervorum à dorsali medulla prodeuntium nudam seriem ostendunt, potissimum subseruit. Hac namq. sola dorsalis medulla, ab ea sede, qua è cerebri basi principium sumit, ad extremum ipsius usq. finem, ex humiliori sacri ossis sede procidentem, delineatur.

*A* Dorsalis medulle initium, è cerebri basi pronatum.

*B* Hac regione dorsalis medulla, calvarie amplitudine egrediens, primam cervicis subit vertebra: adde, ut ipsius pars, adhuc in calvaria consistens, ac quinq. quodammodo nervorum cerebri posteriora educens paria, ab *A* ad *B* metiatur.

*C* Hac sede dorsalis medulla non amplius simplex, ac velut solida, deorsum ducitur: verum imaginem refert multorum funiculorum, qui simul commissi, recta tenduntur.

3, 4, 5, 6, 7 Hæ characteribus nervorum radices notantur, à dorsali medulla, priusquam è calvaria labatur, prodeuntium. Sunt autem radices hæ eorum cerebri parium, quæ singulis characteribus indicantur. Numeri autem in dextro figure latere repositi, triginta nervorum indicant paria, quæ à dorsali medulla, in dorsi ossibus iam consistente, producuntur, uti in characterum adhuc reliquorum indice modo explicabimus.

*D, 7* Inibi ubi dorsalis medulla, iam dorsi ossa subiens, primum ipsius nervorum par educti, *B* conspicitur, quod cum *D* in sinistro latere, & character 7 in dextro, intervallum dorsalis medulla denotat, cervicis vertebra comprehendens, septemq. ex illis proferens paria.

*E, 19* Duodecimo pari nervorum, quos dorsalis medulla in thoracis vertebra contenta profert, *E* & 19 adhibetur. atq. ita etiam media inter *D* & *E*, aut 7 & 19 consistentia undecim paria, citra characterum operam sunt obvia.

*F, 24* Quinto pari eorum nervorum, quos dorsalis medulla, lumborum vertebra complexa, emittit, *F* & 24 accommodavimus. adde, ut inter *E* & *F*, aut inter 19 & 24, etiam reliqua quatuor occurrant paria, lumborum vertebra ascripta.

*G, 30* Sexto pari nervorum, à dorsali medulla in osse sacro reposita prodeuntium, *G* & 30 accommodavimus, ita ostensuri sex nervorum paria, & dorsalis medulla partem, ad sacrum os relata.

*H* Dorsalis medulla extremum, quod inconiugatum ab ossis sacri fine procidit.




TRIGINTA

TRIGINTA PARI-  
QVAE A DORSALI ME-

BRIS CONTENTA, ORIGI-  
delineatio, quae trium subsequen-  
figurarum secunda


VM NERVORVM  
DULLA, DORSIOSSI-

NEM DUCUNT, NUDA  
tibus Capitis communium  
numeratur.



TERTIA TRIVM FIGVRARVM SVBSEQUEN-  
TIBVS CAPITIBVS COMMVNIVM, QVAE OSSIVM

DORSI CONTEXTVM POSTERIORI FACIE ITA COMMONSTRAT,  
atq; modo precedens eundem anteriori facie oculus subiicit. Deim uniuersa dorsalis medulle nervorū series hac  
figura depingitur, quae superiori figura minus apte spectari potest, & cui characteres non satis cōmode illic ascri-  
bere licuit. Ceterum in utriq; figuris dorsalem medullam adhuc in dorſi ossibus repositam finximus,  
ut nervorum parium numerus & egressus in procinctu oculus esset, quodq; iam ante  
in prima figura, dorsalis medulle ossibus libera effi-  
giem proposuimus.



CHARA.



HUMANI FABRICA LIBER IIII.  
CHARACTERVM SECVNDÆ ET TERTIÆ  
FIGVRARVM, QVIBVS DORSALIS MEDVL-  
læ nervorum series exprimitur, Index.

529

QVANDO QVIDE M hic characterum Index ad duas nunc præcedetes pertinet figuras, quæ mul-  
tos characteres unâ habent communes, & dein plerofq; forſim proprios, non inopportune has notas 2,3 chara-  
cteribus pro ipſorum ratione ſubſcribam. & licet numeri characteres in figuris paſſim quoq; ſint obvi, notis ta-  
men illis modo ſubijungendis parum obſcuritatis acceſſurum arbitror.

A 2,3 Dorsalis medullæ ſedes, qua primum ea uertebraſ ingreditur.

I, 2, 3, 4, 5, 6, 7.2 Septem cervicis uertebrae.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.2 Duodecim thoracis uertebrae.

20, 21, 22, 23, 24.2 Quinq; lumborum uertebrae.

25, 26, 27, 28, 29, 30.2 Sex ſacri oſis oſſa. Os autē quod coccyx nobis in homine dicitur, hic non appropinquum,  
quia dorſalem medullam non continet, nulluſq; nervus ab ipſo elabitur. Cæterum numeri characteribus, quibus  
iam dorſi oſſa inſignimus, etiam dorſalis medullæ nervorum paria indicabimus, quæ ad elatiorem ſedem eius  
ſpectant oſis, cui numerus inſcribitur. Priuſquam tamen nervorum ſeriem nunc explicabimus, dorſi oſſa in ter-  
tia figura notabimus.

B 2 Prima cervicis uertebra.

C 3 Primæ thoracis uertebra. atq; ita à B ad C ſeptem cervicis notantur uertebrae.

D 3 Prima lumborum uertebra. à C itaq; ad D duodecim thoracis uertebrae indicantur.

E 3 Principium oſis ſacri. unde etiam à D ad E quinq; lumborum uertebrae in conſpectum ueniunt, & ſub F to-  
tius ſacri oſis poſterior ſedes.

F 3 Primi paris nervorum dorſalis medullæ iam in uertebraſ poſitæ poſterior propago.

G 2,3 Poſterioris primi paris propaginis ſeries. notatur autem præcipue ramus ipſius, tranſverſum primæ uertebrae  
proceſſum accedens, & imbi in mufculos aliquot digeſtus.

H 2 Anterior primi paris propago.

I 3 Secundi paris poſterior propago. atq; hoc etiam characterẽ eius propaginis minor ramus inſignitur.

K 3 Poſterioris ſecundi paris propaginis craſſior ramus.

L 3 Coitus tertij paris rami, in ſecunda figura S notandi, cum ſecundi paris ramo, K iam indicato.

M, N 2,3 Craſſioris ſecundi paris rami ſeries, ad uerticē & occipitiũ cutem.

N 2 Anterior ſecundi paris propago.

3.2 Tertium par.

O 2,3 Poſterior tertij paris ramus, retrorſum ad ſpinam ſecundæ cervicis uertebrae reflexus, ac inter mufculos uerte-  
bris hac ſede adnatos latians. Quando uero ſpinam contingit, extrorſum fertur per mutuum congreſſum dextri  
lateris mufculorum cervicis poſteriora occupantium, cum mufculo ſiniſtri lateris atq; hinc rorſus oblique in la-  
tera ducitur. Hunc ſane ductũ omnium parũ à tertio hoc, ad uigefimum quartũ uſq; poſteriores rami inſignitur.

P 2 Anterior tertij paris ramus, qui in quatuor dirimitur propagines. ac Q in ſecunda figura primam indicat, muf-  
culus cervicem ſteclentibus inſertam. R in ſecunda & tertia indicat propaginem, quæ cum quarti paris propa-

gine I notanda congređitur. S in ſecunda figura tertiam notat, quæ poſterioris ſecundi paris propaginis gran-

7. diori ramo K notato imbi cõiſectur, ubi L in tertia figura ſcripſimus. T in ſecunda & tertia quartam an-  
terioris tertij paris rami inſinuat propaginem, mufculus inſertam, qui tranſverſis uertebraſ committuntur  
proceſſibus.

4.2 Quartum par. Veritus ne characterum copia præſentes nervorum tabulas, neutiquam proſectō caſu ludōq; à  
me partas, obliteraret, quarti paris characteres in ſiniſtrum latus reiici: ut dextrum latus, aliquin pluribus  
onertatum characteribus, hac ſaltem ſede liberum eſſet, ipſeq; quinti paris & ſubſequentium parium notæ o-  
portuniũs accommodarentur.

U 2,3 Poſterior quarti paris ramus.

X 2,3 Anterior quarti paris ramus, in ternas diremptus propagines. Y in ſecunda figura indicatur prima propago;

Y. tertij paris propaginem R inſignitam admiſſens. a in eadem figura inſignitur ſecunda propago, in mufculos di-

a. b. ſpenſata, tranſverſos uertebraſ occupantes. b ſimiliter in ſecunda figura notatur tertia propago,  
quinti paris portionem e indicandam, ad ſepti tranſverſi nervi conſtitutionem accedens.

5.2 Quintum par.

c 2,3 Quinti paris poſterior ramus.

d 2,3 Quinti paris anterior ramus, ab ipſius interno latere ramulam mufculus cervicem ſteclentibus exporrigens, qui  
inter d & characterem G in ſecunda figura eſt conſpicuus.

e 2 Propago anterioris quinti paris rami, maximam conſtituens ſepti tranſverſi nervi portionem.

f 2,3 An-

- f 2,3 Anterioris quinti parvis rami propago, quæ inter musculos occultata, ad summum perrepat humerum. Cha-  
7,7. racteres in tertia figura hoc modo T, T conspiciuntur, huius propaginis soboles notantur, musculus scapulam attollen-  
tibus oblatas.
- g 2,3 Propaginis snotata ramus, in cutem exporrectus, quæ summum integit humerum, & musculum quo bra-  
chium attollitur.
- h 2,3 Propaginis snotata ramus, musculi brachium attollentis parti insertus, quæ à clavicula & summo humero,  
quæ à clavicula articulatur, principium duci.
- i 2,3 Propaginis quam insigniuimus ramus, brachium attollentis musculi parti insertus, quæ à scapule spina exor-  
ditur: soboles autem rami i notati, quæ in brachij cutem exporrigitur, cum brachij nervorum notis π in secun-  
da & tertia figura indicabitur.
- 6.2 Sextum par.
- k 3 Posterior sexti parvis ramus.
- l, m Nescio quæ incuria l & m in secunda figura omiserim: num scilicet in apponendis characteribus eos prætere-  
rim, quominus sinistro latere fortassis illos adhibitis arbitrarer: an uero appositos sculptor non ex-  
penderit. Utique sit, ad sinistrum laus e tuo Marte adscribes, ut sexti parvis anteriorem indices  
ramum. m uero accommodabitur illi furculo, quem à sexto pari uersus n, hoc est, septi nervum,  
deduci conspicias. Atq; id figura hic inserta monitus, multo præstiteris facilius, quam ego, delinea-  
tionem forte initiaturus, & nihil interim promoturus, iam sculpta ac prælo subiicienda tabula, l & m cæteris  
characteribus adicere possem.
- n, n 2,3 Septi transversus nervus, ex tribus furculis b, c & m conflatus. Quod uero utriusq; lateris nervus & in secunda  
figura & in tertia obliquo ductu incedat, hinc fit, quod inter sepientes thoracem membrana, propter cordis in-  
nolucrum, quod inibi amplexantur, hac sede extuberant.
- o, o 2 Septi transversus nervus in septem series.
- p 3 Sexti parvis ramus, cavam scapule sedem petens, & uariis oblatas musculus.
- q 2,3 Anterioris sexti parvis rami cum proximorum parvis ramis implexus, portioq; brachium accedens.  
7.2 Septimum par.
- r 3 Posterior septimi parvis ramus, similiter atq; alij huius sedis rami sparsus.
- s 2 Congressus septimi parvis cum proximis parvis, qui nervos in brachium deducit.
- t, t 3 Propagines sunt septimi parvis, seu potius nervi brachium petentis tertij, ac t notandi, quæ in huius sedis muscu-  
los scapulam & brachium moventes accedunt.
- 8.2 Octavum par, seu parvis dorsalis medulla in thoracis uertebriis reposita primum.
- u 3 Posterior octavi parvis ramus.
- x 2,3 Octavi parvis congressus cum septimo pari, à quo in brachium aliqui exporriguntur nervi.
- y 2 Octavi parvis propago, per superiorem primæ costæ sedem ad pectoris usq; summum proropens.
- α, α 3 Surculi octavi parvis, seu potius quarti brachium adveniunt nervi, in huius sedis musculos diffusi.
- 9.2 Nonum par.
- β 3 Posterior noni parvis ramus.
- δ 2 Ne γ uicinum ipsi γ offenderet, anteriorem noni parvis ramum δ insigniuimus, hic quoq; notantes eius rami  
propaginem, primæ costæ exporrectam.
- ζ 2 Propaginis δ insignita surculi, in musculos thoraci hic instratos protensi. Verum huiusmodi surculi in subse-  
quentibus parvis exprimentur dilucidius.
- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 2 Paria nervorum à nono pari ad uigessimum usque notantur, quibus eadem  
penè propaginum, & potissimum ad costarum internalla est series.
- u, u 2 Surculi intercostalium nervorum, sexti parvis nervorum cerebri ramum augentes, qui sub tunica costas succin-  
gente harum radicibus exporriguntur.
- θ, θ, θ 2 In dextro secunda figura latere rami notantur, ab intercostalibus nervis in musculos uaria serie excurrētes, qui  
1, thoraci inferuntur. Verum in sinistro latere paulo expressius eiusmodi ramos insigniui. Nam 1 & 1 ramos in-  
dicant in elatiorem partem exporrectos musculi brachium pectori adductis, cuius fibræ deorsum oblique, ut &  
u, u, præsentis rami, porriguntur. x uero & x rami indicantur in humilioris eius musculi sedem excurrētes, ac obli-  
q, λ, λ, quæ sursum reflexi. Porro λ & λ rami ostenduntur, oblique descendenti ab domini musculo exporrecti. μ &  
μ, μ. μ rami insinuantur, in musculum propagati, cuius ope brachium uersus dorsum humilior a ducitur.
- v 2 In dextro latere v ponitur, indicaturum nervi sobolem, papille quodammodo elargitam.
- ο, ο 2 Ramuli à decimo octavo pari & decimonono, accedentes principium musculi scimus moventium sexti.
- π, π 2,3 Primus nervus brachium accedens, qui in externæ brachij sedis cutem digeritur. Verum in secunda & tertia  
figura, s secundus brachium subgrediens nervus erit, τ tertius, φ quartus, \* quintus, & sextus.

- § 2,3 Secundus brachium petens nervus, quem Galeni auctoritati nimium additus, graciliorem quàm oportuit expressit, secus ac in figura huius libri calci insua, quam tunc delineaui, quum meis oculis plus fidei, quam Galeni libris tribuere capi.
- § 2,3 2 Secundus nervi propagines, quæ capitibus anterioris cubitum flectentium musculi digeruntur.
- T 2,3 Tertijs brachium accedens nervus. Quod à verò secundus & tertius nervus paulo magis quàm natura se habent, in brachij exteriora delineati sunt, in hoc factum putato, ut nervi invicem in pictura magis quàm natura distantes, omnia adamussim oculis subijciant.
- v 2 Tertijs nervi propago, in brachij cutem aliquousq; excidens, inter musculum pectori brachium adducentem, & eum qui brachium sursum ducit.
- φ 2 Tertijs nervi ramulus, capiti oblatus musculi cubitum flectentium posterioris.
- χ 2 Tertijs nervi propago, in cutem anterioris brachij sedis diffusa.
- † 2 Hic congressus tertijs nervi portionis cum secundo notatur. verum iam sepius observavimus tertium nervum à secundo augeri: uti in figura etiam pinxi, huius libri calci adhibita.
- ω 2 Secundus nervus post congressum suæ portionis cum tertio nervo, deorsum propereps.
- F 2 Secundi nervi furculus, capiti exsertus longi, & radium in pronum ducentis musculi.
- Δ, Δ 2 Nervus secundus ramus, secundum radium ad brachiale usq; properans, ac externam primi pollicis internodij sedem sub cute inibi ascendens, ubi humilius Δ reponitur.
- Θ 2 Nervus secundus ramus, iam dicto crassior, qui mox in duas propagines dividitur.
- Λ 2 Rami quem Θ insigniui elatior propago, sub cute secundum internu latius repens longi, & radium in pronum ducentis musculi.
- Ξ 2 Rami Θ insigniui inferior propago, iam Π & Σ notanda.
- Π, Σ Inferioris illius propaginis Ξ notatæ duo præcipui rami, secundum internam cubiti sedem ad ulnam usq; frequenter exserti, quemadmodum & in dextra delineatum est manu.
- Φ 2,3 Quartus brachium subiens nervus. Huius nervi propagines, etiam si accuratè in secunda & tertia delineata sint figura, tertia tamen duntaxat characteres adhibituus sum, ne secunda plus satis hic obijcetur.
- Υ 3 Quartus nervi propagines, musculis cubitum extendentibus diffusa.
- Ω 3 Quartus nervi ramus, in cutem posterioris brachij & cubiti articuli sedis exsertus.
- 32,3 Quartus nervi propago, cutem accedens humiliori sedi externi lateris brachij obducit.
- 33,3 Quartus nervi soboles, in exterioris cubiti regionis cutem ad brachiale usq; protensa.
- 34,3 Divisio quarti nervi, quæ iam externo humeri tuberi insidet.
- 35,3 Elatior dictæ modo divisionis ramus.
- 36,3 Elatioris rami 35 notati, in exteriorem pollicis, indicis & medij sedem propaginum series.
- 37,3 Demissior ramus divisionis 34 indicatæ, qui ulna ad brachiale usq; exprorrigitur.
- 38,3 Propagines demissioris rami 27 insigniui, quæ musculis inferuntur, ab externo humeri tubere initium ducentibus.
- 39, 40, 41, 3 Hæc notæ propagines notantur demissioris illius rami, qui ulna exprorrigitur, quas offert trium musculorum initij, ab externa ulna regione secundum ipsius longitudinem pronatis.
- 42,3 Rami 37 insigniui finis, ac furculi, quos is articulo brachialis cum cubito præbet.
- \* 2,3 Quintus brachium ingrediens nervus.
- 43,2 Tertijs & quinti brachium accedentium nervorum series, in musculis internam cubiti sedem occupantes.
- 44,2 Tertijs nervi ramus, radio exsertus, ac in internam sedem pollicis, indicis & medij digestus.
- 45,2 Quinti nervi ramus, ulna attensus, & propagines derivans interna sedi minimi digiti, & anularis, & medij.
- 46,2 Rami 45 insigniui propago, externa sedi minimi digiti, & anularis, & medij oblata.
- v 2,3 Sextus in brachium pertinens nervus.
- 47,2 Sexti nervi finis, non procul à brachialis cum cubito connexu desinens.
- 48, 48, 2 Surculi passim à sexto nervo in cutem, cui is exprorrigitur, excurrentes.
- 20, 21, 22, 23, 24, 2 Quinq; paria nervorum è lumborum vertebribus egredientium.
- 49, 49, 2 Ramus à vigesimo pari principium ducentis, & cum feminali arteria ad testem plerumq; exsertus.
- 50, 50, 2 Series nervorum per abdominis musculis.
- 51,2 Rami à nervis qui abdominis musculis offeruntur, in musculum excurrentes, quo brachium versus dorsum humiliora ducitur.
- 52, 52, 3 Posteriores rami nervorum è lumborum vertebribus procedentium. Porro ramuli qui in secunda figura hos characteres 20, 21, 22 spectant, illi sunt, qui ramum augent sexti parvis nervorum cerebri costarum radicibus exsertum, ac etiam ramuli sunt in principium sexti femur mouentium musculi excurrentes. Ramuli



- autem 23 & 24 spectantes, illi sunt, qui musculis hanc dorsi partem flectentibus offeruntur.
- 25, 26, 27, 28, 29, 30.2 Sex sacri ossis nervorum paria. Ramuli illi qui nonero proximissimi, illi censentur, qui nescia & uteri quoq; cervicibus implicantur, antiq; musculos pariter accedunt.
- 53.2 Primi parii ossis sacri, seu vigesimi quinti parii propago, internæ ilium ossis sedis, ipsiq; adeo abdominis musculis hinc ab ilium osse prodeuntibus exprorecta.
- 54.3 Vigesima quinti parii propago, gibbum ossis ilium accedens, & musculus eam sedem occupantibus, cluniumq; cuti ramos offerens. Huc & a subsequenibus quoq; paribus ramuli pertinent.
- 55.3 Ramus est propaginis 54 insignitus, qui hic musculis exporrigitur.
- 56.2,3 Dorsalis medulla terminus absq; coniuge, indivisusq; procedens.
- 57.2 Primus femur cruris ue subiens nervus.
- 58.2 Primi cruris nervi ramus cutem accedens.
- 59.2 Primi cruris nervi portio, musculus exteriorem femoris sedem occupantibus implicita.
- 60.2 Secundus in crure prorepens nervus.
- 61.2 Secundi nervi ramus, per internam femoris & tibiae sedem ad summum usq; pedem sub cute repens.
- 62.2 Rami 61 insigniti, in pedis summum distributio.
- 63.2 Rami 61 insigniti, notavi dignæ soboles, cuti anteriorem genu sedem, & interiorem quoq; uerjus poplitem am bienti digesse.
- 64.2 Secundus cruris petentis nervi portio, femoris profundiora subintrans.
- 65.2 Portionis, quam 64 notauimus, ramus facile primarius, ac quinto femur mouentium musculo insertus.
- 66.2 Tertius in femur pertinens nervus.
- 67.2 Tertii femur petentis nervi soboles, in musculos digesse, pubis ossis foramen occupantes.
- 68.2 Tertii femoris nervi ramus, in cutem exprorectus.
- 69.2 Tertii femoris nervi portio, in alto permanens, & musculus implicita.
- 70.2 Præcipua modo dictæ portionis soboles, musculo distributa tibiam mouentium secundo.
- 71.2,3 Quartus, idemq; crassissimus in femur procedentium nervus.
- 72.2,3 Quartus nervi propago, in posterioris sedis femoris cutem magna ex parte diffusa.
- 73.2 Quartus nervi soboles, in musculorum capita digesse, à coxendicis ossis appendice exorta.
- 74.2 Quartus nervi ramus, primum quartæ tibiam mouentium musculi portioni à femoris osse principium ducenti oblatus, ac mox in cutem excurrrens, quæ inferiori sedi obducitur posterioris regionis femoris & genu articuli.
- 75.2 Quartus nervi rami, intus musculorum ab inferioribus femoris capitibus pronascentium oblati.
- 76.2 Quartus nervi in duos crassitie impares truncos diuisio, inter humiliora femoris occurrens capita.
- 77.2 Gracilior exteriorq; dictæ modo diuisionis truncus.
- 78.1 Trunci 77 insigniti ramus, cuti subtensus externam tibiae sedem & externum pedis latum inuoluenti.
- 79.1 Præcipua exterioris trunci portio, fibule cum tibiae osse connexum petens.
- 80.1 Ramus præcipuæ illius portionis 79 indicatæ, qui anteriorem tibiae sedem sub cute implicat.
- 81.1 Pars præcipuæ portionis 79 insignita, secundum fibulam inter septimum & octauum pedem mouentium musculos exprorecta.
- 82.1 Interior crassiorq; truncus diuisionis, quam quartus femur aduenitium nervus in poplite molitur.
- 83.1 Ramus internam tibiae sedem uersus suram & internum pedis latum sub cute perambulans.
- 84.1 Ramus in cutem sparsus suræ potissimum obductam.
- 85, 85.1 Propago, quam crassior quartus nervi truncus in anteriora tibiae mittit, per ligamentum fibulam tibiae ossi tota sede committens, quæ hæc ossa inuicem dehiscunt. Propago ista per transversum in anteriori tibia regione occurrens ligamentum fertur, in superiori pedis sede absumpta.
- 86.1 Propago inter quartum pedem mouentium musculum, & duos primos pedem quoq; mouentium musculos excurrrens.
- 87.1 Reliquum interioris trunci quartus femur aduenitium nervi, quo tandem secundum interiorem malleolum pedis humiliora petens, singulorum digitorum inferiori sedi binos surculos exporrigit.

Præter figuras, quarum modo indicem absoluius, quedam ad præsentis libri reponetur finem, nervorum imaginem grandiori quam superiores forma non ineleganter exprimens, & ad horum librorum Epitomen præcipue apparatus: adeo ut ad illam quoq; ex interiori iam subsequenti Capitulum margine uenias nonnumquam remittendus.

DE DORSALI MEDULLA, ET NERVO-  
rum ab ipsa prodeuntium numero. Caput XI.

*S 1 quando alicubi in interiori margine toto hoc Opere occurrit, fig. 1, aut 2, aut 3 cap. 11 lib. 4, illa consulenda sunt, quas huic Capiti præposuimus.*

*a 1. figura  
trium que  
ad hoc et  
sequentia  
Capita spe-  
ctant.*



**D**ORSALIS<sup>a</sup> medulla, neruorum modo substantiæ cerebri, à qua originem sumit, correspondens, quanto magis à cerebro recedit, protèditurq; , tanto (neruorū etiam ritu) cōpactior duriorq; efficitur. Variat enim plurimū ab aliorum ofsium medulla impensè humida, propemodumq; fluxili: siquidem hanc, & præcipuè molliorē ipsius substantiam pinguedini, uel ad ipsi assimiles licet, in ofsium

*Dorsalis medulla ab ofsiū medulla differtentia.*

sinibus cauernulisq; nutriendi humectādīq; gratia asseruato. Quinetiam hæc ofsium medulla nec cerebri, aut dorsalis medullæ inuolucris obtegitur, nec præterea ipsi adeo dignæ notatu arteriæ ac uenæ obtenduntur: nec perinde ac dorsalis medullæ, aut cerebri substantia, candicans albā ue existit. Quapropter etiā nulla ratione cerebro & dorsali medullæ similis est, neq; ulla illi cum sensus organis aut musculis existit communio, quum interim dorsalis medulla non paruam cum musculis communionem sibi uendicit. Quippe si rerum Opifex hanc, quam alijs longum cerebrum appellare libuit, non produxisset, duorum alterum subsequeretur. aut enim omnes corporis partes capite inferiores, ac à<sup>b</sup> neruis sexti paris neruorum cerebri propagines nullas admittentes, motu destituerentur arbitrario, tristantiumq; sensu priuarentur: aut neruum in singulas partes à cerebro deriuari necessum esset. Verū si motu carerent, tunc homo non amplius animal, sed lapideæ luteæ ue corresponderet statuæ. A<sup>c</sup> cerebro autem in singulas partes exiguum neruum porrigere, artificis esset neruorum securitatē nihili pendentis. Nam non solum gracilem neruum, ut qui rumpi cōfringiq; possit, longo progressu deduci non erat tutum: uerū ne aliud quoddam ualidiorum etiam organorum, & minus adhuc uenam aut arteriam. Hæ enim ut dorsalis medulla à propria origine grādes amplæq; enascentes, instar arborum caudicis in progressu uariè discinduntur: & quum corporis partibus appropinquāt, surculos ipsis offerunt, qui materiam sibi à principio oblatam communicent. Vnde etiam satius fuit dorsalem medullam uelut fluuium aliquem, ex fonte nimirum cerebro effluentē, per eam

*Dorsalem medullam procreanda necessitate.*

• sedem qua transit, geniculatim neruos tanquam animalis facultatis aut spiritus uectores germinare, uti modò rerum Opifex probè est molitus. Ceterū quando dorsalis medulla instar alterius cerebri omnibus propemodum partibus sub capite positis censetur, hanc quoq; oportebat, similiter ac cerebrum, duro & ferendis iniurijs pertinaci munimento, ac uelut propugnaculo cingi. Cuiusmodi uerò id sit, in primo libro, dum dorsi uertebrarū structuram prosequeretur, abundè dictum est. Præterea duæ etiam membranæ dorsalem medullam amplexantur, ijs omnino specie respondentes, quibus cerebrum obuoluitur, etiamsi distantia inuicem non cōgruant. Duram enim cerebri membranā à tenui in caluaria dehiscere, gratia distentionis contractionisq; uasorum tenuis membranæ, & ipsius adeo cerebri, in septimo libro declarabitur. In uertebrarū autem sinibus, ubi membranæ dorsalem medullam ambiunt, dura tenuem cōtingit. Atq; hoc uno quoddam inuolucrū egregiè ualidum membraneūq; duabus illis quæ dorsali obducuntur membranīs, extrinsecus circuducatur:

*Dorsalis qui manenda.*

*Ossis.  
Membranæ  
involucris*

*e fig. cap.  
1 lib. 5. b. f.  
cap. 6 D.  
D, f. fig.  
cap. 12 A.*

*d fig. cap.  
14 lib. 1.*

*e in pri-  
oribus fig.  
lib. 7.*

*Dorsalis cur-  
nica.*

quodd dorsalis medulla uertebreis quas uariè moueri necessum fuit, secus quàm cerebrum continetur, non mouendis ferè ossibus amplexum. Dorsalem medullam unicam (uti & cerebri sedes, à qua<sup>1</sup> principium ducit, unica simplexq; f. 18. cap. 2 D uer-  
est) iustè à Natura factam esse, neminem latère arbitror: quum homini duo<sup>2</sup> fuit E.  
dorsa procreari fuisset planè ridiculum, atque ad plurimas actiones ineptum, quodq; dorsalis medulla ualidior per uertebreas, ceu unicū iter, simplex, quàm gemina prorepat. Quàm uerò uana sit Galeni ratio, qua<sup>3</sup> cerebellum simplex g. 1. fig. lib. 7.  
esse docet, ut unica fieret dorsalis medulla, in septimo libro explicabimus.

*Lib. de p'su  
partium.*

Quanquam sanè & hoc loco hominis medulla dorsalis adhuc insuper ueniat expendenda. per<sup>4</sup> totam namq; ceruicē, & ad thoracis usq; medium, aliquando & inferiùs nonnihil, simplex, ac indiuisa, mollisq; adhuc deorsum fertur, neruus duntaxat geniculatim à se diffundens. quum uerò thoracis medium h. 1. fig. 4 B ad C.  
perperis, ut duris duntaxat, ac motui potissimum seruientibus neruis propagandis idonea redderetur, non simplex amplius, sed in innumeras secta soboles descendit, non aliter profectò, quàm si frequentes multasq; tenuissimas chordulas simul rectà tensas membranæ cuiuspiam illigares: ac deinde per singula uertebrearum dorsī ue ossium<sup>5</sup> foramina, per quē nerui profiliunt, unam h. 1. cap. 14 lib. 1 Q.  
atq; alteram chordulam ex mutuo illo cōnexu tantisper distribueres, quousq;

*ubi dorsalis ne-  
luti e multis su-  
miculis compin-  
gantur.**Quot neruorū  
paria à dorsali  
discendantur.*

unica tantum superesset chordula, dorsalis medullæ fini respondens. Cæterum nerui, quos dorsalis medulla per uertebreas ducta, ac paulatim in progressu gracilescens distribuit, refectionis professoribus sexaginta, & interdū quinquaginta octo enumerantur, modò triginta, modò uigintinouem complexi paribus. A<sup>6</sup> dorsalis enim medullæ<sup>7</sup> sede septem ceruicis contenta uertebreis, septena exiliunt paria. A<sup>8</sup> medullæ autem<sup>9</sup> sede per thoracis uertebreas, duodena dependent paria: à quinis autem lumborum uertebreis, quina: ab ossē sacro sena. quamuis interim quinq; inferiora ossis sacri neruorum paria, si quando id sex efforitur ossibus, gemina (uti ferè duobus prioribus è ceruice eductis paribus usuuenit) quodam modo dici possint, quum nerui utrinque antrosum & retrorsum<sup>10</sup> ducantur, ab una radice uix enati. Dorsalis uerò medullæ<sup>11</sup> terminus ex ossē sacro procidens, neruus non censetur: neq; in ramulos, qui neruorum nomen merentur, cessat. quanquam aliquando illum iam ex sacro ossē decidentem, in tres impense breues surculos diffundi uiderim, tunc sacro ossē quinque solum ossibus conformato. In canibus autem & alijs animalibus, pro dorsī ossium numero, neruorum dorsalis medullæ parium copia differt.

# SEPTEM NERVORVM PARIVM E' CERVI- cis uertebreis profilientium series. Caput XII.

*Quam uia Na-  
tura primo pa-  
ramerit paria.*

MODÒ haftenus memoriæ non exciderint primæ ceruicis uertebre cum occipitis ossē, & secundæ item uertebre cum prima superius traditæ articulationum species, meritò in præsentia Naturæ prouidentiam admiraberis, quæ primo ceruicis paria, & secundo, non cæterorum ceruicis aut thoracis neruorum ritu, sed peculiari quodam, duarum primarum uertebrearum articulationibus impedita, uiam insculpsit, ac duos utriusq; paris, quemadmodum & in sacro ossē, utrinq; machinata sit exortus: unum quidem anteriori corporis sedi, alterum uerò posteriori exporrigen. Quippe ut<sup>12</sup> posteriori primi paris propagini concinnè uia præpararetur, Natura in primæ uertebre eminentiori sede ad radicem<sup>13</sup>

*Hæc memo-  
ria, si opus  
erit, ex fir-  
gulis cap.  
15 lib. 1  
reparabit.**d. 1. fig. 1.*



b<sup>3</sup>, u<sup>1</sup> fig. cap. 15. lib. 1. V. c<sup>1</sup> u<sup>1</sup> fig. c<sup>1</sup> inf. lib. 1. d<sup>1</sup> u<sup>1</sup> fig. 14. muf. 14. G. F. 14. tab. 14. H. I. i<sup>1</sup> fig. cap. 10. lib. 2. l. 1. h<sup>1</sup> u<sup>1</sup> muf. 14. B. B. 1<sup>1</sup> fig. 1. m<sup>1</sup> 2 fig. N. n<sup>1</sup> 10. 11. fig. cap. 15. lib. 1. r. f. mus autem 4. fig. q. et 6. fig. p. o ad 13. fig. p. 3 fig. K. q<sup>1</sup> 2 fig. S. r 3 fig. L. s<sup>1</sup> 2, 3 fig. M. M. 1 Petri hanc ex 3 fig. r<sup>1</sup> a medio. u<sup>1</sup> 3 fig. f. p. B. et ad inf. ram. 1. x 14 muf. 14. B. B. K. L. 7 2 fig. N. 2 11 fig. cap. 15. lib. 1. m ad la- tus r.

dicem, posterioremq; regionem ipsius cum capite articulationis<sup>b</sup> finum cæ-  
lauit: atq; hic etiam occipitis ofsi<sup>c</sup> finum insculpēs, foramen effecit, primæ cer-  
uicis uertebrae, ipsiq; occipitis ofsi commune. ne si fortasse integrum foramen  
tenui illi uertebrae (uti in canibus, quibus grandior est uertebra, euenit) inscul-  
pisset, ipsa, quum alioquin magno indigeat robore, multis perforationibus  
in ualida redderetur. Quinetiam quo foramen id arctius esse possit, Natura po-  
steriorem primi paris exortum gracilem effecit, eumq; in musculos duntaxat  
distribuit, qui à prima ceruicis uertebra in occipitis os inferuntur, & eos qui  
ab occipitij osse in transuersos illius uertebrae processum implantantur. ac dex-  
tra quidem propago in dextri lateris deperditur musculos, sinistra autem in  
sinistri: quod etiam semper tota neruorum serie subaudiri uelim. Ab hac præ-  
terea posteriori primi pari: propagine, furculus etiam deducitur in princi-  
pium<sup>d</sup> musculi à primæ ceruicis uertebrae, & aliquot subditarum uertebra-  
rum transuersis processibus principium fumentis, ac scapulam sursum attra-  
hentis. <sup>h</sup> Altera primi paris propago non semper conspicua, ab anteriori dor-  
salis medullæ regione enata, excidit inter primam ceruicis uertebra, & oc-  
cipitis os, iuxta latus<sup>i</sup> teretis ligamenti secundæ uertebrae processum (quem  
denti à similamus) occipitio colligantis. Hæc propago uti gracillima est, ita  
etiam mox in<sup>k</sup> musculos absumitur, qui anteriori uertebrae, sedi obnati,  
dorsum mouentium primum par recensentur. Secundum neruorum par,  
quando prorsus ex lateribus subsequētium parium modo pronasci nequiu-  
it, utpote ab articulatione primæ uertebrae cum secunda offendendum, & arti-  
culationis robore foramen inibi non admittēte, Natura uertebrae noxam  
fugiens, id ut frequentius, binis propaginibus exoriri operæ precium putauit.  
ac posteriorem propaginem, quæ<sup>m</sup> anteriori longè est crassior (quanquam &  
ipsa gracilis uisitur) per latus posterioris secundæ uertebrae processum, quem  
spinam uocamus, eduxit, ibidem opportunissimum tutissimumq; iter (uti  
in primo docuimus libro) machinata. Præsens propago simulatq; prodijt, in  
duos crassitie impares<sup>n</sup> discinditur ramos: ac<sup>o</sup> crassior à prioribus quodāmo-  
do ad posteriora sursum transuersum tendit, ex spinæ nimirum secundæ uer-  
tebrae lateribus, uersus spinæ medium, ubi mutuus est utriusq; lateris muscu-  
lorum posteriorem ceruicis regionem occupantium congressus. Ramus iste,  
tertij paris<sup>q</sup> sobole huc exporrecta<sup>r</sup> coactus, ac ex dictorū iam musculorum  
medio in exteriora prolapsus, cōtrario penitus ductu ex posterioribus sursum  
in priora ad caput contendit, atq; inibi in uniuersam capitis cutem, tam quæ  
circa aures, quàm quæ post aures in occipite ad uerticis usq; summū habetur,  
furculos spargit. Huius rami progressus accuratè propter subsequētium pa-  
rium seriem uenit perpendendus. Ab illis enim paribus rami à uertebrae  
lateribus ad ipsarum spinas pertingunt, & hinc rectà extrorsum per mutuam  
musculorum utriusq; lateris congressum, & rursus hinc à spinarum seu poste-  
riorum processuum apicibus, dorsiq; medio, antrosum seu uersus corporis la-  
tera ascendunt, & in musculos digerūtur à spinarum apicibus principium du-  
centes, uti subsequēs neruorum series edocebit. Cæterum posterioris secundi  
paris propaginis minor<sup>s</sup> ramus in proximorum musculorum principia di-  
uanicatur. sunt autem illi, tertij & sexti parium<sup>t</sup> musculi, eorum quos capitis  
motibus præesse diximus. <sup>v</sup> Anterior secundi paris propago admodum graci-  
lis, ab anteriori dorsalis medullæ sede originem mutuatur, atque<sup>u</sup> inter secun-  
dam & primam elabatur uertebra ad latus radices, eius secundæ uertebrae

Secundi paris  
processus & je-  
ries.

processus, quem denti comparamus. Digeritur autem hæc propago mox in musculos anteriori cervicis uertebrae sedi adnatos, primumq; musculorum dorsum mouentium par constituentes.<sup>b</sup> Tertium par, ex<sup>c</sup> communi foramine secundæ cervicis uertebrae & tertiæ procidit, mox ab egressu in duos discissum ramos.<sup>d</sup> posterior retrorsum flectitur, ac inter musculos cervicem extendentes, qui dorsum mouentium septimus & octauus enumerantur: ac deinde inter caput mouentium<sup>e</sup> secundum par occultatus, ad secundæ uertebrae spinam contendit: atq; hinc ex mutuo musculorum posteriorem cervicis sedem occupantium concursu excidens, ad cervicis properat latera,<sup>f</sup> musculo suffultus, qui ex carnea constitutus membrana, buccarum motibus præest.<sup>g</sup> Anterior autem tertij paris ramus, in quatuor spargitur propagines, ac prima musculorum dorsum mouentium primum par implicat.<sup>h</sup> Secunda propago decliuus ducta, quartum adit neruorum par, cuidam ipsius furculo commiscenda, in dictos nuper musculos absumpto.<sup>i</sup> Tertia autem sursum contendit, ac posterioris secundi paris propaginis ramo in verticis cutem excurrenti concreditur, unà cum illo (ut prius dictum est) dispergenda.<sup>j</sup> Quarta autem tertij paris anterioris ramus propago in<sup>k</sup> musculos digeritur, qui transuersis uertebrae processibus connati, cervicem in latera mouent: & eum pariter, qui à transuersis uertebrae cervicis processibus principium ducens, scapulam sursum uellit.<sup>l</sup> Quartum cervicis neruorum par è communi tertiæ & quartæ uertebrae foramine excidens, tertio pari similiter, in duos partitur ramos.<sup>m</sup>

*Quartij paris series.* Posterior, aliorum qui retrorsum ad spinam inter musculos occultati reflectuntur modo, uersus tertiæ cervicis uertebrae spinam contendit, in progressu illis quibus intertextitur musculis, furculos diffundens. Quando autem spinam contingit, per mutuum elabitur congressum musculorum posteriorem cervicis regionem occupantiū, atq; hinc in latum membraneumq; digeritur musculum, buccarum motus autorem præcipuū.<sup>n</sup> Anterior autem quartij paris ramus, ternas educit propagines. ac unam promit, cui tertij paris propago commiscetur, quæq; in musculos deperditur stomacho substratos, ac cervicem flectentes.<sup>o</sup> Secundam uerò propaginem in musculos distribuit uertebrae lateribus adnatos: cuiusmodi sunt, quorum beneficio ceruix in latera ducitur, ac is qui à transuersis colli uertebrae processibus principium ducens, scapulam sursum allicit.<sup>p</sup> Tertia propago duabus nuper dictis gracilior, decliuus fertur, cum quinti paris<sup>q</sup> sobole congressura, ac simul cum illa & sexti paris<sup>r</sup> propagine, septi transuersi<sup>s</sup> neruum constitutura.<sup>t</sup> Quinto pari quinta cervicis uertebra cum quarta uiam præbet ipsum uerò similiter atq; quartum in duos discinditur ramos, ac<sup>u</sup> posteriorem ad spinarum apices retorquet, eodem prorsus modo digerendum, quo posteriorem quartij paris ramum digeri diximus. At<sup>x</sup> prior anterior<sup>y</sup> uel quinti paris ramus, primum<sup>z</sup> sobolem spargit musculis cervicem flectentibus. dein<sup>a</sup> grandiore depromit, qui deorsum repens, ramos utriusque uicini paris, quartum nimirum & sexti excipit: & illis adauctus, neruum<sup>b</sup> septi transuersi efformat, qui præcipua quinti paris constat propagine, & exigua sobole quartij paris, & item exigua sobole sexti. Interdum uerò & septimi paris furculus septi transuersi neruo accedit, at tunc quartij paris soboles ipsi nulla offertur. Atq; hæc sanè regio admodum industriè septo transuerso neruos elargitur. Variat enim id à cæteris musculis non figura solùm, uerum & functione. Orbicularis enim formæ (uti in secundo recessuimus libro) uisitur, & situ obliquo donatur. Mox caput ipsius, à quo fibræ dependent, non ut quispiam

d 314. A. B.

b 2 fig. u.

c 7 fig. cap.

d 315. fi. O.

e 14. tab. O.

f 13. tab. A.

g 3. tab. T.

h 2 fig. p.

i 2 fig. Q.

k 2, 3 fig.

l 2 fig. S.

m 3 fig. u.

n 3, 4. C.

o 13. tab. H.

p 2 fig. u.

q 2, 3 fig. V.

r 3, 4. fi. X.

s 2 fig. R.

t 2 fig. R.

u 2 fig. d.

x 2 fig. b.

y 2 fig. c.

z 2 fig. m.

a 2, 3 fig. n.

b 2 fig. ch. 15.

c 3 fig. d.

d 2, 3 fig. d.

e 2 fig. d.

f 2 fig. m.

g 2 fig. e.

h 2 fig. n.

i 2 fig. n.

j 2 fig. n.

k 2 fig. n.

l 2 fig. n.

m 2 fig. n.

n 2 fig. n.

o 2 fig. n.

p 2 fig. n.

q 2 fig. n.

r 2 fig. n.

s 2 fig. n.

t 2 fig. n.

u 2 fig. n.

v 2 fig. n.

w 2 fig. n.

x 2 fig. n.

y 2 fig. n.

z 2 fig. n.

a 2 fig. n.

b 2 fig. n.

c 2 fig. n.

d 2 fig. n.

e 2 fig. n.

f 2 fig. n.

g 2 fig. n.

h 2 fig. n.

i 2 fig. n.

j 2 fig. n.

k 2 fig. n.

l 2 fig. n.

m 2 fig. n.

n 2 fig. n.

o 2 fig. n.

p 2 fig. n.

q 2 fig. n.

r 2 fig. n.

s 2 fig. n.

t 2 fig. n.

u 2 fig. n.

ut quispiam arbitraretur, ex pectoris osse, aut costarum cartilaginibus, aut uertebrae corporibus educitur: sed in media totius septi regione, quæ nervosa est, id consistere nobis persuasum habemus. Ac proinde nervos fibris illis motum largituros, eò proripere ab alto operæ precium fuit, ut in uniuersam ipsius sedem suam uim ex æquo diffunderent. Si uerò Natura nervos septi partibus, quæ pectoris osi, costis & uertebri connascuntur, inferuisset, septi finis in ipsius medio haberetur: quum nervos in musculorum initia potius quàm fines exporrigi, Anatomes professoribus axionassit. Atq; hac ratione septum duntaxat nervos à cervicis uertebri mutuatur. longo enim progressu eos ducere, quum possent ex proximis sedibus emitte, opificis esset ignorantis, quid magis in fabrica conduceret. Hac itaque ratione, septo ex altis partibus nervos exhiberi oportuit: quos Natura, ne toto progressu, quem per uniuersum thoracem moliuntur, parum concinnè ducerentur, intersepientibus thoracem membranis adnexuit, unum neruum singulis membranis exterius firmans.

Neq; profectò minorem conditoris industriā arguit id quod adhuc anterioris quinti paris neruorum cervicis est reliquum, atq; in musculus præcipuè inferitur, cuius auxilio brachium attollimus. Natura enim ab hac portione ramulos quosdam porrigens musculus scapulæ attollentibus, primum ab externo huius portione latere neruum deriuat, qui foras emergens, atq; in multas scissus soboles cutem implicat, qua attollens brachium musculus integitur. Deinde reliqua portio in profundo recodita, simulatq; scapulæ cervici appropinquat, in duos magnitudine impares partitur ramos. Anterior, qui & gracilior est, sub summi humeri cū clauicula conexu porrigitur, & musculi brachium attollentis parti soboles spargit, quæ à summo humero & clauicula inibi principium ducit. Atq; hic ramus cuti nullum exporrigit furculum, nisi interdum

Reliquum anterioris rami quinti paris.

extremè gracilem, aliquousq; humeraria uena concomitatum. Posterior uerò eius quinti paris portio, quam in profundo reconditam, decliuem ferri diximus, ramus qui anteriori crassior est, postquam gracilem exprompsit ramulum musculo hinc à scapula sursum ad os u referens proficicenti, insidet foramini instar semicirculi in scapulæ elatiori costa exculpto. In hoc foramine posterior hic ramus uena quoq; & tenui arteria concomitatus, mox propinquem diffundit musculo sinum occupati, quem inter scapulæ spinam & elatorem ipsius costam haberi scripsimus. Insuper in musculi brachium attollentis sedem digeritur, à scapulæ spina & summo humero pronatam. Verum hic ramus in præsentem musculum non totus dissoluitur, sed furculo quoque iam cū tem externæ brachij sedi obducta adit, quem secundum exterius latus insertionis ramus ille ab alto transmittit, quam musculus is brachium attollens in humerum molitur. Eadè sanè industria & à succedentibus neruorum paribus, seu

neruis in brachium progredientibus ad musculos scapulæ mouentes, nerui transmittuntur, qui omnes intimis musculorum sedibus potissimum inseruntur. Cæterum nunc tempestiuum est, sexti & septimi parium seriem sermoni subijcere, seu primo thoracis pari potissimum mutuentur. Anterior autè sexti paris portio, postquam neruum exprompsit, qui quinti paris portioni ad neruum septi transuersi constituendum permiscetur, cū contiguis paribus, septimo nimirum

Sexti paris series.

aa 4 & octauo



& octauo<sup>1</sup> coit, & uariè rursus discinditur, neruos unà cum proximis paribus f 2, 3, fig. q.  
 efformatura, qui in brachium contendunt. Priuatim uerò præter cætera cer-  
 uicis paria, sextum par<sup>2</sup> portionē notatu dignam deorsum ad scapulæ cauum g 2 fig. p.  
 transmittit, & rami quoq; tum ab hoc, tum & à cæteris coniugijs ad muscu-  
 los digeruntur, qui scapulani fursum ducunt. Validis enim, & magnam mo-  
 lem attollentibus musculis, uarias quoq; ac frequentes neruorum propagines  
 inferi, quàm maximè rationi est consonum. <sup>h 2 fig. q.</sup> Septimi etiam paris ex commu-  
 ni sextæ & septimæ ceruicis uertebrarum foramine prolabētis, magnus cum cha. 7.  
 duabus proximis coniugationibus, sexta uidelicet & octaua, congressus perf-  
 citur, atq; huius potissima portio in brachiū fertur. Ab hoc enim pari, & quin-  
 to & sexto ceruicis, & primo & secundo thoracis neruorum paribus, omnes i 2 fig. f.  
 brachij nerui propagantur. Qua autem serie illi digerantur, peculiari Capite aut potius  
 persequar: modò interim adhuc addens, septimum par (uti & prius monui) specia fig.  
 interdum ramulum septi transuersi neruo offerre, & perpetuò ramum in po- cap. 14. aut  
 steriora ad spinam ducere, qui præter cæteras propagines in musculos poste- nili. fig.  
 riori ceruicis sedi instratos digestas, aliquot etiam offert<sup>1</sup> lato membraneoq;  
 musculo, qui buccas mouentium, ex carnea membrana constituitur. In hunc h 2 fig. r.  
 enim musculum à quinti paris neruorum cerebri<sup>2</sup> propagine per<sup>3</sup> cæcum fo- i 3 musc.  
 ramen excidente, ac dein ab omnibus ferè paribus uertebrarum ceruicis (si tab. r.  
 primum excipias) soboles pertingunt, uniuersè secundum musculi fibrarum m 12 fig.  
 ductum exporrectæ, ac proinde etiam ad uenas & ligamenta multifariam (ut cap. 14.  
 ductum illum seruent) reflexæ, ac cuti etiam communicatæ. n 2 fig. u.  
cap. 12 lib.  
u. b.

## SERIES DVODECIM PARIVM NERVORVM

dorsalis medullæ, thoracis complexæ uertebris. Caput XIII.

Dorsalis me-  
dullæ neruorū  
octauū parū,  
sive thoracis pa-  
riū primi ge-  
neris



RIMVM thoracis neruorum<sup>2</sup> par, inter septimam cer-  
 uicis uertebrarum, & thoracis primam, quinque humilio-  
 rum ceruicis pariū modo exiliens, si superioribus dorsalis  
 medullæ neruorum paribus cōparetur, opportune octa-  
 uum nuncupabitur. Hoc itaq; simulatque excidit, in duos  
 impares diductum ramos,<sup>3</sup> posteriorem, qui & gracilior  
 est, retrorsum ad spinam inter musculos uertebris hic ad-  
 natos reconditum detorquet, à quo in progressu furculos accipit radix<sup>4</sup> mu-  
 sculi à prima thoracis costa in transuersos ceruicis uertebrarum processus in-  
 ferti, ac ceruicem in latus (uersus anteriora tamen) inclinātis. Dein & qui cer-  
 uicis capitisq; in posteriora motibus hīc præficiuntur muscoli, ab hoc octauū  
 paris ramo furculos adipiscūtur. Quod autem eius rami, septimæ ceruicis uer-  
 tebræ spinam contingit, extrorsum ducitur: & rursus transuersim à spina ab-  
 scedens, propagines offert humiliori sedi eius<sup>5</sup> muscoli, qui scapulam mouen-  
 tium secundus ac maior enumeratur. insuper & musculo scapulæ basi inser-  
 to, scapulamq; ad dorsum trahenti, ac demum<sup>6</sup> illi quem hominis thoracē mo-  
 uentium tertiuū recensuimus. At anterior octauū paris ramus, posteriori longè  
 insignior, septimi, sed magis adhuc interdū noni paris non minimam portio-  
 nem cum ipso congregientē<sup>7</sup> suscipit: totusq; uariè uicinis paribus cōmixtus,  
 si<sup>8</sup> unicam ipsius dempseris propaginē, in brachiū fertur. Ex demissiori namq;  
 ipsius sede, ubi iam proximis paribus se commiscuit, propaginem antrorsum  
 emittit, quæ secundum primæ thoracis costæ ductum ad pectoris ossis usque  
 summū perlata, in progressu furculos dispēsat thoracis<sup>9</sup> musculo à clauicula in  
 primam d 2 fig. u.  
cha. 8.  
e 8 musc.  
tab. r. u.  
e 10 da. r.  
f 11 da. r.  
g 2, 3 fig. r.  
aut specia  
fig. ca. 14.  
h 2 fig. r.  
i 4 musc.  
tab. d.

primam inserto costam. Præterea huius propaginis terminus in illos digeritur musculos, qui à pectoris osis summo principium ducentes, sursum exporriguntur, tum ad mamillarem capitis processum, tum ad os uinagini comparatum, & ad laryngis cartilaginem scuto non absimilem. quanquam interim & his musculis à sexto pari neruorum cerebri<sup>1</sup> soboles offerantur, ut & à primo intercostali neruo, quem mox noni paris<sup>2</sup> propaginé esse dicam. Quæ autem octauæ paris in brachium sit series, cum reliqua brachij neruorum explicatione persequar: id etiam hoc loco subiungens, ab octauo pari, seu potius quarto brachium petente neruo, quum is alam accedit, ex posteriori ipsius regione etiam<sup>3</sup> ramos pullulare, in cauam scapulæ regionem digestos.<sup>4</sup> Nonum par inter primam & secundam thoracis uertebras originem ducens, octauum quoque; paris ritu<sup>5</sup> ramum in posteriora ablegat, simili quodammodo ratione atque posterior octauæ paris ramus digerendum. Deinde non minimam sui partem octauo porrigen<sup>6</sup>, uti suo dicam loco, in brachium fertur.<sup>7</sup> reliquam uerò ipsius portionem primo costarum interuallo offert, quæ secundum primæ costæ ductum ad pectus usque fertur in progressu, ut & reliqui costarum interuallis exporrecti nerui, soboles diffundens in musculos thoraci incumbentes.

Porrò<sup>8</sup> decimum, undecimum, duodecimū, & reliqua ad primum usque; lumborum, seu uniuersæ dorsalis medullæ uigefimum par, subsequencia, eadem quodammodo serie digeruntur. Quippe omnia mox atque in uertebrarum lateribus exiliere, bipartitò scinduntur, ac minor graciliorque ramus retrorsum ad uertebrarum spinas detorquetur, inter musculos uertebris adnatos latitās. Sunt uerò illi, quos dorfi & thoracis motibus hic præesse retulimus. Videlicet humani thoracis motorum<sup>9</sup> quartus, in canibus uerò & simijs sextus: deinde dorsum mouentium sexti paris<sup>10</sup> alter, mox & alter octauæ dorsum mouentium paris, & circa superiores thoracis uertebras<sup>11</sup> alter primi, & alter secundæ paris caput mouentium, & alter tertij paris, & alter quoque quarti paris musculorum dorsum priuatim mouentium. In hos enim musculos thoracis neruorum posteriores rami sparguntur: ueruntamen in illos toti non absumuntur, at ubi iam spinarum attingere apices, extrorsum properant, inter mutuum dextri sinistrique; lateris musculorum congressum excidentés, atque in musculos postmodum digesti, qui ab illarum quas cōtingunt spinarum apicibus principium mutuuntur: è quorum classe (præter aliquot nuper commemoratos, præcipuè autem alterum primi paris musculorum caput mouentium) sunt, musculus scapulam ad dorsum trahens, totique; scapulæ basi insertus: & humilior pars eius musculi, quem secundum scapulam mouentium enume-

ramus, ac monachorum cucullis conferimus, quiq; hac parte scapulam deorsum uellit, mox humani thoracis motus opificum<sup>12</sup> quintus, & is etiam qui brachium deorsum dorso adducit. Et præterquam quòd à posterioribus horum parium ramis furculi in musculos digerantur, etiam aliquot in cutem dorso instratam contendunt, at minus frequentes quàm nerui in brachij, aut pectoris, aut colli cutem exporrecti. Cæterùm anteriores præsentium parium rami<sup>13</sup> furculos offerunt sexti paris neruorum cerebri<sup>14</sup> ramo sub tunica costas succingente costarum radicibus exporrecto, illisq; furculis adaucto. Dein præsentés rami costarum oblatis interuallis, uena itemq; arteria concomitantur, & proprio<sup>15</sup> sinu costarum interiori inferiorique; sedi insculpto uecti, secundum costarum ductum in anteriora properat. Rami enim ueris exporrecti costis, ad pectoris usque os pertingunt: rami autem secundum spurias delati costas, haud


Noni paris series.

Reliquorum parium è thoracis uertebris profiliens series.

haud unà cum illis cessant, uerùm in abdominis usque anteriora super peritonæum repunt. Ab his ramis in progressu<sup>n</sup> sparsa admodum propaginum series in musculos thoraci adstratos diffunditur, è quorum numero<sup>n</sup> secundus est thoracem mouentium, &<sup>n</sup> qui brachium pectori admouet, &<sup>n</sup> qui scapulam pectori adducit, &<sup>n</sup> qui brachium deorsum uellit, &<sup>n</sup> oblique descendens abdominis musculus. In hos enim musculos propagines ab intercostalibus nervis offeruntur, singulæ tanta industria ad costas, & uenas, & arterias, & ligamenta reflexæ, ut musculorum quibus porriguntur, fibrarum incessus adamussim quodammodo retineât. Atq; ut his musculis thoraci instratis ab intercostalibus nervis propagines exhibêtur, sic à nervis spurias costas superantibus, soboles quoq; abdominis musculis cõmunicantur, fibrarũ etiam illorum quibus attenduntur musculorũ ingressum utcunq; obseruâtes. A' propaginibus musculos implicantibus, neruuli etiam thoracis cuti offeruntur, non quidem certa, neque nunquam aberrante serie: sed sparsim, eoq; prorsus modo, quo errantes uasorum rami, *æropodidæ* Græcis nunguntur, digeruntur. Vtunque tamen uaria, neq; sibi constans sit eiusmodi neruorum cutem petentium series, Natura nihilominus subuerita, ne tenero adhuc infanti lac familiare ipsius alimentum, à matre exigenti, papilla nõnunquam atrocius denegaretur, exactum papillæ sensum impartiri uoluit, quo tenerorum infantuli labrorum, mollisq; linguæ contactus illam uoluptate afficeret, qua homines ille-cti, hanc promptius sugendam contrectandamq; offerant. Ac proinde à nervis ferè, qui quartum costarum perreptant interuallum, propagines diffunduntur in musculum, cuius beneficio brachium pectori adducimus: atq; ab illis propaginibus furculi in papillam pertingunt, simili<sup>n</sup> qua penis efformatur substantia constantem. Cæterum ut præsentis furculi duodecimo neruorum pari quodammodo peculiare censendi sunt, ita sanè decimo octauo & decimonono paribus id priuatim ascribendum uenit, quod<sup>n</sup> furculos offerant principio<sup>n</sup> sexti femur mouentium musculi, quod hinc è uertebrarum lateribus pronasci, iam multo antè commemorauimus.

*Nervi papillam petentes.*

### NERVORVM PER BRACHIUM, CVBI- tum & manum series. Caput XIII.



*PRÆSENTI* figura neruorum brachium accedentium plexum, de quo in huius Capitis contextu mox agetur, & qui supra primam thoracis costam in colli latere consistit, nudum exprimere ita conatus sum, quem admodum in postrema dissectione is mihi Patavij occurrit. Ut uerò delineatio esset apertior, omnes ramos qui à quinto, sexto, septimo, octauo & nono paribus aliò quàm in brachio deducuntur, resectos finxi: uti contra omnes sunt consueti in figura huius libri calci adhibita, & huius plexus imaginem ita exprimente, ut nequaquam pigere debeat & illam quoq; istius

plexus occasione intueri. Characteres autem, quibus hæc figura insignitur, ita se habent.

- 5, 6, 7, 8, 9 Radices parium nervos qui brachium subeunt consistunt, illic resectæ, quæ à uertebriis iam proci-  
dere. Nerui uerò brachij illic sunt abtruncati, ubi iam in brachium prolabantur:  
A Portio quinti paris, à qua tandem nervus deducitur, qui brachium subennitium primus numeratur.  
B Secundus nervus.  
C Tertius nervus.  
D Quartus nervus, qui hic ex posteriori sede prodiit congressus quinti paris & sexti, portionemq; assumit ex po-  
E. steriiori sede congressus septimi paris: ac deinde sub octavi paris nomiq; congressus prorrepens, etiam ramum E insignitum ab illo ita atq; hic expressimus assumit.

F Quintus



F Quintus brachium petens nervus.

G Sextus brachium petens nervus.



D brachium à quinto, sexto, septimo ceruicis neruorum paribus, ac dein à primo secundoq; thoracis, seu totius dorsalis medullæ uertebreis cõtentæ octauo & nono<sup>b</sup> paribus, sex nerui digerûtur: quorû seriem prosequar mox atq; addidero, neruos brachium adituros, statim ab ortu ad uertebrearum latera ita inuicem permisceri coireq;, & rursus inuicem dirimi, ac denuò cõgredi, & postremò se-

A quibus pa-  
ribus nerui in  
brachium du-  
cantur.

Implexus ner-  
uorum bra-  
chium aduen-  
tum.

parari, ut neutiquam dicere queas, quis nam brachij neruus ab hoc illo<sup>c</sup> ue pen-  
deat pari. at uerius quodãmodo sex præcipuos neruos à quadam commixtione, neruorumq; congerie, ac contextu reticulari, principium ducere astrues. Atq; hic implexus tam elegans est, ut ab illius effigie chordulas, Cardinalium galeris appensas, artifices primùm miscere committereq; forsitan didicerint. Quòd autem Natura artificio hoc peculiari, spectatuq; iucundissimo utatur,

quo neruos longissimo progressu deducendos, duriores, & ad iniurias pellen-  
das pertinaciores reddat, neminem ambigere existimo, potissimum si imple-  
xum neruorum crus petentium unà quoq; spectauerit, ac non nimium inter-  
rim Galeno in primo affectorum locorum libro acquieuerit. Cæterum<sup>e</sup> pri-  
mus brachium subiens neruus, eius quinti paris neruorum ceruicis<sup>f</sup> rami, qui  
in<sup>g</sup> musculi brachium attollentis sedem à scapulæ spina pronatam digeritur,  
soboles est, quæ tantum in externæ brachij regionis cutem paulo sub medio  
longitudinis brachij diffunditur, inibi<sup>h</sup> cessat. Quippe inferiorẽ huius regio-  
nis cutem<sup>i</sup> alia exilis propago implicat, quæ nunc dictæ sobolis modo ex alto  
emergens, ab eo editur neruo, qui neruorum brachij<sup>j</sup> quartus erit. Atque hæc  
propago non isti solum cuti furculos offert, sed & illi etiam, quæ externam po-  
sterioremq; cubiti ad humerum articuli sedem amplexatur. Præsentēs nerui,  
ut & omnes quoq; cutem accedentes, membrana, quam cum multis carnosam  
uocare libuit, pulchrè suffulciuntur, & inter hanc & cutem prorepunt, in ho-  
mine multo adipe etiam immersi, mēbranamq; illam cuti pertinaciter com-  
mittentes, at pilorum interim modo graciles. Deinde non eandem perpetuò  
in situ, numero & crassitie retinent seriem: sicut in minoribus uasis, neq; pa-  
rem numerum, neq; situm, neq; magnitudinẽ accuratè obseruari, iam antea  
relatum est. Porrò cæteri quinq; nerui per axillam brachium subeunt, atq; in  
plures ramos quàm primus sparguntur, singuliq; maiores crassiores ue spe-  
ctantur.<sup>k</sup> Secundus itaque brachium petens neruus, ab implexu quem neruos  
brachium ingressuros ad uertebrarû latera efformare dixi, principium ducit.  
unde etiam nemo hunc neruum alicui pari uerè ascribet: quum non uno, sed  
pluribus neruorum paribus textus ille constituatur. Cæterum neruus iste sub  
musculo cubitum flectētium anteriori brachium ingreditur. Vbi enim duo  
illius musculi capita inuicem sunt coitura, neruus ille primùm in brachiũ fer-  
tur: quo etiam loco<sup>m</sup> musculus brachium pectori adducens, insertionẽ secun-  
dum humeri lōgitudinem molitur. uti etiam<sup>n</sup> musculus brachium attollens,  
transuersim inibi humero implantatur: præter insertionem, quam hac pro-  
pemodum regione<sup>o</sup> musculus tētat, qui ab humiliori scapulæ costa pronatus,  
brachium in posteriora allicit. ac demum eius quoq;<sup>p</sup> musculi insertio secanti-  
bus inibi occurrit, cuius beneficio deorsum uersus dorsum humiliora brachium  
agitur. Secundus igitur brachium petens neruus, priori cubitum flectentium  
subditur

Primus ner-  
uus.

Neruus cutem  
subeuntes non  
eandẽ semper  
propaginem se-  
necum.

Secundus nerui  
ingressus.

d 2 fig. chs  
rell. 1, 6, 7.  
b 2 fig. chs  
rell. 1, 6, 9.  
c 2, 3 fig.  
n. p. 1, 2, 3, 4, 5,  
6, 7, 8.

d circa of-  
fisa r. re-  
gonem, in  
2 fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

h 1 fig. chs  
rell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

k 1, 2, 3 fig.  
g. alt. fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

l 6 musc.  
tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

m 1 tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

n 4 tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

o 11 tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

p 10 tab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

subditur musculo: & sub<sup>a</sup> interiori eius capite, quod à scapulæ processu anchoræ speciem referente originem ducit, occultatus, utriusq; eius musculi capitibus furculum offert: ac decliuus prorepens, sub posteriori nuper commemorati musculi sede reconditur. Quas uerò propagines dein diffundat, ubi & ter<sup>o</sup> tertium neruum huc sermone deduxero, subiiciam: qui secundo humilior, ex illo quoq; còplexu, reti ue, quod iam prius à neruorum brachium adeuntium radicibus confici diximus, prodit: & quum alam perrepat, ramum promittit inter muscolum brachium pectori adducentem, & illum quo brachium attollitur, cuti exporrectum, quæ illorum musculorū obducitur lateribus, quæ illi se mutuo contingunt. Simulatq; uerò tertius neruus humero, seu brachij ofsi appropinquat, mox etiam cubitum flectentiū anteriori musculo cooperitur: atq; simul cum secundo neruo deorsum properans, ramulū capiti præbet musculi cubitum flectentium posterioris, quod etiam interdum & à secundo neruo propagine quadam donatur. Cæterum Galenus asserit, à tertio nostri numeri neruo, postquam is ramulum hunc in caput musculi cubitum flectentium posterioris deprompsit, tantam propaginem diffundi, illamq; secundo neruo commisceri, quanta secundi nerui est portio, hæc sub anteriori cubitum flectentium musculo prorepens. Deinde subdit, se semel obseruasse, à tertio neruo ad secundum nullam còmuniciari propaginē. Nos sanè utrunq; quodammodo animaduertimus: sed multo sæpius, & perpetuò ferè in hominē, à secundo neruo<sup>o</sup> propaginem notatu dignæ crassitudinis ad tertium neruum deductam spectauimus, qua tertius neruus crassior ualidiorq; reddebatur. Vt cunq; uerò sit, siue tertius secundo propaginem impertiat, siue à secundo (quod uerum ducō) ad tertium propago pertineat, siue etiam nullus secundi cum tertio congressus fiat, secundus neruus perpetuò deorsum ad anteriorem articuli cubiti sedem contendit, musculo cubitum flectentium anteriore tectus, & in progressu ab externo ipsius latere ramulum spargens in caput musculi ab humero principium ducētis, & radio ad brachialis radicem infert, radiumq; in prouum mouentis. Quum primū uerò secundus neruus ad anteriore usq; cubiti articuli sedem, cubitū ue flexum pertingit, secundum externum latus tendinis musculi cubitum flectentiū anterioris, ad carneam ducitur membranam, in cutem dissipandus. mox enim atq; ab alto emerfit, in duos crassitie impares secatur ramos: quorum unus, qui gracilior ac superior est, aliquousq; cum humeralis uenæ ramo, secundū radium, ad mediam usq; cubiti longitudinē exporrecto, ac dein uersus ulnæ appendicem tendenti deducitur, uniuersam cutem radio incumbentem prætenuibus furculis intertexens: quorum præcipuus, inferiorem radij appendicem superans, ad secundum usq; pollicis pertingit internodium hîc, uti & toto progressu, inter carneam membranam & cutem repens, sobolesq; tenuissimas diffundens. Huic furculo pollicis exporrecto, interdum ramuli accedunt, permiscenturq; ab ijs secundi nerui propaginibus, quas modò internā manus cutem adire scribam. Humilior enim crassiorq; ramus eius secūdi nerui diuisionis, quæ iuxta cubiti flexum perficitur, statim in duas quoq; dirimitur propagines, sub media prorepentes uena, ab humerali ad communis uenæ còstitutionem proficiscente. Vna harum propaginū, quam elatiorem appellare nihil prohibet, postquam dictæ iam uenæ succumbens, ad uenæ communis usq; originem obliquo ductu accersit, relicta uena cuti subtenditur: & in descensu elatius ad radij sedem nonnihil oblique conscendens, secundū internum latus musculi longi, &

radio

Tertij in-  
gressu.Secundū cum  
tertio con-  
gressu.Lib. 3 de Ad-  
minist. diffi-  
cili.Reliqua serun-  
di series.q 5 tab. n.  
o musc. 3  
ab l.  
r 2 fig. 5, 6  
s 23 fig. 4.  
ult. fig. T.

t 2 fig. 2.

u 3 musc.  
tab. per li-  
neam ab l.  
ad Q.

x 2 fig. 4.

y 8 musc.  
tab. T.

z 2 fig. 1.

a ult. fig. X.

b 2 fig. 4.

c 2 fig. 1.  
ult. fig. X.  
d 12 tab. 3.e 6 tab. 4  
musculi 2.  
f ult. fig. Z.  
g 2 fig. 2.  
ult. d.  
h fig. cap. 6  
lib. 3 l.i 2 fig. 13.  
serius 2.k 2 fig. 2.  
ult. b.  
l fig. cap. 6  
lib. 3 h, ad a.m 2 fig. 1.  
n fig. cap.  
6 lib. 3 a.o 2 musc.  
tab. 4.

radio proprij, ad brachialis usq; radicē perfertur.<sup>p</sup> Altera propago, quam memoriae doctrinæq; gratia in scholis humiliorē nuncupo, magis obliquē quā medium cubiti flexus, aut uenæ communis origo consistat, deorsum fertur, ac tandem uenæ interioris cubiti sedis cuti potissimum oblatae attensa, ad brachiale usque<sup>q</sup> prorepat, in multos exiles furculos in progressu absumpta. Nam priusquam longo ductu in cubiti regionem feratur, in duos præcipuos partitur ramos: quorum<sup>q</sup> unus quodammodo radij regioni exporrigitur, alter uero ulnæ: ac uterq; crebrò brachiale superat, ramulos in cutem internæ manus sedis dispargens. Dein ab illis ramulis, qui Veneris monticulum conscendunt, interdum soboles in externam manus sedem excurrūt, neruulis<sup>t</sup> commiscendæ cutem primi pollicis internodij externæ regioni obductam implicatibus. atq; in hunc modum secundus absumitur neruus. Qui uerò Galenus huius nerui propaginem quandam diffundi scribat<sup>q</sup> arteriæ illi quoq; adhærescentem, cuius ante brachiale pulsus tangimus, non satis assequor: quum ea arteria in corporis ducatur alto, profundeq; incedat: non autem, ut descriptæ nobis secundum nerui propagines, in cubiti quodāmodo superficie. præterquā quod illa arteria simul cum attensa ipsi uena, toto ipsius incesu alium insignem sibi in profundo corporis exporrectum, ac coniugem adhærescentemq; uendicet<sup>t</sup> neruum, quem præcipuam tertij nerui brachium accedentium portionem esse, paulo post audies. Tertius namque neruus, simulatque in brachij regione secundum nerui<sup>u</sup> propagine adaugetur, frequenter<sup>x</sup> ramulum in cutem dispensat, anteriori brachij sedi hic obnatam. Hinc in alto uti ab initio repositus, cubiti flexum accedit, æquali propemodum interuallo in progressu à secundo distans, ac anteriorem sedem sibi uendicans. Tertius enim neruus non adamusim per medium cubiti flexus sedem in cubitum delabitur: uerū anteriori sedi insidet<sup>y</sup> tuberis interioris humeri, ac super internum latus quodāmodo uehitur insertionis<sup>z</sup> musculi cubitum flectentiū posterioris. Quum uerò hanc transcendit insertionem, in multas<sup>a</sup> dirimitur propagines, seriatim tunc recensendas, ubi<sup>b</sup> quintum neruum ad cubitum usque sermonis serie deduxero, qui unā cum tertio in musculos digeritur, sedem cubiti interiorem occupantes.<sup>c</sup> Quartus itaq; neruus à reticulari illo neruorum iuxta uertebrarum latera implexu principium quoque ducens, omnium neruorum qui in brachium porriguntur longè crassissimus est, & similiter atque tertius occultatus cum ipso in brachium properat,<sup>d</sup> axillari uenæ & magnæ brachij arteriæ attensus, moxq;<sup>e</sup> insignes utcunq; soboles<sup>f</sup> musculis distribuens, quorum ministerio cubitum extendimus. Priusquam uerò præsens neruus ad medium usque longitudinis brachij pertingat, obliquē retrorsum<sup>g</sup> ad humerum brachij ue os contorquetur, hoc & musculos cubitum extendentes intercedens. Verū anteaquam penitiùs reflectatur, ab interno ipsius latere<sup>h</sup> propaginem emittit, quæ<sup>i</sup> inter musculos cubitum extendentes, & posteriorem cubitum flectentium in internam brachij sedem procidit, uniuersa in illius sedis cutem absumenda, furculosq; partim sursum, partim deorsum multiplici serie sparitura. Porro ipse quarti nerui truncus, ad eum modum secundum humeri posteriora reflexus, sensim ad externam brachij sedem properat, ac ab externo latere<sup>k</sup> propaginem edit, quæ<sup>l</sup> inter exteriorem cubitum extendentium musculum, & caput longi musculi radium in pronum ducentis ex alto emergens, in cutem dispensatur externæ brachij & cubiti articuli sedi obductam. Quum primū autem quartus neruus in alto semper latitās<sup>m</sup> exterius

b b humeri

In 2 lib. de Admin. scilicet.

Tertij nerui ad cubiti usq; flexum progressus.

Quarti nerui in brachij margine, ipsius serie.



humeri contingit tuber, posteriori illius sedi innititur, in qua huius nervi nomine<sup>n</sup> finem à Natura priuatim exculptum diximus, quòd nervus musculis oc-  
cultatus, atque hic in frequentem sobolem spargendus, tutò ueheretur. Mox  
enim atque nervus ille in cubitum ducitur,<sup>n</sup> ramum promit, qui ex alto emer-  
gens, errabundo ductu sub cute ad brachiale usque prorepat, frequentes furcu-  
los in progressu educens, à quibus cutis externam cubiti sedem obtegens in-  
tertexitur. Deinde quartus nervus in duos<sup>n</sup> discinditur truncos, in profundo,  
ut & ipsorum radix, recòditos. Horum<sup>a</sup> alter altero elatior est, ac radio expor-  
rigitur: alter autem qui humiliùs còsistit, secundùm ulnam deorsum fertur.  
Elatior penitiùs inter superius latus musculi bifido tendine brachiale exten-  
denti, & exterius inferius<sup>n</sup> ue latus musculi longi radium in pronum ducenti-  
tis, ad brachiale contendit, in progressu<sup>n</sup> graciles ramulos utriq; quibus occulta-  
tur occultaturq; musculis còmunicans. Vbi uerò elatior hic ramus brachia-  
le accedit, per<sup>n</sup> transversum repit ligamentũ, in externa radij sede bifido \* ten-  
dini brachiale extendenti obductum. Mox autem atque præfens quarti nervi  
ramus externam brachialis sedem<sup>n</sup> contingit, in duas dirimitur propages:  
quarum altera duplici furculo externæ pollicis regioni offertur: altera uerò in  
duas secta soboles, unam indici porrigit, in ipsius externâ sedem duplici quoq;  
furculo absumentam. alteram autem medio largitur digito, eam simplicem  
indiuisamq; interno lateri exterioris eius digiti sedis applicans.\* Demissior ul-  
næq; exporrectus ramus quarti nervi iam cubitum ingredientis<sup>n</sup> bipartitio-  
nis, illico<sup>n</sup> frequentes educit soboles: ac primâ donat capit<sup>a</sup> musculi indicem,  
medium & anularem extendētis: secundam capit<sup>b</sup> musculi, cuius auxilio mi-  
nimus extenditur digitus: tertiam autem offert<sup>n</sup> musculo, brachiale simplici  
tendine extendenti. In ipso autem secundùm ulnam processũ, tribus muscu-  
lorum principijs ab hac originē ducentibus<sup>n</sup> propages exhibet. Horum mus-  
culorum primus est, qui radium in pronum ducentium breuior uisitur: mox  
ille qui triplicem diffundit tendinē, ac unum brachialis ossi primum pollicis  
os sustinenti innectit, secundum primo pollicis ossi, tertium secundo pollicis  
ossi & tertio. Dein musculus, qui tribus pollicis ossibus insertus, pollicem ex-  
tendendo uersus indicem ducit. Mox musculus, cuius beneficio index, ac in-  
terdum quoque medius à pollice in latus abducuntur. Quod uerò huius rami  
reliquum est, brachiale non conscendit, multoq; minus in minores absumi-  
tur digitos: sed uniuersum hic ad brachialis radicē cessat, aliquot furculis bra-  
chialis cum cubito articulum implicans. ad hunc sanè modum quartus ner-  
vus in ramos spargitur.\* Quintus autem à commemorato iam sæpius nobis  
plexu inferius quàm quatuor hætenus descripti, principium obtinens, quar-  
toq; attentus, per axillam in brachium fertur, nullas omnino soboles cuiquam  
brachij parti distribuens. Nam indiuisus<sup>n</sup> inter musculos cubitum extenden-  
tium interiorem, & cubitum flectentium posteriorem, secundùm internam  
brachij sedem occultatus, tantisper porrigitur, dum internum humeri con-  
tingat tuber, ad cuius posteriore reflectitur sedem, hic priuatim habens<sup>n</sup> si-  
num, quo aptè in cubitum uehitur. Quemadmodum enim tertius nervus an-  
teriolem interioris humeri tuberis sedem occupare dictus est, ita sanè & quin-  
tus hic nervus in posteriore sede eius tuberis consistit, pariq; quodammodo se-  
rie cum tertio digeritur. A duobus namque præsentibus nervis<sup>n</sup> propages  
omnibus offeruntur musculis internam cubiti sedem occupantibus, qui & ab  
interiori tubere humeri, & ab ipsa ulna radioq; principium mutantur. Ac à  
tertio

Quinti nervi  
in brachio in  
gressus, ipsiusq;  
series cum ter-  
tio.

n eius. fig.  
v.

o 3 fig.  
cha. 23. ill.  
fig. h.

p 3 fi. cha.  
34. ill. fi. t.  
q 3 fi. cha.  
35. ill. fig.  
h. ill.

r 3 fi. cha.  
37. ill. fig.  
h.

s Inter y  
et x 9. ill.  
muscul.

t 12 musc.  
tab. cha. 3.  
\* 11 musc.  
14. h. musc.

u.  
u 3 fi. cha.  
36.

x 3 fi. cha.  
37.

y 3 fi. cha.  
34.

z 3 fi. cha.  
38.

d 9 musc.  
tab. 2.

b 5 tab. 3.  
c 9 tab. 1.  
d 10 tab.  
13. ill. p.

e 3 fi. cha.  
39, 40, 41.

f 3 fig. cha.  
42.

g 23 fi. \*.  
ill. ji. m.

h 7 musc.  
tab. p. 11.

i 3 fig. ct.  
23 ill. n. s.  
h eius. fig.

v.

12 fig. iu-  
xia cha.  
43 ill. fig.

n.

m s musc.  
 tab. o.  
 n 6 ta. m.  
 o 6 tab. n.  
 p 1 tab. X.  
 q 1 tab. Y.  
 r 1 tab. Z.  
 s 1 tab. V.  
 aut 7 tab.  
 bul. Q.  
 t 3 fi. cha.  
 4 u. ult. fi.  
 gu. d.  
 u ult. figu.  
 lib. 3 g.  
 x 4 musc.  
 tab. d.  
 y 3 muscu.  
 tab. p.  
 z 11 tab. f.  
 a 6 ta. u. d.  
 b 7 ta. cha.  
 2, 3, 3.  
 c 6 ta. f. f.  
 d Ad alte  
 ram latus  
 a 8 tabul.  
 e 7 tab. X.  
 f 2 fi. cha.  
 4 s ultima  
 fig. o. o.  
 g ult. figu.  
 lib. 3 i.  
 h Ex nu-  
 per scri-  
 ptis petu-  
 tur tabul.  
 i 3 tabul.  
 k 2 fi. cha.  
 4 s ult. fi.  
 gu. p.  
 l 9 musc.  
 tabu. inter  
 z et A.  
 tertio quidem nervo potissimum soboles sparguntur in<sup>m</sup> musculum secun-  
 dos quatuor digitorum articulos flectentem, &<sup>n</sup> illum qui tertios eorundem  
 digitorum flectit articulos, mox<sup>o</sup> illum qui tertij pollicis osis flexus est autor.  
 deinde propago quoq; à tertio nervo<sup>p</sup> illi porrigitur musculo, qui ab interno  
 humeri prodians tubere, ac post brachialis osi in dicem sustinenti infertur, bra-  
 chialis flexus opifex habetur. Verum is musculus etiam à quinto nervo surcu-  
 lum subinde asciscit, ut & omnes ab interno humeri tubere pronati. ex quo-  
 rum classe, præter nuper commemoratum<sup>q</sup> is censetur, qui tendine lato in-  
 terne manus cuti subnascitur: dein<sup>r</sup> qui quarto brachialis osi infertur brachia-  
 le flectit, mox<sup>s</sup> qui radium in supinum ducentium superior longiorq; descri-  
 bitur. Porro quintus & tertius nervi, etiam si sparsam hanc propaginum deri-  
 uent seriem, penitus hic non absumuntur: uerum utrorumq; singuli adhuc su-  
 perfunt rami, insignes sanè, & in plures furculos diffundèdi. Ac tertij quidem  
 nervi<sup>t</sup> ramus inter musculum quatuor digitorum secundos flectentem arti-  
 culos, & illum qui tertium pollicis os flectit, radio exporrigitur, unà cum<sup>u</sup> ue-  
 na ac arteria hac deductis ad brachiale properans, &<sup>x</sup> transuersum permeans  
 ligamentum in brachialis interna sede tendinibus obductum. Iste tertij nervi  
 ramus furculos, sed nimis quàm obscuros, quibusdam muscularis exhibere dici-  
 tur: qui in manu repositi, digitorum motibus quoq; præsent. cuiusmodi<sup>y</sup> is  
 est, quo pollex ab indice maximè abducitur: dein<sup>z</sup> quo pollex indici proximè  
 adigitur, &<sup>a</sup> duo pollicis primum flectentes internodiū, &<sup>b</sup> tres secundi ipsius  
 internodij flexus opifices, mox<sup>c</sup> qui indicem ac medium pollicis adducunt, ac  
 duo qui indicis primum flectunt articulum, ac interior deniq; primum me-  
 dij digiti os flectentiū. Verum his muscularis, ut &<sup>d</sup> illi qui radium in supinum  
 ducentium inferior est, nervi potius attenduntur, quàm inferūtur, aut etiam  
 superficietenus adnascuntur. Ipse tamen tertij nervi ramus in uola tres notatu  
 dignas emittit propages, quarum prima pollicis internam accedit sedem, in  
 duos prius dissecta furculos: secunda etiam binis furculis internæ indicis sedi  
 implicatur: tertia uerò simplex, interno tantum lateri interioris medij digiti  
 sedis exporrigitur. Porro quinti nervi<sup>f</sup> ramus, ulnæ attensus, inter musculum  
 secundos quatuor digitorum articulos flectentem, & illum qui eorundem di-  
 gitorum tertios articulos flectit, ad brachiale ducitur, & uena etiam & arteria  
 concommitatus, quæ ulnæ exporrigitur, atq; ad uolam per transuersum bra-  
 chialis ligamentum tendunt. Hic ramus simulatq; ligamentum id superauit,  
 unam propaginem in duos diuisam furculos, minimi digiti interne sedi com-  
 municat: ac unam similiter in duos furculos diremptam, internæ sedi anula-  
 ris digiti offert: mox unam quoq; medio digito communicat, quæ in diuisa ex-  
 terno applātatur lateri internæ medij digiti sedis. Præter has quinti nervi pro-  
 pagines, nullas in manūs musculos spargi animaduerto, in<sup>h</sup> illos dico, qui anu-  
 larem & minimum ad pollicem ducunt, qui primum os minimi & anularis  
 flectunt, cum externo musculo primum medij digiti os flectentium, &<sup>i</sup> illo  
 qui minimū à cæteris digitis in latus remouet. Nam, uti prius monui, his mu-  
 sculis nervi potius attenduntur, quàm adnascuntur. Porro præsens quinti ner-  
 ui ramus, ulnæ exporrectus, ad hunc modum non totus absumitur. nam non  
 perfunctoriè expendendam promit<sup>k</sup> propaginem, paulo inferiùs quàm me-  
 dium ulnæ longitudinis consistit. quum enim ramus hic ulnæ medium emen-  
 sus est, ab externo ipsius latere propaginem illam educit<sup>l</sup> inter musculum bra-  
 chiale flectentium inferiorem, & inferiorem brachiale extendentiū. Propago  
 bb 2 hinc ex

hinc ex profundo elabens, secundum ulnam in externam sedem cubiti porrigitur: & quum externam brachialis sedem contingit, in externam regionem illorum digitorum ramulos spargit, in quam<sup>m</sup> quartus nervus nullas soboles promptit. Diuiditur itaque ea quinti nerui propago in tres ramos, quorum primus duplici furculo externam minimi digiti sedem adit, secundus duplici quoque furculo externae anularis sedi exporrigitur: tertius autem indiuisus, externo implicatur lateri exterioris medij digiti regionis. Quoniam uerò quintus nervus hanc externae manus sedi exporrectā diffundit propaginem, subinde uidimus quintum neruum tot atq; dixi furculos in internam manus sedem non digerere. Haud semel enim obseruaui, à tertio neruo etiam externum latus interioris sedis medij digiti, & internum latus anularis furculos affumere, quinto tunc duas tantum propagines internae minimi digiti sedi, & unam anularis interiori sedi porrigente. Dictam nunc neruorum in manum seriem non iniucundè in teipso obseruabis, modò adamusim nervos alterius manus pollice aut cubiti innixu, ad os ita cōpresseris, ut animalis spiritus transitum compressione cohibeas, ac pars cui nerui inseruntur stupefcat. Fit uerò id iuxta cubiti articulum non multis intestum uestibus, aut non multa adipe (ut in obesis mulieribus) inuestitum commodissimè. nam si pollice quartum neruum aliquandiu compresseris, senties externam pollicis & indicis sedem, & internum quoq; latus exterioris sedis medij stupefcere. Quod autem quartum neruum compressuro, pollicem inter posteriorem ulnae processum, & externum humeri tuber ui impingere oporteat, neminè latet, qui modò surda aure quarti nerui seriem non obaudiuerit. Iam si quintum neruum compressurus, pollicem ad posteriorem interioris tuberculi sedem ui admoueris, mox interna externaq; sedes minimi digiti & anularis, & inferior medij, stuporem experientur. At si maiori conatu anteriorem interioris humeri tuberculi sedem compresseris, atq; ita tertium neruum obstruxeris, ilico interna sedes pollicis & indicis, & pars medij, stupore laborabunt. Quum uerò hæc exploras, pendente pariter, quàm leue sit, nonnunquam motum integro adhuc sensu perire, & sensum quoque motu adhuc integro aboleri. Nam ut cæteros taceam nervos (& ne à reconditis magis exempla petam) da uulnere aut alio affectu quartum neruum, quàm is secundum humeri posteriora reflectitur, aut etiam quàm à reticulari plexu ad uertebrae latera consistenti exorditur, præscindi, aut aliàs ex humoris affluxu, eiusq; generis malo quopiam ita uitari, ut animalis spiritus cum ipso non deducatur, & quintus nervus interim illæsus (uti factu est facillimū) ac integer sit, non ne minimi digiti & anularis extensio perdetur, illorum sensu haud uitato? Nam quintus nervus sensum suppeditans, illæsus est: at propter quarti uitium, musculorum digitos extendentium munus intercidit. Quid si casu quintus nervus, integro interim quarto, confusus, aut alioqui oblæsus fuerit: non ne paruus digitus & anularis stupefcent, ipsorum interim motu haud corrupto? Atq; ut hæc de quarto neruo & quinto, exempli gratia proposui: ita sanè illi, quem neruorum series, & musculorum natura non fugiunt, expendere confingereq; promptissimum est, quàm sensus illæso motu aliquando aboleatur: aliquando autem seruato sensu, motus corrumpatur. Neq; necessum est eò deflekti, quòd maior uis animalis ad motum, quàm ad sensum requiratur: & multo minus admittenda est Anatomicorum quorundam ratio, qua illi confingunt quosdam neruorum furculos motui tantum, alios autem sensui præfesse. Quasi uerò quis neruorum furculus sensu tactus

Qui circa sectionem neruorum in brachio series experiri possit.

Sensum seruato motu perire, & contra.

Lib. 1. de Affectionum locorum cognitione.

m. 1. fig. 9  
educat  
cha. 36.



n 2, 3. fi.  
ult. fi. q. 4.

o fi. 2. ch4.  
48, 49.  
p fig. cap.  
6, 13, 14, 21.

q Confer  
inter se  
nos in 2, 3  
fig. sed ma-  
gi, in ult.

Sexti nervi in  
brachium in-  
gressus ac se-  
ries.

Nervorum  
crassities.

tactus desitueretur, & non quævis tandem corporis pars sua essentia constitutione uel sensui haud repugnans, à quolibet nervorum furculo ipsam perperante, tangendi uim obtineret. Quia uero hæc aliò spectant, sexti nervi (qui adhuc enarrandus superest) seriem quoque perstringemus. Iustus principium ab infima retis iam sæpius dicti sede enascitur, & inconiugatus per axillam in brachium properat, nullibi in alto reconditus, sed cuti internæ brachij sedis substratus, ad internum humeri accedit tuber, in progressu conterminis eius quam perreptat cutis partibus frequentem depromens sobolem. Ad internum uero humeri tuber, in plures partitur ramos, uenæ axillaris propaginibus sub cute exporrectis partim incumbentes, partim quoque substratos. Hi deorsum numerosa propaginum serie secundum ulnam digeruntur, inter cutem & carneam membranam deducti, & priusquam brachiale contingant cessantes, perpetuoque secundum inferiorē cubiti regionem seu ulnam exporrecti. Præsens nervus crassitie secundo respondet, ubi is cubitū accedit. Quintus autem nervus iuxta cubitum tertio in crassitie cōuenit. in axilla autem tertius quinto gracilior uisitur, ipsique similis tunc propemodum est secundus, priusquam scilicet sui portionem tertio commiscuit. Atque ita quintus, tertius & secundus ipsorum in axillam ingressu sexto numeris aliquot sunt crassiores. omnium autem plenissimus est, quem quantum enumeraui: quæadmodum summum est etiam gracilis occurrit, qui primus recensebatur.

QVINQUE PARIVM NERVORVM E' LVM-  
borum uertebri prodeuntium series. Caput xv.

a 2 fig. et  
ult. fi. ch4.  
10, 21, 22,  
23, 24.  
b 2 fi. ch4.  
12, 13.  
c 12. tab. vi.  
muscul. Δ.  
15. tab. I.  
d 14. tab. I.



ORSALIS medullæ lumborum uertebri complexæ nervi, in hoc thoracis uertebRARUM nervis magna ex parte conueniunt, quod à singulis<sup>b</sup> rami retrorsum ducantur in musculos uertebri adnatos. Committitur autem hic uertebri<sup>c</sup> musculus humani thoracis motorum quartus, dein dorsum mouentium<sup>\*</sup> undecimus, ac demum<sup>d</sup> qui huic substernitur decimustertius. Atque his musculis propagines à posterioribus ramis offeruntur, quum illi adhuc reconditi ad uertebRARUM spinas ducuntur. Quando autem rami ex mutuo utriusque lateris musculorum connexu, atque ab ipsis spinarum apicibus procidunt, ad latera denuò excurrunt, cuti & musculo præcipuè intexti, cuius ope brachium uersus dorsum humiliora agimus. Anteriores autem horum parium rami in abdominis musculos, ac illum qui brachium uersus dorsum humiliora detrahit, ipsamque adeo cutem disseminantur, ut & in musculorum dorsum mouentium nonum, & eum qui femur mouentium sextus mihi numeratur. Dein à uigesimo primo pari, seu secundo lumborum, unà cum seminaria sui lateris arteria perquam exiguus furculus ad testem ducitur, si modò à sexti paris nervu<sup>r</sup> cerebri<sup>\*</sup> ramis costarum radicibus exporrectis, atque in intestina propagatis, nullæ soboles ad testes pertingant. nam & ab illis ramis interdum furculos testibus exporrigi animaduertimus. Quinetiam ab anterioribus ramis trium primorum parium ex lumborum uertebri profiliendum, furculi etiam diffunduntur, qui nuper dictos sexti paris ramos costarum radicibus exporrectos accedunt, illosque adaugent. A tribus uero humilioribus è lumborum uertebri elabentium paribus, non minimi sanè nervi crus accedunt: quæ autem serie in illo digerantur, secundo ab hoc Capite exequar.

e 10 tab. 10.  
f 2 fig. ch4.  
50, 51, 52.

g 8 musc. ta.  
h 12 musc.  
tab. 10, 21.

i 2 fig. ch4.  
49, 50.  
h 2 fig. u.  
cap. 2 h.

l Ad la-  
tus ch4. 50,  
22, 23, 24.



V A M cōcinnè Galeni ofsis sacri descriptiones inuicem, ac demum<sup>a</sup> hominis ofsi congruant, primo explicuimus libro, addentes quoq; inter sex hominis sacri ofsis ossa anteriori & posteriori sede foramina exculpi: adeò sanè, ut hominis neruorum series à canum & caudatarum simiarum serie plurimum discrepet. Ac<sup>b</sup> primum quidem par tam in hominibus quàm quadrupedibus inter os sacri ofsis primum, & infimam lumborum uertebream ea prorsus ratione, qua neruorum paria è lumborum uertebreis egrediuntur, procidit, moxq; ab egressu raramum in posteriora non secus ac superiora paria diffundit, qui etiam similiter atq; posteriores illorum parium rami, digeritur. Priuatim uerò à posteriori illo primi paris sacri ofsis ramo, propago utcunq; insignis in musculos spargitur, ab ilium osse principium ducēs, potissimum autem in<sup>c</sup> primum femur mouentium. Dein eius propaginis soboles non poenitendē in cutem clunibus obductam deriuantur. Anterioris uerò præsentis paris rami præcipua portio neruis in crus deducendis permiscetur. Is enim totus in crus non absumitur, quum ab illo<sup>d</sup> propago secundum internam ilium ofsis sedem exporrigatur, furculos offerēs abdominis musculis, & illi pariter<sup>e</sup> musculo, quem ab interna ilium ofsis sede pronatum, femur mouentiū septimum recensui.<sup>f</sup> Cæterum quinq; humiliora sacri ofsis neruorum paria peculiari procidunt ratione. Nam priusquam ex ipso osse elabantur, gemina ab utroq; latere sunt, & unus neruus utrobique à singulis paribus in anteriora procidit, & unus item utrobique retrorsum: atq; hæc series in hominibus uisitur. In simijs uerò & canibus alia occurrat. uti enim tria tantum in illis sacri ofsis neruorū sunt paria, sic etiam duo solum inferiora anteriùs posteriùsq; excidunt. Dein reliqua paria (quæ in canibus & caudatis simijs cernuntur numerosa) ab ofsis coccygis (ut sic etiam de illis animalibus loquar) lateribus (uersus posteriora tamē magis) in eum modum prodeunt, quo ex thoracis & lumborum uertebreis nerui egrediuntur, quum interim ab hominis ofse nobis coccyge uocato, ne unus quidem exiliat neruus. Adeò sanè, ut minimè mirandum sit, si ego in horum neruorum paribus recēsendis, à Galeni sententia in libro de Ossibus procul declinem. Quinq; igitur sacri ofsis inferiora paria neruos in posteriora excidentes ad musculos potissimum digerunt, qui ilium ofsis & sacri ofsis posteriore occupant sedem: ex quorum classe in dextro latere est musculus dorsum mouentium<sup>g</sup> undecimus, ac dein<sup>h</sup> decimustertius, præter membranē initium<sup>i</sup> musculi brachium ad dorfi humiliora agentis, & \* quartum humani thoracis motorū. Item<sup>k</sup> quatuor primi femur mouentium, ac cutis deniq; clunibus obducta, quæ ipsa quoque propaginibus aliquot ab illis neruis donatur. Anteriores uerò nerui uariè magis digerūtur. siquidem tres superiores, primi paris modo in crus (uti subsequenti narrabo Capite) properant. Duo autem humiliores nerui, qui sexti septimiq; parium propagines sunt, in ani musculos digeruntur. ad hæc, in uteri ceruicem frequenti sobole, uti etiam in uiroꝝ uesicæ ceruicem penem<sup>l</sup> ue, pertinent. Nam uesicæ ac uteri item fundus plerunq;<sup>m</sup> neruulos ab illis mutantur ramis, qui à sexto pari neruorum cerebri costarum radicibus sub tunica costas succingēte exporrigūtur.<sup>n</sup> Terminus uerò dorsalis medullæ ex sexto sacri ofsis ofse procidēs, nerui ritu mihi haudquaquam digeri uisus est, etiam si hunc à

<sup>a</sup> Spectat hæc fi. cap. 15. l. 11.

<sup>b</sup> 2 fig. et ill. char. 15.

<sup>c</sup> 2 fig. char. 14. d 9 musc. tab. 11.

<sup>e</sup> 2 fig. char. 15. f 8 tab. A. g Cōfer se eundem fig. tertie.

<sup>h</sup> 15 musc. tab. 11. i 14. l. 1. T. k 9. l. 1. O. l 12 musc. tab. 11. l 9 tab. 11. m 13. n 13. fig. char. 16.

hunc à quibufdam neruum coniuge carentem uocari non ignorem. In homine tamen, cuius facrum os quinq; tantum efformari uidebatur ofibus, medullæ dorsalis terminus ab offe procidens, unum utrinq; diffundebat furculum, hac ratione sexti paris sacri ofis uices fupplens.

NERVORVM FEMVR, TIBIAM ET PEDEM  
adeuntium distributionis ratio. Caput XVII.



R V R I iuxta femoris initium à dorsi medullæ lumborum uertebreis, & offe sacro cōplexæ neruorum paribus, quatuor nerui offerūtur, à reticulari quodāmodo plexu perinde procedentes, atq; præcipuos brachium petentes neruos pronafci, iam antea relatum est: quanquam magis uarius in ceruice, quàm hic ad lumbos facrumq; os neruorum implexus occurrat. His neruis non eadē obigit crassities, multoq; minus par series & ductus. qui enim primus ac tertius recensebuntur, graciles sunt. Secundus autem duobus illis crassior subinde reperitur, licet interea tenuis quoq; sit. quartus uerò illorum trium unā complexorum

Quatuor nerui  
crus peten  
tes.

crassitiem longē uincit. Primus à suprema parte implexus neruorum in crus pertinentium originem ducit, ubi scilicet tertij lumborum paris (quod ordine in uniuerso dorso uigefimum secundum est) anterior ramus quarto lumborum pari commiscetur. Neruus hic lumborum incumbens<sup>c</sup> carnibus, ac peritonæo substratus, in femur procidit secundum exterius latus tendinis<sup>d</sup> sexti femur mouentium musculi, qui unā cum septimo femoris motuum autore musculo hāc supra coxendicis os ad<sup>e</sup> minorem femoris processum cōtendit. Simulatq; uerò neruus ille femur contingit<sup>f</sup> ramum depromit cuti paulo minus quàm ad genu usq; exporrectum, quæ anteriori femoris sedi uersus externum ipsius latus obducitur. Porro<sup>g</sup> maior præsentis nerui portio in alto laticans, aliquot propagines deriuat<sup>h</sup> primo tibiā mouenti musculo, qui ab antica sede appendicis ilium ofis principium ducit: dein & septimo tibiā mouenti musculo, qui à maioris processus femoris radice enascitur: mox quoque nono tibiā motuum auctori, atq; cum illis musculis primi huius nerui grandior portio decliuus ducta, elatius quàm genu consistat articulus, terminatur.

Primi nerui series.

Secundus neruus suum principium inferius quàm primus adipiscitur, eregionē uidelicet uigefimi secundi paris neruorum dorsalis medullæ, seu eregionē articulationis tertiæ lumborum uertebre cum quarta. Hic neruus peritonæi etiam posteriori regioni subtenfus, simul cum<sup>m</sup> uena & arteria per inguina femur petētibus in crus porrigitur, ac mox ab interno ipsius laterē<sup>n</sup> ramum deriuat, & uenæ ad pedis usq; pollicē<sup>o</sup> attensum, quam ab inguine per internam femoris sedem, ac per genu articulum, internamq; tibiæ regionem sub cute ad summum usq; pedem protendi cōmemorauimus. Atq; ut illa uena uarias soboles in progressu ad cutem illi cōterminam diffundit, ita sanē & hic secundi crus petentis nerui ramus anteriori uenæ illius sedi toto ductu cōtiguus, soboles passim in cutem spargit: quarum<sup>p</sup> illæ sunt præcipuæ, quas anteriori & interiori uersus poplitem, genu regionibus offert. Neq; sanē ofcitater obaudiendum est, præsentem ramum anteriori uenæ parti exporrigi, ut in eius uenæ sectione, quam mox sub genu aut iuxta interiorē malleolum molimur, scalpellus retrorsum atq; in posteriora impingatur, ne is casu antrorsum actus, neruū præfecet. Ceterum<sup>q</sup> grādiōr secūdi nerui portio simul cū uena ac arteria ipsūm

Secundi nerui series.

bb 4 conco-

d 2 fi. cha.  
57, 60, 66,  
7 uult. fig.  
57, 73, 104.

b 2 fi. cha.  
57 uult. fig.  
c.

c 8 muscu.  
lab. o, m.  
d 2 tab. o  
cum A.  
e 1, 2 figu.  
et p. 30 lib.

f 2 fig. cha.  
58 uult. fig.

g 2 fi. cha.  
59 uult. fig.

h 3 muscu.  
tab. x.  
i 5 tabul. A.

ab u.  
k 4 tab. o.  
l 2 fi. cha.

60. uultim.  
figur. 7.

m uult. figu.  
lib. 7 d.

n 2 figur.  
cha. 64 uult.

fig. 4, 6.  
7 uult. fig.

lib. 3.  
m. m.

o 2 fi. cha.  
62.

p 2 figur.  
cha. 63.

q 2 figur.  
cha. 64.

uult. fig. 6.



concomitantibus, reconditur, & in musculos anteriorem femoris sedem occupantes quoq; digeritur: præcipuè autem in<sup>r</sup> quintum femur mouentium, & in<sup>r</sup> octauum tibiā mouentium, cum quo etiam secundum internum latus<sup>r</sup> noni tibiā mouentiū musculi deorsum fertur, & supra genu articulum non minus quā primus neruus cessat, in progressu membranulis uasa colligantibus exiguas porrigens soboles.<sup>r</sup> Tercius neruus secundo succedit, illic potissimum enatus, ubi quarta lumborum uerthebra quintæ articulatur. unde peritonæo quoq; succumbens, & musculo femur mouentium septimo uectus, ad pubis ovis<sup>r</sup> foramen contendit. quod quum permeat, nono & decimo femur mouentibus musculis ramulos porrigit: mox uerò & illis musculis, qui à pubis ossē pronati, peni peculiare censentur. At ubi paulo demissius prorepit, duorum neruorum, quos iam descripsimus, ritū, ramum emittit cuti internam femoris sedem iuxta inguina occupanti. Dein eius nerui<sup>r</sup> reliquum, sobolem offert<sup>r</sup> secundo tibiā mouenti musculo, ac dein<sup>r</sup> quinti etiam femur mouentis musculi portioni à pubis ossē pronatæ ramum deriuat, supraq; medium lōgitudinis femoris terminatur.<sup>r</sup> Quartus cruris neruus tertio quidem ortu sublequitur, at sextuplo etiā crassior est, atque ex uigessimiquinti ac trium succedentium parium anterioribus ramis potissimum conflatur: non solum omnium corporis neruorū crassissimus, uerū etiam quum hinc à dorsalis medullæ quasi termino principiū obtineat, durissimus, pariterq; ualidissimus. Hic neruus peritonæo quoq; subditus, inter sacri ovis<sup>r</sup> latus, & illi os, quā hæc ossa inuicem dehiscunt, tanquam per<sup>r</sup> sinum ipsi peculiariter paratum ducitur, & mox<sup>r</sup> ramū ex posteriori ipsius sede pullulat, qui aliquousq; sub<sup>r</sup> primo femoris motorum latitans musculo, tandem ad cutem procidit, soboles distributurus cuti, inferiori clunium sedi obtensæ, & illi pariter cuti, quæ posteriorem femoris sedem nonnihil ultra mediū longitudinis femoris integit. Cutis enim supra genu in posteriori femoris sede reposita, ab<sup>r</sup> alia quarti nerui propagine ramulos obtinere mox decebitur. Posteaquam igitur quartus neruus hunc ad cutē deprompsit ramū,<sup>r</sup> alias utcūq; grandes distribuit soboles in musculorū<sup>r</sup> capita digerendas, quæ à coxendicis ovis<sup>r</sup> appēdice principiū ducunt, quorum tria tibiæ motibus famulatur, ac tertium, quartū & quintum tibiā mouentes cōstituunt musculos. quartū uerò caput, quintū femur mouētium efformat musculū. Quartus neruus hinc inter musculos posteriore femoris sedem sibi uendicantes reconditus, deorsum fertur, ac paulo sub medio longitudinis femoris<sup>r</sup> ramum educit in quarti tibiā mouentis musculi<sup>r</sup> partem à femoris ossē, ac si peculiaris esset musculus, enatam. Ab hoc ramo propagines in cutem excurrunt humiliori sedi posterioris femoris regionis iuxta genu obductam. Simulatq; quartus neruus inferiorum femoris capitum radicem spectat,<sup>r</sup> utrinque unam edit propaginem, in<sup>r</sup> capita musculorum disseminandam, qui tres primi pedis motores enumerantur. Quando autem quartus neruus in<sup>r</sup> sinu<sup>r</sup> consistit, quem duo inferiora femoris capita mutuò dirempta efficiunt, in<sup>r</sup> duos crassitie inæquales truncos partitur, à quibus uniuersæ propemodum tibiæ & pedi item nerui offeruntur. Nullus enim in tibiā neruus procidit, à quarto non diductus, præter<sup>r</sup> ramum secundi crus petētis nerui inferiori femoris & tibiæ & pedis sedi exporrectū. cuius etiā uices is quarti nerui<sup>r</sup> ramus non semel subire uisus est, quem paulo post secundum internam tibiæ sedem (uersus suram tamen magis) sub cure ad internum usq; pedis latus diffundi scribam. Cæterum neminem mirari uelim, quòd quartum neruum

non secus

Tercii nerui  
femoris.

Quarti nerui  
femoris.

r 8 muscu.  
tabul. 6. c.  
56 tab. r.  
4 146. 9.

u 2 fig. cha.  
66 mli. fl.

x 8 tab. A.  
y 12, 1 fig.  
cap. 29 lib.  
17.

z 8 tab. v.  
4 146 tab. 2.  
G. H.

b 1 2 figu.  
cap. 40 lib.  
2 K. L.

c 2 fig. cha.  
5 mli. fig. u.  
d 2 fig. 69.

u 16 muscu.  
tabul. 2.  
f 1 4. 9. c.

g 2 3 figu.  
cha. 7 mli.  
fig. 4 c.

h 2 3 figu.  
cap. 25 lib.  
1 c.

i 2 3 figu.  
cha. 7 1/2  
mli. fig. u.

k 9 tab. r.  
12 fig. cha.  
74.

m 2 fig. cha.  
77 mli. fig. u.  
11 10 muscu.

tab. r. 5.  
11 tabul. 2.  
69 1/2 c.

o 2 fig. cha.  
74 mli. fig. u.  
p 11 tab. 5.

q 2 fig. cha.  
75 mli. fig. u.  
r 4 c. 1.

s 1 fig. cap.  
30 lib. 1 1/2.  
t 2 fig. cha.

u 10 muscu.  
tab. 1 1/2.  
x 2 figu.

cha. 61.  
y 2 figu.  
cha. 21.

non secus quàm si unicus esset, non autem (ut Galenus docet) geminus, secundum totam femoris longitudinem fermione deduxerim: quum uniuersus in homine unicam obtineat circumscriptionem. & si quis ipsius qua inuestitur membrana unguibus dirempta, hunc uelut in duos neruos dirimere proposuerit (quod leui etiam sit negotio, si manum ab ea<sup>e</sup> sede, qua neruus propè femoris inferiora capita bipartitò scinditur, sursum ad mediam usq; femoris longitudinem duxeris) etiam licebit in quàm plurimos neruos ipsum hac ratione diuidere: quum is aliud nihil sit, quàm plures nerui instar plurium rectorum funiculorum protensi, & membranis circumdati. Ac proinde ea ratione, qua quis quartum neruum geminum esse còtendet, ego illum decem & octo neruis consilari astruam, quum aliquando tot ipsius portiunculæ seu funiculi illos studiose numeranti occurrerint. Quotcunque uerò quartus neruus constet partibus, in poplite, uti prius dicebam, uniuersus in duos impares dirimitur truncos. Exterior, qui & gracilior est, uersus fibulæ cum tibia connexum prorepens, mox<sup>o</sup> ramum à se profert, qui secundum externum tibiæ latus, exteriorenq; malleolū, ad pedis usq; externam sedem, minimumq; digitum, sub cute exporrigitur, surculos utcunq; graciles ipsi cònterminat cuti toto incessu offerens. Præcipua uerò exterioris trunci portio, septimū pedem mouentis musculi caput subiens, ramum ex alto quoque dispargit sub cute, ultra medium longitudinis tibiæ excurrentem, quæ anteriori tibiæ sedi obducitur. Ipsum autem præcipuæ portionis reliquum, iuxta fibulæ externum latus descendit, inter septimum eum musculum, & octauum pedem agentium occultata, & illuc usque prorepens, ubi in exactos tendines illi musculi definiunt, uersusq; exteriorem malleolum reuolui incipiunt. Interior idemque crassior diuisionis, quam quartus neruus in poplite molitur, truncus, rectà deorsum incedit, & ab interno latere ramum depromit, secundum internam tibiæ sedem, modicè uersus posteriora ad internum malleolum, & hinc ad internum pedis latus ad pollicem usque sub cute exporrectum, & utrinq; soboles in progressu perinde à se edentem, ac reliqui assueuerunt rami, inter cutem carneamq; nobis uocatam membranam excurrentes. Huius generis alius adhuc ramus, etsi non adeò insignis, ab interiore quarti nerui trunco, humilior paulo quàm nuper dictus emittitur, in cutem quæ suram integit, uariè disseminatus. Verum ipse truncus in tibiā nunc plenè delapsus, ac sub musculis latitans posteriorem tibiæ sedem occupantibus, notatu dignam inibi edit<sup>o</sup> propaginem, ubi fibula primū à tibia hic iuxta genu dehiscit, membraneiq; ossa ea ipforum tota longitudine necessantis ligamenti superior sedes occurrit. Propago enim illa ligamentum hoc permeat, & in anteriorem tibiæ sedem ducta, secundum illud ligamentum deorsum repit, inter<sup>o</sup> musculum pollicem extendentem, & eum qui reliquos pedis digitos extendit, recondita, illisq; quibus attenditur musculis soboles quoque dispensans. Quod autem ipsius est reliquum, unā cum dictorum musculorum tendinibus pertransuersum incedit ligamentum, in anteriori tibiæ regione iuxta pedem occurrens. Atque quum propago hæc in superiora usq; pedis contendit, musculis potissimum distribuitur pollicem, & tres ipsi proximos digitos in externum latus abducentibus. Quemadmodum uerò propago hæc antrosum ab interno quarti nerui trunco educitur, ita quoque alia (sed multo gracilior) in posteriora ab illo distribuitur, inter posteriorem quarti pedem mouentium musculi sedem, & anteriorem duorum primorum musculorum eidem

Quæ quartus  
neruus ueluti  
pluribus senci-  
culis constare  
uideatur.  
Lib. 3 de Ad-  
mimis. dis-  
tinctionibus.

z figur.  
char. 76.

a 2 figur.  
char. 77.  
ult. fig. 77.  
b 2 figur.  
char. 78  
ult. fig. 78.  
c 2 figur.  
char. 79  
ult. fig. 79.  
d 6 musc.  
tab. 9. 2 id.

e 2 fi. cha.  
80 ult. fi-  
gur. e.  
f 2 figur.  
char. 81.  
g 2 figur.  
char. 79.  
h 2 muscu-  
tab. 9.

i 2 figur.  
char. 82.  
ult. fig. 82.  
k 2 figur.  
char. 83.  
ult. fig. 83.  
l 2 figur.  
char. 84.  
ult. fig. 84.  
m 2 figur.  
char. 85 ult.  
fig. 85.

n 15 musc.  
tab. 7 in-  
ter R. et S.  
o 5 musc.  
tab. 9.  
p 4 musc.  
tab. 9.  
q 2 figur.  
char. in se-  
rior 85.

r 1 muscu-  
tab. 9.  
s 5 musc.  
tab. 9.  
t 2 fi. cha.  
85.

u 2 figur.  
char. 86.  
x 15 musc.  
tab. 9.  
y cad. tab.  
7, 7.

eidem muneri præfectorum regionem eouſq; descendens, ſparſaq; ac trium horum muſculorum tendines inuicem plenè non uniuntur. Porro<sup>a</sup> quod ex quarti cruſ petentis nerui trunco interiore adhuc ſupereſt, ſecundùm poſtèriorem tibiæ ſedem, cum<sup>b</sup> quinto pedem mouentium muſculo, &<sup>c</sup> ſecundo &<sup>d</sup> tertio pedis digitos mouentibus, deorſum fertur: & illorum muſculorum tendinibus concomitatum, ad poſtèriorem malleoli interioris ſedem reuoluitur, pedisq; inferiora ſubit, muſculis inibi reſoſitis attenſum, & ita in ſurculos diſſectum, ut duo ferè humiliori cuiuſque digiti communicentur ſedi, totuſq; quartus cruſ adeuntium neruus eum in modum abſumatur. In cuius ſerie (potiſſimùm uerò per tibiã) commemoranda, ſi haud leuiter à Galeni placitiſ me declinaſſe animaduertiſ, non ſit obſecro moleſtum, ipſius deſcriptionem cum uera humani corporiſ ſectiõẽ expendere: ut unã mecum diſcas, quã timidè quantumuiſ etiã pròbatifſimis autoriſ ueniat acquieſcendum. Quibuſ autem modiſ neruorum omnium ſectiõ oportunè ſit adminiſtranda, ſub finem trium ſequentium librorum ſuo loco utcuq; enarrabo: nunc grandiore neruorum imagine quarto huic libro colophonem adiecturus.

NERVORVM

a 2 figur.  
chava. 17  
ult. fig. u.  
b 15 muſc.  
tab. D, E.  
c 14 muſc.  
tab. A.  
d 14 muſc.  
tab. B.



NERVORVM DELINEATIO, QVAE SEPTEM PARIVM NERVORVM QVI A CERE-  
BRO ET DORSALIS MEDULLAE INITIO PRONASCVNTUR ORTUS PROPONIT, ET DISTRIBU-  
tionem seriemq; omnium parivm quae à dorsali medulla in dorso sibi complexa originem ducunt, pulcherrimè refert.

CHARACTERVM INDEX.

- P**RAESENT I figura cerebrum una cum cerebelli cerebriq;  
exortibus eum in modum delineatim, quasi à calvaria eundatum  
in ipsius basi sic conficretur, ut apparet, si quis cretus caput in po-  
steriora quam maximè flecteret, sursum retrorsumq; oculos altissimè  
erigens, quomodo charactervm Index huic chartae pulchre adhiberi posset, si-  
guam ac si altero careret brachio ac crure delineatim, praecipue  
quomodo eadem utriusq; sit ratio.
- A, B, C** Cerebri ex altero latere basili notatur, ac **A** indicat partem ipsius  
ad nervum summum promissulam, nonnulliq; mamillarem processum  
nuncupatam. **B** vero cerebri partem insulam, amplum calvaria-  
sum subeuntem, qui ad latum sinus conficitur, quo glans cerebri pui-  
tam excipiens reponitur. **C** autem maximè plicatam cerebri sedem  
notat.
- D, D** Cerebellum.
- E** Similes cerebri processus, organo olfactus praecipue subministrant.
- F** Nervus usq; sinistri ortus.
- G** Nervorum usq; sinistri ortus.
- H** Tunica, in quam usq; nervus excluditur, degenerat' ue.
- I** Secundum nervorum cerebri par.
- K, K** Minor radix terti par.
- L** Crassior radix terti par.
- M** Quartum par.
- N** Quinti parii gracilior radix.
- O** Quinti parii insignior radix.
- P** Membrana, in quam quintum par in auditu organo praecipue exel-  
uitur.
- Q, R** Maioris quinti parii radices propaggines, quorum hac per eadem elab-  
itur foramen alla vero per aliud sibi proprium.
- S** Sextum nervorum par.
- T** Septimum nervorum cerebri par. Atq; horum nervorum progressus  
hic non delineatim potuit, uti elegantissimè proponuntur secundum  
figura, huius libri secundo Capiti praeposita.
- V** Dorsalis medulla ex cerebri basi medio initium.
- X** Dorsalis medulla sedes, quae calvariam egerit.
- Y, Z** Numeri characteres ipsam cervicis, duodecim thoracis, quinque  
lumborum, & sex sacri ossis indicant vertebrae, atq; adeo triginta  
nervorum à dorsali medulla tam in illis vertebrae contenta proficien-  
tium paria, quorum seriem quam potui accuratissimè & simplicissi-  
mè in hac tabula meo Marte expressi. Perium quia hic locus exiguum  
characterum declarationem admittit, non omnes nervorum solos li-  
teri inscripturus sum.
- P** Septi transversi similiter nervum, quem citra aliam characteri operam  
ex quarti, quinti & sexti parivm propagginibus efformari conspicio.
- Q** Nervus à quinto parii, cui summum humerum muscifici, & dein  
musculus brachium attollens praecipue distribuitur.
- R** Prima brachii nervus, ipsiusq; propaggines hic in eadem excurrentes.
- S** Secundus brachii nervus, ipsiusq; in anteriorem cubiti flexionem  
musculum flectens.
- T** Tertius brachii nervus, ipsiusq; propaggines, cuius anteriorem brachii so-  
dem adducit adiacens.
- V** Tertii nervi propago ad posteriorem musculum cubiti flexionem.
- X** Secundi nervi portio, tertium accedens nervum.
- T** Ramus secundi nervi caput adiens longioris radii in primum mo-  
nentium musculi.
- Z** Secundi nervi distributio in duos impropares ramos.
- a** Minor ramus secundum radii cuti ad pollicem usq; exortectus.
- b** Crassior ramus, mox in duas propaggines diusus, quarum series in con-  
spicuo est.
- c** Tertii nervi sololes, in musculis internam cubiti sedem occupantes di-  
gesta.
- d** Tertii ramus radio exortectus, ac dein pollicis & indicis & medio  
furculis offertur.
- e, e** Quartus brachii nervus, atq; inferius e ramos notat musculi cubi-  
tum extendentibus depromptis.
- f** Quartii ramus, internam brachii cutem adiens.
- g** Quartii ramus, externam & posteriorem brachii accedens cutem.
- h, h** Quartii ramus, cuius externa cubiti digestus.
- i** Quartii praecipua distributio ad ingressum cubiti.
- k, k** Quartii ramus radio exortectus, & externa sedi pollicis, indicis, &  
medii sololes offertur.
- l, l** Quartii ramus, ulna exortectus, & musculi ab externa ipsius sede  
initium ducentibus ramulis exhibens, ac ante brachiale cessans.
- m** Quintus brachii nervus.
- n** Quinti nervi series in musculis ab interno brachii ossis tubere pronat-  
os.
- o, o** Quinti nervi ramus, ulna exortectus, & interno sedi parvi digiti,  
& anularis, aliquando & medij ramusculis dispergens.
- p** Disti modo rami sololes, in externam manus sedem reflexa, & exter-  
na parvi digiti sedi & anularis & medij furculis dispergant.
- q, q** Sextus brachii nervus, ipsiusq; sub cute tantum ducta series. Quis ue-  
ro brachii nervorum sit exortus, eorundemq; principiorum plexus,  
abique notis promptè dignoscitur.
- r, r, r** Nervus sunt intercostales, illic praefici, quia cum costis antrosum refle-  
ctuntur.
- s, s** Rami in posteriora deducti, hic etiam undiq; obliqui.
- t, t** Eiusmodi serie nervi musculis aduent thoracis ossibus infratos.
- u, u** Propaggines indicantur, sexti parii nervorum cerebri rami colla-  
rum radicibus exortectum augentes.




- x, x** Propaggines nervorum ex lumborum vertebra  
excurrentium, quae abdominis & huius sedis  
musculis & cuti dispenantur.
- y** Nervulus testem frequenter petens, hanc re-  
sistit.
- z** Propaggines sextam femur momentum adeum  
te musculum.
- z** Prima femur petens nervus.
- a** Primi nervi propago, cui obliata.
- a** Primi nervi propago, alius inter musculis  
absumpta.
- y** Secundus femur petens nervus.
- a, a** Secundi nervi sololes, per internam femoris  
& tibia sedem ad pedis usq; superiora sub cu-  
te excurrentes.
- i** Secundi nervi propago, musculi anteriorem  
femoris sedem occupantibus deprompta.
- f** Tertius femoris nervus.
- u** Tertii propago, internam femoris cutem im-  
plicans.
- d** Tertii propago musculis adiens.
- i, i** Quartus femoris nervus, cuius exortus aequè  
atq; trium superiorum est conspiciendus.
- u, u** Series anteriorum propagginum inferiorum pa-  
rii & sacro ossis proceduntium.
- u** Dorsalis medulla extremum.
- u** Quartus femur petens nervi propaggines, ad  
capita musculorum à coxendicis ossis appendi-  
ce proceduntium sparsa.
- v** Quartii nervi sololes, in posteriorem femoris  
cutem ad medium usque longitudinis femoris  
excurrentes.
- g** Propago praecipue in quantum tibiae momen-  
tum musculum, ac dein in reliquam posteri-  
orem femoris cutem iuxta genu digesta.
- o** Sololes in musculis sparsa ab inferioribus fe-  
moris capitibus pronatos.
- w, r** Quartii nervi in duos truncos distribuiti, ac  
quidem minoremq; nervi insigniorem notat.
- r** Minoris trunci propago, externa tibiae cuti ad  
parvi digiti usq; extremum diffusa.
- r** Propago fibulae inter musculis exortectus.
- v** Ramulus anteriorem tibiae cutem implicans.
- q, q** Grandioris trunci ramus, interna cuti tibiae  
ad pollicem usq; digestus.
- x** Grandioris trunci ramus, posteriori tibiae seu  
surae cuti exortectus.
- g** Grandioris trunci ramus, qui ligamentu  
fibulam tibiae, quae hac  
ossis iunctum dehiscent,  
committit, premittit, ac  
dein ad digitorum ossis  
superiora excurrit.
- o** Praecipua grandioris tra-  
ci portio, inter tibiae os  
& calcem pedis inferio-  
ra petens, singulinq; di-  
gitis furculis offertur.

CIBRI QVARTI  
FINIS.

ANDREAE VESALII 555  
 DE CORPORIS HUMANI FABRICA LIBER  
 QVINTVS, ORGANIS NVTRITIONI QVAE CL-  
 bo potuq; fit, & dein propter partium connexum ac uiciniam instrumentis  
 generationi famulantibus dedicatus, & omnes sibi peculiare figu-  
 ras seriatim simulq; mox in initio ostendens, quo minus  
 eadem figuræ plerisq; Capitibus passim  
 præponendæ ueniant.

PRIMA QVINTI LIBRI  
 FIGURA



PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEM'QVE  
 characterum Index.

*PRÆSENTI* figura tanta humani corporis portio delineatur, quanta ad peritonæum ostendendum  
 sufficit: exprimitur enim hic anterior peritonæi sedes, sectionis serie ab octo abdominis musculis libera, nullaq;  
 ex parte dissecta.

*A, A, B, C, D* His characteribus peritonæum inscribitur.

*E, E* Linea à mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubis usq; ossium commissuram procedens, cui oblique descen-  
 dentium & oblique ascendentium, & transversim procedentium abdominis muscularum nervosae tenuitates  
 pertinacissimè conascuntur.

*F* Umbi-

*F* Umbilicus, quem inter dissectandum etiam ademptis abdominis musculis, gratia opportuna umbilici uasorum demonstrationis, reservare solemus.

*G* Seminaria sinistri lateris uasa, suis membranis, quas à peritoneo mutantur, adhuc obvoluta.

*H* Seminaria dextri lateris uasa.

*I* Vena ac arteria, quæ potissimum inferiori sedi rectorum abdominis musculorum exporriguntur, quorum & hic quoque propendet portio, pubis ossibus adhuc connexa.


*K* Vena & arteria, quæ sub osse pectoris exporrectæ, in anteriorem abdominis sedem prolabantur, præcipuè rellis abdominis oblata musculis, ac superiorem abdominis sedem uniuersam quoque implicantes: quemadmodum ille quas *I* insigniuimus, per humiorem, & pubis ossibus uiciniorem abdominis regionem expaciantur.

*L* Soboles uenarum in peritonei latera excurrentium, ac ab illis uenis deductarum, quæ aut à coniuge carente uena, aut à cana geniculatim pronascuntur, quæ ipsius caudex lumborum uertebri colligatur.

*M* Transuersi abdominis musculi portio, à peritoneo diuulsa, retrorsumque flexa.

*N* Ilium ossis sedes hic nuda conspicitur, cui obliqui transuersique abdominis comittebantur musculi. Verùm quum præsentī figuræ, uti etiam subsequētibz omnibz, ea duntaxat organa explicare uisum sit, quæ hoc pertractabuntur libro, non est quod illis quoque indicem partes, quæ figuris ob hoc adduntur, ut describenda parius sedes in conspectu promptior esset: cuiusmodi in hac figuræ est thoracis inferior sedes, abdominis musculi, & ipsi qui brachia & scapulas agunt, libera: ut & femorum initia, cute duntaxat denudata.

## SECUNDA QUINTI LIBRI FIGURÆ.





*H* AEC figura primam sectionis serie subsequitur. hic namq. peritonaeum recta linea a pectoris ossis mucronata cartilagine ad pubis usq. os ita diuisum est, ut umbilici uasorum nullum uitiauerim: dein transuersa sectione a sinistro illo ad dextrum ducta, quatuor peritonaei anguli ab anteriori corporis sede in posteriora reflexi conspiciuntur. Praeterea umbilici quoq. pars, una cum ipsius uasis, quae peritoneo prius connecebantur, oculis subiaceat. Ad haec, praesens figura iecoris portionem, & uentriculi sedem, ac omenti intestinis obducti suum indicat, quem omentum obtinet, quum manibus ipsum uersus pubis os inter diffecandum trahitur, si quando sursum uersus sinistrum latus (uti plerumq. accidit) retractum adinuenitur.

*A, B, C, D* Quatuor peritonaei partes diffectae, ac in posteriora reflexae, addo ut interna anterioris peritonaei sedis regio hic ex sectionis serie in conspectum uenerit.

*E* Umbilicus a peritoneo liberatus.

*F* Vena ab umbilico in iecur porrecta.

*G* Vena umbilici in iecoris rimam ingressus.

*H, H* Portio iecoris, ex gibba ipsius sede apprens.

*I* Praecipuum ligamentum iecur septo transuerso conneclentium, quod uersus dextrum latus mucronata cartilaginis consistit. Scutum enim id ad sinist. um latus *I* conspiciuum, mucronata est pectoris ossis cartilago.

*K* Dextra arteria ab umbilico secundum dextrum uesicae fundi latus ad ramum quendam magna arteria propens.

*L* Sinistri lateris arteria, ab umbilico secundum uesicae sinistram sedem, ad sui lateris quendam arteria magnae ramum exporrecta.

*M* Meatus, quo a uesica fundo fetus urina inter duas illum inuoluentes tunicas expurgatur.

*N* Uesicae fundus.

*O* Peritonaei ad uesicae fundum nexus.

*P* Uentriculi anterior pars, quae neq. iecore, neq. omento obtegitur. Ceterum haec uentriculi sedes ob hoc amplior apparet, quod uentriculus quem hic depinximus, impenitus inflatus fuerat: quemadmodum & huius cadaueris uesica paulo quoq. elatius solito, supra pubis ossa superiori sua parte efferebatur.

*Q, Q, Q, Q* Omentum.

*R* Vena & arteria simul cum nervo dextrae sedis inferioris partis uentriculi exporrecta.

*S* Sinistri lateris uasa, quae sinistram fundi uentriculi sedem amplectantur.

*T* Haec sede dextri lateris uasa sinistris committuntur: ac proinde etiam *R, T* & *S* suturae indicant, cuius Aristoteles tertio Historiae de animalibus libro, ut & quarto de Animalium partibus, meminit, quum a medio uentre omentum oriri dependereq. asserit.

*U, U* Uasorum uentriculi fundum per reptantium soboles, huc geniculatim in uentriculum sparsa.

*X, X* Venarum arteriarumq. propagines, superiori omenti membrana exporrectae, & multo adpe undiq. cinctae.

### TERTIAE FIGURAE, QVAM SEQVENS proponet pagina, eiusdemq. characterum Index.

*T* E R T I A figura secundam administrationis ordine subsequitur, ac humilior em omenti membranam a superiori diuisam laceratamq. gerit. Superior enim omenti membrana anteriori thoracis sedi hic est exporrecta, & ita sursum simul cum uentriculo ex peritonaei amplitudine emulsa, in uasorum series in conspectu foret, quae ad posteriorem uentriculi sedem in inferioris membranae omenti superiori parte admodum numerosa consistit, utq. etiam inferioris membranae omenti ortus ac natura promptius specularetur, quae hic ita in sinistrum latus, sursumq. collecta cernitur, atq. uniuersa omenti pars intestinis ab oquin obducta, sursum conuulsa inter diffecandum plerumq. occurrit. Intestina autem nusquam perturbata, suo loco hic iacent: uti & lien quoq. cuius etiam pars oculis hac figura subiicitur.


*K, L, M, N* & *O* eadem hic atq. in secunda figura notantur. nam *K* indicat umbilici arteriam dextram, *L* uero sinistram. *M* meatus, quo fetus urina in exterius ipsius inuolucrum excernitur, quiq. hic, ut & arteria, abtruncatus conspiciuntur. Ceterum *N* uesicam notat: *O* autem peritonaei cum anteriori uesica sede conexum. In hac figura peritonaei angulus, qui secunda figura *A, B, C* & *D* insigniti erant, reuocamus.

*a, a* Superioris membranae omenti posterior sedes, quae inferiori membranam integro adhuc omento spectat.

*b, b* Extuberans hac sedes, uentriculus est, superiori membranae omenti testis.

*c, c* Inferior omenti membrana. Ceterum extuberans pars, cui duo superiora *c* & *c* inscribuntur, eolum est intestinum.


AND. VESALII, DE CORPORIS  
TERTIA QVINTI LIBRI  
FIGURA.



tinum, quâ uentriculi expôrrigitur fundo, ac inferiori membrana omenti, uice mesenterij tuitur.  
d Hic lien quoque, etsi omento obducitur, protuberans sese ostendit, ad quod etiam pellucida omenti inuat sub-  
stantia.

Inferior omenti membrana hic modo, quâ uentriculo subijciatur, quâ pluribus notanda erat characteri-  
bus: uerùm quo minus illam characterum copia obliterarem, eos in subsequenti figura ponendos duxi, prae-  
cipuè quum leui opera lector eosdem characteres utriusq; figuris inibi adhibitos fingere  
posset, ubi ambæ figurae idem expriment.

QVARTA



QVARTAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE  
 characterum Index.

*H. a. c.* figura omentum suis quibus adnascitur, aut potius à quibus initium ducit, partibus liberū, & nulla interim alia sede diuisum delineatur, integrāq; sua constructio, & præcipue uenarum, arteriarum & nervorum per ipsum series, & glandulosa corpora ipsi innata com monstrantur. Insuper quàm continnè omentum sacculo, aut per. a, aut minoribus piscatorum retibus assimilatur, hac quoq; figura discitur.

*e, e, e* Omenti circulus, seu orificium, quo id initium ducit.

*f, f, f* Omenti superioris membranae anterior facies.

*g, g, g* Inferioris omenti membranae anterior facies. at hæc non integra, ut superioris membranae anterior facies, hic conficitur: quum ea tantum inferioris membranae sedes obuia sit, quæ uentriculo substernitur, atq; ad colon usq; intestinum, quæ id uentriculo exporrigitur, pertinet, reliqua interim inferioris membranae parte adhuc à superiori membrana obiecta, & sequenti figura ut cunq; proponenda.

*h, i, k* Tribus his characteribus ad sinistram latum superioris membranae omenti positus, omenti constructio insignitur. Nam *h* omenti partem notat membranæ, uenis arterijsq; & adipe quoq; carentem. i uero uasa indicantur, *k* autem adeps uasis attentus adnatus ue exprimitur. Atq; ut istos characteres hac omenti parte repositi, ita etiam quauis ipsius sede eos potuisse collocari, nemo ambigit.

*l* Vena portæ caudex, quæ ex iecore prodiens, inferiori membrana omenti continetur ac suffulcitur.

*m* Arteria, iecoris cauum & bilis uesiculam petens, nervoq; concomitata, quæ à dextri lateris sexti nervorum cerebri parvis nervi ramo, dextri lateris costarum radicibus exporrecto depromitur, ac iecoris cauum, bilisq; uesiculam adit.

*n* Principium uenæ posteriore in inferioris uentriculi orificij sedem potissimum accedentis, & arteriam habentis coniungentem.

*o, o* Arteria & uena & nervus, secundum superioris omenti membranae principium, dextræ fundi uentriculi sedi exporrecti.

*p, p* Illorum uasorum quæ dextræ fundi uentriculi sedi exporriguntur surculi, corpora uentriculi implicantes.

*q, q* Ditorum iam uasorum, quæ fundi uentriculi dextræ sedi exporriguntur propagines, in superiorem omenti membranam sparsæ.

*r* Vena arteriaq; duodeno intestino et ieiuni intestini principio exporrecta, nervulūq; sociū frequenter admittentes.

*s* Portæ uenæ in duos truncos bipartitio. quod uero uenas *r* & *o* indicatas hic elatus quàm in nuda portæ uenæ figura delineauerimus, in hoc factum putato, quod earum uenarum ortus in hunc modum subinde uariet.

*t* Dexter seu grandior uenæ portæ truncus, in mesenterium, adeoq; in ipsa intestina excurrentem.

*u* Vena in posteriore in uentriculi sedem circa arteria consortium distributa.



- x Vena cum arteria & nervo in dextram inferioris membranae omenti sedem sparsa, ac colon quoque intestinum hac parte accedens.
- y Vena simul cum arteria in ventriculi posteriora excurrrens, & tandem corona instar superius ventriculi orificium amplectens. uerum huius uenae arteriaque tanta duntaxat delineatur portio, quanta inferiori membranae omenti sustinetur.
- α Hic gradior mesenterij arteria nonnihil se offert, cūq̃si minimo intervallo inferiori membranae omenti suffulciatur.
- β Truncus arteriae, qui inferiori omenti membranae intertextus, uentriculo, iecori, bilis uesicula, colo, quā id uentriculo exporrigitur, ac dein lieni ramos depromit, nervosq̃ has partes aduenies concomitatur.
- γ Vena simul cum arteria & nervo, mediam potissimum sedem subiens inferioris membranae omenti, & ramos quoque offerens colo intestino, quā ad uentriculi proreptū fundum.
- δ Vena coniugis arteriae expers, quae sinistrae sedi inferioris omenti membranae pauculus soboles (ut & ipsa gracilis est) diffundit.
- ε Venarum, artieriarum & nervorum in lienem series.
- ζ Vena pariter cum arteria nervosq̃, uentriculi fundi sinistrae sedi exporrecta.
- η, η Glandulosum corpus, inferiori membranae omenti innatum, uasorumq̃ robori praefectum.
- θ Glandulosi corporis, quod duodeno intestino subnascitur, portio.

QVINTA QVINTI LIBRI  
FIGURA.



QVINTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

QVINTA figura omentum aliter prorsus quā quarta figura expressimus. totam namq̃ coli intestini partem ē corpore resectam huc reposuimus, quae à iecoris regione secundum uentriculi fundum ad lienem usq̃ pertinet, atq̃ in hominibus uocata nobis inferiori omenti membrana ad dorsum continetur. Dein cum ea coli parte, inferior omenti membrana oculis quoque subicitur, magna iam superioris membranae omenti portione distraita & abscissa, ut omenti ad colum intestinum connexus coalitusq̃, quouis tandem modo demonstraretur, inferiori interim membrana non ita atq̃ interua figura in sese conuoluta, & supra colum quasi contracta.

- A, A, B, C, D Huius characteribus eius omenti partis portio insignitur, quae à dorso pronata, uentriculi posteriori regioni subicitur, ac mesenterij quasi modo duabus sibi instratis membranis efformatur, coli partem secundum uentriculi fundū exporrectā continentibus. Ceterum B, C, D priuatim quædā, uti modo subiungā, insinuatur.
- B Prima uena à sinistro portae uenae trunco in humiliores omenti membranam sparsa, cum comite sibi arteria, & attento ipsi plerumq̃ nervulo.
- C Secunda uena, eaq̃ insignis, à sinistro etiam portae uenae trunco in inferiorem omenti membranam diffusa, & praeter ceteris huc pertinentibus uenis, colo intestino oblata cum coniuge ipsi arteria, cui quibusdam sedibus nervulus attenditur.

D Hac uena similiter à portæ tum omento offertur, quum uena nuper C insignita, hanc omenti & colî intestini sedem non satis implicat.


E Hic uinculo colî intestini pars est intercepta, & postmodum præsecta, quæ iecoris cauo subternitur, aut dextra iecoris sedî maxime est contermina.

F Colî intestini portio hic quoq; uinculo est intercepta, quæ lieni incumbit. atq; ita totam colî regionem asseruauimus, quæ uentriculî fundo exporrigitur, ac G & G insignitur.


H, H, H Hic characteribus inferioris membrana omenti pars indicatur, quæ sub dicta nunc colî sede G & G notata, cæteris incumbit intestinis, unicâq; est membrana à colo intestino quodammodo pronata, ubi superiora H, H conspicias. Vasa autem hanc partem passim intertextentia ab illis pendent, quæ colo intestino alioquin quâ secundum uentriculî fundum incedit, offeruntur.

I, I, I Portio in hunc modum hic relicta est eius omenti partis, quam superiorememembranam uocamus: quæ quum magna ex parte est diuisa, promptè etiam ostendit, qui omentum sacculo aut peræ conferrî queat.


SEXTA QVINTI LIBRI FIGVRA, TERTIA SECTIONIS SERIE SUBSEQUENS, IECUR, uentriculû & intestina in proprijs ostendis sedibus: omento interim, quâ à uentriculo enascebatur, colloq; intestino continuû erat, prorsus resecto, ne fortè id relictum, alicuius organi sedem obliteraret. Præterea ut singula opportunius oculis subicerentur, costarum aliquot fines (uti inter pingendum scitum est) effregimus, ipsas unâ cum peritonæo septoq; transuerso illis connato in posteriora resicientes. Vesica autem hic respondet tertiæ ac secundæ figuræ uesicæ. Cæterum quia præsentis figuræ characteres magna ex parte cum duabus nunc succedentibus communes sunt, non abs re erit, ante illarum indicum explicationem eas figuræ proponere, ac dein communem characterum indicem subijcere.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
 SEPTIMA QVINTI LIBRI FIGV-  
 RA, QVA TENVIUM DUNTAXAT IN-  
 testinorum ductum delineauimus, aliqua etiam uentriculi & coli intestini simul cum  
 caeco asseruata portione, ut praesens figura iam subsequenti facilius conferatur. Quod au-  
 tem coli intestini initium paulo magis quam par sit, ab ipsis tenuibus intestinis abdu-  
 ctum uideatur, in hoc factum arbitrator, ut sola gracilia in conspectum  
 accurate uenirent: potissimum quam coli intestini cir-  
 cum tenuia situm ingressumq, sexta fi-  
 gura pulchre proponat.



OCTAVA QVINTI LIBRI FIGV-  
 RA, QVA CAECI INTESTINI ET COLI  
 & recti imago ductusq, demonstratur, una cum ilei intestini extre-  
 mo, & musculi recto intestino proprijs.





HUMANI FABRICA LIBER V.  
CHARACTERVM SEXTAE, SEPTIMAE  
& octauae Figurarum Index.

563

*S R S E Q U E N S* modo characterum Index, sextae, septimae & octauae figuris communis est. Si quis uero interim character harum alicui peculiaris sit, illi pro figura numero aut 6 aut 7 aut 8 adiciam: characteres uero, quibus huiusmodi nulla subiungitur notula, tribus figuris communes censuebis.

- A 6 *Macronata* pectoris ossis cartilago.
- B, B 6 *Peritoneum* una cum disruptis costis, illisq; adnato septo transuerso retrorsum atq; in latera flexum.
- C 6 *Primum* ligamentum, quo iecur humanum septo transuerso colligatur.
- D, D 6 *Gibbi* iecoris magna sedes.
- E 6 *Portiuncula* uena ab umbilico iecori inserta.
- F, F 6 *Ventriculi* anterior sedes, quae hic ampla occurrit, quod uiri huius uentriculus cibi admodum erat turgidus.
- G 6 *Lienis* sinistrum latus, seu ipsius pars in corporis anterior a uergens.
- H 7 *Ventriculi* portio, quae inferius uentriculi constituit orificium, seu intestinorum principium, quod hic chordula ligatum finximus.
- I, K 7 *Pars* intestinorum ab I ad K protensa, uulgato nomine nunc duodenum intestinum, nunc intestinum duodenum digitorum longitudine, nobis uocatur.
- L 7 *Ieiuni* intestini initium, graciliumq; intestinorum sedes, quae hac primum in anfractus conuoluit, antrorsumq; assurgere incipit.
- M, 7, 8 *Ilei* intestini terminus, atq; adeo gracilium intestinorum finis. Verum quia nam sede ieiuni intestini terminus, aut ilei intestini principium sit ponendum, augurari nequeo: quum toto ductus, qui ab L in septima figura ad M usq; pertinet, nullibi in fione discrimen occurrat, quo ieiunum ab ileo liceret interfungere.
- N *Extuberans* crassorum intestinorum initium.
- O *Appendiculus* iste admodum tenuis, & uermis in modum conuolutus, caecum intestinum nobis appellatur.
- N, P, Q, R, S, T 6, 8 *Colem* intestinum his characteribus insignitur: uerum singuli priuatim aliquid notant. N enim ad P usq; coli intestini ductum notat, à dexteri rasis sede ad iecoris usq; cauum pertinentem. A P uero ad Q coli ductus insinuatur, secundum uentriculi fundum à iecoris cauo ad lienis usq; regionem proitus. A Q autem ad R ductus coli occurrit, à lienis regione ad pubis os, secundum sinistrum ile procedens. Caterum ab R ad S (quod in octaua figura priuatim insit) coli indicatur ascensus anfractusq;, quem sursum ad umbilici usq; regionem molitur. At S ad T usq; progressum notat, ducti nunc ascensus ad recti usq; intestini initium.
- U, U 6, 8 *Depressa* coli intestini secundum ipsius longitudinem sedes.
- X, X 6, 8 *Coli* intestini uirga, ad depressam eam sedem U & U insigniam extuberantes semiglobuli, quos celulas uulgo uocat.
- Y 6, 8 *Recti* intestini initium. Quicquid uero sub Y consistit, rectum est intestinum.
- Z 7 *Portio* meatus bilem in intestina perferentis.
- a 8 *Musculus* recti intestini finem orbiculatim amplectens, & intempesiue fecium excretioni praefectus.
- b, c 8 *Duo* muscoli rectum intestinum post fecium excretionem sursum contrahentes.
- d 8 *Hac* sede rectum intestini uirorum peni, & mulierum uteri cervici, musculosa substantia interuentu cōnascitur.
- e, f 6 *Duae* arteriae facti peculiares.
- g 6 *Hoc* caractere uesciae fundus indicatur: uti & meatus, quo factus urina è corpore ipsius educitur, quemq; hic, ut & nuper commemoratas arterias, abtruncatum finximus.

NONA QVINTI LIBRI FIGVRA.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
NONAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

*H* *a* *c* figura recti intestini, & coli quoque, quæ id recto continuatur, partem expressimus, intestinorum tunicas aliquo tandem pacto demonstraturam.


*b* Prima intestinorum tunica, quæ & intima est, ac solis transversis circularibus ut conformatur fibris.

*i*, *i* Secunda intestinorum tunica, quæ transversis quoque constat fibris. attamen rectus etiam eo donatur pluribus, quo recto intestino vicinior est.

*k*, *k* Mesenterij portio, quæ rectum intestinum quasi sacro committit, ac tertiam ipsi exporrigit tunicam.

*L*, *L* Tertia intestinorum tunica, à mesenterij pronata membranis.

DECIMA QVINTI LIBRI  
FIGURA.



DECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

*U* *t* decima figura, quæ sectionis serie sextam subsequitur, mesenterij situm quàm appositissimè oculis sub-  
iaceret, gracilia intestina undecumque ad latera sursum deorsumque inuicem manibus diducta continet: ac proinde  
mesenterij

mesenterij demonstrat centrum, & rationem qua mesenterium intestinis uasa porrigit, intestinaq; dorso con-  
nectit. Ad haec, mesenterij etiam partem ostendit, quae coli finem, & rectum quoq; intestinum dorso alligat.

A, B, C, D Portiones peritonaei, aperto iam abdomine in latera extrorsum flexae.

E, E, E Tenuia intestina.

F Cecum intestinum.

G, G, G Colon intestinum.

H Recti intestini initium.

I Vesica, cui peritonaeum ea potissimum sede connascitur, ubi alteram ipsi offert tunicam.

K Mesenterij centrum, eaq; dorsum pars, quae id à peritonaei membranis initium ducit, quae magnam arteriam &  
cauam uenam hic uertebrae corporibus adnectunt.

L, L Corpus glandulosum, mox in ipsa uasorum distributione positum, quae mesenterij centro inseruntur.

M, M Glandulae uasorum distributionibus interiectae, quas uasa in ipso per mesenterium moluntur progressu.

# VNDECIMA QVINTI LI- BRI FIGURA.



## VNDECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE characterum Index.

VNDECIMA figura ipsum duntaxat delineatur mesenterium, è corpore exemptum, omnib; par-  
tibus ipsi connatis liberum, præterquam ab inferioris membranae omenti portione, quae colon dorso inibi colliga-  
tur, ubi secundum inferiorem uentriculi sedem procedit.

K Character K, ut & in decima figura, mesenterij indicat centrum.

L, L Hic quoq; characteres, similiter atq; in decima, glandulosum corpus notant, totius mesenterij maximum.

M, M Glandulae illis interpositae uasorum dissectionibus, quae iam intestinis appropinquant.

N, O His characteribus mesenterij circumscribitur pars, tenuia intestina dorso alligans.

P P ad Q usq; mesenterij indicat portionem, colon intestinum dorso affirmantem, quae id à dextri renis sede ad  
cauum usq; uicoris protenditur.

Q Q ad R usq; inferioris omenti membrana partem notat, quae colon tota illa sede dorso committit, quae id secun-  
dum uentriculi fundum exporrigitur.

R R ad S usq; mesenterij insinuat portionem colo intestino tota ea sede propriam, quae id à lienis regione ad re-  
ctum usq; intestinum pertinet.

S, T Quod




S, T Quod S & T intercluditur, mesenterij pars est, rectum intestinum dorso nectens.

U Hac sede mesenterij naturam exprimere conati sumus, quandoquidem unam mesenterij membranam ab al-  
X, Y. tera unguibus diuulsam pinximus: uni quidem X, alteri uero Y adhibentes. In harum membranarum me-  
dio, mesenterij uasa excurrunt, & ipsius adeps, ut & glandulae, etiam continentur, quemadmodum in uigesi-  
ma quarta huius libri figura quoque est cernere, ad characteres F, F & G, G.

DVODECIMA QVINTI LIBRI FI-  
GURA, QVAE IAM PRAECEDENTIBUS IN-

regis figuris sectionis serie succedit. Habet enim dissectum peritoneum, & omentum quo-  
que in hac ablatum est, & costas aliquot etiam hic effregimus, quo uniuersum iecoris ca-  
num opportuniùs delineari posset. Dein uentriculi quoque apparent orificia, quem perinde  
ac intestina in sinistrum latus depressimus, ut in conspectu esset mesenterij pars, ac uena  
portae in ipsum series, & in super bilis meatus in intestinum inferius, uti  
characterum index huic figurae & subsequenti mo-  
do communis insinuabit.



DECIMATERTIA QVINTI LI-  
BRI FIGURA, NUDAM BILIS UE-  
scula, eiusdemq; meatuum delineationem  
exprimens.



CHARACTERVM DVODECIMAE ET  
decimatertiae figurarum Index.

*P*RAESENS characterum Index, duodecima & decimatertia figuris habetur communis. ac proinde quum character occurreret duodecima figuræ peculiaris, illi 1 subiungemus, illis qui decimatertia priuatim inscribuntur, 2 adiecturi. Si uero quis utriusq; figuris simul communis erit, illi 1 & 2 addetur.

*H, H* 1 Peritonæi unâ cum costis euerſi portio.

*I, K* 1 Cavum iecoris.

*L* 1 Portiuncula gibbi sedis iecoris.

*M* 1 Iecoris sectio, cui ſectum alens uena primum inferitur.

*N, N* 1 Rimæ ac impreſſiones & tubercula in iecoris cavo iuxta uenæ portæ exortum conſpicua. N uero ſuperius, ſeu ſiniſtrum, ſeu ipſo T uicinius, ſedem indicat, qua ab umbilico procedens uena, iecoris cavo, ubi portæ caudex prodiit, inferitur. Ab *M* enim ad ſiniſtrum N uſq; foramen pertinet, quod libere quodammodo per iecoris corpus umbilici tranſmittit uenam, ad ſedem illo N inſignitam.

*O* 1 Ligamentum ſiniſtram iecoris partem (quæ in angulum quodammodo acutum deſinit) ſepto tranſuerſo hic colligans.

*Φ* 1 Sinus iecori hic inciuſus, ac ſtomacho cedens, ubi in ſuperiori uentriculi oriſicio continuatur.

*P, Q* 1 Uentriculus ſiniſtorſum uelut ex peritonæi cauitate preſſus.

*R* 1 Uentriculi ſuperius oriſicium, ſeu ſtomachi ſinus, unâ cum uenis, arterijs, & neruis id oriſicium amplexatibus.

*S* 1, 2 Hæmilium uentriculi oriſicium, ipſuſq; duodeni inſtini initium, quod in duodecima figura ſecus quàm ſecundum naturam ſe habet, antroſum refleximus, ut in conſpectum ueniret bilis ueſiculæ meatus in ipſum infer-  
tus, ac mox c notandus.

*T* 1 Nervus iecoris cavo inferitur, & à nervo ductus uentriculi ſuperius oriſicium implicantibus.

*U* 2 Biliſ ueſiculæ. Hæc in utriusq; figuris eſt conſpicua: uerum priuatim illam donaxat in decimatertia figura cha-  
racterem notauimus. ac proinde primum decimatertiae, ac dein duodecimæ mentem hic & in ſubſequentibus aliquot  
characteribus accommoda, quod duodecimam characteribus haud obſcurandam duximus.

*X, X* 2 Biliſ ueſiculæ meatus per iecoris corpus inter portæ uenæ & cauæ item uenæ ramos exporrecti.

*Y* 2 Venæ portæ propago in iecoris ſubſtantiam diſſuſa.

*Z* 2 Venæ cauæ propago in iecoris ſubſtantiam diſſeſta. Volui enim hic utcumq; exprimere uſorum in iecoris ſub-  
ſtantia ſitum, qui ſcilicet portæ uenæ rami propaginibus cauæ ſubſiſcantur, & quo nam pacto in horum medio  
biliſ ueſiculæ meatus excurrant. Quamuis interim modo ſecantibus, portæ uenæ propagines, cauæ uenæ propa-  
ginibus continui eſſe uideantur.

*a* 2 Concurſus coitus uo meatuum biliſ ueſiculæ, qui per iecoris corpus digeruntur.


*b* 2 Ueſiculæ biliſ ceruix, cui meatus ex iecore ductus, ac a notatus inferitur, communisq; eſſicitur.

*c* 1, 2 Biliſ ueſiculæ meatus, in duodenum inferitur inſtinum. In decimatertia figura duodenum inſtinum humi-


*d* liori ſede apertum ſinximus, ne meatus illius inſertio d notata lateret.

- e 2 Arteria in iecoris cauum & bilis uesiculam digesta.  
 f 2 Nervulus iecori & bilis uesicula communis, & à sexti paris nervorum cerebri propagine depròmpetus, qua dextri lateris costarum exporrigitur radicibus.  
 g 2 Tenuis porta uena propagines, in bilis uesiculam excurrentes.  
 h 1 Porta uenae caudex.  
 i, i 1 Glandulosum corpus, quod duodeno intestino adnascitur, usq; ipsi exporrecta opportune sustinet.  
 k, l, m 1 Mesenterium. Verùm singuli characteres priuatum quid indicant. k enim uena porta dextri seu grandioris trunci distributionem in mesenterium notat. l uero, glandulosum corpus in mesenterio primis uasorum distributionibus praefectum. m autem, mesenterij insinuat partem, cui colon intestinum tota illa sede committitur, qua à dextri renis sede ad iecoris usq; cauum pertinet. Hic namq; colum intestinum à mesenterio diuisum est, quo mesenterij centrum aptius delinearetur.  
 n 1 Vena qua sub posteriori recti intestini sede deorsum protenditur, ipsiq; recto intestino soboles porrigit.  
 o 1 Vesica fundi superior pars etiam hic est conspicua.  
 p 1 Quod hic extuberat, dexter est ren. sua pingui membrana adhuc obiectus.  
 q 1 Neceat us urinaris, à dextro rene urinam in uescam deducens.  
 r 1 Vena & arteria seminales dextri lateris.  
 s 1 Vas semen à dextro teste uersus cervicis uescica initium perferens.

DECIMAQVARTA QVINTI  
 LIBRI FIGURA, ANTERIORE  
 integri uentriculi & stomachi faciem exprimens, unà  
 cum uenis, arterijs & neruis uen-  
 triculi insertis.







CHARACTERVM DECIMAEQVARTAE ET  
decimaquintae figurarum Index.

CHARACTERES hoc Indice explicandi, partim utriq; figuræ communes sunt, partim nunc huic, nunc illi peculiare: ac proinde communes, his notis 1 & 2 indicabimus: peculiaribus vero decimaquintæ figuræ characteribus, istam 1 subijciemus, decimæ sextæ autem figuræ proprijs characteribus hanc 2 notam addemus.

- A 1, 2 Stomachi pars, in oris amplitudinem pertinens, hic à faucibus præfecta cernitur.  
A, B 1, 2 Ab A ad B usq; ductus stomachi notatur, recta super mediam vertebrarum cervicis & quatuor superiorum thoracis sedem descendens.  
B, C 1, 2 A B ad C usq; ductus stomachi pertinet in dextrum latus super quintam & aliquot sequentes thoracis vertebrae modice declinans.  
C, D 1, 2 A C ad D usq; stomachi ductus insignitur, ex dextra sede sinistrorsum supra magnâ ascendens arteriam, & per septum transversum in ventriculi superius orificium pertinens.  
E, E 1 Duæ tonsillæ, quæ non procul à stomachi sede in oris cavitatem pertingente distant.  
F, F 1, 2 Glandulosum corpus stomacho frequentèr adnatum, quæ quintæ thoracis vertebrae corpori insidet.  
G 1, 2 Superius ventriculi orificium.  
H 1, 2 Inferius ventriculi orificium.  
I 1, 2 Superior ventriculi pars.  
K, K 1, 2 Ventriculi demissior pars, seu fundus.  
L, L 1 Anterior ventriculi sedes.  
M, N, O 2 Posterior ventriculi sedes.  
P 1, 2 Duodenum intestinum, quod hic ad ieiuni intestini principium resectum finximus.  
Q 2 Biliæ vesiculae meatus, in duodenum intestinum insertus.  
R 2 Hic character in interna ducti nuper intestini sede insitus, insertionem meatus illius notans, quem modo Q insigne.  
S 2 Glandulosum corpus duodeno intestino subnatum, usq; illi intestino ex porrecta sufficiens.  
T 1, 2 Dexter nervi sexti paris nervorum cerebri propago, ad stomachum ex porrecta, multiplici serie in clavius: ventriculi orificium distributa.

U 1,2 Propago sinistri nervi paria sexti nervorum cerebri stomachum amplectens.

X 2 Sinistra propaginis ramus, secundum elatiorem ventriculi sedem adiecit usq; excurrent, hicq; quâ teconi pro-

T. ximus est, insignitus.

a 2 Prima (uti doctrinae studio nuncupare eam solemus) ventriculi uena & arteria.

b 2 Secunda ventriculū accedens uena, quae coniuge caret arteria.

c 1,2 Tertia ventriculi uena, cum coniuge arteria, & nervo quoq; secundum dextram ventriculi fundi regionem exportecta.


d 1,2 Quarta ventriculi uena, coniugem obtinens arteriam, & elatius ventriculi orificium coronae ritu amplectens.

e 1 Ramiam dicta uena & arteria, qui secundum ventriculi elatiorem sedem ad inferius usq; ipsius orificium condescunt.

f 1,2 Quinta uena, simul cum coniuge arteria & nervo, sinistram sedem fundi ventriculi perreptans.

g g 1,2 Alia uena ac arteria, ab illi pronata uasis, quae lieni inseruntur.

## DECIMASEXTA QVINTI LIBRI FIGURA.




### DECIMASEXTAE FIGURAE, EIVS- demq; characterum Index.

H A c figura ventriculū à stomacho ac intestinis liberauimus, ac dein inuertimus, ut interior ventriculi sedes, seu superficies cibos & potus amplectens, in conspectum ueniret. Occurrit uero hic posterior ventriculi pars: non autem, ut in subsequenti, aut decimaquarta figura, anterior.

b Circulare ventriculi tuber, ea sede conspicuum, ubi stomachus ventriculo continuatur, aut ubi elatius ipse consistit orificium.

k Tuber orbiculatum, in humiliori orificio ventriculi apparens.

## DECIMASEPTIMA QVINTI LIBRI FIGURA.



HUMANI FABRICA LIBER V.  
DECIMAESEPTIMAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

571


PRÆSENS figura uentriculi tunicarum seriem, numerumq; & naturam, quantum pictura affe-  
quā potuimus, docet.

k Tertia uentriculi tunica, à peritoneo pronata, atq; hic à uentriculo magna ex parte diuisa.

l Secunda uentriculi tunica, minus quam tertia à uentriculo diuisa.

m Prima intimaq; uentriculi tunica, hac in parte à duabus exterioribus tunicis libera.

DECIMAOCTAVA QVINTI  
LIBRI FIGURA.



DECIMAOCTAVAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

DECIMAOCTAVA figura, iecoris gibbam posterioremq; sedem unā cum caua uena caudicis por-  
tione exprimit.

A, A Iecoris gibbi superior pars.

B, B Iecoris gibbi posterioriq; sedis infima regio.

C Caua uena sedes, qua septum permeat, ipsiq; soboles exporrigit.

D, E Hoc intervallo sedes notatur, qua caua caudex posteriori iecoris sedi innascitur.

F Portio præcipui iecur septo alligantis uinculi.


G Ligamentum, iecoris partem in sinistra maxime exporreclam septo transverso alligans.

H Vena portæ portio.

I Sinus, quo iecur stomacho cedit, quā is sinistro uentriculi orificio continuatur.

DECIMANONA QVINTI LIBRI FI-  
GURA, QUAE QUATUOR COMPLEXA TA-  
bellis, seu imaginibus, lienem omni ex facie commonstrat: ipsius autem situm, & ex  
proportione magnitudinem, iugesima quæ mox subijcietur figura,  
lienis O, O, P explicabit.

PRIMA. SECUNDA. TERTIA. QVARTA.



dd 2 QVATVOR



AND. VESALII, DE CORPORIS  
QUATVOR DECIMAENONAE FIGVRAE  
tabellarum, earundemq; characterum Index.


*PRIMA* effigies, seu tabella, lienem anteriori facie exprimit, unà cum omenti portione, seu inferioris su-  
A. periorisq; omenti membranarum partibus. A namq; lienis sinistrum indicat laus, dextra interiva ac media  
B.B. ipsius sedibus omento intectis. B, B enim & B inferioris omenti membrana portionem indicant, lienis ua-  
C.C. sa deducentem. C uerò & C superioris omenti membrana portionem significant, qua ad uentriculum uasa  
perferuntur, ab illis uasis pronata, qua in lienem iamian inferenda ueniunt.

*SECUNDA* tabella, lienis caua regio exprimitur, ab omnibus qua illi committuntur partibus libera.  
D.E. ac hic D notat superiorem lienis sedem, E inferiorem, F sinistram, G dextram. H uerò & H lineam in-  
F.G.H. dicant in caua lienis regione conspicuam, cui lienis uasa inferuntur, & omenti membrana innascuntur.

*TERCIA* tabella, lienis gibbum demonstrat.

*QUARTA*, lienis quoq; cauam sedem delineatam continet. At huic priuatim duas indidi sectiones, ut  
I.K. lienis substantia conformatioq; oculis subiceretur. Atq; hic I & K dictis modo sectiones indicant.

VIGESIMA QVINTI LIBRI  
FIGURA.



- P R A E S E N S figura sectionis serie duodecima succedit: ab hac enim omnia intestina exequimur, relata dumtaxat uentriculi portione, superioris orificij uentriculi sedem monstrante. atq; ita hac figura pleraque indicat, quae nunc opportune cum characterum indicibus seriatim insinuabuntur.
- A, A Portio septi transversi peritonaeo succincta, atq; una cum costis aliquot sursum reflexa.
- B, B Causa iecoris sedes.
- C Iecoris ligamentum, quo ipsius sinistra pars septo alligatur.
- D Vena per umbilicum iecori ex porrecta portio, ubi & sinus ille indicatur primum hanc admittens uenam, quae per priuatum ipsi in iecore humano incisum foramen ad iecoris usq; sedem perrepat, ubi hic G non procul à K adhibitum conspicis.
- E Hac sede iecur sinum obtinet, quo cedit stomacho, per septum transversum ad elatus uentriculi orificium conrendenti.
- F Superius uentriculi orificium, uentriculiq; portio.
- G, G Lineae impressiones uel tuberaq; in iecoris cauo, ubi porta uenam educit, conspicua.
- H Bilis uesicula.
- I Porta uenae caudex hic abscissus. Verum I quoq; radices exortus uel indicat duarum uenularum bilis uesicae aduentum.
- K Iecoris nervus, ab illis propagatus, qui elatiori uentriculi implicantur orificio.
- L Arteria iecori & bilis uesiculae communis.
- M Nervus à sexti nervorum cerebri paris propagine initium ducens, quae dextri lateris costarum exporrigitur radicibus, atq; hic nervus iecori pariter & bilis uesiculae communis censetur.
- N Bilis uesiculae meatus hic abtruncatus uisitur, qui ad intestina pertinet.
- O, O Lienis anterior cauaq; regio.
- P Lienis linea, cui uasa ipsius implantantur.
- Q Vena caua.
- R Magna arteria.
- S Radices artieriarum in uentriculum, iecur, lienem, omentum, mesenterium, ipsaq; demum intestina excurrentium.
- T Dexter ren, pingui sua adhuc obductus tunica.
- U Sinister ren, pingui ipsius adhuc inuolutus tunica.
- X Vena in sinistri renis pinguem diffusa tunicam.
- Y Vena pinguem dextri renis accedens tunicam.
- a Vena arteriaq; dextro reni osum sanguinem deducentes.
- b Vena arteriaq; in sinistrum renem protensa.
- c, c Meatus, ex dextro rene urinam in uesicam deferens.
- d, d Meatus, quo sinistri renis urina in uesicam ducitur.
- e Seminalis uena, sinistrum accedens testem.
- f Seminalis uena dextri testis.
- g, g Surculi à seminalibus uenis, quae peritonaeo committuntur, in ipsaq; adeò uersus testes progressu, ad peritonaeum derivati.
- h Seminalis arteria, dextrum testem petens.
- i Arteria seminalis, quae sinistro testis est propria.
- k Arteria in humiliorem mesenterij sedem ad colon intestinum & rectum excurrentis radix.
- l Arteria magna super cauam uenam ascensus, ac ipsius magnae arteriae & cauae supra ossis sacri initium in duos truncos diuisa.
- m, m Praecipuae uenae ac arteriae earum quae geniculatim à magnis uasis lumborum carnibus, ipsiq; peritonaeo offeruntur.
- n Arteria magna soboles, sacri ossis foramina accedentes.
- o Recti intestini pars, à colo liberata, & ut inter secundum fit, uinculo intercepta.
- p Uesica, urinae receptaculum.
- q Uasis semen à teste ad penem deferentis portio, quae secundum pubis os deorsum ad uesicæ cernicis initium retorquetur.
- r Cutis, quae penem inuestiebat.

f Scortum, à tunici testes inuoluentibus resectum, hucq; reflexum.

i Carnosa membrana pars, quæ haud secus atq; scortum, utrunq; ambebat testem.

u Tunica, à peritoneo mihi pronata, ubi id seminarijs uasis iter præbet. estq; hæc testis tunica, earum quas testibus singulis proprias peculiaresq; ascribimus exterior.

x Denudat penis portio.

## VIGESIMAPRIMA QVINTI LIBRI FIGURA, QUÆ TRES PROPRIAS CONTI-

net tabellas, sectionis serie inuicem subsequentes, ac appossissime renum si-  
nus, meatuumq; urinariorum principia ostendentes.

PRIMA.



SECUNDA.



TERTIA.



## TRIVM VIGESIMÆ PRIMÆ FIGURÆ tabellarum, earundemq; characterum Index.

PRIMA tabella sectionem secundum renis longitudinem per gibbum ipsius indutam habet adeo profundam, ut in secundum renis pertingat sinum, interim nulla renis substantia ablata portione. Significetur igitur α, β. tur α dexteri renis anterior pars, β uero posterior.

γ, γ Orificia ramorum primi sinus renis, seu ipsius membranei corporis, quibus inuicem illi rami cōeunt. Hic enim rami necessario per sectionem in mutuo coitu diuiduntur.

δ, δ Primi sinus renis corpus, seu membraneum corpus, in quod uena & arteria renis terminantur.

ε Foraminulum hoc, urinarj meatus est initium.

λ Urinarj meatus pars.


3, 4 Super membraneum corpus δ & δ insignitum, secundus renis consistit sinus: cuius interior, & corpori illi membraneo proximum latus, in hac sectione tantum apparet. Eius enim partes, quæ in exteriora ad utrumq; septi ex renis substantia conformati latus producuntur, ipsumq; sinum uelut bipartitum efficiunt, nisi specillo in circuitu sub 3 hic & 4 deducto intueri nequis. Septum namq; illud præsentis sectione in duas partes, anteriorem scilicet & posteriorem, diuisum cernitur: ac u. quidem partem ipsius notat anteriorem, 3 uero posteriorem.

SECUNDAE tabellæ omnia cum nuper commemorata sunt communia: nisi quod uniuerſa propemodum renis substantia, septum illud (cuius in prima tabellæ indice meminimus) constituens, cultello orbiculatim adempta sit, neq; aliter sanè septi illius figuram ob oculos ponere licuit. Conspicitur hic itaq; secundus renis sinus uniuerſus, at non quemadmodum externo suo latere est bipartitus, eo quod septum abstulerim, sinum hunc in exteriori ipsius latere dirimentem. α igitur, & β, & γ, & λ, eadem hic quæ in prima tabella notant. Circulus autem in hac tabella inter α & β ductus, secundum renis indicat sinum. δ uero anteriorem partem primi sinus, seu membranei corporis, quæ hac in ramos discinditur. i corporis membranei posteriorem partem inu. dicat. adeo ut δ & i simul membraneum notent corpus, seu primum renis sinum. u. autem urinarj meatus insignitur regio.

TERTIA tabella primi sinus seu membranei corporis ramos omnes insinuat: renis enim substantia, quæ summis eius sinus ramis adnascitur, penitus derasa est. Atq; hæc citra characterum operam sunt obuia.

VIGE.





VIGESIMAESECVNDAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

*P*RÆSEN *s* figura sectionis serie vigesima succedit. in hac namq; costarum aliquot fines effratti, & extorsum sursumq; reorti occurrunt, ut iecoris gibbum ita hic spectaretur, ut ipsius cauum in vigesima figura erat in conspectu. Rences etiam pinguium tunicā denudati, sese hic offerunt, & uenarum arteriarumq; feminalium exortus ductusq; etiam ostenduntur. Verum in hac figura priuatim à cauae uenae caudice ramulum pronasci effinximus, sinistra feminali commixtum uenae. Præterea peritonaeum, quā nāsi seminarijs iter praeber, unā cum tunica ab ipso pronata, testemq; & sui lateris uasā seminaria amplectente, dissectum est, unde etiam seminaria uasā & testes cum suis musculis obuia sunt. Insuper pubis ossa inuicem ita dirempta, atq; adeo reflexa uidentur, ut inuicem insynuer dehiscant, & uesica, & glandosum corpus uesicae ceruici proprium, unā cum ipsius musculo, & penis corporibus, eorundemq; progressu, oculis subiiciantur. Quod autem praesenti figura, à dextro femore cuiem prorsus, & à sinistro aliqua ex parte ademinus, neminem ambigere reor.

*a, a* Peritonaei pars, cum septi transversae portione, & effractus costis sursum extorsumq; reflexa.

*b, b* Iecoris gibbum.


*c, c* Cavae iecoris sedes, aliqua ex parte hic conspiciuntur.

*d* Praecipuum iecoris ligamentum, ad dextrum latus mucronata cartilagine consistens, & hic à iecoris anteriori sede, magna ex parte diuisum.

*e* Ligamentum, quod iecoris partem in sinistro protensam septo committit.

*dd* 4 *f* Uena

- f Vena porta caudex, unâ cum arteria & nervis iecur petentibus, & bilis vesicula meatu intestina petente, hic unculo est interceptus, & dein praeſectus.
- g Vena caua caudex.
- h Arteriae magnae truncus, deorsum ad vertebrarum corpora ex porrectus.
- i Principium venae pinguem sinistri renis tunicam adeuntis.
- k Radices articularum in intestina excurrentium, & ventriculo, iecori, bilis vesiculae, lieni, & ipsi demum omento ramos offerentium.
- l Initium venae dextri renis pingue in uolucrum petentis.
- m Vena ac arteria dextrum accedentes renem.
- n Vena ac item arteria sinistro reni serosum sanguinem deducentes.
- o, o Dextri renis pingue in uolucrum, ab anteriori sede renis liberatum.
- p, p Sinistri renis pingue in uolucrum, ab anteriori etiam sede sua renis diuisum, & peritoneo, unde principium ducit, adhuc connexum.
- q, q Et dexter & sinister meatus, quo urina è renibus in vesicam fertur, q in signatus est.
- t Seminalis uena, dextrum accedens testem.
- u Principium seminalis uenae dextrum testem adeuntis, quod instar rotundi tuberi prominet.
- x Seminalis uena, sinistro testis ex porrecta.
- y Venula à uena caua caudice pronata, ac uenae feminali sinistra commixta, unida ue. Quamuis enim haec uenula rarius occurrat, tamen quâ in alijs figuris sinistra uena ab q, hac delineatur, illa q, hic nihil obſcuret, ipsam exprimere uisum est.
- æ Seminalium articularum origo.
- ß Sterculi, quos uenae seminae peritoneo imbi depromunt, quâ ipsi connexae, deorsum ad pubis ossa continentur.
- γ Dextra seminalis uena, & item arteria, per peritoneum supra pubis ossis, coxendicisq, regionem descensus, & ascensus pariter uasis semen à teste deferentis, quod n, & x mox notabitur.
- δ Venae feminalis & arteriae commixtio, & corpus quod uaricum imagini conferam, initium.
- ε Varicosi corporis in testem insertio.
- ζ Testis intimo ipsius in uolucro adhuc obiectus.
- η Principium uasis semen à teste deferentis.
- ι Sedes, qua deferens semen uas sursum secundum testis humillimam sedem reflectitur, & à teste ipsi non amplius connatum, abſcedere incipit.
- κ Hic semen deferens uas nullam amplius conuolutionum ostendit speciem, at sursum instar nervi teres porrigitur.
- ν Vesica, urinae receptaculum.
- ξ Glandulosum corpus, uesicae ceruicis initio adnatum, & semen deferentium uasorum insertionem excipiens.
- ρ Circularis uesicae ceruicem ambiens musculus.
- s, t Duo penem constituentia corpora, quorum sinistrum à suo principio, quod à sinistro pubis osse ducitur, liberatum est: dextrum autem corpus suo principio adhuc pubis dextro osse firmatur. Praeterea hic s nostri figura in conspectu est, quam peni flaccidus languidusq, cum uesica effingit.
- υ Venarum & articularum neruorumq, penem aduentium series, tam aptè ac in huiusmodi figuris id moliri datur, expressa.
- φ, χ Peculiarium testis in uolucrorum exterius, imbi à peritoneo pronatum, ubi φ ascriptimus: ubi uerò χ locatur, ea huius in uolucri sedes notatur, qua id infima testis parti connascitur.
- ⊥ Testis musculus, iam dicto in uolucro innatus.
- ω Musculus femur mouentium septimus hic se spectandum offert, quâ super coxendicis os deorsum ducitur.
- \* Recti intestini portio, quae in corpore, dum intestina aliqua auferuntur, relinqui consuevit. Supra hanc recti intestini portionem, uenae cauae & arteriae magnae circa ossis sacri regionem distributio eleganter quoq, uisitur.



VIGESIMATERTIAE FIGURAE, IPSIVSQUE  
partium & characterum Index.

VIGESIMATERTIA figura, multas peculiare obtinens effigies, tabellas ne, simul cum illa quæ mox præcesit, ac ordine vigesima secunda fuit, potissimum ad virilium organorum generationi subseruientium inspectionem facit: & ambobus, quum primum characteribus insignirentur, decimotertio huius libri Capiti præponendas ducebam. unde etiam in utrisq; eadem prorsus est characterum ratio. Verum quod iam satis fore arbitrer, omnes præsentis libri figuras hic seriatim collocari, priuatum indicem huic vigesimæ tertie figuræ dedicabo, characteres qui huic & vigesima secunda communes sunt, denud non grauati explicaturus. Porro in hac vigesimæ tertie figuræ duæ sunt præcipue tabule, quarum unam non inopportune dextram, alteram uerò sinistram appellabimus. ac in utrisq; quidem tabulis renes, uescicæ, & semina organa, cum uenæ causæ & arteriæ portionibus ex ætate corpore finximus. Atq; hæc quidem in dextra, anteriore facie: in sinistra autem, posteriore delineantur. & in dextra adhuc priuati uescicæ, & ipsius cernicæ, seu meatum semini urinaeq; communem, aperimus, quum hæc in sinistra adhuc sint integra: quemadmodum in characterum explicatione dicturus sum diffusius, simul atq; tabellas expressero, quæ sinistram latius, & inferiorem præsentis vigesimæ tertie figuræ sedem occupant, ac maiusculis Latinorum literis in hunc modum notantur.

A, B Duabus his tabellis dextrum testem anteriori facie, at magis secundum sinistram latius ostendentibus, idem exprimitur. Verum superior tabella A insignita, ab inferiori B indicata in hoc differt, quod ipsa semen deferentis uasis situm inturbatum ostendat: quum interim inferior deferentis semen uasis partem, quæ secundum testis anteriora sursum fertur, neq; amplius testis adnascitur, ex sua sede sinistrorsum habeat reflexam, de trusam ue, ut insertio applicatioq; uenæ & arteriæ seminalium ad testem in conspectum ueniret. At hæc characterum utrisq; tabellis communium opera, iam reddentur dilucidiora.

C Vena



C Vena & arteria feminales, illic abtruncate, ubi iam ex magna peritonæi cavitate exidentes, invicem impli-  
cantur, commiscunturq; ac corpus quod uarico sum mihi appellabitur, efformare incipiunt. Atq; ita huius va-  
ricosi corporis, quod pyramidi a similitur, conus, C infertur.

*D* Basis uraricosi corporis, seu sedes qua uena & arteria feminales testis inferuntur, & ramulos in testis intimum inolucruni & testis substantiam parount.

*E Uasis semen à teste deferentis initium.*

*F Reflexus uasis semen deferentis secundum humiliorem testis sedem.*

*G Sursum conscendens deferentis semen uasis portio, & ipsius regio, in qua testi connasci desinit.*

H<sup>1</sup> Praefens tabella, deferentis semen uasis portionem ostendit, quae testis intimo connata erat inuolucro: Et foramina illa asperitatesq<sup>ue</sup> cernuntur, quae post sectionem in eius uasis sede conspiciuntur, quae inuolucro illi con-  
nascebatur.

*I Hac tabella, eadem uasis semen deferentis portio, quæ & mox precedente, delineatur. uerùm hac sedem eius  
portionis ostendit, quæ gibba est, testisq; inuolucro non connascitur.*

L Testis, à quo semen deferens noster abscisus est, ipseq. adhuc testis cum intimo ipsius inuolucro & navicoso corpore remansit.

*Ne* Hæc tabella, eadem cum tabella *L* notata indicat. verum ut illa anteriorem testis faciem exprimebat, ita hæc posteriorem: & duæ subsequentes notæ utriq. sunt communes.

N Prima uena & arteria seminalium commixtio, seu uaricosi corporis conus.

O Varicosis corporis basis, & in testis substantiam, ipsiusq; intimum involucri insertio.

**P** Testis suo minime adhuc obducitur muo luco, sed a varicofo liberatus corpore, & superiore ipsius regionem ostendens, in qua varicofo non illud corpus inferitur. Apparent namq; hic foramina ramulorum varicosi corporis, qui (uti dicebam) testi implantantur.

*Q* In hac tabella intima testis tunicam involucrium ne nonacula dissecuri, & ex altero latere à testis substantia  
*R*. eius involucri partem *R* notatam diremi, in posterioraq; reflexi, ut ductus in conspectum uenirent, qui à ramis

*S. involucrium intertextentibus in testis substantiam pertinent. Alteram uerò huius involucri partem S insignitam, testis adhuc connatam reliqui.*

*T* hic celsus per medium diffectus iacet, uasorum per ipsius substantiam diffusorum, ac  $U$  &  $V$  insignitorum  $U, V$ , naturam, distributionisq. seriem demonstrans. Qui uero modo subsequuntur characteres, duabus grandioribus & maioris precipuis uisum etertia figuræ tabulis propriè habentur.

I Hac numeri nota indicatur anterior renis regio.

2 Posterior renis regio.

3 *Superior renis regio.*

4 *Inferior renis regio.*

5 *Externum renis latus.*

6 Internum renis latus: in quo 6, 7 & 8 sinum eius lateris indicant. verum 6 prius notat eius sinus tu-

7,8. ber: 7 autem & 8, sinus eius angulos, impressionesq.

g Venæ causa caudex, inibi abscissus, ubi primum sub iecore consistit, dorſiq, medium spectat.

h Arteria magna truncus, inibi relectus, ubi primum sub septo transverso in peritonai cavitatem fertur.

k Radices arteriarum, quæ mesenterio & inferiori membrana omenti digeruntur.

1 Vena pinguem dextri renis tunicam petentis principium.

*in Vena & arteria dextro reni serosum sanguinem deducentes.*

*n Vena & arteria sinistro reni in serosi sanguinis ductu famulantes.*

o Ueræ in pinguem sinistri renis tunicam excurrentis origo.

q,q Meatus urinam è renibus in vesicæ amplitudinem deportantes.

Meatus urinæ rembus deducuntur, in vesicam inferiorem, ac in dextra quidem tabula orificia, quibus hi meatus in vesicam pertinent, & membranei processus his orificijs præferti, indicantur. in sinistra autem tabula sedes spectatur, qua illi meatus primæ vesicæ applicantur.

† Seminalis uena dextra.

16 *Tuberculum, seu protuberans seminalis uenae dextri lateris principium.*

x Vena seminalis, sinistrum petens testem.

α Seminalium arteriarum ex magna arteria caudice initia.

β Radices surculorū, quos uenae seminales peritoneo offerūt, quā ipsi secundum lumborū regionem cōmittuntur.


8 Vena arteriaq; feminalium coitus, commixtio ue, & varicofi corporis initium.

3. *Vena & arteria seminalium ad testem insertio, seu varicosi corporis basis.*

3 Testis, intimo ipsius involucre adhuc obiectus.

- η Principium uasis semen à teste deferentis.  
 θ Descensus uasis semen deferentis secundum posteriorem testis regionem.  
 ι Locus, quo deferens semen uas, rursus secundum testis humiliora sursum fertur, neq; amplius testis connascitur, uti ab η per θ ad ι connatum cernitur.  
 κ Sedes deferentis semen uasis, ubi primum nerui modo citra omnem reuolutionem spiram'ue sursum properat.  
 λ Hac sede semen deferens uas ad posteriorem regionem uenae ac arteriae seminalium reflexum, in peritonaei cavitatem contendit.  
 μ Dextrum semen deferentis uasis cum sinistro coitus, propter uescicæ cervicis initium.  
 ν Uescica. Haec in dextra tabula priuatim adaptata est, suam commonstrans cavitatem.  
 ξ Glandulosum corpus, uasorum semen deferentium insertionem excipiens, ac in dextra tabula longa sectione ad meatus usq; urinarij cavitatem dissectum.  
 ο Amplitudo cavit. usq; cervicis uescicæ, in quam uasa semen à testibus deferentia insertionem moluntur.  
 ϑ Atysculus uescicæ cervicem ambiens, ac urinae excretioni praefectus.  
 σ, τ Duo penem potissimum consuetudina organa.  
 υ Vena ac ii em arteriae penem cervicemq; uescicæ accedentes.  
 φ Sedes notatur meatus urinae seminiq; communis, quæ reliquo ipsius ductus amplior in penis glande uisitur.

VIGESIMAQVARTA QVINTI  
LIBRI FIGURA.



VIGESIMAE QVARTAE FIGURAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

Hæc figura muliebris corporis truncus humi stratus exprimitur, cuius peritonæum unà cum abdomi-  
 nis musculis adaptum est, ac in latera ( uti inter secundum sit ) reflexum. Deinde intestina omnia à mesenterio  
 præsecimus,

præsecimus, recto intestino adhuc in corpore relicto, simul cum integro mesenterio, cuius membranas hic aliquæ ex parte iniucem direximus, ut mesenterij natura oculis subiceretur. Verum præsens figura in hoc potissimum delineata est, ut uteri & uestica possum ita ostenderet, quemadmodum in hac muliere, utero nobis nulla ex parte moto, is occurrit. Nulla enim hic ab utero diuisa est membrana: sed omnia integra ita hic uisuntur, quemadmodum in mediocriter obesis mulieribus, iam amotis intestinis, secanti obuiam ueniunt. Mulieres namq; adeo pingues sunt, ut longo etiam morbo enecata, & macilentissima, nullam uasorum seriem (nisi membranis mutuo diremptis) ostendant.

*A, B, C, D* Anterioris peritonæi sedes interior superficies.

*E, E* Mesenterij pars, tenuia intestina dorso connectens.

*F, F* Altera mesenterij membrana notatur, ab altera quam *G* & *G* insigniui diuisa. Utraq; autem membrana uasorum per mesenterium seriem, & glandularum uasorum distributionis interpositarum naturam indicat.

*G, G* Hæc mesenterij parte colon intestinum, quæ recto erat proximum, committebatur.

*H, H* Hæc mesenterij parte, coli intestini initium, dein cacum quoq; intestinum consistebant.

*I* Rectum intestini inibi præsectum, ubi colon desinit, quæ sedes est eregionis connexus sacri ossu cum infimalum borum uertebræ.

*L* Anterior uteri fundi sedes, à qua nihil profusus auulsum cernitur.

*N* Dexter mulieris testis.

*N* Mulieris sinister testis, cuius anterior pars hic tota oculis subicitur, quum interim dextri testis modica uideatur portio: idq; ideo accidit, quòd dextrum testem ita delineauerimus, quemadmodum uterq; testis membrana tegitur, seminaria mulieris uasa deducente, atq; à peritonæo nata: sinistrum uero testem illa membrana solius manus beneficio deteximus. Hæc namq; membrana anteriori testis sedi nulla ex parte adnascitur, sed incumbit solum.

*O, O* Membrana à peritonæi dextra sede pronata, & testem dextrum unà cum huius lateris seminalibus uasis, ac illis quæ elatorem uteri sedem implicant, uenis & arterijs dorso committens, utrumq; pariter continens, & deniq; cum alterius lateris membrana secundam uteri tunicam consitiuens.

*P* Hæc in nuper dicta membrana carne exciurrunt fibræ, dextrum uteri constituentes musculum.

*Q, Q* Hæc characteribus sinistræ lateris membrana notatur, quæ illi correspondet, quam nuper *O, O* indicauit.

*R, S* Uteri cervicis anterior pars, inter *R* & *S* ea adhuc obducta tunica, quam peritonæi partes illi offerunt, quæ ipsi uasa exporrigunt, deducuntq; ac illum peritonæo adnectunt. Cæterum interuallum inter *R* & *S* consistens, uteri cervicis amplitudinem quodammodo significat. Ruge uero hic conspicuæ, illæ sunt, quas uteri cervix in se collapsa, neq; aliàs distenta, inter secandum commonstrat.

*T* uestica, cuius posterior facies hic potissimum spectatur. Ita enim in figura huius delineatione oculum direximus, ac si in prostrato corpore, posteriorem uestica sedem, quæ uterum spectat, potissimum cernere uoluissimus. Si enim præsens muliebri corpus, similiter ac id quod modo subsecquetur, erectum arbitrareris, etiam secus atq; res se habet, uteri fundum multo elatius ipsa uestica delineatum esse, tibi persuaderes.


*U* Umbilici portio, à peritonæo inter secandum liberata, & unà cum uasis facti peculiaribus hic deorsum reflexa.

*X* Portio uenæ ab umbilico iecur petentis.

*Y* Neatus à uestica fundi elatissima sede ad umbilicum pertinens, ac factus urinam inter duo ipsius inuoluta deducens.

*Z, et* Huc unà cum cæteris umbilici uasis reflexæ sunt duæ arteriæ secundum uesticæ latera prorepentes, ac magna arteriarum amplexibus osuam foramina potissimum aduentibus, insertæ seu continuæ.





VIGESIMAEQVINTAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

*A* dextra praesentis figurae mamilla cutem abstulimus, ut quàm fieri posset proximè mamillarum natu-  
ra hic oculis subcyceretur. Deinde uentriculum, & cum intestinis mesenterium & lienem resecurimus, recto  
interim intestino non secus quàm in mox praecedete figura adhuc relicto. Ad haec, uterum suo exteriori quod  
peritonæi ipsi porrigit involucri quodammodo spoliavimus, omnes mēbranas quàm licuit accuratissime possumus,  
ideo amputantes, ut uasa seminis materiam testibus deferentia, & alia semen à testibus utero de ductura, in con-  
specuum

speculum uenirent. Vescicam uero deorsum in sinistrum latus refleximus, una meatum qui uesica à dextro rene urinam defert, abruptentes, ut urinariorum meatuum insertio appareret, ipsaq; uesica, uteri inspectionem non occuparet. Postremo, pubis osium portionem ab hac figura excrucimus, quo uteri cervix ac uesica etiam collum apposte uiderentur.

A, A Vena ad mamillas subinde excurrentes, ab illis quæ cui summo humero obducta offeruntur.

B Vena ab illis pronata, quæ per axillam in manum porriguntur.

C Principium mamilla corpus.

D, D Glandule ac adeps undecunq; corpori illi glandoso ac C insignito adstrata.

E, F, G, H Peritonæi anterioris sedis interior superficies. est enim hic anterior peritonæi regio, ad latus, & sursum deorsum flexa.

I, K Venarum ac item arteriarum sub pectoris osse deorsum ad abdominis superiora, à angulo repentium portiones.

L Gibba icoris sedes.

M Icoris cauum hic quoq; aliqua ex parte conspicuum.

N Vena ab umbilico icoris petentis portuuncula, & caua sedis icoris pars.

O Vena portæ caudex, hic simul cum uasis ipsi attentis præfectus.

P Vena caua.

Q Arteria magna.

R Arteriarum uentriculum, icetur, lienem, omentum, ac intestina petentium radices.

S Principium uenæ pinguem sinistri renis tunicam implicantis.

T Vena ac arteria, dextro reni serosum humorem deducentes.

U Vena ac arteria, sinistro reni serosum humorem deferentes.

X Principium uenæ pinguem dextri renis tunicam aduentis.

Y Dextri renis anterior sedes.

Z Anterior sinistri renis facies.

a, a Necatus à dextro rene urinam in uescicam deducens, & ad humilium a effractus. portio autem huius meatus

b. reliqua, ac uesica adhuc continua, b insignitur.

c, c Necatus urinam à sinistro rene in uescicam deferens.

d, d Dextra seminalis uena, cuius initium elatius d indicat.

e Seminalis uena, sinistrum petens testem.

f Seminalium arteriarum ortus.

g Seminalis arteria dextra.

h Seminalis arteria sinistra.

i, k, l Anterior uteri fundi pars. ac i priuatim dextrum fundi obtusum indicat angulum. k autem notat angulum sinistrum. l uero insinuat regionem uteri, ubi ipsius fundi consistit orificium, ipsiusq; ceruix inchoatur.

m Rectum intestinum, hic à colo cæteris ue intestinis abscctum. Quo minus autem utrunq; figuræ latus inibi ubi par utrinq; estratio, characteribus onerem, uni duntaxat lateri eas iam opportune adhibebo.

n Vena ac arterie feminalis portio, superiorem uteri fundi accedens sedem.

o Vena ac item arterie feminalium portiones, testem aduantes, & inuicem coeuntes, corpusq; inslar pyramidis constituentes: cuius conum o indicat, p uero ipsius basim insinuat, testi commissam.

q A nuper dicto corpore, pyramidis formam exprimente, eiusmodi uascula in membranas excurrunt, testem peritonæo committentes.

r Testis anterior facies.

s Vasis semen à teste in uterum deferentis initium.

t, t Vasis semen à teste in uterum deferentis reflexus, quos id uermis imaginem pulchrè referens, circum testis latera conficit.

u Vasis semen deferentis ad uterum progressus.

x, x Uteri cervix.

y Vasa inferiorem uteri fundi sedem ac uteri ceruicem implicantia.

α Vena uescicam ab illis uasis accedens, quæ uteri ceruicem intertextunt. atq; hic etiam character urinariorum meatuum insertionem notat.

β Vescica fundi posterior sedes, cui etiam α inscriptum est.

γ Vescica ceruicis musculus.

¶ Hac sede vesicae cervix uteri cervici implantatur.

ε Cuticulares cervicis uteri orificij caruncula. Atq; hic uteri colles, & cervicis ipsius orificium, citra characterum operam neminem latent.

ζ Arteria humillimam mesenterij partem accedentis radix.

η Uasa ab illis quae crus adveniunt uenis ac arterijs sursum ad abdominis musculos, ad umbilici usq; regionem ascendunt.

## VIGESIMASEXTA QVINTI LIBRI FIGURA.



### VIGESIMAESEXTAE FIGURAE, EIVS- demq; characterum Index.

PRÆSENS figura uterum unà cum illum peritonæo alligantibus membranis à corpore exsectis demonstrat. ipsiusq; cervix adeò hic sursum est convoluta & eversa, ut fundi uteri orificium in conspectu sit. Vesicae uerò fundum & cervicem pariter sectione aperimus, ut vesicae cavitatis, meatuumq; urinariorum insertio in propatulo essent.

A Uteri fundi anterior facies, nulla membrana prorsus detecta.

B, B Uteri cervix, uti iam diximus, extorsum involuta.

C Fundi uteri pars, glandis in pene modo ad superiorem uteri cervicis sedem protuberans.

D Orificium fundi uteri.

E, E Membrana uterum peritonæo connectens, ipsiusq; uasa continens.

F Sinister uteri testis.

G Vena & arteria feminales.

H Portio uenae ac arteriae seminalium, superiorem uteri fundi sedem accedens.

I Portio arteriae & uenae seminalium, testem accedens.

K Uas semen in testem in uterum deducens.

L Vesicae cavitatis.

M Urinariorum meatuum insertio.

N Urinariorum meatuum frustula hic propendent.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
VIGESIMASEPTIMA QVINTI  
LIBRI FIGURA.



VIGESIMAESEPTIMAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

*PRÆSENS figura uterum à corpore exemptum ea magnitudine refert, qua postremo Putauij disse-*  
*ctæ, &*

*Hæc, & quæ sæpius pepererat, proceræq; admodum stature fuit, mulieris uterus nobis occurrit, vulgarem uterorum molem uicinusq; excedens. Atq; ut uteri circumscriptionem hic expressimus, ita etiam ipsius fundum per medium dissecuimus, ut illius sinus in conspectum ueniret, unâ cum ambarum uteri tunicarum substantia in non prægnantibus crassitie.*

*A, A. B, B. Uteri fundi sinus.*

*C, D. Linea quodammodo instar suturæ, quæ uirile scortum donatur, in uteri fundi sinum leuiter protuberans.*

*E, E. Interioris ac propriæ fundi uteri tunice crassities.*

*F, F. Interioris fundi uteri tunice portio, ex elatiori uteri sede deorsum in fundi sinum protuberans.*

*G, G. Fundi uteri orificium.*

*H, H. Secunda exteriorq; fundi uteri tunica, à peritoneo pronata.*

*I, I. Membrarum à peritoneo pronatarum, & uterum continentium portionem, utrinq; hic asseruauimus.*

*K. Uteri cervicis substantia hic quoq; conspicitur, quod sectionem, quæ uteri fundus diuisus est, inibi incipimus.*

*L. Vesica cervicis pars, uteri cervici inserta, ac urinam in illam projiciens.*

*Uteri colles, & si quid hic spectandum sit reliquæ, etiam non appositis characterebus, neminem Naturæ operum studio sum latent.*

## VIGESIMAOCTAVA QUINTI LIBRI FIGURA.



### VIGESIMÆ OCTAVÆ FIGURÆ, EIVS- demq; characterum Index.

*Hæc c figura canum, non prægnantem exprimit uterum, quem propter Veterum descriptiones hic humano utero adungere iussum est: uti magis adhuc uaccinum, quem modo subiungemus.*

*A. Vena & arteria feminales.*

*B, B. Vena & arteria feminalium portiones, uteri superiori sedi uasâ porrigentes.*

*C. Testis, ac uis semen à teste deferens.*

*D, D. Membranae uterum peritoneo committentes, & secundum exterius ut ipsius inuolucrum efformantes.*

*E. Vena ac arteria, uteri ceruicem & humiliores fundi partem implicantes.*

*F. Dextra fundi uteri pars, exteriori ipsius tunica adhuc uniuersim obducta.*

*G. Sinistra fundi uteri pars, quam media ex parte, exteriori ipsius liber auimus inuolucro. G enim exterius inuolucrum, H uero interius notant.*

*I. Sinistri lateris uis, semen deferens, hic à teste liberatum, ac in ipsius sede seruatum.*


*K. Regio, quæ fundi uteri orificium constituit.*

*L. Uteri ceruix, etiam sinistra ex parte exteriori inuolucro detecta.*

*M. Portio cervicis uesicæ.*

*N. Cutis ad pudendum adhuc reliqua.*

AND. VESALII, DE CORPORIS  
VIGESIMANONA QVINTI  
LIBRI FIGURA



VIGESIMAENONAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

*PRÆSENTI figura uaccini uteri fundum, & ipsius cervicis portionem ita delineavi, ut magna fundi cervicisq; sedes exteriore uteri tunica sit detecta, interiorq; tunica ob id oculis subiciatur.*

*A Testis sinister.*

*B Vas semen deferens à teste in uterum.*

*C Sedes orificij fundi uteri.*

*D Sedes, quæ uterus primum sua interiore tunica geminus fit, ac ueluti duæ uteri partes constituuntur, quæ simul unaq; longo adhuc intervallo, exteriore uteri tunica obteguntur.*

*E Hac sede prorsus duæ uteri partes, etiam cum exteriore uteri tunica inuicè, arietum cornuū modo dirimuntur.*

*F, F Exterior uteri tunica, his sedibus adhuc seruata.*

*G Interior uteri tunica, innumeris ac uermium implexu non absimilibus uasis intexta, quæq; hic etiam C & D indicari possent.*


*H Hic adhuc uisitur membranae portio, uterum sinistra in sede peritonæo committentis.*

TRIGESIMA QVINTI LIBRI FIGV-  
RA, QVATVOR PECVLARIBVS COMPLEXA TABVLIS.

PRIMA TRI-  
GESIMAE FI-  
gurae tabella.



SECUNDA  
TABELLA.



TERTIA  
TABELLA.



QUARTA  
TABELLA.



TRIGE-



*TRIGESIMA* figura quatuor tabellis, seu peculiaribus effigibus constante, factus humani tunicas seu inuolucra exprimere conatus sum, quae de nouo cum factu in uteri fundi cauitate ac sinu generantur.

*PRIMA* itaq; tabella, uterum dextro suo apice magis exuberantē, ac ueluti masculino factu turgidū effinximus, quem in anteriore parte una sectione longa, & altera trāuersa dissectimus: ut dein uteri tunica in latera extrorsumq; reflexa, & a factu exteriori inuolucro diuisa, id in conspectum ueniat, simul cum carne illo obnata substantia, quemadmodum iam subsequens characterum Index proponet.

*A, B, C, D* Interna superficies uteri, quae ante sectionem, ac ipsius in exteriora euerisionem ac inflexum, factus inuolucris obducebatur.

*E, E, E* Sedes, quae uteri uena ac arteriae sese aperiant, ac noua ueluti uasa illis adgenerantur, quae in uaria multipliciq; eorundem collectione atextam habent carneam substantiam, quam praecipuae lienis substantiae conferimus, quaeq; firmandis continendisque uasis hic etiam praeficitur.

*F, F* Exterioris factus inuolucrum, hic quoq; magna ex parte uisitur, ubi membraneum prorsus est, neq; dicta iam carne substantia illi obnascitur: adeo ut *E, E, E* simul cum *F, F* exterioris inuolucrum factus designent.

*G* Uteri cervicis pars, adhuc ex sectione reliqua.

*H* Vena & arteria membranarum uiring, uterum & ipsius cervicem continentibus neclentibusq; suffulta, & a magnis uasis post illorum supra sacri ostis summum diuisionem enatae, utrumq; uarie implicantes.

*SECUNDA* tabula factus inuolucra ita refert, atq; se habent, quum carne quae exteriori inuolucro obnascitur, uasq; continet, substantia, ab utero est diuisa, ac factus cum suis inuolucris aliis non laceratis, inter dissectandum ex utero liberatus, exemptusq; mense alicui aut pelui imponitur.

*I, I, I* Carne, lienisq; carni similis substantia, exteriori factus inuolucro obnata: & in prima tabella *E, E* & *E* insignita.

*K, K* Exterioris factus inuolucrum illis sedibus hic notatur, quibus carne ea quam *I, I* & *I* indicauimus, substantia non obnascitur. Quia autem inuolucrum his regionibus membraneum prorsus est, & exiguis tantum uenulis & arterioli proprii ipsius usus gratia ornatum: haud mirum quoq; est, id pellucidum esse, interiorisq; ueluti inuolucri effigiem nonnihil modo transparere.

*TERCIA* tabella, sectionis quodammodo serie exterioris inuolucrum aperuimus, & ab interiori inuolucro abstractum, in latus repositum, ut modo interioris inuolucrum adhuc integrum, cum factu illi inligo facile occurrat.

*L, L, L* Exterioris factus inuolucrum ac *L, L, L* exteriorem ipsius notant superficiem: At uero interiorem, quae aliis interiori factus inuolucro est proxima.

*N* Corpus, & ueluti finis aut corda quaequam, in quam uena & arteriae ab utero in exterioris factus inuolucrum pertinentes, ac per carneam lienisq; substantiam similem substantiam sparsae, ad umbilici tandem uasorum conuersionem colliguntur, & ab exteriori inuolucro interius hic petunt, ubi meatus definit, factus urinae inter exterioris inuolucrum & interius mediam diffundens.

*O, O* Interioris factum ambiens inuolucrum, omnino membraneum, praeter uenulas quasdam, & arteriolas, sparsim per ipsum excurrentes. Quandoquidem uero istud inuolucrum exactius pellucidum est, factum quoq; in suo fere, quo in utero consistit, situ proponit.

*QUARTA* tabella exterioris quoq; inuolucrum ab interiori reflexum habet. Verum id interioris suae superficiei ampliorem exhibet sedem, quam in tertia tabella: ut scilicet carne ipsius, & lienis carni non absimilis substantia effigies sese hic offerret, quam in interiori inuolucri superficie per pellucidam membranam partem ea substantia exprimit, alioquin in externa tantum inuolucri superficie consistens. Deinde hac tabella interioris etiam inuolucrum longa sectione diuisum est, & a factu abstractum, ut atq; suam proponit superficiem. Atq; ita hic praeter umbilici uasorum ductum, inter factum & ipsius inuolucra occurrentem, etiam factus spectatur, ea propemodum figura, qua plurimum in utero recumbit, & quae omnibus partibus pulchre uidetur media, laesitudineq; ob id minus obnoxia.

*P, Q* Exterioris factum ambiens inuolucrum, ac *P* quidem externam ipsius notat superficiem: Quae uero internam, quae etiam *S* & *S* insignitur, etiam si illis characteribus aliud quid priuatum indicetur.

*R* Carne substantiae exteriori factus inuolucro obnata portio hic externa sua sede consistitur, quae illam utero aliis connatam reperimus.

*S, S, T* Internam exterioris inuolucri superficiem, quae leuis & lubrica, membranaeq; existit, hunc in modum transparet uasorum collectio & series, quae ab uteri uasis pronata, per carneam digeruntur substantiam, exteriori inuolucro obnatam, quae una quoq; per pellucidam alioquin membranam hic spectatur. At *S* & *S* uasorum fere orbem indicant, *T* autem extremam collectionem.


U, U Exterior superficies interioris inuolucri.

X, X Interior superficies interioris inuolucri.

Y, Y Uasorum umbilici progressus, qui ab interna superficie interioris inuolucri hic in fœtum pertinet, quem aliàs satis conspicuum, characterebus non insignimus.

Nihil obstat, his trigesimæ figuræ tabellis illam adicere, ac ueluti cum tertia tabella enumerare, quæ decemipetiti Capitis contextui inferretur, membranam, imperisq; mollem & amplam ostensuram uescicam, quæ non rardum duo fœtum uniuersum amplectentia inuolucra consistens, quodammodo à meatu fœtus urinam ex umbilico deferente producit, tertiq; fœtus membrana loco non paucis dissectionum professoribus recensetur, illam sarciminis speciei aliquo tandem pacto conferentibus.

## TRIGESIMAPRIMA QVINTI LIBRI FIGURÆ.



### TRIGESIMAE PRIMAE FIGURÆ, EIVS- demq; characterum Index.

PRÆSENTI figuræ, Galeni descriptionum occasione, exterioris canini fœtus inuolucrum delineatur: ut discrimen in conspectu esset, quo id ab hominis inuolucro differt. Hec namq; figuræ sectionis serie secunda respondet tabellæ, trigessimæ figuræ, quæ fœtus humani inuolucra, perinde ac si integra, neq; ullibi dissecta, ab utero euulsa essent, exprimuntur. Præterquam igitur quod hæc figuræ secundum proportionem eam tabellæ oblongior est, etiam prorsus aliam ostendit imaginem eius carnosæ substantiæ, quæ exteriori inuolucro obnata, tenis substantiæ à me assimilatur, hic A & A insignienda.

A, A Carneæ substantiæ exteriori superficie exterioris canini aut nulli fœtus inuolucri obnata, quæ transversim orbiculatim, ut totum inuolucrum, secus quàm in homine, ambit & complectitur.

B, B Exterioris canini fœtus inuolucri sedes, carneæ eam substantiæ, quam A & A indicauimus, non obiecta: sed membrana, & uenulis quibusdam & arteriulis interstincta apprens.

## TRIGESIMAE SECUNDÆ QVINTI LIBRI FIGURÆ.



### TRIGESIMAE SECUNDÆ QVINTI LIBRI figuræ, & eiusdem characterum Index.

Hæc figuræ bubali fœtus inuolucra in eum modum delineauimus, quo canini fœtus inuolucra in trigesima prima figuræ, & humani fœtus inuolucra in secunda trigessimæ figuræ tabellæ exprimuntur: perinde sciùcet,  
ac s.

ac si aperto per sectionem utero, fetus involucri nullibi lesa, ab ipso essent distracta, ac huc ab utero seposita: Adhibemus uero hanc quoq; figuram yz quæ hominis partibus ostendendis faciunt, ut discrimen appareret, quo uacca, bubala, capra, cerua, cornutorumq; adeo & acetabula in utero post conceptum uerè demonstrantium animalium fetus involucri, ab hominis fetus, ac rursus à canis, aut suis, aut alicuius plures fetus simul eductis, ac à me interim dissecti animalis fetus involucri differunt. Mirum namq; est, quam eiusmodi discrimen autorum scripta perturbet, intellectuq; ardua reddat, quum in utero & involucri animalium nullam statuunt differentiam: quumq; omnia inuicem respondere autumantes, quod animal ipsi potissimum dissecuerint, descripserint ue, non exprimunt. Quandoquidem uero nostræ orationis in partium historia contextus, quantopere eiusmodi figura etiam utiles sint, abunde testabitur, præsentis effigiei characterum indicem nunc tantum subijciam.

- A, A, A* Exterius bubala fetus involucrium, hic quibusdam sedibus insignitur, quibus membraneum confpiciuntur, & illam substantiam non habet obnatam, quæ nunc *B, B* & *B* uenit indicanda.
- B, B, B* Sedes, quibus exterius bubala fetus involucrium utero conecellitur, usq; admittit, & carnea ea substantia consistit, quæ lienis substantiæ comparatur: hicq; ita sparsim occurrit, ut nigra leopardorum pellis macula.
- C, C, C* Series concurfusq; uenarum & arteriarum per exterius fetus involucrium ad umbilici usq; productionem digesturum.
- D* Sedes, ad quam uenæ arteriaeq; per exterius involucrium sparsæ magis colliguntur, ipsiq; umbilici usq; constituendus sunt proxime.

QVINTI LIBRI FIGVRARVM, ET IPSARVM  
characterum Indicium finis,

HOMINEM, VT AÜGERETVR, DIUTIVS QVE  
uiueret, instrumentis egiſſe uariæ nutritioni famulantibus, ac demum  
quæ instrumenta nutritioni circa cibos potusq; uersant, priuatim ſunt extructa. Caput I.



T C V N QVE uarias inſtituendæ nutritionis cauſas commemorare liceat, tamen ea hauddquaquam infima eſt, quæ augendi corporis gratia hanc utilem neceſſariamq; eſſe commonſtrat: quemadmodum & illa quoq; exiſtit præcipua, quæ continuum ſubſtantiæ fluorem, ab inſito calore excitatū proponit. Quum itaq; tota hominis moles, etiam poſt iuſtam ipſius incrementum, in perpetuo ſit fluore, quumq; niſi altera ſimilis ſubſtantiæ in deſluxæ locum accederet, uniuerſa ilico euaporata diſſiparetur, luminus rerum Optæx homini inſitas quaſdam uires, deſiciens ac deſideratum ſemper appetentes, ab initio ſtatim indidit. Non enim ſugere, ueſci, bibere, aut reſpirare à quoquam diſcimus uſquam: ſed ſtatim à principio facultates in nobis habemus, quæ hæc omnia citra docentē perficiant. & cibo, quicquid ſiccioris ſubſtantiæ effluxit, reſtituimus: potione, quicquid humidioris: atq; ita ad priſtinam commēſurationem ambas reducimus. Sic uerò & aereæ igneæq; ſubſtantiæ modum, reſpiratu arteriarumq; pulſu tuemur. Cæterum quum id quod ſingulis partibus deſluit, tale natura eſſe credimus, qualis ipſa eſt particula: nihil autem eorum quæ bibuntur, eduntur ue, aut inſpirantur, eiufmodi prorsus occurrit: neceſſum fuit animatū, ea primū aſſumere, dein emutare & concoquere, ac quā maximè licet, corpori alendo reſtituendūq; ſimilia efficere: ac demum recrementa, quæ neceſſariò has emutationes ſubſequuntur,

Præcipue inſtituenda nutritionis cauſa.

Inſtrumentorū triplicium nutritioni ſubſeruientium neceſſitas.



sequuntur, expellere. Atq; hac potissimum occasione Natura nutritionis instrumenta in corpore triplicia instituit: quædam prima ratione ad id quod as-  
sumitur cōcipiendum elaborandumq; & in totum corpus deferendum: alia  
secunda, quæ excrementorum sunt receptacula. Reliquas partes ratione ter-  
tia, quæ horum excretionibus mittendis, & ne intempestiue profluant cohi-  
bendis, suoq; tempore expellendis subseruiunt. Porro partes aeri assumendo,  
conficiendo, deferendo, ipsiusq; recrementis ex concoctione alteratione ue  
succedentibus expellendis, à Natura conditas, sequens liber persequetur, cor-  
di omnibusq; respirationis organis dedicandus. Præsens uero cibi ac potus in-  
strumentis, & demum propter sedis uiciniam nexumq; generationi submi-  
nistrantibus organis consecrabitur. Ex ore itaque per stomachum cibus &  
potus in<sup>a</sup> uentriculum, uelut in communem quandam officinam seu prom-  
ptuarium assumitur, quod omnia quæ amplectitur cogit, confundit, & con-  
coquit, concoctum in<sup>a</sup> intestina protrudit: ex quibus quod cocti illius succi  
melius est, sanguiniq; efficiendo conueniens, unâ cum humidioris huius con-  
coctionis recremento, uenæ portæ rami exungunt, id iecoris cauo deferent:  
& hominis arbitratu, laxante se<sup>a</sup> orbiculari podicis musculo, & abdominis mu-  
sculis, simul accedente etiam<sup>a</sup> septi transuersi opera, compressis, excernunt.  
Iecur autem, postquam eum succum cremorem ue admisit, illi ornamentum  
adijcit, ad sanguinis perfecti generationem necessarium, duplici recremento  
ipsum expurgans: flaua scilicet bile, ceu recremento tenuiore & leuiore: de-  
inde atro bilioso succo, ceu lutofo, terrestri & crassiori. Ac illud quidem in bi-  
lis uesiculæ<sup>a</sup> theatus transmissum, in ipsam uesiculam defluit: à qua rursus in  
intestina excretum, cum durioribus fecibus egeritur. Hoc autem, uti uulgò  
arbitramur, per portæ uenæ<sup>b</sup> ramos ad<sup>a</sup> lienis nutritionem transmittitur: &  
quicquid in conficere, ac in familiare nutrimentum sibi adaptare nequit, id in  
uentriculum eructat, postmodum cum intestinorum excrementis subducen-  
dum. Ergo qui in iecore ad hominis nutritionem præparatur sanguis, illa duo  
recrementa deponens, portionemq; sui in portæ uena ad partium quibus illa  
digeritur, enutritionem asseruans, ruber iam ac purus ex<sup>a</sup> arctissimis, maxi-  
meq; frequentibus eius uenæ ramis per iecoris substantiam diffusis, ad gibbam  
iecoris partem in caue uenæ<sup>c</sup> propagines similiter innumeras angustissimasq;  
conscendit, tenui adhuc aquosoque recremento, quod ex intestinis cum opti-  
ma succi in uentriculo confecti portione exugebatur, concomitatus: eiusque  
aqueo recrementi, tanquam uehicle cuiusdam auxilio, arctissimas uias mino-  
ri opera perreptans. Quum uero sanguis eos superauit angustiorum,<sup>m</sup> renes re-  
crementum hoc ad se sedulo alliciunt, illoq; sanguinem purgant, id per<sup>n</sup> uri-  
narios meatus in uesicam huius conceptaculum depellentes: à qua rursus op-  
portuno tempore, relaxato suæ ceruicis<sup>o</sup> musculo, excrementum illud seu u-  
rina è corpore redditur. Sanguis autem per<sup>p</sup> uenam cauam copiosissima ra-  
morum serie propagatam, ad corporis partes deducitur: & quod in ipso sin-  
gulis partibus familiare ac idoneum est, illæ sibi attrahunt, assimilant, & appo-  
nunt: duplexq; quod & in hac concoctione confurgit recrementum, à se per  
proprijs ductus excludunt. Ista quidem de cibi potusq; instrumentis in uni-  
uersum dicta sufficiant. Quanta uero sapientia hæc rerum Opifex creauerit,  
eo ordine persequar, quo ipsa nutritioni famulari commemoratum est. A præ-  
ritonæo autem sermonis opportunè statuetur initium, quod id horum or-  
ganorum commune sit inuolucrum.

Quid præsent  
libro docendi,  
ac partium nu-  
tritionis ex ci-  
bo potusq; salte  
samulati bre-  
uiss. enumeratio.

414 fi. per  
A, B, C in  
L. 2. aut 12  
fin. P, Q,  
b 12 fig. 4  
P, Q, in S,  
ac ita de in-  
cepit, aut in  
7 et 8 fig.  
c fig. cap. 5  
li. 3. aut 12  
fig. 1, h,  
h in 1, K,  
d 1, 2 figu-  
cap. 4. 5 li.  
2 M.  
c 3 muscul.  
tabul. 6, 4  
P, S, 2, 6, 3,  
f 7 tab. 3,  
3 in 2, 3,  
et inde ut  
V. et rur-  
sus per e in  
S. ad 4. 3.  
fig. 1.  
h fig. cap. 5  
lib. 3. T, T  
ad 4. 4.  
i 3 fig. 4. 20  
fig. O. O.  
h fig. 4. 6. 5  
lib. 3. A. A.  
1 fig. cap. 6  
li. 3. 2, 3, 4.  
m 25 fig. 1.  
Y, Z.  
n 25 fig. 9.  
q in 25 fig.  
a, c in 6.  
o 25 fig. 5.  
25 fig. 7.  
p fig. 4. 6  
lib. 3.

PERITONAEI ostendendo pleraq; quinti huius libri conducunt figura, & potissimum prima, id in-  
tegrum anteriore externaq; facie proponens. Secunda autem anteriorem ipsius partem interiori sede ostendit.  
Posteriorem uero peritonaei sedem, illa figura in primis intus refertur, quae ex ipso plura organa habent disse-  
cta, ut uigesima secunda & uigesima quinta.



A TINI nomen peritonaei (quod abdominis membra-  
nam aliqui nuncupant) à Græcis mutuatur. illis namq;  
id quod nullis organis circumtendatur, *πυλόνειον*, *πυλόνειον*, & *πυλόνειον* appellatur. Neque ita absolutè tantum,  
uerùm à nonnullis hæc tota appellatio ipsi inditur, *πυλόνειον*,  
*πυλόνειον*, nomine uidelicet à substantia ipsius, quæ mem-  
branea potissimum est, deducto. à nonnullis hæc *πυλόνειον*  
*χιτώρ*, à nonnullis *πυλόνειον σκίπτωμα*, ab usu scilicet, quo inuolucrum ac tu-  
nicæ cuiusdam modo omnibus propemodum quæ quinto hoc libro profe-  
quemur, organis obducitur. Arabes communi membranarum nomine zi-  
phac & zimphac & chamel peculiariter id nominant. Peritonæum itaque ex  
simplicium & primorum corporum, quæ *similaria* nuncupare solemus, nu-  
mero censetur. Membrana enim est, nullis omnino fibris: secus ac uenarum

Peritonæi ma-  
gnitudo.

Peritonæum in  
similiariu por-  
tione esse nu-  
mero.

Peritonæi ma-  
gnitudo & si-  
militudo.

Connectio  
ortus.

Forma.

Ipsius superfi-  
cies cuiusma-  
di.

a fig. cap.  
i lib. i in-  
feria, &  
fig. cap. 22.  
b in abdo-  
mine, 4.  
c, s. o. musc.  
tab.  
c3 muscul.  
tab. f.  
d3 tab. A.  
e7 tab. d.  
o multo  
sub y, aut  
pallens in  
integriori  
bus s. li. fi.

f 7 ta. t. u.  
dein x, &  
16 tab. F.  
g.

g6 tab. d.  
h que 7 ta.  
spectatur,  
ac d. insti-  
guntur.

i fig. uli  
marum li.  
21 cū o.

arteriarumq; tunicæ, aut tenues membranæq; musculorum eneruatio-  
nes intertexta. estq; inter cæteras corporis simplices membranas amplissima  
& maxima. Carnosa namque nobis uocata membrana, et si amplior ipso peritonæo sit, ac uniuerso corpori cutis modo obducatur, tamen simplex non est,  
quum quibusdam carnis donetur fibris, & musculosa in ipso collo & fronte  
efficiatur. Porro peritonæum uniuersam cavitatem, quæ sub septo trans-  
uerso, ad os usq; coccygis, totius corporis cavitatum faciliè capacissima habet-  
ur, succingit, ac omnibus quæ illa continentur organis obtenditur, ea conce-  
ptaculi ritu amplectēs: uentriculū scilicet, intestina, omentum, mesenterium, ier-  
cur, lienē, renes, utranq; uesicā, uterum, & uasa demum quæcūq; inter septum  
transuersum & crura sitū habent. Atq; hæc quidem peritonæū interna ipsius  
sede cōtinet, externa uerò undecunq; musculis cōnascitur. Ex ligamētis enim,  
quæ lumborū uertebras cōnectunt, & quæ sacrū os ilium osibus cōmittunt,  
peritonæū utrinq; principiū ducit, membranæ latæ modo ab illis enascens. Mox  
ab utroq; latere ascendens, lumborū musculis, & ijs qui internam osis ilii &  
coxendicis ac pubis sedē occupātes, femorū præfunt motibus, obducitur: & si  
bris talibus, qualibus inuicē musculos cōmitti uidemus, illis adhærescit. At ubi  
hos musculos, qui quaternario numero utrinq; cōplectuntur, peritonæum su-  
perauit, interne transuersorū abdominis musculorū, & uniuersæ inferiori se-  
pti transuersi sedi subteditur, pertinacissimè ipsis, potissimū uerò neruosis illo-  
rū tenuitatibus connatū, & quodāmodo propriæ musculorū membranæ uicem  
gerens. Refert itaq; peritonæū oblongū oui instar utrē, seu spheram aliquā, cu-  
ius lōgitudo pertinet à septo transuerso ad humilimā amplitudinis cavitatis ue-  
sedē, quam sacrū os cum osibus ipsius lateribus cōmissis efformat. & quem-  
admodū utres ex tergoribus parati, exterius hirti asperiq; intus plani ac læues  
quodāmodo esse solēt: ita quoq; peritonæum externa parte, ut aptius musculis  
undiquaq; hæreat, asperū fibrosumq; ad eum prorsus modū uisitur, quo mem-  
branas mutuo cōnatas, in æquales esse dicimus. Interna autem peritonæi sedes,  
uiscera quæ cōplectitur spectans, impese leuis & terfa, ac ueluti aqueo humo-  
re oblita, secatibus occurrit, adipis copiā sibi interdū (ut in suisbus quasi perpe-  
tuū) adnatā obtinēs. Verū hunc nō omni ex parte æquè copiosum reperies.

Anterior

Processus à pe  
ritoneo enatu.

Peritonæi nō  
uulgi, pariter  
crassum.

Quibus parti-  
bus peritonæi  
peruium fit.

Præfæ ex ner-  
uis quibus peri-  
tonæum impli-  
catur.

Peritonæi

Anterior namq; superior' ue internæ huius peritonæi sedis\* regio, qua uentri-  
culum contingit, ac dein posterior quoq; regio ad lumbos & sacrum os per-  
tinens, copiosiori abundat adipe, quàm sedis eius internæ latera, parsq; um-  
bilico contermina. Præterea hæc interna peritonæi sedes quasdam portiones  
seu processus ijs quæ continet organis porrigit, illisq; processibus ea organa in-  
uicem colligat, & sibi quoq; adnectit, ac singulis præter peculiare ipsorum tu-  
nicas (si modo quas habeant) aliud etiam inuolucrum tunicam' ue obducit. At-  
que hinc etiam fit, ut ijs organis quæ duas peculiare fortuntur tunicas, quem-  
admodum uentriculus & intestina, ternæ attribuantur: quæ autem unicam  
duntaxat peculiarem tunicam obtinent, è quorum numero sunt uterus, &  
utraq; uesica, binas nanciscantur. Verùm organa, nulla peculiari donata tu-  
nica, ut iecur & lien, eam quæ ipsis obducitur, à peritonæo adipiscuntur. Quo-  
nam pacto autem, quibusq; ex locis hosce processus in eiusmodi tunicas dila-  
tatos degenerantes ue, peritonæum educat, & quo modo illi inuicem crassi-  
tie differant, in cuiusq; organi enarratione opportunius quàm hic recensebi-  
tur. Quemadmodum uerò interna peritonæi sedes ab externa uariet, sic neq;  
omni ex parte peritonæum sibi crassitie & robore correspondet. Quà enim  
ex uerterbarum ligamentis pronascitur, crassissimum est: deinde quæ lumbo-  
rum incumbit musculus, crassum quoq; cernitur. Anteriore uerò parte, quæ à  
mucronata pectoris ossis cartilagine ad pubem usque pertinet, tenuius graci-  
liusq; & inualidius occurrit. Ad hæc, uiris peritonæum crassius ualidiusq; est  
iuxta mucronatam cartilaginē, quàm iuxta pubis sedem. in mulieribus uerò  
ad pubem crassius ualidiusq; conspicitur: neq; his, uti uiris, peritonæum hic ad  
inguina utrobique seminarijs uasis' uiam præbet. Est enim peritonæum pecu-  
liariter in uiris inibi foraminibus, ut ita dicam, peruium: & tunicam utriq;  
testi priuatim offert, quo is & ipsius seminaria uasa tutò obuoluntur. Dein in  
uiris pariter atq; in mulieribus, peritonæum quæ septo subducitur, tria cum se-  
pto quoq; communia ostendit foramina: primum quo uenam cauam, secundum  
quo stomachum cum ipsi coherentibus nervis, tertium quo magnam  
arteriam uena coniuge experti, & aliquot sexti paris nervorum cerebri ramis  
concomitatam deducit. Præterea umbilico quoq; uasorum gratia, & in mu-  
liere quidem finis uteri' ceruicis, in uiro autem ceruicis uesicæ, in utrisq; ue-  
rò podicis nomine, peritonæum perforatur: ac demum multis uenis, arte-  
rijs & nervis cruspulentibus, deinde illis quæ maxima portione in rectos ab-  
dominis musculos sursum tendunt, & alijs nonnullis, quæ dorsi & abdominis  
musculis, & cuti à uasis lumborum uerterbris incumbentibus offeruntur, peri-  
tonæum iter præbet, ab iisdem uasis furculos sibi assumens. Quà enim septo  
subductum est, septi uasis ad nutritionē utitur: in lateribus autem ab ijs ramis,  
qui in lumborum regione geniculatim à magna uena & arteria porriguntur,  
plurimas soboles quoq; mutuatur. In anteriori uerò regione, peritonæum su-  
pra quidem, quæ mucronatam spectat cartilaginē, à uasis sub pectoris ossē  
ad rectos abdominis musculos excurrentibus soboles exigit: infra autem, pro-  
pagines asciscit illis uasis, quæ sursum sub rectis exporriguntur musculis.  
Cæterum quodd peritonæo medici tactus sensum adimant, ridendum potius  
quàm refellendum est: quum unà cum illis quæ transmittit organis, frequen-  
tibus quoq; nervis uiam offerat, à quibus furculos etiam adipiscitur, idq; ab ijs  
potissimum qui abdominis distribuuntur musculis. & insuper peritonæum  
sua essentia cōstitutioneq; à tactus sensu admittendo neitiquam est alienum.  
Peritonæi usus complures enumerari solent. primus quidem, ut omnia ea quæ

diximus

h 2 fig. A.  
B, quib. an  
te sectionē  
commite-  
batur F, G,  
supra F, G,  
l ad latera  
3. h. 21. fig.  
C, P, Q, h.  
2. 24. fig.  
C, D.  
h 2 fig. 2.  
C, D.  
o Vile 9.  
fig. 17.  
P specul.  
E, B, H, H  
27 fig.  
q Educi.  
tur ab F.  
G 18 fig.  
dein B, B,  
C, 1. 1. 1.  
fig. 19.  
r 1 fig. G.  
H. 2.  
fig. 2. 4.  
transmittit  
2. 2. edu-  
cit 2. 2.  
20 fig. 1.  
5 7 musc.  
tab. 1. 1. 1.  
t 2 fig. E.  
4 tab. 1. 1.  
fig. 2.  
h 21 fig. 2.  
x 1. 1. 1. fi.  
cap. 4. 1. 1.  
bri 1. G.  
2. 1. 1. fig. e.  
lusca. M.  
2. 1. 1. 1. 1.  
lib. 1. 1. 1. 1.  
a 1 fig. 1.  
25 fi. 1. 1.  
6 musc.  
tabul. e.  
b fig. 2. 4.  
e lib. 1. 1.  
n. 2. 1. 1.  
cap. 12. lib.  
3. 1. 1. 1.  
e 2 fig. 1.  
d 1 fig. 1. K.  
e 1 fig. 1. L.  
f 1. 1. 1. 1. 1.  
cap. 11. lib.  
4. ad abdo-  
minis re-  
gionem.



diximus cōtegat: ex quibus quum pleraq; tendi remittiq; debeāt, peritonæum (quo aptius fieri id possit) nerueum & membraneum meritò factum cernitur. ualidum quidem, ut opportunè contineret: sed tenuè, quo minùs pondere molestum esset. Secundus, quo omnia quæ amplectitur ab extrinsecus ambientibus musculis interstinguit, ne quādo intestinorum aliqua in media musculorum spacia incidant: & dum ipsos premunt, aut ab illis premuntur, intestina motui musculorum obstant, ac nē recrementa intestinis complexa difficilius deorsum transmittantur. Tertium peritonæi usum Galenus cum cæteris Anatomes professoribus recenset, quo id sicci alimēti superfina septi transuerfi accedente opera propellit: quasi uerò idem officium, quod abdominis musculis unā cum septo in faciū excretionibus obire commemorauimus, peritonæum præstet, & arbitrario motu, quo se contrahat distendatq; prædicitum sit, ac non transferorū abdominis musculorum, & septi, quibus conascitur, motum necessariò sequatur. adeò, ut peritonæum non magis quàm cutis, aut abdominis adeps, ipsum uē omentū, illi usui subseruiat. Miror membranam costas succingentem, quæ peritonæo substantia, usu & conformatione penitus correspōdet, in thoracem arctantium organorum numero ab illis habitam non fuisse: quum illa non minus thoraci cōprimendo, quàm hoc facibus cijciēdis auxiliari deberet. His quartus peritonæi usus succedit, omnibus quæ peritonæum ambiunt, & potissimū abdominis musculis communis, quo is cū inuolucrum exactè circumdatum, omnia stringit, ne leui occasione laxior uentriculus, aut intestina etiam flatibus infestentur. Præcipuus autem peritonæi usus est, quo omnia quibus circumdatum est, ab eo continentur, & ueluti à pelle quadam singula seorsum tecta, tutò colligantur, suisque sedibus fixa hærent.

Lib. 4. de usu partium

## DE STOMACHO ET VENTRICULO.

## Caput III.

STOMACHVM & uentriculum præcipuè ostendunt decimaquarta & decimaquinta figuræ: quibus in uentriculo monstrando succedit decimasexta, quæ hunc inuersum refert: dein decimaseptima, quæ illius tunicas, uti commodissime eas effingere potuimus, exprimit. Insuper uentriculum sua sede positum proponit secunda figura, simul cum sexta: sua sede autem nonnihil motum refert duodecima.



ENTRICVLVS, qui promptuarij modo esculenta poculentaq; suscipere, eaq; primo labore concoquere ac mutare debuit, non statim post os collocatus est, quanquā is situs ad cibi dentibus attriti assumptionē fuisset accommodus. Thoracem namq; & contenta illo uiscera, rerum Opifex uentriculo prælocauit, ut is in demissioribus sedibus excrementorum haberet effluxus, illaq; procul à sensibus, qui in capite sedem obtinent, deducerentur. Thoracem uerò aerem per os & narium foramina attracturū, ac rursus eundem necessariò emissurum, ut uocis respirationisq; autor efficietur, elatiùs collocari deuit. Porro ne nimium uentriculus ab ore remoueretur, quumq; longus ab ipso ad recrementorum expulsionis locum, uel intestinorum occasione, ductus esse potuit, Natura illū quàm licuit proximè ori subiunxit. Sub thorace enim & septo transuerso interiectur & lienem statim ponitur, uiamq; ab ore cibos ad se deferentem obtinet, quæ ab usu *οιστοφυ* Græcis nuncupatur, & communi nomine quo omnem angustum ductum, isthmi seu colli modo alicui ampliori uentri præpositum uocitant, *σώμαχ* illis quoque dicitur: qua uoce nos Celsum & Ciceronem

ventriculus sub thorace locatus.

47 musculi.  
lab. A.  
66 figu. F.  
F inter D.  
D & G.  
c 14, 15 ff.  
A, B, C, D.

Pia cibum potumq; uentriculo degerentis nomina.

ff Ciceronem

*initium.*

Ciceronem imitati, potius utemur, quàm gula alijs (uti & meri & uescet) non infrequenti dictione. Hæc itaq; uia linguam ad radicem eius herens excipit, & utraq; parte<sup>d</sup> tonsillas attingens, à palati extremo principium fortitur: ac agitatione motibusq; linguæ depulsum, & quasi detrufum cibū fufcapiens, illum deorsum pellit, partibus ipsius quæ sunt infra id quod deuoratur dilatatis: quæ uerò suprà, cōtractis. Neruosa enim, membraneā ue, ut faciliè dilatetur, prom-  
 \* Harū de  
 linationē  
 pete ex fi-  
 gura 17 fi-  
 guratum.

*Substantia ex  
 forma ac tui-  
 ca.*

*lucifus.*

pteq; rursus concidat, effecta est: & fibris suo muneri famulantibus concinnè intertextitur: ac reliquorum deniq; ductuum ritu teres, & intus accuratè leuis lubricaq; cernitur. \* Duabus etenim proprijs constat tunicis, substantiā, duri- tie, crassitie, & fibrarum specie uariantibus. Harum namq; interior, & totius oris palatiq; tunicæ continua, neruosior quidem & durior, & paulo tenuior est, & rectis fibris manuum instar ciborum attractioni subseruientibus dona- tur. Exterior uerò crassior, mollior, propemodumq; musculorum natura par- ticipans, carnosior uisitur: & transuersis tantū circularibus ue abundat fibris, quæ ciborum interioris tunicæ fibrarum beneficio attractioni feliciorem, magisq; subitam in uentriculum propulsionē efficiunt: & si quando uomen- tibus uentriculum quippiam protrudit, ad eius quoq; educationem summope- re auxiliantur. Duabus his solū fibrarum differentijs stomachus indiguit, ut rectæ quidem attraherent, transuersæ autem pellerent. Nam si obliquæ ac- cessissent, cibus in stomacho longiori mora hæreret: quod non solū homi- ni inutile, sed & importunum molestumq; esset: quando nimirum stoma- chus cibo plenus, ita diutius distenderetur, asperæque arteriæ, ac pulmonī, & magnæ item arteriæ, dum ea dilatantur, longiori mora obstaculo esset. Natu- ra enim stomachum tutò, & ea quæ modò innuebam organa minùs mole- statum, per ceruicem thoracemq; ad uentriculum porrigens, illum<sup>e</sup> exactè supra mediam ceruicis uertebraarum, & quatuor primarum thoracis sedem, in neutram partem inclinantem, asperæque arteriæ subtensum<sup>f</sup> deducit. Ad principium uerò quintæ thoracis uetræ<sup>g</sup> stomachus, ut ampliori magnæ arteriæ trunco secundū dorsi uertebras inferiora corporis petenti cedat, nonnihil in dextrum latus à media uertebrarum regione abscedit, arteriæ illi proximus, ad nonam usque thoracis uertebram repens: quò simulatque per- tingit, ab eius uetræ<sup>h</sup> eleuatus corpore, arteriam elatiùs (ne illa fortè à deo- rato cibo comprimatur) ascendit, neruosam septi transuersi partem uersus si- nistrum latus<sup>i</sup> penetrans. Non equidem, ut cum Hippocrate Galenus censuit, arteriæ hîc ad inferiora corporis prolabantis utens<sup>k</sup> foramine: uerū pecu- liari, quod ipsi neruisq; cum illo descenditibus (dum septum describeretur) præparatum esse diximus. Ad nonā igitur thoracis uetræ<sup>l</sup> usque initium, stomachus uertebrarum corporibus interuentu membranularum ex dorsili gamentis originem ducentium cōmittitur, atq; ab illis membranulis tertiam tunicam nullis omnino fibris interstinctā, & uelut secundæ ipsius tunicæ in- uolucrum possidet. Quòd uerò iuxta quintam thoracis uetræ<sup>m</sup> ad dextra po- tius arteriæ, quàm ad sinistra stomachus explicetur, in causā ipsa est arteria, nō adeò tyranni ritu (quamuis multo sit dignior) mediā dorsi sedem occupans: sed quum à<sup>n</sup> sinistro cordis sinu ortum ducat, & per reliquum ipsius ductum uersus sinistrum cauæ uenæ<sup>o</sup> subiiciatur, sinistrorsum maiore sui parte neces- sariò uergens, ac proinde aliquantulum stomacho cedens, cōmunicatorem ac uelut sōcium sedis uertebrarū admittit: adeò ut stomachus & minus oblique- tur, & firmiorē adhuc sedem quàm in sinistro latere reperire posset, obtineat. Dein stomachus non dextram septi perforat sedem, rectaq; in uētriculum ex dextro

*d si musf.  
 tabul. p. 14  
 fig. 2, 3.*

*\* Harū de  
 linationē  
 pete ex fi-  
 gura 17 fi-  
 guratum.*

*e 7 musf.  
 tabul. B. fa-  
 per B. ac  
 sub r.*

*f 15, 14. fi.  
 ab A. ad B.  
 g eius. fig.  
 B. uersus  
 C. ut ce-  
 deret. i. fig.  
 ed. 12 li. 1.  
 h 15, 14. fi.  
 C. uersus  
 D. G.*

*i 7 musf.  
 tabul. r.  
 k 7 musf.  
 tab. 4.*

*q spectio  
 tam 10 fig.  
 li. 6. ac O.  
 P. 6 fig. bu-  
 ius lib. 6.  
 r 22 fig. h  
 ed. 2. et 10  
 fi. R. ad Q.*

*Lib. 5 de Ad-  
 ministr. sectio.  
 Stomachus non  
 eodem cum ar-  
 teria magna se-  
 ri. foramine se-  
 pri.*





iecoris duntaxat concavo subtenfus, tota ipsius parte superiore, & dextro i-  
 rem latere à iecore occultatur: tantumque à dextra septi sede passim abscē-  
 dit, quanta iecoris est crassities, quum interim magnam septi sedem (uti mo-  
 dō dicebam) sinistro suo latere contingat. Neque id sanē admodum lien im-  
 pedit, qui non ita uentriculi sinistro lateri attenditur, adeoque in corporis  
 anteriora, ut medicorum uulgus arbitratur, pertingit, sed potius in postero-  
 ra humilioraque (tamen & ad latus nonnihil) substernitur. Dein, non solum  
 in sinistrum (ad septum usque scilicet) magis quàm in dextrum (utpote ad  
 iecoris tantum cauum) uentriculus protenditur: uerum ipsius forma in ho-  
 mine (nulla enim nunc mihi cum Galeno, neque canum, neque simiarum  
 est consideratio) talis cernitur, ut maxima ipsius quoque portio in sinistro  
 colloctetur, haud secus quàm si inibi maiorem quàm aptè contineri possit se-  
 dem adinuēisset, idque illius functionibus uideretur accommodum. Ven-  
 triculus enim forma perquam uarius est: at si quis illum obiter examinet,  
 rotundus, & à dextro in sinistrum oblongus, aut secundum latitudinem quo-  
 dammodo teres, primum occurrit: rotundus quidem, quod rotunda omnia  
 sint capacissima, & interim minimum noxijs exposita: oblongus uerò, quod  
 id sedes qua continetur, & deinde bina ipsius orificia, alterum quo cibos ad-  
 mittit, alterum quo iam confectos in intestina protrudit, exigere uideantur.  
 Cæterum si deinceps uentriculi forma accuratius expendatur, in sinistro la-  
 tere multo amplior rotundiorque, & ad inferiora quoque prominulus cer-  
 nitur: ac dein hinc uersus dextra uergens, paulatim in angustum cōgi, & su-  
 periore quidem sua regione descendere, inferiore autem ascendere conspi-  
 citur, adeo ut in dextro latere multo quàm in sinistro euadat gracilior. Sic  
 quoque superiore quidem sede, quæ ab uno orificio ad alterum pertinet, stri-  
 ctior angustiorque est, inferiore autem latior ampliorque. Anteriore parte æ-  
 qualiter undique gibbus occurrit, nulla ex parte deformatus. Posteriore sede  
 duos quodammodo gibbos commonstrat,<sup>g</sup> unum sinistrum, eundemque  
 magnum, proceriusque extuberantem:<sup>h</sup> alterum dextrum, minorem, ac de-  
 pressum magis. Atque hos gibbos sinus quidam impressio<sup>i</sup> ue parat, secun-  
 dum corporis longitudinem posteriori uentriculi fedi impressa. Quæ enim  
 uentriculus dorsi uertebras, ipsisque exporrectos uenæ cauæ & arteriæ ma-  
 gnæ descendentes<sup>k</sup> truncos respicit, ac sedi quam sortitur sese utcunque ada-  
 ptat, posterior ipsius regio introrsum quasi ad suam cavitatem nonnihil im-  
 primitur: quamuis interim uentriculus è corpore auulsus inflatusque, eiuf-  
 modi sinum non ostendat, & perinde totus inibi ac anteriori regione gibbus  
 conspiciatur. Porro ad uentriculi quoque formā duo ipsius pertinent orificia,  
 è quib<sup>l</sup> unum quo cibos & potus assumi dicebatur, in elatissima sinistra uen-  
 triculi partis sede ob hoc consistit, quod stomachus inibi septum commode  
 perforans, illic primum uentriculo connasci, commune<sup>m</sup> ue cum ipso corpus  
 fieri potuit. Et quanquam superius uentriculi os in sinistra eius parte haberi  
 dicimus, propinquius tamen mediæ ipsius sedi quàm sinistro lateri accedit:  
 quod tanto apparet manifestius, quanto uentriculus occurrit turgidior. Al-  
 terum uentriculi orificium cibos in cremorem emutatos ad intestina trans-  
 mittens, & πύλω<sup>n</sup> inde Græcis, nobis autem ianitor & inferius seu dextrum  
 os appellatum,<sup>o</sup> in dextra uentriculi sede consistit: non quidem, ut reliqui dis-  
 sectionum professores tradunt, illiq<sup>p</sup> existimant, qui tam pertinaciter de cibo-  
 rum assumendorum ordine altercantur, huicque orificio nomen à situ non  
 admodum aptè impoſuerūt, & nunquam auium ingluuiem & stomachum,  
 ruminan-

Ventriculi  
forma.

e 14, 15 fig.  
G, H.

f 14 figura  
L, L.  
g 15 figura  
M.  
h 15 fig. N.  
i 15 fig. O.

Duo uentricu-  
li orificia.

k 22 fig. g, h.  
22 fig. P, Q.

l 14, 15 fig.  
14 G.

m 14, 15 fig.  
H. 12. fig. S.

ruminantiumq; animalium uentres expenderunt, in eius sedis inferiori regione, sed in elatissima, dextroque uentriculi lateri proxima. Non enim sat erat mutuo, è directoq; hæc orificia inuicem (ne ocyus cibus adhuc immutatus è uentriculo laberetur) non opponi: uerùm inferius ex elatiori quoque uentriculi sede explantari oportuit, quo minus sua gravitate cibus uentriculum præterfugeret: sed tunc primùm, quando confectus, & in cremorè exquisitè mutatus est, uentriculi potius excernendi robore, quàm suo pondere, in intestina propelleretur. quorum principiū, istud uentriculi orificium cōstituit, explanatq; quare etiam<sup>n</sup> primum intestinorum, quod duodecim digitorum est longitudine, Exortum pleriq; nominarunt. Neque profectò iniuria alterum hoc orificium dextram uentriculi sedem occupat, quum hæc medio cauæ iecoris sedi contermina sit, in quam iecur suarum uenarum beneficio, ex intestinis, ipsosq; adeò uentriculo, quicquid succulentum ab illo confectum est, arripit ac depascitur. quod eo iecur præstat facilius, quo partes elaboratum à uentriculo cremorem primùm excipiētes, illi uicinius collocantur. Præterea uentriculi orificia non situ duntaxat inuicem uariāt, sed inferius quoq; superiore arctius est: quòd rudes, non tritas, duras, magnasq; moles homo subinde deuoret, ad quarum ingressum amplam uentriculi uiam esse oportuit. Per inferius econtrà, rariùs magnū, durum, non conuersum in succum crudumq; transit: quantum sanè non adeò angustum sit, ut solum cremorem transmittere queat. quandoquidem non pauci quamplurima fructuum ossa impense etiam magna, crebrò deuorata innoxie excernunt, & Galenus à quodā anulum aureum qui ore tenebatur, imprudenter deglutitum, eundemq; promptè excretum narrat. Neq; orificij huius amplitudinem se ignorasse callidus ille Hispanus docuit, qui superiori anno Clinianæ cuipiam Bacchidi quadraginta uniones, ex illis quas hic nobiles matronæ collo gestant, unā cum aurea cruce quinque genimistructissima, & fide pariter quæ hæc cōtinebantur, suffuratus est. Illa nanque quum huic noctem se daturam, nisi prius numeratis quinquaginta aureis, negaret, atque is lætè annuisset: ipsa à patricio Veneto pathico suo, ut compitiōr ornatiōrque, & magis placida esset, elegantissimum uxoris suæ monile obtinuit. cui Hispanus, quo meretriculæ uices reponeret, inhians, eam quàm potuit salacissimè, ut suauius tandem obdormiret, exercuit: ac postmodum soluto monili singulos uniones, & crucem, ac postmodum fidem (ne quid suo furto obstaret) deuorauit. Ceterùm Galenus & omnes eius asseclæ glandosam carnem inferiori orificio priuatim tribuunt, hanc ad eius orificij contractionem auxiliari, ac in quibusdam animalibus manifestiorem esse affirmantes. Istam sanè in canibus primùm, qui illa donantur maxima, & carnis colore insigniter prædita, deinde in homine examines uelim. Eam siquidè hanc esse arbitror, quæ duodeno intestino adnascitur, qua portæ uenæ<sup>o</sup> ramus cum coniuge arteria, illi subtenitur. Verùm hæc non in hoc ut intestinum illud, aut inferius uentriculi orificium claudat, arctetue, procreata est: sed ut uas intestino exporrecta suffulciat, ac parem cum glandio<sup>o</sup> iuguli & mesenterij, & humilioris membranæ omenti usum præstet. Deinde si quæ constringendi uis huic glandoso corpori præter cōmunem glandularum, quæ conterminas sibi partes lubricas humectasque reddunt, usum, indita esset, ipsum orificium aut intestinum necessariò ambiret, fibrarumq; natura participaret, aut transuersarum, musculi uesicæ ceruicis instar, aut obli quarum uesicæ & uteri corporis modo: quum interim id fibris omnibus destitutum, ad intestini longitudinem recta duntaxat linea illi adnascatur. Quanquam non desint, qui fo-

Orificiorum  
non par am-  
plius.

Lib. de Natu-  
ralibus succu-  
lationibus.

Lib. 4. & de  
Par. usu.  
Glandulosa ca-  
ra non procul  
ab inferiori o-  
rificio distans.

*Protuberans  
uentriculi in  
orificij sub-  
stantia.*

lis libris edocti, suoq; arbitrato Naturæ opera comminiscentes, glandosum id corpus musculum esse scribāt, eo inferius uentriculi orificiū orbiculatim amplecti nugaciter affirmātes, atq; hinc etiam corpus id perinde ferē ac Galenus octauo de Partium usu πύλωρον ianitoremq; appellantes. Porro (quod illis animaduertendum erat hominibus) non solum in inferiore uentriculi orificio, sed & in superiore, substantia uētriculi crassior spissiorq; est, ac orificia uelut in interiora extuberantiores inftar circuli partem obtinēt, uentriculi membra neæ nervosæq; prorsus substantiæ, nō uerò uti hoc in loco Galeni nomine quis sibi falso persuadere possit, glandulosæ cuipiā, penitus respondentē: quæ quidem inter dissecandum integro adhuc uentriculo tactu percipitur, aperto autem inuersoq; in cōspectum uenit, manifestē uentriculi initium stomachi ue finem & duodeni intestini originem proponens. Videtur enim tunc stomachus, idq; intestinum ex ipso uentriculo quodammodo enasci, aliāq; omnino quàm uentriculus ipse, partes esse: quum tamen exterius nihil tale appareat, neque ulla uentriculi portio præter reliquam superficiem emineat. Hæc crassior adauctaque uentriculi substantia ac sedes in internam ipsius regionem educta, ad hoc potissimum procreatur, ut ora uētriculi robustiora densioraq; quàm reliquum eius corpus, euadant, ne fortē à transeuntium impetu diuellantur, rumpanturq; & dein fortassis, ut quum ora constringuntur huius extuberantioris particulæ in trorsum cōiuentis occasione, citius arctentur occludanturq;. Et sanē quemadmodum exterior uentriculi superficies læuis & plana est, sic & inferior quoque ipsius amplitudo, si modò duo, quæ iam diximus, tubera circulatim prominentia exceperis. Ventriculus enim inibi nihil præter rugas quasdam, si uehementer constrictus reperiatur, ostendit, intestinorum & uesicæ cavitati respondens, quamuis interim obfuscum & quasi nubeculis intente rubentibus interstinctum colorem exprimat, quum tamen exterius omnino penē albicet. Verum interim nonnunquam in admodum obesorum hominum uentriculis, ut cunque copiosus, sed læuis & lubricus, adeps circa fundi in sinistro latere regionem internæ superficiei adnatus reperitur: quam nonnulli, ruminantium omasis tot ueluti alueolis faui quasi in modum interiori amplitudine obstitis ornatisque delusi, cellulis quibusdam & continuis sinibus abundare, falso scripserunt. Ventriculi quantitas, uaria est admodum. nam si è corpore exemptus, uesicæ modo inflatur, haudquaquam miraberis tantam ciborum uim, uinique copiam uno tempore posse absumi. Neque in homine æquē semper est turgidus, sed quum pro sua natura se habet, constrictoriaque ui utitur, quamlibet exiguum multum ue sit quod continet, totum id undique complectitur, nullam uacuum sedem relinquens. ac proinde pro assumptorum se habet ratione, ut & multa (ne perpetuò edere cogatur homo) assumere amplectique possit: & rursus si modica offerantur, ea undique amplexetur ac concoquat. Huic actioni ipsius congruit substantia nimirum maxima ex parte membranea, quæ commodè usu exigente ampliari dilatarique queat: & rursus quum opus est, colligi ac constringi. Constat enim uentriculus duabus latis tenuibusque tunicis sibi inuicem iunctis, perinde ac stomachus, sed nonnihil dissimilibus. Quandoquidem interior uentriculi similiter, atque interior stomachi, nervosā membraneaq; est, & totius stomachi, oris & labrorum, uti sanē & intestinorum interiori tunicæ continua: duritie tamen ab oris stomachiq; tunica modicè differt. quodd duriores asperioresque cibos, priusquam in uentriculum decidunt, ore conficiamus: à quibus id cōtunderetur & raderetur,

*Ventriculi su-  
perficie.*

fig. 14  
fig. 16

*Ventriculi  
quantitas.*

fig. 23 in  
dextra fig.

*Ventriculi sub-  
stantia quibus  
formetur tu-  
nicis.*

Quoad  
fieri licuit,  
uentriculi tu-  
nicas 17 si-  
gura ex-  
pressimus.



retur, nisi dura densaq; eiusmodi tunica euassisset. Vnde etiam tunica ori, & stomacho, & uentriculo communis, sensim ad uentriculi fundum accedens, mollior efficitur. Fibris hæc duplicibus intertextitur, quo etiam ab interna stomachi uariat. Interior enim tunicæ pars, uentriculi cauitatem respiciens, rectis ipsdem<sup>a</sup> que plurimis donatur fibris. Attrahat namque uentriculus cibos & potus per stomachum oportet, huiusmodi fibris ceu manibus alliciens: quæ quum contrahuntur, stomachum uentriculumque breuiant: adeò ut inter deglutendum<sup>a</sup> larynx, descendente stomachi initio, sursum conscendat, quòd mutuus stomachi & laryngis sit connexus: & interior laryngis tunica, cum interiori tunica stomachi, adeoque uentriculi, cernatur esse continua. Secundum uerò fibrarum interioris uentriculi tunicæ genus, obliquum est, in externa tunicæ sede, qua secunda illam amplectitur, situm.

Quemadmodum enim cibi potusque attractio, eorundem necessariò præcedit retentionem, ita rectas fibras interius obliquis Natura coordinauit. Deinde ut retentionem, ciborum iam confectorum succedit expulsio, ita quoque secunda exterior<sup>a</sup> ue uentriculi tunica transuersas fibras obliquis exteriores meritò nanciscitur. Hæc enim interiore crassior & mollior, minusque compacta, transuersis abundat fibris, secundæ stomachi tunicæ respondens, nisi quòd illa paulo minus quàm hæc carnosa est, & aliquot etiam obliquis implicatur fibris. Cur autem uentriculum, aut hanc exteriorem ipsius tunicam adeò impense carnosam secundum uentriculi fundum, humiliorémue ipsius sedem, esse plerique scribant, non satis assequor. Videntur enim suis somnijs confisi<sup>a</sup>, fundum uentriculi, quo melius concoquat (uti & stomacho, propter exteriorem ipsius tunicam utcunque musculosam, conficiendorum ciborum uim tribuunt) insigniter carneum statuere: quum interim uentriculus illic neque carnosior, neque crassior sit, quàm ad elationem ipsius sedem. Imò si uerum fateri licet<sup>b</sup>, superior uentriculi pars carnosior est inferiore: ut nunc taceam neruorum superioris sedis frequentiam, tunicarum eius sedis crassitiem insigniter adaugentem. Cæterum duabus his uentriculi tunicis<sup>c</sup> tertia accedit, instar operimenti & propugnaculi cuiusdam, tunicæ exteriori circumdata, & à peritonæo, quæ id septi partem stomacho iter præbentem integit, pronata. Hic enim peritonæi portio primum elatori uentriculi orificio, deinde uniuerso ipsius corpori ad duodeni usque intestini originem obducitur. Atque hæc à peritonæo procedens tunica, omnium quas id reliquis secundum uterum organa exporrigit, faciliè crassissima cernitur: ac, ut postea dicturus sum, <sup>e</sup> superiori membranæ omenti principium præbet, omnes uentriculum petentes uenas, arterias & neruos primum excipiens, firmansque. Venæ omnes à sola portæ<sup>f</sup> uena originem ducunt. Nulla enim quantumuis exilis à<sup>g</sup> caua uena uentriculo secundum corporis longitudinem substrata, ac peritonæi hac in sede initio proxima, uentriculum accedit. Quanquam fortè quispiam, perinde ac ego aliquando feci, secus arbitraretur, qui Galenum in sexto de Administrandis sectionibus libro, & quarto item de Partium usu, de caua, atq; adeò magna uena, non autem de uniuersa portæ uena, aut <sup>h</sup> sinistro ipsius trūco loqui existimaret: quum peritonæi uarios enarrans processūs, & omenti exortum cum mesenterij principio edocēs, in uentriculum uenas uariè propagari scribit, à magna uena sub uentriculo, secundum ipsius longitudinem delata. Cæterum arteriæ in uentriculum digestæ, omnes ab illis ortum habent<sup>h</sup>, quæ à magna arteria in

Exteriorem uentriculi tunicam in fundo impense non esse carnosam.

Uentriculus petentes uenas ac arterias

ff 4 humilio-

<sup>a</sup> Laryngis simul cum stomacho ostendunt<sup>a</sup> 23. 5 fig. cap. 21 lib. 2 ubi stomachus notatur.

<sup>a</sup> Secundum K. 14. 15 fig.

<sup>b</sup> 14. 15 fig. iuxta G.

<sup>c</sup> 17 fig. lib. 7 muscul. labar.

<sup>e</sup> 2 fig. Q. Q. 2. 3 fig. d. 4. 4.

<sup>f</sup> fig. cap. 5 lib. 3.

<sup>g</sup> 22 fig. g.

<sup>h</sup> fig. 504. lib. 3 F. 7.

<sup>i</sup> fig. f. h. fi. indic. fig. cap. 12 lib. 3 infer. tem. hic uero 4. fi. 8.

humiliorem omenti membranam primùm digeruntur, ac in id & iecur, & bilis uesiculam, & lienem, & in uentriculum deniq; ipsū deriuatur. Ac<sup>1</sup> prima quidem uentriculi uena, à portæ uena, priusquam in duos grandes ipsius truncos discinditur, principium obtinet, ad inferius uentriculi orificium, contermina; ipsi ad posteriorem eius sedem loca excurrunt.<sup>8</sup> Arteria autem huic uenæ coniunx, propago eius arteriæ censetur, quæ secundum portæ ductum, iecoris cauum adit.<sup>1</sup> Secunda uena coniugem undecunq; habens arteriam, toti dimidiæ inferiori uentriculi parti subteditur, superiore membrana omenti suffulta, à qua & anterior & posterior fundi uentriculi dextra sedes surculos mutuatur. Præfens uena frequenter ortum ducit ex dextra uenæ portæ regione, quā in duos grandiores ipsius truncos finditur.<sup>m</sup> Arteria uerò ab illa pronascitur, quam in iecur deriuari diximus.<sup>n</sup> Tertia uentriculi uena impenſe gracilis est, comite carens arteria: & à uenæ portæ graciliori sinistro uenæ enata truncus, in posteriorem uentriculi sedem (qua dextrum ipsius gibbum inibi prominet) pauca ramulorum serie dispergitur.<sup>o</sup> Quarta uena ab eodem quo nuper dicta trunco prodiens, toto incesſu<sup>r</sup> arteriam, ab ea quæ per inferiorē omenti membranam lienem petit, enatam, sibi coniugem alciscit, omniumq; uentriculorum accedentium uenarum (ut & arteria arteriarum) facile est præcipua, ac in numerosiores ramos diuisa. Procedit enim sursum ad medium posterioris sedis uentriculi, ac primùm utrinq; ramum spargit in plures surculos per posteriorem uentriculi sedem diuariatū. Dehinc sursum ad dextrum superioris uentriculi oris latus sensim cōscendit, illudq; coronæ modo amplectēs, ramulos complures deorsum in uentriculi corpus digerit: aucos, eisdemq; graciles in stomachi finem, quo is uentriculo cōmittitur, sursum offerens. Ab hac uena, quum dextrum oris uentriculi latus ambit,<sup>q</sup> propago editur, secundum elatiorem uentriculi sedem ad ipsius usq; humilior orificium pertingēs, ac in progressū deorsum quoq; geniculatim soboles aliquousq; diffundens.<sup>r</sup> Quinta uena comite arteria non priuata, sinistram uentriculi fundi sedem implicat: & superiori membrana omenti suffulta, ramos elatiore sua sede in uentriculi anteriora posterioraq; emittit. Huius principium dependet ab ampliore uenæ portæ ramo, lienis infimæ sedi inferēdo: & arteria, uenam eam cōcomitans, ab arteriæ ramo pullulat, lienē hic accedente. Sexta uentriculi uena, ea demum esset, quæ sola Anatomicis in ore uersatur, quamq; à liene in superius uentriculi orificium perferri omnes astruūt. Ego sanè, ut uerum fatear, non unicam, sed plures, easq; non semper pari numero ab illis quæ lienī exporriguntur uenas pronasci, præter quintam antè enumeratam, obseruo, sinistri lateris uentriculi sedem lienī proximam accedētes: inter quas ferè ea solet esse præcipua, quæ à maiori uenæ portæ ramo, altiori lienis partī inserto, principium ducit: à qua rarò surculi, pilorum instar graciles, quasi ad superius uentriculi orificium pertingunt. His uenis sinistram uentriculi latus adeuntibus, comites perpetuò iunguntur arteriæ, ab illis quoq; quæ lienem subeunt propagatæ. Commune omnium uentriculi uenarum officium est, ut & alimentū ipsi adferant, & succulentioris ab illo confecti cremoris ad iecoris cauum, non aliter ac intestinorum uenæ deducant. Proprium uerò earum quas sexto loco enumeravi uenarum, & potissimū quintę munus, cum alijs dissectionum professoribus esse (at timidè interim, & præter animi propemodum sententiam) fatebor, ut si quid in uentriculum lien eructet, illæ eius sint uehiculum, idq; in uentriculum fundant. Cæterum frequentes uentriculi arteriæ innatū ipsius calor ē recreant, & succulētī etiam aliquid (si ausim modò proloqui) ex uentriculo fugere uidentur.

Uenarum uentriculi minime.

Arteriarum.

i fig. cap. 1  
lib. 3. D. fi.  
13 a uerſus  
H.

k fig. ca. 11  
lib. 3. p.

l fig. cap. 1  
li. 3. H. 2. fi.  
R. 14. 15  
fig. ca.

m fig. ca. 11  
lib. 3. r.

n fig. cap. 3  
lib. 3. K. 15  
fig. b.

o fig. cap. 1  
li. 3. N. 14.  
15 fig. d.  
p fig. ca. 11  
lib. 3. x uerſus  
tum ab u.

q 14 fig. e  
uerſus li.

r fig. cap. 1  
li. 3. Z. 14.  
15 fig. f. 2  
fig. u. 3.

s fig. ca. 11  
lib. 3. 1.

t fig. cap. 5  
lib. 3. X.  
Y. 14. 15 fi.  
83.





Quia uentriculi  
li munijs sub-  
seruiant par-  
tes ipsi accu-  
bantes, atq; ita  
illius ad alios  
partes conta-  
ctum.

Nullam omen-  
ti partem ante-  
rior uentricu-  
li sedi obducit.

uel essentiali forma, facultate, in succum cremoremq; colore substantiæ suæ similem reddat: ac demum quod confecit intestinis exhibiturus, inferius orificium suum laxet, transuersisq; fibris quod amplexabatur, deorsum protrudat. Cæterum uim ipsius alteratricem, unde quaque eum circumdantia organa, ac uelut lebetem ingentes foci solent, excalefacientia, non parum adiuuare credimus. totam enim superiorē eius sedem uersus anteriora, & dextrum ipsius latus, iecur complectitur. elatior uero ipsius pars, ad superioris sui orificij posteriorem sedem consistens, & sinistrum eius latus uniuersum, septo ambitur: excepta solū ea regione, quam lien ad sinistrum uentriculi latus humiliori posteriorique parte occupat. In posteriore autem sede, uentriculus inferiorem omenti membranam, & quæ in illam excurrunt uasa proximè subtensa obtinet. Dein sub hac septi transuersi pars, & uena caua, & magnæ arteriæ truncus, præter dorsum, ipsiusque musculos, consistunt. & uniuersæ inferiori uentriculi sedi omentum partim attenditur, partimq; connascitur. præterea & huic sedi sub omento colum intestinum elatiùs, tenuia uero intestina demissiùs attenduntur. At alij anteriorem uentriculi sedem omento integri somniant: quum tamen elatior omenti membrana, recta duntaxat lineæ, inferiori ipsius parti secundum anteriora adnascatur, nulla interim omenti parte uentriculi anteriori sedi obducta. Vacat itaq; magna anterioris uentriculi (si quando impense turget ac distenditur) sedis regio, neq; iecore, neque septo transuerso, neque omento, neque liene obducta: quanquam omenti uice aliud uentriculus hic obtineat subsidium, in calefaciendo iam dictis auxilijs non ab simile. Præter peritonæum enim, & octo abdominis musculos, uena ab umbilico iecori deducitur, qua foetus nutrimentum accipit, quæque post partum exanguis inutilisq; efficitur. Huic uenæ, quæ peritonæo nexa uentriculo infertur, in circuitu adeps multus, non tamen omnibus æquè copiosus, adnascitur: qui ut & uentriculus suo in concoquendo munere alacrius laboret, aliquid auxilij præbet. Impensius enim conducit iecur, lien, & quæ posteriori uentriculi sedi subtenduntur uenæ ac arteriæ, ut & ipsum quoque septum indefesso suo motu uentriculum minimè negligit. Quinetiam cordis septo incumbens calor, ad perfectiorem uentriculi functionem non censetur inutilis.

Hæc petes  
ē 2, 3, 6, 12,  
20 figuræ:  
ui qui uē  
triculi sibi  
enarrare-  
mus, colli-  
gere prom-  
ptum fuit.

i istud 2 fl.  
positum  
exhibet.

hæc figuræ  
dein G.

## DE OMENTO. CAPVT IIII.

OMENTI delineationem in primis proponunt quarta & quinta figura, ac dein secunda & tertia: uti ex illarum figurarum indicibus est colligere.

Omenti sermo  
nem nunc insti-  
tuendum.



Omenti sermo.

ROXIMVM fortè nunc erat, intestinorū, ut quæ confectum à uentriculo succum excipiant, enarrationē subiungi: sed quia illis omentum incumbit, & uelut innatat (unde & à Græcis ἐπίσπασμα & ἐπίσπασμα, uulgoq; uētris map pa dicitur) & quia dissecantibus prius quàm intestina occurrat, ac demum non minus quàm intestina uentriculo continuum magna ex parte est, non admodum inopportune id hoc loco aggrediemur. Omentum itaque, Arabibus Zirbus nuncupatum, in peritonæi amplitudine positum, mox anteriori illius sedi subijcitur: & super<sup>b</sup> intestina extensum, ad lienē quoq; & iecoris cauum, ac posteriorem uentriculi sedem propemodū uniuersam, eiusq; fundū exporrigitur. Verum etsi omentū iecori, uentriculo, lien, ijsq; demū sedibus, à quibus originē ipsius pendere audies, proximū attēsumq; in dissectionib; perpetuū reperitur,

non sem-

a In 2 fig.  
Q, Q, Q  
mox in C  
sub A, B,  
C, D.  
b Confer  
figurā se-  
ctæ, & sedis  
lō spectā  
figuræ, &  
C, F.

non semper tamen ad pubis usq; os, intestinis obductum uisitur. Huius enim portio, quæ in homine alioquin intestinis, perinde ac in canibus, porcis & simijs, interni debebat, rarò ultra umbilici regionem dimissa,<sup>d</sup> sed maxima sui parte sinistrorsum lienem uersus retracta conuolutaq; secantibus sese offert. quamuis interim omentum humiliori sua sede manibus apprehensum, ac ueluti deorsum & in latera distentum, promptè ad pubis ossis usq; regionem, posterioremq; uesicæ<sup>e</sup> sedem, ac ilia procedat, intestinaq; penitus obtegat. Neque hunc omenti ad superiora retractum, in suspensio necatis tantum obseruamus, ne quis forsan id corporis cōcussu, motu ue uehementiori in sese conuolui existimet: at in ijs quoq; non infrequenter idem occurrit, qui aqua suffocantur, & qui morbo laterali, aut cerebri inflammatione, aut consimili aliquo affectu placidè, & citra corporis agitationem pereunt, & quibus thorax abdomenq; uiuentibus in publicis supplicijs aperitur. Quinimò in sanis, quod ad omentum attinet, hominibus, id tam rarò ad pubis usq; ossis sedem descendere inter secandū animaduertitur, ut nonnulli dubitauerint, num ramices ex omenti in scortum, aut<sup>f</sup> exteriorem potius testis uasorumq; feminaliū tunicam descensu produci queant: & num omento uteri<sup>g</sup> os ita secundum Hippocratis sententiam in admodum obesus comprimi possit, ut cōceptum impediatur. Verum ego non semel sanè omentū in eam, quam dixi testis feminaliumq; ipsius uasorum tunicam (cui peritonæum<sup>h</sup> originem præbet) deuolutum, ac miris modis extra mediocrem omenti aliàs cōstitutionem, ad auctum deprehendi. Nam quum tota omenti<sup>i</sup> pars alioquin intestinis incumbens, in mediocriter pingui homine, uix libræ aut sesquilibræ pondus excederet: uidi tamen omentum ita præter naturam in ea testis tunica auctum, ut quatuor aut quinque libra rum pondus penderet, & uentriculum ex sua sede ita deorsum distraheret, ut uentriculi deficiente munere, uarijsq; obortis singultibus, id pondus mortis occasionem fuisse, inter secandum collegerim: quum in morbo quodam laterali, qui alioquin bene expurgatus fuerat, scrotum ex more ab ægro altantibusq; subligari neglectum fuisset. Quinetiam quo exactius ramicum herniarum ue, uti uocamus, rationem perquiro, eo etiam magis omnes illos molles ramices, quos carnosos uulgus appellat, ac meritò à uaricosis affectibus distinguit, ex omenti prolapsu, incrementoq; progigni, mihi persuadeo. Atq; ut omentum in scorto ita nonnunquam augeri decumbereq; sæpius conspeximus, ita quoque indubiè Hippocrates quibusdam mulieribus id ita increlescere arbitratus est, ut eius incrementi moles<sup>k</sup> inter uterum uesicamq; collecta asseruataq; fundi uteri os ita cōprimere arctareq; posset, ut ad feminis conceptum sese recludere aperire ue nequiret, & ceruicis uteri iuxta fundum amplitudo à pene, eoq; potissimum languidiore, minusq; procero, ita distendi haud posset, ut semini in uteri fundum aditus patèret. Præterea ab hac forsan omenti mole augmento<sup>l</sup> ue, nonnulli primum *ὀνιμασία*, quasi dicas, omenti gestatores, fuerunt nuncupati. uix enim arbitror omnes homines ita appellatos, quasi inter cætera animantia maximum, uti Galenus tradidit, nasci cernerentur omentum: quum quadrupeda ferè omnia maiori, & perpetuò supra intestina undiq; distento, explicatoq; omento, quàm bene habiti homines, donari mihi uideantur. Omenti<sup>m</sup> figura proximè marsupij, aut sacculi, aut peræ imaginì conuenit: ac in primis aucupum peræ, quæ orbiculatum habet orificium, posteriori sua parte elatiùs quàm anteriori congrueret, si uno constaret corio, aut ex pera omenti figuræ adamuissim congrueret, si uno constaret corio, aut ex lana texeretur, ac unde quaque in consutulis, & unum duntaxat, uti sic dicam, corpus

omenti figura.

\* Hæc potissimū ostendit fig. 5. f.

c v1 apparet in 2 fig. d ita fere ac inferior membrana conuoluta iacet in 3 fig. e, e in 4 fig. f sub 2 fig. aut al. 5 25 figur.

f 30 figur. h 22 fig. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. 25 fig. c. 27 fig. g.

b 22 figur. ad 25 p.

i uniuersum id qd 2 figur. spectatur.

h 24 figur. inter T & L, R, S. ac 25 fig. inter 6 & 1, x.





\* Expēde  
hic sedulū  
quintā fig.

collectæ. Membranæ hæ nullis nexibus intestinis connascuntur, præter inferioremembranam, quæ in hominibus colo intestino pertinacissimè \* continuatur per totam eius intestini sedem, quæ secundum ventriculi fundum prorepat. Neq; id segniter obseruandū venit, quum inferior omenti membrana mesenterij loco ipsi colo intestino sit, quæ id uentriculo exporrigitur. Colum enim toto illo ductu nullā obtinet mesenterij partē, secus multo quàm in canibus & simijs, quibus omentum uix colo connascitur. quum tamen homini inferior omenti membrana, quæ uentriculo substernitur, non solum mesenterij, quemadmodum nunc diximus, uicem gerat: imò si accuratè singula examinaueris, membranæ inferioris omenti portionem intestinis exporrectam quodammodo ex tertia coli intestini tunica pronasci fateberis. Atq; id eo expendi uelim diligentius, quo minus à Galeno, qui simijs nimium tribuit, animaduersum est: uti sanè Herophilo & Aristoteli uidetur fuisse perspectissimum, qui omenti partem colon dorso colligantem, omenti loco non habuerit: sed eam tantum partem, quæ à uentriculi fundo & colo intestino enata, intestinis obducitur. Quanquam satius fore arbitror, eam quoq; omēti partem, quæ uentriculo sub tenditur, columq; continet, omento attribuire, quum ea omenti reliquæ portiones ferè cōtinuetur, & eodē usus cum inferiori canum omenti membrana suppeditet: quamuis interim ex abundanti hominis colo, mesenterij uice sit: ac quum duplici propemodum membrana inibi sub uentriculo extruitur, mesenterij constructioni ac fabricæ plurimum respondeat. Dein superior quoq; omenti membrana in homine inferiori membranæ ad coli regionem, quæ id uentriculo exporrigitur, ad eò connata occurrit, ut quispianonnullis nexibus superiorem omenti membranam colo quoq; intestino secundum uentriculi fundum cōnecti, haud absurdè dixerit. Quod autem Galenus omētum modicis, & iisdem laxis nexibus, idq; ad dextrum duntaxat latus colo intestino committi prodiderit, in causâ fuere simiæ, mediam inter canes & homines naturam sortitæ. Omentum namq; canibus nulla ex parte colo, alicui uel alteri intestino adnascitur. Simijs autem medio se habet modo: licet illæ adhuc ad canis cōstructionem potius, quàm hominis accedant. Venæ omento implicatæ, solius uenæ portæ sunt soboles. nullæ enim à caua in omentum, uel ubi id principium sub uentriculo ducit (etsi aliter Galenus senserit) pertinent. Venas namq; inferiori membranæ omenti dispensatas, si ad amulsim singulas examinaueris, ab eo portæ<sup>s</sup> trunco dispergi inuenies, cuius præcipua portio in lienem exhauritur, quemq; doctrinæ studio graciliorem & sinistrum portæ truncum appellamus. Primum itaq; omentum portæ<sup>s</sup> caudicem ex iccore proficiscētē excipit, sibi iam cōmemorandas in ipso ductu propagines assumens. Ac inferior quidem omenti membrana<sup>a</sup> tres uenarum radices admittit, ex humiliori sede eius portæ trunci, qui ad lienem fertur, depromptas. Vna notatu satis dignæ magnitudinis in dextram potissimum eius membranæ partem multiplici serie dispergitur, quibusdam furculis in colon quoq; per tingens. Secunda iam cōmemorata amplior, aliquantulum post originem in duos mutuò multū abscedentes ramos diducitur, à quibus postmodum in mediam inferioris membranæ omenti sedem, uersus sinistrū tamen magis, frequentes admodum soboles diffunduntur, quæ homini in colum intestinum ea<sup>s</sup> serie pertinent, quæ uenas mesenterio intertextas, alijs intestinis exporrigi nouimus. Tertia radix exigua, & non semper apparens, in sinistram humilioris membranæ partem aliquouſq; perinde ac in ipsum quoq; colum, deducitur. Porro superior omenti membrana uenas mutuatur à<sup>s</sup> duabus secundum

Venæ omenti  
implicantes.  
Lib. 6. de Ad-  
min. differt.  
Lib. 4. de uſu  
parti.

s fig. cap.  
s lib. 3 F.  
4 fig. ad si-  
nistrum la-  
tus f.  
2 fig. cap.  
s lib. 3 B. 4  
fig. L.  
4 fig. cap.  
s lib. 3 L. S.  
V. fig. 4 x.  
7. d. fig. 5  
B. C. D.

x 10. 11. ff.  
mesenterij  
imagine.  
2 fig. cap.  
s lib. 3 H.  
Z. 2. fig. R.  
2. d. fig. X.  
2. d. fig. O.  
O. 1. d. fig.  
9. 9.

cundum inferiorem uentriculi sedem in ipsa membrana exprorectis. Ab his enim innumeræ soboles deorsum in eam omenti membranâ excurrunt, non quidem recto prorsus tramite, sed obliquo quodammodo, & errabundo, ac ita ut retium funiculos implicari cernimus, in se nunc coeunte, ac nunc rursus abscedente. Ac proinde etiam omentum Græcis γαγγαμιον & σπυλιον, ut & uulgò rete & reticulum dicitur. Quanquam fortè non à uario uasorum ductu omentum ita fuerit appellatum: sed quòd ab ijs quibus committitur partibus<sup>a</sup> liberatum, & deinde distentum, rete piscatorium uni accommodatum orbi referat.<sup>b</sup> Arteriæ omenti ab illis pendent, quæ uentriculo, lienì, iecori, & bilis uesiculæ distribuuntur. has namq; omnes non secus ac uenas omentum tutò deducit, ac ab illis suarum peculiariũ uenarum cõiuges ad eò numerosas adipiscitur, ut quàm paucissimi uenarũ furculi, citra arteriæ cõsortium, ipsum perrepent. Item præter cõmemoratas modò arterias, inferior omenti membrana aliquoufque<sup>c</sup> grandiorè in intestina porrectam deferat arteriam. Sic<sup>d</sup> neruis quoq; illis omentum intertextitur, qui à sexti paris cerebri neruorum portationibus secundum costarũ radices exprorectis, iecori, lienì & uentriculo implantantur. Cæterũ<sup>e</sup> adeps, quo omentũ abundat, in obesis præpinguibz; hominibus plurimus, in macilentis modicus, in extremè siccatis & marasmo mortuis, etiam aliquis reperitur: isq; perpetuò uenis & arterijs omenti attentus, ad uasorũ quidem latera duntaxat quibus mediocris est: superius uerò, ac inferius quoq; quibus multus, accidit: ad eò ut illis etiam uasa alioquin gracilia pinguedine prorsus occultentur. In<sup>f</sup> intermedijs autem uasorum spacijs, nullus adeps asseruatur: ut nec in alijs membranis, quibus adeps innasci cõsuevit. unde etiam promptius colligitur, hunc ab exudante è uenis sanguine, & membranarum frigore incrassato, mutantisq; corporis colorem mutuante progigni. Præter adipem, qui ambabus omenti membranis communis est, inferior ipsius membrana posteriori uentriculi sedi substrata, priuatim<sup>g</sup> glandosum quoddam corpus impense magnũ nanciscitur: quod quia simplicis carnis speciem quodammodo exprimit, Græcis λεανίμειρος & πάγκρειας appellatur, in canibus magis quàm hominibus rubens. Hoc præcipuus uenæ portæ, arteriarum & neruorũ ramis attenditur, ut illorũ diuaticio inferiore membrana omenti duntaxat hic suffulta, reddatur securior, utq; uentriculo instar substerniculi ac puluinari etiam subijciatur. Huiusmodi planè<sup>h</sup> corpus substãtia<sup>i</sup> ue est, quæ duodeno intestino subtenditur, quæq; hætenus falso uentriculi humilioris officium (ne quid incoctũ efflueret) occludere credita est. Atq; is profectò præcipuus maximusq; omẽti usus mihi cõsetur, ut securè ramos portæ in lienem, uentriculum, & duodenum intestinum, ac coli non infimam partem exprorectos suffulciat, ac ipsi implexos deducat: ac dein ut arterias quoq; & neruos illis quas modò dicebam partibus inferendos sustentet ac tueatur: & demum usui potissimum respondeat, in utero quidem<sup>j</sup> exteriori fœtus inuolucro, in capitis autem cauitate<sup>k</sup> tenuis qua cerebrum inuoluitur membranæ. Deinde, quod haudquaquam minimum est, omentum dorso uentriculum colligat, & rursus iecur lienemq; uentriculo unà cum uasorum neruorumq; interuentu connectit: ut iam taceam, quantum homini firmando colo officium separatum subministret. ex accidente uerò uelut quoddam intestinorum inuolucrum tegumentumq; efficitur, ipsum calorem instar penicilli cuiusdam fouens ac continens. His sanè usibus omenti fabrica respondet, membraneum namque est, ut fortius uenas, arterias, neruosq; ipsi implexos colliget, meliusq; intestinorum calorem reflectat, ac promptè cum intestinis subsidere extēdiq; queat.

Omẽti arteria.

Nerui omenti.

Adeps.

Glandulosum  
omenti corpus.

Omenti usus.

Omenti fabricam suis  
usibus respondere.<sup>a</sup> Quem.  
admodũ 4  
fig.<sup>b</sup> In 2, 3,  
4 fig. uenis  
attēdular,<sup>c</sup> fig. cap.  
12 lib. 3 m.<sup>d</sup> ac ferē 120  
ta illius trũ  
ci series.<sup>e</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap.<sup>f</sup> 12 lib. 3 l.  
d uenis qua  
que orte  
rjs in 2, 3,  
4 fig. atten  
duntur. 12  
fig. cap. 2 li.<sup>g</sup> 4 fig. 4.  
4 fig. 4, 5,  
6, 7, 8,  
9, 10, 11,  
12, 13, 14,  
15, 16, 17,  
18, 19, 20,  
21, 22, 23,  
24, 25, 26,  
27, 28, 29,  
30, 31, 32,  
33, 34, 35,  
36, 37, 38,  
39, 40, 41,  
42, 43, 44,  
45, 46, 47,  
48, 49, 50,  
51, 52, 53,  
54, 55, 56,  
57, 58, 59,  
60, 61, 62,  
63, 64, 65,  
66, 67, 68,  
69, 70, 71,  
72, 73, 74,  
75, 76, 77,  
78, 79, 80,  
81, 82, 83,  
84, 85, 86,  
87, 88, 89,  
90, 91, 92,  
93, 94, 95,  
96, 97, 98,  
99, 100.<sup>h</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>i</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>j</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>k</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>l</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>m</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>n</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>o</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>p</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>q</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>r</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>s</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>t</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>u</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>v</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>w</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>x</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>y</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>z</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>aa</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>bb</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>cc</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>dd</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>ee</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>ff</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>gg</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>hh</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>ii</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>jj</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>kk</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>ll</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>mm</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.<sup>nn</sup> 4 fig. 4.  
fig. cap. 2 li.

queat. Tenue autem, & potissimum quâ intestinis innititur, ne pondere grauet. Vnde etiam Bruxellenſi nostro idiomate plumæ nomen meretur. Quòd uerò omentum sanguine & spiritu frequentibus illis uenis arterijsq; afferuato, intestinorum & uentriculi, qua parte ipsi attèditur, fouendo calori accommodum sit, etiamſi non dicatur, manifestû esse arbitror. Cæterum num ad eps infita ac peculiari natura calefaciendo proſit, an tantum penicilli carnis uel aut membranæ potius ritu iuuat, non æquè ab omnibus conceditur, alijs quidem frigidum adipem, alijs uerò calidum pronunciantibus.

## DE INTESTINIS. CAPVT V.

*INTESTINORVM imaginem potissimum sexta figura, & septima, & octaua, & nona exprimere conati sumus. quanquam huc etiam faciat tertia figura, simul cum decima & duodecima.*



*Huius et  
6 lib. figura  
ris sunt ob-  
soluta.  
b. 7 fig. 1. ab  
H. ad 3 fig.  
4.*

*et 8 fig.  
d. 7 fig.*

**I**NTESTINORVM cōstructionem, ipſorum officio & uſui cōuenire, tum demum opportunè narrabo, ſimulatq; eorum ſitum, formam, ſubſtantiam, cōnexum, quæq; iſtis implantātur uenas, arterias & neruos, ac ſi quid aliud ad eorum fabricæ enarrationem reliquum erit, explicue- ro. Intestinorum igitur, quæ Græcis *ἰντρίνα* dicuntur, nomine, non omnia in præſenti complectimur uifcera, uel quæ coſtas ſuccingente membrana & peritonæo amplectuntur organa; neq; etiam uel ſtomachum & uentriculū, ijs quæ nunc inteſtina uocabuntur, aſcribemus: quum<sup>b</sup> ductus ab inferiori orificio uentriculi ad podicem uſq; perti- nens, ac *ulnas Italicas ut plurimum quatuordecim & dimidiam longitudine æquans*, peculiariter nunc inteſtinorum uoce ueniat comprehendendus. Et quamuis ille, ipſa uel adeò inteſtina cōtinuum idemq; ſint corpus, quum tamē in uarios & multiplices & figura differētes anfractūs ſpirasq; circundcātur, neq; omni ex parte eandem ſitus, ſubſtantiæ & formæ naturā obtineant, ac deniq; alia alijs ſedi cōtigua efficiantur, neq; præcipuus omniū eorum uſus par eſſe uideatur, ac ſi plura inteſtina forent, diſſectionū peritis ipſa enumerantur, primum in<sup>c</sup> craſſiora &<sup>d</sup> graciliora hæc diuidentibus, atq; ex illis rurfus ſingulis ternarium numerū, ut lex ſint uniuerſa cōſtituentibus, ad eum quaſi modum, quo idem cōtinuumq; perpetuò iter plura uarijs occaſionibus nomina ſortiri conſtat. Quemadmodum Lutetiæ à diui Iacobi porta, ad eam uſq; quæ ſancti Martini dicitur, iter, etiamſi penè rectū ſit, neq; per uarios gyros procedat, nihilominus tamen ſexies (ſi rectè memini) nomen euariat: primum à diuo Iacobo, inde à paruo ponte, mox à tēplo beatiſſimæ Virginis, & non multo poſt ab eiufdem ponte, inde ab ænopolio quodā, & poſtremum ab æde ſancti Martini appellationē mutuans. Idem multo magis in fluminibus nō regijs, & continuis quæ per multos gyros procedūt uijs, fieri cernimus. Cæterum utcunq; inteſtina inuicē uariant, omnia tamen inter uentriculū, & qua excremēta egerimus ſedem collocātur, forma tereti donata, ſed non omni ex parte æquè capaci & orbiculata. Subſtantiam habent membranæ, uerūm undiq; nō pariter aut craſſam, aut tenuem: deinde duas peculiareſ tunicas orbicularibus, & alibi etiam rectis fibris intertextas ſortiuntur, tertiam ad has tunicam à peritonæo obtinentia. Venarum præterea, & arteriarū, & neruorum ſurculos ſuſci- piunt, ſed non ubiq; ſimiliter numeroſos: quemadmodum nunc perſequi eni- tar, ab ipſo inteſtinorū exortu ſumpto ſermonis initio. Ex<sup>e</sup> humiliori itaq; ori- ficio uentriculi, quod in ſua elatori, & dextro ipſius lateri proxima cōſiſtit ſe-  
de,<sup>f</sup> principium inteſtinorū exoritur, illi uel orificio, ubi id craſſiori ſua ſub-  
ſtantia

*Quæ hic inte-  
ſtinorum no-  
mine comple-  
ctantur.*

*Inteſtina conti-  
nuum quidem  
eſſe corpus, ſed  
pluralitati nu-  
mero, uarijsq;  
nominibus, de-  
uerſas ob cau-  
ſas danari.*

*breuiſ inteſti-  
norum hiſtoria  
enumeratio.*

*Inteſtinorum à  
uentriculo ex-  
ortus, & gra-  
cilis ductus ſeu  
ſitus.*

*e. 14. 15 fig.  
H. 16 ſi. h.  
f. 7 figur. 1  
ex H.  
† 16 fig. h.*



stantia introrsum protuberat, cōtinuatur, & simulatq; ē uentriculo prodiit, in posteriora retortū, sub sede uētriculi posteriore secundū dorsi dextrū latus rectā deorsum<sup>a</sup> proficiat, in nūllos omnino anfractus reuolutū. Quū primū uerō ad inferiorē usq; uētriculi sedem intestinū istud sic occultatū<sup>b</sup>, pertingit, sub colo intestino (quod paulo post, hāc<sup>c</sup> porrigi audies) latitās, mox sinistrorsum retorquet, ac uelut ex alto antrorsum assurgēs, in frequētes innumerosq; gyros & anfractus<sup>d</sup> reuoluitur, ac nullis omnino intestinis obiectū, sedē uniuerſam quæ sub uentriculo ad pubis usq; ossa, & ad ilia utrinq; habetur, implet; ea demū excepta, qua huic intestino colū instar orbis ad latera<sup>e</sup> circūduci, postea dicam. Horum sanē anfractusū seu reuolutionū nullus omnino neq; numerus, neq; idē penitus ordo habetur, neq; illē magis dextrā quā sinistrā uētris sedē occupant, præterquā quod in dextro latere supra ilium os ad pubē usq;, ampliore sedē, quā in sinistro infarciant, coli nimirū<sup>f</sup>, anfractu quo piā eum in sinistro latere locum sibi priuatim uendicāte. Vt cūq; uerō multiplices, uarijsq; huius gracilis intestini cōspiciantur anfractus, perpetuō tamē<sup>g</sup> ē directo mediæ sedis dextri ilij ipsius formā amplitudinēq; & pertraq; alia (uti post subiungam) euariat, eandem nihilominus crassitiem amplitudinemq; ab orificio uentriculi inferiori, ad illam usq; sedē obseruans, nisi aliquando huius intestini<sup>h</sup> pars sub uentriculi fundo ad dorsum proximē affirmata, inter disseandū capaciōr, ampliōr; reliquo intestini ductū (quemadmodum subinde fit) occurrat. Huiusmodi itaq; præsentis intestini ductus uisitur, quod ter nomē, ac si tria esset intestina, uariat. Primū quidem cōstituitur tota ea intestini pars, quæ uentriculo substrata, ab inferiori ipsius orificio rectā quodāmodo eousq; descendit, ubi intestinū in anfractus orbesq; primū cōuolui incipit. ac de huius intestini nomine aniles admodū cōtentiones apud illos reperies, qui reſectione neglecta, futiliter de uoce altercantur. Sunt qui totā hanc partē quæ duodenum digitorum longitudinē in uiro ut plurimū æquat, non intestinū, sed *uquosm* exortum, seu processum, uocandū cōtendant. Alij, etiam si ipsius principium ē uentriculo nascatur, intestinū tamen esse, ipsiusq; orificiū *uquosm*, reliquum uerō ipsius ductum, intestinū uocari affirmant, integros cōmentarios nugaci disceptatione implentens. Vocetur itaq; nobis uulgato nomine tanquā succinctiore, duodenū, aut t. intestinum longitudinē duodecim digitorum equans: siquidem id Græcis, *δωδεκαδάκτυλον* appellabatur. Secundū intestinum<sup>i</sup> illic incipit, ubi iam cōmemoratum in anfractus gyros<sup>j</sup> ue primū conuoluitur: & *ujsm*, seu ieunum uocant, quod inter disseandū reliquis intestinis inanius & magis uacūū reperiatur. Huius nomen alij explicare conantes, tanquam nihil unquam in se cōtineat, ac per ipsum à uentriculo confectus cremor nunquā transeat, aut momento tantū in eo hæreat, scribere uidentur. Tertiū intestinum uulgo nobis inter disseandū, uti & Græcis *ἡλεον*, à frequētibus fortassis quibus inuoluitur gyris anfractibusq; nuncupatur: & morbo nomen dedit, qui ex huius intestini inflammatione obſtructioneq; & interdū implexu quopiam obueniens, ægrosq; miris cruciatibus torquēs, *ἡλεον* Græcis, & uoluulus Latinis passim dicitur. etiamsi nonnulli tam *ἡλεον* quā *ἡλεον*, non intestini cuiusdam, sed dicti nunc morbi, nomen esse contendant, gracilis tenuis<sup>k</sup> ue intestini partem, quam nūc enarrare statuiamus, cōmuni uoce, tenue intestinū ad eum modum appellantes, quo colon intestinū subinde crassi plenius<sup>l</sup> ue intestini nomine priuatim donari nouimus. Vt cūq; uerō præſentē intestinorum portionē interuallum<sup>m</sup> ne, tenue intestinū, aut manifestioris sermonis gratia, ueluti peculiari quapiam uoce uoluulū, aut ileon nuncupare lubeat, id in crassi intestini principium

Gracilis intestini in tria diuisio.

Primum.

secundum.

Lib. 5. de pſis part.

Tertium.

g 7 fig. 46 i  
ad K. 14. 15  
fig. P.  
h 7 fig. K. L.  
i 6, 8 fig. P.  
uerſus Q.  
k 7 fig. 45 L.  
ad M. conſi.  
nuo dñſu.  
l 6, 8 fig. N.  
P. Q. R. 35.  
T.

m 45 R. 3  
ad T.

n 45 7, 8 fig.  
gure B.

o Eſſet iux  
ta L. et K. 7  
figura.

p 7 fig. 46  
1 ad K.

q 7 fig. K.

r 7, 8 fig. N  
committit  
tur B.

cipium definit. Vbi autem ipsius statuendum ueniat initium, non satis conij-  
 cere ualeo. Equidem me latet, quantam totius gracilis intestini portionem ie-  
 iuni nomine, grauitur de nominibus litigantes, comprehendi uelint: neque fa-  
 nē<sup>a</sup> à ieiuni intestini initio, ad ilei usq; finem, manifestū aliquod indicium obser-  
 uo, quo ieiuni finem ileiq; initium internoscere queam. Vbi enim duodenum  
 intestinum in ieiunū finire, ieiunūq; intestinū incipere dicimus, copiosiores  
 uenæ ac arteriæ, quàm propter ilei ad crassiora intestina terminū, occurrūt:  
 uerū media medio sese habent modo. Deinde ieiuni initium rubicundius  
 est, ilei finis magis albicans. Ad hæc, inter secandum ieiuni initium fortè magis  
 inane ilei termino offenditur: at in medio ductu, uti & antea dixi, omnia sunt  
 media. Quapropter quis ieiuni habendus sit finis, aut quod ilei principium,  
 non statuo: id intrepidè affirmans, nihil minus ieiunum ab ileo quàm inani-  
 tione, quæ à plerisque Anatomicis proponitur, dirimi posse. neque profectò  
 minus duodenum, quàm id quod ieiunum uocant, inane reperitur: idque ma-  
 iores (ut dicam postea) ob causas. Huiusmodi igitur gracilis intestini ter no-  
 men emutantis, ductus situsq; sunt. Forma autem undecunq; cōstat simili, ad  
 amussim uidelicet tereti, & omni ex parte æquè ampla, nisi interdū (ut prius  
 quoque innuebam) quà dorso proximè committitur, ieiunūque incipit, ad  
 uasis nimirum bilei ad intestina deferentis insertionem, amplius obseruetur.  
 Substantia quoque toti intestino gracili eadem est, mēbranea scilicet, mo-  
 diceque admodum carnea. Constat enim<sup>a</sup> tunicis duabus, quarum interna du-  
 rior magisq; membranea est, uerū interiore uentriculi tunica mollior: exter-  
 na tenuior, magisq; carnea: utraq; tamen tenuis est, & trāuersis orbicularibus  
 ue fibris tantū intertextitur: nisi fortassis externa, idq; potissimū ad ilei in cras-  
 siora intestina<sup>a</sup> terminum, rectas quoq; sed illas quàm rarissimas nanciscatur  
 fibras.<sup>a</sup> Tertia præter duas peculiare tunica, à peritonæi membranis uasa ad  
 intestina securè deferentibus originem ducit. Hæc namque unā cum uasis ad  
 cauam intestinorum sedem pertingentes dilatantur, tertioq; inuolucro inte-  
 stina induunt. Caua autem intestinorum pars in externo ipsorum orbe, exter-  
 na<sup>a</sup> ue superficie, Anatomicis nuncupatur, quam uasa primū attingunt, seu  
 quæ mesenterium respicit: gibba uerò, huic contraria. Ac duodeno quidem  
 intestino tertiam tunicam ea omenti<sup>a</sup> pars exporrigit, cuius beneficio inte-  
 stinum id dorso colligatur. Ieiunum uerò ac ileum tertiam tunicam à mēsen-  
 terio, quod ea dorso firmat, accipiunt. Sic duodenum quoque & ieiuni ini-  
 tium<sup>a</sup> uenam<sup>a</sup> arteriamque habent peculiare, secundum ipsorum longitu-  
 dinem rectā deorsum ductas, multosque sūrculos in progressu illis diffun-  
 dentes. Ac uena quidem à portæ uena priusquam mesenterio inseratur, prin-  
 cipium obtinet: arteria autem, ab ea quæ iecori offertur. Ieiunum ac ileum fre-  
 quentes uenas arteriasque suas nanciscuntur ab<sup>a</sup> illis quæ mesenterio à portæ  
 uena, & ab arteriæ radice supra renum arterias à magna originē ducente ex-  
 porrigūtur. pauci enim rami in graciliora intestina ab arteriæ<sup>a</sup> propagine dif-  
 funduntur, quæ à magna arteria post seminalium arteriarum principia origi-  
 nem sumit. Neq; etiam uasa, quemadmodū in duodeno, secundū ieiuni & ilei  
 longitudinem deducuntur, sed<sup>a</sup> uelut ex mesenterij cētro ex alto sursum ten-  
 dunt, rectaq; antrorsum in intestina pertingunt, in quæ numerosa sobole ar-  
 boris radicū modo implantantur, osculis suis in internam intestinorum se-  
 dem hiantia. Ileum & ieiunū<sup>a</sup> nerui quoq; obtinēt, deriuatos à ramis sexti  
 neruorum cerebri paris, qui costarū radicib. exporriguntur. duæ enim ab illis  
 propagines utrinq; singulæ, ad mesenteriū, & dehinc ad intestina, frequēti ut-

Gracilis inte-  
stini forma.

Substantia.

Caua intesti-  
norum pars,  
quæ Anatomici  
eū dicunt.

Gracilium in-  
testinorum ue-  
na & arteria.

Nerui.

cunq; sobole discinduntur. Duodenū uerò<sup>h</sup> neruos, si quos habet, ab illis ascen-  
 scit, qui inferius uētriculi orificiū, & dextrā fundi sedem adeunt. Dein duode-  
 num priuatim id sibi uēdicat, quòd<sup>h</sup> 'meatus bilē flauā ad intestina deferens, il-  
 li implātetur. Idē quoq; intestinū in hominibus, & adhuc magis in canib.<sup>h</sup> glan-  
 dosum illud corpus, cuius antea uentriculum describēs memini, peculiariter  
 substratum possidet, ad uasa illi intestino propria suffulcienda, & cavitatē eius  
 intestini lento humore irrigandā. Quanquam non duodenū solū, sed & re-  
 liqua intestina omnia lento quodam & lubrico humore interna sede imbuan-  
 tur, atq; ut Rhazes non ineptē dicebat, sicciliū uasorum more inuidentur, in-  
 stanneantur<sup>ue</sup>. At quū huiusmodi pleraque crassiss etiam intestinis sint com-  
 munia, illa quoq; nunc ueniunt recensenda. Ileum itaq; intestinum sub dextri-  
 renis regione à quodā crasso intestino multis modis ipso gracili intestino am-  
 pliore<sup>h</sup> excipitur, non quidem ac si quis diceret exactē in crassi eius intestini in-  
 nitium, sed in illius iuxta originem latus sinistrum. Hoc enim instar globi cu-  
 iusdam præmagni extuberat, in sinistro suo latere duo obtinens orificia.<sup>o</sup> u-  
 num quidem ileo intestino continuum, & magis ab origine distans<sup>h</sup> alterum  
 uerò humilius, & ipsi origini propinquius. cui continuum est in hominibus  
 intestinum, quod τυφλόν, seu cæcum ueteribus dissectionum professoribus uo-  
 catum esse nihil dubito. haud ignarus interim, quid hodie plerique de cæco  
 intestino commententur: decepti profectò, quod inter crassiora intestina id  
 à Galeno alicubi recensetur, neque aliter quàm si amplius quispiam sacculus, ac  
 ueluti alter quidam esset uentriculus, ab ipso cæterisque qui illum subsequen-  
 ti sunt Anatomicis describatur. quum tamen in homine<sup>h</sup> id quod cæcum ap-  
 pellandum duco, cæteris omnib. intestinis sit breuius, atq; arctissima omnium  
 intestinorum parte multo angustius strictiusq; & crassiori lumbrico in orbes  
 conuoluto potius quàm intestino simile: adeò ut cæcum uix intestinorum ap-  
 pendicis loco, ac proinde minus longè in crassorum intestinorū numero ha-  
 bendum esse uideatur. Atq; hinc fit, sacculos nostros cæcosq; Rabinos, quan-  
 do hanc gracilem portiunculam in homine cæci intestini loco me common-  
 strare uident, Galeni descriptione mihi obstrepere, ac<sup>h</sup> amplum illud coli inte-  
 stini initium saccū, aut ut ipsi loquuntur, Orbū & Monoculum neutiquam  
 esse, turpiter contendere. Imò nonnullos reperias, qui de cæco intestino se  
 paradoxa conscribere gloriantur, quòd non unum cum Græcis in cæco ori-  
 ficium, sed duo sibi proxima esse, in medium adferant. Quæ si uiderint, aut i-  
 maginati rectē fuerint, ea demum sunt<sup>h</sup> quæ in extuberantiore coli initio oc-  
 currunt: ac unū quidē foramē ilei intestini terminus est, alterū uerò eius quod  
 cæcum esse dico, initiū. Neque est profectò cur minus credamus, gracile illam  
 intestini portiunculā mesenterio non annexā, sed si bipsi in orbes cōuolutam,  
 & fibrarū beneficio hærentē, in homine cæcū esse intestinū: quantum uis eam  
 amplitudinem usumq; Galenus ipsi tribuat, quæ huic minimè adesse uisuntur:  
 quandoquidem is, suas potius caudatas simias hac appendice destitutas, quàm  
 homines descripserit, ueteres aut qui homines aggrediebātur appendicē hunc  
 intestini cæci nomine proculdubio donauerint. Deinde Galeni descriptio can-  
 ni fortassis accōmodari hīc posset, cui cæcum intestinū multo quàm homini  
 contigit amplius: neq; in illo, ut in homine, inane propemodū reperitur. Quin  
 etiam ueras glīres & sciuros cæcū hoc intestinū adeò amplū nactus scimus, ut  
 amplitudini ipsorum uentriculi faciliē respondeat, scēibusq; turgidū in sectio-  
 ne obseruetur: atq; hinc cōstat, gracilem hunc appendicem in homine cæcum  
 esse, quum uidelicet ductu ac situ & forma pariter (licet non amplitudine)  
 illorum

h. claus. v.

l. 13 figur. c.

m. 12 fig. d.

Intestinorum  
glandos.Crassum in-  
testinum bi-  
sfora.

u. 7, s. 3. M.

in N.

o. 7, s. 3. M.

p. 7, s. 3. O.

Cæcum intes-  
tini cuius-  
modi.

q. 6, 7, s. 3. f.

g. u. O. 10

fig. f.

r. 6, 7, s. 3. f.

g. u. N.

r. Sunt O. et

M. ad N. f.

7. C. 8.



illorum animalium cæco intestino congruat, unumq; (unde etiam cæcum primò dictum est) nanciscatur orificium. Insuper summus profectò Naturæ admirator Galenus, si hominis intestina unquam intuitus fuisset, hunc appen dicem, & extuberans illud coli initiū, ileiq; cum ipso unitatem, & coli formam, longè secus descripsisset. quippe si aliud homo cæcū nancisceretur, eum appē dicem minimè præterisset Galenus, quanquā ortu nōnihil in homine à cane uariet. nam etiam si utriq; in dextro ileo collocetur, hominis tamen cæcū ex sinistra magis coli initij sede, quàm dextra principiū ducit: secus ac in canibus, & quàm Galenus attestatur. Porro si cum nōnullis, qui secātī mihi altiterūt, in homine quidē ad eum usum, quem Galenus cæco intestino tribuit, appendicē hunc à Natura primū formari dicerē, & ob nimiam hominū ingluuiem ex ileo intestino à uetriculo confectum succū, abq; eo ut is totus cæcū subintret, protrudi: atq; hinc appendicē in nobis, tanquā inuulē & marcidū, aliter fortē quàm in tēperatis Galeni hominibus, pendere affirmarē, ad nugacē illā tergi uersionē deueniendū foret, qua alios quandoq; quàm modò homines fuisse fateremur, præcipuē quū amplū hoc coli intestini initiū in homine cæci intesti ni usum abundē suppleat, & notæ duntaxat gratia cæcū in homine haberi ui deatur. In dextro itaq; ileo ad humiliorē renis dextri sedē, extuberans<sup>a</sup> illud, & amplum rotundumq; coli principiū habetur, quod hinc sensim rectā ad iecur furlum<sup>\*</sup> cōtendit, iecorisq; cauē parti nōnihil substernitur, ac<sup>c</sup> bilis uesticulum in homine contingit: cuius etiam contactu, intestinum hic quandoq; flauo co lore tingitur.<sup>2</sup> inde ex dextro latere secundū inferiorē uentriculi sedem in sinistrū fertur, uentriculi fundo attensum: haud tamen, ut alijs uisum est, eum conscendens: aut, ut uulgò dicitur, uentriculi fundo superequitans. Quum pri mū uerò ad sinistrum uetriculi latus pertingit, super demissio rem<sup>a</sup> antero rem<sup>a</sup> uē<sup>a</sup> lienis partem anfractus quosdā leuiter inflexos obtinet, ac paulatim supra<sup>b</sup> sinistrum renem per ilium sinistrū decliue fertur, secundū peritonēi latus ad pubis usq; ovis regionē<sup>c</sup> descendēs.<sup>4</sup> Hinc rursus sinistrorsum, quasi ad umbilici usq; sedem ascendit, ac anfractum (quem à medicis clysterum co licorumq; cruciatuum occasione perpendi optarim)<sup>h</sup> hic constituens, ad ovis sacri initium denuò fertur,<sup>e</sup> rectā deorsum ad podicem usq; descendens: ac in uiris quidem sub uestica, in<sup>e</sup> mulieribus uerò sub utero ovis sacro & coccygis ovis intratum. Huic intestino, ab ilei intestini fine ad podicem usq; pertinenti: & si par undiq; propemodum, præterquàm in initio, ubi multo capacius ap paret, sit amplitudo, ipsum tamen figura ductūque uariat: ideoq; tanquam in duo intestina subdiuiditur, ut<sup>h</sup> quicquid à dextro ilio super dextrum renem sub iecoris cauo, deinde secundū uentriculi fundum ad lienem properat, & hinc rursus super sinistrum renem uersus pubem fertur: ac alium anfractum supra internam ovis ilium sedem faciens, ad sacri usque ovis initium prore pit, Latinis pariter ac Græcis colon appelletur.<sup>4</sup> quod uerò ab ovis sacri initio ad anum usq; pertinet, Græcis ἀπὸ τοῦ σφιγγοῦ & ἀπὸ τοῦ ῥαχίου dicatur, Latinis longæon, rectum, & princeps. Colon enim in hominibus, non ad amūsim, ut in cani bus, teres est: uerū per uniuersum ipsius ductum superius inferiusque<sup>k</sup> de pressum, æqualeque ac leue uisitur, ad latera utrinq; quadam serie, uelut in medios globos cellulasque extuberans. Atque hæc figura eo minus conspi cua fit, quo colon recto intestino uicinius accedit: quod exactè teres, non autem coli modo depresso extuberansque cernitur. Ambo itidem, ut & cæcum quoque, tunica extruuntur<sup>m</sup> duplici: quarum, ut in gracilibus inte stinis, interna exteriori neruofior, membrana<sup>a</sup> ue magis, & durior est. uerū

Græci intesti ni ductus, su uisq;

Græcum inte stinum in coli<sup>a</sup> & rectum di uidit

Coli à recto dis serentia.

Crassorum in testinorum tu nica.

gg 4 colon

t 20 fig. T.  
u 6, 7, 8 fig.  
gu. N.  
x 6, 8 fig.  
ab N ad P.  
y 20 fig. H.  
z 6, 8 fig.  
a P ad Q.  
in sexta se  
cundū E.

a 6 fig. G.  
b 20 fig. V.  
c 6, 8 fig. A.  
Q ad R.  
d 8 fig. ab  
R ad S. &  
inde ad T.  
e 8 fig. ab  
Y ad A.  
f 22 fig. a  
sub v.  
g 24 K sub  
L.  
h 8 fig. ab  
N per P.  
Q, R, S ad  
T.

i 8 fig. ab  
Y ad A.

k 6, 8 fig.  
V, V.

l 6, 8 fig.  
X, X.

m Hæc pe  
tes ex 9 fig.

colon interim utramq; tenuiorē gracilioremq; quā rectū obtinet: & quanto colon recto magis conterminū est, tāto quoq; ipsius tunicae crassiores, meliusq; enutritae cōspiciuntur. Interna utriusq; intestini tunica transuersis duntaxat circularibusq; fibris, iisdemq; frequentissimis abundat: externa uerō in colo intestino transuersas quidē nanciscitur, sed & rectas quoq; quamplurimas obtinet, non quidem secundū uniuersam intestini superficiē protensas, sed inferiūs dūtaxat & superiūs, ubi colon<sup>n</sup> depressum esse diximus. Secundū enim eas coli impressiones recte fibrae protenduntur, & coli tunicae ibidē sunt robustissimae, admodumq; spissae: & ut Galenus de pluribus animalibus innuebat, colon fortibus ligamentis utrinq; singulis inibi constringitur, secundū longitudinem desuper ad inferna porrectis: quod mehercule & homini ascripisset, nisi illius intestina canum intestinis eiusmodi ligamentorum specie carentibus, respondere putasset. Porro exterior intestini recti tunica per totum intestini ambitum rectis fibris admodum frequentibus passim abundat, adeo ut hae plures rectas quā orbiculares fortiaur. Cæterū<sup>m</sup> tertia crassorum intestinorum tunica, quemadmodum & tertia gracilium tunica, à mesenterio ipsis uasa porrigente pendet. quamquam coli intestini pars, uentriculi fundo atensa, priuatim in hominibus ab<sup>i</sup> inferiore membrana omenti tertiam asciscat tunicā, quod hae coli sedes eius membranæ beneficio ita dorso affirmetur, atq; reliqua intestina mesenterij interuentu dorso colligari nouimus. Coli itidem & recti intestinorū uenae & arterie, quas pauciores hęc quā intestina gracilia adipiscuntur, à portæ & magnæ arteriæ ramis pendunt. Colo quidem intestino toto progressū, qui à dextro ilio ad sinistrum ferre renem pertinet, arteriæ uenaeq; non secus quā ieiuno & ilio, implantantur, ex alto scilicet fursum seriatim conscendentes. at parti ipsius inferiori à sinistro rene ad rectum usque intestinum ductæ, & ipsi pariter recto, uenae arteriæque, perinde ac<sup>2</sup> duodeno<sup>1</sup> porriguntur. Vna enim insignis uena à portæ ramis in mesenterium excurrentibus enata, & arteria etiam ab<sup>i</sup> illa principium ducens, quæ ab arteria magna ad mesenterium sub uasorum seminalium exortu depromitur, secundū dictam coli partem & rectum intestinum mesenterio suffultæ, recta protenduntur, ac in progressu furculos seriatim unoque ordine intestinis offerunt. Verū de intestinorum uenis ac arterijs in mesenterij descriptione rursus pertractabitur. Neros autem crassiora hae intestina cum gracilibus communes habent, & utraq; lento uiscidoque humore intus oblinuntur. Exteriori autem coli intestini superficiei, quā id recto proximum est, & ipsi quoque recto, pingues quidam appendices magno numero passim subinde ac peculiariter adnascuntur. Dein rectum intestinum musculi<sup>n</sup> musculos uoluntariæ faciūm excretioni praefectos sibi priuatim uendicat: quos quum in secundo libro sim persequutus, non est necesse hic quoque recensere. Sed admirabilis potius Naturæ industria nunc consideranda uenit, quæ intestina primū potissimumq; extruxit, ut horum beneficio quicquid in cibo uentriculi opera elaborato esset succulenti, ad iecur sanguinis officinam duceretur: dein ut faeces, & quæ suctui inepta essent, debite excernerentur. præterquam quod intestina coquendialterandiq; ui modica etiam prodesse credimus, ut à uentriculo scilicet prius confecta, absolutius paulū in ipso per intestina ductu emutarentur. Atque ad hos sanē scopos Natura respiciēs, intestina artificiosissimē fabrefecit. quod enim præcipue neq; gratia educationis excrementorum, neque concoctionis, sed ut id quod in cremorē uersum est, per uenas assumptū in iecur totum deferatur, intestina ad eum quem diximus modum,

Lib. 4. de usu  
partium.

Coli & recti  
uena ac arteria.

Nervi.

Adq; intestini  
obtinuit.

Recti intestini  
musculi.

Intestinorum  
musculi.

n. 6. v. figu.  
v. v.

o. 9. fig. h. h.  
educit sp.  
peri & h.

p. 4. figura  
c. c. c. & s.  
figu. A. A.

q. 12. fig. b.  
r. secundum  
H. fig. 10. et  
12. fig. n.  
s. p. c. d. s. l. 3.  
c. ad d. d.  
c. c.  
t. fig. cap. 12.  
lib. 3. a.

u. 8. fig. a. b.  
c. d. et f. c. c.  
s. l. 1. s. l. 2.  
c. d.

modum, fabricata sint, collectu est promptissimum. Primò quidem, quòd in nullo animali constructus sit uenterculus illis organis còtiguus, quibus egerendo idem expurgatur. quamuis non impossibile esset, uenterculù ad anum usq; extendi. Deinde, quòd plurimis animalibus intestina in multos frequentesq; gyros & anfractus inuoluuntur. Postremò, quòd constet uenterculum cibum non antea demittere, quàm probè illum confecerit. Venterculum igitur sedi non esse contiguum, aut illi recto saltem meatu ductu' ue iunctum, liquidò commonstrat, aliud concoctionis esculentorum, aliud uerò redditionis digestionisq; organum fieri oportuisse. Quippe si idem omnino existeret, metuendum esset, ne frequenter uenæ crudum inconcoctumq; assumeret cibum: qui postmodum à iecore malè còfectus, homini inutilis noxiusq; foret. Sed & redditionis instrumentum, quod non rectà à uentriculo ad anum extenditur, at quam plurimis orbibus & anfractibus spirisq; (ne oculus hominis nutrimentum non exuctum elabatur) inuolutù uisitur, nunc dicta confirmat. Si enim alius uenter uentriculo succederet, essetq; ille redditionis, sicut hic còcoctionis, promptuarium, nequaquam exiguo tempore, plurimum alimenti per uenas frequentes in iecur susciperetur. Nunc autem per innumeras uenarum soboles, ex uarijs illis copiosisq; intestinorù anfractibus, quicquid succulenti à uentriculo confectum est, in iecur promptè transsumitur. Aliàs uerò si raris uenarum orificijs parum cibi in cremorem uersi, continuò incideret, tarda & diuturna succederet digestio: quum necessarium sit, ora uasorum elaboratum succum tangere. Si uerò alter magnus ueter priori subtenderetur, cibus omnino modicam eius uentris sedem tangeret, solam nimirum eam cui proximus attinguusq; suis parietib. esset. atq; ita præcipua cibi portio, quantacumq; scilicet esset in profundo, seu medio eius uentris spacio, uenarum apprehensiones suctusq; effugeret. Sed nunc demum trāsitus angustia cibum in exiguas còminuens particulas, cogit, ut is propemodum totus tangat intestinorù tunicam, ad quam uenæ suis osculis conuiuent. Etsi enim quid in transitu primi anfractus, uasorum ora effugerit, per secundum quidem tangit: & si huc præterlabatur, tum omnino per tertium, aut quartum, uel alium eorum anfractuum qui frequentes numerosiq; subsequuntur, ut tandem nullus effugiat, aut lateat, aut excidat cibus ad nutritionem utilis, quando lege Naturæ & morbo liberum corpus dī pensatur. Intestinorum itaq; anfractus, ut quicquid succulenti humidique in confecto à uentriculo cremore esset, uniuersum distribuatur, comparati sunt. Et id præcipuè tenuium intestinorum munus est. Crassa enim, & si ipsa quoq; ad succorum distributionem conducant, priuatim tamen in hoc conferunt, ne continuò, sed per longa interualla egeramus. Hæc enim tanquā uenter aliquis siccis excrementis, uti uesica urinæ, subiiciuntur, excrementa que ita in illis colliguntur, ut repentiè uniuerfa simul educi queant: sic tamen, ut & hinc aliquis homini usus accedat. quippe si gracilium intestinorum suctum aliquid præterfugerit, quum longiori mora excrementa in crasis intestinis resideant, ipsorum uasa id exugunt. Quod autem commemoratis iam usibus, quæ de intestinorum constructione suprà scripsi, omnia competant, obiter quoque nunc subnectam. Hæc itaque ad uenterculum statim, à quo cibum accipiant, opportunè locantur: \* Duodenū dein, etiamsi id fuisset utile, in nullo tamen anfractus ducitur, quòd sub uentriculo, quā fertur, nullam omnino uacuam sedem obtineat, in qua aptè in gyros flecti queat: præterquam quòd portæ etiā uenæ à iecoris cauo prodeunti cedere oportuerit. \* Ieiunū uerò & ilium mediā uentris sedē iustissimè occupāt, quòd in ibi mesenterij cætro sint proxima,

*Intestinorum  
constructioni  
ratio.  
Situs ratio.*

x7 fig. ab 1  
ad K.  
712 fig. h.  
x7 fig. à K  
per uarios  
anfractus,  
vide ad M.  
ad 10, 11 fig.  
L. L.



proxima, breuissimòq; ductu & uenæ portæ rami, & arteriæ magnæ propa-  
 nes illis hîc diffundi possint. Porro de colî situ nimis quàm miserè se torquêt  
 dissectionum professores, quòd id quum excrementorum uelut quoddam sit  
 promptuarium, ad uentriculi tamen fundû iecorisq; cauû porrigi còspiciunt.  
 Vnde etiam alius quidem colon, quia fæces continet, innatòq; calore destitui-  
 tur, ad uentriculum ferri uult, ut illius uicinarumq; partium còtactû, id maio-  
 rem concoquendi uim assumat. Alius autè sub iecoris cauo colon deduci con-  
 tendit, ut ex bilis uesicula in illud refudans bilis, incitando, excrementorum e-  
 gerendi uim feliciter reddat. Alius uerò aliud còminiscitur: & interea ne-  
 mo animaduertit, colon mesenterij centro non admodum debere uicinum  
 esse, neque id uenæ portæ ramos cauo iecoris proximos oportuisse assumere,  
 quum parum quod exugi deceat amplexetur. Vt itaq; grandior dexter ue-  
 næ portæ truncus breuiori ductu gracilibus intestinis infereret, ac succinctio-  
 ri uia cibum in uentriculo confectû ad iecur transferret, colon intestinum gra-  
 cilibus cedit, ac ueluti per distantia maximè à mesenterij cêtro loca procedit  
 atq; hac etiam occasione, id præcipua sua portione sinistrâ corporis sedem oc-  
 cupat. Rectum autem intestinum illic còmodissimè reponitur, quâ opportu-  
 nè paulatim asseruata egerere tandem queat. Forma autem tereti in hoc inte-  
 stina creantur, ut sint capaciora, minusq; iniurijs occurrantib. exposita. At an-  
 gusta sunt gracilia intestina, ut minima quæq; cibi portio ab ipsorum tunicis,  
 adeoq; ipsorum uasis tangatur. Crassorum intestinum magna est amplitu-  
 do, ut multa colligere possint, ac ne frequentius egeramus opitulentur. Sub-  
 stantia constant, facîle quæ continet amplectente, & rursus à contentis disten-  
 di apta. Duplicem uerò habent tunicam, ut iniurijs innoxie ferendis magis  
 sint idonea. nam interior aliquândo in intestinum difficultatibus, alijsq; diu-  
 ternis affectibus putrescit, exteriore salua: unde & ægri nonnulli exadunt. Por-  
 rò interior graciliû intestinorû tunica interiori uentriculi tunica mollior est,  
 quòd nulla aspera intrita ue illa, sicut hic, recipiât. Exterior uerò intestinum  
 tunica exteriore uentriculi minus fortè carnosa est, quoniam digestionis po-  
 tius quàm concoctionis organa sunt. Cæterum exterior crassorum intestino-  
 rum tunica, tanto gracilium interiore tunica durior est, quanto illa materiam  
 continet durior, & à succo magis liberam. Quandoquidem quæ graci-  
 libus continentur intestinis, liquida, fluida, aqueaq; adhuc sunt: quæ autem  
 crassiss, dura. Vtraque intestinum tunica transuersas sortitur fibras, ut o-  
 cyus quod in illa defluit propellant, itaq; citò uniuersus succus ad iecur exu-  
 gatur. At externa recti intestini & coli tunica, præcipuè quoque rectas fibras  
 obtinuit, ut hæ uelut uinculum circularium fibrarum efficerentur, ne fortè  
 quum illæ dura excrementa crebrius protrudunt, inuicem abscedant, diuel-  
 lantur: quæ atque hac potissimum occasione recto intestino, ut quod siccio-  
 ra excrementa amplectitur, eius generis tribuuntur quamplurimæ. Quan-  
 quam fortassis non ob id solum ut transuersas colligent, rectæ fibræ huic of-  
 ferantur, sed etiam ut recrementa alioquin non admodum sequacia, illæ at-  
 trahant. Tertia intestinum tunica secundæ uelut propugnaculum est, &  
 copula, cuius beneficio intestina mesenterij interuentu dorso colliguntur.  
 Cæterum uenæ arteriæq; (nā & hæ mihi ex intestinis aliquid elicere credun-  
 tur) nō omnibus pari numero ac frequentia distributæ sunt, quod non in om-  
 nibus intestinis eadem exugenda succorum sit copia. Quo enim intestina uen-  
 triculi in còtinuitate uiciniora sunt, eo plus optimi cremoris còtinent: ac pro-  
 inde frequentiora uasa gracilib. intestinis deferuntur, pauciora crassiss. & pari hac  
 ratione

*Intestinum  
forma ratio.*

*Substantia.*

*Tunicarum.*

*Fibrarum  
ratio.*

*Venarum ar-  
teriarum ratio.*

*fig. cap. 5  
lib. 3 G.*

*d 9 fig. h et  
i, quibus ob-  
ducitur po-  
stet L a  
h, k.  
e 17 fig. m.*

*fspectatur  
id fig. 10.*

ratione pauciores uenę uentriculo, quàm tenuibus intestinis inferuntur: quoniam qui in ipso continetur cibus, non semper plenè confectus mutatusq; est. Quemadmodum uerò uenas, uentriculum, ut sanguinem illi ad nutritionem offerant, etiam implicare nihil dubito: ita quoq; easdem uenas, quę cremori ex intestinis assumendo, & eodem in iecur trajiciendo, famulantur, ad præcipuam illorum pariter enutritionem subseruire, sanguinemq; ipsis cōmodum adferre existimo, cremorem intestinis alioquin cōtentum, ad ipsa alenda nihil accommodare (quicquid alij sentiant) arbitratus. Cæterum intestina neruis donantur, ut infestantes humores dignoscant: quandoquidem si sensus penitus essent expertia, nihil obstaret, quin ex flaua bile, aut alio mordaci succo intestinum penitus subinde corroderetur, priusquam homo sentiret. iam uerò bilis<sup>s</sup> meatus in duodenum insertus, intestina bilis influxu stimulans, eorum actionem uehementer adiuuat, ac pituitam ipsis infedentem expellit. Atque hæc præcipua, præter succi tenuitatē, causa est, cur ieiunum intestinum suum quem continet cremorem ocyus quàm reliqua transmittat. nam dum bilis adhuc cremor in non mixta, intestini lateribus adfluit, sua acrimonia id magis stimulans, ad ea quę continentur uelocius propellenda inuitat. Reliquę enim inanitatis ieiuni causę, ut succorum optimorum copia, frequentes uenę, proximus iecori situs, & ante hæc omnia deorsum rectā tendens intestini ductus, & liquidissimus adhuc succus, duodenum magis ieiunum debere esse, documento sunt. Quamquam bilis in ipsum influens, & illud quoq; ad subitam excretionem irritat, impellitq;. Sed de bilis natura, ipsiusq; meatibus, suo postea loco accuratius pertractabitur.

Neruorum ratio.

Peristule bilis meatus insertionis ratio. Quamobrem ieiunum intestinum cremorem ocyus transmittat.

## DE MESENTERIO. CAPVT VI.

MESENTERIVM inter ceteras figuras ostendit undecima, mox decima & duodecima, & non persuntorie uigesima quarta.



ORPVS μεσεντεριον & μεσεντερια Græcis nuncupatum, Gaza in Aristotelis historia de Animalibus lactes appellauit: Cicero autem in tertio de Natura deorum libro, intestinum aliquod ijs Græcorum uocibus dici non admodum rectè arbitratus, illas uertit interpretatur ue medium intestinum. Quia uerò hic describendum corpus, in intestinorum numero neutiquam uenit comprehendendum, & quia lactes non idem omnibus significant, & medianum uox parum adhuc recepta uidetur, non inopportunè à Græcis nomen mutuabimur. Mesenterium itaque (quod etiam pinguis membrana, quum etiam reliquis omnibus membranis uniuersi corporis partibus obefior pinguior ue existat, priuatim nuncupatur) ad posteriorem intestinorum sedem locatum est, uinculum, cuius beneficio intestina inuicem & ad dorsum colligarentur, futurum. Vt uerò id adeo insignem usum commodè præstet, dura membranaq; constat substantia. Ex<sup>b</sup> duabus enim mutuò attensis accumbentibusq; membranarum, à peritonæo originem ducentibus, præcipuè extruitur, ipsiusq; formam intestina ab illo colligata, propemodum effingunt, & uariant. Vt namque intestinorum omnium non par anfractuū ductus est, ita quoque non eadem undecunq; mesenterij effigies. Quam Galeus fortè animaduertens, etiam si mesenterium omnino continuum sit, nihilominus tria mesenteria quodammodo in libro de Venarum arteriarumq; sectione recensuit.

Mesenterij nomina.

Ipsi sunt.

Substantia.

Forma ac ordinis.

g 13 fig. cad d.

a Vti uidere est in 10 fig. & 12.

b 24 fig. E. F. una, altera G. sic & 11 fig. X. Y.

recensuit<sup>c</sup> unum medium,<sup>d</sup> aliud dextrum,<sup>e</sup> tertium sinistrum esse insinuans. Ac ipsum quidem medium appellare arbitror mesenterij partem, ieiunum iliumq; intestina dorso colligantē: quæ angusto orta principio, in miram amplitudinem latitudinemq; ducitur, ut omnibus ieiuni ilijq; intestini connasceretur anfractibus. Dextrum uerò & sinistrum appellare potuit, quod colon intestinum, & rectum dorso alligat, dextrum quidem in dextri ilij regione, sinistrum uerò in sinistro ilio collocans. Mesenterij itaq; pars gracilibus intestinis peculiaris, similem omnino cum<sup>f</sup> inferiore, & colon quâ secundum uentriculi fundum exporrigitur continente omenti membrana sortitur exortum. Ex<sup>g</sup> magnæ enim arteriæ & uenæ cauæ tunicis, quas ea uasa secundum uniuersum per lumborum uertebras ductum à peritonæo obtinent, membranæ fibræ admodum frequentes exurgunt, statim in duas degenerantes membranas, quibus mutuò adnexis, mesenterij pars gracilia intestina dorso colligans efformatur: partes autem colon & rectum dorso connectentes, ab illis peritonæi regionibus principium ducunt, secundum quas hæc intestina exporriguntur, peritonæo fibras quasdam, quæ in mesenterij substantia non in hoc solum, quo ualidius intestina dorso adnecteret, membranæ estat alterius etiam magni cuiusdam usus gratia, quo<sup>h</sup> uenas omnes ex iecoris porta, &<sup>i</sup> propagines à magna arteria ad intestina excurrentes tuto continet: ac ne illæ, dum homo salit, aut cadit, disrumpantur, tuto secureq; admodum suffulcit. Grandior enim uenæ portæ truncus, quæ mesenterium iuxta renum regionem à dorso pronascitur, inter duas mesenterij membranas ducitur, arteriam habens comitem, quæ à magna arteria, priusquam hæc ad renes ramos dispergat, in hoc ut in intestina diffundatur, originem ducit. Huc quoq; pertingunt<sup>k</sup> duo nervi, utrinq; nimirum singuli, ab illis pronati ramis, qui à sexto neruorū cerebri pari costarum radicibus exporriguntur. Ad eò ut ingens is uenæ portæ truncus, & dicta nuper arteria cum duobus illis nervis simul mesenterij centrum subeant, atq; inter duas ipsius mutuò cohærentes membranas ingrediatur, tutoq; postmodum per uniuersam mesenterij sedem numerosa sobole ad intestina procurret. Præter cōmemoratam nuper arteriam, alia quædam magnæ arteriæ<sup>m</sup> propago, sub seminalium arteriarum initij exorta, eam mesenterij partem ingreditur, quæ sub renum regione à dorso principium obtinet. Venas autem nullas, præter dictum nuper uenæ portæ truncum, mesenterij admittere. Neq; satis assequor, quid Galenus sibi uelit, quādo intestinis, ipsiq; ad eò mesenterio uenas offerri testatur, in iecur non terminatas, aut (ut alij uertunt) ad iecur non trañcientes. nisi fortè aliquas cauæ uenæ propagines in intestina disseminari indicauerit: quanquam & illæ in iecur tandem uel ipsius sententia terminarentur, etiam si forsan cremorem ex intestinis iecori non offerrent: at potius intestinis mesenterioq; enutriendis, priuatim conducerent. Verum hæc nus nullam uel tenuissimā sobolem à caua uena in intestina mesenterium uel pertinere, quantum uis diligenti refectione deprehendi. Et quum Galenus in sexto de Administrandis sectionibus, quemadmodum & quarto de Partium usu, peritonæi processus, ac omenti mesenterijq; ex illis initia & ductum, perquam diffuse commemorat, & cum illis processibus uenas distribui deferriq; docet à magna uena secundum uentriculi longitudinē descendente, arbitror Galenum<sup>n</sup> portæ uenam subaudire: non uerò<sup>o</sup> cauam, adeoq; magnam, quæ dorso insidens, cum magna arteria ipsi comite sub uentriculo declius fertur, inceditq; ubi peritonæū præcipuè oritur, & omēto mesenterioq; potissimum originem

Substantia mesenterij ratio ac usus.

Vena, arteria & nervi.

Lib. 4. de respiratione.

c 11 fig. N. N. O. O. d 11 fig. P. uerf. Q. 12 fig. m. e 11 fig. R. S. T.

f 4 fig. 4. g, e, & s fig. A. A. g 25 P. Q.

h fig. cap. 5 lib. 1. G. 6, 6, 6, & 12 fig. h. i fig. cap. 12 lib. 1. 1, 1.

k 2 fig. ca. 2 lib. 4. A. A.

l 10, 11 fig. L. L. 12 fig. l.

m 25 fig. 1 sub f.

n tota fig. cap. 5 lib. 1. & hic 4 fig. l. o 10 fig. Q. & 24 27 fig. & 30th h.



originem præbet. Et si fortè quis (uti ego nonnunquam feci, atque à me inter discendum in scholis aliquando cauè propagines in uentriculum & mesenterium excurrentes, ab astantibus frustra sunt expetite) alitruet, Galenum ibidem de magna aliàs, cauà ue, non uerò portæ uena, sermonem instituisse: ego lubens cōcessero, eiusmodi propagines quantumuis modicas & graciles, me adhuclatère. Dein Herophili sententiā à Galeno in quarto de Vsu partium adductam, de uniuerfa portæ uena eum in modum intelligendam arbitror, quo nos de eius usu egimus, quū proponeretur, non totam portæ distributionem in hoc tantum fieri, ut à uentriculo cōfectus succus in iecur traiceretur, ac ex uulgi etiam opinione melancholicus succus lienī offerretur: uerum etiam ut plerisque insuper partibus alimentū suppeditaretur, quemadmodum uel illi portæ uenæ ostendunt<sup>p</sup> ramuli, qui uariè per omenti membranas intestinis instratæ excurrunt, &<sup>q</sup> qui in omenti & mesenterij glandulas terminantur, neq; ultrà incedunt, soli; ita nutritioni famulatur. Portæ uerò propagines in intestina insertæ, simul ad cremoris in iecur traiectum, & sanguinis enutriendis intestinis idonei deductum, subseruire mihi uidentur, mutuā materierum transumptionem necessariò multisq; argumentis (uti aliàs docebitur latius) concedenti. adeò, ut præter cōmemoratas uenas, nullæ aliæ in intestina & mesenterium pertinentes, hæcenus mihi fuerint obuiæ. Ceterum, ut in canibus (ne hic fortè præter sententiam in nugaces scholarum disceptationes incidam) uasorum per mesenteriiu incessum adinuenire promptum est: ita cōtrā, ambe mesenterij membranæ in iisdem difficulter expenduntur. quod illis macilentius quàm homini obtigerit mesenteriiu: quodq; ideo ipsorum mesenterij membranæ inuicem omni ex parte (nisi quā uasa admittūt) perinde ac si simplici unaq; membrana id constaret, connatæ uisuntur. At in homine binæ mesenterij membranæ inuentu sunt perquàm faciles, quū multa intercedent pinguedine, inuicē distant. Vt enim homo copiosa undecunq; abundat pinguedine, sic mesenterium quoque præpingue adipiscitur, sanguine hic ex uasis resudante, membranarumq; ui in adipē mutato. Præter adipem aliud quoque mesenterio accedit. non enim sagaci Naturæ fat esse uisum est frequentem illam uasorum sobolem mesenterij membranīs contineri, quin glandosum corpus, singulis uasorum scissionibus, ita undequaq; subtruxit simul & circumposuit, ut nulla ipsarum in ualida fieri, aut per motum quassari posset: non ignorans, quid uis suscipiendis noxis opportunissimum esse, ubi in ramos diducitur. Ac proinde ad mesenterij quidem<sup>r</sup> centrum, ubi prima uasorum fit distributio, grande corpus glandosum extruitur, insigniores ac primas uasorum dissectiones securè admodum suffulciens. Per reliquam uerò mesenterij sedem, singulis propè uasorum diductibus Natura<sup>s</sup> glandulam quoque aliquam interiecit, diuisionis robur simul ac firmamentum futuram. Adeò ut simul quoque glandulis illis accedentibus, mesenterij membranæ uasa uersus intestina tutissimè deferant, intestinaque omnia dorso quàm aptissimè colligent, ac demum<sup>t</sup> tertiam intestinorum tunicam efforment. Quum enim mesenterij membranæ, uasa ad appellatam nobis cauam intestinorum partem deducunt, ipsis intestinis simul cum uasis adnascuntur: atque hic inuicem abscedentes, singulæ per suum intestinorum latus contendunt, in tertiamque intestini tunicam degenerant hac occasione fortius intestina ligantes, & ualidius uasorum propugnaculum constitutæ.

mesenterij  
adepti.

Glandes.

p. 4. fig. q.  
q. i.  
q. fig. cap. 5  
lib. 3. M.  
r. 4. fig. n. n.  
c. 11. fig. L.  
L. B. M.

r. 10. 11. fig.  
L. L. 11. fig. L.

t. 10. 11. fig.  
M. sed maxime in 2. 4.  
fig. ad F. F.  
G. G.

u. 9. fig. h. h.  
cōstituit L.

*IECUR* pleræq. ostendunt figuræ: uerùm inter ceteras duodecima & nigesima cauam ipsius sedem in primis spectandam offerunt. Gibbam uerò proponit decima octaua, & aliqua etiam ex parte secunda, sexta, ac nigesima secunda, & nigesima quinta, quæ & caue regionis nonnihil exprimunt.

*Iecoris sima.*



**E C V R**, nutritionis organorum facillè præcipuum, & sanguinis crassioris officina, animæq; cibos ac potus, quæq; corporis naturæ necessaria sunt, appetentis fomes, elatissimam ministrantium ipsi partium regionem sibi uendicat. Mox enim sub<sup>a</sup> septo transuerso collocatur, maximam inferioris illius sedis regionem occupans. Totam namq; dextram septi partem cōtingit, parum admodum

eius partis intactum inibi relinques, quā septum undecimæ duodecimæq; costis adnascitur; suaq; ligamenta, quibus uertebreis colligatur, porrigit. Mediæ autem septi parti uniuersæ iecur subtenditur, sinistræ uerò parti non itidem: quanquam huius magnam quoq; sedem teneat, totam uidelicet anteriorem, ad eam usq; sedem, quæ sinistrum septi latus costarū medio (quod ab ipsarum radicibus ad finem usque eorundem metior) incumbere incipit. adeo sanè, ut longè magis quàm nostris uisum est medicis, in sinistrum latus iecur<sup>d</sup> pertingat. Neq; uerò septi transuersi latitudinem ullibi excedit: nisi quòd paulo demissius, quàm<sup>e</sup> mucronata consistit cartilago nonnunquam, & potissimum arctato thorace depēdeat. quod etiam tanto fit manifestius, quo maius homi-

*Sima ratio.*

ni iecur (quemadmodum pueris ferè) accidit. Porro humanum iecur maiorem sui portionem in dextro latere extensam habet, propter<sup>f</sup> lienem, qui ipso dignitate multo inferior, sinistram sedem erat occupaturus. Vt igitur corpus redderetur æquibale, sagax Natura minorem iecoris partem in sinistra deduxit: uti aues manifestò attestātur, quibus iecur æqualiter in utroq; latus, ut & canibus propemodum, cōsistit. His enim quia gracilis, neq; ualde ponderosus contigit lien, magna iecoris portio in sinistra fertur. Quocūq; tamē deducatur iecur, etiam si sub septo, ipsoq; in peritonæo locetur, eam sedem perpetuò obtinet, quæ costis succingitur: adeo ut cibi organorum situs magnam rursus Naturæ ostendat potentia. Quum enim abdomen propter ea quæ extendi

*Iecur maxima ex parte costis succingi, muni rig.*

*Iecoris forma.*

subsidereq; crebro debent organa, ossibus destituatur, Natura eas partes, quarum gratia illud ossibus carere uoluit, ab iniurijs minus texit: reliquas uerò hac extensione non indigētes, tutissimè cōdidit.<sup>g</sup> Atq; ita peritonæo inter dissecandum aperto, primū occurrūt, uētriculus, intestina, uesica, & utcrus. Verū iecur, lien, renes, uena caua, & arteria magna, tutius recōduntur. Forma iecoris uaria est, & suis quibus accumbit organis respondens, non aliter quàm si id nullam peculiare exigere formam, & sibi à uicinis partibus, instar fictilis terræ, quamuis effigiem indi lineret. Nam & suprà, & retrò omni ex parte quæ septum<sup>h</sup> spectat, gibbum læueq; admodū uisitur, nullis omnino extuberans processibus: & cavitati septi, quæ in inferiore ipsius sede necessariò<sup>i</sup> constituitur, ad amulsim congruens. Videtur enim iecur uelut gleba illi inferiori septi sedi impressum fuisse, ac ab ipsa hic formatum.<sup>k</sup> Ne uerò uenæ cauæ caudex secundū posteriorem iecoris sedem protensus, aut huius grauitate, aut septi transuersi motu cōprimeretur, tantus sinus in posteriori iecoris sede exsculptus est, quantus amplectendo innascendoq; cauæ caudici sufficiat. Cæterū<sup>l</sup> inferiori sede, iecur admodū amice uētriculo cedit, ac ab illo (quem rotundum, secundūq; corporis latitudinē oblongum necessariò procreatum esse diximus) cauum efficitur: & læue quidē hic etiā existit, sed non undecūq; processibus

*d 7 muscul. tab. a.*  
*b Videtur id 2. 6. 12. 20. 22. 25 si guris, et ul tima, quoq; fig. lib. 2.*  
*c 7 muscul. tab. o. p.*

*d Ad O fig. 12. et ad C fig. 10.*  
*e 6 fig. sub A habetur D. D.*

*f 10 fig. O. O. E.*

*g confer 2 et 6 fig. cū 10, 24, et 25.*

*h fig. 18 et 22. præcipuè.*  
*i 7 muscul. tab. a.*  
*k id totum pete ex 18 figura.*

*l 12 figur h K cedit P. Q.*

<sup>112 fig. N.</sup>  
<sup>N. 20 fig. G.</sup> processibus<sup>m</sup> tuberibus<sup>ue</sup> & sinibus liberum. Quemadmodum enim organa quibus iecur caua sui parte incumbit, simplici quadā superficie neutiquam gibba sunt ita quoque iecur unica superficie haud sinuatum est, sed rupis præcipitio aliqua ex parte accedit. Quā nanq<sup>ue</sup> duodenū exporrigitur intestinum, & uenā portæ à iecore prodit, iecur quodam<sup>p</sup> tubere prominet, sedē quam hīc uacuam reperit adimpleturum. Præterea ubi bilis<sup>ue</sup> uesicula cauæ iecoris regioni innascitur, sinus in illa exculpitur, medium eius uesiculæ corpus eleganter excipiens. Ad hæc, iecur quoque ea parte<sup>r</sup> sinum adipiscitur, qua stoma-  
<sup>115 fig. P.</sup>  
<sup>116 fig. B.</sup>  
<sup>117 fig. C.</sup>  
<sup>N. N.</sup>  
<sup>120 fig. H.</sup>  
<sup>121 fig. I.</sup>  
<sup>122 fig. J.</sup>  
<sup>123 fig. K.</sup>  
<sup>124 fig. L.</sup>  
<sup>125 fig. M.</sup>  
<sup>126 fig. N.</sup>  
<sup>127 fig. O.</sup>  
<sup>128 fig. P.</sup>  
<sup>129 fig. Q.</sup>  
<sup>130 fig. R.</sup>  
<sup>131 fig. S.</sup>  
<sup>132 fig. T.</sup>  
<sup>133 fig. U.</sup>  
<sup>134 fig. V.</sup>  
<sup>135 fig. W.</sup>  
<sup>136 fig. X.</sup>  
<sup>137 fig. Y.</sup>  
<sup>138 fig. Z.</sup>  
<sup>139 fig. A.</sup>  
<sup>140 fig. B.</sup>  
<sup>141 fig. C.</sup>  
<sup>142 fig. D.</sup>  
<sup>143 fig. E.</sup>  
<sup>144 fig. F.</sup>  
<sup>145 fig. G.</sup>  
<sup>146 fig. H.</sup>  
<sup>147 fig. I.</sup>  
<sup>148 fig. J.</sup>  
<sup>149 fig. K.</sup>  
<sup>150 fig. L.</sup>  
<sup>151 fig. M.</sup>  
<sup>152 fig. N.</sup>  
<sup>153 fig. O.</sup>  
<sup>154 fig. P.</sup>  
<sup>155 fig. Q.</sup>  
<sup>156 fig. R.</sup>  
<sup>157 fig. S.</sup>  
<sup>158 fig. T.</sup>  
<sup>159 fig. U.</sup>  
<sup>160 fig. V.</sup>  
<sup>161 fig. W.</sup>  
<sup>162 fig. X.</sup>  
<sup>163 fig. Y.</sup>  
<sup>164 fig. Z.</sup>  
<sup>165 fig. A.</sup>  
<sup>166 fig. B.</sup>  
<sup>167 fig. C.</sup>  
<sup>168 fig. D.</sup>  
<sup>169 fig. E.</sup>  
<sup>170 fig. F.</sup>  
<sup>171 fig. G.</sup>  
<sup>172 fig. H.</sup>  
<sup>173 fig. I.</sup>  
<sup>174 fig. J.</sup>  
<sup>175 fig. K.</sup>  
<sup>176 fig. L.</sup>  
<sup>177 fig. M.</sup>  
<sup>178 fig. N.</sup>  
<sup>179 fig. O.</sup>  
<sup>180 fig. P.</sup>  
<sup>181 fig. Q.</sup>  
<sup>182 fig. R.</sup>  
<sup>183 fig. S.</sup>  
<sup>184 fig. T.</sup>  
<sup>185 fig. U.</sup>  
<sup>186 fig. V.</sup>  
<sup>187 fig. W.</sup>  
<sup>188 fig. X.</sup>  
<sup>189 fig. Y.</sup>  
<sup>190 fig. Z.</sup>  
<sup>191 fig. A.</sup>  
<sup>192 fig. B.</sup>  
<sup>193 fig. C.</sup>  
<sup>194 fig. D.</sup>  
<sup>195 fig. E.</sup>  
<sup>196 fig. F.</sup>  
<sup>197 fig. G.</sup>  
<sup>198 fig. H.</sup>  
<sup>199 fig. I.</sup>  
<sup>200 fig. J.</sup>  
<sup>201 fig. K.</sup>  
<sup>202 fig. L.</sup>  
<sup>203 fig. M.</sup>  
<sup>204 fig. N.</sup>  
<sup>205 fig. O.</sup>  
<sup>206 fig. P.</sup>  
<sup>207 fig. Q.</sup>  
<sup>208 fig. R.</sup>  
<sup>209 fig. S.</sup>  
<sup>210 fig. T.</sup>  
<sup>211 fig. U.</sup>  
<sup>212 fig. V.</sup>  
<sup>213 fig. W.</sup>  
<sup>214 fig. X.</sup>  
<sup>215 fig. Y.</sup>  
<sup>216 fig. Z.</sup>  
<sup>217 fig. A.</sup>  
<sup>218 fig. B.</sup>  
<sup>219 fig. C.</sup>  
<sup>220 fig. D.</sup>  
<sup>221 fig. E.</sup>  
<sup>222 fig. F.</sup>  
<sup>223 fig. G.</sup>  
<sup>224 fig. H.</sup>  
<sup>225 fig. I.</sup>  
<sup>226 fig. J.</sup>  
<sup>227 fig. K.</sup>  
<sup>228 fig. L.</sup>  
<sup>229 fig. M.</sup>  
<sup>230 fig. N.</sup>  
<sup>231 fig. O.</sup>  
<sup>232 fig. P.</sup>  
<sup>233 fig. Q.</sup>  
<sup>234 fig. R.</sup>  
<sup>235 fig. S.</sup>  
<sup>236 fig. T.</sup>  
<sup>237 fig. U.</sup>  
<sup>238 fig. V.</sup>  
<sup>239 fig. W.</sup>  
<sup>240 fig. X.</sup>  
<sup>241 fig. Y.</sup>  
<sup>242 fig. Z.</sup>  
<sup>243 fig. A.</sup>  
<sup>244 fig. B.</sup>  
<sup>245 fig. C.</sup>  
<sup>246 fig. D.</sup>  
<sup>247 fig. E.</sup>  
<sup>248 fig. F.</sup>  
<sup>249 fig. G.</sup>  
<sup>250 fig. H.</sup>  
<sup>251 fig. I.</sup>  
<sup>252 fig. J.</sup>  
<sup>253 fig. K.</sup>  
<sup>254 fig. L.</sup>  
<sup>255 fig. M.</sup>  
<sup>256 fig. N.</sup>  
<sup>257 fig. O.</sup>  
<sup>258 fig. P.</sup>  
<sup>259 fig. Q.</sup>  
<sup>260 fig. R.</sup>  
<sup>261 fig. S.</sup>  
<sup>262 fig. T.</sup>  
<sup>263 fig. U.</sup>  
<sup>264 fig. V.</sup>  
<sup>265 fig. W.</sup>  
<sup>266 fig. X.</sup>  
<sup>267 fig. Y.</sup>  
<sup>268 fig. Z.</sup>  
<sup>269 fig. A.</sup>  
<sup>270 fig. B.</sup>  
<sup>271 fig. C.</sup>  
<sup>272 fig. D.</sup>  
<sup>273 fig. E.</sup>  
<sup>274 fig. F.</sup>  
<sup>275 fig. G.</sup>  
<sup>276 fig. H.</sup>  
<sup>277 fig. I.</sup>  
<sup>278 fig. J.</sup>  
<sup>279 fig. K.</sup>  
<sup>280 fig. L.</sup>  
<sup>281 fig. M.</sup>  
<sup>282 fig. N.</sup>  
<sup>283 fig. O.</sup>  
<sup>284 fig. P.</sup>  
<sup>285 fig. Q.</sup>  
<sup>286 fig. R.</sup>  
<sup>287 fig. S.</sup>  
<sup>288 fig. T.</sup>  
<sup>289 fig. U.</sup>  
<sup>290 fig. V.</sup>  
<sup>291 fig. W.</sup>  
<sup>292 fig. X.</sup>  
<sup>293 fig. Y.</sup>  
<sup>294 fig. Z.</sup>  
<sup>295 fig. A.</sup>  
<sup>296 fig. B.</sup>  
<sup>297 fig. C.</sup>  
<sup>298 fig. D.</sup>  
<sup>299 fig. E.</sup>  
<sup>300 fig. F.</sup>  
<sup>301 fig. G.</sup>  
<sup>302 fig. H.</sup>  
<sup>303 fig. I.</sup>  
<sup>304 fig. J.</sup>  
<sup>305 fig. K.</sup>  
<sup>306 fig. L.</sup>  
<sup>307 fig. M.</sup>  
<sup>308 fig. N.</sup>  
<sup>309 fig. O.</sup>  
<sup>310 fig. P.</sup>  
<sup>311 fig. Q.</sup>  
<sup>312 fig. R.</sup>  
<sup>313 fig. S.</sup>  
<sup>314 fig. T.</sup>  
<sup>315 fig. U.</sup>  
<sup>316 fig. V.</sup>  
<sup>317 fig. W.</sup>  
<sup>318 fig. X.</sup>  
<sup>319 fig. Y.</sup>  
<sup>320 fig. Z.</sup>  
<sup>321 fig. A.</sup>  
<sup>322 fig. B.</sup>  
<sup>323 fig. C.</sup>  
<sup>324 fig. D.</sup>  
<sup>325 fig. E.</sup>  
<sup>326 fig. F.</sup>  
<sup>327 fig. G.</sup>  
<sup>328 fig. H.</sup>  
<sup>329 fig. I.</sup>  
<sup>330 fig. J.</sup>  
<sup>331 fig. K.</sup>  
<sup>332 fig. L.</sup>  
<sup>333 fig. M.</sup>  
<sup>334 fig. N.</sup>  
<sup>335 fig. O.</sup>  
<sup>336 fig. P.</sup>  
<sup>337 fig. Q.</sup>  
<sup>338 fig. R.</sup>  
<sup>339 fig. S.</sup>  
<sup>340 fig. T.</sup>  
<sup>341 fig. U.</sup>  
<sup>342 fig. V.</sup>  
<sup>343 fig. W.</sup>  
<sup>344 fig. X.</sup>  
<sup>345 fig. Y.</sup>  
<sup>346 fig. Z.</sup>  
<sup>347 fig. A.</sup>  
<sup>348 fig. B.</sup>  
<sup>349 fig. C.</sup>  
<sup>350 fig. D.</sup>  
<sup>351 fig. E.</sup>  
<sup>352 fig. F.</sup>  
<sup>353 fig. G.</sup>  
<sup>354 fig. H.</sup>  
<sup>355 fig. I.</sup>  
<sup>356 fig. J.</sup>  
<sup>357 fig. K.</sup>  
<sup>358 fig. L.</sup>  
<sup>359 fig. M.</sup>  
<sup>360 fig. N.</sup>  
<sup>361 fig. O.</sup>  
<sup>362 fig. P.</sup>  
<sup>363 fig. Q.</sup>  
<sup>364 fig. R.</sup>  
<sup>365 fig. S.</sup>  
<sup>366 fig. T.</sup>  
<sup>367 fig. U.</sup>  
<sup>368 fig. V.</sup>  
<sup>369 fig. W.</sup>  
<sup>370 fig. X.</sup>  
<sup>371 fig. Y.</sup>  
<sup>372 fig. Z.</sup>  
<sup>373 fig. A.</sup>  
<sup>374 fig. B.</sup>  
<sup>375 fig. C.</sup>  
<sup>376 fig. D.</sup>  
<sup>377 fig. E.</sup>  
<sup>378 fig. F.</sup>  
<sup>379 fig. G.</sup>  
<sup>380 fig. H.</sup>  
<sup>381 fig. I.</sup>  
<sup>382 fig. J.</sup>  
<sup>383 fig. K.</sup>  
<sup>384 fig. L.</sup>  
<sup>385 fig. M.</sup>  
<sup>386 fig. N.</sup>  
<sup>387 fig. O.</sup>  
<sup>388 fig. P.</sup>  
<sup>389 fig. Q.</sup>  
<sup>390 fig. R.</sup>  
<sup>391 fig. S.</sup>  
<sup>392 fig. T.</sup>  
<sup>393 fig. U.</sup>  
<sup>394 fig. V.</sup>  
<sup>395 fig. W.</sup>  
<sup>396 fig. X.</sup>  
<sup>397 fig. Y.</sup>  
<sup>398 fig. Z.</sup>  
<sup>399 fig. A.</sup>  
<sup>400 fig. B.</sup>  
<sup>401 fig. C.</sup>  
<sup>402 fig. D.</sup>  
<sup>403 fig. E.</sup>  
<sup>404 fig. F.</sup>  
<sup>405 fig. G.</sup>  
<sup>406 fig. H.</sup>  
<sup>407 fig. I.</sup>  
<sup>408 fig. J.</sup>  
<sup>409 fig. K.</sup>  
<sup>410 fig. L.</sup>  
<sup>411 fig. M.</sup>  
<sup>412 fig. N.</sup>  
<sup>413 fig. O.</sup>  
<sup>414 fig. P.</sup>  
<sup>415 fig. Q.</sup>  
<sup>416 fig. R.</sup>  
<sup>417 fig. S.</sup>  
<sup>418 fig. T.</sup>  
<sup>419 fig. U.</sup>  
<sup>420 fig. V.</sup>  
<sup>421 fig. W.</sup>  
<sup>422 fig. X.</sup>  
<sup>423 fig. Y.</sup>  
<sup>424 fig. Z.</sup>  
<sup>425 fig. A.</sup>  
<sup>426 fig. B.</sup>  
<sup>427 fig. C.</sup>  
<sup>428 fig. D.</sup>  
<sup>429 fig. E.</sup>  
<sup>430 fig. F.</sup>  
<sup>431 fig. G.</sup>  
<sup>432 fig. H.</sup>  
<sup>433 fig. I.</sup>  
<sup>434 fig. J.</sup>  
<sup>435 fig. K.</sup>  
<sup>436 fig. L.</sup>  
<sup>437 fig. M.</sup>  
<sup>438 fig. N.</sup>  
<sup>439 fig. O.</sup>  
<sup>440 fig. P.</sup>  
<sup>441 fig. Q.</sup>  
<sup>442 fig. R.</sup>  
<sup>443 fig. S.</sup>  
<sup>444 fig. T.</sup>  
<sup>445 fig. U.</sup>  
<sup>446 fig. V.</sup>  
<sup>447 fig. W.</sup>  
<sup>448 fig. X.</sup>  
<sup>449 fig. Y.</sup>  
<sup>450 fig. Z.</sup>  
<sup>451 fig. A.</sup>  
<sup>452 fig. B.</sup>  
<sup>453 fig. C.</sup>  
<sup>454 fig. D.</sup>  
<sup>455 fig. E.</sup>  
<sup>456 fig. F.</sup>  
<sup>457 fig. G.</sup>  
<sup>458 fig. H.</sup>  
<sup>459 fig. I.</sup>  
<sup>460 fig. J.</sup>  
<sup>461 fig. K.</sup>  
<sup>462 fig. L.</sup>  
<sup>463 fig. M.</sup>  
<sup>464 fig. N.</sup>  
<sup>465 fig. O.</sup>  
<sup>466 fig. P.</sup>  
<sup>467 fig. Q.</sup>  
<sup>468 fig. R.</sup>  
<sup>469 fig. S.</sup>  
<sup>470 fig. T.</sup>  
<sup>471 fig. U.</sup>  
<sup>472 fig. V.</sup>  
<sup>473 fig. W.</sup>  
<sup>474 fig. X.</sup>  
<sup>475 fig. Y.</sup>  
<sup>476 fig. Z.</sup>  
<sup>477 fig. A.</sup>  
<sup>478 fig. B.</sup>  
<sup>479 fig. C.</sup>  
<sup>480 fig. D.</sup>  
<sup>481 fig. E.</sup>  
<sup>482 fig. F.</sup>  
<sup>483 fig. G.</sup>  
<sup>484 fig. H.</sup>  
<sup>485 fig. I.</sup>  
<sup>486 fig. J.</sup>  
<sup>487 fig. K.</sup>  
<sup>488 fig. L.</sup>  
<sup>489 fig. M.</sup>  
<sup>490 fig. N.</sup>  
<sup>491 fig. O.</sup>  
<sup>492 fig. P.</sup>  
<sup>493 fig. Q.</sup>  
<sup>494 fig. R.</sup>  
<sup>495 fig. S.</sup>  
<sup>496 fig. T.</sup>  
<sup>497 fig. U.</sup>  
<sup>498 fig. V.</sup>  
<sup>499 fig. W.</sup>  
<sup>500 fig. X.</sup>  
<sup>501 fig. Y.</sup>  
<sup>502 fig. Z.</sup>  
<sup>503 fig. A.</sup>  
<sup>504 fig. B.</sup>  
<sup>505 fig. C.</sup>  
<sup>506 fig. D.</sup>  
<sup>507 fig. E.</sup>  
<sup>508 fig. F.</sup>  
<sup>509 fig. G.</sup>  
<sup>510 fig. H.</sup>  
<sup>511 fig. I.</sup>  
<sup>512 fig. J.</sup>  
<sup>513 fig. K.</sup>  
<sup>514 fig. L.</sup>  
<sup>515 fig. M.</sup>  
<sup>516 fig. N.</sup>  
<sup>517 fig. O.</sup>  
<sup>518 fig. P.</sup>  
<sup>519 fig. Q.</sup>  
<sup>520 fig. R.</sup>  
<sup>521 fig. S.</sup>  
<sup>522 fig. T.</sup>  
<sup>523 fig. U.</sup>  
<sup>524 fig. V.</sup>  
<sup>525 fig. W.</sup>  
<sup>526 fig. X.</sup>  
<sup>527 fig. Y.</sup>  
<sup>528 fig. Z.</sup>  
<sup>529 fig. A.</sup>  
<sup>530 fig. B.</sup>  
<sup>531 fig. C.</sup>  
<sup>532 fig. D.</sup>  
<sup>533 fig. E.</sup>  
<sup>534 fig. F.</sup>  
<sup>535 fig. G.</sup>  
<sup>536 fig. H.</sup>  
<sup>537 fig. I.</sup>  
<sup>538 fig. J.</sup>  
<sup>539 fig. K.</sup>  
<sup>540 fig. L.</sup>  
<sup>541 fig. M.</sup>  
<sup>542 fig. N.</sup>  
<sup>543 fig. O.</sup>  
<sup>544 fig. P.</sup>  
<sup>545 fig. Q.</sup>  
<sup>546 fig. R.</sup>  
<sup>547 fig. S.</sup>  
<sup>548 fig. T.</sup>  
<sup>549 fig. U.</sup>  
<sup>550 fig. V.</sup>  
<sup>551 fig. W.</sup>  
<sup>552 fig. X.</sup>  
<sup>553 fig. Y.</sup>  
<sup>554 fig. Z.</sup>  
<sup>555 fig. A.</sup>  
<sup>556 fig. B.</sup>  
<sup>557 fig. C.</sup>  
<sup>558 fig. D.</sup>  
<sup>559 fig. E.</sup>  
<sup>560 fig. F.</sup>  
<sup>561 fig. G.</sup>  
<sup>562 fig. H.</sup>  
<sup>563 fig. I.</sup>  
<sup>564 fig. J.</sup>  
<sup>565 fig. K.</sup>  
<sup>566 fig. L.</sup>  
<sup>567 fig. M.</sup>  
<sup>568 fig. N.</sup>  
<sup>569 fig. O.</sup>  
<sup>570 fig. P.</sup>  
<sup>571 fig. Q.</sup>  
<sup>572 fig. R.</sup>  
<sup>573 fig. S.</sup>  
<sup>574 fig. T.</sup>  
<sup>575 fig. U.</sup>  
<sup>576 fig. V.</sup>  
<sup>577 fig. W.</sup>  
<sup>578 fig. X.</sup>  
<sup>579 fig. Y.</sup>  
<sup>580 fig. Z.</sup>  
<sup>581 fig. A.</sup>  
<sup>582 fig. B.</sup>  
<sup>583 fig. C.</sup>  
<sup>584 fig. D.</sup>  
<sup>585 fig. E.</sup>  
<sup>586 fig. F.</sup>  
<sup>587 fig. G.</sup>  
<sup>588 fig. H.</sup>  
<sup>589 fig. I.</sup>  
<sup>590 fig. J.</sup>  
<sup>591 fig. K.</sup>  
<sup>592 fig. L.</sup>  
<sup>593 fig. M.</sup>  
<sup>594 fig. N.</sup>  
<sup>595 fig. O.</sup>  
<sup>596 fig. P.</sup>  
<sup>597 fig. Q.</sup>  
<sup>598 fig. R.</sup>  
<sup>599 fig. S.</sup>  
<sup>600 fig. T.</sup>  
<sup>601 fig. U.</sup>  
<sup>602 fig. V.</sup>  
<sup>603 fig. W.</sup>  
<sup>604 fig. X.</sup>  
<sup>605 fig. Y.</sup>  
<sup>606 fig. Z.</sup>  
<sup>607 fig. A.</sup>  
<sup>608 fig. B.</sup>  
<sup>609 fig. C.</sup>  
<sup>610 fig. D.</sup>  
<sup>611 fig. E.</sup>  
<sup>612 fig. F.</sup>  
<sup>613 fig. G.</sup>  
<sup>614 fig. H.</sup>  
<sup>615 fig. I.</sup>  
<sup>616 fig. J.</sup>  
<sup>617 fig. K.</sup>  
<sup>618 fig. L.</sup>  
<sup>619 fig. M.</sup>  
<sup>620 fig. N.</sup>  
<sup>621 fig. O.</sup>  
<sup>622 fig. P.</sup>  
<sup>623 fig. Q.</sup>  
<sup>624 fig. R.</sup>  
<sup>625 fig. S.</sup>  
<sup>626 fig. T.</sup>  
<sup>627 fig. U.</sup>  
<sup>628 fig. V.</sup>  
<sup>629 fig. W.</sup>  
<sup>630 fig. X.</sup>  
<sup>631 fig. Y.</sup>  
<sup>632 fig. Z.</sup>  
<sup>633 fig. A.</sup>  
<sup>634 fig. B.</sup>  
<sup>635 fig. C.</sup>  
<sup>636 fig. D.</sup>  
<sup>637 fig. E.</sup>  
<sup>638 fig. F.</sup>  
<sup>639 fig. G.</sup>  
<sup>640 fig. H.</sup>  
<sup>641 fig. I.</sup>  
<sup>642 fig. J.</sup>  
<sup>643 fig. K.</sup>  
<sup>644 fig. L.</sup>  
<sup>645 fig. M.</sup>  
<sup>646 fig. N.</sup>  
<sup>647 fig. O.</sup>  
<sup>648 fig. P.</sup>  
<sup>649 fig. Q.</sup>  
<sup>650 fig. R.</sup>  
<sup>651 fig. S.</sup>  
<sup>652 fig. T.</sup>  
<sup>653 fig. U.</sup>  
<sup>654 fig. V.</sup>  
<sup>655 fig. W.</sup>  
<sup>656 fig. X.</sup>  
<sup>657 fig. Y.</sup>  
<sup>658 fig. Z.</sup>  
<sup>659 fig. A.</sup>  
<sup>660 fig. B.</sup>  
<sup>661 fig. C.</sup>  
<sup>662 fig. D.</sup>  
<sup>663 fig. E.</sup>  
<sup>664 fig. F.</sup>  
<sup>665 fig. G.</sup>  
<sup>666 fig. H.</sup>  
<sup>667 fig. I.</sup>  
<sup>668 fig. J.</sup>  
<sup>669 fig. K.</sup>  
<sup>670 fig. L.</sup>  
<sup>671 fig. M.</sup>  
<sup>672 fig. N.</sup>  
<sup>673 fig. O.</sup>  
<sup>674 fig. P.</sup>  
<sup>675 fig. Q.</sup>  
<sup>676 fig. R.</sup>  
<sup>677 fig. S.</sup>  
<sup>678 fig. T.</sup>  
<sup>679 fig. U.</sup>  
<sup>680 fig. V.</sup>  
<sup>681 fig. W.</sup>  
<sup>682 fig. X.</sup>  
<sup>683 fig. Y.</sup>  
<sup>684 fig. Z.</sup>  
<sup>685 fig. A.</sup>  
<sup>686 fig. B.</sup>  
<sup>687 fig. C.</sup>  
<sup>688 fig. D.</sup>  
<sup>689 fig. E.</sup>  
<sup>690 fig. F.</sup>  
<sup>691 fig. G.</sup>  
<sup>692 fig. H.</sup>  
<sup>693 fig. I.</sup>  
<sup>694 fig. J.</sup>  
<sup>695 fig. K.</sup>  
<sup>696 fig. L.</sup>  
<sup>697 fig. M.</sup>  
<sup>698 fig. N.</sup>  
<sup>699 fig. O.</sup>  
<sup>700 fig. P.</sup>  
<sup>701 fig. Q.</sup>  
<sup>702 fig. R.</sup>  
<sup>703 fig. S.</sup>  
<sup>704 fig. T.</sup>  
<sup>705 fig. U.</sup>  
<sup>706 fig. V.</sup>  
<sup>707 fig. W.</sup>  
<sup>708 fig. X.</sup>  
<sup>709 fig. Y.</sup>  
<sup>710 fig. Z.</sup>  
<sup>711 fig. A.</sup>  
<sup>712 fig. B.</sup>  
<sup>713 fig. C.</sup>  
<sup>714 fig. D.</sup>  
<sup>715 fig. E.</sup>  
<sup>716 fig. F.</sup>  
<sup>717 fig. G.</sup>  
<sup>718 fig. H.</sup>  
<sup>719 fig. I.</sup>  
<sup>720 fig. J.</sup>  
<sup>721 fig. K.</sup>  
<sup>722 fig. L.</sup>  
<sup>723 fig. M.</sup>  
<sup>724 fig. N.</sup>  
<sup>725 fig. O.</sup>  
<sup>726 fig. P.</sup>  
<sup>727 fig. Q.</sup>  
<sup>728 fig. R.</sup>  
<sup>729 fig. S.</sup>  
<sup>730 fig. T.</sup>  
<sup>731 fig. U.</sup>  
<sup>732 fig. V.</sup>  
<sup>733 fig. W.</sup>  
<sup>734 fig. X.</sup>  
<sup>735 fig. Y.</sup>  
<sup>736 fig. Z.</sup>  
<sup>737 fig. A.</sup>  
<sup>738 fig. B.</sup>  
<sup>739 fig. C.</sup>  
<sup>740 fig. D.</sup>  
<sup>741 fig. E.</sup>  
<sup>742 fig. F.</sup>  
<sup>743 fig. G.</sup>  
<sup>744 fig. H.</sup>  
<sup>745 fig. I.</sup>  
<sup>746 fig. J.</sup>  
<sup>747 fig. K.</sup>  
<sup>748 fig. L.</sup>  
<sup>749 fig. M.</sup>  
<sup>750 fig. N.</sup>  
<sup>751 fig. O.</sup>  
<sup>752 fig. P.</sup>  
<sup>753 fig. Q.</sup>  
<sup>754 fig. R.</sup>  
<sup>755 fig. S.</sup>  
<sup>756 fig. T.</sup>  
<sup>757 fig. U.</sup>  
<sup>758 fig. V.</sup>  
<sup>759 fig. W.</sup>  
<sup>760 fig. X.</sup>  
<sup>761 fig. Y.</sup>  
<sup>762 fig. Z.</sup>  
<sup>763 fig. A.</sup>  
<sup>764 fig. B.</sup>  
<sup>765 fig. C.</sup>  
<sup>766 fig. D.</sup>  
<sup>767 fig. E.</sup>  
<sup>768 fig. F.</sup>  
<sup>769 fig. G.</sup>  
<sup>770 fig. H.</sup>  
<sup>771 fig. I.</sup>  
<sup>772 fig. J.</sup>  
<sup>773 fig. K.</sup>  
<sup>774 fig. L.</sup>  
<sup>775 fig. M.</sup>  
<sup>776 fig. N.</sup>  
<sup>777 fig. O.</sup>  
<sup>778 fig. P.</sup>  
<sup>779 fig. Q.</sup>  
<sup>780 fig. R.</sup>  
<sup>781 fig. S.</sup>  
<sup>782 fig. T.</sup>  
<sup>783 fig. U.</sup>  
<sup>784 fig. V.</sup>  
<sup>785 fig. W.</sup>  
<sup>786 fig. X.</sup>  
<sup>787 fig. Y.</sup>  
<sup>788 fig. Z.</sup>  
<sup>789 fig. A.</sup>  
<sup>790 fig. B.</sup>  
<sup>791 fig. C.</sup>  
<sup>792 fig. D.</sup>  
<sup>793 fig. E.</sup>  
<sup>794 fig. F.</sup>  
<sup>795 fig. G.</sup>  
<sup>796 fig. H.</sup>  
<sup>797 fig. I.</sup>  
<sup>798 fig. J.</sup>  
<sup>799 fig. K.</sup>  
<sup>800 fig. L.</sup>  
<sup>801 fig. M.</sup>  
<sup>802 fig. N.</sup>  
<sup>803 fig. O.</sup>  
<sup>804 fig. P.</sup>  
<sup>805 fig. Q.</sup>  
<sup>806 fig. R.</sup>  
<sup>807 fig. S.</sup>  
<sup>808 fig. T.</sup>  
<sup>809 fig. U.</sup>  
<sup>810 fig. V.</sup>  
<sup>811 fig. W.</sup>  
<sup>812 fig. X.</sup>  
<sup>813 fig. Y.</sup>  
<sup>814 fig. Z.</sup>  
<sup>815 fig. A.</sup>  
<sup>816 fig. B.</sup>  
<sup>817 fig. C.</sup>  
<sup>818 fig. D.</sup>  
<sup>819 fig. E.</sup>  
<sup>820 fig. F.</sup>  
<sup>821 fig. G.</sup>  
<sup>822 fig. H.</sup>  
<sup>823 fig. I.</sup>  
<sup>824 fig. J.</sup>  
<sup>825 fig. K.</sup>  
<sup>826 fig. L.</sup>  
<sup>827 fig. M.</sup>  
<sup>828 fig. N.</sup>  
<sup>829 fig. O.</sup>  
<sup>830 fig. P.</sup>  
<sup>831 fig. Q.</sup>  
<sup>832 fig. R.</sup>  
<sup>833 fig. S.</sup>  
<sup>834 fig. T.</sup>  
<sup>835 fig. U.</sup>  
<sup>836 fig. V.</sup>  
<sup>837 fig. W.</sup>  
<sup>838 fig. X.</sup>  
<sup>839 fig. Y.</sup>  
<sup>840 fig. Z.</sup>  
<sup>841 fig. A.</sup>  
<sup>842 fig. B.</sup>  
<sup>843 fig. C.</sup>  
<sup>844 fig. D.</sup>  
<sup>845 fig. E.</sup>  
<sup>846 fig. F.</sup>  
<sup>847 fig. G.</sup>  
<sup>848 fig. H.</sup>  
<sup>849 fig. I.</sup>  
<sup>850 fig. J.</sup>  
<sup>851 fig. K.</sup>  
<sup>852 fig. L.</sup>  
<sup>853 fig. M.</sup>  
<sup>854 fig. N.</sup>  
<sup>855 fig. O.</sup>  
<sup>856 fig. P.</sup>  
<sup>857 fig. Q.</sup>  
<sup>858 fig. R.</sup>  
<sup>859 fig. S.</sup>  
<sup>860 fig. T.</sup>  
<sup>861 fig. U.</sup>  
<sup>862 fig. V.</sup>  
<sup>863 fig. W.</sup>  
<sup>864 fig. X.</sup>  
<sup>865 fig. Y.</sup>  
<sup>866 fig. Z.</sup>  
<sup>867 fig. A.</sup>  
<sup>868 fig. B.</sup>  
<sup>869 fig. C.</sup>  
<sup>870 fig. D.</sup>  
<sup>871 fig. E.</sup>  
<sup>872 fig. F.</sup>  
<sup>873 fig. G.</sup>  
<sup>874 fig. H.</sup>  
<sup>875 fig. I.</sup>  
<sup>876 fig. J.</sup>  
<sup>877 fig. K.</sup>  
<sup>878 fig. L.</sup>  
<sup>879 fig. M.</sup>  
<sup>880 fig. N.</sup>  
<sup>881 fig. O.</sup>  
<sup>882 fig. P.</sup>  
<sup>883 fig. Q.</sup>  
<sup>884 fig. R.</sup>  
<sup>885 fig. S.</sup>  
<sup>886 fig. T.</sup>  
<sup>887 fig. U.</sup>  
<sup>888 fig. V.</sup>  
<sup>889 fig. W.</sup>  
<sup>890 fig. X.</sup>  
<sup>891 fig. Y.</sup>  
<sup>892 fig. Z.</sup>  
<sup>893 fig. A.</sup>  
<sup>894 fig. B.</sup>  
<sup>895 fig. C.</sup>  
<sup>896 fig. D.</sup>  
<sup>897 fig. E.</sup>  
<sup>898 fig. F.</sup>  
<sup>899 fig. G.</sup>  
<sup>900 fig. H.</sup>  
<sup>901 fig. I.</sup>  
<sup>902 fig. J.</sup>  
<sup>903 fig. K.</sup>  
<sup>904 fig. L.</sup>  
<sup>905 fig. M.</sup>  
<sup>906 fig. N.</sup>  
<sup>907 fig. O.</sup>  
<sup>908 fig. P.</sup>  
<sup>909 fig. Q.</sup>  
<sup>910 fig. R.</sup>  
<sup>911 fig. S.</sup>  
<sup>912 fig. T.</sup>  
<sup>913 fig. U.</sup>  
<sup>914 fig. V.</sup>  
<sup>915 fig. W.</sup>  
<sup>916 fig. X.</sup>  
<sup>917 fig. Y</sup>



Theophilum illum, parum sanè Anatomicum, uidere est) imponūt nomina. Quatuor enim quum sint, inquirunt, iecoris fibræ, prima focus dicitur: maxime nanq; ad succi concoctionē facit, quemadmodū concoquendis cibarijs focus. Secūda mensē nomē sortitur, quōd mensē uices gerat: nam membrorum alimenta in ipsa apponūtur. Tertia culter nūcupatur: diuidit enim, segregatq; inter se humores: aut si quid crassius distribundū sit, id secat atq; commutat. Quarta aurigæ nomine appellatur: nam naturales uires iam excoctos humores bene regunt, atq; in melius rectā ducunt. Huiusmodi profectò eorum qui humanam fabricā imaginationibus, non sectionibus, aut è brutorum potius quàm hominū corporib. discere conantur, nugæ figmenta q; sunt. Quantum uis interim haud ignorē, iecori in libro de Natura ossium ab Hippocrate quinque fibras, aut, ut interpres habet, extremitates dari. quod sanè nō leuiter mirarer, nisi uel perfunctoriē in Anatome uersato, & autorum gratia suis oculis fidem non deroganti, plus satis constaret, quàm multa in eo libro, ipsiq; præsentis argumenti conterminis libris occurrant, ab hominis fabrica, omniq; prorsus ueritate aliena, & indigna pariter quæ ad Hippocratem referantur, quem nunquam in Anatomicis lapsū fuisse Galenus audacter (at nescio quàm uerè interim) attestatur. Nimio itaque erga autores affectu nonnihil remisso, omnes qui mihi unquam secātī altitere testor, me iecur in fibras aliquo pacto diuisum, nunquam inspexisse. Neq; est cur quispiam iecur duplici fibra constare astruat, propter scissionem seu foramen potius, quo uena ex umbilico proficiens excipitur: aut ob eius iecoris\* portiunculam, sub ortu uenę portæ extuberantem, id fibris aliquot constare affirmet: si modò unquam uel per somnium animalia, quibus iecur in fibras, ut canī, diuisum est, cōtemplatus fuerit. non autem hæc solū leui negotio obseruabit, sed & animaduertet etiam, quotquot hæctenus uenæ cauæ exortū, & ad iecoris gibbum in duos truncos distributionem literis prodiderūt, ridiculè nugaciterq; a dmodū delirasse. De magnitudine uerò iecoris, quōd scilicet timidis gulosisq; maius obtigerit, & quōd iuxta proportionē homini, ut & cerebrū, inter reliqua animantia, grandius iecur datum sit, nō præter rationē à quibusdā dissectionū professorib. dictum est: quanquā nonnulli nostratiū medicorum ipsdē crapula absūmi iecur, serìò adeoq; cōtentiose affirmēt: ut rerū omniū imperiti, & uulgo & sibi ipsis persuadeant, insignibus illis uini gurgitib. iecur ad nucis duntaxat molē reduci consueuisse. Porro de iecoris substantia, uenis, arterijs, tunica, & ligamētis, nunc dicendum est. Per uniuersum itaq; iecoris corpus, ad humiliorem eius sedem, uenæ portæ\* propagines innumeræ diffunduntur, in superiorem uerò ipsius sedem uenæ cauæ\* soboles numerosæ spargūtur: quas aut ab earum extremis furculis, aut ab ea parte, qua caudices uenarū constituūt, describere integrum est. Orbiculatum nanq; (uti in tertio libro complexus sum diligentius) ex omnibus extremis iecoris partibus infiniti uenarū furculi prodeunt, quorum alij in elatiore uisceris parte, alij in demissiore habentur, inuicē propemodum continui, & mutuis osculis quodāmodo cōmissi. Inferiores furculi paulatim inter se in alios paulò crassiores colliguntur, & hi rursus in alios. Atq; ita deinceps tantisper coeunt, donec tandem omnes in iecoris cauo in\* unam uenam congregiantur: non equidem (ut quispiam alijs dissectionū fidens professioribus putauerit) in cauæ sedis centro, sed in humiliori eius parte, qua dextro dorsi lateri iecur proximū est. Hinc prodiens uena, eos quos sæpe recensui ramos, in bilis uesiculam, uentriculū, omentum, lienem, & intestina digerit. Sic ramorum qui superiorē iecoris sedem occupant, tenuissimæ soboles in grandiores

Primo lib. de  
Fuspartium.

Iecoris sub-  
stantia.

Uenarum fir-  
mitas.

22 si inter  
H. H. quā in  
greditur G.  
420 fig. in-  
ter G. G.

6 si. ca. 11.  
3 A. A. A.  
c fig. 44. 6  
113 A. A. A.

4 si. ca. 11.  
B. et 10 si.  
ga. 1.

diiores paulatim, & hæ rursus in maiores, ampliores uē tantisper coaceruantur, quousq; omnes in<sup>2</sup> duos maximos coeant ramos, in anteriorem uenæ cauæ sedem, quā hæc iecori innascitur, pertinentes. præter aliquot etiam<sup>1</sup> graciles furculis eidem uenæ cauæ sedi insertos. Neq; rursus hoc in gibbæ iecoris sedis sit medio, sed<sup>3</sup> in posteriore ipsius sede, qua septo incumbit potius quàm adhæret, dum resupinatum hominem intelligimus.<sup>4</sup> In dictorum ramorum medio aliquibus in locis tenues gracilesq; admodum deducuntur furculi, qui caui sunt, & uenarum corpore donati, in unum quoq; caudicē mutuō collecti desinunt, in bilis uesiculam (uti post dicemus) deducendū. Quin & in humi-  
liore iecoris sede, ubi portæ rami in suum caudicē coeunt, exiles arteriæ in iecoris corpus exporriguntur, ab ea diffusæ, quæ dextræ sedi inferioris membra-  
næ omenti à magna arteria offertur. His omnibus ualis rubra mollisq; adnasci-  
tur substantia, nuper concreto sanguini quàm simillima, nisi quod durior, &  
potissimum in iecoris gibbo cernatur, ab Erasistrato, quod ualis his & propa-  
ginibus circumfunditur, *ῥήγχινα* nuncupata. Hæc substantia iecoris uasa con-  
tinet, & amplectendo suffulcit, totam propemodū iecoris molem cōstituens.  
quæ per quàm tenui obuoluitur tunica, à ligamenti pronata, quibus iecur pe-  
ritonæo, quā id septo subditum est, affirmatur. Sunt autē hæc duo præcipua:  
unum quidem densum & insigniter ualidum, sed membranæ modo tenue  
quod peritonæi pars inferiorē septi sedem succingens, paululum à latere dex-  
tro mucronatæ cartilaginis educit, rectā ex anterioribus in posteriora proten-  
sum, paucisq; omnino quadrupedibus ut quæ perinde ac homo neuti quā eri-  
guntur cōmune. Alterum uerò, quā iecoris sinistra pars in acutū desinit angu-  
lum, à peritonæo nascitur. hic enim fortissimo & quodammodo tereti liga-  
mento iecur peritonæo alligatur. Dein<sup>m</sup> qua cauæ uenæ caudex septum per-  
meat, & dein secundum cauæ per iecori posteriora deductum, peritonæum  
iocori adnascitur, sibiq; hac in parte iecur connectit. Quinetiam cauæ iecoris  
sedi, ubi portæ est principiū, omēti quoq; portio adnascitur. Præterea iecur an-  
teriori peritonæi sedi (quod & alijs animaduertendū etiā fuerat Anatomicis)  
cōnectitur, beneficio<sup>o</sup> uenæ ab umbilico in ipsum iecur pertinētis. Hæc enim  
foetu è matre excluso arefcit, ac instar ualidi efficit uinculi, ipsum iecur, uti iam  
dixi, peritonæo colligantis. Ex his omnibus uinculis quibus iecur peritonæo  
adnectitur, tenuem suam & sibi peculiarē fortitur tunicā, in quam duo quo-  
que inferuntur nerui:<sup>o</sup> unus quidem à sexti paris cerebri neruorum ramis, ela-  
tiori orificio uētriculi implantatis:<sup>p</sup> alter uerò ab alijs Anatomicis igno-  
ratus, à sexti eius coniugij discinditur propagine costarū dextri lateris radicibus ex-  
porrecta. Nervus iste in iecoris tunicam raris modicisq; furculis dispersitur,  
priori neruo in iecoris quoq; substantiam pertinente. Et talis quidem uisceris  
huius est fabrica. quod autem ad ipsius partiū usum attinet, sic sese ordine ha-  
bent singula. Iecori quicquid humidū succulentumq; à uentriculo conficitur,  
uenæ portæ rami ex ipso uentriculo & intestinis potissimum id depascentes,  
aderunt. Quod uerò ijdem rami priusquā iecori succulentū id porrigant, ru-  
dem aliquam sanguinis formam illi cōferant, & ut Galenus attestatur, modo  
iecori simillimo ipsum præparent, non facile concessero. Nam si uenis, non  
his solum, sed & omnibus cauæ uenæ propaginibus præter proprii nutrimen-  
ti alterationē, alia quæ toti subseruiret corpori alteratrix uis, quemadmodum  
uentriculo, inesset, ea sanè non in rubrū, at in album quod à uenis amplectere-  
tur, emutaret. si quidem alteratū in nutritione, alterantis colorem ut assumat,  
necessum sit. Iecur itaq; in omnes portæ ramos per substantiā ipsius digestos,  
h h 3 quicquid

*Bilis uesicula  
mentis in  
icore.*

*Substantia ua-  
lis circumfusa.*

*Iecoris liga-  
menta ac ex il-  
lis pronascens  
tunica.*

*Nerui.*

*Iecoris officina,  
ipsiusq; stru-  
ctura ratio.  
Lib. 2. de pſſa  
partium.*

*e Alter A in  
fig. 1. 6 lib. 3.  
fig. cap. 6  
lib. 3. d.  
g 15 fig. inter  
D & D.  
h in 13 fig.  
X, X, habet  
ur inter Z  
& Y.  
i 20 fig. L. et  
fig. 12 lib.  
31.*

*h 18 fig. F. 2  
fi. 1. 6 fig. C  
iuxta A. 13  
fig. d.*

*l 18 fig. G. 13  
O. 20 C.  
22 c.*

*m iuxta A.  
A, B, D 18  
fig.*

*n 2 fig. T. ne-  
cebat A  
et B. atq; i-  
ta H. H. ad  
A, B.*

*o 2 fig. cap. 22  
lib. 4. 2. 12  
fig. T.  
p 2 fig. cap. 23  
lib. 4. 2. 13  
fig. M.*

*q fig. cap. 5  
lib. 3.*

*Quis iecoris  
perficiatur  
sanguificatio.*

quicquid humidum succulentumq; uentriculus cōfecit, in se admittit, & substantiæ suæ ingenita ui alteratrice id emutans, sibiq; quàm similitimū reddens, sanguinē generat. Verūm ut in omni concoctione, ita quoq; in hac iecoris sanguificatione, duplex sit recrementū. Alterum quidem tenuius, alterum uerò crassius. At satius fuerit cum Galeno ad similitudinē actionis, humido liquori iam quidem præcocto, & prius elaborato, indigenti tamen absolutiore adhuc cōcoctione succum assimilare, quem uenæ in iecoris cauū deducunt. Sit itaq; uinum nuper ex uuis pressum, ac in dolia infusum, & quod ab infito innatoq; calore adhuc elaboretur, secernatur, cōcoquatur & ferueat, eiusq; excrementorum quod quidē est graue & terrestre (fecem uocant) in fundum uasorum subsidat, alterum uerò quod est leue & aereum supernatet, hoc autē flos nuncupatur tenuiorib. uinis innatās copiosum, sicut crassiorib. fex residet plurima. Ergo iuxta exempli huius similitudinē, succus à uētriculo & intestinis in iecoris uenas allatus, ab alteratrice iecoris ui cōcoquitur, ac instar musti feruens ad sanguinis benigni generationē alteratur. In hac autē ebullitione, recrementum quantumcunq; lutosum crassumq; est, subsidet, & in lienem (uti uulgò credimus) depellitur. Quod leue ac tenue est, spumę modo sanguini innatat, & à bilis uesiculę meatib. supra uenæ portę ramos in iecoris substantia stratis affugitur. At humidum illud, quod uelut uētriculi elaborationis aqueum existit recrementum in iecur per uenas cum benigno ad sanguinis generationē succo assumptum, à sanguine nondū in iecoris cauo repurgat, sed sui iam maximum præstans usum, nutrimenti uehiculū, ut Hippocrates ipsum uocabat, se esse eleganter ostendit. Sāguis enim in iecoris cauo cōfectus, exilibus ē portę uenę furculis ad cauę uenæ ramulos uersus iecoris gibbum procedit, ad cuius per angustissimos ductus transitum aquosus ille liquor uehiclei ritu plurimum auxilia tur. Caro igitur iecoris, quę proprium ipsius est corpus, primarium sanguificationis est organum. Venæ autem per uniuersum eius corpus dispersę sinus loco cēsentur, in quib. quod ab illa cōfici debebat appositē cōtinetur, & hi postmodum sanguinē præparatum, alijs partib. tanquā proprię iecoris riuuli perferunt. Est autē uenarum, quæ in iecoris substantiā digeruntur, tunica longē tenuior, quàm earum quæ per uniuersum corpus distribuuntur, ne scilicet uim substantiæ iecoris, cuius beneficio contentus in uenis succus elaboratur, sua crassitie retundant: quo fit, ut iecur etiam crassiori sanguine enutriatur, quem tenuis uenarum tunica à iecoris facultate allectum transmittit. Porro ut sanguis diutius in iecore moram traheret, ac perfectam elaborationem experiretur, utq; totus iecoris substantiæ appropinquaret, non unum uentrem illi uelut lagenam quandam rerum Opifex indit, uerūm uenas illas omnes infinita ramorum serie, & in arctissimos ductus digessit. Meatus autem bilis inter utraq; uenas locum obtinent, ut commodo ipsorum situ prius expurgatus sanguis in uenæ cauæ ramos assumeretur. Arteriam autem cauæ duntaxat iecoris sedi arbitramur exporrigi, ut huius tantummodo calorem euentilaret, temperaretq; superiore iecoris parte, quæ septum contingit, ab eodem motu adipiscente continuum. Ne uerò iecur sensus plantæ modo expers esset, & à ui rationali concupiscibilis animæ pars minus moueri cohiberiq; ut sic dicam, possit, Natura iecori neruos exprompsit, quibus ceu freno illa pro imperio uteretur. Tunica iecoris inuolucrum quoddam & tegumentum est: uinacula uerò, ne iecur quum graue sit, aliquando decidat, plura, eademq; ualida illi committuntur.

*Iecoris carnis  
proprie, ue substantiæ ratio.*

*Venarum  
seu riuuli ratio.*

*Bilis meatuum  
sinus ratio.  
Arteria.*

*Neruum.*

*Tunica.*



HANC pulchrè liberam ostendit decimateria figura: iecoris uerò cauo adhuc innexam referunt duodecima & uigesima.



ESICA, bilis flauæ<sup>a</sup> conceptaculum, in caua iecoris parte sedem obtinet: iecori enim, quâ dextrum uentriculi latus amplectitur, sinum insculpi, antea diximus, mediæ bilis uesiculæ portioni exquisitè congruentem. Illi namque sinui superior eius uesiculæ media portio secundum ipsius latitudinem innascitur: inferior autem extra iecoris substantiam deorsum prominet, à nullo cui innititur corpore grauius pressa. Nam uacuo penè interstitio, ad dextrum uentriculi latus con-

*Bilis uesicula  
sinu.*

longq; huc<sup>c</sup> prorepens intestinum cōspicuo incumbit: & sedem, qua commodè flauum tenueq; iecoris recrementum suscipere, idemq; ad intestina depellere posset, opportunam adipiscitur. Forma huius uesiculæ oblonga rotundaq; est, sensim ad ipsius fundi usq; apicem longioris cuiusdam pyri modo dilatescens. Quo enim à caua iecoris sede, ubi portæ<sup>e</sup> caudex educitur, ipsiusq; uesiculæ ceruix consistit, hæc antrorsum magis fertur, eo sensim magis magisq; ampliat. Cum enim, ut reliqua corporis receptacula, capax esse debuerit, ne

*Forma.*

que interim globi modo adamussim rotunda fieri potuerit, ipsius cauitas sua longitudine adaucta fuit, ita nullo à pressuro uentriculo affecta incommodo, ipsoq; iecore non nimis insinuato. Vt autè inanita bilis uesicula, appositè sub-

*Substantia.*

dere, ac impleta uicissim extendi queat, membranea nerueaq; cōstituitur substantia: quippe simplici & unica peculiari cōstat tunica, tenui quidè, sed densa & forti, ac triplici, ut uulgò credimus, fibrarū genere intertexta. & rectas quidem fibras intimas habet, quibus succedunt obliquæ, rectis multo pauiores:

extimæ uerò orbiculares sunt, transversæ<sup>e</sup> ue. Huic tunicæ alia à iecoris tunica obteditur, non toti uesiculæ, sed illius duntaxat parti, quæ extra iecoris corpus depēdet, solaq; propugnaculo & inuolucro indiguit. Vesicula, etiāsi iecori sanguificationis officinæ innascatur, à portæ uenæ tamè caudice<sup>d</sup> duas admodum graciles assumit uenulas, ea serie in ipsius tunicā diffusas, qua in adhærentē<sup>e</sup> al-

*Uena, arteria  
& ueni.*

bam<sup>e</sup> ue oculi tunicā uenulas digeri cōspicimus. Ab arteria quoq; cauo iecoris exporrecta, ramus perquam gracilis uesiculæ offertur, ad ipsius usque fundi extremum excurrēs. Dein<sup>g</sup> neruulis non destituitur, ne sensus sit expers. nam iecoris neruus per humiliore<sup>h</sup> omenti membranam à dextra sexti neruorum cerebri paris propagine costarum radicibus exporrecta, diductus, etiam huic uesiculæ furculum depromit, in macilentis uix minus quam illius arteria conspicuum. At meatus, quibus uesicula bilem allicit, rursusq; aliò depellit, ita se

habent. Vesiculæ<sup>h</sup> ceruix fundo ipsius multo durior, paulatim in angustum definit meatum, ad eam iecoris partem protensum, unde<sup>i</sup> uena portæ egreditur. quò quum meatus peruenit, in duos diducitur processus, hunc quidem

*Meatus exci-  
pienda & e-  
mitrenda bili  
parati.*

furfum, illum autem deorsum porrigens. Qui sursum fertur, anteriori uenæ portæ sedi innitens, in iecur conscendit: & in duas primùm dissectus propagines, unam dextrorsum, alteram sinistrorsum in iecur porrigit. Hæ propagines, singulæ in ipso iecore rursus in<sup>m</sup> alios furculos, & hi in alios rursus tātisper digeruntur, donec innumeram ramorum constituent seriem, per iecoris corpus inter portæ uenæ ramos & cauæ propagines diffusam. Atque hi furculi,

ij sunt, quorum ope bilis in uesiculam defertur. At<sup>n</sup> processus nuper dicti uesiculæ meatus, qui deorsum porrigitur, inferiore membrana omenti

hh 4 suffultus,

d 13 fig. V.  
20 fig. H.

b 6 fig. P.

c 10 fig. L.

d 13 fig. g. et  
figur. cap. 5.  
lib. 3. C.  
e 10 fig. ca.  
14 libri 7.  
h, u.  
f 13 fig. ab  
6 fig. cap. 12.  
lib. 3. f.  
g 13 fig. ab f.  
7 2 fig. ca.  
2 li. 4. ab 8.

h 12 fig. b.  
220 fig. l.

h 13 fig. d.  
l 13 fig. e.

m 13 fig. a  
descenditur  
in X, X in  
ter Z & Y.

n 13 fig. d.

suffultus, parumper obliquè deorsum properat, ac duodeno intestino non procul à ieiuni principio<sup>o</sup> implantatur. Hic processus depulsam ex uesicula bi-<sup>o 13 fig. d</sup> lem in intestina defert, interim nihil ab illis neq; cremoris, neq; flatus, neque<sup>o 15 fig.</sup> ipsius denique, quam deduxit, bilis regurgitatis, admittens. Quod non solum<sup>Q, R. o</sup> tortuosi in intestinum ingressus, sed & duarum membranularum beneficio fit, quæ utrinq; ad orificij latus laxè propendent, influentis bilis ponderi facilè cedentes, & ne quid in meatum regurgitare possit, iter præpedientes: quòd scilicet collectæ, ac meatus os primum subeuntes, id occludant. Non autem una aliqua est membrana ori huic præfecta, uti unus in follibus asser, aut simplex in pilis, quas inflammas, lingula uisitur. Meatus huius in intestina implantatio,<sup>p 15 fig. Q</sup> longius ab inferiore uentriculi orificio, quàm Anatomicorum uulgus existimat, remouetur. An uerò is intestino insertus, simplex omnino sit, aut in<sup>distat ab H.</sup> progressu bipartitò scindatur, unam partem in testino, alteram uentriculi fundo exhibens, hoc loco me dicturum expectas opinor, cum hac de re in scholis indies, & in libris medicorū plenissimè contendatur. alijs affirmantibus, hunc bilis uesiculæ meatum interdum intestinis, frequentius tamen uentriculi fundo inferi: alijs afferentibus, eum quandoq; bipartiri, atque altera portione in uentriculum, altera in intestina tendere: alijs uerò semper hunc bifurcatis, ac perpetuò alterum ramorum, nunc tamen ampliorem, nunc angustio-<sup>q quasi 3</sup> rem in uentriculum distribuentibus. Interea omnes quotquot sunt, autoritatum<sup>o 12 fig.</sup> congerie tantum, non rerum ipsarū inspectione, sese tuentur. Equidem ut semel dicam, quid hīc mihi inter secandum contingere so-<sup>rat paratu</sup> leat, uerè affirmare possum, in uniuerso corpore neq; molestiorē, neq; difficiliorē, mihiq; grauiorem sectionem obuenire, quàm dum inferior omenti membrana, & caua iecoris regio, organaq; contermina sunt<sup>rus.</sup> aggre-<sup>r circa c.</sup> dienda, maximè uerò in homine, aut animali quopiam præpingui. adeò sanè, ut quemuis artificem, licet industrium, facilè hic hallucinari existimem. Nullam igitur (ut quod mihi occurrit, in medium adferam) uel minimam bilis uesiculæ meatus portionem in uentriculū porrigi animaduerti, præterquam in uno pontificis tiremorum remige. Hic enim, ut alijs quibuscumq; organis, & præcipuè circa thoracis costas & musculos, ab aliorum hominum fabrica uariabat: ita & meatum hunc in duas dissectum propagines obtinuit, quarum minor gracilior uel uentriculi fundo, quā primum uena dextram inferioris ipsius sedis regione ambiens, uentriculo committitur, inferebatur. Vir iste calidi quidem, succique temperamenti fuisse uidebatur. Vt autem resciscerem, num uomitu bilioso, quem huiusmodi hominibus frequentem Galenus esse testatur, uexari consueuisset, ab eius familiaribus diligentissimè quæsiui, ecquid eiusmodi in illo obseruassent. Asserebant itaq; se nunquam illum uomentem, aut in maximis etiam procellis nauseabundū uidisse: uerū ut erat robustissimus, ab omnibus eum prædicari affirmabant, quòd longissimo spiritu subinde cornu inflaret, omnesq; commilitones graui uoce, & uno spiritu recensendis numeris longè superaret. Verū non semper meatus huius, de quo in præsentī agimus, portionem in uentriculum deduci, hinc mihi abundè persuadeo, quòd inter disseccandum, hoc à conterminis uasis membranisque liberato, nullum foramen appareat, ex quo ad uentriculum propago eius meatus deducatur. quod sese offerret, si nodò uel minima quæpiam propago à præcipuo meatu diducta, per incuriam præcinderetur. Nam si uel acu meatum pertundas, ac bilis uesiculam digitis cōprimas, bilis ex meatu defluit, quæ citius ex propaginis eius (si quam Natura condidisset) orificio promanaret. Ad stipulatur itidem ratio. nam si<sup>o 14 o 15.</sup> diligenter

*Bilis uesiculæ  
meatus diuode  
no inferius an  
propagine uen-  
triculo offerat.*

*Ex bilis uesicu-  
la meatum in  
uentriculū nō  
semper perti-  
nere.*

*quò bilem ex  
purgare con-  
duxerit.*

diligenter expendis, eum meatum bilem intestinis offerentē, non in quamcunq; siue uentriculi, siue intestinorum sedem decenter inferi potuisse: sed in quam & meatus ipse tutò implantandus, uentriculoq; & intestinis minus incommodaturus, biliosum istud recrementū expurgare posset, nō debuisse ad uētriculum ne meatulū quidem inferi, uel citra sectionē ferebere. Tutò enim ducuntur, quæ neq; procul, neq; alijs organis incôcomitata procedunt: quod huic meatui usuuenit, qui nulla succinctiori uia, aut in uentriculū, aut in aliam intestinorum partem inferi potuit, quàm ea qua nunc implātur: & interim tutò portē uenæ caudice, & inferiori mēbrana omenti deorsum modicè proprepens suffulcitur. Quòd si uentriculo inferēdus fuisset, non adeò commodè atq; nunc omenti membranis sustineretur: & obliquos anfractus faciēs, etiam longiùs abduceretur. Eodem modo, si biliosam hanc superfluitatem oblongo meatu ad sedem usq; (ut in intestina primū illic defluēs, unā cum fecibus excerneretur) Natura perduxisset, metuendū erat, ne tenuis meatus quauis occasione ocyus rumperetur. Quòd autem materia hæc nutritioni inepta, duodeno autem intestino aptissima, haudquaquam uentriculi fundo innoxie immitti potuerit, primū ex bilis natura, dein ex uentriculi & intestinorū munibus, postremū pituitæ, quæ ab utrisq; necessariò in illorū obeundis functionibus asseruatur, examine, & è curatione quam huic exuberanti pituitæ adhibemus, discere licebit. Nam bilis flauæ naturā tenuem fluxilemq; esse, & dein pituitæ incidentē, detergentemq; ac expurgantē, si quando nimīū abundat, curationem adhiberi, medicorū præcipuis concessum est. Deinde cibum, quousq; concoctus sit, retinendum, ocyssimè uerò cremorem confectū per gracilia intestina deducendū, nemo ambigit. Ventriculo itaq; pituitæ istius incidentæ expurgandæq; gratia bilem deferēs meatus utilis fuisset: uerū quia ui retentus uentriculo utendum maximè fuit, summò malo Natura nonnihil boni nequaquam prætulit. Nam si uentriculo bilis influeret, tum ille (uti Galenus rectè affirmat) huius mordacitate perpetuò ad excernendum irritaretur: neq; tantisper, dum cibus probè cōfectus esset, retentrice sua facultate fungeretur: & bilem illā respuens, eiusq; occasione nauſeabūdus, quod sibi offerretur, minus quàm decet, ambiret, amplectereturq;. At quo minus in intestina bilis influeret, nihil omnino obſtitit. Hæc namque pituita, quæ in gracilibus illis ductibus ex intestinorum munere coaceruatur plurima, incidit, detergit, atq; expurgat. deinde intestina irritans & mordens, ad fæces excernendas inuitat & stimulat: & ipsa quoque unā cum excrementis nullam (quum lege Naturæ omnia in homine dispensantur) noxam, sed, uti liquet, summum usum præstans, è corpore tandem propellitur. Meritò igitur intestinis, non autem uentriculo, meatus ille bilem deferens implātur, neq; obiter cuius intestinorum sedi, sed ferè duodeni termino: quòd id primum intestinorum sit, quodque in eo bilis suum, quem in intestinis præstat, usum citius conferre, potest. Et interim duodeni ad ieiunum terminus tantū à uentriculo remouetur, ut rariùs bilem in uentriculum ex intestinis sursum conscendere contingat. Quanquam & id biliosis naturis familiare sit, quoties his ieiunus uenter paulo diutius (ut ipse quoque nonnunquam experior) torquetur. At homines qui bilis uesicula carerent, quos Aristoteles enarrat, & post hunc cum alijs permultis Plinius, hos uita firmissimos esse affirmās, hætenus nondum comperi. Quanquam facile fieri posse arbitrer, ut ex icore ad intestina meatus aliquis bilem deferat, ita ut ea in uesiculam quampiam prius non colligatur. Imò haud mediocriter inter discendum mirari solitus sum, cur

*bilis in intesti-  
na fluxus ui-  
litas.*

minus



minus bilis recto ductu ex iecore in intestina pellatur. non ignarus interim subtilis eius Anatomicorum cōmenti, qui bilem in suam uesiculam asseruari docent, ut iecur à putredine uindictet: haud expendentes, quàm innumeros bilis folliculos cerebro, lien, pulmōni, & plerisq; alijs corporis partibus, ne ipsæ quoq; putredinem contraherent, Naturam adhibere oportuisset.

## DE LIENE. CAPVT IX.

*LIEN* potissimum quatuor tabellis decim. a. nona figura exprimitur. earum namq; prima lienis cauum cum omenti portione illi connata exprimit, secunda lienis cauum omento liberum, tertia lienis gibbum, quarta eiusdem substantiam utcumq; proponit. Quamquam etiam lien in corpore adhuc seruatus, in secunda figura ad characterem d, & in sexta ad G, & in uigesima ad O, O, P occurrit.

Lienis situs,



**L**IENEM ad sinistram uentriculi sedem, secundum inferiora tamen magis, ac posteriora, locari, iam antea recensuimus. Non enim is, ut uulgo arbitrat, sano alioquin homini, ad abdominis quasi medium, anterioraq; prominēt, neque etiam tactu admodum deprehendi potest: quamuis interim medicorum plerique illum an mollis, an durus sit, in omnibus sese æquē cōtingere, persuasum

Forma.

habeant. Lien itaq; sinistrae parti<sup>b</sup> septi transuersi, medius ferē inter sinistram uertebrae corporum sedem, & spuriarum costarum eius lateris cartilagine innotitur, costis adamussim ceu tutissimis uallis septus, formamq; obtinens sedis suae effigiei congruentem, ac perinde ut iecori à uicinis partibus ipsi impressam. Quā enim septum cōtingit, ut id leuiter inibi cauum est, ita etiam lien leuiter gibbus cernitur. Quā uentriculus lienis quodāmodo innititur, ut

d 6 fig. G.  
20 fig. O,  
O, R.

b 7 mscu.  
tab. 5.

c Specta figuram 19.

Lib. 4. de resu  
part.

amplius ille, & instar grādiōris globi hic extuberat: sic quoq; lien humanus mo dicē, ac in superficie duntaxat, cauus occurrit. Nam porcis, canibus ac bobus, quum longior, sed arctior interim lien obtigerit, ac uentriculi gibbo in ijs longiori intervallo obtendatur, magis quoq; cauus, magisq; tertiae circuli partis modo uentriculum complectitur, iureq; Galeno in illorum potius animalium sectione, quā hominum uersato, longus nuncupatur. Homo enim crassum & magnum & latum, sed multo breuiorem quā illius generis animalia, lienem habet: non tamen exactē, ut quispiam fortē à spleniorum forma monitus arbitraretur, quadratum. Longitudo namque latitudinem ipsius utcumque superat, deinde superior pars inferiore paulo latior uisitur, ut linguae ad incisorios dentes tantum protensae imagini proximē accedat. unde etiam lien, linguosum<sup>i</sup> uiscus nonnullis appellatur. Humilior enim ipsius pars, ad corporis anteriora magis protensa, in obtusum definit angulum: superior autem in obtusorem adhuc angulum, ac ueluti latus quoddam ad eō comprimitur, ut haec pars utrinque unum obtusum exprimat angulum. Sinistrum latus leuiter gibbum est, dextrum uerō duabus quoddammodo leuib<sup>us</sup> impressionibus modicē sinum. Lienis magna, omniq; ex parte propemodum aequalis crassities, ab ipsius latitudine, ac multo adhuc magis à longitudine uincitur. Cauum lienis profundiore<sup>b</sup> linea secundum eius longitudinem rectā incedente abundat: quae inaequaliter extuberans, sinuataq; lienis uasa (ut mox audies) admittit. At reliqua lienis superficies non ita exactē ut iecoris, aut renum, laeuis est: sed obscuris quibusdam, leuiterq; prominentibus tuberibus, ad eam ferē formam, qua elephantia morbo insigniter laborantium cutis, uariē extumescere consueuit. Neq; illi solum inaequali cutis superficiei, lien tuberibus respōdet: uerū etiam colorē quoq; illius

d 19 fig. E.

e 19 fig. D.

f 19 fig. F.  
g 19 fig. G.

h 19 figur.  
H, H.

Lienis superfices ac color.

illius affatim exprimit. Parisijs enim in diui Lazari monasterio, & in plerisque superioris Germaniæ agris, & alibi quoque, elephantiasi morbo affectos uidi, nigricantem lienis humani colorem superficiemq; ita exquisitè referentes, ac si quis ex liene eos confinxisset. In homine namq; hoc uiscus atro quodam, & perquam obscuro colore nigricat, in cane autem splendidius plerumque ipso iecore rubet. Sues uerò & boues albicantem magis lienem ostendunt. Deinde eiusmodi colorum discrimen, non in lienum tantum superficie, uerum & in ipsorum quoq; corpore utcunque occurrit, siue crudi, siue cocti lienis examini adhibeantur. Hominis namque uiscera non inutiliter in aqua interdum leuiter elixantur, aut saltem, quo sanguis impensius increascit, in calidam aliquandiu submerguntur: quum fluxilis scilicet adhuc sanguis, non nunquam obstare soleat, quo minus iecoris, lienis & pulmonis fabrica adamussim examinari possit. Cæterum lienem præcipuè ita nonnunquam condensandum duxi, quòd de ipsius usu uehementer ambigerem, uenasq; & arterias longè aliter in illo, quàm in iecore, pulmone & renibus dispersas intuerer. Lienis namq; substantia crasso nigroq; admodum, sed solidioris spongiæ, aut leuioris punicis instar, raro tamen còcretoq; sanguine constare mihi uidetur, frequentibus fibris filamentisq; non insigniter ualidis distaxat implicita. Ut enim multas uenas & arterias lieni inferi certò cognoscimus, nullæ tamen perinde ac in iecoris & pulmonis corpore, per substantiam ipsius dispersæ animaduertuntur, nisi perquam raræ, eademq; admodum graciles: non aliter quàm si, simulatq; rectam lienis lineam uasa ingrediuntur, in innumeram ramorum sobolem diffunderentur, adèd tenuium, ut cavitatem quodammodo carentes, fibræ potius quàm uasa nuncupandi essent. Hisce ramis seu fibris undecunq; in se conuolutis, crassus admodum sanguis obducitur, quem Erasistratus hic quoq; quòd uasis circumfunditur, *ἀσχυρμα*, uti & in iecore, appellauit. Neq; profectò tenuis sanguis, quo lienem uulgò propter arteriarum frequentiam enutrirî damus, sola raritatis substantiæ lienis causa esse uidetur, sed innumerus ille fibrarum (uix ausim enim arteriarum dicere, & uenarum) implexus. Talis igitur mihi lienis in sanis hominibus apparuit substantia. In quodam uerò elephantiasi laborante, quæ nondum penitus radices egerat, turgidiorem maioremq; lienem reperimus: in reliquis autem, sano similem. In ciue Patauino, qui annis tribus carcere detentus, & tandem nigro arquato in maximis mœroribus defunctus, publicæ sectioni adhibitus fuit, lienem præter cætera minus crassum latumq; & exiguum omnino reperimus, & gibbæ eius parti adipem adnatum, instar candidissimi durissimiq; lapidis concretum. Substantia uisceris huic erat arida, & impense dura. Qui Montisselis suspensus, ad Patauinas scholas in corporum penuria aduectus fuit, adèd grandem exhibuit lienem, ut modicè admodum iecoris moli cederet, & anteriori iecoris parti adnatus, anteriori quoque uentriculi sedi exporrigeretur. Lienis eius substantia, sanorum uisceris substantiæ penitus respondebat. Adolescens hic erat candidissima & glabra cute, minimèq; natura melancholicus, aut alioquin ualetudinarius. Galli sacerdotis Bononiæ in xenodochio, aqua subter cutem mortui, lienem albidum, sed exiguum adinueni, perinde ac Augustæ in muliere textrice, in cuius utero serosæ aquæ supra sexaginta Augustanas mēsuras, quæ singulæ tres pendunt libras, post mortem, unà cum multis medicis reperi, nullibi interim circum intestina præsentē aqua, aut laxo in manibus aut pedibus tumore, aut etiam uiscerum, aut alterius cuiusdā organi sese alioquin offerente uitio: præterquam quòd magnus ille uterus, cuius

*Hominis uiscera ad ipsorum fabricam descendit haud inutiliter coqui.*

*Arteriarum per lienis corpus series.*

*Lienis substantia.*

fundi os miris modis occalluerat, tota anteriori sua fede peritonæo erat con-  
natus. & dextri testis glandulæ miris modis non secus excreuerant, quàm si  
nouem decem'ue anserum, aut struthiocamelorum potius oua uni inessent  
membranæ, singula humore ouorum albo non absimili, aut paulo crassiore  
oppleta. Bello armatus insignis Iurisconsultus, posteaquam annis multis pal-  
luit, & ueluti lienosus à medicis iudicatus fuit, ex paruo uenæ portæ caudicis  
erupto & sanguinē uniuerfam corporis in peritonæi cauitatē trāsmittente ab-  
scellu derepētē mortuus, cōtractissimū, & magna ex parte in caua ipsius regio  
ne consumptū, & agnini pulmonis modo rubens iecur, nobis eius uiscera Pi-  
sis, ut Senas transportaretur, eximētibus ostendit, cum molli magnoq; admo-  
dum liene, sanissimi iecoris instar colorato. Prosper Martellus, quum multis  
annis regio morbo laborasset, & subitò ex bilis in uentriculum miro confluxu  
Florentiæ expirasset, iecur habuit magnum & durum & uiride, cum molli in-  
gentiq; liene. quorum historias plenius recenserem, nisi hic ægrorum (quos à  
me dissectos, non pœnitendo ad morborum cognitionem opere, diffule ali-  
quando persequar) nullam mihi uellem esse rationē: qui uel horum nunc obi-  
ter memini, ut lienis substantia, de qua non mediocres controuersias in scho-  
lis iam proponimus, à studiosis sedulò expendetur. Cæterum<sup>i</sup> uenæ, arte-  
riæq; & nerui lienis in hunc habent modum.<sup>k</sup> Minor seu sinister uenæ portæ  
truncus, inferiore membrana omenti suffultus, transuersim ad lienem tendit,  
posteriori primū uentriculi sedi, eiusq; elatiori orificio, & humiliori mem-  
branæ omenti, adeoq; ipsi colo, quā uentriculo exporrigitur, ramos offerens:  
quos ubi deprompsit, reliqua ipsius portio in duos primū ramos, deinde hi  
rursus in alios disseminātur: ut tandem multiplici serie per humiliorē omen-  
ti membranā ducta, cauæ lienis sedis medio secundū<sup>m</sup> rectam lineam im-  
plantentur. Priusquam uerò in lienis substantiam deperdantur, ab insigniori  
ramo uisceris humiliora petente, uena pronascitur, sinistram fundi uentriculi  
sedem amplectens. Ab alijs uerò lienem adeuntibus ramis modò<sup>n</sup> tres, modò  
etiam plures rami enascuntur, in sinistrum uentriculi latus, uti sæpe prius re-  
latum est, excurrentes, nequaquam autem ad superius usque uentriculū<sup>o</sup> orifi-  
cium (si quid saltem sectione assequor) conscendentes. Quemadmodū uerò  
lienem petentes uenæ inferiore omenti membrana suffulciuntur, sic quoque  
rami ab illis uentriculum accedentes, superiore membrana omenti<sup>p</sup> sustinen-  
tur, cuius ut & uasorū quoq; interuentu lien uentriculo connascitur.<sup>q</sup> Arteriæ  
frequenti itidem serie lienī implicitæ, ortum ab illa ducunt arteria, quæ à ma-  
gna arteria, supra renum regionem pronata, inferiori membranæ omenti in-  
nascitur, ac sinistrorsum lienī potissimū offertur, pari prorsus cum uenis se-  
rie in ipsum pertinens.<sup>r</sup> Nerui lienis à sexti neruorum cerebri paris sobole pen-  
dent, quæ sinistrilateris costarum exporrigitur radicibus, & furculum humi-  
liori membranæ omenti mittit in lienis potius tunicam, quàm ipsius substan-  
tiam spargendum. Lien enim non minus quàm iecur tenui quadam & sim-  
plici obducitur tunica, ab omenti<sup>s</sup> membranīs, quæ lienis rectæ lineæ inna-  
scuntur, orta. Hæ namque membranæ, lienis cauo insertæ, in ipsius degene-  
rant tunicam. Et quia à peritonæo originem ducunt, earundem beneficio in-  
teruentūq; peritonæū ipsum lienī tunicam offerre, merito dicimus. Sed præ-  
ter lienis ad dorsum & ad uentriculum, omenti auxilio nexum, à peritonæo,  
qua septum succingit, tenues interdum fibræ impari numero lienis gibbo ad-  
nectuntur, ipsi quoque septo lienem colligantes. Verū ut in hominibus hu-  
iusmodi fibræ rariùs reperiuntur, ita in canibus nunquam. Aliquando etiam  
lienīs

Vnde lienis ue-  
næ, arteriæ &  
nerui ducun-  
tur.

Lienis tunica.

Ipsi nexu.

i Oslendit  
harum fe-  
riem 4. fig.  
ut 3. & 4.  
insuper 1  
tab. fig. 10.  
h fig. cap. 1  
lib. 3. F. d. d.  
fundes pri-  
mum K. L.  
M. N. S. di-  
uiditur in  
T. T. et hic  
4. fig. p.  
l 2. tab. 19  
H. H.  
m fig. ca. 5  
lib. 3. Z.  
n fig. cap. 5  
li. 3. X. X.  
Y. & 1. fi.  
& 8.  
o 14. 1. fi.  
gur. G.  
p Oslendit  
id 3. fi. & 1  
tab. fig. 19.  
q fig. ca. 12  
lib. 3. A. A.  
ab m. ant  
4. fig. B.  
r 2. fig. ca. 2  
lib. 4. A.

510 fig. B.  
B. C. C.



110 fig. V  
subijciatur  
O, P, O.

Lienis usus ac  
functio.

lien is gibbum exteriori ren is sinistri inuolucro, quod multa abundat adipe, fibrarum quarundam medio firmatur, potissimum si ren lieni (ut non infrequenter fit) magna ex parte succumbat. Atque hæc est lienis situs, formæ, & partium historia, quàm iuste uerò corporis nostri architectus omnia dispensauerit, lienis edocebit usus, & functio: de qua non medicorum modò proceres, uerùm & philosophorum præcipui dissenferunt. Erasistratus namq; uulgi opinione (quod cursoribus lienem ponderis & dein punctilis doloris uitandorum gratia, eximi stultè credit) persuasus, licnem frustra factum esse quodammodo attestatur, dum ait, Naturam timentem necubi artis suæ obliuisceretur, quum foetui uix dum concepto iecur in dextris conformaret, in sinistro quoq; latere aliquid molitam esse, & consistentem in eo lienem iecori opposuisse: perinde, ac si ipsa uentriculo paululum in sinistram producta, creationem superuacua uitare nõ ualisset. Aristoteles communem usum, quem omnibus tribuit uisceribus, lien i quoq; primùm ascribit, uidelicet quo uenæ, utpote penfiles, copia uiscerum sustineri & stabiliri ad corpus possint: Quasi enim (inquit) anchoræ partibus appensæ, uiscera ad corpus iaciuntur. Deinde iecoris lienisq; usum priuatim docens, su biungit: Iecur & lienem ad ciborum concoctionem auxiliari, & lienem uapores uagantes diuertere, & ex uentriculo attrahere, cosq; posse còcoquere, ut qui sanguineus sit. atq; ut semel dicam, Aristoteles lienem adulterati iecoris loco recenset. Eodem modo autor libri de Respirationis usu, quem Galeno falsò tribuunt, præter quædam de uenis, quæ gibbo lienis inferi arbitratur, nugamenta, lienem ex uentriculo & intestinis confectum cremorem per uenas uentriculi & intestinorum assumere, ac sanguificationis organum esse contendit. Huic sententiæ nõnulli etiam medicorum, perinde ac in quarto de Morbis libro Hippocrates propemodũ, subscribunt, lienem iecore malè affecto, nomine iecoris sanguinem elaborare affirmantes. At qui cæteris dissectionũ professoribus probabilior esse uidetur lienis usus, in hoc illum à Natura fabricatum docet, ut lutosi sæculentiq; in iecore cõfecti sanguinis sit receptaculũ, utq; quemadmodũ tenuiori leuioriq; rcremento bilis uesicula præficitur, ita lien crassiore & grauiore suscipiendo extruatur. quod lien ad se per portæ uenæ truncum, tanquam familiare alliceret exugeretq; attractum aut conficeret, elaboraret, ac suæ nutritioni aptum redderet, sanguinem illum, & si crassus sæculentusq; sit, rarum spongiosumq; efficiens. Ad quod præcipuè opitulari aiunt frequetes in lienẽ insertas arterias, suo calore ad exactã sanguinis illius elaborationẽ strenuè auxiliãtes. Sed quòd primarius præcipuusq; huius actionis opifex, lienis habeatur caro, etiam si id non dicam, manifestum esse, haud ambigo. Atq; ita etiam his autoribus cõcessum est, lienem nõ uniuersum sanguinem quem à iecore admittit, conficere, ac in sui nutrimentum reponere: uerũ quicquid nutritioni ineptum continet, suæq; substantiæ adaptari nequit, in uentriculũ magni cuiusdam usus gratia reuomi, ipsis creditur. Primùm enim omnes affirmãt, succum melancholicum à liene in uentriculũ eructari, alij quidem per uenã à liene in uentriculum pertinentẽ, alij per propriũ quendam meatũ, atq; inde à uentriculo in intestina, & hinc unã cum fecibus è corpore expurgari. Porro uenam illam, aut meatum, nõnulli simpliciter in uentriculũ à liene duci scribũt: alij insertionis locum intrepidè exprimẽtes, illum in superius uentriculi orificiũ implantari adiiciunt. Par etiã in eius excrementi usu assignando, inter dissectionis proceres occurrit dissensio. nam alij per quàm utile & amicũ uentriculi functionibus hoc esse, sicut bilem flauam inimicũ & hostem perniciosissimũ astruant.

Quid lien in  
uentriculum e-  
ructet, & qua  
meatu.

sed alij quidem contenti sunt, si doceant, atram hanc bilem sua saporis qualitate, quam acerbam & acidā esse fatentur, omnes uentriculi functiones, quæ in amplexu quodam consistunt, astringendo & colligendo corroborare, ac proinde, ne incofectus à uentriculo cibus elabatur, prohibere. Alij autem hoc tantum usu non cōtenti, iam dictis addunt, uim uentriculi appetitricem isto excremento adeò incitari, ut eius præcipuè usus gratia uenam meatum' ue à liene in superius uētrici orificium inferi statuant: imaginatione solum, non sectionibus ita edocti, Ego sanè de hac recrementi lienis in uentriculum eruptione, & eius usu, nihil affirmare audeo: neq; etiam sectio, hæc, quæ tamen citra ulla cōtrouersiam Anatomes professores audacissimè asserunt, mihi luculenter commonstrat. Primum enim nullum meatum illi, quo bilis in intestina repurgatur, similem esse haud ambigo: uenæ autem, quæ sinistro uentriculi lateri implantatur, non à lienis" prodeunt corpore, sed ab illis quæ iam lieni inferuntur. Neq; alia penitus harum uenarum per uentriculum series uisitur, quàm reliquarum omnium, corpus uētrici petentium. dein nulla hic prorsus est uena, cōiuge carente arteria. Postremò, si quid in uentriculū à liene deferatur, id potius uentriculi fundum petit, quàm superius illius orificiū. \* Vena namq; sinistrā fundi uentriculi sedem perreptans, omnium uenarum uentriculo ab illis quæ lieni exporriguntur oblatarum faciliè maxima occurrit. Quanquam neq; hæc uena, uti nec alia quæuis, sinistrum uentriculi adiens la tus, ullo alio turgat sanguine, quàm reliquæ uentriculum implicant uenæ. adeò sanè, ut nisi multorū modò metuerem calumnias, quas hætenus non mediocri meo malo expertus sum nimium graues, hic mihi argumenta non deficerent, quibus uulgatā, omnibusq; nunc persuasissimā de lienis munere sententiam interturbare. Verū interim nemini non cōcessum est, lienē suo calore innato, ac frequentibus qui illum intertexunt arterijs, uentriculi concoctionē fouere. Quòd autem uulgo lien risus autor habetur, hinc sumptum esse cōiicio, quòd crassum, fæculentum & lutosum sanguinem ad se allicere, reliquumq; sanguinem agiliorem, ac, ut ita dicam, hilariorem reddere creditur. Porro lienis beneficio, cor præcipuo quodā usu (uti ferè de cerebro celsuit Aristoteles) refrigerari (quod Arabum præcipuis affirmatur) non autumo: quum is cor non contingat, & si quod illi innatum esset frigus, lienis arteriæ id ad cor haud deducerent.

n Videre id  
est in fig.  
ca. 5. li. 2. &  
3. fi. & 1. li.  
fig. 10.  
x fig. cap. 5  
lib. 3. Z.

## DE RENIBVS. CAPVT X.

*RENES* pingui ipsorum membrana adhuc indutos, uigesima commonstrat figura: uigesima autem secunda, & uigesima tertia, ac uigesima quinta figura, renes ea membrana liberos proponunt. Vigesima uerò prima figura, tribus tabellis internam renum fabricam harmoniamq; concinnè spectandam offert.



**R** GANA bili flauæ, & fæculento lutosoq; sanguini expurgandis sacrata, sermo præcedens iam pertractauit. Hic uerò illis dedicabitur, quæ sanguinem in cauam uenam ex iecore missum, seroso aqueoq; humore colant, quem cremoris ex intestinis in uenæ portæ surculos sumēdi, & elaborati sanguinis ex iecoris cauo in gibbum eiusdē ducendi, uehiculum esse dicebamus. Hunc enim, postquam proprium opus expleuit, neq; sanguis per plures ita angustos meatus ducēdus est, nō decet amplius in corpore omnē asseruari, uenis alienis onus futurū. Huius igitur muneris occasione<sup>a</sup> renes, quòd recrementū istud aqueū, & bilē ipsam, & fæculentum sanguinē copia superat, bini sunt facti, situm, formam, to tamq; constructio-

Renum nune  
rim & sum.

410 fig. 1,  
V. 21 Y, Z.

b 33 figura  
 cha. 3.  
 c 35 fig. Y  
 nictum est  
 L. aut 22 ff.  
 o ad c.  
 d 30 fig. V  
 sub O. O.  
 e 7 muscul.  
 tab. 2.

constructionem illi muneri idoneam obtinentes. Quo ocyus enim renes humorem serosum, quem urinam & lotium uocamus, sanguini adimât, quam fieri potuit proximè ambo iecori allocâtur. Dexter enim<sup>b</sup> superiore sua parte humillimam iecoris portionem<sup>c</sup> contingit, in canibus ac capris sinum etiam in iecore sibi, ut altius collocaretur, insculptû, appositè subiens. Sinister uerò aded altam sedem occupat,<sup>d</sup> ut & lien<sup>e</sup> aliqua ex parte substernatur. Vterque uerò iuxta uertebra<sup>f</sup> corporû latera, humiliori<sup>g</sup> septi sedi incumbit, qua id tribus humilioribus costis obducitur, ea potissimùm parte, qua illæ in posteriora impensius obliquantur. Is enim costarum in posteriora flexus, ita opportunam renibus sedem offert, ut & tutò uallètur, & antro<sup>h</sup>sum prominentes, cæterorum nutritionis organorum sedem haud occupent. Quæ nisi respexisset Natura, unum forsan semper, eundemq; maximum (ut interdum in habentibus ventrem impense prominulum, & uiciatam costarum ductum, illam moliri uidimus)<sup>i</sup> super uenæ cauæ & arteriæ magnæ corpora renem collocasset, breuiori succinctiori<sup>j</sup>; compendio serosum sanguinem attracturum. Non enim renes, ut alijs scribitur Anatomicis, lumborum<sup>k</sup> musculis, qui dorsi & famoris hic famulantur motibus, prorsus internuntur. imò non multo humilius quàm costę sunt, uel<sup>h</sup> infima sui parte uersus ilia descendunt, etiam si alter altero semper sit elatior, neq; ad amussim è directo mutuò opponantur. Quum enim lien demissiùs quàm iecur descendat, uterq; autem ren uenæ cauę, quàm sub iecoris corpore ducitur, uicinus esse cõtendat, meritò dextrum sinistro elatiorem esse plerunq; cernimus. quippe nõ rarò etiam sinister dextro elatior obseruatur, in ijs præcipuè quib. minor lien & maius iecur obtigit: perinde ac si id dextrû renem deorsum deprimeret, ille autem sinister altius ascendere, sibi<sup>j</sup>; subijci sineret. Porro contrarium hunc situm renibus non tam loci, quo aptè locari possent, occasione, quàm ne è directo utriq; serosum sanguinè attrahant, ac unus in contrariû reuellens, alterius munus prohibeat, accidisse constat. Neq; etiam in renû situ Galeni ratio probâda est, qua dextrum sinistro editior<sup>k</sup> esse docet, ut secundû rectitudinem magis trahat, quum ea quę dextro uenę lateri ascribit, nõ magis illi quàm sinistro lateri sint propria. Nemo enim sanæ mentis ex iecore in dextrum uenæ cauæ latus plures uenas, quàm in sinistro pertinere fatebitur, si ad amussim eius uenæ secundum iecoris posteriora<sup>l</sup> ductum contemplatus fuerit. Cæterum utcunq; renes situ inter se discrepent, neuter tamen alterius altitudinè, quanta media est illorum longitudo, superat unquam. Sûnt enim humani renes<sup>m</sup> oblongi, & minus<sup>n</sup> lati, omni<sup>j</sup>; ex parte æqualiter propemodum crassi.<sup>o</sup> Anteriùs nanq; & posterius comprimuntur, & in<sup>p</sup> latere quidem exteriori ad amussim orbiculares & gibbi, paulo<sup>j</sup>; crassiores apparent. in<sup>p</sup> interiore autem (quod exteriori breuius est) partim gibbi, partim caui. In media enim interioris lateris sede sinum profundius sibi impressum ostendunt, superius inferiusq; uelut in acutum angulum definientem, in medio autem extuberantem.<sup>q</sup> Superiore etiam parte renes paulo quàm<sup>r</sup> inferiore latiores sunt, ea donati magnitudine, quæ probè quantû sanguini ex usu est, seroso humore illum emundât. Superficiem iecoris gibbo similiter impense leuè & lubricam fortiùtur, ut & colorè inter se rubrum & resplendentè. Substantia nanq; cõtstant carnea, densa, admodû<sup>j</sup>; solida & dura, parumq; à cordis substantia uariante, præterquam quòd nullis omnino fibris intertextitur. Renum enim substantia fibrarum, ut & iecoris pulmonumq; substantia, expers est: uasorum per ipsam diffusorum fibrarum ad attractionè, retentionem & expulsionè pulchrè famulantibus. Quum

Lib. 5. de resu part.

Renum forma.

Magnitudo.

Substantia.



Renae ac arteriae  
in renibus ob  
lata.


enim renes sanguinis serum excolare oporteret, neq; commodè uenae cauae, magnæq; arteriæ corporibus (ut iecur ad uenam cauam) adnasci potuerint, <sup>122 fig. 8, b, in Specula 12 figuram.</sup> insignes rami à uena ac arteria in ipsos deducuntur. Ac à caua quidem duo grandes rami, utrinq; nimirum singuli, ad singulos renes enascuntur, qui non è directo inuicem produnt: sed pro renum situ, origine uariant, dexterq; ramus elatius sinistro principium possidet, siquidè ren dexter altius collocetur: si uerò sinister superiorè dextro sedem sibi uendicet, sinister quoq; ramus elatius dextro à caua pronascitur. Ac par sanè arteriarum est ratio, quæ sub uenis protensæ, unà cum illis transuerfim ad renum sinus, quos in internis ipsorum lateribus gerunt, perferuntur. Quum primum uerò in hominibus ad illum alterius renes sinum uena ac arteria peruenerint, in duos ramos, priusquam renem subeant, ambæ diuiduntur, unum ramum superiori eius sinus angulo, alterum inferiori offerentes. In ipso autem uasorum ad renes progressu, arteriæ admodum rarò à se ramulos diffundunt, sed totè in renes absumuntur. quum interim à sinistri renis uena, feminalis uena sinistru petens testem depromatur: ab ea autem quæ dextrum renem adit, ramus in pinguem membranamq; renis tunicam numerosa sobole spargatur: quod & sinistra uena interdum imitatur, dum ren sinister elatiorem dextro sedem obtinet. Cuiusmodi uerò hæc

Renis in inter-  
nis sedibus con-  
formatio.

pinguis renum sit tunica, paulo post exequar: nunc enim uasorum per renis corpus ductum ac distributionem, unà cum ipsius sinibus, & meatus urinam è rene in uesicam deducentis ortu, propter continuum de uasis sermonem, perscribere aggrediar. Atq; utinam hæc ita ob oculos ponere possem, ac si præfens essem, leui admodum opera in renis sectione demonstrarem: maxime quum tot fabulæ de renum officijs, sinibus, membranis, & quæ in renibus distribuuntur uasis, hæctenus cæteris dissectionu professoribus effictæ sint. Galenus simpliciter ait, uenas ac arterias per renis corpus diffundi: & per spissam duramq; renum substantiâ, retento sanguine, urinâ cum bilis quæ sanguini adest portione transmitti, inq; urinarium meatum, à rene in uesicam pertinentem, effluere. Nostorum medicorum, & qui Galenum sequuti sunt omnium, hæc exprimere studentium, alij perperam oscitanterq; renis fabricam aggredientes, & quæ hæc uasorum sit distributio & situs non obseruantes, necio quas colatorias membranas ementiuntur. Alij sectionem auersati, & in altis cathedris sedentes, sibi que ipsis mirificè placentes Promethei, abundè suo munere se perfundos esse arbitrantur, si discipulis imaginatione hominem confingant. Atq; hinc illud est, quod præcipuos nostræ ætatis medicos & docuisse & scripsisse scio, nobis triplicem, quo urina à sanguine in renibus discernitur mo-

et Hic in  
notando ut  
minus sim, se  
riatim spe-  
ctabis tabu-  
las 21 figu.

- D P A B V S his figuris medicorum de urina exco-  
latione commentum exprimere conatus sum, ac superiore  
quidem figurâ renem ab ipsius gibbo uersus sinum ca-  
uam uel dissectum sinui, inferiore autem renis duos axes  
media spectatur portio. Ceterum quid singulis indicetur  
figuris, ipse characteru Index in hunc modum edocuit.
- A Vena & arteria, serosum sanguinem reni offerentes.
- B Sinus, in quem medici uenam & arteriam uiper dictos  
serosum sanguinem profundere docent.
- C Sinus, in quem urina ex iam dicto sinu colaretur.
- D Renis substantia, orbiculatim sinus hos amplectens.
- E Beatum & nuptissimum renis colatorium, seu mem-  
brana cribri modo peruia, & urinam ex sinu B indicato  
in sinum C infigentem, unâ cum bile promanare sinens.
- F Primam è rene ad uesicam deferens meatum.



dum excogitari posse: non addentes interim, quid in ipsa hominis sectione appareat, sed sibi sinus & ductus suo arbitrari effingunt. Aded sanè, ut nunc omnibus recepta probataq; sit opinio, duos in renibus esse sinus, secundum uisceris longitudinè sitos, elatiorem scilicet unum, demisiores alterum, qui transuerfa quadam membrana interdiuidantur, superior dico ab inferiore. Deinde annuunt, in superiorem sinum, renis uenam arteriamq;

arteriamq; finire, easq; serosum sanguinem in illum fundere: insuper membranam duos sinus intercipientē, tam arctis angustisq; foraminulis peruiam esse, ut aqueum illud ac tenue recrementum & bilem quoq; transmittat, sanguine interim propter sui crassitiem non penetrante. Addunt præterea stupidi illi humanæ fabricæ architecti, ut tanto scilicet elegantiùs falsum opus confingant, ex inferiori sinu meatum urinarium explantari, illumq; urinam iam colatam excipere. Profectò sagacissimus rerum Opifex tantum munus uni membranulæ cribri modo perforatę non tribuit, neq; in renibus eandem extruxit. quin renum substantia facultate sibi innata, ac propria ad iustitiā temperie, formaq; essentiali, ex uenis ac arterijs per ipsius corpus deductis, serosum illud recrementū excolat, ac in sinū qui urinario meatu excipitur, diffundit. Vt uerò in insigne istud artificium uideas, caninum, aut etiam caprinum renem, utpote macilentū, & nulla, quemadmodū humanus, aut etiam ouinus est, pinguedine oppletū, ad manum tibi esse uelim: illumq;, uti renis administrationem ad præsentis libri calcem subiungam, te primū aggredi. Post aliquot enim obitas sectiones (dummodo prima nō suffecerit) duos in renibus sinus adinuenies, secus multo ac nostri arbitrantur medici, formatos.<sup>d</sup> Vena enim & arteria in renem subeuntes, in unum degenerant corpus, quod articularum tunicis duritia crassitiq; respondens, cauū, & uenæ arteriæ ue cuiusdam modo per renis corpus distributū cernitur. Primum enim paulatim latescens, in duas quodāmodo partes diducitur: quarū unā quidem anteriorem, alteram uerò posteriorem (renum figuræ, quam suprà descripsimus, perpetuò memores) doctrinæ studio uocabimus. Anterior una serie, unoq; ductu, modò sex, modò septem, modò plures etiā æquē crassos producit ramos, qui per anteriorem renis partem æqualiter à se inuicē secundū renis formam abscedentes, uersus exterius renis latus properant, non quidem ad externam usq; lateris eius superficiem, sed interius multo in renis corpore permanēt: & hīc in aliquot propagines rursus dissecti, corporis membranei posterioribus ramis, quos nunc prosequar, commiscētur. Posterior enim corporis eius pars eodem modo quo & anterior, in ramos digeritur, ad externū renis latus contendentes. Quum uerò posteriores rami eò usq; quò anteriores deueniunt, mutuò cum anterioribus coeunt: ac singuli singulis, ac si unum idemq; corpus essent, uniūtur, & mutuam cavitatē constituunt. elegansq; iste ramorum coitus instar semicirculi, ad exterioris scilicet renum lateris formā, perficitur. Membraneum cauūq; istud cum suis ramis corpus, non undecunq; renum adnatam habet substantiā. corpori enim ipsi, priusquā in ramos digeratur, anteriùs posteriùsq;, & ad internū latus suum, non autem ad externū, renis substantia adnascitur. Ramis uerò anterioribus duntaxat anteriùs, posterioribus uerò tantum posteriùs renis substantia adnascitur, quousq; ad mutuū coitum rami ducantur. Hic enim, ubi in plures ramos singuli diuidūtur, anterioresq; cum posterioribus coeunt, renis substantiā adnatā undiq; habent. quanquam inter ramos ipsos, quā nihil adnascitur ad renis interiora, uelut septum quoddam procedit, ramis non connatū, & ab illa renis substantia prodiens, quæ ramis, dum coeunt, cōnascitur. Adeò, ut hīc inter anteriores posterioresq; corporis illius mēbranei ramos, alter quidam renis sinus exurgat, quodāmodo bipartitus. Qua enim is exterius mēbranei corporis latus, ubi id primū ramos germinat, respicit, unicus esse apparet: quum autem secundū septū ex renis substantia pronatū, uelut ad exteriora fertur, geminus conspicitur. Vnā enim eius pars inter septū & ramos anteriores, altera inter idē septū & posteriores

ramos porrigitur. Sinus hic inter dissecandum subhumidus exanguisq; omnino occurrit, corpus autem illud membraneum cum suis ramis omnibus, aut primus renis sinus (si ita corpus id appellare uisum sit) sanguine plenus semper inuenitur. Homines ut passim pinguetudine, quemadmodum & porci, scatent, secundum sinum quoq; adipe duriusculo, & quasi seroso humore enutrito oppletum habent: qui non solum humanorum renum speculationem dissecantibus obscurauit, sed quibusdam accuratius sectione aggredientibus ita imposuit, ut hunc adipem<sup>g</sup> urinarij meatus operculum quoddam esse, & urinæ in renibus excretioni seu colationi præfici, & quoddam uelut colatorium esse, scriptum reliquerint. Qui enim suis imaginationibus & somnijs non contenti, plenam operam unam cum ratione sectioni quoq; impenderunt, si nihil aliud, saltem meatus urinarij<sup>g</sup> initium uiderunt, quod sanè ex secundo renis sinu pendet, non quidem ex humiliori sua sede, sed ex interni lateris ipsius medio. Incipit enim meatus ille ab externo latere membranei corporis, ubi primum in ramos scinditur. deinde per eius corporis medium procedens, ex renu medio per internum renis latus, uenæ cuiusdam instar procidit. Hæc meherculè renum est conformatio, quæ in membraneum illud corpus ipsiusque ramos serosum sanguinem renis substantiæ ui, & fibrarum eius corporis rectarum beneficio attrahi commonstrat: nimirum ut sanguis seroso illo humore ita liberetur, ut sanguinem à portæ uenæ furculis in cauæ soboles maxima ex parte assumi transmittique credimus. Cæterum renes non uniuersum alliciunt serum, imò ut sanguis ad fluxum per uenarum cavitates aptior sit, feri portio unam cum eo per reliquum adhuc corpus ducitur, quæ extracto iamq; concreto sanguini innatare conspiciamus. Quinetiam manifestum quoque euadit, renum substantiam à sanguine non solum in uena caua, sed & in arteria magna contento, aqueum illum humorem, & si quid biliosi extremi adhuc ipsi sit admixtum, colare, atq; in alterum illum sinum protrudere, eumq; inde per<sup>g</sup> urinarium meatum ad uesicam huic humori admittendo instar lagenæ preparatam sensim defluere. Quæ uerò horum meatuum sit structura, ubi renum tunicarum explicationem præcedentibus addidero, statim audies. Renibus enim binæ sunt tunicæ, ortu substantiæq; variatæ.<sup>h</sup> Prima, quæ exterior est, renis corpori pertinet, citè non adnascitur, nihilominus ipsi instar inuolucri circumquaq; obducitur, & hinc etiam renis fascia uulgò nuncupatur, à peritonæo humiliorem septi transuersi sedem succingente principium ducens. Quæ enim ipsi renes incumbunt, membraneas quasdam fibras producit, in membranam tunicam, quæ renes ipsi colliget, degenerantes. Præsens tunica frequentibus uenis instar omenti intertextitur, multa pinguedine (ut & illud) abundans, renumq; fortè actionem penicilli cuiusdam ritu fouens. Dextri quidè renis tunica à uena ad ipsum renem pertingente<sup>i</sup> propaginè obtinet, in membranam frequenti ramorum serie excurrentem. Sinistri autem renis tunica<sup>k</sup> uenâ adipiscitur à sinistro uenæ caue latere, elatius quam renis<sup>l</sup> uena enatâ: aliquando etiam contraria est eiusmodi tunicas implicantium uenarum exortus ratio. Altera renu tunica tenuior est, & nullis uenis, neq; etiâ adipe obsita, & ualidissimè, ut iecoris & lienis tunica, renum substantiæ connata. Hanc procreat tertia renem petentis arteriæ tunica, & uenæ item altera. nam dum hæc uasæ eni implantantur, hæ tunicae ab eis abscedentes, in hanc renis tunicam dilatantur. Cæterum renis<sup>m</sup> neruus, quem quasi præterieram, gracilis est, neq; uenæ, neque arteriæ renis, proportionè respondens. Illæ enim alterius usus, quam nutriendi calorisq; insiti recreandi gratia, reni offeruntur. neruum autem sensum duntaxat obtusum præstare

Renum tunica.

Renum tunica.

Renum neruus.

e. 22. 23. fig.

f. 22. fig. 4.

g. per g. 4. in v. fig. 22. 23.

h. 20. fig. T. V. 22. 6. p.

i. 20. fig. Y.

k. 20. fig. X.

l. 20. fig. h.

m. 2. fig. ed. 2 lib. 4. 7. 2.



præstare oportuit: ac proinde à sexti paris neruorum cerebri ramis, qui costarum exporriguntur radicibus, Natura singulos ad utrumq; renem diffudit, in internam ipsorum tunicam potius quàm in corpus illos dispersens.

DE VESICA, VRINAE RECEPTACULO,  
& meatibus illam è renibus in uescam deducen-  
bus. Caput XI.

*Utilem uescam in primis ostendunt uigesima secunda & uigesima tertia figura, hanc simul cum uinarijs meatibus detectam prorsus exprimentes, uti & quarta figura Capitis quadragessimoni, libri secundi. Superiorem uerò uescicæ fundi partem adhuc peritonia nexam, proponit secunda figura, tertia, sexta, decima, duodecima, uigesima. Ceterum muliebrem uescicam pulchre delineatam continent uigesima quarta, uigesima quinta, uigesima sexta, uti ex illarum figurarum Indicibus petere lice.*



ERINDE sanè ac renes suis functionibus opportunam sedem sibi uendicant, tutoq; locantur: ita quoq; & uescica, & uinarij meatus.<sup>a</sup> Vesica enim, quum urinæ existat receptaculum, in quo hæc sensim à renibus colata (ne frequenter & perpetuò, sed rarè & simul nobis reddenda sit) coaceruatur, eam sedem meritò obtinet, qua commodè, dum urinæ copia aut qualitate molestatur, illà excernere possit: quem locum non deuit ab eo quo sicca excrementa emittuntur, procul abesse. Deinde elatiorem sedem alia nutritionis organa, hac uescica longè nobiliora, altumq; situm necessariò expetentia, sibi occuparunt: adeò, ut iure quodam uescica non minus quàm rectum intestinū, humilius collocetur. Ad posteriorem enim pubis ossis sedem consistit, elatiore sua parte superiorem eius sedem modò plus, modò minus, prout urina distenditur, excedens. Est namq; oblongæ sphaeræ instar aliquantulū rotunda, & superiore parte, quàm inferiore, in<sup>c</sup> ceruicem, angustumq; meatum definēte, spectatur amplior, idq; situs propemodum occasione. Quanquam enim, ut uescica capaciore, iniurijsq; minus exposita redderetur, figura adamussim globi modo rotūda, ipsi potius conuenisset: attamen oblongiorē, suaq; eminentiore parte ampliorem rerum Opifex hanc extruxit: ne si fortè uescicæ cauitatem, quam ex sua sortitur longitudine, latitudini adiecisset, hæc nimium à pubis osse, & recto intestino, & mulierum insuper<sup>i</sup> utero premeretur, eaque organa uescicæ distentioni plus æquo obstarent: quum interim superior ipsius pars, pubis os excedens, propter cedentes abdominis musculos, opportunè distendi dilatariq; possit. Vesicam enim amplam, & extendi promptam fieri oportuit, quo rariùs, ut distentum est, urina nobis reddenda ueniat. Vnde etiam mēbraneo nerueo<sup>e</sup> ue constat corpore, quod dilatari possit commodè: & rursus, quum nihil continet, subsidere. Etenim<sup>h</sup> uescica læui, dura, ualida, membranaeq; constat tunica, quæ modò crassior, modò tenuior uisitur, prout nimirum aut impenius distenditur, aut arcatur: peculiariter hoc sibi uendicans, quod in elatissima sui fundi parte, & qua in ceruicem definit, ob meatuum quorundam interfectiones & exortus durior crassiorq; occurrit. Hanc triplici fibrarū genere intertextam, uel pueri nouere, unguibus, dum uescicam inflant, ut promptius distendatur, illam fricantes, ac eiusmodi fibras, additis interdum carminibus, diuellentes. adeò, ut è uescicis, quas puer, uti nostratibus moris est, inflare, contundere, & unguibus ac digitis terere solebam, quid tunicarum fibræ apud Anatomicos essent, ilico intellexerim. Vesicam implicantēs fibræ, eadem qua fibræ uentriculi, & bilis uesiculæ collocantur serie. Rectæ enim intimæ sunt,

*Vesica sima.*

*Vesica forma.*

*Vesica substantia.*

430 fig. P.  
25, 25<sup>r</sup>. C  
24 T. 25<sup>r</sup>. B.

61, 2 fig. C.  
49 fig. M.

e ult. figura  
rariū li. 1. g.

d 23 fig. O.  
e 25 fig. U.  
7, A.

e 20 fig. O.  
24 fig. K.  
f 4 fig. L.  
25 fig. U. i.  
h, l.

h Vesicam  
dissectam  
proponit  
dextera fi-  
gura figu-  
re 23, C  
figur. 26.

extimæ transuersæ, mediæ uerò obliquæ, pro functionum ordine situs ordinem adipiscentes. Expulsionē namq; præit retentio, & hanc rursus attractio. Duram uerò & crassam uesicæ tunicam fieri oportuisse, præter cætera argumento sunt, quòd in magnam molem sæpe distendi eam oporteat, quodq; urinae acrimonia & ulceribus ac calculis, idq; generis malis alijs frequenter uexetur: quæ, nisi dura esset, eam faciliè lacerarent, eroderent, ac perforarent. Vt autem tunica hæc adhuc efficiatur ualidior, peritonæū illi densum robustumq; inuolucrum peculiariter circundedit, quod secunda uesicæ censetur tunica, illic à peritonæo procedēs,<sup>i</sup> quā suprà pubis os uesicæ fundus anteriorq; ipsius sedes uniuerſa illi in hominibus utpote erectis, secus multo quàm in canibus<sup>i 3. fi. O. 10</sup> ac Galeni ferè est sententia, adnascitur. In canibus enim & alijs quadrupedibus processus tantum à peritonæo uesicæ offertur, neq; tota ipsius sedes anterior peritonæo ne laxè quidem adnascitur, sed ut & posterior uesicæ sedes leuis & lubrica cernitur. quanquā in hominibus quoq; posterior uesicæ sedes rectum<sup>h 24. fig. T. 25. fig. A.</sup> intestinum & uterum respiciens, læuis & lubrica & aqueo humore oblita occurrat. Cæterum cum urina uesicæ (ut & bilosum recrementum suæ uesiculæ) ad nutritionem inepta sit, Natura uesicæ<sup>i</sup> uenas quibus alatur, & arterias quibus calor ipsius recreatur, per opportunè distribuit, ac primū utrinq; in ceruicis uesicæ latera unam uenam, & arteriam item unam, à cauæ uenæ & arteriæ magnæ<sup>m</sup> ramis per pubis ossis foramen crus accedentibus deriuauit, quæ hinc sursum per corporis uesicæ longitudinem cōscendentes, in tenuissimos piliq; modo graciles furculos dissipantur. Neque neruis itidem, quibus ob instantium sensationem maximè indiguit, uesica destituitur. Quantūuis enim urina uesicæ, ut bilis minori uesiculæ, tanquam familiare quippiam insuat, neq; quum naturalis est, ullam ab illa noxam patiat<sup>u. 25. fig. u.</sup>; ea tamen interdū tantum biliosi excrementi admixtum habet, mordaxq; & acris redditur adeò, ut nisi urinae qualitatem uesica perciperet, illam diutius continens, grauiter ple-runque afficeretur. Ac proinde inter cæteras corporis partes, uesica<sup>n</sup> neruos non minimos sensus tactus solum gratia obtinuit, eos à sexti paris ramis costarum radicibus exporrectis, & ab<sup>n 2. fig. ca. 2. lib. 4. 1. 10.</sup> infimis spinalis medullæ paribus asciscens. Quemadmodum uerò hæc uasa neruiq; uesicam petunt, ita quoque ex elatione mediq; corporis sui seu fundi regione<sup>o 2. fi. ca. 11. lib. 4. ch. 11. 27. 28.</sup> meatus quidam exoritur, qui uenæ tunica utcunque efformatus, per umbilicum incedit: cæterisq; umbilici uasis commissus,<sup>p 2. fi. M. 46. N. ad E. 24. fig. Y. q 3. tubella fig. 30. inter M. N. O.</sup> inter duo fœtus inuolucra cessat, huius urinam, quæ dum utero gerimur, continuò aceruat, illuc deferēs: ne fortè hæc per fœtus pudendum reddita, ipsiusq; corpori circumfusa, tenellā fœtus cutem suā acrimonia exulceraret. Atq; ut huius meatus in natis hominibus nullus amplius est in hac functione usus, ita quoq; is exarescit, & uinculū duntaxat uesicæ ad peritonæum efficitur: perinde ac binæ fœtus umbilicum subeuntes<sup>r 2. fi. K. L. 24. Z. C.</sup> arteriæ, fundo uesicæ utrinq; attense, ac ita adnatæ, ut uesicam tunc quoq; peritonæo pulchrè committant, quum hominibus in lucem editis funiculorum instar resiccantur, & natiuo fœtus calore refocillando, aut aliàs arteriarum munere obeundo, penitus sunt inutiles. Porro in humiliorem uesicæ sedem, præter suos neruos & uenas & arterias in cavitatem usq; ipsius, alijs<sup>i</sup> duo inseruntur meatus ad urinam ex renibus deducendam formati. Quum enim renes quàm proximè iecori necessariò allocentur, uesica autem humilem sibi sedem uendicet, meatus quosdam effingi oportuit, urinam ex renibus in uesicam delaturos. Atq; hos uenarum corpori quàm simillimos Natura construxit. quippe simpliciter constant tunica, uenarum tunica paulo duriore, paucioribus tamen quàm illa

*Pend. & arte  
ria ac nerui  
uesica.*

*Meatus fa-  
tus urinam e-  
ducens, & fa-  
tus peculiari  
arteria uesica  
commissa.*

*Meatus u-  
rinæ renibus  
in uesicam de-  
ducendum bi-  
fora.*

*123. 23. fi. q.  
4. 25. fi. 4. 5.*

aptiores, & tendi subfidereq; facile possūt, & obliquæ fibræ quo minus in uesicam urina ocys delabatur, nihil interim præpediūt. Verū quod his meatibus, quos Græci ab officio *ὑπὸ τῆς οὐρᾶς*, & *ὑπὸ τῆς οὐρᾶς*, & *πρὸς τῆς οὐρᾶς* appellant, tanta cum uenis sit similitudo, quodq; illi secus quā uenę sanguine turgentes, can dicunt, Celsi albæ uenæ nuncupantur. <sup>1</sup> Horum principium ex secundo mihi appellato in renum corpore pendet sinu: & per primum eorundem sinum exporrecti, è caua mediāq; renum efferūtur sede, hincq; peritonæo super lumborum <sup>2</sup> musculos supertensi, securissimè deorsum ad uesicam prorēpūt. Adnascuntur enim in progressu peritonæo, & ab illo fibras quasdam adepti, alteram assūmūt tunicam, uenulis & arterijs ut peritonæum ipsum intertextam. Porro in scellus ipforum, quum itineris longitudo nihil commodi adferre hīc possit, quā minimè anfractuofus est, ex renum enim sinu deorsum modicè uersus interiora, ut ad uesicam pertingant, porrigūtur. Ne uerò parum firmiati, & omnino pensiles uesicę infererentur, aut obliquum nimis ductum efficerent, non elatissimæ parti uesicæ, ex quā <sup>3</sup> meatus, urinam fœtus extra umbilicum deferens pendet, <sup>4</sup> implantantur: sed illi uesicæ sedi, quæ posteriori peritonæi regioni, ad quam meatus toto ductu securè firmatur, uicinior est. Consistit itaq; insertionis regio in posteriore humilioreq; uesicæ sede paulo antea quā in ceruicem definat: & meatus primū uesicæ adnascūtur, & obliquo anfractu ipsius tunicam à peritonæo pronatam penetrantes, tandem in uesicæ cauitatem (alteram quoq; permeantes ipsius tunicam) aperiuntur, ingrediuntur uē, modo sanè quā simillimo, <sup>5</sup> quo bilis meatum in duodenum inferi relatum est: laxis nimirum membranulis utrinq; ad meatus foramen non aliter appendentibus, quā si uesicæ internæ tunicæ inibi membranulæ adnascerentur. Quarum usus, membraneorum processuum bilem deducenti meatui adnatorum usui respondet, ut scilicet urinae quidem ex meatibus in uesicam defluenti cedant: & dum uesica distenta urinam rursus in eodē meatus regurgitare uolet, collectæ meatūq; opplentes, urinæ transitum impediant. Id quod præsentēs membranulæ ad cō præstant commodè, ut uesica uel flatu plurimo repleta, nihil planè spiritus per hos meatus reddere queat: pari ferè cum folliis ratione. Per foramen namq; quod à tergo illis adhiberi solet, aer quidem attrahitur: sed quū follis rursus cōprimitur, propter asserculum impetu aeris foramini appressum, nihil uenti per illud expiratur. Idem quoq; in pilis quas flatu distendimus, & organorum quæ folliis inflantur fistulis, & multis aquæ ductibus eleganter obseruamus, quanquā interim rerum Opifex non ita pendulis latisq; ac manifestis operculis in urinariorum meatuum insertionē utatur, atq; nos ipsius in dultriam imitantes folliis adhibemus & organis & pilis, ac columbariorum denique fenestris, quibus admiffas furtoq; ingredientiē colūbas denuò egredi prohibemus. Cæterū, & obliquum insuper meatuum urinariorum in insertionē ductū, etiam urinae per eodē regressum cohibere, in illis quas inflamus uesicis experimur, quoties relictas meatuum portiones fursum nonnihil attrahimus, meatusq; quodammodo dirigentes, aeri in uesicam per ipsius ceruicem inflato, iter damus. Incipit autē uesicæ, uti & paulo antè monuimus, <sup>6</sup> ceruix aliquanto inferius quā meatuum urinariorum consistit insertio. Humillima enim uesicæ corporis fundi uē sedes, sui medio in arcum finitur meatum, quem uesicæ ceruicem seu collum nuncupamus: aliter in uiro quā in muliere protensum, & alijs quoq; in illo quā in hac adnatum coagmentatumq; partibus, & usum denique ambobus diuersum præbentem. Commune est enim utrisq; huic ceruici uel

Artificiosa  
meatum uri-  
nam deducen-  
tium insertio.

Pessica ceruix.

11 fig. B.  
n. 2.

17 muscul.  
tab. 1. 11.

12 fig. M.  
13 fig. r. 15  
si non pro-  
cul ab a. 16  
fig. M.

13 figur. c.  
ad d. & 15  
fig. Q ad R.

13 fig. 10  
per o ad q.  
15 fig. 11, 12.



uel meatui urinam ex uesica deferenti<sup>b</sup> musciculum orbiculatum circumduci, <sup>c 22, 23 fig.</sup> <sup>b 25 fig. 2.</sup> quo cauetur, ne urina præter uoluntatem nostram effluat: cuius usum, situm & formam in secundo libro diffuse persequuti sumus. Deinde uiris & mulieribus per illum meatum urina excernitur: sed uiris ad seminis quoq; eiacularionem subferuit. Vnde etiam hi peculiariter<sup>c</sup> glandosum illud corpus adnatum habent, semen deferentium uasorum<sup>d</sup> infertionem suscipiens, quo corpore meatum urinæ humectante & irrigante mulieres interim destituuntur. Quinetiam mulieribus super uteri<sup>e</sup> cervicem meatus hic fibris membraneis illi adnatus extēditur, ac ubi primū sub humillima<sup>f</sup> connexus pubis ossium sede cum uteri ceruice consistit, citra ullum ad superiora (quicquid Galenus interim in quinto de Partium usu libro doceat) reflexum, in illius cavitatem sinumq; cessat. Viris autem ultrā<sup>h</sup> porrigitur, ac prominet. quamprimū enim humillimam pubis ossium commissurę regionem superauit, penis corporibus subnatus, ad elatiorem usq; pubis ossium commissurę sedem ascendit: & hinc rursus, prout rigidus flaccidus<sup>i</sup> ue est penis, aut sursum spectat, aut propendet, nunc σ Græcorum, nunc S Latinorum elementum exprimens. At hæc unā cum generationis organis (quorum iam ob partium connexum uiciniamq; insituendus est sermo) opportuniū pertractabuntur.

NATVRAM PROPAGANDÆ SPECIEI  
prouidisse. Caput XII.



NITIO librorum de Sanitate tuenda, Galenus ex corporis humani primordijs hominem necessariō morti obnoxium esse, pulchrē colligit. Imō præterquā quodd corpus humanum mixtum genitumq; esse constat, id ipsum immortale incorruptibileq; nequaquam potuisse fieri, arteriæ, uenæ, nerui, caro, & id genus partes reliquæ, e quibus conformatur, abundē commonstrant. Quando itaq; uel materiæ occasione, hominem producere immortalem non licuit, rerum Opifex ipsi ad immortalitatem quod potuit auxilium machinatus est: instar boni ciuitatum cōditoris, cui non prælens duntaxat cohabitatio cordi est, sed modum quoq; prouidet, quo uel in æternum, uel ad quāplurimos annos ea duret. Sed ciuitas quidem, quantumuis bene fortunata, quæ non unā cum seculis ætatibusq; quandoq; intercidat, nulla uidetur unquam instituta. Prouidi uerō solertisq; rerum Opificis opera, quæ multis annorum millibus iam suffecerunt & perdurarunt, adhuc permanent, rara quadam arte ab ipso inuenta, qua semper pro hominibus qui corruptūtur noui succedant, perpetuaq; speciei conseruatio fiat. Homines namque initio ita extruxit, ut unus quidem potissimū fœtus principij rationem exporrigeret: alter autem id suscipiens, fœtem enutrit, foueretq;. Sic uiro organa, ipsos scilicet<sup>a</sup> testes addidit, qui semen, præcipuum noui constituendi hominis principium, efformarent, uasailis adiungens duplicia: alia quidem materiam, ex qua hi aptē illud cōficerent, apportantia: alia uerō confectum iam semen in unum<sup>d</sup> meatum, qui opportune id in<sup>e</sup> uterum proijciat, deducantia. Is enim mulieri datur, ut principium hoc concipiat: deinde is quoq; uasis conseritur, quorum beneficio genitura temporis successū enutriatur, ac singulari miraculo in nouum hominē prodeat. Interim & testes<sup>f</sup>, uasq; illorum functionibus seruiciū, uterus sibi uendicat, ut & mulier aliquam primarij principij rationem fœtui adijciat. Quinetiam his omnibus non hominum duntaxat, sed & cæterorū animalium generationi

Partium generationis subferuentium breuius enumeratio.

d 22, 23 fig. gur. f. b 22, 23 fig. h. x. m. d. e. i. f. c. 22, 23 fig. h. 2, 3. i. c. i. d. 23 fig. 1. 25 fig. i. h. l. f. 25 fig. m. r. g. 25 fig. r. h. 25 fig. pri. mum d. g. o. p. d. e. i. n. t. t. h.

nerationi famulantibus organis meras commiscendorum corporum libidines, & peculiarem quandam delectationis uim ad procreationem, rerum Opifex copulauit: ipsi uerò animæ ea usuræ, mirabilem quandam & indicibilem utendi appetitum quoque elargiens: à quo animalia incitata, etiam si stulta, aut iuuenilia, aut ratione prorsus priuata fuerint, prouident tamen successioni speciei, haud secus quàm si omnino essent prudentia. Quum enim Opifex haud ignoraret, substantiam, ex qua instrumenta hæc creauit, perfectam sapientiam neutiquam admittere, illecebre, & uelut inescationem, quam solam accipere poterant, ad salutem conseruationemq; speciei ijs indidit, delectationem uehementissimam illarum partium usui adiiciens. Atque hinc illa in Timæo Platonis, de generationis amore à Deo nobis ingenito differens, est sententia: Quocirca pudendorum naturæ in uiris insita uis inobediens ac imperiosa, & quasi animal non exaudiens rationem, furiosarum libidinum uiolentia, subijcere sibi cuncta conatur. Vulua quoque & uterus in fœminis pari ratione animal auidum generandi, si intempestiue diuq; à generando abstineat, ægrè fert moram, plurimumq; indignatur. Vt amorem nunc præteream, quo animalia suos prosequuntur fœtus: & temperiem à Natura mulieri priuatim concessam, ut non solum utero adhuc contento fœtui alimentum subministraret, uerum natum quoque suis mamillis sedulo & sollicitè enutriat. Quàm uerò hæc reliquaq; generationi subministrantia organa affabrè extructa sint, iam paulatim enarrare aggrediar, à uirorū organis sumpto sermonis initio.

DE VIRORVM ORGANIS GENERATIONI subseruientibus. Caput XIII.

PRÆSENTIA organa primum uigesima figura, mox uigesima secunda & uigesima tertia absolute exprimuntur.

42, 23 ff. f.



EST IVM in uiris<sup>1</sup> situs nulli non est conspicuus, ut & binarius ipsorū numerus, unde etiam diducos<sup>2</sup> & gemini appellantur: quamuis interdū unus tantum, & interdum tres simul reperiantur: at id rariū quàm nonnulli existimant, tertium testem tuberculū aliquod præter naturam in scorto reconditum enumerantes. Testes rotundi sunt, sed paulo admodum oblongiores, quàm aut lati, aut profundi: dein humiliori parte obtusiores, amplioresq; quàm superiori sede uidentur. uerū & id ipsis accidit admodū obscurè: etiā si testes, ouorū nomen à plerisq; & præcipuè Arabib. inuenerint. In externa superficie nullū penitus finum, impressiōem<sup>3</sup> ue, aut inæqualitatem obtinent: substantiaq; constant alba, lactea, molli, & sibi undecunq; simili ac continua, nisi quòd<sup>4</sup> uenulis frequentibus, iisdemq; exiguis tenuissimisq; oppletur, ob idq; rara cauernosaq; perinde ac lienis<sup>5</sup> substantia, apparet. Virorum enim testes nullum omnino finum cavitatem<sup>6</sup> ue fortiuntur, præter eam quæ secundariò ipsis eiusmodi uenularum gratia accedit. Vnde autem uenę, uasculā<sup>7</sup> ue, quæ testium substantiæ implicantur, ortum ducant, simulatq; testium inuolucra expressero, subiungam. Testes itaq; pluribus tunicis seu inuolucris integuntur, alijs quidem utriq; testi communibus, alijs autem priuatim singulos testes inuoluentibus. Cutis enim & carnosa<sup>8</sup> membrana ambos testes non secus quàm uniuersum corpus, amplexantur, & duo illis communia statuunt inuolucra: cutis quidem unum, quod reliqua corporis cute tenuius est, & uelut sutura quadam & rugis interstingitur: ac quibusdam scrotum, quibusdam uerò (qui se

Testium finis ac numerus.

Testium forma.

Substantia.

Testium inuolucra, utriusq; testis communia.

b 21 fig. T  
c v. v.

c 10 fig. I, K.

d 20 fig. r. f.  
e 20 fig. t.

Latiniūs

Latiniùs loqui existimant) scortum, Græcis uerò *δοχεύ* dicitur. Alterum autem carnosa efformat membrana, hîc perinde ac cutis, longè quàm in reliquo corpore tenuior, sed uenis frequentioribus intertexta. Præter hanc uerò tenuitatem, cutis & membrana aliud quoq; peculiariter hîc, ut & in fronte ac pene, sibi uendicant, quandoquidè nullus inter ipsas interuenit adeps: non aliter profectò, quàm si Natura uirorù testibus laxius tenuiusq; uoluisset à cute & ea membrana obduci inuolucrù, à uirorumq; testibus nò minus quàm à cerebro omnè abesse pinguedinè. Nam etsi membranarum, quæ uenis arterijsq; frequentibus intertextuntur, circa testes adsit copia: nullus tamen, ut ferè in reliquo corpore esse solet, hîc conspicitur adeps. Tunicæ singulos testes priuatim inuoluètes, amplitudine, structura & tenuitate inuicè admodum uariât. Vna enim, quæ & exterior est, testè cum suis uasis ad eam usq; sedè, qua magnæ peritonæi cavitati cõmittuntur, induit, ualida quidè, sed tenuis, uenisq; abundàs. Quæ enim uenâ arteriamq; seminales, ac dein uas semè à teste sursum ducens, ex peritonæi magna cavitare in inguinum regionè, ipsùmq; scortum duci audies, illic peritonæum hanc educit tunicâ, quæ peritonæi pars processusq; meritò censetur, itaq; ab ipso peritonæo prodit, ut scortum à cute deduci pronasceiq; cernimus. Hæc tunica<sup>o</sup> exteriori superficie, qua ipsam carnosa contingit membrana, fibris quibusdam membranæ illi connascitur, adeò sanè frequentibus, ut interdum has aliam quandam testium tunicam cõstituere arbitratus fuerim. Atq; ita etiam, ubi dextri testis tunica sinistri testis spectat tunicâ, ambæ fibris mutuo committuntur: ob idq; etiam externam superficiem non admodum leuem habere uidentur, sed membranarù inuicem connatarum modo asperâ ac fibrosam. Interior huius tunicæ superficies, quæ testem ipsiusq; uasâ respicit, læuis, & aqueo quodâ humore obducta est: neq; ulli penitus corpori connascitur, præterquàm quod elatiore suâ parte peritonæo illic continuatur, adnasciturq; ubi ab ipso principium sumit: quin & inferiori testis parti ualidè<sup>1</sup> applantatur, non quidem testis corpori, sed humillimæ uasis semen à teste deferentis parti, quâ id sursum secundum testis humiliora reuoluitur. Ad hæc, ipsa tenuissimæ membranæ interuentu, interna sua superficie membranæ adnascitur, quæ à peritonæo enata, uenæ quidem seminali alteram constituit tunicam, arteriæ autem tertiam. Atq; is connexus non orbiculatim ad uasâ perficitur: sed secundum rectam duntaxat lineam, quæ ad posteriorem uasorum sedem consisteret. Huic tunicæ aliquid cum carnosa corporis membrana commune obtigit: ut enim hanc carnosâ quibusdam fibris<sup>o</sup> aliqua sui parte augeri, intertextiq; ac in musculi naturam degenerare dictum est, sic ista quoque testis tunica secundum totam ipsius<sup>o</sup> longitudinem posteriori in sede, à peritonæo usque ad humillimam testis partem, carnosâs nanciscitur fibras, & longi strictiq; cuiusdam musculi refert naturam, quem tunicæ innatum cernimus, nusquam ab illa abscedentem, sed unâ cum ipsâ à peritonæo incipientem, & etiam inferiori parti uasis à teste semen deferētis, simul cum tunica<sup>o</sup> adnatû: quæ præterquàm quòd testem cõmodissimè integit, illumq; suspensum continet, musculi etiam illius beneficio, quasi uoluntario motu testem, idque potissimum coitus tempore, sursum allicere sentitur. Porro musculi huius occasione, quòd scilicet ruber, ut reliqua caro, sit, hanc tunicam *σπυρσποσδω* priuatim appellatam à Græcis arbitror. aut etiam ob<sup>1</sup> uenarum gracilium illam implicantium copiam, quæ ruborem quoque aliquem conciliat. Non desunt interim, qui ipsum ab *ἐλκτεου* (quod uelamen uaginarumq; quàm inuolucrum pulchrè refert, Græcis significat) specie, ita nominari

*Priuatâ singu-  
lorum testium  
involucra.*

*f 20 fig. in  
tegra est.  
uigesima  
autè secun-  
da ad 4, 5,  
4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.*

*i 22 fig. 9,  
9, 10, 11.*

*h 22 fig. 9.*

*l 22 fig. 9,  
placatur.*

*m 22, 23 fig.  
u, 1,  
n carnosâ  
fi. uerius  
d, c, 1.*

*o 7 muscu-  
latu. d. r.*

*p 22 fig. 9,  
p 22 fig. 9,  
p 22 fig. 9.*

*q 22 fig. 1.*

*r 22 fig. 9,  
nascitur.*

*s 20 fig. 1.*

*Testis muscu-  
lus exteriori-  
pissus inuolucro  
innatus.*



t. 130 testis  
23, 24 figur.  
rarit indui  
tur, in uige  
finitur ad Q.  
t. 131 testis sub  
stantia mo  
dicè illi di  
uulsum cer  
nitur, R. et  
s. notatam.

ii 23 figur.  
N. O.  
x 23 fig. P.  
y 23 fig. R.  
z 23 fig. V.  
z 23 figur.  
sub O.

d 23 fig. M. d.  
e. 23 fig. E.  
G.

b 23 figur.  
Q. R.

c 23 figur.  
ad O.

d 23, 24 fig.  
e. et 23 fig.  
E.

e 23, 24 fig.  
M. d.

f 23, 24 fig.  
M. d.

g 23, 24 fig.  
M. d.

h 23, 24 fig.  
M. d.

i 23, 24 fig.  
M. d.

k 23, 24 fig.  
M. d.

l 23, 24 fig.  
M. d.

m 23, 24 fig.  
M. d.

n 23, 24 fig.  
M. d.

o 23, 24 fig.  
M. d.

p 23, 24 fig.  
M. d.

nominari astruunt, à inq Atticorum more conuersum esse coniicientes. 'Al-  
terum uerò priuātū testis inuolucrū, nihil præter testis corpus substantiamq;  
cum implexis huic uasis amplectitur, testis figuræ ad amussim respondens,  
aut potius illam efformans. Quippe dura & crassa ualidaq; admodū est mem-  
brana, testis substantiam utcunq; mollem ac sequacem inuoluens. Atque is  
sanè præsentis tunicæ præcipuus censendus est usus. dein in hoc conducit, ut  
ipsius interuentu & medio, uasa testis committenda ipsi adnascantur. Tuni-  
ca enim hæc laxior, tenuior, molliorq; inibi cernitur, ubi uasa illi commit-  
tuntur, quàm per reliquam circumferentiam. Et elatiori quidem tunicæ par-  
ti uena ac arteria testis sanguinem spiritumq; deferentes<sup>e</sup> adnascuntur, ac  
quamplurimi ramuli eam tunicam hic<sup>\*</sup> perforantes, in testis substantiam<sup>f</sup> ex-  
porriguntur. Præter hos uerò, alij quoque deorsum in tunicæ illius corpus  
frequentes, sed perquàm graciles<sup>g</sup> furculi à uena arteriaq; seminalibus deri-  
uantur, in tauris & arietibus instar uitis capreolorum eleganter deducti. In  
posteriori uerò sede, tunica hæc per uniuersam ipsius longitudinem ualidissi-  
mè adnatos habet omnes deferentis semen uasis<sup>h</sup> anfractus testis obduetos,  
inibi etiam undecunque tenuibus ac uisum fugientibus foraminibus pertusa.  
Cæterum per reliquam exteriorem ipsius superficiem, læuis & aqueo humo-  
re perfusa, nulliq; penitus parti connexa cernitur. Interna uerò superficiei, qua  
hæc tunica testis substantiam continet, undecunque illi substantiæ<sup>i</sup> connasci-  
tur. Porro hanc à primis Anatomes professoribus, qui testem *ἡ δὲ σπέρματος* uocau-  
re, *ἡ δὲ σπέρματος*, quasi supergeminalem dixeris, appellatam sat scio: quicquid  
alij de testis nugentur capite, qui quum tunicam hanc ignorarent, & apud  
ueteres Græcos *ἡ δὲ σπέρματος* legerent, præter<sup>e</sup> elatiorem testis partem, Gale-  
no testis caput procul dubio nuncupatam, aliam effinxerunt particulam,  
quæ parui testis instar, testis imposita, ipsius caput & *ἡ δὲ σπέρματος* uocaretur. Alij  
horum errore (quem & alij Græcorum interpretes, *ἡ δὲ σπέρματος* testicula-  
rem uenam uertentes, mirificè auxerunt) elusi, sed sectionem interim ag-  
redientes, quum huiusmodi caput non reperirent, Arabes quosdam imi-  
tati, uas aliquod hoc nomine appellandum finxerunt, quod inter testem &  
uenam ac arteriam seminales, quæ præsentis tunicæ primū adnascuntur,  
medium posuere, <sup>e</sup> canū fortasse semen deferentis uasis particulam ita ap-  
pellantes, quæ ipsius est principium, & in posteriori testis sede elatiorem hu-  
ius regionem orbiculatim aliqua ex parte complectitur. Sed quum ex refe-  
ctione horū nugæ etiam leui opera obseruentur, postposita nominū conten-  
tione, hanc ex proprijs cuiq; testis tunicis alterā habeto, & *ἡ δὲ σπέρματος* etiā ueteribus  
Græcis appellatā scito, nūc uasorum historiæ mentē alacriter accommodans. Ad  
singulos itaq; testes singulæ pertingūt uenæ, ac item arteriæ, ortu differētes. Ve-  
na nanq; dextrū accedēs testē, à uenæ cauæ caudice demissiū quàm uenarū ad-  
renes exporrectarū origines pendent, principiū ducit: non quidē à dextro cau-  
dicis latere, sed ex superiori anteriori ue ipsius sede ad dextrum modicè decli-  
nans, idque oblongo quasi & crassiusculo<sup>h</sup> tubere. Sinistri uerò testis<sup>i</sup> uena, ex  
uenæ sinistro reni exporrecte humiliori sede originē habet. Huiusmodi uena  
rum ortus plerumq; cernitur, nōnunquā uerò, sed rarius, à sinistro cauæ caudi-  
cis latere<sup>k</sup> ramulum exporrigi cōspicies, qui deorsum ad sinistra repens, sini-  
stræ seminali uenæ commiscetur. Galenus idem & dextræ seminali uenæ  
aliquando contigisse testatur, quod scilicet à dextri renis<sup>l</sup> uena egrediens<sup>m</sup> fur-  
culus, deorsum protenderetur, & cum uena coiret à cauæ caudice princi-  
piū obtinenti. At nescio quid Prometheis in mentē uenerit, qui suis somnijs  
kk hominem

propter testi-  
lis sanguinem  
ac spiritum de-  
rentium nume-  
ris, mox ex-  
ortus.

hominem in cathedra fingētes, dextram feminalem uenam à dextri renis uena, sinistram autem ex cauæ caudice toties enasci docent, quoties sinister ren elatiorem dextro sedem occupat: quasi uerò dextra uena nō demissius multò, quàm renum uenæ, initium duceret: & quia plerunq; dextri renis uena nimis elata esset, testis dextri uena à cauæ caudice deriuaretur. Nos crebrò eum renum obseruauimus situm, sed dextri testis uenę aliud principiū semel duntaxat, quamuis tunc ambæ feminales uenæ à renū uenis originem mutuabant. Venæ ab ipsorum initijs deorsum in latus protensæ, peritonæo fibrosis nexibus qui in alteram earum degenerant tunicam committuntur, coniuges arterias fortitæ. Vtræq; enim arteriæ humilior quàm, dextrum testem petentis uenæ principium consistit, è directo & sibi proximę ex anterioris magnæ arteriæ sedis medio<sup>o</sup> promuntur: ac dextra quidem cauæ uenæ<sup>o</sup> caudicem (quod hactenus parum à dissectionum professoribus animaduersum miror) conscendens, deorsum obliquè ad dextri testis uenam properat. Sinistra uerò, sui lateris uenam accedens, non semel mihi defuisse uisa est, sinistri testis uena solito tunc longè ampliore. Ab arteria uerò sinistro reni communicat illam enasci, uix unquam uidi: quanquam id interdum accidere posse, non eo inficias. quòd tamen crebrius par uenarum & arteriarum testes petentium (ut passim Galenus docet) obseruetur exortus, nequaquam concessero. Dextra uena & arteria (idem de lateris sinistri uasis subaudito) sese inuicem contingentes, peritonęo (uti dicebā) fibrosis mēbraneis<sup>ue</sup> nexibus alligātur, decliuesq; deorsum protensæ, super<sup>o</sup> uenarū meatū ex dextro rene urinam uescicę deferentē ducūt, peritonęo in progressu<sup>o</sup> tenues ac perquā graciles furculos diffundentes. Quum primum uerò uasa hæc ad coxendicis olis usq; sedem perueuerint, quā<sup>o</sup> septimus femur mouentiū musculos deorsum uersus minorem femoris<sup>o</sup> processum fertur, illa peritonæum iuxta internum eius musculi latus<sup>o</sup> permeant: & ex magna peritonæi amplitudine procidentia, in<sup>o</sup> exteriori testi peculiarium inuolucrum quòd hīc à peritonæo principium ducit, pertingunt, unā cum neruulo nimis quā gracili & obscuro ad testem contendente, qui interdum à sexti paris neruorum cerebri<sup>o</sup> propagine costarum radicibus exorrecta<sup>o</sup>, interdum uerò à uigesimo primo spinalis medullæ neruorum pari diducitur. Porro peritonæi<sup>o</sup> foramen uasa transmittens non ita patet, ac si quis ori pennam inderet, aut illa chartam hanc pertunderet: sed peritonæum exactissimè<sup>o</sup> uasorum lateribus conascitur, tutò ipsa non secus transmittens, quā septum transuersum, & quibus id succingitur membranæ, stomacho & uenæ cauæ<sup>o</sup> uiam offerunt. Simulatque uerò uasa illud peritonæi foramen superarunt, obliquè deorsum ad elatiorem dextri testis sedem<sup>o</sup> ducuntur, & arteria non amplius, ut in reliquo processu, uenæ duntaxat accumbit, fibrisq; membraneis tantum<sup>o</sup> connectitur, sed uaria quadam peculiariq; ratione uena cum arteria<sup>o</sup> coit, & ambæ inuicem commiscuntur,<sup>o</sup> corpusq; unum pyramidis anteriùs posteriusq; depressæ instar efformant: cuius quidem conus inibi consistit, ubi uasa primum inuicem permiscuntur: uasis uerò, ubi eadem elatiori testis parti committuntur. Per uniuersum hoc corpus ramorū myriades inuicem cōplexi obseruantur, non quidem omnes rectā deorsum procedentes, sed alij partim rectā, partim orbiculatim, partim transuersim, alij alio modo inuicem implicari apparent: impossibileq; est, unā ductus seriem, unum<sup>o</sup> ue ordinē hīc animaduerte. Neq; etiam, quod alijs traditum est resectionis professoribus, ibidē expendere ualeo, quo nā pacto maiorē uasorum dextrū testem petentiū, quā quę

n 22, 31 fig.  
= educitur  
sub uab. h.  
o 22, 31 fig.

p 22, 31 fig.  
super q.  
q 22, 31 fig.

r 22, 31 fig.  
cap. 22 lib.  
11.

s 8 muscul.  
tab. A.  
t 12, 2 fig. cap.

u 23 fig. p. p.  
x in u 20 fig.  
gura.

y 2 fig. cap. 2  
libri 4 ab i  
uxta 12.

z 2 fig. ad. u.  
lib. 4 char.  
49.

a 22 fig. p. p.  
b 22 fig. 7, 8.  
c 7 muscul.

d 22 fig. 7.  
f 22, 31 fig.  
gu. d.

g 22, 31 fig.  
ad 1. aut  
23 fig. d. c. ad

D. aut 24  
ad O.

u asoria istoru  
ad testem dist.  
ctus.

Testis neruul.  
lus.

Vene cum ar-  
teria comixtio  
& implexus.

finistrum adeunt, implexum fieri nugetur: quum mihi hac ex parte ualorum nullum conspiciatur discrimen: & aliunde profectò, quàm à maiori illo, minori uel implexu, masculorù foeminarumq; pendet procreatio. Porro quum tot ramorum in <sup>h</sup> membrana illa, quam peritonæum uasis inibi offert, quàm illi fibrosis nexibus in ipsius magna cavitae, toto incessu hæret, implexus fiant, corpus id nidum erucis aut lumbricis oppletum referre uidetur, aut etiam senioris rustici aut baiuli suræ, temporum uel cutem uaricibus turgidam. Ut enim multifariam in illa uenæ uarices uel inæqualiter extuberantes, errabundo ductu feruntur: ita quoque in hoc quod narramus corpore, uenæ feminalis ac arteriæ innumeræ soboles oberrant. Perquàm rarè enim accidit, uarices capreolorum pampinorum uel uitis imaginem exprimere: sed ipsæ, uti dicebam, hic rectà, illic transuersim & obliquè, uarieq; admodum prominēt. Ab hac igitur similitudine reor parentes illos, qui pueros in cadauerum confectionibus exercebant, corpus hoc *lyporeidij* *ἡγασσέντων*, quasi uaricosum assistentem, aut adfitem diceret, appellasse. non secus quàm in nono de Partium usu libro fecit Galenus, quum inibi in caluaria reticulari quendam comminiscitur implexum. Cæterum in reliquis de Partium uel libris, unà cum Herophilo, nomen id alijs ferè parti, neque illi semper (ut paulo posterius explicabo) eidem attribuit. & in libris de Semine, à uitis pampinorum figura corpus hoc, cuius modò historiam instituimus, pampiniforme frequenter uocat, ipsum à uaricosa specie, cui alioquin proximè accedit, distinguens. Vt cunque uerò illud nuncupes, basi sua, elatiori sedi in intimæ testis tunicæ adnascitur: ac multos ramulos rectà hanc tunicam perfrantes, elatiori testis parti distribuit, multipliciter per testis substantiam, prinde ac iecoris uenæ in ipsius substantiam, disseminatos, & perquàm tenè constantes tunica. Præter ramos, quos rectà uaricosum hoc corpus testis substantiæ offert, alias per ambitum dictæ nunc tunicæ frequentes, & uenæ in adhærente oculi tunica sparsis, quàm simillimas soboles diffundit, à cubus denuò germina in testis substantiam pertingunt. Hæc uenæ ac arteræ seminalium est series, quæ siue ita, siue uasa testis sanguinem spiritumque differentia, aut præparantia uoces, nihil moror, modò ipsas à iam recensend<sup>o</sup> uase prorsus distinguas. Ad externum enim uaricosi illius corporis latus quàm testis implantatur, aliud corpus album, & durioris nerui modo durum, intimæ testis tunicæ adnascitur, hincq; incipit: & exterius, quàm testis non committitur, gibbum, quodammodoq; teres est, latius nonnihil quàm crassum se offerens: quàm uerò tunicæ illi connatum est, secundum conuexum tatis, cauum<sup>o</sup> existit. Hoc itaque corpus ab externo uaricosi corporis latere incipiens, secundum illius posteriorem fertur sedem: & deorsum modicè uersus interiora pronepens, secundum posteriorem sedem intimæ testis tunicæ ualidissimè tantisper adnascitur, donec ad humiliorem testis descenderit sedem: à qua denuò sursum reflectitur, intimæ testis tunicæ attersum, incumbensq; quidem, at non amplius illi connatum, neque eandem ut hætenus formam retinens. Per totum enim ductum, quo testis tunicæ corpus id necitur, propemodum æqualiter crassum, eiusdemq; figuræ est, quam compacto uitæ aut cucurbitæ capreolo & pampino assimilare queas. quanquam tamen non in orbem, sed uelut in latera, huius corporis reuolutiones fiant, id eum ferè modum, quo angues & anguillas ocyus repere cernimus. Huius namque corporis anfractus & gyri admodum inuicem continuæ & connatæ conspiciuntur, ut & lignorum uermibus eas assimilare integrum sit. Respondent enim illis, & deinde etiam

Vena ac arterie in testis substantiam, ipsarumq; proximè musculorum in serie.

Passi semen à teste ad uescicæ ceruicem descendit historia.



multum referunt cerebelli<sup>1</sup> processus, quos in septimo libro à uermium imagine nomen inuenisse dicam. Atq; hinc etiam fortassis in Arabum interpretibus lumbrum nomen legitur: ita enim præfens corpus, quàm testis connascitur, Arabum nonnulli uocauisse uidentur. nam eorum aliqui, etiam<sup>2</sup> implexum uenæ arteriæq; supra sedem testis elatiorem conspicuum, ita nuncupauere. Porro corpus hoc, quod uermi assimilabam, nihil prorsus imagine uaricibus inæqualiter, neq; eadem serie extuberantibus, accedit. Quanquam si bene Galeni sententiam in libris de Semine percipiam, is alibi has<sup>3</sup> reuolutiones ex Herophili suffragio *λογισθὲν ὡς ἀστέρων* appellari uelit: alibi autem eo nomine appellitet, aliam huius quodiam tractam<sup>4</sup> corporis<sup>5</sup> sedem, qua id peni inferitur. quæ uerò ea sit, ubi corpus istud sermone ad ipsius usq;<sup>6</sup> infertionem, & illius cum corpore alterius lateris coitum deduxero, audies. Ad hunc itaq; modum corpus id intmæ testis tunicæ connascitur: & exterius, demptis reuolutionum impressiōibus, læue est:<sup>7</sup> intus uerò, quum ab intima testis tunica acutiori cultello admitur, asperum, sed nullis quæ oculis subijciuntur meatibus peruium est. Neq; etiam aliter uenæ aut arteriæ modo cauum esse uisitur, non hîc solum quàm testis tunicæ cōnascitur, uerum neq; quàm ab illa abscedens, sursum fertur. Quum primum namq; ad inferiorem testis partem descendit, recta<sup>8</sup> sursum reflexum, sensim angustius efficitur: & non amplius inuolutum, in teretem quasi uerum definit. atque id ipsi maximè euenit, ubi elationem testis partem sursum scandens superat. Quò quum pertigerit, anteriori illius<sup>9</sup> corporis, quod nos uaricosum esse diximus, parti uersus interiora innititur: & ipsi tenuis membranulæ interuentu connexum, tantisper ascendit, donec per peritonæi<sup>10</sup> foamen, quo uena & arteria feminales ducuntur, in peritonæi cavitatem pertinet. In hoc transitu teres istud corpus non amplius anteriori uenæ arteriæq; parti<sup>11</sup> attenditur: sed in posteriora reflexum, sub illis in peritonæum transcendit.<sup>12</sup> Hinc ex dextro latere (dextri enim testis enarrationem prosequor) ad posteriorem pubis ossis sedem reflectitur: & posteriori peritonæi parti connexum, super<sup>13</sup> uenarium dextri lateris meatum sub uesica deducitur. Eòdem pari omnino ratione, à sinistro teste corpus simile perfertur: & ambo sub posteriori uesicæ sede super<sup>14</sup> rectum intestinum ad uesicæ ceruicis initium protensa sensim mutuo<sup>15</sup> appropinquant: & latiora crassioraq; facta, inter se tandem cœunt: unumq; corpus sub uesicæ ceruicis initio constituenta, in<sup>16</sup> glandosum quod paulo post explicabimus, organum assumuntur. Hoc<sup>17</sup> corpus à teste ac uesicæ ceruicē procurrens, id sanè est, quod Herophilus *σπέρματιον ὀρόρον* appellauit: quodq; nos uas semen deferens, ad illius imitationem, aliquando & iactatorem, uibratoremq; dicimus. nam reuera corpus hoc à testis substantia semen assumens, ad penem id deferit. Porro ut cavitatis ipsius uniuerso suo ductu perquam obscura est, raroq; admodum sectione deprehenditur: ita quoq; obscuriores<sup>18</sup> meatus foraminaq; sunt, quæ à teste per intimam ipsius tunicam in eiu<sup>19</sup> corporis aut uasis semen deferentem reuolutiones pertinent. Præterea uasis huius in penem<sup>20</sup> infertio conspectum quodammodo fugit, & coitus, aut aliàs excretionis seminis tantum tempore aperitur. quod quidam Patauij d'issetus, facillè edocuit, qui ante suspendium inuoluntario seminis fluxu laborās, hos meatus omnes apertos laxosq; habuit, eos potissimum, qui ex testibus in deferētis semen uasis reuolutiones gyros uer<sup>21</sup> pertingunt, & quibus dextrum & sinistrum deferentia semen uasa in uesicæ ceruicem terminantur. Herophilus, & ex ipsius suffragio Galenus,<sup>22</sup> hîc ubi dextrum uas sinistro permiscetur, amboq; paulo antea quàm cœant, latiora crassioraq;

fig. li.  
7 C, G, E  
H. I.

fig. 2  
ad D. E  
ad N. O.

fig. 4  
D, 1, C, 1.

fig. 23  
fig. 23  
fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fig. 23  
fig. 23

fioraq; reddi diximus, alijs quibudā reuolutionibus hæc uasa circūagi inuoluiq; uidentur innuere, quū & in hac sede præsentia uasa subinde *ἡσαστέων λυσοειδῶν* nomināt. Vasa hæc inibi nunquā nisi perquam \* obscure mihi in hominibus inuolui uisa sunt: & si quæ sit reuolutio, ea penitus illi similis apparet, quā hæc uasa obtinēt, quā primū ab intima testis tunica nō amplius illi tunicæ connata sursumq; cōscendētia abscedūt. tale enim quid canes, & magis adhuc caudati simij & tauri indicant, modicē conspicuis reuolutionibus ea sede frequenter donati. Ceterū corpus glandosum, in quod deferētia semen uasa, postquam coiere inferuntur, quodq; Herophilus *ἡδωοειδῆς ἡσαστέων* appellat, ad humillimam uesicæ partem ipsiusq; ceruicis initium reponitur, estq; unicum & subinde utriusq; simul testibus grandius: at nō ad amussim rotundum. antierius enim & posterius nonnihil depressum, à lateribus autem rotundum instar globi cernitur. per ipsius uerò medium, uesicæ canalis procedit, qui hic paulo quā in reliquo progressu latior, amplior uē existit: non tamen, quod manifestē conspici possit, à semen deferentibus uasis foratus, sed asper duntaxat, ac inæqualis & rugosus: idq; potissimū in posteriori ipsius sede, ubi interdum deferentium ualorum ingressum accurato studio secantes, cōspicuē deprehendimus. Deinde uesicæ ceruix, qua per glandosum hoc corpus fertur, distincta ab illo neutiquā membrana est. nam solus glandosi corporis sinus communem hic urinæ seminiq; meatum cōficit, per reliquum autem processum canalisis priuatum est corpus, orbiculari musculo itatim à glandoso corpore circumdatum, & dein duobus quæ penem præcipuē constituunt corporibus adnatū. Quæ uerò hæc penis sint corpora, quæq; uniuersa ipsius habeatur constructio, simulatq; singulorum quæ iam complexus sum usus, succinctè ascripsero, peculiari Capite recensebo. Quum primū itaque hætenus commemorata diligenti sectione eris aggressus, ex iecoris, pulmonis, & renum fabrica, multorum autorum sibi pugnantium neglectis dogmatibus, pulchrè doceberis, testium substantiam ingenita sibi facultate, ex materia quam uenæ ac arteriæ illi deferunt, ac per totum testem diffundunt, semen efficere: & quemadmodum iecoris caro sanguificationis opifex censetur, ita & hanc testium substantiam seminis procreatricem, paremque hic organorum constructionem, ac in iecore esse. Perinde enim accibos nutritioni aptos ore assumimus, eosq; uentriculo conficimus, & quod cōfectum elaboratumq; est, ex intestinorum anfractibus longo ductu in iecoris cauū fertur: ita quoq; optimam sanguinis spirituumq; portionē testium uenæ ac arteriæ ipsis perferunt. non quidem breui aliquo, aut non anfractuoso progressu, uerū longissimo, & innumeris reuolutionibus spirisq; tortuoso & oberrante: ut materiā testi præparatam, seminiq; efficiendo magis opportunam communicent. neq; id in unam amplam testibus incisam cavitatem, sed in tenuissima, eademq; tunica subtili admodum formata uascula, per testis substantiā frequentissima serie distributa. Nimirum ut testis substantia (quemadmodum de iecoris carne dictum est) facultate sibi insita sanguini & spiritui perfectam feminis naturam impertiat. Atque hæc facultas in masculis roboris & utilitatis, in feminis muliebritatis causa existit: corpusq; uniuersum ita alterat, ut id quod neq; mas, neque femina per se esset, mas uel femina euadat. Rursus ut in iecore uenæ cauæ furculi ex portæ ramis sanguinem assumebant, atq; in illis quoq; is perfectius elaborabatur: sic etiam pori meatusq; innumeri, sed gracillimi, paratum à testib. semen in deferentis uasis anfractus testi cōnatos exporrigunt: ut hinc rursus ex utroque teste semen in eam sedem in uiris deducatur, qua

Glandosum corpus uasorum semē deferentium insertionem excipit.

Partium quæ hoc Capite describuntur constructionis ratio.

Partium testium materiā deductionis ortus ratio.

commodè in uterum proijci & eiaculari queat. Ad hanc functionem conducit, dextri testis uenam à caue caudice sub renum uenis enasci, quò puriorè syncrioremq; sanguinem testi offerat. Sic & utraq; arterias à magna pariter oriri magnopere expedit, ut tenuioris, impetuq; ruentis sanguinis & diuinà quæ semini inest animam, spiritum' ue magis in fæcatum deducerent. Quippe neminem iam esse opinor, qui in arterijs sanguinem cum Erasistrato non contineri, & seminales arterias nihil præter spiritum testibus adferre autumet. quam etiam & hoc Aristotelis fuerit dogma, seminales arterias sanguine uacuas esse falsò docentis. Cæterum à sinistri renis uena, eius lateris testem, suam uenam in hoc obtinere Galenus cum alijs Anatomicis omnibus attestatur, ut hæc serosum sanguinem semini communicaret, cuius acrimoniæ & mordicationis ui in seminis emissionem pruritus, titillatioq; in organo multis neruis implicito, concitaretur. Eiusmodi enim hic delectatione Galenus fieri scribit, qualem ex falsis mordacibusq; succis in his qui scabie laborant, esse cognouimus, quando illi igne, aut lecti stragulis excalefacti pruriunt, scalpendoq; succis illis cutem stimulantibus locum dant. Hoc Galeni decretum, non admodum probabile duco, quum mingentes ex tanta serosi humoris copia pruritu non afficiantur, etiam si rigido excalefactoq; pene crebro & præcipue ijs qui calculo uexantur, urinã reddi nouerimus. Quinetiã putridi seminis in uoluntario fluxu laborantes, primis diebus languido & flaccido pene pruritum etiam sentiunt, nulla præcedente penem excalefaciente causa. Ad hæc, qui ex ramis cum uitio, aut alia occasione sinistro teste castratur, coeuntes, neq; pruritu, neque uoluptate afficerentur: quod falsum esse, indies ab his quibus ramex manu curatur, audimus. Quod uerò alij halituosum seminis spiritum ad delectationis causam etiam concurrere testantur, nò mihi satis aridet, quò ea pungendi stimulantiq; uis spiritui inesse nequeat. adeò ut ad specificam essentialemque seminis formam materiamque, ac dein ad corporis quod sensu afficitur rationem hæc delectatio sit referenda. quum tota uesicæ ceruice hanc non percipiamus. neq; profectò semen pari sensu alias corporis partes, ac uterum afficit. Cæterum uasis à teste semen deferentis ad testem applantatio, nisi tenuissimis & angustis foraminulis, idq; intimæ testis tunicæ interuentu fit, quòd uas id durum, ualidum, densumq; iniurijsq; ferèdis pertinax fieri oportuerit, substantiam uerò testis laxã, mollèq; adeò ut prudens Natura hic, quæ admodum etiam nusquam, nulla essentij contraria in unũ coegerit, nisi copula aliqua amicitie societatisq; conciliatrice in medium cõiecta. Quantũ enim à uase semen deferente, intima testis tunica densitate duritiaq; uincitur, tantum ipsa testes superat, non quidem per uniuersam circumferentiam qua testi obducitur, sed eo duntaxat loco, quo uasa seminaria habet adnata. hic enim quàm per reliquum corpus mollior existit, & ut dixi, tenuibus foraminibus perforata. in hoc nanque potissimum creatur, ut testis substantiæ exquisitissimum sit inuolucrum. Vas uerò semen deferens tot anfractibus spirisq; super testem obuoluitur, ut citius & copiosius à teste semen assumat, & aliquam forsan elaborationem in ipso semen obtineat. Posteriori uerò testis sedi, non autè anteriori uas illud connascitur, ut quum iam semen confectum porrigat, contineat' ue, testis autem solum conficiat, tutiori loco uas reponatur, teste propugnaculi loco utens: atque eadem ratione quum uas peritonæum<sup>r</sup> ingreditur, sub uena & arteria meritò occultatur, quòd semen sanguine spirituq; ex quibus semen paratur, perfectius contineat. Dextrum uas cum sinistro coit, atque in uesicæ ceruicem ambo insinuantur, ut utriusque testis semen simul, eodemq;

*Uasis semē deferentis stru-  
ctura ratio.*

*y 23 fig. ad  
sub d.*



eodemq; tēpore in uterum ei aculetur. Glandulosum uerò corpus ( quod caui  
 dati finij obtinent maximum, & instar nubium exterius reuolutum ) urinæ,  
 feminisq; in uescicæ ceruice meatum humectare certum est. Et deinde uelut  
 meatuum qui per ipsum à deferentibus uasis digeruntur, sicut & uenarum,  
 & arteriarum, & neruorum uescicæ corpori & ceruici distributorum, fulcrum esse, & fortassis etiam semini quandam perfectionem indere, ad feminisq; generationem conferre uidetur. Etenim in inuoluntario seminis fluxu laborante, quem Patauij dissecuimus, corpus hoc glandosum quū diuidetur, non minus quā testes ipsos, semine oppletū conspeximus: & si uerum fatendum est, inter dissecandū in nulla penitus corporis parte, tanta seminis uis usquam, atq; in hoc glandoso corpore adinuenitur, quantū uis id à testij substantia mollitie æqualitateq; multū uariet. Cæterū Galeni de glandoso hoc corpore demonstrationem ad calcem secundi de Semine positā admiror plurimum: qui quum hoc dissectionis imperitos ne prorsus quidem cognoscere, peritos uerò uno ore omnes asserere semen illo contineri, dixisset, illorū sententiam improbaturus, hanc sæpius inculcatam ueramq; & irrefutabilem ab ipso habitā demonstrationem subiecit. Si in glandulosis astitibus (ut interpretis uoce, *ἡσυχίας ἀσπίδων* ita uertentis, utar ) semen gigneretur ( periti tamen, quib; glandulosum corpus cognitum fuit, contineri tantum dixerant ) excretionem eius castrata animalia appeterent. at hanc nō uidentur appetere: nullum igitur semen in his gigni perspicuū est. Profecto si Galeni libri de Demonstratione, eiusmodi crebris scatent demonstrationibus, quæ ipsi ( si modò ausim proloqui ) non infrequentes, ac potissimū in qua plurimum excelluit Anatome sunt, non est quod tantopere eos libros expetamus, illisq; ipsis inuideamus, apud quos à tinea & blattis nullum sui usum præbentes, deuorandi asseruantur. Præter hoc enim quod eiusmodi animalia subinde ut pueri spado nesq; in cassum uenerem appetunt, quō nam pacto quæso, etiam si tota seminis generandi uis glādoso huic corpori inesset, testibus adeptis semē ea producent, quādo resecti testes uasi ad glādosum corpus semen deferētī nihil exporrigent? Id enim ex sectione certo certius est, nullā omnino deferētī semen uasi cum uenis ac arterijs testium cōmunionem esse, qua semen citra testium opus assumerent. etsi quid tale esset, quod aliquando mihi cum plerisq; Anatomicis professoribus persuasissimum fuit, ut scilicet uena & arteria in deferentis semen uasis naturā degenerarent, exq; uena & arteria illud cōformaretur, Galeni demonstratio duntaxat in illis animalibus locum haberet, in quibus indutrius castrator testē illēis seminarijs uasis (quod factū est impossibile) ademisset. Quantū uis enim studueris deferentis semen uasis super testē circumactus, & spiras, gyrosq; ab intima testis tunica rescindere, id non prestabis, quin uasis pars quæ testi adnascitur, aspera inæqualisq; & rafa uideatur. Etsi fortē huius experientiæ studiosus, in castrando animali intimā testis tunicam aliqua ex parte diuideres, & tunicam ad seminaria uasa adhuc connatam relinquens, solam testis substantiam ex tunica liberares, necessariò adhuc pori meatusq; seminalium uasorū disrumpērētur, quæ certò per testis substantiā digeri nouimus. Huius namque administrationis, & expendendæ Aristotelis sententiæ, quæ testibus nullam seminis generandi uim tribuit gratia, in cane periculum feci: qui bellē quidem conualuit, sed generationi, ut reliqui quibus testes eruti sunt, ineptus esse uidetur. nam hic, ut & illi quoque, obesus admodum & ingenerosior redditus est. Verū ut reliqua taceam, mirum est Galenum non animaduertisse, quum huiusmodi texeret demonstrationē, ab Aristotelis

*Glandosum corpus uescicæ collo adnatis igitur.*

*Galeni Anatomica demonstratio, qua glandosum corpus semini parando non praesse conficitur.*

sectatoribus illam, ut testes ad seminis generationem nihil conducere persuaderent, in hunc modum retorquere posse: Si semē in testibus gigneretur, animalia quibus uena & arteria seminales, quā ex peritonæo elabuntur, uinculo ita essent interceptæ, aut præfectæ, ut testes in scorto adhuc relinquerentur, feminis excretionem appeterent. at hanc non uidentur appetere: nullum igitur semē in testibus gigni, est perspicuum: Sed ut glandosum corpus, si semen generaret, absiectis testibus suo munere, utpote deficiente materia, fungi nequiret: ita etiam testes suum non obirent munus, quum nullus sanguis & spiritus, iam præfectis uasis, ad illos deduci posset.

DE VIRILIS MEMBRI, PENISVE  
structura. Caput XIII.

*PENIS fabricam in primis ostendunt figura Capituli quadragesimoni, libri secundi: ut & uigesima figura huius libri, & uigesima secunda, & uigesima tertia.*



FFABRE<sup>a</sup> admodum Naturam penem extruxisse, illius functiones pulchrè attestantur. Hæc namque, quum satius fore duxisset, duos qui commodè generationi subseruirent homines procreare, uni quidem præcipuè ad feminis susceptionem, alteri autem ad eius excretionem idoneas partes adaptauit. Viro igitur membrum semini in uterum fundendo aptissimum est largita, quod concu-

bitus tempore uarios ob usus tumidū, rigidum & erectum prorsus esse oportuit. At si perpetuò ita tensum prælógumq; seruaretur, tota uita, præterquam congressus tempore, molestum foret, prompteq; iniurijs non secus afficeretur, quàm si quis semper manum circumferret protensam. Quum itaque modò laxum, gracile & breue, modò uicissim tensum tumidumque fieri debuit,

laudanda est Natura, quæ membrum his usibus idoneum confinxit. Penis enim potissimū<sup>a</sup> duobus corporibus, nullam partem (nisi fortè papillam) sibi similem nanciscentibus, construitur: quæ spiritu sanguineq; repleta, erigi, produciq; & insigniter turgere possunt: & rursus eodē spiritu sanguineq; dissolutis, arctari, concidere, flaccescere, breuioraq; effici. Quod uerò Galenus hæc corpora nunquam rescuerit, neq; illorum naturam perspectam habuerit, ipse in decimo quinto de Partium usu orationis series plus satis tibi argu-

mento erit, ubi uirilisi membri fabricam absoluerit: cuius situm Galenus prolixissimè & eleganter recenset, quod nimirū citra sectionē is illum non magis latuerit, quàm hominis digiti, & ad inguina & in poplite flexus, quibus duntaxat locis hominem à simia differre, Galenus propemodū arbitratus est. Atq; ut situs in cōspectu citra longiorem enarrationem uenit, ita quoq; leui opera colligitur, quàm is penis muneribus obeūdis examulsiim quadret, neq; aptius aliquò reponi possit: ita sanè, ut moles ipsius & forma nulli non pateant. Constructionem uerò ipsius subintran duo illum præcipuè efformantia corpora, meatus semini urinæq; communis, quatuor musculi ad penis radicem repositi: ac demum uenæ, arteriæ, nerui, cutis, & quæ huic subternitur carnosa membrana, & uinculum cutem hanc cum carne membranæ peni connectēs. Ex dextro itaq; pubis osse,<sup>a</sup> ubi id crassius & quasi teres ad inferiore<sup>a</sup> commissuræ pubis ossa cōmittentis sedem uisitur, teres quoddam corpus ualidissimè principium ducit, ligamētū naturam prorsus referens, quod ab osse nonnihil sursum recedēs, interno latere<sup>a</sup> aliud cōtingit corpus, similiter à sinistro pubis osse pronatum. Hæc corpora in eum modum inuicem committuntur,

ac si

Penis structura ratio.

Potissima penis substantia.

Galenū humani penis fabricam nunquam spectasse.

Penis situs.

Penis constructionem subestitua. Duo præcipua ipsius corpora.

41, 2, 3, 4  
fig. ca. 49  
lib. 3 A, B.  
& huius libri 22, 23  
fig. 5, 7.

d 1, 2, 3 fig.  
ca. 29 lib.  
21.  
e 1 fig. uili  
maru lib. 1  
f 2 fig. ca.  
49 lib. 3 B  
et de in illi  
substitu C.  
g eius fig.  
A & illi  
substitu C.

ac si utrarumq; manuum indices internis partibus mutuo iungeres, unitosq; fingeres. Vt enim interna indicum sedes plana, non autem gibba & teres, exterioris sedis modo est, ita etiam hæc corpora quæ inuicem connascuntur plana sunt, externis autem lateribus & superiori sede teretia inuicem iunctorum digitorum instar, qui simul commissi latius quàm profundius corpus ad penis modum efficiunt. Deinde ut inferior indicum, ita commissorum sedes modicè dehiscit, plana; uisitur: sic & penis corporū inferior sedes patens dehiscit, ac<sup>h</sup> urinarium uesciæ meatum sub se ita porrectum obtinet, ac si calamus quo scribitur, inferiori indicum sedi exporrigeres, & indices tibi penis corporum loco, calamus autem urinarij meatus uice essent. Mox enim à corporum exortu ipsis urinaris meatus, seu uesciæ ceruix subtenditur, ac cum illis ad glandes usque initium in eum modum porrigitur, ut corporum substantiam nusquam ingreditur: perinde ac in glandis sede, ubi meatum in corporum substantiam duci paulo post audies. Corpora hæc in hunc modum cnata, simulque commissa, scorum singulū oblonga referunt corpus, ex neruea contextum substantia, instar coriaceæ fistulæ, cuius interior<sup>k</sup> substantia rubra prorsus, & nigricans, & fungosa, & atro sanguine oppleta cernitur, ad eum ferè modū, ac si ex innumeris arteriarum uenarumq; surculis quàm tenuissimis, simulq; proximè implicatis, retia quædam efformarentur, orbiculi latini à neruea illa membranaq; substantia tanquam in corio comprehensa. Atque hæc duo penis corpora ad glandem usque priuatim singula nerueum retinent inuolucrum, & fungosam hanc substantiam, summa diligentia à Naturæ opum studioso expendendam. Quum autem ad eam usque penis regionem perrepserè, in qua iam glande<sup>l</sup> efformatura sunt, in acutum feruntur, & carnosa glandis substantia ipsis obnascitur, quæ meatum urinae seminiq; communem non subnatū duntaxat ut corpora illa obtinet, uerum eum in se complectitur, meatūq; ambit, qui hic reliquo ipsius ductū<sup>m</sup> amplior efficitur: & rursus suo fine extremo<sup>n</sup> ue arctatur: nō secus quàm si Natura in concubitu seminis morā, ac proinde intensiorē delectationem in glande (quā affrictus potissimū occasione adauxit) cōse cupiuiisset. Vnde etiā inuoluntario seminis fluxu laborātes, hac sede plurimū ulcerib. infestantur, propter putridi seminis in hac amplitudine asseruati acrimoniā, urinarium meatum impēse exulcerantem: qui profluentis urine mordacitate, dum urina redditur, in glāde insigniter infestatur, non minus sanè, quàm rigido pene eiusdē meatus sedes inter anum & testes, ubi perineū nobis uocatū habetur, consistens, grauiter eo malo affectis cruciat: quod in primis meatus obliquitatis ac reflexus, & insuper decliuus etiā sedis ratione accidit. Quū enim meatus<sup>o</sup> hanc primū sub penis corporibus sursum reflectitur, hæcque sedes humillima est, seminis copia à quo meatus exulceratur, nō minus hic quàm in glāde cōsistit, ac proinde magis quàm in reliqua meatus sede erodit: & deinde erosus meatus, quādo unā cum penetenditur, solutionē unitatis uehementius inibi percipit. Porro<sup>p</sup> uenæ ac arteriæ ad horū penis corporū radicem accedentes, ab illis deriuantur uenis ac arterijs, quæ humilioris illius diuisionis rami sunt, quæ uasa os sacrū prætergressa tentare, in tertio libro prodidimus: & quanquam hæc uasa ad penis corpora pertingant, uix tamen sectione assequor, quo itinere in<sup>q</sup> corporū illorum cauitatem inserantur, sanguinem eum nigricantem & crassum, quem fungosa corporum substantia plurimum possidet, deductura. Rami tamen<sup>r</sup> cuti hæc corpora induenti, etiam ante sectionē conspicui offeruntur, illamq; intercurrent. Nerui quoque huc plures ab infimis sacri ossis paribus pertingunt, secundum corporum

Meatus urinae  
seminisq; communis.

Gland.

Vena, Arteria  
& nervi

b 12. 3 fig.  
ca. 49 li. 2  
G sub A, B.

i figurat<sup>l</sup>  
49 cap. lib.  
2 D.

h 1 fig. cap.  
49 lib. 2 E.

l ad D figurat<sup>l</sup>  
49 cap. lib. 2.

m 23 fig. p.

n 1 fig. cap.  
49 li. 2 G.

o 12, 13 si v.  
et ultimæ  
fig. lib. 3 f.

p 1, 2, 3, 4  
fi. ca. 49 li.  
2 A, B.  
q 40 fig. r.



corporum longitudinem diffusi: ac duo tenues in humillima penis sede exporriguntur, unus utrinque ad meatus urinæ seminiq; communis latera. Quinti etiam & alius subinde conspicuus est, superiori corporum sedi qua hæc inuicem connascuntur, expansus. His nervis accedunt membranea uincula, superiorem corporum sedem, qua primum sursum ducuntur pubis ossium commissuræ ad eam usque partem necessentia, qua primum penis orbiculatim cute carnosaq; membrana obtegitur. Musculi quatuor penem adeuntes, in secundo libro descripti sunt: dum duos urinæ, seminisq; meatui, & singulos singulis penis corporibus aliquod usque exporrigi recensuimus. Adeo ut nihil de penis fabrica modo dicendum superfit: nisi quis Naturam laudare uelit, quod nullum adipem inter carnem membranæ & cutem peni obductas interiecerit, quo tenuius, & conuolui implicariq; & extendi aptius inuolucrum peni statueretur, quod preputium uulgo nuncupamus: in hoc in primis formatum, ut penem tegendo asseruet læuem, modiceq; mollem & lubricum, egregieq; sensu præditum, non uero callosum, cutisq; instar aridum & stupidum. Si itaq; humanum penem refeceris, non unum concavum reperiens neruum, aut ligamentum à pubis osse enatum, quemadmodum Galenus docuit, sed duo quæ descripti corpora: quæ non uacua & omni humiditate indiga, ut Galenus scribit, existunt, sed fungosa illa & ueluti carnea, uti Aristoteles rectè innuit, materia, & plurimo nigricante sanguine instar sarciminum implentur. Deinde ad seminis urinæq; meatum non alij exporriguntur musculi, quam duo illi quos à recti intestini orbiculari musculo pronasci ostendimus: quantum uis interim Galenus per totam penis longitudinem duos exporrigi recenseat musculos, secundum urinæ seminisq; meatum protensos. Cæterum haud mirum est, Galenum penis musculos non probè assecutum, quandoquidem nervosi illius cavi que quod in pene statuit corporis exortum non debite expendens, asserat, id ex superioribus pubis ossium sedib; pronasci: haud secus sanè, quam quis dissectionum rudis iudicaret penem illic primum oriri, ubi is ab osse pubis supra scortum teres ac cute obductus propendet, aut erigitur: non uero (quemadmodum nos scripsimus) animaduertet, nervosa penis corpora inferius etiam educi, quam infima pubis ossium commissuræ consistit regio, & penem mox ad anum inuocato nobis perinæo, uniuersoq; ipsius per scortum in cessu, & longo ad anteriorem pubis ossium sedem nexu, æquè crassum corpulentum que existere, ac in tereti illa & ueluti sua ex corporis trunco eminente sede, quam uulgu penem uirgamq; appellat. Neque istud solis obtigit hominibus, at uniueris quoque quadrupedibus præcipua penis portio molesq; infra pubis ossium commissuram, anum uersus, auspicatur: etiam si hæc animalia in penis constructione, non rara alioquin uulgariq; proponant discrimina. Cæterum Arabes quoque admiror, qui tres in pene enumerarunt meatus: unum quidem urinæ dicatum, secundum semini, tertium autem illi uiscido humori, quem à glanduloso corpore ceruicæ uescicæ circumnato parari arbitramur, quique hu mectum penem subinde reddit uiro impensus cōcubitum appetente, quem interim his omnibus unus extruatur meatus. Verum facili existimo hanc sententiam primum ab Arabe quopiam fuisse inuectam, qui penis sectionem aggressus, eiusq; fabricam Galeni placitis non conuenire animaduertens, tres arbitratu sit esse penis meatus: duo quæ dixi corpora, & meatum semini urinæq; & dicto etiam nuper humori communem. Quandoquidem si transuersim penem refecas, neque nigricantem qui inter secandum promanat sanguinem abstergis, profecto singula corpora singuli meatus tibi apparerent: quibus tertius accedit,

Cutis.  
Carnea mem-  
brana Mu-  
sculi.

Lib. 15. de P-  
su part.

Lib. 1. de Esi-  
stor. cap. 13.

¶ Ea sede.  
ubi specta-  
tur 22 figu.

¶ Inter 1 &  
7 figu. 22.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

11 20 fig. in-  
ter 1 & 7.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

¶ Ubi qd cō-  
stit 4. musc.  
tab. in qua  
penis pars  
in 3 tab. cō-  
spiciat est  
absoluta.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

¶ Ubi in dis-  
secta  
figu. 27 &  
musc. tab.  
ad q.

accedit, qui uerè meatusest. At expresso absterfoq; sanguine, corporum fungosa se offert substantia, leui negotio commonstrans, corpora illa meatu non esse censendos. Vt cunque tamen sit, hîc Patuij adolescens iuris studiosus, ac è nobili Symionum apud Foroiulienfes familia natus, mihi familiaris est, qui in glandis apice duos obtinet meatus, unum semini, alterum urinæ paratum. Verum quum ea quæ non nisi rarissimè accidunt, hic nequaquam commemoranda duxerim, quæ præter naturam se habere comperi, non lubens scribo. Quare etiam hermaphrodytorû species, quas aliquot hæcenus uidi, nûc non recëseo: generationis, non môstruosæ mulieris organa, modò persequuturus.

DE VTERO, RELIQUISQVE MULIEBRIBUS  
generationi famulantibus organis. Caput xv.

*PRÆSENTIBVS organa ostendendu seriatim faciunt uigesima quarta figura, & uigesima quinta, duæq; illas subsequentes.*



VVM uteri enarramus fabricã, illum opportunè in fundum, & cervicem, seu collum, non secus ac uesicã, distinguimus. quandoquidem, etsi uterus illis ambobus conformetur, unumq; ex illis cõsurgat corpus: ea tamen situ, forma, magnitudine, substantia, uasorum insertione, & id genus alijs, in uteri historia diligèter spectandis, admodum differunt. Cervix itaq; uteri à mulieris pudendo sursum

*uterû in fundum & cervicem diuidi.*

rectà per posteriorem pubis osium & uesicę regionem, ac secundum recti intestini anteriora, in peritonæi cavitatem tantisper ascendit, donec ferè è directo sedis pertingat, quæ è pubis osibus rectorum abdominis musculorum exoriantur initia. illic namque uteri cervix in fundum, aut fundus ipse in cervicem definit, adeò ut & hîc humilior quoq; fundi pars plurimùm consistat. Cæterùm superioris fundi partis, & eiusdem laterum sedes, pro magnitudine ipsius & mole uariant. Quanto enim fundus cum foetu magis increfcit, tanto etiam elatiùs, uel supra umbilici regionè, superiore sua parte protèditur: suisq; lateribus ad ilia sic accedit, ut nullum peculiarem ipsi situm circumscribere queam. In nullis tamen omnino mulieribus utero non gerentibus, fundus, sacri osis initium infimæ lumborum uertebrae coarticulatum superat, neq; in illis fundus & cervix posteriori parte aliud præter rectum intestinũ tangunt, uixq; ipsius etiam uincunt amplitudinem, & elatissima fundi pars non tam altè ac recti intestini sedes in colon cessans proreperit. imò hanc nunquã adeò altè atq; uesicam uel prorsus inanitam, cõscendisse animaduerti, nisi uterum manu apprehensum, ipsius producta ceruice, sursum traxerim. Prout namq; hanc in se laxatam & conuolutam finis, aut utero sursum attracto protendis, uteri situm plurimùm uarias. Is namq; tam liberè connexus iacet, ipsiusq; ceruix, uti suo audies loco, ea extruitur substantia, ut fundus leui opera deorsum

*uteri situs, & cum accubentibus ipsi partibus contactus.*

ac sursum agi possit. unde etiam (ne quid de uteri adferam prociencia) non admodum magna occasione in quibuldã mulieribus, præcipuè autem ætate prouectioribus, & quibus uteri ligamenta iam laxiora eualere, fundi os ad cervicis uteri os ita deuoluitur, ut mox in cervicis ore, ipso ue pudendo occurrat, sicque suprema fundi pars multo humiliùs quàm elatior uesicæ regio descendat. Quanquã interim (uti iam prius monui) puellis etiam, & illis mulieribus quæ nondum pepererunt, & quibus fundi os altiùs adhuc recõditur, uteruscq; suis ligamentis detinetur, suprema fundi pars, inter diffecandum, uesicam

a 22 fig. l.  
hol.  
b 25 fig. x.  
x. aut quic  
quid sub g.  
K. K. con-  
sistit si. 27.

c ultimaria  
fig. li. g. b.  
d 24 fig. t.  
25 fig. b.  
e 24 fig. k.  
f 25 fig. m.  
g 24 fig. c.  
D. 25 fig. a.  
G. H.  
g 25 fig. l. a.  
n. o. mus. d.  
h 24 fig. u.  
R. s. in li.  
dejununt.

i ult. fig. li.  
i. M. & fi.  
cap. 14. li.  
i. G. ad F.

k 25 fig. tu.  
xia T. et X.

l 24 fig. o.  
P. Q. 26  
fig. u. B. E.  
m 26 fig. d.  
n 25 fig. i.

ficam minimè excedere uideatur: adeò, ut uniuersæ anteriori fundi parti uescica præponatur. Hic tamen<sup>o</sup> humillima omenti sede in illis mulieribus interueniente, quibus id sursum uersus lienem non còuolutum, omnibus intestinis obducitur. Omenti enim moles longitudoque tanta est, ut inter uterum uescicamque aliquando implicari, ac ut Hippocrates de obesis dicebat mulieribus, uteri fundi os, quo etiam minus aptè concipiat, leuiter comprimere possit. Cæterum<sup>o</sup> anteriori ceruicis uteri parti, uescicæ quoque fundus illic incumbit, aut præiacet, ubi uteri ceruix fundo suo est contermina. per reliquam uerò sedem, quasi ad pudendum usque, collum uescicæ ipsi duntaxat exporrigitur. Verum quia uteri ceruix, uescicæ collum latitudine plurimum superat, tota anterior ceruicis uteri pars, uescica ipsiusque collo non operata, eam peritonæi sedem contingit, qua interna posterior ue pubis ossium regio succingitur. Porro latera ceruicis fundique uteri,<sup>a</sup> uasa quæ ipsum adeunt, & membranæ illum proximis partibus neccentes, spectant. Atque ita uterus ferè non prægnatibus situatur. in utero autem gerentibus, super<sup>a</sup> gracilia intestina sub omèto (nisi id sursum uersus lienem sit reuolutum) & anteriore peritonæi parte ducitur, ilia quoque, quum partui uicinior est, impensiusque turgēt, insigniter opplens. Quinetiā uterus his nō adamussim (ut aliàs ferè) mediā, quod ad dextrum & sinistrū attinet, sedē occupat: sed quasi elatiore apice in<sup>a</sup> dextrum magis, aut sinistrū uergit. Quod etsi subinde foetuum sexus ratione fiat, non tamen perpetuum est. Mulieres enim dextrā abdominis partem magis prominulam grauemque habètes, & foetus impetū inibi magis sentientes, foeminas perisse cognoui: & etiā in sinistro latere facta tensione ac motu, mafculos aliquando progenitos esse cōstat. Muliebris uteri formā, uescicæ plerumque<sup>a</sup> assimilamus, & potissimū<sup>a</sup> uteri prægnantiū, quibus adamussim propemodū uescicæ respōdet: quippe illis uteri fundus, ut & uescicæ, amplius egregiè, magnusque est: & ceruix, si hanc ad fundi cōtuleris amplitudinē, angusta. In non prægnantibus autē, ceruicis latitudinē, fundi latitudo uix superat: & si ceruicē uel leuissimo conatu diduxeris, iam ipsius latitudinē plurimum fundi latitudinē uincere spectabis, quum fundi substantia, utcūque manibus protendēti, haud sequax sit. unde etiā tunc iniqua quodāmodo uteri ad uescicā est cōparatio. Deinde uescica, quod ad latum profundumque attinet, exactè orbicularis est: uteri autem fundus non prægnantibus, anteriori posteriorique partibus (ut latior quàm profundior euadat) comprimitur. Vescicæ etiam superior pars exquisiti globi instar rotunda esset, nisi quā<sup>a</sup> meatus urinam è foetu per umbilicum deducens, ab ipsa pronascitur, uelut in acutum assurgeret: quum uterus interim hic<sup>a</sup> obtusus sit, quartamque circuli partem, etiam nonnihil erectam, aut nouilunij imaginem referat, non aliter quàm si superior fundi pars<sup>a</sup> utrinque obtusum constitueret angulum: perinde ac frontem uituli iam primum cornua producentis, angulosam extuberantemque esse cernimus. adeò, ut ab eiusmodi frontis imagine, cornuumque exortibus, arbitrer ambos uteri angulos, ac ueluti papillas, à ueteribus cornuum nomen obtinuisse, & à nobis quoque cornua nuncupari.<sup>b</sup> Ab his angulis, seu cornibus, uteri fundus sensim arctior redditus, deorsum ad ipsius ceruicis originem fertur: ita tamen, ut totus fundus non multo fiat longior, quàm est latus, ceruice interim instar meatus cuiusdam longa & tereti.<sup>c</sup> Fundus uteri, omni ex parte, præterquàm in lateribus, ubi exigua amplitudine uasorum membranarumque admittit applantationes, externa superficie læui & æquali, & madente ueluti linteo absterfa, subrubicanteque constat. Ceruicis quoque exterior superficies

uteri forma.

uteri cornua.

Externa uteri superficies.

o 2 fig. inferiora Q.

p 25 fig. A, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

q 25 fig. 15.

16, 17.

r 24 fig. O.

p, Q. et 27

fig. 14.

s tota ferè

7 fig.

t 16, 17.

fig. 10.

u 25 fig. 10

fer 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

cum i. h. 1.

x. aut 24

fig. T. et L.

x. 14. fig. 10

7 2 fig. 18

educitur ab

18. aut 24

fig. X. et T.

2 25 ab i et

h. ad l.

a 25 fig. i

et h.

b 25 fig. ab

i ad h. ad l.

c 26 fig. fun

das læui

est ad h. ad

super ad h.

quod est

proximum

A.



d 27 fig. 104  
tur A, A.  
B, B, C, D.  
e 26 fig. L.

Fundus uteri  
sinus.

f 17 fig. C, D.

g iuxta G  
27 fig. quo so  
ravit no-  
tatur.  
intrinsecus ad  
latus E 27  
fig.  
i 25 fig. 4, h.  
h 27 fig. E, F.

i 25 fig. 0.  
m 23 fig. 0, 1, 2, 3, 4, 5.

n 25 fig. M.

o 26 fig. B, B.

p 25 fig. F.

q 27 fig. 0.  
26 fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

Interna cervi-  
cis uteri super-  
ficies.

Prominula in  
cervicis orifi-  
cio caruncula.

Ipsi scrobis  
ex uestica colli  
in illa inseritur.

superficies in posteriori ipsius parte ab uteri fundo nonnihil ultra medium suae longitudinis, & anteriori etiam parte fundo propinquiore, laevis ac humecta (magis tamen quam fundi superficies candicans) conspicitur. Per reliquam uerò externam sedem, propter quarundam partium adnexum aspera existit, earum membranarum modo, quae in uicē adnascuntur.<sup>a</sup> Interna fundi superficies, non praegnantibus aequalis quoque ac laevis, ut & inanitarum uesticarum apparet. Sed harum<sup>e</sup> sinus maioribus profundioribusque rugis oppletur, illius uerò pluribus quidem, at uisum quodammodo propter continuitatem densitatemque fugientibus, non aliter quam si exactissimè laevis foret. Attamen fundi uteri sinus, perinde ac inuersum uirile scortum, leuiter & perquam modicè extuberantem<sup>f</sup> futuram, seu tenuissimae lineae instar prominens taberculum obtinet, secundum uniuersae sinus superficiei longitudinē anteriùs & posteriùs exprorectum, quasi quoddam totius superficiei in dextram superficiem & sinistram interstitium, aut obscurissima potius quæpiam cõseri posset notula. Neque etiam aliud, præter hanc uix eminentē lineam, occurrit septum, aut signum, quo internam fundi superficiem, in duas subdiuidere liceat, adeò ut tota superficies unica duntaxat sit cavitatis aut sinus, quo genitale semen excipitur, foetusque in utero continetur. Sinus iste, formam fundi uteri magna ex parte referens, latior est & albior, quam profundior, humilimaque<sup>g</sup> sede iuxta fundi foramen angustus cernitur: superiore autem sede latus, qua ueluti in duos cessat<sup>h</sup> angulos ad elatioris fundi partis<sup>i</sup> latera cornuaque cõscendentes. Media enim<sup>j</sup> sedes superioris partis sinus non tam altè ac latera ipsius cõscendunt, ob uteri substantiam deorsum hic quasi septum aliquod & tuber in cavitatem sinus spectantē. Hunc sinum in non praegnantibus, ut plurimum uiscido quodam & subbalbo mucosum illitum, & colore inter pallidum & rubrum medio perfusum, & in suis angulis superioribus<sup>k</sup> uel ipsius apicibus, quam reliqua amplitudine rugosiores, ac omnino illi<sup>l</sup> cavitati similem comperi, in quam deferentia semen<sup>m</sup> uasa uiro ad penis initium inferuntur. Nullus enim inibi in mulieribus inuoluntario seminis fluxu, seu albis, ut uocamus, menstruis non laborantibus, manifestus (quemadmodum neque in uiro) se offert meatus, nisi ex uase semen deferente stylum acutiorem secundum uasis insertionem ui intrudamus, ac secus quam secundum naturam habet, meatum dilatemus. Cæterum interna cervicis uteri<sup>n</sup> superficies, quom conuiet, nec alioquin distenditur, undecunque rugosa implicitaque est, ac in se concidit: si uerò admodum inducitur, exactè laevis & lubrica per uniuersam ipsius longitudinem, apparet, præterquam ad eam partem, qua in pudendum terminatur. Hic namque perpetuò præter laxos implexus, illas cuticularcs<sup>o</sup> carunculas non aequaliter omnibus mulieribus instar geminae linguae propendulas adipiscitur, quæ Græcis *νυμφή, μύετορ, ὠιδέρις* & *ἐλντορίς* uocantur. qui earum præcisionem plus quam quis facile arbitraretur cruentam, & cicatricem perinde ac reliqua huius sedis ulcera difficulter suscipientem, docuerunt: quòd illæ carunculae nonnullis mulieribus ad tantam augeantur molem, ut pudorem deformitatemque inducant, & multis nationibus insignis quoque impudiciæ argumento sint: imò à uestimentis iugiter attritæ, ad libidinem irritant. Vnde etiam Aegyptijs uisum est, ut anteaquam illæ longius exerantur & propendeant, tunc potissimum amputentur, quum proximè uirgines nupturae sunt. Ad hæc, uteri cervix in anteriori sua sede, paulo supra pudendum, ubi uestica<sup>p</sup> excipit collum, non adamussim aequalis cernitur. Nam præter scrobiculos quosdam transuersim ductos, quibus uteri cervix hic contrapubis ossis renixum,

11 palati

palati cuiusdam instar, exasperatus, utrinque ad insertionis colli uesticæ latera, tenuis uteri cervicis portiuncula excrescit, in ipsius cavitatem propendens, ac illis inembraneis processibus forma perquam similis, quos regressum urinæ ad urinarios meatus è uestica, & bilis confecti ue in uentriculo cremoris ex duodeno intestino in deferentem bilem meatum, prepedire inuimus. Haud secus, quàm si uteri cervix urinam promptè admitteret, penduli uerò illi processus hanc aliam ue potius materiam in uesticæ collum regurgitare prohiberent. A tergo etiam huius colli uesticæ insertionis, paulo ue interius, carne a occurrit membrana, quæ hymen & eugion appellata, uirginibus est peculiaris. In cæteris namque mulieribus coitu, aut alioquin petulanti quopiam attritu diuulsa, lacerata ue aboletur, neque inter secandum alias ue liquidò sese offert: quum interim uel citra dissectionem in puellulis, diductis nimirum illarum, perinde ac si emitturæ essent, cruribus, persæpe uisitur. Perinde enim ut septum transuersum in homine reponitur, aut potius, ut uasis alicuius fundus transuersim ipsi innexus commissus ue est: ita quoque membrana hæc transuersim in ceruice uteri ea qua diximus sede consistit, & cervicis substantiæ eum in modum continuatur, ac si ex ipsa non aliter enasceretur, quàm cuticulares nuper dictæ carunculæ ex illa prodeunt. Carne hæc membrana, tota sede qua è cervicis uteri lateribus enascitur, modicè crassior est, quàm reliqua ipsius amplitudine: quæ alioquin insigniter tenuis, & non secus quàm carneæ quæpiam membrana mollis existit, longa sectione instar rimæ cuiusdam peruia. adeò, ut huius sectionis occasione, hymen sanguinis menstrui purgationem in uirginibus neutiquam impediat, & albi illius crudiq; humoris fluxum quoque promptè transmittat: quem etiam admodum puellis nonnunquam accidere, Aristoteles rectè prodidit. Quòd uerò Arabes alicubi quinque uenulas in cervicis uteri medium pertinere, ac dextrarum uenularum ora, sinistri lateris uenularum oris committi, ex hisq; Centonem ipsorum interpretibus uocatum, adeoq; hymenem efformari scripserint, coniectura magis, quàm sedula refectione facti mihi persuadeo: quò scilicet membranæ huius nostræ Arabes haudquaquam meminerint, sed commissas in uicem suis oculis quasdam in uteri ceruice reperiri uenulas, ex sanguinis fluxu imaginati fuerint, qui sanè in prima coitione, quam Terentius acerrimam duxit, copiosissimè profluit, modò tunc puella integrè aliàs, & prius quauis tandem causa non utiatum hymenem habeat. Quanquam enim nullæ uenulæ ab Arabibus traditæ, suis finibus conniueant, connatæ ue sint: nihilominus tam rationibus assequi est promptissimū, quò membrana hæc, in petu rupta uel lacerata, & dein còtinuo affricu diuulsa excalefactaq; sanguinè promanare sinat: nò aliter quàm in coitu ruptum præputij uinculū, quod plus æquo excedens, glandis apicem deorsum præter modum intorquet. Ceterum, ut uulgò (quamuis falso interim) ferunt, modò apud has, modò apud illas nationes, nuper natis puellis, quo facilius aliquando pariant, pubis ossa, nescio quibus modis seiungi: ita quoque ab obstetricibus matronisque quibusdam interdum audiui, nonnullis morem esse, ut puellulis membranulam quandā, seu pelliculam, perinde ac frustra mulieribus datam, ita effringāt, ut Iudeos uirilem glandem de tegere, præputiumq; rescare adhuc hodie cernimus: utq; etiam sedulas obstetrices puerorum iam iam in lucem editorum ori indicem inde, ac linguæ uinculum, si fortè plus iusto in anteriora pertingat, contrahitq; sit, dilacerare nouimus. quod si sit, hymenem tunc disrumpi, uitariq; & quibusdam nupturis non leue rarumq; commendandæ uirginitatis argumen-

r 33 fig. u.  
dein 15 fi.  
R. aut 23  
d.

57 muf.  
tab. 2.

Hymen.

argumentum præberi, arbitror. adeò, ut hac quoque occasione puellas absque hymene non secus nasci contingeret, quàm ludæorum pueros interdum recutitos in lucem prodire certissimum est: utq; raras quasdam capitis figuras, citra omnem quæ ab obstetricibus matribusq; adhibetur compressionem, nonnullis nationibus, ueluti proprias iam esse factas, non ambigimus, multaq; peculiararia in equorum pullis tempore euenire constat. Vt cunq; sit, nullus in uirginibus internæ ceruicis uteri superficiei laterum ad inuicem est connexus, ab eo quem quis fortè hymenis aliàs etiam perforati beneficio, fieri diceret. Præterea uteri ceruicis cavitates, ipsius uniuerso ductu, nullibi neq; uirginibus, neque iam coitu exercitatis mulieribus angustior, quod ad compositionem attingit, redditur: imò æquè capax est quàm fundo continuatur (si modò inibi amplior distendiq; aptior non sit) ac quàm in pudendum cessat. In elatiore humilioris cavitatis sedem, ex humillima fundi uteri regione insignis suæ substantiæ exportigitur portio, quæ penis glandem quasi referens, obtuso suoq; mucrone ceruicis uteri latera nusquam contingens, foramine quodam peruia est: quod uteri aut fundi ipsius os nõ secus uocari solet, ac muliebri pudendum ceruicis os nuncupamus. Verùm, ut hoc alioquin nõ diductum aut dehiscens, sectionis secundum corporis longitudinem ductæ modo, aut instar I conuiuet: ita quoque illud scissura trāsuerfa & ueluti literæ Θ centro simili, (at non perpetuò æquali) donatur. Prægnantibus enim rugosa admodum & perquam angusta esse, specillumq; uix admittere putatur. Quæ nuper pepererunt, scissuram hanc ampliorem, minusq; contractam rugosam uel possident: non prægnantes, medio se habent modo. Quod tamè fundi orificiũ, quoties dehiscit, orbiculare (ut & ceruicis orificiũ) reddatur, manifestũ esse arbitror. Aperitur autem in partu, quũ fœtũ illiusq; inuolucra emittit, & quũ mēstruis purgationibus uiam dat, dein in coitu: nõ semper quidẽ, sed quũ uirile semen appetens, id naturali motu sugendo allicit: & quando uterus non concepturus, uirile semen unà cum muliebri semine iterũ eructat: aut quum in pollutione, uel affrictu, muliebre semen excernit. Nequaquã enim uteri ceruice uiri semẽ admitte, aut alioquin distẽta, simul quoq; fundi orificiũ perpetuò recluditur. quippe haud decuisset insatiatæ mulieris arbitrio, etiã post conceptũ, uenerẽ procciter nemiũ desideraturẽ, orificiũ illud subijci. Vt interim præterea, quãta conseruationis speciei noxa, mulieres subinde geniturã præter sententiã non referuarent: quãtaq; licetia, nullo cõceptionis habito metu, maritis parētibusq; imponent, si modo fundi orificiũ ita ac ceruicis orificiũ ex mulieris arbitratu aperiri potuisset. Vteri magnitudinem, quum ipsius explicaretur situs, aliquo etiam pacto recensuimus: neq; hæc sanè promptius, quàm uentriculi moles, describi potest. Fundi enim magnitudo pro contentæ in illo genituræ aut fœtus quantitate uariat, & ceruix quoque modò complexa rugosaq; conuiuet; modò in coitu ad penis, in partu uerò ad fœtus formam diducitur. Et quemadmodum distentionis ratione, non eadem ceruici adest latitudo, ita quoque neque par longitudo. nam nobis uterum inter diffecandum attollentibus, in miram longitudinem ceruix porrigitur. adeò ut non minus ridiculum sit, uteri ceruicis quàm penis (cui illa instar uaginæ censetur) longitudinẽ latitudinem uel describere. Quinetiam uteri ceruix pro mulieris libidine turgidior, angustiorq; & directior (præterquam quòd alijs natura sit strictior) efficitur. ac proinde etiam haud miror, omnes quodam digitorum numero eius longitudinem describere aggressos, inter se discrepare: & hunc à pudendo ad fundi sinum undecim, illum duodecim, istum plures, alium pauciores digitos enu-

137 figur.  
K, K.  
11 17 ff. ad  
uiriã se-  
dem.  
x 16 ff. C.  
dein D. et  
17 ff. G. G.  
y 21 ff. G.

Fundi uteri o-  
rificium.

Muliebris  
uteri magni-  
tudo.



merare: & quod omnium absurdissimum est, parem in non prægnantibus fundi ceruicisque statuere longitudinem. Præterea uterus in eum modum à peritonæo ligatus pendet, ut ipsius fundus sursum & deorsum plus minus in coitu, quum generationem expetit, sese ducere, ac ad penis summum tanquam animal quoddam (ut & Plato dicebat) hiare possit. Insuper uetulis & ijs quæ sæpius pepererunt, aut rudius ab obstetricibus in secundarum euulsione fuerunt tractatæ, fundi os in pudendum quasi dependet, ac proinde breuissima implexaq; in illis ceruix uidetur: quæ tamen inter secandum sursum tracta, aut aliàs in uiuentibus intrò protèsa, longè educitur. Quòd autem puellis uteri fundus minor sit, quàm illis quæ iam diu coiere, aut aliquando uterum gessere, etiam alijs proditum est Anatomicis: quanquam in his omnibus testium ferè ritu, sic fundus uariet, ut nullam ipsius molem (quemadmodum neq; uesicæ) priuatim circumscribere queam. Vtunque sit, nò prægnantis uteri fundus multo minor est, quàm dissectionum rudis facile sibi persuaderet. quum latitudine duos digitos parum excedat, & longitudine uix unquam trium digitorum latitudinem æquet. Porro dissectionū professoribus, etiam in menstruæ purgationis occasione, fundi uteri magnitudinis poni differentiã, legi quidem, quando uterum sanguine turgentem, & paulo post eum repurgaturum, illo grandiores esse docent, qui nuper uniuersum sanguinem profudit. Verùm hac ex parte nunquam mihi se obtulit uteri discrimen: & de sanguinis illius collectione, & purgatione, infrà quædam subijciam, nunc uteri substantiam pertractaturus. Non prægnantium itaque fundi substantia conspicitur neruea, membranæ ues, sed interim admodum crassa, & nò adamsim, ut cætera quæ generatim neruosa dicuntur, candicans, sed carneum quid colore & substantia præ se ferens, & passim denique continua, & duritiæ sibi æqualis, nisi fortè ad fundi os paulo durior collectiorque aut densior euadat. In exteriori huius substantiæ (quæ utero, ut semel dicam, quodãmodo propria & peculiaris est) superficie, obscuræ gracilesque uenæ integro adhuc utero excurrere uidentur, inter interiorē exteriorēque ipsius tunicas, incedentes. Sunt enim duæ uteri tuniciæ, quarum exterior principium ducit à membranis, quæ uasa uterum accedentia continent, uterumque peritonæo alligant. À peritonæo namque, quæ uasa ipsi adnascuntur, quæ à magna uasorum distributione supra sacrum os facta, uersus crura tendunt, partes quædam processus ues exoriuntur, membranarum mesenterium efformantibus substantia formaq; similimi. Sunt enim hi processus instar duarum tenuiū membranarum in ipsarū medio uenas & arterias & nervos aliquot deducunt, & multo adipe oppletarum, quæ à peritonæo utrinque procedentes, totis ceruicis & fundi uteri lateribus ad eum modum committuntur, quo intestinis mesenterium applantari docuimus: & quemadmodū mesenterium illis tertiam obducit tunicam: ita etiam hæc peritonæi membranæ in secundam exteriorē ues uteri degenerant, longè ea crassiorē, quæ à mesenterio intestinis offertur, quòd scilicet quatuor peritonæi portiones, utrinque nimirū duæ, uteri efforment tunicam, tertia interim intestinorum à duabus tantum constituta membranarum. Verùm uteri tuniciæ crassities ob hoc duntaxat non tanta est, quòd ex tot peritonæi exurgit partibus: sed quia hæc in contracto, & non grauidi utero, impense collecta compressaq; dissecantibus occurrit. Interior fundi uteri tunica, ipsi peculiaris & propria est, ab eaq; compingitur substantia, qua fundum præcipuè constare diximus. Hæc itaq; tunica in non prægnanti utero crassitie omnes reliquorū corporis organorū tunicas, uel tres etiã uen-

2 Mole  
uteri ut m  
xina, ex-  
primatur  
27 fig.

a Conspici  
tur ad E.  
E. E. 17 b.

b iuxta G  
27 fig. C.  
iuxta C.  
D 16 fig.

c 27 fig.  
B. E.  
d 27 fig.

H. H.  
e 24 fig.  
O. P. Q.  
f 26 fig.  
E. E. 17  
j. l.

g 25 fig. n.  
u. z.  
g ult. fig.

lib. 3 b.  
h 24 fig.  
F. G.

i spectatur  
in 10 fig.  
k 5 fig. k. k  
educit L.

l 27 fig.  
E. E.

m 17 fig.

in Timao.

p uteri fundi  
substantia.

q duarum uteri  
tunicarum ex-  
terior.

r interior tuni-  
ca.

119 fig. triculi & intestinorum simul implexas, uincit. Ipsa tamen omni ex parte non  
 927 ff. G. pariter crassa uisitur. Vbi enim fundi efformat orificium, crassissima est, de-  
 127 fig. E. inde in media<sup>p</sup> sede superioris fundi partis crassa quoq; est admodum, & (ut  
 in fundi sinus enarratione dicebam) in ipsū quasi sinum extuberat. Cæte-  
 955 fig. rum quā uterus in obtusos<sup>o</sup> angulos sua<sup>o</sup> ue cornua definit, hæc tunica tenui-  
 1, h. minusq; spissa uel densa dissecantibus quā in reliqua parte occurrit. In la-  
 teribus autem, & anteriori & posteriori sede pariter crassa existit, adeoq; com-  
 pacta, ut nihil præter ipsius substantiam citra fibrarum quibus abundat distin-  
 ctionem, & notatu dignum uenarum arteriarumq; incessum, utcunque tuni-  
 cam illam disseces, intueri liceat. Verū in illis quæ iam aliquandiu utero ge-  
 runt, interior hæc tunica, triplex fibrarum genus, etiam multo manifestius,  
 quā nuper ex animante resecta, & quæ modò inflatur uesica, proponit. ac  
 rectas quidem habet intimas, easq; nō admodum numerosas: extimas autem  
 orbiculares transuersas<sup>ue</sup>, rectarum copiam nonnihil superantes: medias  
 uerò nanciscitur obliquas, easdemque plurimas & ualidissimas. Dein in præ-  
 gnante utero uenarum arteriarumq; hanc tunicam perreptantium magna  
 116 tabula ff. conspicitur copia, quæ suis osculis tunicam ingredientia, in<sup>o</sup> secundinas (uti  
 300 in foetus inuolucrorum dicemus historia) pertinent: & ipsa denique tunica  
 tanto est rarior tenuiorq; & magis neruea membrana ue, ac minus car-  
 nea, quanto magis uterus ipse in magnitudinem promouit. Cæterum cer-  
 127 figur. uicis uteri<sup>o</sup> substantiæ aliquid commune cum uirili pene accidit. quemad-  
 K. modum enim duo huius<sup>o</sup> corpora, & glans præcipuè, crasso inuolucro inter  
 1 fig. 64. 49 neruum carnemque substantia medio, & fungosa spongiosaque quadam  
 lib. 2 A. B. substantia infarto: constant: sic quoque ceruix uteri carnea nerueaque, sed  
 u carundē fig. D. non impense crassa, constituitur tunica, substantiæ etiam illius fungosæ non-  
 x Causiū nihil possidente. Huius substantiæ beneficio, quum mulier uenerem auidè  
 tionem hæc ostendit 3 expetit, uteri ceruix penis modo extuberat, pudendiq; ipsius colliculi ac  
 fig. 64. 49 cuticulares illius carunculae extrà prominent, ceruicisq; cauitas penem am-  
 lib. 2 ad B. plexura arctatur, & quod ad rectam uirilis seminis euibrationem sat est, di-  
 E, F. rigitur. At istud parum illi expenderunt, qui ceruicem uteri multis & orbi-  
 725 fig. y. cularibus musculis, non aliter quā uesicæ<sup>o</sup> ceruicem, & recti intestini<sup>o</sup> ter-  
 28 fig. d. minum intertexi finxerunt. Quod, etsi plerisque mulieribus concubitus uo-  
 luptatem forsā augeret, & pariter in causa esset, cur illæ constringentium  
 arctantiumque medicaminum copiam nostris officinis relinquerent: ni-  
 mis tamen uoluntariam uim Natura genitalibus indidisset, & nescio quō-  
 nam pacto penem plus iusto uteri ceruicis arbitrio subiecisset. Porro Ana-  
 tomici uerius scripserunt, ceruicem in puellari ætate delicatorem mollior-  
 emque esse: contrà in prouectioribus, & ijs quæ frequentius pepererunt,  
 callosiorem temporis successu reddi, ut etiam cartilagini asperæque arteriæ  
 illam in uetulis subinde comparauerint. crebro enim congregientium attri-  
 tu, partiumque exeuntium collisione ceruix occallescit: & frequenti astrin-  
 gentium lotionē, assiduoque inensum fluxu, haud secus induratur, quā  
 ob acrem humorē continuò defluentem ulcera ad fistulas permutati noui-  
 mus. Venæ & arteriæ ceruicis insertæ, non prægnantibus manifestiores pro-  
 pemodum mihi semper uisæ sunt, quā fundi: diuersum tamen utero ge-  
 rentibus accidere certum est. At uenarum arteriarumque uteri seriem, iam  
 unā cum seminalium uasorum fabrica, & uteri neruis, opportunè aggre-  
 diar. Mulierum itaque testes, uteri accumbunt lateribus, non prægnanti-  
 bus quidem paulo elatiūs quā fundi superior consistit pars. utero autem

*Ceruix uteri  
substantia.*

*Mulierum te-  
stes.*

gerentibus eandem ferè sedem occupant: at quo magis uterus extenditur, eo inferius quàm ipsius summum habetur, ad latera illius siti apparent. Innituntur autem peritonæo ea sede, qua ilium ossa sacro committuntur, omnino laxi, neque aliter quàm<sup>b</sup> feminalium uasorum beneficio<sup>c</sup> laxisq; membranis, peritonæo connexi. Hi uirorum testibus multo minores sunt, forma uerò oblongiores, & secundum latitudinem minus rotundi, & perinde ac si latiores quàm profundiores effici deberent, anteriùs posteriusq; depressi. Externa ipsorum superficies inæqualis, & haud secus quàm si plures eadẽmque exiguæ unà colligarentur glandulæ, multis inæqualibus tuberculis oppleta uidetur. Substantia quippe non constant, ut uirorum testes, molli, ac innato sibi humido læui, continua & æquali: uerùm duriori, mesenterijque ac inferioris omenti membranæ<sup>a</sup> glandosis corporibus non absimili, & præter exiguos uenarum & arteriarum in ipsa consistentes plexus, sinuosa cauaq; . Habent enim mulierum testes intus præter uasa, sinus quosdam tenui aqueoq; humore ple-  
nos, qui prius non læso teste, sed ui compresso, ac inflatæ uesicæ modo crepante, in miram altitudinem inter diffecandum, non secus quàm ex scaturigine quapiam exilire solet. Vt uerò is humor uelut crassiusculum lactis serum in sanis mulieribus albus est, ita quoque illum mirè luteum croceumque & paulo crassio-  
rem deprehendi, in duabus non uulgariter nobilibus puellis, quæ ante mortem, uteri strangulatu uexabantur, quibusque alterius testis sinuum unus duntaxat, instar maiusculæ pisæ protuberabat croceo humore illo infartus, & conterminas sedes non secus tingens, quàm in hominibus colon intestinum, quò sub iecore fertur, à bilis uesicula luteum reddi cernimus. Vtque huius humoris liquoris uè rarus occurrit color, ita quoq; grauissimè olebat, uenenosumque quid & tetrum præ se ferebat: illorum cerebri symptoma-  
tum indubiè autor, quæ in uteri strangulatu indies oboriuntur. Vna uirgo annos nondum nata quatuordecim, ex pulmonum, ut uidebatur, inflammatione, & frequenti in eo morbo uteri strangulatu periijt, qui non ita pridem molestus esse cæperat. Altera annos iam attingēs duos de uiginti, posteaquam uno aut altero anno insigniter palluerat, illisq; symptomatibus subinde oppres-  
sa fuerat, quibus puellas modò ferè teneri constat, quæ perditè amantes, men-  
struas purgationes diu propressas habent, aut quibus albus ille & crudus humor longo intervallo profluit: ex uteri inquam suffocatione ita interiijt, ut quum porrecti ueneni parentibus incideret suspicio, ea mihi medicisque ali-  
quot ad expetitam sectionem obtigerit. qua præter ingentem pulmonum albedinem, mollitiemque, ac totius corporis exanguem habitum, nihil uitio-  
sum, uel circa uterum ipsum, deprehendi, præter luteum illud miris modis olens alterius testis tuberculum. Muliebrium itaque testium (ne fortè ad mu-  
lierem, cuius in Capite de liene obiter mentio incidit, & monstruosa alioquin & egra prolixius excurrat oratio) sinib. nulla peculiaris est forma: ineq-  
uales enim, ut exterior ipsorū testium superficies, sunt: & nò unus, sed plures, neq; illi  
semper iidem cernuntur. Testiū substantia membraneo inuolucro undiqua  
que circumdatur, quod ipsi ualidissimè adnascitur. Atque hoc quidem, etsi  
durum sit, longè illi tamen<sup>e</sup> inuolucro quod uirorum testes proximè am-  
bit, duritia & crassitie cedit: neque adeò promptè à testium substantia inter  
secandum diuellitur, non secus quàm si commune continuumque cum testis  
substantia esset corpus: quam ea quoque ratione quis etiam membraneam esse,  
meritò diceret. quanquam interim præsens mulierum inuolucrum, eundem  
usum suo testi præbeat, quem uirorū testis intimum inuolucrum suo testi præ-  
stare

*Testium sinus,  
& in illis con-  
tenuis humor.*

*d. 10. 11. fig.  
L. 1. L. 2. 4.  
fig. 1. 2.*

*Testis inuolu-  
cra.*

*e. 27. fig. 1.  
R. 5.*



stare cōstat. <sup>1</sup> Vāforum namq; feminaliū appllantatiō ē excipit; gāldolofamq; testis substantiam ueluti in forma quāpiam continet. Præter hoc autem inuolucrum, muliebris testis nullum aliud obtinet, nisi <sup>2</sup> quod peritonæi processus uasā seminaria utriq; uenas & arterias in testis ambitu cōtinentes, & uespertilionum alis forma longè similimi, & ab Eudemo retia non ineleganter nuncupati, testis medium duntaxat partem integunt: non uerò (ut <sup>3</sup> exterior uirilis testis tunica suum testem, illiusq; seminaria uasā) prorsus induunt. Cæterum uasā muliebribus testibus materiam ad feminis generationem adferentia, similiter ac in <sup>4</sup> uiris, duæ sunt <sup>5</sup> arteriæ, & totidem uenæ, utrinque nimirum una uena, & una arteria, quæ exortu quidem uiro-<sup>6</sup>rum uasīs prorsus correspondent: in distributionis autē serie & progressu, ab illis differūt. Dextra enim muliebris <sup>7</sup> uena à cauæ uenæ pronata caudice, simul cum coniuge sua <sup>8</sup> arteria, cui magnæ arteriæ truncus initiū præbet, priusquā sui lateris <sup>9</sup> testem contingit, simul quidem cum arteria ita implicari permisceriq; <sup>10</sup> incipit: ac uiro-<sup>11</sup>rum uasā posteaquā è magna peritonæi cavitāte prociderunt, <sup>12</sup> inuolui uidentur. uerū mulieris uasā non inuierum ipsorū corpus (perinde ac uiris euenit) in implicationē eam absumunt, sed <sup>13</sup> mediā sui partem in superiorem fundi uteri sedem sic digerendam porrigit, ut <sup>14</sup> cæteras uterum petentes uenas ac arterias multis propaginibus discindi distribuiq; audies. Porro ea <sup>15</sup> implicatio, quæ à reliqua mediā uasorū portione cōstat, paulatim magis magisq; ut in <sup>16</sup> uiris, inuoluitur, uaricosumq; corpus efformat, sua <sup>17</sup> basi, elatiori testis parti adnatum, & ramos in testis substantiā, & illum proximè ambiēs inuolucrum diffundens. Hac quoque ratione <sup>18</sup> sinistra feminalis uena à cauæ propagine sinistro reni oblata, initium sumens, cum <sup>19</sup> sinistra arteria à magnæ artenæ pronata caudice distribuitur. dein utriusque testis <sup>20</sup> uas semen ab ipso in uterum deferens, testis corpori, perinde ac in <sup>21</sup> uiris connascitur: quanquam interim testis magis orbiculatim, quā in posteriori solum sede, aduoluatur. Ab inter-<sup>22</sup>na enim sede basis <sup>23</sup> uaricosi corporis <sup>24</sup> incipiens, externo testis lateri, & deinde inferiori illius parti, ac nonnihil interno quoque lateri <sup>25</sup> adnascitur, haudquaquam tot reuolutionibus instar uermis equaliter procedentibus, quā testis <sup>26</sup> adnascitur, ac uirile <sup>27</sup> uas donatum. Porro à teste nonnihil sursum ascendens, & testi non amplius adnatum, reuolutiones eas amittit, ac <sup>28</sup> teres planumque instar nerui in uterum errabundo ductu (quem ueterum quidam laxè con-<sup>29</sup>torto uitis pampino capreolō uē assimilantur) fertur, in medium sui lateris cornu sedem inferum. <sup>30</sup> His organis, quæ peritonæi processibus membranis-<sup>31</sup>ue admodū pinguibus intertexuntur, tutoq; suffulciuntur, per me quidem licebit quæuis nomina imponere: ego autem, quoniam uiro-<sup>32</sup>rum organis forma substantiaq; correspondent, eadem nomina illis, quæ his, inter docendum in-<sup>33</sup>dere soleo. Cæterum præter nuper <sup>34</sup> commemoratas uteri uenas & arterias, quæ à mediā uasorū testi materiam adferentium portione constituuntur, <sup>35</sup> aliæ multo crassiores uterum à caua & arteria magna post illarum supra sacri osis initium factam <sup>36</sup> diuisionem, accedunt. Postquam enim ea uasā pri-<sup>37</sup>mum in duos insignes truncos diuisa sunt, & hi rursus singuli in <sup>38</sup> duos gran-<sup>39</sup>des, sed amplitudine impares ramos dissecti: unum quidem crassio-<sup>40</sup>rem, ac per inguinā crus adeuntem, alterum uerò humilio-<sup>41</sup>rem gracilio-<sup>42</sup>remq; cuius <sup>43</sup> finis per pubis osis <sup>44</sup> foramen elabitur, utri inquam uenæ ac arteriæ oriuntur, à graciliori humiliori-<sup>45</sup>que secundæ illius diuisionis ramo utrinque pronatæ. Ramus enim in dextro consistens latere (quod & de sinistri lateris ramo subaudies) insignem educit propaginem: uena quidem uenam, arteria au-

*Seminaria uk-  
sa mulieribus  
cuiusmodi.*

*Pleridarteria*  
*et hendi*

tem arteriam: quæ simul accumbentes, dextrum uteri latus propter fundi orificium accedunt, inibi quæ in multas scissæ soboles, quasdam sursum in humilio-<sup>p. 1 tabellæ  
fig. 30 H.</sup> rem fundi sedem exporrigunt, quasdam per uteri cervicem deorsum digerunt, nonnullas etiam uesticæ impartientes. Ab his uterum accedentibus uasis (uti quis fortè arbitraretur) uenæ & arteriæ nequiquam originē ducunt, quæ secundum rectos abdominis musculos sursum feruntur, & uasis per posteriorem pectoris ossis sedem descendantibus conterminæ fiunt. Hæ enim ortum sumunt à præcipuis uasis per inguina in crus deductis: à quibus etiam fursculi pronascuntur, muliebri pudendū colliculosque ipsius petentes, unā cum præsentibus uteri uenis ac arterijs. ab ossis sacri nervorū paribus utrinque etiam nervi propagantur, tenuibus fursculis in uteri potissimum cervicem, & circa humiliorem fundi sedem excurrentes. Ad elatiorem porrò fundi regionem, subinde nervuli perquam graciles diffunduntur, à sexti nervorum cerebri paris ramis dissecti, qui costarum exporriguntur radicibus. Verum, ut hi nervuli prætenues albicantesque sunt, & pinguibus membranis, uti & prius commemorati, suffulciuntur: ita quoque inter secandum difficile ter occurrunt. Nunc itaque propemodum euadit manifestum, quas partes uter-<sup>z 24 fig. P.</sup> terus tangat solum, ac quibus insuper alligetur & adnascatur. Anterior enim, posteriorque & superior fundi uteri regiones, nullis quas contingunt partibus adnascuntur, latera uerò connascuntur membranis uasa utero deducen-<sup>z 24 fig. P.</sup> tibus, ac demum carnis illis fibris intertextis: quæ duos efformant musculos, quorum beneficio uterus uoluntario motu non nihil obscureque sursum, dum mulieres ilia contrahunt & quasi colligunt, allicitur, quique adeò oblique properepunt: & quæ uterum accedunt, adeò interdum crassescunt, ut perperam illos musculos uteri cornua esse aliquando arbitratus fuerim, quòd scilicet obtusos muliebris uteri angulos papillasue cornuū imagini non admodum accedere uidebam. Cervix porrò uteri ex lateribus membranarum quoque & uasis ipsi porrectis adnascitur, & illorum interuentu peritonæo (sed, quem admodum & uterus, laxè) connectitur. Posteriore autem parte, suæ longitudinis medio, quod fundo propinquius est, recto intestino ita innititur, ut accumbentes inuicem intestinorū gyros mutuo allocari cernimus. Verum ad cervicis in pudenda finem, illa podici proinde connascitur, ac si recto intestino & ipsi communis quedam esset tunica, uti stomacho & asperæ arteriæ communem esse tunicam non ambigimus. Rursus cervix anteriori sede, elatius quidem ac iuxta fundi orificium, innitentem dumtaxat habet uesticam: sed paulo inferius fibris quibusdam humillimam uesticæ partem & ipsius cervicem adnatam possidet. Vbi autem hæc illi inseritur, uelut commune quoddam utriusque corpus, & tunica efficitur. Sic quoque, quæ uteri cervix in pudendū desinit, commune utriusque, cervicis scilicet & cutis, quemadmodum in labris & palpebris, corpus constituitur. Hæc cutis, præterquam quòd pilosa euadit, ipsi duriuscula, similiter ac in mento, substernitur pinguedo: in uetulis (etiam si illis uteri cervix occalluerit) unā cum mamillis flaccescens, neque ita bellè pudendi colliculos alasue, ut in iunioribus, ac magis consistente duraque adipe obesis, sustinens. At quum hæc citra mortuorum sectionem sint obuia, quis omnium hoc Capite hactenus enarratorum sit usus, explicare modo conabimur. Vterus itaque concipiendo semini idoneus, & foetum tantisper complexurus, dum perficeretur, ac alijs quàm sanguine nutriri queat, in humillima trunci corporis sede locatus est, quæ ad concubitum feminisque susceptionem, & adhuc ad concepti foetus augmentum, perfectique partum,

quibus partibus uterus adnascitur, & solum quas tangat.

uteri officium ipsiusque conformationis ratio. Situratio.

q 25 fig. a.  
r 25 fig. u.  
c 6 musc.  
tab. c in f.  
s 6 musc. ta.  
a. aut figu.  
esp. c lib. 3  
L ad M.  
f fig. ca. 6.  
lib. 3 a.  
n fig. 2 cap.  
11 lib. 4 m.  
x lach. 25.  
26. c. c.  
x ab 1 c. 4  
fig. 2 cap. 3  
lib. 4.  
7 24 fig. O.  
O. c 26 E.  
E.

a 25 fig. h.  
b 27 fig. 1.  
1 c 24 fig. R.  
R.  
c 24 fig. K.  
x Specimen in 6, 7.  
8 fig.

d 25 fig. A.  
27 fig. L.

partum, nulla aptior excogitari posset. Hæc siquidem longe à facie & nobilissima rationis arce situatur: deinde ossa nulla, quo minus insigniter uterus distendi queat, inibi præpediunt: atque etiam ipsi parituro hinc ad inferiora, & uersus crurâ exitus facilis est. Forma autem uteri fundo conuenit rotundæ proxima, quo is reddatur capacior, iniurijsque minus obnoxius. De in fundo unicus simplexque est, quod unicum foetum amplecti debeat: at tamen latior uisitur, quàm profundior, quòd interdum & gemellos concipiat. Paruus autem, ac magis quàm facile crederetur contractus in non prægnantibus uidetur, ut quàm minimum alia tunc comprimeret organa, <sup>c 17 fig. A, A, B, B.</sup> si numq; suum adeò angustum redderet, ut quàm uicinisimè uniuersam genituram amplecti queat, nulla ex parte eam à se intactam relinquens. Ac proinde commodæ quoque ipsius functioni constat substantia, quæ affatim scilicet contrahi colligiq; quum nihil complectitur, possit: & rursus secundum contenti augmentum, sensim in egregiam amplitudinem explicari. Atque hæc non imbecillis, distendi ue citra diuulsionem inepta uisitur: at ualida, & iniurijs ferendis pertinax, fibrisque non infirmis, neque ijs, ut fors fert, intertexta. Verùm rectas habet intimas, quòd ante omnia semen allicere debeat: & easdè possidet paucas, quòd semè ipsi ex tēperamento ad iustitiā, adeoq; tota essentia placens, ac fluidū, aptoq; mēbro porrectū, in illum ocyus labatur. Obliquas autem plurimas, easdēq; rectis ordine succedentes sibi uendicat, quòd ab ipso conceptū, diutissimè retinendū sit. Trāsuersas uerò extimas nāciscitur, quòd illas uterus tum primū maximè requirit, quādo foetum diu satis amplexum, in lucem editurus. Quòd unica, eademq; crassa cōtentus fuerit peculiari tunica, neq; duas cum uentriculo, carnosiorē uidelicet unam, & neruosiorē alteram obtinuerit, hinc factum credimus, quòd uterus tantum cōtinere amplectiq; debeat, non aut uentriculi modo aliud quippiā à proprio nutrimento coquere & elaborare. Peritonœū illi ualidam exporrigit tunicā, propriæ ipsius tunice inuolucrū, & tutissimum propugnaculū futuram. Hęc externa superficie leuissimè a quoq; humore oblita est, aliarū partium ritu, quæ se inuicē tangere quidem, non aut mutuo connasci satius fuit. Si enim uteri fundus nō pregnantibus incumbēti ipsi uesicæ, & quod ipsi subiacet recto intestino cōnalceretur, & non laxis ipsius, sed duris uinculis, ijs quibus accumbit partibus alligaretur: quis inficias ibit, uterum commodè tunc unā cum foetu non posse distendi, aut etiam in congressu, uel partu, deorsum uelut animal quoddam reperere? Rursus, si uterus foetu turgidus, omnibus quas tunc contingit partibus connatus hæreret, quo nam pacto obsecro, semen denuò amplexurus in se concideret, debitamque angustiam efformaret? & quum minimè sua distentione amplitudineq; opus est, intestinorū functioni non semper obesse? Orificium fundi tale est, quod semper conuiuet, nisi quum naturali instinctu semen admittere, aut foetui mensibus ue iter præbere debet. meritò enim ex mulieris arbitrio, uti & antea dicebam, ipsius apertio oclusioq; haudquaquā pendet. Crassiore uerò & densiore, ac idcirco penis glādis modo in uteri ceruicis amplitudinem protuberante substantia, quàm reliquum fundi corpus, constituitur, ut in partu satis distendatur: utque in mira illa apertione, lacerari diuellue non periclitetur. Insuper insigni providentia in uteri ceruicis substantia extruenda Naturam uti, quis ignorat? qui eam ut dirigi distendique ad seminis susceptionem facile possit, & rursus ne uterus refrigeraretur, locusque seu amplitudo frustra inanis seruaretur, colligi & conuolutim occludi queat, efformatam conspiciat. præterquam quòd ceruicem substantia ad ueneris pru-

Forma.

Magnitudinis.

Substantia.

Fibrarum.

Superficiæ  
nexus ratio.Orificij fundi  
ratio.Pteri ceruicis  
ratio.



ris pruritum apta cōstare, & propter affrictum scrobes quasdam obtinere, diximus. Vt uerò ipsius conuolutio & inflexus, ne uterus frigore afficiatur, plurimum auxilij præstat: ita quoq; cōnuentes pudendi colles, & cuticulares ipsius carunculae, ceruicis opplentes initium, eidem usui, perinde sanè ac titillationi & pruritus, accommode censentur. Vasorum seminaliū in mulieribus ortus & ductus, ipsaq; testium substantia & cōformatio, mulieres semen habere mihi utcunq; persuadent: uerū id humidius frigidiusq; uirili semine existere arbitramur, quodd testes ipsi & minores sint, & mediā duntaxat arteriæ uenæq; seminalium portionem asciscant: quodq; mulierem uiro frigidiorē esse credimus. Neq; etiam frequens scortorū concubitus argumento est, mulieri plus seminis, aut illius humoris quem libidinis nomine Aristoteles mulieri datum scribit, quiq; secantibus copiosus in testiū sinibus occurrit, quā uiro adesse: quum id nō ex cōcubitus, sed ex seminis humoris uel illius eiectionis frequentia & copia (quibus illa à uiris longè superantur) metiendum sit. Muliebrium itaq; uasorum & testium functionem ac usum, ea quæ de uiri seminalibus organis prodimus, satis comonstrant. Sic quoq; ut uterus, & potissimum ipsius ceruix, exacto sensu donarentur, neruos illis frequentes insertos fuisse, is quem nunc obtinet sensus, liquidò attestatur. Ceterū uenas & arterias uterum implicantes, huic & quū concepit mulier fœtui etiā, cōmune uenarū arteriarumq; munus in alendo natuiq; calore recreādo præstare, indubitatum est. Vti & mēstruas lunares uel purgationes, ex uterū petentib. uenis quoq; euacuari cōstāt. sed quī id fiat, & per quas nā potissimū uenas, fundi scilicet, an ceruicis: perpetuū, an nunc ex his, nunc ex illis, forsan si diligēs Naturę operū fueris admirator, neque in alicuius iuraueris uerba magistri, & tu quoq; non mecum modò, uerū etiam cum eruditissimo Belgarumq; singulari ornamento, ambigis: qui hac de re non semel, tum propter alias occasiones, tum maximè propter Hippocratis Aphorismū sexagesimum libri quinti, & Galeni in eundē commentarium, ad me scripsit. Non quòd quis mēstruus sit sanguis, & quē ipsius natura, & quantus, & qua ratione in muliere abundet, & quī fœtum enutriet, quāq; falsa de ipsius prauitate & tetro odore Plinius cum alijs plerisque tradiderit, nos lateat: aut quòd ignoremus, sanguinem illum in fundi sinu toto mensis interuallo sensim minimè coaceruari, ac mensis periodo, turgente iam utero (licet quibusdam secus uisum fuerit) promanare. Hoc enim si accideret, sanguis mēstruus neutiquam tenuis, fluidus, ac illi perquā similis esset, qui è naribus aut ano guttatim distillat: à quo mēstruus neq; manādi forma, neq; alijs omnib. differt, nisi fortassis plerunq; tenuior & aquosior, aliāue eiusmodi qualitate præditus occurrat. Qui si in utero seruaretur, quis dubitare posset, illum ferè concretū & frustulatim educendum? ut taceā, fundi officium tum nisi purgatis mensib. nō posse in congressu recludi. alioquin quando mulier iniretur, ac fundi ore semen exciperet, aut id os semē emitteret, etiā sanguini mēstruo uia præberetur, isq; profliueret. Quin & magnā huius rei cōiecturam mulieres quædam dant, nuper à partu neq; fluidum neq; tenuem emittentes sanguinem: uerū magna cōcreti sanguinis cum seroso quopiam humore frusta, perinde ac si sanguinem in uenæ sectione extractum, atq; in uitro horis aliquot asseruatum, in partes cultro diuideres, ac illum tunc in terram abijceres. Eius namq; formę illis mulieribus sanguinē profluere aliquando conspexi, haud aliter sanè, quā si uenę, quę secūdinis innascebātur, adhuc apertē in uteri sinu (qui tum adhuc laxus est, & patet, prompteq; aliquādiu in se

Testiū & uasorum seminalium.

Neruosum ac uenarum & arteriarum ratio.

Mēstrua purgationes quæ coarcentur, et unde fluant.

in se coaceruat) sanguinem effunderent: & is ita concretus, non autem stillatim, ut aliàs solet, ex pudendo manaret. adeò, ut facilè in fundi cavitatem sanis mulieribus sanguinem menstruum nequaquã sensum colligi, certò possumus conijcere, & arbitrari (ut in fœtuum dissectione intuemur) uenas ad fundum cervicemq; pertinentes, qua suis suffulciuntur membranis, sanguinem hunc maxima sui portione paulatim in se reponere: ac tandem turgentes, illum singulis mensibus, apertis ipsarum osculis emittere. Insuper id quod in quodam, hæmorrhoidum uitio laborante, non illubenter expendi, mihi certissimo, in uenis illum sanguinem, non autem in fundi cavitatem accumulari, argumentò est. Hic namque ordinatis uicibus, ut mulieres suis mensibus, sanguinis fluxu ex uenis in anum pertinentibus uexari consueuerat: & quum ex nigro arguato, iecorisque mira duricie periisset, num portæ rami, an cauæ hunc sanguinem euacuarent, indagaturus, illum dissecui: atque uenæ portæ<sup>1</sup> ramum sub coli intestini fine, & tota recti longitudine in mesenterio ductum, pollicis ferè crassitiem æquare, & sanguine turgere animaduerti, conterminis cauæ uenæ<sup>2</sup> ramis nihil prorsus immutatis. Cæterùm etsi perinde in mulieribus fieri colligo, id tamen sectione nunquam obseruauì: quum hætenus mulierem non prægnantem, quæ uenarum crassitie ab alijs non prægnantibus magnopere differret, haud inuenerim. quanquam tamen pleræque diuerso modo affectæ, mihi inter secundum occurrerint, quæ eiusmodi quid ostendere potuissent: nisi etiam sanguis in toto uenoso uniuersi corporis genere, antequam purgetur maxima ex parte, consistat. Lutetiæ enim in publica sectione, præstanti forma & floridæ ætatis meretricem, suspendio necatam, primum secui. Patauij quoque altera obtigit, quæ sibi laqueo mortem intulerat. Deinde monachi cuiusdam, diuo Antonio hîc sacri, elegans scortum, repente uelut ex attonito morbo mortuum, Patauini studiosi ex monumento ereptum, ad publicam sectionem attulere: mira industria cadaver uniuersa cute liberantes, ne à monacho dignosceretur, qui id ereptum cum scorti matre apud urbis præfectum conquirebatur. Præterea superiori anno mulierculam utcunq; senem, & fame (uti conijcio) in ea annonæ penuria enecatam, par ratione subductam, in scholis adepti sumus. Quæ autem postremò nobis obtigit, raræ magnitudinis, mediæque ætatis mulier, suspendij metu se grauidam falso finxerat. Verùm prætoris iussu ab obstetricibus (quæ illam minime grauidam esse affirmabant) interrogata, nunquam, quantum à mens-  
truis purgationibus abesset, utcunq; id sedulo nos resciscendum ab ea curauimus, indicare uoluit. Cæterùm huic, perindè ac puellis, cæterisque, quas non prægnantes hætenus uidi, omnibus, uenæ pari se habebant modo, reliquisque totius corporis uenis ex proportionem respondebant, nullo scilicet redundante copiosiore<sup>3</sup> uel turgentes sanguine: ita sanè, ut ex dissectis corporibus (quemadmodum iam prius quoq; dixi) nullas rationes adferre queam. Verùm interim (ut ad id de quo potissimum ambigebam, redeat oratio) non adeò de lunaris ac mens-  
trui sanguinis collectione aut coaceruatione sui sollicitus, atq; lubens inspexissem, qui utero non gerëtibus per crassam uteri fundi substantiam uenæ sese aperiât, ac menstruum sanguinè statis interuallis emittant, potissimum quàm & hanc duritia & cōpactione densitate<sup>4</sup> uel uix magnopere differentè perpetuò in omnibus repererim, quas non prægnantes dissecui: nullo quoq; insigni uenarum uteri fundo oblatarum occurrente unquã discrimi-  
ne, cum uenis & arterijs uteri ceruicè implicatibus. adeò, ut uteri fundi<sup>5</sup> crassitiem cum ceruicis substantia conseres, nonnunquã mihi ferè persuaserim, non prægnan-

*Haec mulierculam fluxu  
obscuro ramifica  
uena portæ*

*fig. cap. 5.  
lib. 3, c. 6. et  
d. d. de ins  
e. c. 12  
fig. 11.  
fig. ca. 6  
lib. 3, v.*

*17*

*b 27 fig. E,  
E, F,  
17 fig. K,  
K,*

prægnantibus mulieribus per uenas in cervicem uteri pertinētes, menstruas purgationes plerunq; fieri. maximè quum uulgo confirmari scirem, uirginibus ex uenis cervicem sub hymene, qualiscūq; is tandem esset, adeuntibus, eas purgationes duci: quumq; in nuper dicti Aphorismi commentario apud Galenum legerem, utero gerentium sanguinem, qui ipsis interdum instar lunaris purgationis defluit, nō ex uteri uenis, sed cervicis, promanare. Quia tamen mulieres uteri procidentia laborantes, ex ore fundi uteri sanguinem hunc excernere, indubitātū est, idq; non semel ipse præsentis disputationis gratia uidi, ac quia ad genituram fundi uteri substantiam extenuari, ipsiusq; uenas recludi necessum est: nunc nō ambigo, ex fundi uenis, non uerō cervicis, mēstruas purgationes sanis alioquin prouenire, etiam si id sectione nondum deprehen- derim. Quod autē de uirginibus adfertur, ex ignorata hymenis euenit fabri- ca: quem quum pleriq; neūtiquā peruium arbitrarentur, & nescio quem cer- uicis laterum mutuū connexum, ipsum esse putarent, necessum quoq; esse finxerunt, sanguinem menstruum ex uenis humiliū quā hymen consistit, in cervicē uteri deductis purgari. Grauidis autem, quibus fortē sanguis pro- fluit, Galenus eum non per fundi uenas manare putauit, quōd illarum ora se- cundinæ continuentur. Verū hęc (uti in fœtus inuolucrorum historia di- cturi sumus apertius) toti fundi sinui non est cōtinua, multæq; uenæ in illum pertinent, quibus ipsa non connascitur. adēd, ut grauidis per fundi uenas san- guinē defluere, non sit impossibile, uteri quoq; tum crassitie, quæ in non præ- gnantium purgatione aliquoties me hædere ambigereq; coegit, nihil prorsus obstante. Neq; etiam utero gerētibus tanta oris fundi uteri est commissio, ut eius occasione, illis sanguinem ex uenis uteri cervicem intertextentibus defer- ri, contendendum sit, quum multi id orificium nonnunquā semen tum quo- que admittere astruant. Quanquam interim sanguinem per cervicis uteri ue- nas quibusuis tandem mulieribus emanare interdum posse, collectu prom- ptissimū sit uel ex sanguinis ē naribus, & ano, & faucibus, & uentriculo etiam subinde defluxu: quodq; uterum quibusdam mulieribus & uirginibus, annis aliquot mira fuscæ crassæq; aquæ copia turgidū fuisse, iam sectione nō semel deprehendimus: quibus alioquin menstruus sanguis sæpius, etsi non ordina- tis omnino uicibus, certisq; interuallis, eiusdemq; perpetuō quantitatis, pro- fluxit, non aliunde sanē, quā ex uenis uteri cervicem implicātibus. Quid ue- rō interim de hymene Galenus cēserit, ignoro, quum illius nullibi, quod scia, meminerit: fortē quōd in illis animalibus, ē quibus uteri historia ipsi potissi- mum traditur, hymenem non reperit. Haudquaquam enim mihi persuadere possum, Galenum uel semel saltem humanum uterum inspexisse: at<sup>k</sup> uacci- num, & dein<sup>l</sup> caninum, inter se uarios, & miris modis à muliebri utero discre- pantes. Ut uerō discriminē id studiofis constet, ipsiq; Galeni placita promptius assequantur, & men non immeritō ab illis in humani corporis historia passim declinare expendāt, obiter illos quoq; uteros describam. Vaccæ igitur, capræ, ouis & bubalæ, aliquotq; cornutorum, quæ secui, animalium uterus, sua cer- uice à pudendo ad sacri ossis usq; <sup>m</sup> sedem pertingit, cui infima lumborum co- arctatur uertebra: hicq; primū uteri fundus<sup>n</sup> incipit, qui dein in lumborum regionem expansus, externa superficie teretis corporis anteriū & posterius compressi speciem<sup>o</sup> longo interuallo refert, & dein<sup>p</sup> parte superiori in<sup>q</sup> duos mucrones diducitur, arietis cornuum modo in latus incuruatos, perinde ac si medium digitum & indicem fascia quapiam mutuō alligatos, simulq; circun- datos spectares, qui ante unguium radicem à se inuicem dirimerentur, & in mucronem

Galenum muliebre uterum neq; dissecti, neq; descri- pisse.

Vaccinam et capri uteri his- toria.

k tota 29  
fig.  
l tota 28  
fig.  
m fig. cap.  
n. q. lib. 1 F  
cum G.  
n illic ubi  
C occurrit  
in 29 fig.  
et quæ  
quid supra  
id consistit,  
fundus est.  
o à C ad B  
ferè usq; 29  
fig.  
p 29 fig. E.  
q 29 fig.  
E, E.



mucronem singuli cessarent, instar arietis cornu conuolutum. imò potius hic confinge duo arietis cornua longam habere basim, ac ueluti longum & rectum corpus, aliquidque hac in parte cum hirci aut capreoli cornibus, ut cunque rectis, nancisci commune: & dein bases has, seu oblonga corpora, internis lateribus committe, fasciamque illis ad eam usque cornuum sedem obducito, qua in latera abscedunt, & in mucrone coarctantur. Huiusmodi namque cornua inuicem (uti de duobus diximus digitis) commissa, tota sede, qua simul fascia obducerentur, seseque mutuò contingerent, fundi uteri portionem imagine exprimerent, quam instar teretis corporis esse dixi: quod ob compressionem anteriùs & posteriùs ipsi per longitudinem inditam, quodammodo latum existit. & abscedentes dein à se inuicem cornuum partes, superioris fundi sedis formam referrent, quæ in duos mucrones à se inuicem diductos cessat. Externa fundi superficies, membraneorum corporum sibi mutuò tantum accumbentium modo, prorsus læuis & lubrica est: & suis lateribus, tota ipsius lōgitudine, perinde ac ceruix quoque, membranis connascitur, quæ uterum peritonæo committunt, uasque illum potentia cōtinent. Ipsi autem fundi apices, quæ inuicem dirimuntur, internis suis lateribus etiam læues sunt, neque ullis connascuntur partibus: externa autem ipsorum latera iam dictis membranis cōtinuantur. Interna fundi superficies, penitus figura dictorum arietis cornuum cauis sedibus respōdet, duasque ita cauitates obtinet, quæ ad unum fundi orificiū, in uteri ceruicem pertinens, coeunt, illudque orificium sibi cōmune uendicant, non longam interim mutuam<sup>r</sup> cauitatem ante orificium id ostendentes. adeò, ut duos omnino sinus huic fundo tribuere oporteat: qui sanè non læues sunt, & plani: uerum sublaui, ijsque plurimis tuberculis ita ornantur, ac si planæ alicui cæræ multas pisas ex dimidio ferè impressas, & in cæra hærentes spectaremus: aut perinde ac si ea tubercula illis uenarum exortibus eminentijsque conferenda forent, quæ in ano protuberantes, sanguinem nonnunquam profundunt. Tubercula hæc in utero, qui non ita pridem concepit, sese aperiunt, & sinus efformant, eosque in cera consurgerent, si quis dimidiatas pisas ipsi passim impressisset, easque illis similes constituisset, quos in polypodū & loliorum cernimus promulcidibus, & acetabula quoque uocamus. Si quando his animalibus unicus tantum fœtus in utero cōtinetur, una tantum uteri pars seu cauitas dilatatur & diducitur: quum autem gemellos conceperunt, ambæ partes increfcunt, singulaque unum fœtum cōtinent. Fundi huius substantia, duabus extruitur tunicis: una quidem interiori, ac ueluti propria: altera autem, quæ à peritonæi membranis, uterum illi colligantibus, & uasa uterum accedentia deferentibus, interiori tunice obducitur. Cæterum quia totus fundus instar uesticæ non est rotundus, & non unica tantum constat cauitate, interior tunica duarum loco recensetur, singulisque digitis cornibusque, quibus fundum uteri constare diximus, una tribuitur, non tantum<sup>r</sup> ubi fundi partes à se inuicem abscedunt, & in mucronem exacuuntur: uerum tota illa etiam<sup>\*</sup> sede, qua secundum longitudinem tanquam fascia quapiam ipsas simul contineri scripsimus. Quandoquidem uerò exterior tunica, per eam longitudinem inter fundi partes non intercedit, sed anteriùs duntaxat & posteriùs, & secundum latera ipsis obnascitur, exterior hæc tunica, tanquam una simplexque habetur: quanquam tamen singulis uteri apicibus, cornuum arietis modo obliquatis, ab inuicemque abscedentibus, peritonæum priuatim circundetur. Inter has uteri tunicas,

mm

quum

t quia ex-  
terior tui-  
ca ex dimi-  
dia ferè  
parte in  
fig. ablata  
est, utrang-  
apparet. ex  
teriorque no-  
tatur F, F,  
interior au-  
tem C, D,  
G.  
u supra E  
19 fig.  
x à D ad  
E 29 fig.

quum inuicem diuelluntur, etiam in non prægnantibus uaccis & capris mulieribus manifestior, & sanè eiusmodi, ut interior fundi uteri tunica non im-  
 meritò uenosa tunica nomen à quibusdam obtinuisset uideatur. <sup>2</sup> Testes  
 his animalibus consistunt ad uteri latera, mox sub apicibus illis, instar cornu  
 arietis intortis. Venarum arteriarumque testes & uterum adeuntium or-  
 tus ac ductus, cum muliebri fabrica ferè respondet, & uasorum à testibus  
 semen deferentium par quoque est ratio: nisi quòd in uaccis & capris ipso-  
 rum insertio in uteri cavitates sit manifestior, faciliusque specillum quàm in  
 mulieribus admittat. Canes porro, & fues, uter<sup>o</sup> cervicem ad ossis sacri us-  
 que cum lumborum uertebris connexus, etiam habent porrectam: ipsius  
 autem fundus, non duorum digitorum, simul aliquandiu commissorum, re-  
 fert imaginē: uerùm mox à suo initio in<sup>4</sup> duas partes ita bipartitur, ac si duo  
 extensi essent digiti, ab inuicem diducti, & sensim in mucronem acti. Verùm  
 interim aliàs nusquam in non prægnantibus ueluti in gyrum conuoluti, ac  
 proinde rectoris quodammodo cornu imaginem exprimentes: quum ta-  
 men foetus multi in singulis partibus seriatim continentur, partes istæ pri-  
 mum sursum, & dein deorsum, intestinorum quasi modo, implicantur, ob-  
 liquantur ue. Duæ hæ fundi partes, unum commune obtinent<sup>o</sup> orificium, in  
 elatiorem cervicis sedem pertinens: singulæq; duobus constant<sup>o</sup> inuolucris,  
 seu tunicis: <sup>5</sup> interiore scilicet una ac peculiari, dein una<sup>h</sup> exteriori, à perito-  
 næo pronata, quod suos<sup>o</sup> processus exteriori partium lateri offert, & dein eos  
 tanquam ad intestinum singulis partibus obuoluit. ad eò, ut duæ fundi par-  
 tes, nullo ferè intervallo communem habeant tunicam exterioriorem. His ani-  
 malibus<sup>5</sup> testes ad elatiorem sedem, mucronemq; duarum fundi partium col-  
 locantur, & uasorum par quodammodo est undiq; cum uaccis series. quan-  
 quam interim caninus uterus ea in suis cavitatibus non proponat tubercula,  
 quæ uenarum eminentijs comparatur, quibus sanguis ex ano nonnunquam  
 defluit. Quum itaq; caninum uterum, & uaccinum, & muliebrē (ne quid de  
 asinino, aut equino, quorum Galenus nō meminit, dicam) simul inspectioni,  
 quemadmodū ego in scholis facere cōsueui, adhibebis, cuperem sanè diligen-  
 ter expēdi, num Galenus muliebrē uterum unquā secuerit, siue libros de Vsu  
 partium, præcipuè autem decimum quartū & decimum quintū, siue librum  
 de Vteri dissect. euolues. & quia longum esset, à me omnes cōiecturas, quibus  
 id auguror, persequi, aliquot duntaxat adjiciā. Galenus itaq; uteri situm sic tra-  
 dit, ut suo fundo uesicā prorsus excedat, & ueluti in lumbis cōtineatur, tenui-  
 busq; intestinis cōterminus sit. quod ut de muliebri utero parū uerè est asser-  
 tum, utpote qui ad sacri ossis cum lumborū uertebris cōtextum nō pertingit:  
 ita de uaccino rectè profertur, eò usq; in peritonēi cavitatē, atq; diximus, con-  
 scendēte. Dein etsi muliebris uteri fundus unico tantū donetur sinu, Galenus  
 duos tamen suo utero tribuit, tum sepius quādo uterum describit, tum etiam  
 quum in libris de Part. usurationes texere conatur, quāobrem in dextris sedi-  
 bus mares, in sinistris fœmine, ex Hippocratis placito, magis cōcipiantur. Tūc  
 enim asserit uterū esse geminū, & duos sinus duosq; ueluti uteros in unā cerui-  
 cem cessare. Ac proinde si Galeni mentē in hoc sinuum numero pulchrè asse-  
 quemur, & caprini muliebrisq; uteri hac in parte discrimē nos nō lateat, facile  
 cōstabit, quī is uera de caprino utero, nō autē muliebri, tradiderit. Verùm in-  
 terim hic ignoro, unde<sup>o</sup> nam natū sit egregiū illud cōmentum, quo in iuriscō-  
 sultorum,

Canini &  
fusi uteri  
historia.

Præde constet,  
Galenum mu-  
liebrē uterum  
non secuisse.

Ex sinu.

Ex fundi sinu.

Specula-  
tur in deie-  
ctæ tunica  
sede 29 fig.  
29 fig. A.

29 fig. B.

29 fig. L.

28 fig. K.  
28 fig. F, G.

e ubi K. cō-  
stitit fig. 28.  
f. confir. G.  
cum H. 29  
fig.  
g. 28 fig. H.  
h. G, F, K.  
28 fig.  
i. 28 fig.  
D, D.  
h. 28 fig. C.  
l. 28 fig. A.  
B, B. E.

sultorum, & dein scholasticorum theologorum libris, & Alberti illius magni indoctissimo de Virorum mulierumq; secretis libro, & apud ineptissimum quendam Michaellem Scotum, & Gentilem nostrum, & Nicolum, & Mundinum, atq; adeò apud innumeros etiam Anatomicos legitur, muliebrè uterum septem cellulas seu loculos obtinere: tres quidè in dextra uteri sede, masculis suscipiendis aptos: tres autem in sinistra, foeminis dicatos: septimum uerò in horum medio existere, hermaphrodytisq; consecratum esse. quum tamen muliebris uteri cauitas, perinde ac ego illam descripsi, habeat, nihilq; minus quàm huiusmodi loculos seu sinus ostendat. Verùm hos eum in modum effingere, quibusdam non sat uisum est: imò insuper septem illos sinus (quos & scrobes uocant) decè rugosos obtinere inflexus affirmant: & septenas quidem scrobes, rugas autem septuaginta enumerantes, totidem simul concipi posse foetus contendunt: parum per Iouem in hominù, multoq; etiam minus in brutorum, quæ plures simul foetus utero plerunq; gerunt, sectionibus uersati. At quia Galenum harum nugarum autorem neutiquam fuisse, mihi persuadeo, deinceps ipsius expendamus de uteri tunicis enarrationem, quæ uacuum etiam uterum ab illo potius quàm muliebrem descriptum attestatur. Interiorem namq; tunicam, geminam esse scribit: exteriorè uerò unicam, & simplicem: id non solum numero proponens, uerùm diffusissimè ita explicans, ut exteriorèm tunicam, quæ à peritonæo pendet, ideo simplicem esse dicat, quòd simul utriusque fundi uteri partibus obducitur, easq; perinde continet, ac si ambæ una tantum essent pars: quæ tum primùm gemina occurrit, quum exterior hæc tunica ab interiori<sup>m</sup> diuellitur, quæ singulis partibus est propria & peculiaris. adeò, ut hac occasione maxima & notatu digna sese offerat inter caprinum uterum & muliebreni differentia: quum interim Galenus in libro de Vteri sectione, uaccas & capras mulieri secundùm uterum similes existere affirmet: itaq; plus satis in tanto, tamq; uario uterorum discrimine comprobet, se muliebrè uterum nunquam inperxisse. Cæterum quum hæc obseruabis, pluresq; coniecturas, quibus istud meum placitum corroborare queas, in Galeni descriptionibus passim inuenies: haud prætereundum est, quàm Galenus anceps & ambiguus sit, quum Herophili scripta suo uacino utero non conuenire animaduertit, & quum Praxagoram & alios quosdam ab Herophilo dissentire expendit, quumq; omnes non eiusdem animalis narrant historiam, & Galenus deniq; Herophilo (quem humana corpora secuisse cognouit) multis locis præter sententiam ferè assentitur, non lubens sanè annuens, à se muliebrem uterum, etsi illum nunquam uiderat, haud describi. Atq; id profectò pulcherrimè (ne quid de uteri dicam forma, quam Galenus primùm rotundam, & dein aliam proponit, & peculiaribus uteri musculis, quos uarios & sibi non uisos sæpius inculcat) obseruare licet, quum Galenus cornuum uteri ita perplexè meminit, ut ipsius enarratio, & obtusos muliebris uteri<sup>m</sup> angulos exprimat, & uaccarum abscondentes à se inuicem<sup>m</sup> apices, cornuum arietum mucronibus simillimos, & dein totius canini uteri fundi<sup>m</sup> partes, in quibus feriatim foetus reponuntur. Idem in acetabulorum explanatione Galeno accidere, sequens Caput ostendet: uti & uenæ illæ & arteriæ quoq; id insinuant, quas præter hæcenus<sup>m</sup> commemoratas, Galenus utero tribuit. Simulatq; enim in libro de Vteri dissectione<sup>m</sup> uenas & arterias, quæ una quidem portione testes, alia uerò uteri fundum adeunt, descripsit, mox alia quatuor cõmemorat uasa, quibus ex<sup>m</sup> uenis & arterijs ad renes procedentibus

Ex ueteri tuni-  
carum nume-  
ro, adeoq; totius  
uteri formati-  
one.

Galeni in qua  
rundam uteri  
partium descri-  
ptione esse ad-  
modum ancipi-  
tem, sibiq; parũ  
fidere.

In uteri forma  
explicatione.

Musculorum.

Cornuum.

Acetabulorũ.

Venarũ & ar-  
teriarum.

muti f. 27.  
q. 29. fi.

n 27 fig. d. h.

o 29 fi. F. F.

p 28 figu.

F. G.

q 27 fig. h.

o 28 fi.

B. B. E.

r 25 fig. d.

d. c.

s 25 fig. h.

t 27 fig. T.

v.



originem præbet, quæq; uterum non omnibus quidem mulieribus, at quibuldam tantum, ingredi tradit. Atque id sanè Galeno ex Herophili sententia sic astruitur, ut non dubitet, hæc uasa in mulieribus ita se habere: quas tamen mortuas, ab ipso nunquam aggressas esse, inibi satis (et si interim inuitus) fateatur. additq; ea uasa in alijs animalibus, præterquam rarissimè in simijs, à se ne utiquam inuenta. Verum ego duas has Galeni uenas, & totidem arterias, neq; in mulieribus, neq; alijs animalibus unquam reperi. Neque etiam scio, quamobrem Natura tam procul uasa uterum, nutritionis duntaxat nomine petentia, exoriri uoluisset: quum ambas feminales arterias, & uenam feminalem dextram, humilius à cauæ uenæ & magnæ arteriæ caudicibus, quam renum uenas & arterias eduxerit: sinistra tantum feminali uena, ab ea quæ in renem sinistrum fertur uena, initium mutuante. etiam si Galenus in libro de Vteri sectione, hanc quoq; à cauæ caudice sub renibus enasci, parum uerè prodiderit: alijs uasis, quorum iam mentio est, quæq; me adhuc latent, altiora, magisque remota, quam illi etiam uenæ, tribuens principia. quum tamen uasis, testibus materiam adferentibus, longum ductum ex usu esse, uaricosus illorum ante testem implexus satis arguat: uti contrà, prolixior incessus alijs illis uasis esset noxius, & arterias plenus. Ad hæc, Galenus præter uasa, quæ à testibus in uteri apices seu cornua semen deducunt, quorumq; insertionem Aristoteli, Herophilo, ac omnibus denique, qui sectionem ante ipsum aggressi fuerunt, incognitam scribit, ex Herophili inquam sententia, quædam in libro de Vteri sectione insuper commemorat uasa, à testibus perinde ac in uiris, uesicæ muliebri<sup>z</sup> ceruicem accedentia, & præsentē glanduloso corpore in illam inserta: haud secus sanè, quam si semen in uesicæ etiam ceruicem mulieribus similiter ac uiris deferretur. Galenus namque mulieri, & in uteri cornua, & in ceruicem uesicæ semen excerni, hac ratione docuit: at quam uerè interim, penes alios esto iudicium. Quantum uerò ad me attinet, nulla uasa à testibus in uesicæ ceruicem inserta, uti neq; glandulosum aliquod corpus ipsi ceruici in mulieribus, quemadmodum nec in omnibus quæ sectioni adhibitæ mihi sunt quadrupedibus foeminis, adnatum reperi. ac proinde etiam semen mulieribus in uesicæ ceruicem ne utiquam deduci putauerim: uti etiam illæ coeuntes, neque seminis excretionem, neque pruritum ex semine suo aliquem in ipsa percipiunt. Velim itaque, ut hæc Galeni uasa diligenti refectione exquiras, tum in mulieribus, tum cæteris. quoque animalibus: inter quæ lepus haud est negligendus, quum generationis organis à catulæ suis uel fabrica, ipsi aliàs proximè simili, pereleganter uariet. Quod si uerò uasa Galeno commemorata, tandem tibi non occurrerint, expendas quæso, num fortè Galenus hæc etiam sibi nunquam uisa, ideo descripserit, quod Herophilus parem uasorum feminalium in mulieribus & uiris insertionem, ac ueluti seriem esse, obiter tradiderit: quem nihilominus hac ex parte Galenus in secundo de Semine libro, non longam præfatus ueniam, mentiri affirmat. Cæterum ne hic in Galenum annotationes potius, quam humani corporis fabricam, præter institutum describere uidear, præsentī de utero Capiti finem imponam: præcipue quum Galeni placitis in acetabulorum & foetus inuolucrorum sermone, subsequentiū iam Capitibus, parum quoq; mihi ueniat acquiescendum.

*Uasorum semē  
deferentium.*

*u. 25 fig. 8  
ab V.*

*u. 25 fig. 8, p.*

*u. 25 fig. 8, p.  
1, 1, 1.*

*u. 25 fig. 8, p.  
6, 1, 1.  
u. 25 fig. 8, p.*

## DE VTERI ACETABVLIS. CAPVT XVI.



ET ERVM dissectionis professorum de uteri acetabulis dissensio ad nos quoq; manauit. Grauius enim in scholis contenditur, quid nam uteri sint acetabula: qua etiam de re tanisper dubitauimus, donec in oue, quæ non ita diu utero gesserat, quid uerè uteri acetabula appellare oporteat, inspexissem. Hæc enim altero uteri sinu semen receperat: qui dissectus, asperam inæqualemq; ostendit superficiem, mult<sup>a</sup> sinibus oppletam: qui tales prorsus erant, ac si mediâ piscis partem finibus suis quis non secus impressisset, quàm si in ceram eiusmodi sinus piscis quapiam moliretur. Quum itaq; sinus illos intuerer, ac Galeni loci ad finem libri de Vteri resectione non inmemor essem, quo acetabula sinui foliorum herbarum assimilata, quam Græci ab acetabuli, seu potius heminae forma, *κεφαλαιώδεις*, & à cymbali imagine *κυμβαιώδεις* & *κύμβαλοι* uocant: nos autem acetabulum, & Veneris hortum, seu umbilicum nuncupamus: promptè collegi, hos uteri sinus *κεφαλαιώδεις* Græcis, acetabula uerò Latinis primum fuisse ad eum modum appellatos, quo altius incisus ossium sinibus acetabuli nomen accommodamus.

Quid uerè uteri sint acetabula, & quæ primū ita fuerint nuncupata.

a Hos sinus spectabis moues, aut capras, aut uaccas, quæ non ita pridem coxendicis.

b 12. fig. ca. 29. lib. 1 g. 6. f.

c 12. fig. ca. 29. lib. 1 g. 6. f.

d 12. fig. ca. 29. lib. 1 g. 6. f.

e Et hæc quoque ex ex uaccæ utero peti de ueniunt.

Si enim coxendicis acetabulum spectans, illud ad hos uteri sinus contuleris, nullas reperiies corporis partes æquè ex merito ab imagine idem nomen obtinuisse, atq; acetabulum id coxendicis ossis, à quo iam paulo antè femur resectum sit, & hos uteri sinus. Vt enim coxendicis sinus, ita ac si medius globus ipsi impressus fuisset, cauus cernitur: sic etiam & hi uteri sinus insinuantur. deinde ut coxendicis acetabuli supercilia extra reliquam ossis superficiem prominent, ita etiam in uteri amplitudine, suorum sinuum supercilia procerius quàm reliqua uteri superficies extuberant. Ad hæc, ut coxendicis ossis acetabulum mucoso humore oppletur, ita sanè & uteri sinus mucoso sanguine mihi conspiciébatur infarti: à quo iam in nonnullis sinibus teres & insigniter mucosum uasculum uidebatur pronatum, ad eum prorsus modum, quo teres ligamentum ex coxendicis acetabulo in femoris caput inferitur. Quum itaq; hos ouilli uteri sinus, etiam uocatis in polypodum & loliorum promuscidibus acetabulis perquam similes, inspexissem, unde uteri acetabulorum nomen primum esset institutum, nequaquam hæsi. Vt autem, quo nam pacto sinus procrearetur, cognoscerem, non prægnatis ouis uterum mox aperui, & uteri cavitatem multo aliter quàm muliebris uteri, asperam inæqualemq; adinueni. Per uniuersam enim illius superficiem subflaua occurrebāt tubercula, & semiglobuli, tales omnino, ac si dimidiatas piscis planæ alioquin superficiem pascim quis agglutinasset. Atq; hic primum discere cœpi, quid Anatomes professores sibi uellent, uteri acetabula extumescētibus in ano uenarum capitibus comparantes, ex quibus iam paulo post sanguis est profluxurus. Si enim non prægnantem uaccam, aut capram, aut ceruam uterum secuerit, illo quauis ratione aperto, nihil eiusmodi prominentibus capitulis erit manifestius: nihilq; addubitabis, illa acetabulorum loco plerisque; Anatomis habita fuisse. non fortassis, quod illa ueris acetabulis assimilaretur, uerumq; acetabula uteri esse arbitrareretur: sed quod ex uteri sectione didicissent, uenas spectantes, ac arterias inter internam externamq; uteri tunicas admodum multiplici & implexa prorsus serie in illis cornutis animalibus distributas, suis sinibus in hæc capitula per uniuersam uteri cavitatem extuberantia pertinere, ac demum concepto iam semine illa aperiri, seminemq; amplecti, & uasa quedam educere, quæ à uenis & arterijs in capitula pertinentibus pronata, ad seminis usque superficiem insererentur:

Quæ secundum acetabula à uentribus fuerint appellata.

Ad qua ter-  
tio acetabuli no-  
men fuerit de-  
ductum.

g Specta 110  
figuram.

Aphorif. 45.

illiꝑ; implicita, acuariè per<sup>e</sup> secundinam digesta, tandem umbilici uenam & arterias constituerent. Præterea, ubi sedulo in non prægnante uacca hæc tubercula expenderis, & rursus in alia, quæ nuper concepit, illos sinus, quos tubercula sese aperiencia efformant, didiceris: ac pariter obseruaueris in uacca quæ paulo diutius concepit, quæ sinus illi oblitterentur, & distento iam utero prorsus uisum fugiant, ac quæ uasa tantum appareat ex sinuum loco, atq; adeo ab uteri tunica ad secundinam porrecta: etiam faciliè ratiocinaberis, quid medici indicauerint, qui acetabula uocauere non quidem sinus illos, neq; tubera, uerum uasa ex utero in secundinâ pertinencia. Ea enim Hippocrates tum aliâs, tum maximè in quinto Aphorismorum libro, acetabuli nomine intellexisse uidetur: appellationem hinc fortassis sumens, quod hæc uasa ab illis uteri finibus, quæ primum acetabula uocari inuimus, porrigantur. Atq; hinc liquet, unde in Naturæ operum historia tot exurgant contrariæ prorsus autorum sententiæ: quod scilicet Galeno, dissectionis studiosorum faciliè præcipuo, nimum in humani corporis fabricæ cognitione credamus, & ipsi nostris manibus dissectionem non aggrediamur: aut si hanc tentemus, ab illis casu abstineamus animalibus, ex quibus Galeni dogmata expendere liceret. Frustra enim in muliebris uteri<sup>b</sup> cavitare tubercula illa, quæ subflaua & dimidiata<sup>b</sup> pifæ simillima esse diximus, indagabis: quum illa his penitus non donetur, uti neq; asinæ uterus. Si tamen uaccinum uterum ex macello tibi curaueris adferri, nihil his tuberibus (quocunq; etiam pacto uterū aperias) promptius occurret. Insuper in muliere quæ non ita pridem concepit, incassum sinus illos, quos coxendicis acetabulo cōferebam, inquires. quod non solum hinc conijcio, quia non prægnantium mulierum uteri illis tuberibus prorsus expertes sunt: sed quod refectione in muliere fuisse à marito interfecta, & quæ nō multo antè conceperat, id etiam didicerim: cuius uteri interior superficies, & uasorum iam in semen pronascentiū ratio, nullam eiusmodi sparsim occurrentium sinuum imaginem præ se ferebat. uerum continua tantum in interna eius uteri superficie spectabatur asperitas, amplitudine cōtinuo illi<sup>i</sup> connexus respondens, quo exterius humani fœtus<sup>i</sup> inuolucrum utero hære committiq; docebimus: & ubi uasa illa, serie cōtinua sibiꝑ; commissa occurrunt, quæ ex utero in illud fœtus pertinent inuolucrum. Adeo, ut nihil in muliebris utero sese exhibeat, cui Hippocratis occasione (si modò illi corporis humani fabricam perspectam fuisse, uelimus asserere) acetabuli nomen accommodare poteris, nisi uasa hæc ab ipso subaudita coniecerimus. In primo tamen de Semine libro Galenus uidetur innuere, quosdā extitisse, qui<sup>i</sup> carnem quandā ab Hippocrate acetabula nuncupatā fuisse contenderent, quam uasis inter uterū & exterius fœtus inuolucrū, de nouo cum fœtu progenitis, circumnasci astabiliriꝑ; cernimus. Verum isti nomen acetabuli ad eam carnem, ut Hippocratem interpretarentur, perinde deduxerunt, atq; ego paulo antè ad uasa id distorsi: quod nimirum in mulieribus caro hæc, nō secus quam in cornutis animalibus (quæ sinus, adeoꝑ; ipsa uera acetabula, & tubera illa, ex quibus sinus producantur, tantum obtinent) inueniretur. quamquam sanè hæc in mulieribus sit continua, unumꝑ; ueluti corpus existat: in illis uerò animalibus<sup>m</sup> ita sparsa est, atq; sinus illos, quibus acetabuli nomen meritò est attributum, sparsos, ac à se inuicem disritos, occurrere prodidimus. Cæterum quum hæc prorsus ad inuolucrorum fœtus sermonem pertinere constet, eorum quoq; tractationem ad subsequens modò Caput opportunè asseruabimus: nunc pulchrè memores, quàm sibi undique consona Galenus (qui solis ceruis & capris

carnem

i 14. 30 ff.  
E, E. 1. 106.  
1, 1, 1.  
h 14. 30 ff.  
E, E, F, F.  
2 14. 1, 1, K.  
K.

l 14. fig.  
30 E, E. 2  
tab. 1, 1.

m 31. fig. B.  
B, B.



ns tab. fig. a  
30 l. l. l. c  
31 f. A. A.  
32 f. B. B.  
B. B.

carnem illam, cuius modò memini, ascribit) de acetabulis passim tradiderit: quàmquàm in solis ferè anatomicis, illius scripta interpretè magnopere desiderèt.

Lib. 15 de partium usu.

DE INVOLUCRIS FOETVM IN VTERO  
tegentibus. Caput XVII.

FOETVS humani involucria, utcumque quatuor tabellis trigesima figura exprimerè conatus sum. Dein trigesima prima figura discrimen ostendit, quo canini aut suilli fetus involucria ab humani fetus involucriis differunt. Et insuper trigesima secunda figura discrimen spectatur, quo bubale, aut uacca, aut alicuius alterius animalis cornib. donati, ac à me hactenus dissecti, fetus involucria ab hominis, & ite canis fetus involucriis variat.



VANDO QUIDEM hoc libro, qui nutritionis ex cibo potuq; factæ organorum cõstructionem docuit, propter sedis uiciniam ea quoq; instrumenta persequi usum fuit, quæ immensus rerum Opifex ad generationem extruxit: proximum sanè erit, post acetabulorum sermonem, hîc quædam de foetum inuoluentibus tunicis inuolucris ue subiicere, quæ de nouo unâ cum foetu in utero

generantur, & cum eodem in partu prodeunt, ipsumq; mox ferè subsequuntur.

Vnde etiam totam horum inuolucrorum molem Latinis secundam, seu secundinam nuncupari arbitror: perinde ac si secundus ueluti esset partus, foetus uel in lucem egredièti succederet. Græcis uerò *χωρίον*, & interdum *χώραμα* (uti & Latinis quoq; loculos) hanc inuolucrorum cõpagem appellatam dico, quòd instar loculi, spacijsq; ac aluei sit, quo foetus in utero cõtinetur ac amplectitur. adeò sanè, ut neq; secundinæ, neq; *χωρίον*, seu loculorum nomen alicui priuatim inuolucro ab illius institutore attributum existimem: uerùm toti illi inuolucrorum substantiæ, aut compagi, quæ, posteaquâ ex ea foetus prorupit, ac ueluti e ductus est, illi in partu succedit. Quum uerò dein Veteres illi, qui pueris domi Anatomen proponebant, non unum aliquod, sed plura foetum ambiètia obseruarent inuolucra, comuni eo *χωρίον* nomine haud contenti, singulis inuolucris priuata nomina putarunt indenda. Atq; hinc fit, nobis adhuc duo hæc asseruata esse nomina, *ἀμνιοτμήν*, & *ἐμνιον*, seu *ἐμνιον*: quorum priore, ob quandam farciminis speciem, exterius foetus inuolucrum: & posteriore, ob molliciè, candoremq; ab agno sumptam, interius inuolucrum Veteres illi appellarunt. Vt cumq; tandem permulti post hos Anatomen libris cõmendantes, illis nominibus fuerint abusi, facileq; specimè dederint, quàm Veteres multo foelicius diligentiusq; illis, dissectiones aggrediebatur. Foetum itaq; humanum, & caninum, & bubalum, duæ complectuntur membranæ, seu inuolucra, in omnibus his foetibus substantia, & ferè conformatione sibi respondentia. Si enim quandam exterioris superficiei in exteriori inuolucro differentiam in quodam uasorum per inuolucrum ductu, & substantia quadam carnea, exterioriq; illi superficiei adnata, consistentem subaudiueris, eadem inuolucrorum in dictis iam foetibus est ratio. Cæterùm differentia hæc ex uterorum ferè discrimine, exteriorisq; inuolucra ad uterum connexu, oboritur. Duæ enim membranæ inuicem obductæ, uniuersum foetum ita amplectuntur, ac bombicem duobus inuolucris, posteaquam sese aliquandiu inuoluit, contineri cernimus: uno quidem, quod in serica fila ab eius rei peritis, ex calida aqua dissoluitur: altero autem, quod membranæ instar bombicem proximè obteggit. Insuper, ut exterius inuolucrum in nexibus, quos bombix primum ad ramulos quosdam, aut quempiam domus angulû, aut quoduis tandem antrum cõmittit, pro loci in quo textit discrimine, quandâ ueluti ostendit

Quid secundina & χωρίον.

a 1a uniuersum, quod præter partum A. tabella figura 30 continet.

b 1a tabella 30 fig. E, E, F, F, 1a, 1a, K, K, 3 1a L, L, M, 4 1a P, Q, R, S, S, 30 O, O, 4 tab. V, V, X, X.

d Specta qui inuicè differant 2 tabella 30 fig. cum 31 figur. 32 figur.

e 1a tab. 30 fig. 1a, 1a, 31 fig. A, A, 32 fig. B, B, B.

Foetum duobus ambiu involucriis. ac dein, quæ exterioris involucri ad uterum sit nexus usus, &c.

differentiam: ita quoq; exterioris foetus inuolucris ad uterum nexus, in muliere alius quam in cane, & alius adhuc in bubala aut uacca quam muliere ac cane, spectatur. Exterius namq; foetus humani inuolucrum, etiam si utero undecunq; ambiatur, unica tamen duntaxat utero hæret continuatur<sup>1</sup> ue amplitudine, quæ quodammodo orbicularis est, & neq; transuersum, neq; secundum longitudinem inuolucrum omnino complectitur. Ea enim tantum amplitudine utero id continuatur, quæ bombix unicæ tantum ac planæ quasi superficiæ attexeretur, aut quæ nonnihil oblongior ceræ globus leuiter concuatae manus uolæ hæreret, firmareturq;. Dein amplitudo hæc, seu exterioris inuolucris ad uterum nexus, non semper in eadem uteri occurrit sede: uerum modo in dextro, modo in sinistro latere, sed posterius ferè quam antè magis. Exterius autem canini foetus inuolucrum, amplitudine quadam utero committitur, quæ instar latioris cinguli transuersum inuolucrum ambit: perinde ac si bombix sese in latiori quoque circulo texuisset. Vaccæ uerò foetus inuolucrum, unica non continetur amplitudine, sed plures exiguæ sparsim ita occurrunt, ut leopardorū pelles maculis distinctas cernimus: non secus atque si singulæ nexuum inuolucris amplitudines, singulis maculis essent comparandæ. talisq; ferè huius inuolucris est nexus (ut & illum ad similitudinē aliquam referamus) qualem bombix molitur, quum tenuibus ramulis ipsum sparsim ambientibus, sese primū adnectit. Sunt itaq; hæc quas describere conor amplitudines, aliud nihil quam sedes locaq;, quibus exterius foetus inuolucrum utero colligatur. Quum enim semen in utero conceptum est, illiq; ueluti in pulte, alijsq; crassioribus iusculis iam refrigerantibus membranula undique obducitur, uenæ ac arteriæ uterum implicantes, per multa ipsarum ora in uteri sinum aperiunt, membranamque eam, ipsum ue semen amplectuntur: & perinde ac si uenæ & arteriæ uteri augerentur, his oris noua uasa accrescunt, mutuam cavitatem continuatēq; cum illis seruantia. Ex his nouis uasis, uenas ac arterias cōstitui oportuit: quibus foetus iam formandus, enutriendusq;, non aliter toto tempore, quo in utero cōsistit, uteretur, ac matris crus aut brachium suis uenis ad enutritionem, & arterijs præcipuè ad natiui caloris temperiem moderandā frui nouimus. Quum itaq; inartificiosum, prorsusq; incommodum fuisset, foetus corpori tot uasa inseri, implantariq;, quot ipsius occasione in uteri sinum fuerunt aperienda: necessum sanè fuit, uasa hæc frequenter effici, ut tandem ex omnibus sese aperientibus uenis, una ferè constitueretur, & ex arterijs omnibus duæ exurgant: ac uena quidem per umbilicum ducta, iecoris potissimum cauo inferatur, ipsiusq; uenis communis fiat: arteriæ autem secundum uesicæ latera prorepentes, magnæ arteriæ propagininibus continuentur, quæ per pubis ossa in femora mox sunt prolapsuræ. Ad hæc, quum gracilium uasorum in crassiora amplioraq; mutuus ille congressus, ac uaria illa uasorum series de nouo foetus gratia inter uteri superficiem, foetusq; umbilicum formanda, corpore quodam non secus suffulciri, implicariq;, & in textu debuerit, ac multas uasorum distributiones in reliquo animante (siue hæc in mesenterio, siue tenui cerebrum inuolueniente membrana, siue alibi spectentur) contineri scimus, ilico sanè exterioris quoq; foetus inuolucris præcipuus usus, ipsiusq; ad uterum nexus ratio, nobis occurrunt. Necesse enim fuit, illud inuolucrum uteri uasorum ora excipere, nouaq; ueluti uasa in ipso procreari: hæc q;, uti diximus, per id inuolucrum, ut tandem umbilici cōstituant uasa, in se colligi. Quia uerò uteri uasorum cum inuolucris uasis connexus infirmi inuolucris

fig. 125, 126  
B, E,  
E 2 126, 130  
fig. 1, 11, 11,

fig. 125, 126  
A.  
B, 1: fig. B,  
1: fig. A,  
A, A.  
1: fig. B,  
B, B.

1 ad N 1 14  
bule n. 10.  
S, S ad  
T tib. 4.  
m 2 fig. 1.  
G.  
n 2 fig. 1.  
L. 1 fig.  
12 ca. 10. 1  
inter 1  
1.  
0 12. fi. M.  
N. 10 fig.  
D.  
p. 11 fig.  
q. 2 fig. 12.  
7 E. E.  
r. 4. fi. per  
omnium.

ualidiq; extitissent, si nouis illis ac tenellis uasis Natura nihil, quo aptius continerentur, firmarenturq; adiecisset, carne a quædam substantia connexibus illis accessit, quam nulli in uniuerso corpore substantiæ proximius quàm peculiari lienis<sup>g</sup> carni conferre possum. Atq; ut ea caro, lienis uasis undiq; attextitur ac circumfunditur: ita hæc quoq; substantia, uteri uasa in inuolucrum sese aperientia circūplectitur ac continet, tanto semper copiosior crassiorq; apparēs, quo foetus partui est uicinior. Adnascitur autē hæc substantia ualidissimè utero, & externæ inuolucrici superficiei. in partu uerò, aut quum aliàs in diffinitionibus inuolucrum ab utero diuellitur, ipsa inuolucro cum uasis ipsi in textis adnata manet. Atq; huius sanè substantiæ amplitudo, quæ semper exterioris foetus inuolucrici ad uterum nexibus in latitudine ac situ respondet, ea demum est, quam hæctenus describere conatus sum, quæq; in una tantum inuolucrici sede in humano foetu orbicularis ferè & unica occurrit: in canino autem unica quoq; spectatur, sed quæ transuersim instar latioris cinguli aut fasciæ totum inuolucrum in sui medio, ac ubi amplissimum est, cōprehendit. In uacis uerò, & bubalis, alijsq; cornutis animalibus (uti & prius scripsi) exiguæ amplitudines sparsim per totam inuolucrici superficiei sese offerunt, inuicem non connatæ. Cæterum etsi eiusmodi amplitudinum nexuumq; occurrat discrimen, omnibus tamen animalibus uasa per hanc substantiam & exterius foetus inuolucrum, uariè etiam distributa, ita tandem coeunt, ut ex interiore exterioris inuolucrici superficiei, ueluti ex puncto, unum teres longumq; instar cordæ corpus prodeat, simul in se complexum, continens umbilici duas arterias, & hic adhuc totidem uenas. Vt uerò exterior huius inuolucrici superficiei, ob uasorum connexum, substantiæ quæ illius seriem, inæqualis, ac quodammodo locis quibusdam aspera existit: ita contrā interior superficiei est prorsus læuis & lubrica, quodammodo quæ madens. Si itaque inuolucrum hoc, cum foetu ab utero exemptum, ac dein, posteaquam à foetu amotum erit, in uersum finxeris, ut iam carneam eam substantiam, & crassum subuirdemque, qui tum ex uasis subinde profluit, sanguinem, in se amplexetur, facile auguraberis, quā à farcininis specie Veteribus *αλκυονιδας* fuerit nuncupatum. Vt enim farcimen exterius, propter internam intestini, priusquam id inuenteretur, superficiem, exactè lubricum & læue, ac ueluti membraneum est: intus uerò, propter externam intestini superficiem, à qua ipsum accedentia uasa cum mesenterij membranis resecta sunt, asperum, ac tandem carne, aut concreto sanguine, aut alia quauis materia infartum est: ita quoque exterius foetus inuolucrum, intestini modo ad farcininis constitutionem inuersum, externa tunc superficiei prorsus membraneum & lubricum læueq; existit, interna autem carneam illam, ac lienis substantiæ similem obtinet compagem. Cæterum interius foetum ambiens inuolucrum, undecunque ab exteriori laxè circumdatum exquisita est membrana, longè quàm exterius inuolucrum mollior, & prorsus alba, & pauculis uenulis & arterijs, quæ illam non secus quàm adhærentis albæ uel oculi tunice uasa, ad ipsius tantum enutritionem, calorisq; temperiem perreptat, intertexta. adeò, ut à candore & mollicie *αμυδός*, ac ueluti agnina, uel ut quibusdā placet, amiculū Veteribus sit nuncupata. Exterior huius inuolucrici superficiei exactè læuis & lubrica est, exteriori inuolucro nullibi quàm umbilici uasorum interuentu connata. Vbi enim hæc ab interna exterioris inuolucrici sede, tanquā ex puncto, instar cordæ, aut alterius teretis corporis simul implexa, membranisque cōtenta prodeit, succinctissimo & neutiquā errabundo ductu interiori inuolucro adnascitur: & exiguas uenulas

Carnosa enim  
dī substantia ex  
teriori satis  
inuolucro ob-  
nata necessi-  
tas.

Quæ exterius  
inuolucrum à  
farciminis spe-  
cie nomen ob-  
tinet.

Interioris satis  
inuolucrum.

g utriusq; uide-  
tur 4. 14.  
et figuræ.

13. 14. fig. 30  
N. & 4. 14.  
fig. 30. & 5.  
colliguntur  
ad T.  
ut tota 2. 14.  
fig. 30. &  
fig. 31. &  
72. fig.  
23. 14. fig. 34.  
30. M. & 4.  
14. Q. 5. S.  
T.

3. 14. fig.  
30. O. 4.  
14. V. V.  
X. X.  
14. 14. fig. 34.  
14. lib. 7  
13. 14.

6. 14. fig.  
30. N. 4. 14.  
T.




uenulas arteriolasq; illi exporrigentia, in internam dein inuolucris interioris sedem transeunt, ac cordæ in modum ad fœtus usq; umbilicum deducuntur: quæ sanè oblonga hic est, ac locis nonnullis, ueluti tuberculis, nodisq; quibusdam inæqualibus ornata: ex quorū numero obstetrices ridiculæ, futurorum adhuc puerorum numerum parturientibus prædicere solent. Cæterum hæc corda, nunc in interioris inuolucris interna superficie nō tantum umbilici uenam (quæ hīc modò unica & simplex est) & duas ipsius arterias in se complectitur: uerum & meatum quandam continet, assumitq;: qui ab elatiori sede fundi uesicæ enatus, & substantia cōformationeq; meatibus, quibus urina ex renibus in uesicā delabatur, respondens, per umbilicum excidit: ac per dictam nobis cordam ad externam usq; interioris inuolucris superficiem procedēs, in eam sese aperit: ac inter hanc & internam exterioris inuolucris superficiem, fœtus urinam (unde etiam οὐραχὸς & οὐρανὸς appellatur) desert, illic toto tempore, quo fœtus in utero geritur, sensim mira profectò Naturæ industria coaceruandam. Si fœtus enim adhuc utero detentus, urinam, perinde ac ubi in lucem prodijt, per uesicæ ceruicem redderet, hæc ipsi fœtui proximè obnata, sua acrimonia & mordēdi facultate tenellam fœtus cutem exulceraret: haud secus profectò, quàm si interius fœtum ambiens inuolucrum hac potissimum ratione efformatū uideretur, uti exterius inuolucrū, uasorum nexus collectionisq; gratia in primis extructū colligimus. Verum fœtus urina non semper undiquaq; uaga, passim inter duo fœtus inuolucra diffuere manarēue conspicitur: at meatus urinam huc per umbilicū deferens, ueluti in membranam, impenfēq; mollem & tenuem, amplamq; uesicam cessat: quæ inter

Meatus urinæ  
fœtus inter duo  
ipsius inuolu-  
cra perferens.

Peculiare inter  
duo inuolucra  
fœtus urina re-  
ceptaculum.

H A C figura uterūq; membranam uesicā expressimus, quæ, quum fœtus urina inter illius inuolucra uagari non desinit, ex meatu urinam per umbilicū deferente expaditur. Significet itaq; A, exterius fœtus inuolucrum, secundum longitudinem dissectum, & ab interiori inuolucro B notato, & adhuc hīc integro, diuisum. C autem insignitur molis admodum tenuis membrana, uesicæ uesicæ urina sibi in utero asseruans.



Sudor fœtus,  
et reliqua dein  
excremēta ubi  
coacervantur.

brantarum fœtus occasione procreatarum numero ita habita, ut illam tertij (sed medij interim) inuolucris fœtus nomine donauerint, exterius duntaxat inuolucrum ueluti propria & peculiari uoce secundas & loculos nuncupantes. Fœtus porrò sudor, quum priuato aliquo meatu interfœtus inuolucra, aut in peculiarem aliquam uesicam educi nequeat, inter internam interioris inuolucris superficiem & fœtum ipsum coaceruatur: & ne sua forsitan acrimonia (quam nonnihil quoq; sibi uendicat) fœtui noxius sit, crassum, quod per insensibiles cutis meatus alioquin educitur, & aliàs cuti nostræ & indusijs quasi hæret, excrementum præstat: quod glutinis lutiue modo, fœtus cuti oblitum, sudoris uim arcere cernimus. Videtur itaq; sanguis, qui ab uteri uenis per umbilicum in fœtus potissimum iecur defertur, ad cōmodam fœtus nutritionem magna adhuc, & alia sanè quàm reliquus matris membra accedens & enutrients sanguis, indigere elaboratione: non secus ferè, quàm si purissimus tantum esset succus, ex uentriculo & intestinis fœtui oblatas. Præter urinam namq; & sudorem, idq; cuius modò memini lutofum excrementum, quæ extra fœtum adhuc in utero consistentem ducuntur, in ipsius intestinis, si non stercus, saltem crassam & uariam bilem unā colligi, inter diffecandum, & aliàs

d 2 fig. M  
procedens  
ab illi.  
e 22 fig. q.

f iuxta N  
3 tabule fi  
gur. 30.

& aliàs mox à partu, quum illam foetus excernit, liquidò spectamus. Atq; hæc excrementa, pro matrū ferè temperie ac valetudine, potissimū quantitate, & nō nihil colore & cōsistentia uariare experimur, prout nimirū illis sanguis aliàs accidit serosior, aut crassior, aliā ue qualitate ab optimo & laudato alienior. Quòd uerò sudor & urina; in eum quē diximus modū asseruata, quum mox ante partum profluunt, ac uteri fundi os, uteriq; ceruicē humectant, & emolliendo distendi aptiorē efficiunt, ad faciliorē partum magnopere adiuuant, uel me tacēte, ijs notū arbitror, qui mulieribus, alijsq; animalibus, expendendorum Naturę mysteriorum gratia, nonnunquā altitere. Quum enim in partu fundi uteri os quasi in pudendū delabatur, ac miro Naturæ beneficio dilatatur, uasq; ab utero in exterius foetus inuolucrū inserta, ab illo, suisq; unde pronata fuerūt uasis, eum in modū abscedunt, quo maturos fructus, aut in autumno folia suis pedunculis ab arboribus abscedere abrūpiq; cernimus: tunc foetus ipse interdum, sæpius autem bruta animalia suis dētibus, mulieres uerò nonnunquā ipsæ, aut obstetrices, ambiētia foetum inuolucra disrumpunt, distētiq; liquores profluunt, foetusq; in lucem egreditur, umbilico adhuc nexus, quem mulieres forpicula aut cultello, bruta uerò dētibus ferè discindūt, ipseq; iam foetus spiritū ducere, aereq; ipsum ambiēte uti incipit: quum prius in utero umbilici arteriæ, cordis pulmonisq; foetusungerent muneribus. Ipsa autem inuolucra, foetum mox cum sanguinis quodā, ob abscedentia uasa, defluxu subsequuntur: quæ mulieres quidē asperso sale ferè exurunt, aut aliquò defodiunt: bruta autē permulta, nisi ipsis ab astātibus præripiātur, illa deuorant. In hoc pueri egressū, nonnunquā interius inuolucrū, adhuc in utero aliquādiu manēte exteriore, prius egreditur, foetui aliqua ex parte obuolutū, adeò ut mulieres priuatim illi puero, si masculus sit, galeā aut thoracē: si fœmina, uittā aut indusium (prout nimirū huic illi ue foetus parti potissimū in partu hæserit) à Deo datum gestiāt, mira illi puero tunc promittētēs, quò interim omnib; pueris ea mēbrana sit cōmunis, modò quis interius inuolucrū assumat, ac perinde atq; illę mulieres suā galeā & uittā, à foetu & externo inuolucro reseceat, & uesicę alicuius instar asiccātū asseruet, quò iam adolēscētib; in quēuis tandē usum eiusmodi mēbranula exhiberi queat. Equidē mirū est, quā religiosę mulieres, nō minus sanē quā uerè occultę philosophię sectatores, de illa sentiāt. In hunc igitur modū foetus habent inuolucra, quę in canibus, singulis foetib; sunt peculiariora, & nulla ex parte foetus unius inuolucra alterius foetus inuolucris cōmittuntur. Seriatim nāq; ueluti in longo quopiā intestino, foetus in cane & sue, in utrisq; uteri partibus collocantur, non eam seruantes rationē: etsi fortē quis Hippocratis & Galeni occasione secus arbitrareretur, ut in dextra uteri parte omnes foetus sint masculi, in sinistra uerò fœminę. In uaccis autē, & bubalis, & capris, quum unicus est foetus, in altera tantū parte, altero ue uteri sinu is reponitur: sin geminus, utraq; uteri cavitās (ut sic dicam) unum foetum cum suis membranis complectitur. Mulieres uerò, quum aliās sibi non conatos, aut monstruosos gemellos habent, eos quoq; singulos in proprijs membranis inuolucrisq; continent, & par est ad uterum amborum foetuum exterioris inuolucris & carnosę illius substantiæ nexus: unius nimirum foetus colligatione in unum uteri latus, alterius uerò ad alterum latus facta. adeò ut magnū uterorum occasione in exterioris foetus inuolucris nexu in hominibus, canibus & uaccis sit discrimen. Quod quum obseruabis, hancq; nostram descriptionem cum Galeno in libris de Semine, libris de Partium usu, libro de Foetus formatione, libro de Vteri dissectione, ubi foetus inuolucra persequitur, con-

*Cuiusmodi in  
partu urinesu  
dorsū, ac inuo-  
lucra egressu  
sunt.*

*Quis foetus se  
habeat inuolu-  
cra, pluribus si  
mul existēti-  
bus satis.*

*Veram inuolu-  
crorum histo-  
riam à Galeni  
placitis multis  
esse remotam.*

tur, conferes, obuium profectò fiet, quàm Galenus sibi undecunq; consentiat, & quàm ueritati cõsona nobis de fœtus inuolucris tradiderit: ne quid dicã de fœtus formatione, multisq; huc pertinētibus disputationibus, quas ille potissi-  
mum cum Aristotele instituit. Nam etsi fœtus inuolucrorũ historiã mihi proponere, & in hac procul à Galeni, aliorumq; disseccionis professorum pla-  
citis dissentire integrum fuerit: quum tanie innumera circa fœtus formatio-  
nem me dubium & ancipitem habeant, quumq; mihi ipsi magna ex parte in  
illis altercationibus neutiquã satisfaciam, pleraq; me prorsus ignorare lubens  
fateor, utcunq; etiã non oscitanter disseccionibus incubuerim: etsi brutorum  
interim præcipue, quum scilicet hætenus, potissimumq; quãdo in Anatome  
paulo factus sum exercitator, atq; non modica, de quibus meritò ambigam,  
mihi obuersantur, in paucas mulieres utero gerẽtes inciderim. adeò, ut latius  
multo fore duxerim, uniuersum de fœtus formatione, & quæ huic proximæ  
sunt disceptationibus, sermonem (quĩ non nisi prolixissimus esse posset) pe-  
nitens hic omittre, illumq; in alium locum, ac argumentum aliud referuare,  
si quid fortè mihi in posterum ex confectionibus, accuratiori; ratiocinatione,  
ne, tradi dignum occurrerit.

## DE MAMILLIS. CAPVT XVIII.

*MAMILLARVM fabricam non aliter delineare licuit, quàm in dextro latere uigesima quinta fi-  
gura eam exprimere conati sumus.*



*Mamillarum  
sine.*

A M I L L A E, etiam si peritonæo nulla ex parte<sup>a</sup> cõtinean-  
tur, quum tamẽ fœtum, ubi in lucem prodijt, alunt, & in  
organorũ generationi subseruientiũ numerum recẽsen-  
tur, hoc quoq; loco ipsarum fabricã opportunẽ prosequẽ-  
mur. Mamillarũ itaq; situs nulli non cõspiciuus est: super  
pectus enim ad ofsus pectoris latera locatur, parti inferiori  
brachium pectori admoũtis<sup>b</sup> musculi superstrata. Ve<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Non con-  
tinetur in-  
ter A, B, C,  
D & E 24  
fig.

<sup>b</sup> 3 musc.  
tab. 24

rũ ut figura admodũ uariant, sic quoq; parẽ non semper sedẽ occupant. am-  
pliores enim mamillæ latiori firmatur basi: propedulæ uerò ac flaccidæ, à na-  
turali loco declinat: & quibusdã mulieribus uiciniũs ad pectoris mediũ inui-  
cem accedunt, quibusdã autem (quod & pulcherrimũ ducitur) inuicem re-  
cedunt, thoracisq; lateribus magis appropinquat. Forma illis penẽ propria femi-  
globũ refert: quippe exterius rotundæ gibbæq; sunt, papillã (quæ Græcis *θήλα*  
appellatur) instar proceffus obtinẽtes: intus uerò, seu posterius, quã pectus spe-  
ctant, leuiter secundũ huius gibbum insinuatur, illi ampla basi cõmissæ. Ceterũ  
quãdo mamillarũ moles à brachiũ pectori adducẽte musculo abscedit, il-  
læ quã potissimũ dependet, ampliores quàm in medio ductu euadũt, ut ple-  
risq; feminis simul in basi, & in ipsarũ extremitate ampliores ob cõcidentem  
earundẽ substantiã uisuntur. Porro substantia qua cõstant, glãdulosa est, multo  
adipe abundãs, & uenis utcunq; frequẽtibus, & arterijs perquã paucis, pro-  
fusq; gracilibus, ac aliquot deniq; neruis intertexta. Nerui quidẽ semper ijdẽ  
in mamillas pertingũt, ac sibi perpetuò similes sunt: uenę autẽ crassitie & con-  
tento humore admodũ, pro mamillarum mole, & quo tunc fungũtur mu-  
nere, differunt. Insuper in glandulosæ mamillarum substantiæ forma, consi-  
stentia, multitudine & situ, longẽ maior singulis tẽporibus est differentia. Vi-  
ris namq; multis nulla, aut ualde modica, eademq; arida, eiufmodi glandulosa  
obtigit substantia, uti etiam admodũ puellis. Iuenculæ uerò, quibus mamil-  
læ in molem iam cum pruritu attolluntur, auidẽq; maritum expetunt, huius  
nanciscun-

*Forma.*

*Substantia.*



nanciscuntur copiam plerunque compactam & duriusculam, nulloq; lacteo humore (secus scilicet quam in lactantibus, aut propediem parituris euenit) oppletam, neq; etiam substantiæ in anicularū mamillis cōtentæ modo, flaccidam, aut defluentem. Ad papillæ igitur centrum mulieribus <sup>e</sup> una magna, & mamillæ instar effigiata habetur glans, cæterorum animalium peculiari priorq; glanduloso uberum corpori, substantia respondens. cui<sup>4</sup> aliquot aliæ ferè, sed paruæ & amygdalis à cortice liberatis similes, in circuitu accumbunt glandulæ, pro mulieris temperie nunc duriori adipe, nunc molliori, & uenarum & fibrarum ex carnea mēbrana in cutem pertinentium interuentu, mutuo commissæ connatæq;. Vniuersa enim mamillarum substantia adipis modo, inter cutem & membranam illam continetur: neq; costis incumbentibus musculis mamillæ alio nexu cōmittuntur, quam per reliquū corpus ea membrana subditis sibi hæret musculis. nisi fortè hic paulo plures interueniant uenæ, à musculis in mamillas digestæ. Vt cunq; tamen mamillæ aliquando molles ac flaccide propendeant, carnea idcirco mēbrana à musculis nunquam abscedit: at glandulosa illa mamillarum substantia simul cum adipe non amplius constricta, sed defluens & laxata, à carnea membrana dissoluitur. Mulieres enim lactantes, & ultimis mensibus uterum gerentes, mamillarum uenas lacteo humore aut lacte oppletas habent, & ipsæ etiam glandulosa substantia eo abundat, & ob id mollior & fungosa admodum, neq; ita densa & cōtinua redidit, ac tonum illum non amplius seruans, & duriusculo adipe haud magis illam suffulciente, sensim flaccescit propendetq;. Quanquam interim eò nunquam perueniat raritatis, ut deuoratum à muliere pilum in se (uti Aristotelis est sententia) reciperet, & pilari morbo, Græcis *πυλιδες* nuncupato, uexaretur: quandoquidem nulli dubiū est, per tot angiportus, tenuesq; anfractus ab ore ad mamillas, pilum nequaquam duci posse: etiam si mamillæ illum fortè, interim in ipsarum confisteret uenis, amplexuræ essent. Non est tamen omnibus, <sup>e</sup> urinarijsque meatibus, progigni posse. Cutis mamillæ obducta, reliquæ thoracis cuti congruit: mamillæ enim substantiæ, ut reliquo per corpus adipi connascitur, pariterq; inibi crassa est. At ubi orbiculatim ad papillā quodammodo nigricat, circulumq; constituit, qui *φός* Græcis nuncupatur, pertinacius præcipuo mamillæ glanduloso corpori connascitur, plurium neruorum & tenuium uenarum instar fibrarum albicantium interuentu. Quinetiam cutis interdum hic tenuior quam alibi euadit, fungosum quidpiam, ut & papilla, adipiscens. Huius namq; constitutio præcipuæ penis<sup>5</sup> substantiæ accedit, hoc est neruæ quodammodo cuti spongiosa intus substantia oppletæ, quæ dirigi ac uicissim laxari non minus quam penis ualet, & pori sensu prædita est. Obscuri illi tenuesq; in papilla conspicui meatus, fibræ prorsus ac nerui modo albicantes, uenarum furculi sunt, multiplici serie per glādulosam mamillarum substantiam excurrentium. Atque harum mamillas implicantium uenarum nonnullæ ab axillaris uenæ iam thoracis amplitudinem egressæ<sup>6</sup> ramo dependent, qui in<sup>7</sup> musculos pectori superstratos & pectoris cutem, ipsamque demum mamillam sese distribuit. Item uenæ elatiorem scapulæ sedē & summum humerum perreptantes, deorsum in plerisq; mulieribus cōspicuos ante sectionem<sup>8</sup> furculos in mamillæ cutē, ipsamq; unā mamillā deriuant. Apparent namq; crebrò mamillarum cutis uenæ in multis mulieribus, & potissimum quæ aliquādo lactarūt, insignes & subuirides, errabundoq; ductu, perinde acin sura & temporibus interna; cubiti sede progredientes. Præter com-

Lib. 7. *Historia de Animalibus.*

*Papilla substantia.*

*Venarum mamillam petentium series.*

n n memoratas

memoratas mihi modò uenas, dissectionũ professors, alias magis præcipuas ac solas propemodum enumerant, quæ arterijs cõcomitate, ab illis uenis initium ducerent, quæ à caua uena in iugulo prodeunt, & sub pectoris ossẽ uersus abdomem ad umbilicum usq; propemodum simul cum attensis ipsis arterijs excurrunt, ac per costarum cartilaginũ interualla furculos in anteriora pectoris dispensant, internam potissimũ musculi partem implicantes, cuius beneficio brachium pectori adducimus. Num uerò præsentis furculi eum permeent penetrentq; musculum, unaq; cum suis comitibus arterijs tandem in mamillas disseminetur, sed uelò inter secandũ obseruari uelim. mihi namq; eiusmodi mamillas adeuntes furculi aut uenæ repertu non sunt faciles, uti mihi nus quoq; huc pertinentes artetias adinuenire queo, ita sanè ut mamillis artetias uix ascribere ausim. Cæterũ brutis quib. alius mamillarũ uerũ uel quàm homini situs accidit, ab illis uenis propagines in mamillas diffunduntur, quæ humiliorem abdominis partem suis ramis intextunt, ac quarũ utrinq; una inibi à caua uena initium obtinet, ubi hæc præcipua sua portione, supra pubis os in inguina fertur, ac in crus extra peritonæi cauitatem primũ procidit, longè nimirũ à uenarum uterum adeuntium exortu. Atq; in harum quidem uenarum quæ ad abdomen tum à iugulo sub pectoris ossẽ, tum ab inguinibus sursum deducuntur serie, bruta ab hominibus uix quicquã differunt. illaq; in omnib. ferè uasorũ spectatur distributio, quam in tertio libro expressimus, quamq; non obiter examinari uelim, quũ hoc Capite, aut unquã alias, de uteri cum mamillis ages consortio. Mamillarũ nerui ab illis pendunt, qui subditis illis exporriguntur musculis, neq; aliter hi in mamillas quàm reliquam thoracis cutem deriuantur, præter unicum, qui ceteris crassior ex quinto ferè costarum interuallo papillã adit, multosq; furculos ipsi offert. Quàm uerò singula primario mamillarum muneri idonea, rerũ Opifex accuratè fabricauerit, intelliges, si seorsum unumquodq; suo usui adhibueris. Præcipuum enim mamillarum officium in omnibus uiuiparis censendũ est, tenero adhuc aciam nuper nato foetui alimentũ præparare. Nò enim in hoc præcipue (quam in quarto de Animalium partib. libro Aristoteles id attestetur) ubera fuerunt creata, ut cordis sedẽ operiãt, & deinde, ut in mulierib. ueluti secundo, aut Natura illis quodãmodo abutente, ad lactis generationẽ, & ad illud continendum subseruieret. Quippe quum neq; pueris, neq; alicui animali ad generationem nõdum apto, mamillæ exurgat, sed ueluti notè cuiusdã gratia absq; peculiari aliquo in illis corpore, quo à reliqua inter cutẽ & carneã membranam pinguedine insigniter discerni possint, duntaxat in illis habẽdæ sint, certũ est, eas primò nõ propugnaculi uice fieri, quum scilicet præter tenerã papillam nihil habeant, quo propugnacula illis quib. incumbunt organis, meritò dicerentur. Ad hæc, si quod incrementum in uiris mamillæ recipere appareat, & quasi alterius cõmodi causa, quàm notè cuiusdam habẽdæ sint, id illis magna ex parte provenit peracto anno bis septimo, quũ primũ genitale semẽ ferre ac pube scere incipiunt. adeo sanè, ut lactis gratia potius, quàm munimẽti ac propugnaculi intumescere, effœminatioresq; ipsas mamillas fieri cõstet. Nã & lac nonnullis uiris post pubẽ exprimi, & per suctũ frequentiorẽ crebrãq; ac multam contrectationẽ prodijisse, Aristoteles ipse asserit, & nos quoq; nõ semel id conspeximus. Ceterũ mamillas homini ac simiæ, in pectore, non ita aut ceteris ferè animalibus, percommode collocari, præter hoc quod ipsæ brachiorum ac manuum munia nõ impediunt, homoq; & simia latum pectus, neq; ut reliqua ferè animalia in acutum prominens sibi uendicent, mulier puerũ lactans abundè

l fig. cap. 6  
lib. 3. l. 1.  
2 fig. lib. 6  
B, C.  
m fig. cap.  
12 lib. 3. G.  
n fig. cap. 6  
lib. 3. M. 1.  
6 muscl. a. f.  
03 muscl.  
tab. a.

p fig. cap. 6  
lib. 3. r. quod  
confer. fig.  
25 lib. 5. u  
cum 7.

q fig. ca. 6  
lib. 3. v. aut  
confer. fig.  
25 lib. 5. u  
cum 7.

r 2 fig. cap.  
21 lib. 4. u.

Mamillarum  
nerui unde dis  
cantur.

Mamillarum  
minores et cõ  
structionis ra  
tio.

sicut ratio.

abundè indicat, nobisq; in illo officio uarijs coniecturis colligere promptissimum est, mamillis cōmodiorem regionem fessili animali & manibus usuro (ut ueneris modos taceam) thoracis anteriore regione nullā excogitari possē. Nam hic situs lactis generationi propter cordis calorem nō est ineptus, & ex abundanti mamillę cordis propugnaculū & uallum quoddā censerī possunt, homini in primis pectus exporrecturo, neq; illo ceterorum ferē animalīū modo humi reclinaturo. Deinde p̄fens quoq; situs, reciprocum quendam calorem (qui tamē magis fortē uētriculo & intestinis necessarius fuisset) cordi retribuit. Mamillę enim lanei penicilli, aut uestis, aut ipsius in corpore adipis, aut carnis ritu, à corde caloris officina prius excalfactę, calorē illū, reprimendo tēgendoq; reuerberāt. Itē, cordis thoracisq; continuū motū, cordisq; inexpugnabilem calorē ad lactis generationem plurimū cōferre, qui concoctionis alterationisq; naturā p̄spectā habet, absq; negotio concipit. Porro mamillas homini elatius, ceteris uerō animātib. humilius, ex Aristotelis & Galeni aliorūq; philosophorū & medicorū suffragio reponi, propter alimētī, aut, ut ipsi dicunt, excrementi quod in lac cōuertendum erat penuriā, nō omni ex parte uerū esse arbitror. Primū enim huc scopū dirigūt, quod fœtus in utero inferioris corporis partis excrementitiū sanguinē in nutrimentū assumit, mamillę uerō ad lactis generationē superioris partis sanguinē p̄cipuē admittāt alliciātq;. Dein adiiciūt, homini in elatiori parte mamillas reponi, reliquis aut animalib. nō itē, quod his eius partis excrementū in cornua & iubas, secus multo quā mulieri, ex ipsorū sententia, cōsumatur. Quasi uerō ceruę, uacę, eque, eiusq; generis animātia, uenis quę à iugulo deorsum sub pectore ferunt, aut ijs pariter quę ab axillā petente uena pectori instratis musculis, eiusdemq; cuti dispensantur, magis quā homines carerēt: & in illis ex superiorib. corporis partibus ad utrum sanguis minus quā mulieri possit trāssumi: & non multo plus mulieri, depili aliās omnino, excrementi in lōgissimos capitis crines, quā alijs animalib. in cornua & iubas, idq; pro portione, deperiret. Sed profectō hęc Aristotelis ratio illi correspōdet, qua pleraq; de menstruis lunaribus uē purgationib. problemata, nescio an tam uerē quā ualde, medicī & philosophi soluūt. Quandoquidem uerō hęc aliō spectant, nunc reliquā cōstructionis mamillarum rationē aggrediemur. His igitur forma exterius rotunda, quo minus iniurijs essent obnoxie, perquā idonea fuit: intus uerō ea parte qua pectori cōmittuntur, planas latasq; meritō illas effinxit Natura, ut firma inniterent basi. Teneram quoq; & prominentem adipiscuntur papillā, ut hęc angusto teneroq; infantis osculo inditā, is confestim labijs molliusculis constingat, & inferiorem deducens maxillā & buccas contrahens, lac fugat, & linguā dein instar carnalis inflectens ad stomachum id à nemine edoctus propellat. Ut uerō in illo succu papilla turgidior proceriorq; quā aliās (dum id scilicet minimē opus est) redderetur, similem cum pene possidet substantiā, quā & laxari conciderę, & rursus à suauī contactu intumescere erigiq; idonea existit. Papilla autem sensu exactiore, & neruorum furculis abundat, quo mamillis hac etiā ex parte cum genitalib. foret affinitas. Vt enim illis ad uenerē cōgressum generisq; propagationem, illecebrā ac uoluptatem indidit Natura: sic quoq; & uberibus, potissimumq; papillis, ut mater in lucē iam editi fœtus tenerulo & nondum dentato ori papillam lubentius titillandā pruriendamq; inderet, ac fugendam offerret. Mamillarum uerō glandulosa substantia eius est ad iustitiam temperiei ac formę, ut sanguinē per uenas ipsi magna Naturę industria adductum, in lac familiare pueri alimentum conuertere cōcoquereq; possit.

Formę mamillarum ratio.

Papillę constructionis, & totius substantię eiusdem ratio.



Uenarum se-  
rici ratio, &  
uteri cum ma-  
mellis consor-  
tium.

Cæterum in uasorum mamillas petentiū distributionis usu explicando, Gale-  
nus admodum est diffusus, quū hanc ex remotioribus & disitis partibus de-  
ductam anfractuosa mōq; & gyris multis præditam esse affirmat, quò sanguis  
ad lactis generationē in longis illis ductibus ac gyris commodè prepararetur:  
quum ego interim ignorē, qua tandē peculiari priuata uē sanguis, priusquam  
mamillis offerendus sit, egeat præparatione, uasorum nihilominus semina-  
lium incessuum ductuumq; haud immemor. Neq; etiam succinctior uia erat  
qua mamillis, aut homini aut cæteris brutis uasa tutò distribui potuissēt, quū  
cauæ uenæ caudicem meritò dorsum occupare constet, & Naturæ adeò arti-  
ficiū simul quoque euidens sit, quo anterioribus corporis trunci sedibus, pe-  
ctori nimirum & abdomini uasa exporriguntur, siue id ad iugulum, siue ingui-  
na, siue ad illos etiam ramos spectemus, qui à cauæ caudice & uena pari caren-  
te secundum corporis latera diffunduntur. At non ita uasorum seriem oblon-  
gi ductus gratia, quem uenæ mamillis oblata sibi uendicant, expendendam  
putauerim, atque disceptationum occasione indies occurrentium, de uteri  
cum mamillis consortio, de lactis cum mensuris purgationibus affinitate, de  
earundem & lactis copia, de abortibus, potissimūq; de sanguinis mutuo nunc  
ad uterum, nunc ad mamillas deductu. Mirum namq; est, quā eiufmodi spe-  
culationum gratia, Galenus sese interdum torqueat, modò uenas abdominis  
inferiora petentes, ab illis quæ uterum adeunt oriri (& si rursus alibi secus te-  
stetur) scribens, modò prolixè tradēs quī per easdem uenas sanguis circa ute-  
rum in prægnantibus abundans in mamillas sursum repat. perinde sanè, ac si  
uenæ à iugulo sub pectoris ossē abdomen petentes, & illę quibus inferior ab-  
dominis sedes intertextitur, solæ essent uiæ ac meatus ductus uē, per quos uteri  
cum mamillis fieret consortium, siue id per uenas sub rectis abdominis mu-  
sculis progredientes, siue per eorundem ramos per abdominis cutem expen-  
sos existeret: quum ego interim eiufmodi consortium, qualecunque tandem  
sit, ad uniuersum cauæ uenæ caudicem potius referendum putauerim. Imò  
quum Galenus studiose sanguinis ad superiora ductum explicare contendit,  
non mihi uidetur expēdere, quī suis rationibus, sanguis potius in crura, quā  
sursum per abdominis regionem in mamillas deflueret, accedente etiam ab-  
dominis à grauido utero compressione, & nullo etiam præsentē orificio, quo  
humiliores abdominis uenas cum superioribus conuiuere continuariq; const-  
tat. Verū ne hunc in modum sermo de mamillarū usu institutus, nimium  
excrescat, omnium quæ hoc libro descriptimus organorum dissectionem,  
nunc percommodè aggrediemur.

Intueret hic  
figurā cap.  
6 lib. 3.

8 Specta &  
musc. la. a.  
c. f. & fig.  
ca. 6 lib. 2.  
M, T. & fi.  
ca. 12 lib. 3.  
G, F. & ul-  
time fig. li.  
3 \*, 9, 14

# OMNIVM ORGANORVM QUINTO HOC LIBRO

descriptorum administrandi ratio, ac nonnulla generatim de Anatomien  
discendi, docendū ue ordine. Caput XIX.

Quibus huius  
operis loci par-  
titi secandi tra-  
ditur ratio.



N PRIMI quidem libri calce discendorum asseruando-  
rumq; ossium rationem diffuse expressi: & in secundo li-  
bro musculorum & ligamentorum secandi modum, ut  
res inibi exigebat, persecutus sum: in tertio autem libro,  
qui uenarum arteriarumq; per uniuersum corpus distri-  
butionem complectebatur, ac in quarto etiam, qui ner-  
uis erat proprius, nullus administrandæ sectionis incidit  
sermo, quòd scilicet illum ad præsens usque Caput, ac postremum sexti libri,  
& penultimum septimi differendum putauerim. Quum enim singulis illis  
Capitibus,

Capitibus, earum quas sui libri descriptas habent partium Anatomem proponere uisum fuit: meritò etiam eisdem Capitibus uenarum & arteriarum & neruorum eiusmodi partibus dedicatorum sectio, ita hic tractanda est, ut nullo pacto in superioribus absolutior integriorque institui potuisset. Et si fortè quarundam uenarum & arteriarum neruorumq; sectio, simul cum dictis modò organis, seriatim ac necessariò non comprehendetur, eam ad finem penultimi Capituli libri septimi, unà subiiciemus. Erit autem hæc brachij potissimum & cruris uenarum, arteriarum & neruorum dissectio. ita sanè, ut si pariter, cutis quoque adipis, carnosæ membranæ, musculorum, ligamentorum ac ossium denique mentio suis locis obiter incidet, uniuersa disseccandi corporis ratio his tribus Capitibus ut cunque enarrabitur. Imò ipsa (quòd id scilicet, ei quam prorsus complecti debet tractationi, pauculis adiectis uerbis fieri queat) sic describā, ut quum simul unaq; quis capita hæc cónexa finget, instar libri ac canonis sint, quo humani corporis fabricæ studiofi, eā suo Marte in priuatis uarijsq; domi cum sodalibus tentandis sectionibus aggrediantur, aut in scholis secandarum ostendendarumq; partiū seriem à præceptoribus expetent, aut quem illi obseruaturi sint ordinē iam multo ante cernāt. qui sanè alius in corporum frequentia, quàm cum unum aliquod tantum ad publicam anatonem obtingit, est instituendus. Ego itaq; sæpius, haud denegatā profectò corporum copia, hoc quē modo subiiciā ordine anatomē docui. Parato industrii alicuius fabri lignarij opera elegantia theatro, quod nōnunquā supra quingentos cōmòdo spectantes reciperet, in illiusq; medio mensa quadam exstructa, quam negotio accōmodissimam fore ducebā, sedulò effeci, ut uariorū hominum ossa mihi ad manū essent, quædam inuicē attexta, quædam seiuncta ac in arculis posita: puerorum dico, iuuenū, senum mulierū & uirorū ossa, quæ tum mea, tum aliorum medicinæ candidatorū diligentia in Italiæ scholis mihi magno numero & copia adfuere, simul cū canis, & nonnunquā simiæ aliquotq; aliorum animalium ossibus. Ea igitur serie ossium doctrinam, priusquam integrum aliquod hominis cadauer in scholas adduci curarem, studiofis proponebam, quæ primum huius nostri Operis librum contexui. Ceterum propter Anatomes adhuc imperitos, ante ossium tractationem, simulatq; quædam de humanæ fabricæ cognitionis dignitate & usu, prout occasio ferebat, ac dein ordine quo hanc discendam putarem, eiusmodiq; alijs quibusdam præfatus eram, ac uarias unā, quibus dissectionum doctores humanū corpus diuideresolent, rationes ac differentias proposueram, quā id similaribus partibus, ac dein instrumentarijs efformaretur, adnissus fui ostendere. adhibito operi cane aut agno quopiam, quem magna ex parte primū cutē liberauerā, ac aperto thorace & peritonæo, ac insuper caluaria, in eum modū disseccueram, ut ferè omnes corporis partes sese obiter spectandas offerrēt: ac facile quancunq; tandem inter docendum uellem partē, manu cōplecterer. Quum itaq; de similaris partis ex primis Naturę principijs constitutione, ac potissimū essentiali forma (propter nouam quæ modò non indoctè proponi cœpit, morborum quibus similaribus partibus accidunt diuisionem ac numerum) egissem, os tanquam primam similarē corporis partem proposui, quā id sensu simile esset ostendens, ac ipsius usum in sustinendo firmandoq; exprimēs. Huic cartilaginē subieci, ipsius creandæ necessitatem addens: ac obiter docens, quæ de cartilaginis natura à me suo loco pertractantur. His ligamēti historia succedebat, & uarijs differentibusq; ostēsis ligamētis, ipsorū usus & procreandorū ratio proferebatur. Mox cum ipsis ligamētis, quid membrana esset, quidq; corpori præstaret

*Quis ordo in docenda ostendendaq; Anatome seruandus.*

*Similares & instrumentariæ corporis partes cuiusmodi.*

fermoni addebatur, cum aliquot membranarum in cane iam dicto aut agno demonstratione. Quum itaq; simpliciu, dein membranarū ad organorū tunicas ex fibris cōstantes discrimen docebatur, fibrarum quoq; tractationem membranis adhibui, aliquot diuellēs intestinorū tunicas, & fibras in ipsis indicans, ut quī ex fibris quibuscūq; tunicae nōnullae à simplicis mēbranę cōstructio ne differētes confingant, in propatulo esset. atq; ita deinceps cū fibris quę inuicem nec tendē erāt, carnis in uniuersū hystoria addebatur, quam simplicē in iecore, pulmone ac renibus ostenderā: uisceribus illis, quemadmodū eiusdem quoq; usus gratia, & crebrō nōnihil dissectis. Sed quib. modis caro fibras contineat, ipsisq; cōmittat, in laceratis disceptisq; quibuscūq; musculis, ac in cordis dissecta substantia, obuiā reddebatur. Vbi autē glandulosi corporis, ac dein ad ipsos quoq; quā membranis ferē obnasci cernimus, ac medullae in ossib. asseruatae, & humorū qui in oculis uel negligenter ad apertis spectantur, tanquā partium similariū habita erat ratio, incēpi quoq; recensere, quo nā pacto instrumentariae partes ex similarib. illis cōsurgant: uenae scilicet ac arteriae & nerui, ac postmodum cum suis tendonibus musculi, ac totius deniq; digiti ac manus cum cute efformationē proponens, simulq; ea quae in magnis corporis cauitatibus obuia in cane illo erant, cōmonstrans. Postea quā igitur tyronum gratia haec docuissēm, abiecto cane, integram ossiū cartilaginūq; disciplinā scientiāq; aggrediebar. quā absoluta, humanū cadauer in scholas ferri curauimus, quod musculorū ac ligamētorū speculationi subseruiret. quā sedulō enim, atq; adeo ex nostro arbitratu in Italicis academijs praefectorū diligentia, & erga doctrinarū studia singulari amore, ad publicam anatomen cadauera nunc suppeditentur, nō mediocri usu discimus: etsi fortasse illa nō ita quadrata, & tatisq; mediae, ac nonnunquā optaremus, existāt. Post ossiū itaq; & cartilaginū tractationem, ea serie musculorum, ligamentorumq;, ac omniū deniq; quę secundo libro prosequimur; doctrinā in cadauere illo absolui. Ad uenarū autē & arteriarū neruorumq; anatomen, aliud assumpsimus cadauer, quod etiam illis partibus, quorū hystoria tribus posterioribus libris traditur, ostendendis accommodabatur. In cadaueris istius sectione, eo utebar ordine, quē hoc Capite, & ultimo Capite libri sexti, & penultimo septimi, in uasorū dictarūq; iam partium sectione cōmemoranda, potissimū enitar persequi. Quandoquidem uerō, unum subinde tantū cadauer ad publicā anatomen nasci potest, in his Capitibus unā quoq; ossiū & cartilaginū & musculorum, ac cutis, cuticulę, adipis, & carnosae membranae in abdomine administrationē, ita ut prius monui, mentionē faciam, ut prae-ter exquisitā eorum quorū dissecandi modū hactenus non tradidimus organorum administrationē, series simul pateat, qua in uno cadauere quis uniuersam anatomen utcunq; queat absoluere. Illam itaq; aggressurus, studiorum sodalibus potius quā ministris, qui secantē adiuuēt, adhibitis, ac utiori nouacula orbicularē sectionem secundū umbilicū adeo profundā duces, ut cutē pene tret. dein à media pectoris ossis lōgitudine rectā sectionē ad umbilicū usq; molieris, & ab infima umbilici sede perges ad pubis usq; mediū, uirilis membri (si modō uiri cadauer ad manū sit) radicē cōtingens: aut, si mulieris corpus secas, quousq; pubis ossis sedē ad pudendi colliculos superaueris, ut scilicet à pectore ad pubē usq; una quasi sectio (integro interim umbilico) pertingat. Post hanc, utrinq; ab umbilici latere sectionē tranſuerſim ad lūbos usq; duces: id interim studens, ut solā cutē pertundas, quod in homine, & potissimū obefiore, factu non adeo est arduū, quū adipis crassities, ne carnosam uities membranā, promptē remoretur. Factis hunc in modū sectionibus, cutis angulū, qui ex quatuor

rectus

Pro cadauerū  
opportunitate,  
sectionis ordinē  
esse uariandū.

Cutis, cuticulę,  
adipis, & car-  
nosae membra-  
nae in abdomi-  
ne administra-  
tio.



rectis angulis umbilicū spectantib. superior dexterq; est, hamulo, aut sinistra manus unguibus attollito, acutissimaq; nouacula cutē ab adipe fecernere studeo. Vbi cutis portiunculā liberaueris, hac sinistra manu eleuata, depositaq; hamulo, paulatim cutē ad mamillas usq; uersus dorsum trāsuersis sectionibus proximē ad cutē factis, ab adipe diuides. Hac abdominis thoracisq; parte à cute nudata, reliquæ tres pari modo sunt detegendæ, ac cutis & cuticulæ natura uenit inquirenda, quæ in cute quidē nunc absq; alio negotio sese offert: cuticulæ uerò naturā non cōmodē obseruabis, nisi illā ardentis candelæ, quā cuti adhibeas, ui, uesiculæ modo à cute abscedere cogas. Cum cute deinceps & uenis sub ipsa secundū abdominis regionē, & ab imo sursum & à pectore deorsum excurrentibus adipe quoq; examinata, si hac homo (uti ferē solēt omnes diuturniore morbo nō enecati) abundet, illam quemadmodū iam cutē ab adipe liberaſti, à carnosa mēbrana seiunges. quod sanē nisi acutissima nouacula nunquam aptē confeceris. Si uerò macilentius obtigerit corpus, adipem carnosæ membranæ adhærere fines. adeps enim tūc, quod exiguā obtineat crassitiem, quo minus carnosioris mēbranæ natura in cōspectum ueniat, nihil impedit. Vt cunq; feceris, siue adipē abraſeris, siue adnatā membranæ reliqueris, iſſdem per membranā ductis sectionibus, quas à pectore ad pubis os, & ab umbilico ad ilia in cute faciendas retuli, ipsa membrana retusiori si lubeat nouacula, aut digitorum ferē beneficio à subditis corporib. est separanda, ut iam simul cum magna thoracis parte uniuersum abdomē cute, adipe & carnosa membrana detectum occurrat. Ad hūc sanē modum administrationē in scholis subinde sum aggressus: quanquā si quis uelit, integrū etiam sit in una tantū abdominis parte cutē, adipem, & carnosam membranā examinare, & à reliqua abdominis sede cutem simul cum adipe & mēbrana absque ullo artificio laniorū ritu auellere. Verū de harū partium natura, adeoq; administratione, in secundo libro egi prolixius: in eodēq; libro rationē qua optimē<sup>d</sup> abdominis musculos, qui utrinq; quatuor sunt, aggrediaris, & peritonæū nudes, docui. Ac proinde si feriatim singula in uno corpore ostendere animus est, ex secūdo libro abdominis musculorū administrationē petenda uenit, in qua etiam priuatim<sup>e</sup> uenarum & arteriarū & nervorum series est examinanda. uenarum quidem ac arteriarum, quæ à pubis regione sursum secundū rectorū musculorum posteriorē regionē uersus umbilici sedē contingūt, & earū quæ à pectore huc quoq; pertinent, & in proximas sedes quemadmodū ille furculos utrobique deriuant: neruorum autē ab illis productorū, qui costarū spuriarum interuallis offerūtur, & à lumborū uertebreis ad abdominis musculos (ut suo loco cōprehensum est) uariē dispensantur. Cæterū trāsuersis musculis undecunq; iam à peritonæo liberatis, tota illius exterior propemodū superficies oculis subijcitur. omni enim ex parte euadit cōspicua, præterquam quā<sup>k</sup> septo trāsuersio nascitur, & quā ex uertebreis & ossē sacro originē ducit. Cæterū hominis peritonæū cōsistentia crassitiēq; infirmius existit, quā ut leui negotio id undecunq; à septo dirimi queat: quamuis interim solius manus beneficio peritonæum, dum adhuc integrū est, ad spinā usq; à subditis illi musculis, & nō nihil quoq; à carnosa septi sede liberetur, & sphærā planē oblongā tūc referat. Porro si minori negotio peritonæum penitus à septo auellere lubeat, in porcellis hoc præstiteris cōmodissimē, si postquā (ut in homine) à peritonæo transuersum abdominis musculū seiūxeris, id ab inferna septi sede tuis digitis, cultri uice sensum separare studeas. ita nanq; à neruosa etiā septi trāsuersa parte peritonæū abscedet: & si deinde in opere perrexeris, ab uniuerso uētriculi corpore ad

*Venarum per abdominis regionem interuentem & carnosam membranam excurrentium.*

*Os abdominis musculorū.*

*Venarum, arteriarum, nervorum per abdomen musculi repetitum.*

*Peritonæi à partibus extrinsecus ipsi commissis liberatio.*

*c fig. cap. 6 lib. 3. à radi cū uenarū L & R. de in aliqua ex parte cū P, R.*

*d 3 mus. 14. 4. 4. 14. 1. 5 14. 1. 6 14.*

*14.*

*e ut in 1. fi.*

*f fi. ca. 6 li.*

*3 ab L et r.*

*g fig. ca. 12*

*li. 3 à G &*

*r. aut in 6*

*muscul. tab.*

*4, 6, f.*

*h 2 fi. ca. 11*

*li. 4. 8, 9, cha*

*rac. 50, 51*

*etc.*

*k Quemad-*

*modū i fig.*

*à 7 muscul.*

*tab. 14.*

*17 mus. 14.*

*14, 15.*

*Apertio peritonæi & uisus uisus umbilici administratio.*

omentum usque membranas, ac insuper à iecoris gibbo peritonæum auelles, discesque; quoniam pacto id illis organis tunicas inuolucraque; offerat. Postquam diligenter peritonæum cum suis foraminibus, uenis, arterijs, neruisque; exterius perpende ris, nouacula aut cultello à sinistro mucronate cartilaginis latere deorsum ad sinistram usque; umbilici sedem sectio in peritonæo ducenda est: mente adhibita, ne cultello altius impaeto quicquam subditorum uulneres. Hinc ab umbilico eandem sectionem modicè sinistrorsum inclinante ad pubis usque; regione (ut aliquo interuallo ab illius medio in sinistrum latus deuiet) tentanda est. Insuper in hac sinistra peritonæi sede è directo umbilici transuersam sectionem uersum sinistram ilium molieris, & superiorem eius peritonæi sedis parte ad costas, inferiorem uero uersum coxam reflectes. Leuata aut nunc, sursumque; non nihil reuoluta, seu dextrorsum in uersa peritonæi dextra sede, uenè ex umbilico in iecur pertingenti animum adhibebis, hancque; quæ iecori proxima est, & ubi duntaxat à peritonæo abscedit, sinistra manu apprehendes, & acutiori cultello inter ipsam & peritonæum iniecto, transuersis sectionibus eam ad umbilicum sensim accedens à peritonæo diuides. Quòd quum perueneris, non dissecta uena, ab umbilici dextro latere ad ilia usque; sectionem in peritonæo duces, eam peritonæi partem, quæ nunc libera est, super dextrum lateris costas reflectens. Cæterum iam adhuc una peritonæi pars, quæ in dextro latere inferior est, umbilico connata manet, nondum uel libera pendet. quare ut & hanc liberares, neque aliquid interim uities, umbilico sinistra manu comprehenso, ab ipsius dextro latere, sectio in hanc peritonæi partem ad pubis usque regionem facienda est, quæ digitorum aliquot latitudine à pubis ossium commissura in dextrum declinet. In uersa modò peritonæi particula, quæ triangularis adhuc ab umbilico ad pubem ac uesicæ fundum pertinet, tres quasi funiculi in uicem appositæ, atque illi peritonæi parti interius adnati uisuntur, qui studiose cultello acutiori ab ea sunt diuidendi, ab inuicemque; postea attentè dirimendi, ne in homine uersus pubis ossa nimium liberè sectionem producat, uesicæ fundum uulneres. Homini namque uesica, eo quòd tota anteriori sede peritonæo connascitur, multa que pinguedine obducitur, dissectionum rudibus ita imponit, ut hic uesicam collocari ignorent: uesicam quærentes, quæ ipsis in hominibus perinde atque in bobus & canibus libera occurrat. Quum itaque hæc non oscitanter expenderis, medium funiculum uesicæ fundi medio inna sci, & nusquam à peritonæo abscedere obseruabis: reliquos autem duos secundum uesicæ latera deorsum, penitusque; ad arterias per pubis ossium foramina in crus delapsuras porrigi conspicias, modò eos à peritonæo acutiori cultello ad illorum usque continuationem liberare non pigeat. Medius funiculus, meatu est, quo è uesica, quum utero gerimur, urina inter duas foetum inuoluentes tunicas excernitur. Reliqui autè duo, arteriæ sunt, quibus præcipuè naturalis foetus calor recreatur. Verum neque hæc tria corpora, neque id quòd iecori inferitur, ullam nunc cavitatem habere uidebuntur, sed planè emortua aridaque; & multo adipe enutrita ac ueluti funiculi apparebunt. Vnde etiam alios Anatomes latuerunt proceres, ea omnino penitusque; aboleri in natis hominibus, quemadmodum in canibus ferè accidit, asserentes. Cæterum posteaquam uenæ ab umbilico iecori insertæ implantionem sedulo inspexeris, integrum est, eam cum umbilico, quæ hactenus seruasti, deinde & tres alios funiculos rescare, animaduersosque; peritonæi ad uesicæ fundum conexu sectionem ad omentum conferre. Reliqua enim quæ in peritonæo adhuc uidenda supersunt, nisi paulatim organa hoc obcineta abstuleris, uidere nequis. Porro priusquam aliquid loco dimoueas,

*m Quemadmodum in 17 fig. k ab illi uisum est. n tanquam ex primæ figura paraturus secundum.*

*o 2 fig. G.*

*p 2 fig. A.*

*q ultimam fig. lib. 1. r 2 fig. N. s 2 fig. M. K, L.*

*t fig. 14. 15 h, i, g. f. u. inter 1 et 2.*

*u 2 fig. M. K, L. x 2 fig. G.*

*Umbilici uisus  
rum præfectio.  
Omenti sicut  
obseruatio.*

*y 2, 3 fig. O. & 24 fig. T.*

dimoueat, omenti situs uenit obseruandus, num scilicet ut in canib. & porcis, atq; adhuc multo magis in simijs, ad pubem usq; id sub uesticæ posteriori sede exporrigatur: an uerò (uti non infrequenter obseruatur) uersus sinistrū latus reuolutū, sursumq; etiam supra mediam intestinorū sedem contractū occurrat. Si postremū illud inueneris, utraq; manu humiliori omēti extremū modicē eleuabis, ac sensim æqualiter deorsum detrahens, id omnib. intestinis ad pubis usq; os obtendes. ita enim quantū sit, quodq; interdum<sup>c</sup> ad inguina & scortum, ac<sup>d</sup> inter uesticā & uteri ceruicē deuolui possit, condisces. Vt uerò omēti ad colum intestinū, quā uentriculo id exporrigitur, connexū cernas, duabus rursus manib. humiliorē omenti finē sursum ad pectoris os attolles: & priusquam inferioris omenti membranæ partē, quæ ueluti ex tertia coli intestini tunica enascitur, à colo liberabis, omentū quāu possis maximē pectori obtendes, ac intestinorū situm fumma quā poteris in dextra solis utens manib. inuestigabis: & primū anteaquā alicuius intestini locum perturbes, ipsa ut se eleuato iam omento spectanda<sup>e</sup> offerūt, ad amussim contemplaberis. Simulatq; igitur id accuratē ac non obiter profectō obseruaueris, dextrā manū recto intestino, quā id osis sacri incūbit initio, accommodabis, & sinistra manu tenuia intestina leuiter in dextrū deprimes, non quidē omnia, sed eorū partem quæ dextræ manui quā à recto conscendes, in progressu erit uicinior. Ad hunc itaque modum sinistra dextrē famulātī, à recto intestino sensim dextrā colo ad mouebis, & h<sup>secundū</sup> ipsius ductū reuolutionesq; ad sinistri renis sedem, ac hinc ad lienem & fundum uētriculi pertinges. quōd quum perueneris, mutato manuū ministerio, sinistra colū est apprehendendū, dextra uerò tenuia intestina in sinistram modicē depellenda, quousq; omnē fundi uentriculi sedē, iecurq; superaueris, & colum sub dextri renis regionē (ubi finit) deduxeris. huc quum pertigeris, sinistra manu coli termino modicē subleuato, ac cæci intestini situ, formaq; similiter obseruatis, dextrā quoq; manū huic coli termino accommodabis: & utrisq; manib. sibi proximis, ipsedēq; ab intestinis nunquam remotis, à colo mox ductū ilei intestini, & dein ieiuni sequēris, quod factū longē est facillimū, usq; dum perueneris ad ieiuni principium, quā sub colo retorquetur, ac dorso quodāmodo alligatū, duodeno continuatur. Quapropter ut uniuersus intestinorū ductus tibi occurrat, dextra adhuc ieiunum cōplectēris, sinistram uerò inter iecur & dextrā uentriculi sedē intrudes, duodeni intestini inquirens principiū: quod ubi inueneris, deorsumq; secundū ipsius infesum sinistra descenderis, ieiuni intestini principiū, & quē illi proxima est pars, quamq; dextra adhuc amplectēris, etiam innotescet. Si modō lubet (quod & faciendum maximē consulo) poteris à ieiuno ad ileum, & hinc ad cæcum ac colum, & à colo ad rectum contrario ductu, intestinorum situm secundō examinare, nulla interim (ne quid uulneres) facta auulsione. Perpenso intesti-  
norum situ, ac ijs utcunque in suum locum repositis, omentum rursus intestinis est obuoluendum, uentriculique & iecoris & lienis situs uenit examinandus. Primū itaque inter septum transversum & iecoris gibbum, manū inferes, ut illius gibbum<sup>m</sup> ligamenta que in conspectum ueniant: ac quōdnam pacto ex præcipuo iecoris ligamento tenue ipsius inuolucrum nascatur intuearis, manum transversum hinc inde ducens. Deinceps inter iecoris cauum & dextrum uētriculi latus sinistrā manum, dextrā uerò inter septum & latus uētriculi sinistram impones: paulatimq; inuicem adductis manibus, ad uētriculi<sup>n</sup> superius orificiū accedes. quod in cōspectū ueniet, si modō iecur sinistra sursum nōnihil protruseris, & dextra corpus uētriculi deorsum com-  
presseris,

Intestinorum  
suum examen.Ventriculi, iecoris  
& lienis  
situs examen.

a VI Q. Q.  
in 2 fig.  
b VI inf.  
rior mem-  
brana c, c  
notata in 3  
fig.  
c per p p  
22 figura.  
d Inter T  
et L 24. fi-  
g. referri hūc  
figura.

f ut in 6 fi.

g Ad T  
Y 6 et 8 fi.

b Secundū  
8 fig. T, S,  
R, Q. P ad  
N. ut 6 fi.  
R, Q, P,  
N.

i 6, 7, 8 fi-  
gur. O.

k Ab N per  
M ad L,  
K usq; 7 fi.  
l 7 fig. ab  
l ad K 12  
fig. sub. S.

m 6 fig. C.  
22 fig. O.

n 22 fig. R.



presseris, atq; una eademq; opera iecoris cauum ac uniuersum ipsius sitū obiter examinaueris. Præter hæc, ea quoq; operatio uentriculi sedem etiā accuratè cōmonstrabit, dummodo hinc inde nunc iecur sursum trudens, nunc uentriculum deprimēs, manus ducere non detrectes. Lienis porrò sedē adinuenies, si inter sinistrū uentriculi latus & septū transuersum, sinistram manum immiseris, uentriculumq; cum colo intestino hæc excurrente, in dextrum latus attraxeris. siquidem tunc superiūs lienis latitatio & dimidium ipsius caui sese uisui<sup>o</sup> offerunt: dein si dextram manum inter lienem & septum transuersum mediam inuimiseris, lienēq; modicè eleuatum uersus uentriculū protruseris, ipsius quoq; gibbum apparebit. Quo tamen hæc omnia leuiori negotio conficias, nō erit inutile, interdum aliquod costarum interuallū arcto uulnere ad thoracis usq; cauitatē pertundere. Simulatq; enim thoracem uulneraueris, septum transuersum deorsum cōcidens, insigniter flaccescet: quantumuis etiam uehementer antea tensum, sursumq; attractū, iecur & uentriculum in thoracis amplitudinem sursum duxerit, difficilemq; horum inspectionē ob id parauerit. Cæterum omenti membranæ iam inuicem sunt<sup>a</sup> dirimēdæ. quod fiet, si dextrā manum omento subieceris, hacq; inferioremem membranā, sinistra uerò superiorem apprehendere, trahereq; studueris. hæ enim oculus inuicem dirimuntur, marsupij, seu sacculi speciem cōmonstrantes: quæ uisā, inuicē membranas aded diuelles, ut alicubi lacerentur, cōmodeq; manum in illarū cauitatem inferas, & utrinq; in lateribus, & humiliore omēti sine superiorem membranā ab inferiore discerpas. Nunc inferiorem membranā intestinis exporrectam sinere cōuenit, & superiorē aded pectori supertendere, ut elatius uentriculum è sua sede eleuet. quod si non successerit, sodalis manu id facias oportet, ut commodè inferioris omēti mēbranę exortus, quęq; per ipsum ferūtur organa, in conspectū ueniant: ac discas pariter, quo<sup>a</sup> nam pacto hæc in hominib. colo intestino mesenterij uice sit, tota ea sedē<sup>a</sup> quā colum uētriculi fundo attenditur. In hac enim membrana ubi uentriculo substernitur, minor portæ uenæ truncus ferri, suosq; in quos digeritur ramos educere, apparebit. Deinde præter portæ truncum conspicietur arteria quę lienī, uentriculo, iecori, bilis uesiculę, & ipsi demum omento furculos deriuat. sic quoq; hic occurret arteriæ radix, quæ superiori sedi mesenterij disseminat: & dein nervi duo, quorum dexter iecori, bilis folliculo, & dextrę fundi uentriculi sedi, & hac quoque parte omēto spargitur: sinister uerò lienī & sinistra fundi uētriculi sedi, ipsiq; sinistra omenti parti distribuitur. ante hæc, omnia in humiliori omenti membrana, quā uentriculo subiacet, corpus glandosum cernitur, uasorū & neruorum seriem in illa muniens. Hęc obiter, neq; ullo adhibito cultro, in præsentia sunt intuenta, & solis manibus summisq; digitis superior omēti pars ipsius<sup>a</sup> uenæ circulus diligenter est inquirendus: quē obseruabis, si uētriculo, sodalis opera semper eleuato, ac uelut ad superiora truso, ab ipsius fundo deorsum uersus iecoris cauum, ubi omentū simul multa colligat corpora, & hinc per dorsum quā arteria magna septum permeat, ac insuper secundūm lienis cauū ad uentriculi fundum usq; deuenieris. Hoc enim ductu superior omenti describitur circulus: aut si illud sacco marsupio<sup>a</sup> uel a simulauerimus, eius orificium. Quoniam pacto autem ipsius ortum adinuenias, paulo post dicam. In præsentia enim uentriculo in suum locum reposito, illum in sinistrum latus cum intestinis trahi<sup>a</sup> curabis: iecur uerò, ut ipsius cauum adamussim uideas, in dextrum & uelut sursum protrudes. deinde postquam obiter bilis uesiculam contemplatus fueris, sectionem omnium totius corporis mihi molestissimam

Qui iecur, uentriculus, lien, prima ueluti in thoracis cauitatem tracta, deorsum decubere possint.

Omentum quā diuelles, ipsiusq; oris inuestrigandus, una cum uasis illo fissuralis.

Qui organa in caua iecoris se de posita sunt spectanda.

o ut x tab. fig. 19 spectatur A. p tota 3 ta. fig. 19.

q Corpus ad imaginem 3 fig. paraturus.

r fi. e, e, e. fig. A. A. s A p ad Q 6 fig.

et spectabitur omnia quæ 3 et 4 et 5 figuris, charact. et infig. gnumus.

u 4. fig. e. e, e, o, o, p, f.

x Quodammodo 13 figurā paraturn. aliq. ita hic spectabis, quæ illa figura et 13 charact. et infig. no tui, unde etiā ex illis figuris sequentium notas seriatim petet.

nam maximeq; operosam aggredieris. Bilis namq; mētus, & neruorum & arteriarum uenarumq; rami (qui omnes simul inferiori mēbrana omenti ad cauum iecoris colligantur) nunc ueniunt retusiori cultello examinandi, ne acutioris cultelli mucrone uenam quampiā pertundas, sicq; omnia cruore obliteres. Offertur itaq; primū neruulus ab humiliori uētriculi orificio iecoris cauo insertus, qui à sexti neruorū cerebri paris propaginib. superius uentriculi orificium adeuntib. pēdet. Vbi hunc à uicinis organis diremeris, à mēbrana rum cōnexu diuidendus est alter neruus, qui uno ramo iecoris cauum, altero autem bilis uesiculā accedit. Huic neruo arteria attenditur parem cum illo efficiens distributionē, ac mox post neruū liberanda. Huius uerò, ut & nerui initium, paulo pōst inuenies. nunc enim fat est, hęc inuicē iuxta iecoris cauum separare, inibiq; eorum seriē discere. Sub arteriā, bilis uesiculę meatus cōsistunt, à portę uenaiam liberandi: primū duo illi, qui ex iecoris cauo ex multis surculis colliguntur, & ilico in unum coeunt meatū, qui una parte in bilis uesicula, altera in duodenum intestinū fertur. Vbi hos à portę uena ad intestinum usq; & bilis uesiculā diuulseris, illam pollice adeò comprimes, ut meatus bile turgentes cōmodius appareāt, & num quis meatus ab hac uesicula in uētriculum pertingat, animaduertas: quem si non inueneris, acu meatum in intestina properantem leuiter pertundes, ut profluens bilis argumēto sit, nullum proceffum ab illo meatu tibi incuria præfectum. Postremò uena portę hic est examinanda, ac illico atq; ipsius circūscriptionē quā ex iecore prodit animaduertes, propagines illius obtusiori cultello sunt inquirendę, semper arteriæ & nerui, qui uenę per uniuersam illius seriē attenduntur, diligēti habita ratione. Primū itaq; surculos portę aggredieris, qui bilis uesiculę exporrigunt: deinde eum qui ferē citra arteriæ cōsortium in dextrā uentriculi sedē, iuxta ipsius inferioris orificij posteriorē regionem modica ramorū serie digeritur. Hunc subsequitur, qui dextrā fundi uentriculi partem & medium superioris omenti mēbranę perreptat. Post hunc, qui duodeno nobis uocato intestino deriuatur, quem secundum intestini longitudinē in<sup>m</sup> corpus quoddā glandulosum carneumq; descendere obseruabis, si modò (uti iam monuimus) retusiori cultello uenā, illiq; accumbentē neruum, arteriamq; nudare studueris. Modò magnam portę<sup>n</sup> distributionem deteges, truncum, qui mesenterium adit, obiter tantum expendēs. Atq; hoc in præsentia relicto, ad truncum qui lienipotissimū exporrigitur, te conferes. Vtq; ipsum cōmodè uideas, uentriculus & intestina tibi ueniunt ad eum<sup>o</sup> modū aptanda, quo situabātur dum inferiorem omenti membranā spectaturus, uētriculū sodalis manu sursum attolli, & intestina deorsum premi curares. Patēte itaq; nunc tibi superiore sede humilioris omenti membranę, accurata cura ramos omnes minoris portę trunci examinabis, quos omnes aut uentriculo, aut lienī, aut ipsi omēto, coloq; intestino in homine exporrigi adinuenies. Interea uerò quū ramos hos inquires, ipsosq; à glādofo corpore illos suffulciente liberabis, omnib. ferē arteriam, multis aut neruum atredī obseruabis.<sup>p</sup> Arteriarū radix sese offeret in elatissima inferioris omenti membranę sede, ubi etiā occurret magnę arterię in mesenteriū deducendę origo: deinde utrinq; unus sese offeret neruus, ad magnę hęc descendētis arteriæ latera exiliēs, ac sexti neruorū cerebri paris propaginum, quę costarum radicib. exporrigūtur, soboles. cuius ramuli unā cum arterijs dum uenas detegis, in cōspectum semper ueniunt. Iam & grandioris portę trunci & paulo antē dictę arteriæ & nerui per mesenterium seriē, & quę inibi diuisionib. præfunt glandulas<sup>a</sup> inuestigare tempestiuum est. Primū itaq; solis manibus intestina

I Et hanc quoq; petes ex 12 figu. dēu ex 3 si mal cui 4. aut integrā seriē ex fig. sup. 3. lib. 3.

m 12 fig. 1. 1.

n 4 fig.

o Proffusus ut in 3 figu.

p 4. si. 8. uenim si hic notas requireris, illas omnes ex 3 & 4. si sumas. aut ex 3 & 4. librorum figuris uenas, arterias, neruos exprimētibus. q Partim ut in 10 figu. partim ut in 12 fig.

Portę ramū nā cum arterijs & neruis illis attēdis quā examinandi.

Mesenterij naturā quā indagandā

intestina hinc inde inuicē diduces, & nunc in dextrū, nunc in sinistrum latus reuolues, ut citra sectionem mesenterij naturam perfuntoriē contempleris. Deinde obtusiori cultellulo maiorem uenę portę truncum, & dictā nuper arteriam & neruum inuicē liberabis, & dein ut uniuersum ipforum incessum, & glandulas diuaricationibus interiectas intuearis, unguibus unā mesenterij membranam ab alia diuelles. Quanquam id per uniuersum mesenteriū haud uenit tentandum. suffecerit enim in præsentī à centro ipsius aliquot uasorum furculos ad tenuia usq; intestina deduxisse, ac mox alterā mesenterij arteriam aggredi, à magna arteria ipsi post seminalium arteriarum ortum distributam. Atque hanc promptē reperies, si cum intestinis mesenterium in dextrum latus reuolueris, unguibusq; aut obtusiori cultello mesenterij mēbranas, quā id colo sub sinistri renis sede adnascitur, inuicē dirimere conaberis. Hic enim ilico eius arteriæ rami uenis cōmissi sese offerent, rursus suæ arteriæ radicem commonstrantes. quam ubi inueneris, ipsius diuaricationem prosequere, ut discas, quī ipsa cū uena mesenterio suffulta, recto intestino ramos exporrigat: parum modò sollicitus, etiam si uenæ huius extrema in rectum intestinum inferi nunc non intuearis; id enim paulo post fiet facilius. Eiusmodi itaq; administratione omenti, intestinorum, uētriculi, iecoris, lienis & mesenterij situs, præterea quæ his omnibus exporriguntur uenarum & arteriarum & neruorum furculi sunt examinandi. Porro administrationi, qua commodè quæ adhuc in illis organis uidenda supersunt, cernas, alijsq; monstres, nunc me accingam. Maiusculæ itaq; instar semicirculi obliquatæ acui filum, quo literarum fasciculi colligantur, traiciēs, & hanc per mesenteriū sub recto intestino, ubi sacro osi incumbit duces, & eius intestini fæcibus sursum ad coli amplitudinem compressis, recto intestino uinculum iniiciēs, absceto iam quod superest filo, fæces uinculo proximas ex recto intestino sursum denuò comprimes, & interuallo trium digitorū plus minus interposito, acum rursus sub recto intestino supra prius uinculum traiciēs, secūdò rectum intestinum ita ligaturus, ut inter duos uincula nihil extremēti sit reliquū. Deinceps nouacula rectum intestinum inter duos uincula diuides, & superiorem ipsius partem sensim à mesenterio obtusiore nouacula (ne fortassis negligentior intestina uulneres) rescabīs: & dehinc colum, ileum, ieiunū continuò à mesenterio ad ieiuni usq; principium liberabis, intestinaq; in peluim repones. In hac functione coli intestini supra renum pingues tunicas connexus sedulò est animaduertendus, unā cum uasorum frequenti serie sese in intestina implicante. Vbi uerò ad ieiuni usque principium pertigeris, id perinde atq; rectum, duobus uinculis intercipies, ita ut elatius uinculum insertioni meatus uesiculę bilis proximum sit, non autem elatius conscendat. Intestina à uentre libera, alicui ægrorum in xenodochijs ministro, quales hic sectioni adhibemus, ablunda offers: ut si uisum fuerit, ablutorum iam tunicas & longitudinem examinare queas. Patavij & Bononiæ intestina postquā abluta, scholarumq; scamnis exporrecta essent, aliquando instar uesicæ inflari curauimus: ita enim non solum longitudinem, quæ omnibus uix eadem est (quanquā quatuordecim ulnas ferè equet) uerū formam ac amplitudinem facile didicimus. Intestinorum quoq; tunicas, illis ad hunc modum exporrectis, inquirere est longè facillimum. apparet enim mesenterij pars intestinis proxima, quæ ex duabus constat membranīs, una superiori, altera inferiori: quas si unguib. ab intestinis dirimes, quī tertiam intestinorum efficiant tunica intueberis: ac qua ratione hæc à peritonæo pen deat, ex mesenterij ortu discēs. Hac tunica ab intestinis distraeta, obtusiori nouacula

Quī intestina  
à mesenterio re  
secanda, & à  
corpore auferre  
renda.

Intestinorum  
tunica quæ  
examinanda.

r20 fig. A  
aut fig. 12  
li. 3 & sub  
C. u. enuā.  
r10 fig. circa  
H. & illi  
proximum  
G. ac 12 fig.  
th. aut 11 fig.  
ab R. ad S.  
dein ad T.

t fig. ca. 7 li.  
2 B, N.  
u Ad Y et  
T 6 figur.  
aut H 11 fig.

x Vii fig. ad  
eR 20 fig. ad  
o. aut 20 fig.  
ad K. ubi e  
tiā intes  
tina reliqua  
à mesente  
rio resecui  
mus.  
7 fig. ad L  
fig. 7.  
20 figu  
ra T. V.  
7 fig. Z.  
13. 4. 15 Q.  
R.

4 Vii in 9  
fig.



uacula sectionem secundum intestini longitudinē duces, studiose præcauens, ne id prorsus in ipsius usque cavitatem pertundas. Huius insuper sectionis labra unguibus diuelles, & absq; negotio secundam intestinorum tunicam ab intima liberabis, præcipuè si id iuxta rectum moliaris. in tenuibus enim intestinis, tunica non ita facile in conspectum ueniunt, quas etiam illic, ubi propè uincula intestina transuersim<sup>b</sup> dissecuisti, nonnunquam examinare, nihil prohibet: quum illorum, ac in primis recti intestini, tunica in ea sectione mutuò soleant abscedere. Imò nunc integrum est, quouis tandem pacto, ac ubicunq; uisum erit, intestina diuidere: illisq; in uersis, unicum eius<sup>c</sup> intestini, quod nos cæcum à ueteribus nuncupatum arbitramur, foramen, orificium<sup>e</sup> ue expendere. Porro interdum, priusquam uasa in iecoris concauo occurrentia, & humiliori membrana omenti suffulta, aggredieris, necessum erit intestina è corpore ad eum quem dixi modum à mesenterio derafa, eximere: idq; tunc potissimum, quando publicam obibis sectionem, in qua diutius quam tibi ex usu esset, intestina fortè asseruarentur. Vt cunque uerò feceris, iam uenterculus sectionis serie est adeundus: quem tunc quoq; dum in sectione diutius propter spectantium commoda est morandum, unà cum liene auferre cogor, neruis tamen elatiori ipsius orificio insertis, diligenter prius examinatis. Aliàs enim uenterculum tantisper relinquere consueui, quousque omnia ferè in thorace contenta organa absoluissem, quo uentriculi orificium, ipsiusq; nerui opportuniùs commodiusq; unà cum stomacho tunc expenduntur. Meritò igitur in præsentia, quo<sup>d</sup> nam pacto uenterculum nunc ritè eximas, docebo. quum uerò stomachum in thorace aggrediar, qui<sup>e</sup> nam uenterculum adhuc in corpore asseruatum, debite administres, subijciam. Vnguibus itaq; quantum fieri licet in homine, peritonæum à septo transuerso ad uentriculi usq; superius orificium<sup>f</sup> auellere conaberis, ut tertiæ uentriculi tunica uideas principium. Quod ubi paululum ab illo uentriculi orificio liberaueris, studebis eam tunicam, utcunq; etiam diuulsam, ad uentriculi usq; fundum deducere, ut ab ipsa superiore omenti membranam cõstitui oririq; discas. Deinde acu sub superiori orificio uentriculi traiecto, uinculum sedulò nexum ipsi iniicies, paulo supra uinculum stomachum à uentriculo transuersim liberans. Nunc uentriculo sodalis manu è uentre eleuato, non tamè penitus (ne uenas rûpat) exempto, inferioris omenti membranæ & mesenterij ex peritonæo originem discas, solis unguibus hanc à dorso sensim distrahendo utens, uinculis uerò ple-

*Uenterculus ex  
lien & omen-  
terium ac mesen-  
terium qui si-  
mul eximenda,  
ac quæ in eo  
operare obser-  
uanda.*

raq; intercipientis.<sup>g</sup> Ac primùm simul omnibus quæ in cauo iecoris occurrunt, portæ scilicet uenæ, arteriæ, & bilis meatui: aut si lubet, singulis seorsum funiculos accommodabis: post hæc arteriarum radicibus, quæ mesenterio & inferiori omenti membranæ primùm digeruntur, illa sanè arteria non ommissa, quæ sub feminalibus arterijs orta in mesenterium fertur. Atque his omnibus unum duntaxat uinculum addi sat est: quanquam duo (ut in intestinis facien- dum monuimus) iniicere, nihil prohibeat. Inductis in hunc modum uinculis, uena portæ, & reliqua quæ intersepta sunt, ita ut uincula in corpore maneant, diuiduntur: & oculus solarum manuum munere uenterculus cum mesenterio, liene & omento, ex uentre exempta, mensè imponentur. ac statim<sup>h</sup> omenti pars lieni obnata, unguibus ab illo discerpetur: ut expendas, qui lienis tunica ab omento initiu ducat. Quod uerò attētissimè, summaq; diligētia modò, uti & prius, quum lienis uentriculiq; situm obseruares, inspiciendū sit, num meatus aliquis à liene in elatius uentriculi orificium peringat, quæq; uasorum hinc

*Lienis tunica  
qui obseruan-  
da, simul cum  
ipsius ad uen-  
triculum nexum  
& substantia.*

o o habebatur

*b 7 fig. sub  
Z. & 8 fi.  
ad M. et 20  
fig. o. &  
24. K.  
e 6, 7, 8  
fig. O.*

*d 14. 15  
fig. T, V.*

*e ut & di-  
uisum est  
ab 1. fig. 17.  
f 2 fig. Q.*

*g Quod ad-  
moda ita fi-  
gurat, ut  
20 figuram  
parui-  
mus, aut  
magis ad-  
huc ut 22,  
aut 25.*

*h quasi B.  
B & C di-  
scerpentes  
ab 8 in 1. ta-  
bula 19 fig.*

habeatur<sup>1</sup> series, etiam si taceam, neminem ambigere reor. Ceterum ut lienis i circa q  
 substantiam obserues, aliquot<sup>2</sup> sectiones ipsi induces: & illo inter duos asseres<sup>14, 15 fig.</sup>  
 compresso, ipsius substantiam ab illi insertis uasis, quibusdam sedibus separa-<sup>h ut in 4</sup>  
 bis, hac ratione uasa aliquot sola & lienis carne denudata spectaturus. Venti-<sup>tab. 19 fig.</sup>  
 culum uero lauandum, & dein uesicæ instar inflandum dabis, ut ipsius capaci-  
 tatem, quæ sanè est quàm maxima, intuearis: & tunicas ipsius, ut in intestinis  
 faciendum præcepimus, examines. illumq; postmodum<sup>l ut in 17</sup> inuertas, ac bilis mea-<sup>figura.</sup>  
 tus<sup>m ut in 16</sup> insertionem in intestinum, quod adhuc uentriculo appendet, uideas. Por-<sup>figura.</sup>  
 rò ubi hæc omnia exemeris, si quis sanguis alibi effluxerit, & quæ in uentre ad-<sup>15 fig. R.</sup>  
 huc reliqua sunt, oblitterauerit, spongia copiosiori aqua potius quàm aceto im-  
 buta, semel atq; iterum eluendus est. nam si lino absterferis, plus tingendo obe-  
 ris. Solent enim plerumq; exigui uasorum ductus, multa adipe & membranulis  
 obstri, difficulter admodum in homine reperiri, idq; magis, si sanguine obli-  
 terentur. Eluto itaq; sanguine, ac obiter ijs quæ adhuc in uentre reliqua sunt,  
 absq; sectione inspectis, iecur nõ aggredieris: uerum illud, uenæ cauæ exortus  
 obseruandi gratia, tantisper integrum asseruabis, dum cordis sectionem unà  
 es pertractaturus. Modò autem circa uertebrarum in lumbis regionem, mem-  
 branulas primùm, quæ uelut secundam uenæ cauæ hæc expositæ tunicam  
 constituunt, ad sacrum usque os auellere conaberis: diligenter præcauens, ne  
 ° dextram seminales arteriam, quæ cauæ corpus transcendit, simul cum mem-<sup>o 20 fig. h</sup>  
 branis adimas. Est enim hæc tenuis, & membranæ modo albicās, multaq; pin-<sup>super Q.</sup>  
 guedine in homine obducta. Quapropter comodè admodum feceris, si prius<sup>25 fig. g. iu</sup>  
 quam aliquid eorum quæ in uentre adhuc reliqua sunt, aggrediaris, ° arterias<sup>p 20 fig. h. d.</sup>  
 feminales inquiras: ac deinde, ne lædantur, in reliquarum partium administra-<sup>25 fig. g. h.</sup>  
 tione caueas. Ut uerò id præstes accuratius, animum adhibebis ° dextræ semi-<sup>q 20 fig. f.</sup>  
 nali uenæ, quæ ex caua oritur: deinde & ° arteriæ exortui, quæ inferiorem femi-<sup>25 fig. d.</sup>  
 nenterij sedem adit. Inter hæc duo organa partim ascendēs, partim descendēs,<sup>r 20 fig. h.</sup>  
 nitèris obtuso cultello cauam uenæ ex sinistro ipsius latere ab arteria magna  
 dirimere, membranosis fibris, quorum interuentu hæc uasa committuntur,  
 dissectis. In hoc itaq; opere duarum seminalium arteriarum radices in conspe-  
 ctum uenient, quæ quò arteriæ porrigantur, cõmonstrabunt, si modò ab ex-  
 ortu eas ex membranulis, quibus inuoluuntur, ad feminales usq; uenas sedulo,  
 nullaq; in trahendo facta ui liberaueris. Hæc ubi præstiteris, uenæq; caua, & ma-  
 gna arteria, ut cõmodiùs in conspectum ueniāt, membranulis, quibus pafsim  
 integuntur, fuerint detectæ, ramos quos in ipso per uentrem ductu emittunt,  
 examina-<sup>8 20 figura</sup>  
 bis, ° eos primùm expendens, qui pinguibus renum tunicis membra-<sup>20. X.</sup>  
 nis uel offeruntur: ac dein cauæ uenæ propaginum, sanguinem serosum reni-<sup>t 20 fig. 4.</sup>  
 bus deferentium<sup>1</sup> initia. quæ ubi inueneris, uenæ cauæ propaginè dextro reni<sup>p. 22, 23 fig.</sup>  
 propriam suis membranulis deteges: & deinde eius renis pinguem membra-<sup>m. n. 25 fig.</sup>  
 nam unguibus lacerans, quo pacto ren illi<sup>u</sup> inuoluatur, diligenter examina-<sup>u. Confer</sup>  
 bis. Denudato rene, ° urinarius meatus, quæ ex rene prodit, cultello est inquiren-<sup>renes 20 fi-</sup>  
 dus: deinde & arteriæ magnæ propagò, dextrum renem accedēs: quò simul<sup>gura curre</sup>  
 inter ren, & uenæ, & arteria, & urinarij meatus principiū conspiciantur. Li-<sup>nibus 22 fi-</sup>  
 cebit autem modò totam renis naturā examinare, aut quousq; alia quædam<sup>x 20 fig. 6.</sup>  
 disseueris, renem relinquere. ° Vtcunq; uerò id nunc, aut postea feceris, uenæ<sup>d. 22, 23 fi-</sup>  
 cauæ, arteriæq; magnæ propagines uinculis iuxta dextri renis cauum interci-<sup>q. q. 25 fig.</sup>  
 pi debent: & deinde nouacula acutiore sectio recta secundum renis longitu-  
 dinem in ipsius gibbo uersus cauum est ducenda: renq; ita bipartitus, uenit ape-  
 riendus: °

Ventriculi ca-  
pacitatis & tu-  
nicarum exa-  
men.

Seminales ar-  
teriae quæ in or-  
su obseruanda.

Cauæ uenæ &  
arteriæ magnæ  
series, in perito-  
neas amplitudi-  
ne facta, quæ  
obseruanda.

Renum tunica-  
rum, totiusq;  
adeo eorundem  
fabricæ examē.

hic se-  
ctionis se-  
rie diligen-  
ter obser-  
uabis, tabel-  
las figura

riendus: sanguisq; , si quis occurrat, spongia madente eluendus. Ita enim ilico renis sinuum natura, deinde & urinarij meatus in rene principiū sese offerēt, nisi cadauer nactus fueris obesus. Solet enim pinguedo in secundo humani renis sinu collecta, impedimento esse, cur minus sinuum natura integrè secanti spectetur. Quapropter operæ precium fuerit, canis aut capræ renem diligenter prius examinare, & ex illo dein humanum cognoscere. Diuiso igitur secundum gibbum seu exterius latus rene, primū sinus secūdi, in quem urina colatur, latera digito inquires: & foramini quod in medio ipsius, seu in primi sinus, membranei ue renum corporis externo latere apparet, stylum immittes, qui in urinarium meatum uersus uescicam faciliè protrudetur. Deinde ubi membranei huius corporis, primi ue renis sinus anteriorum ramorum cum posterioribus ramis coitum, qui non procul ab externo renis perficitur latere, obseruaueris, ut illorum ramorum ductus, & primi sinus reliquum corpus, & secundi sinus formam naturamq; adinuenias, dicta sectio-  
ne diuisum & ad apertum renem uicissim claudes & recludes, quo mutuus nuper dictorum ramorum coitus manifestius appareat. dein stylum secundo sinui indes: & ubi ipsius formam expenderis, ab anterioribus primi sinus ramis eam renis abscondes substantiam, quæ posteriori illarum sedi obnascitur: à posterioribus autem ramis eam adimes, quæ illarum anteriori sedi continuatur, ut modò primus sinus integer appareat, cui nunc stylos, quo illum adhuc exactius cognoscas, indere possis: & admirari, quàm ridicula ab Anatomies professoribus de renum officio fuerint hactenus prodita. Caterū tunica præter pinguem membranam, renem inuestiens, faciliè tibi occurret, si sectionis in renis gibbo ductæ labris animum adhibueris. Solet enim ea tunica ibidem tunc nonnihil à renis substantia abscedere, & dein promptè ad renis usque cauum unguibus diuelli, ac qualiter hæc è renis uenæ & arteriæ ascititijs membranis pronascatur, conspici. Hæc ubi in dextro rene intuitus fueris, sinistrum quoque sua pingui membrana liberabis, & uenæ cauæ & arteriæ magnæ ramum uersus ipsius cauum excurrentem inuestigabis: animum, priusquam aliquid diuellas, sinistræ feminali uenæ adhibens, quam ex medio uenæ cauæ rami sinistrum renem adeuntis ductu enasci, citra sectionem conspicias. Vt uerò ritè intuearis, num à renis sinistri quoque arteria, feminale uas originem ducat, obtuso admodum cultello (nisi fortè secandi peritior fueris) membranulas à renis uena detrahes, & accuratè aliquousque uenæ feminalis principium quoque à membranulis liberabis: dein renis uenam ab arteria nonnihil deorsum reflectes: numq; ex toto arteriæ ductu ramus, qui cum sinistra feminali uena exporrigatur, principium obtineat, inquires. Vbi uerò hunc non inueneris, sinistro rene pari ratione cum dextro (si modò illum secuisse non suffecerit) aggresso, reliquæ feminalium uasorum constructioni attendito. <sup>b</sup> Arteriarum itaque, & sinistræ uenæ originem iam prius indagasti, ac <sup>c</sup> dextræ etiam uenæ principium citra sectionem à caua oriri conspicias. Vbi igitur uasorum ortum didiceris, & uenas ad arterias usque sensim, ex membranis ipsas liberans, deduxeris, si masculi obtigerit corpus, penis cutem & scortum à testibus adimes. Primū itaque à pubis ossæ rectam sectionem per penem in cute duces: & deinde eius sectionis labris hamulo aut unguibus eleuatis, cutem cum carnosa membrana à pene auferes, adamussim considerans in cutis extremo, ipsius cum carnosa membrana coalitum, & carnosæ membranæ sub glande à penis corporibus abscessum. ad

*Vasorum femi-  
nalia sinistram  
refle pectentium  
ortus examina.*

<sup>x</sup> 20, 25  
fig. c.

<sup>ass, 25 fi.</sup>  
uena nota-  
tur m. cui  
attenditur  
arteria.

<sup>b</sup> 20 fig.  
h, i.  
<sup>c</sup> 20 fig. c.  
<sup>d</sup> 20 fig. f.

<sup>e</sup> ut factū  
est in 20 fi.

*Testium expe-  
nis à suis inue-  
lucis dete-  
ctis.*



hæc, perpendes ipsius ad glandis radicem ligamentum: deinde & uenas, cutem eam adeuntes: postremò, nullam pinguedinem adipem'ue inter cutem & carnosam membranam, ut neque in palpebris, hic reperiri. Pene detecto, & diductis cruribus, à pubis osse inter inguina & sinistrum testem sectio ad podicem usque ducenda est: & deinde cum penis cute scortum à testibus & interfeminio liberandum, sectionibus semper uersus dextrum latus deductis. Quum uerò testes cute carnosaq; membrana nudas, ne illos suo loco moueas, inuertas'ue, accuratè obseruandum est. Quum primùm enim cute nudati sunt, ipso situm, & quàm potissimùm parte uasa seminalia illis apponentur, indagare oportet: ut Naturæ discas prouidentiam, quæ testes ita collocauit, ut ipsius uasa sint tutissima, illisque ipsi testes uelut propugnacula præponantur. Iam dextrum testem cum ipsius uasis & tunicis à sinistro dirigitis aut cultello dirimes: & iunctis, quæ iam diducta sunt, cadaueris cruribus, dextrum testem femori impones: ac mox cultello<sup>o</sup> uenam & arteriam seminales dextri lateris, uicinis membranulis ad peritonæi usque sedem, quæ illæ<sup>a</sup> prociidunt, deteges: hic primùm in interiõri sede peritonæi, postmodum in exteriori, qualiter transeat, solis manibus considerans. Dein stylum foramini, quæ egrediuntur, uia ad testis usque infimam sedem protrudes, & peritonæum usque ad foramen illud diuides. Insuper secundùm styli longitudinem cultello foramini quoque indito, ad humillimam usque testis sedem, exteriorem ipsius peculiarem tunicam secabis: hacq; distenta, explicata'ue, illius à peritonæo<sup>o</sup> ortum, & ualidum ad humillimam testis partem<sup>a</sup> adnexum, & præterea testis<sup>i</sup> muscolum examinabis. Eius namq; musculi natura, ductus & forma in conspectum iam pulchrè ueniunt, unà cum gracilibus ramulis, à seminali uena & arteria in exteriorem hanc testis tunicam numerosa serie<sup>a</sup> excurrentibus. Nunc itaque testem & uasa rursus hinc inde diligentius subleuans, reuoluensq; uenam & arteriam ab ipsis contermino semen deferente uasè ad testis usque elatiora<sup>a</sup> discernes. Ut uerò uenæ arteriæque infertionem adamussim examines, uas semen deferens ab intimo testis in uolucro seu tunica est<sup>o</sup> liberandum: non quidem uniuersum, sed ad eam duntaxat usque partem, quæ uenæ arteriæque finibus est proxima. Liberabitur autem uas ipsum facillè, si transuersas sectiones inter testem & uas illud ad suum usque principium acutiori nouacula duxeris. qua administratione, uasis etiam illius anfractus, & ad testis tunicam connexum, ipsiusque ueluti poros manifestè animaduertes: & uenæ ac arteriæ furculos, intimæ testis tunicæ oblatos, melius conspicias. Ut uerò prorsus in conspectum ueniant, sanguinem ex uaricosis uenæ arteriæque anfractibus ad testem comprimis: & insuper anfractibus uinculo, ne sanguis refluat, interceptis, testem secundùm ipsius longitudinem diuides: & dein, qui à furculis per intimam testis tunicam excurrentibus, & ex uaricosorum anfractuuum basi complures rami ad testis substantiam pertingant, qualiterque testis ea tunica committatur, quæque demum ipsius & testis sit substantia, obseruabis. Atque hæc primùm in uno quidem teste, dein in altero sunt examinanda. Vix enim prima fronte omnibus erunt obuia, quæ hæcenus tam oscitanter ab alijs sunt pertractata. Atq; hinc etiam pari perpetuò administratione non est utendum: sed quum commemoratam in dextro teste tentaueris, integrum tibi erit, sinistrum tuo arbitratu agredi. Expensis igitur ad hunc modum testibus, ipso quoque nihil reiecto, penis musculi, & ipsius corpora, deinde uestica, & urinarij meatus, & reliquus semen

Testium situs  
examen.

Exterioris testis  
tunica aperta,  
uasarumq;  
seminalium  
detectio.

Vasarum seminalium  
circumtestem,  
ac ipsius  
ad testem exa-  
men.

fiducias  
id, in quo  
20 fig. hic à  
22 uariare  
cernis.  
g 22 fig. 2  
b 20 fig. e  
27 i in u.  
aut per 2,  
p 22 fig.

i 22 fig. p.  
h 22 fig. lux  
ta i nelli-  
tur 2.  
l 22 fig. v.

m uti ui-  
dere est in  
u 20 fig.  
n 22 fig. di-  
scernes d  
ab e usq;  
ad n.  
o Hic se-  
ctionem a-  
ptabis, uti  
23 figura  
uidere est.  
primùm ad  
A & B, de-  
in H, I, & C.

semen deferentium uasorum ductus, insertioque cum glanduloso asistentē, & omnium uenis, arterijs & neruis, secunda ueniunt. Diductis itaque rursus cadaueris cruribus, primum<sup>p</sup> duos musculos ab orbiculari recti intestini musculo in penis radicem, & potissimum in meatum urinæ feminiq; communem pertinentes, aggredieris. dein<sup>q</sup> alios duos, qui ab humiliore pubis ossium sede originem ducentes, penis corporibus inferuntur, adimes: ac ilico penis corporum<sup>2</sup> originem examinabis, acuto cultello dextrum corpus ab osse, unde pronascitur, quam poteris proximè diuidens. Deinceps uerò in penem excurrentibus uenis, arterijs & neruis perfunctoriè hic perpensis, ossa pubis inuicem sunt<sup>3</sup> seiungenda. quod fiet ocyus, si uesicæ corpus à peritonæi parte, pubis os succingente, cultello diremeris, & deinde cultro quam minimè crasso pubis ossium<sup>4</sup> cartilaginem recta sectione penitus diuiseris. Nouacula enim, quum iusto crassior sit, illi officio non æquè est accommoda. Mox uno cadaueris crure in mensa relicto, & alio ab illa propendente, ita cadauer in mensa reclinabis, ut ipsius os sacrum mensæ lateri incumbat: & ui diductis cruribus, ad trium quatuorue digitorum latitudinem pubis ossa inuicem seiungas. parum enim aptè feceris, si pubis ossium portionem exemeris: quòd id & fiat molestè, & præter alia multos uitiet musculos, neque ullus postmodum ossium usus ad sceleti præparationem futurus sit. Quapropter pubis ossium cartilagine dissecta, & dein ipsis ossibus ui diremptis, primum à renibus<sup>5</sup> urinarij meatus à suis membranis, quibus obuoluuntur, sunt liberandi, & ad uesicæ usque corpus perducendi: dein<sup>6</sup> uasa semen deferentia, quà ad pubis ossa deorsum in peritonæi amplitudinem reflectuntur, pari modo ad glandosum asistentem usque, ex pinguioribus, quibus integuntur, membranis sunt denudanda. in quo opere, sodalis manu uesicam modò in dextrum, modò in sinistrum comprimere est necessum: idque maxime, quum uenæ cauæ & magnæ arteriæ seriem hac in sede inquires. Eanamque iam uenit expendenda: ac primum rami, quos uena & arteria lumborum muscularis, & spinæ, abdominisq; musculis, & peritonæo exporrigunt: qui omnes sunt reperti faciles, si uenam & arteriam nunc in hoc, nunc in illud latus ualidiùs reflectas, & neruus qui sub illis feruntur, obtuso cultello quoque inquiras, ac demum ad ipsorum quibus inferuntur organa deducas: illos dico, qui testibus & uesicæ fundo potissimum exporriguntur. Porro rami, uenæ ac arteriæ, post ipsarum super os sacrum bipartitionem excurrentes, in conspectum uenient, si radicibus semper animum adhibueris, & cultello retusiore, ne scilicet ramorum aliquem uities, ipsorum sequaris processum ductumque: & id eo leuiori præstiteris negotio, quo nostras uasorum delineationes diligentius operi accommodaueris. Verum ubi hæc accuratè eris intuitus, sinistram penis corpus à pubis osse etiam dirimito: & quam poteris commodissimè uesicam, ipsiusque ceruicem, à recti intestini termino, cui fortium fibrarum interuentu hæret, diuidito, abscisus interim uenis & arterijs in uesicam penemque excurrentibus: quas si prius uinculis fortè interciperes, parum profectò sectioni obesses. Vesicam modò simul cum pene exemptam, alteri cruri ad asserculo impones: & denuò feminalis uenæ ac arteriæ ductum uersus testem, & à teste dein semen deferentis uasis ad glandulosum asistentē, progressum obseruabis, quo denuò exactiùs feminalium uasorum harmoniam simul scruteris. Post hæc<sup>7</sup> musculus uesicæ meatui præfectū examinabis: & oblongiori stylo penis glandi ad uesicæ usq; fundum

Penis musculorum examen.

Penis corporis oris, & uenarum, arteriarum, & neruorum huc pertinentium examen. Pubis ossa qui dirimenda.

Præparationum meatui ad uesicam, & uasorum semen deferentium ad glandosum uesicæ corpus usq; examen.

Caua & arteria magnæ distributionem sub osse sacro.

Musculi ceruicis uesicæ, ipsius uesicæ fundi & ceruicis examen.

imposito, uesicæ meatum à glande ad ipsius usque fundum cultello secundum stylum porrecto<sup>b</sup> diuides, ut simul uesicæ cavitatem, & ipsius tunicam, <sup>b uti fass</sup> & urinam deferentium meatum in sectionem, & meatum semini urinæq; <sup>est in dex-</sup> communem intuearis. Alicubi igitur urinarium meatum ex renibus in ue- <sup>tra figura</sup> sicam pertinentem forato, stylumque ad uesicæ fundum usque ipsi indito, <sup>23 fig.</sup> ut<sup>c</sup> membranas, meatus illius ori in uesicæ fundo connatas, spectes. quam etiam integrum sit, ex uesicæ fundo stylum ipsis meatibus indere. Corpus uerò glandosum, quod semen deferentium uasorum fuscipit implantationem, ut lubet, poteris discindere, & quo<sup>d</sup> nam pacto ea uesicæ meatui imittantur, perquirere. Postremò uesicæ ceruicem, meatum<sup>d</sup> ue urinæ semini- <sup>c uti fass</sup> que communem, à duobus penis corporibus ad glandem usque cultello se- <sup>est in dex-</sup> cernes: ac deinde duo corpora, quoad poteris, inuicem dirimes: quamq; ha- <sup>tra figura</sup> beant formam, quæque natura ad glandem usque sint prædita, conspicias. Ut <sup>23 fig.</sup> uerò ad amussim ipsorum excutias substantiam, peni nunc transuersas, nunc <sup>c uti fass</sup> longas, rectas<sup>e</sup> ue sectiones induces. Reiecta modo cum suis appendicibus ue- <sup>est in dex-</sup> sica, <sup>tra figura</sup> tres recti intestini musculos, & uenas exquires, quæ partim à portæ ue- <sup>23 fig.</sup> na huc deducuntur, & partim cauæ hac in sede sunt soboles. Vbi id quoque <sup>c uti fass</sup> præstiteris, recti intestini finem è corpore exsectum abijcies. Deinde<sup>f</sup> cauam <sup>est in dex-</sup> uenam, quæ primùm sub iecore conspicitur, &<sup>g</sup> magnam arteriam, quæ se- <sup>tra figura</sup> ptum transit, deinde ipsarum præcipuos ramos crus adeuntes, uinculo inter- <sup>23 fig.</sup> cipies: ut simul cum renibus, si adhuc eos in corpore reliqueris, uenas omnes, <sup>c uti fass</sup> arteriasque, ex uentre auferre liceat. ita enim peritonæi discus ortum, & hu- <sup>est in dex-</sup> ius sedis musculos, & nervos quoque crus petentes (si fortassis illos postmo- <sup>tra figura</sup> dum aggredi statueris) incorruptiores longè habebis. Iecur autem, ut & an- <sup>23 fig.</sup> tea dixi, tantisper illæsum seruandum est, quousque cor, respirationisque or- <sup>c uti fass</sup> gana administraueris. Interea uerò quum cauæ uenæ & arteriæ magnæ por- <sup>est in dex-</sup> tionem in peritonæi amplitudine consistentem aufers, & nihil sanguinis flu- <sup>tra figura</sup> xu obliterandum amplius metuis, licebit uasa secundum ipsorum ductum <sup>23 fig.</sup> longa sectione aperire, ut proprij illorum corporis crassities (potissimùm ue- <sup>c uti fass</sup> rò, ubi ramos ad renes & crura educunt) sese offerat: & expendas pariter, <sup>est in dex-</sup> num ea ad sanguinis refluxum impediendum potius, quàm ad uasorum ro- <sup>tra figura</sup> bur, uti ego sentio, conferant. Atque hæc quidem organorum nutritionis <sup>23 fig.</sup> generationisque in uiro est administrandi ratio: in muliere uerò erit huius- <sup>c uti fass</sup> modi. Primùm mamillarum uisuro naturam, in cute ab ipso iugulo deor- <sup>est in dex-</sup> sum ad umbilicum usque ducenda est sectio: deinde à iugulo secundum <sup>tra figura</sup> clauiculam alia ad summum usque humerum: cutisque à mamillis, non a- <sup>23 fig.</sup> liter ac si in alia corporis sede, ea ab adipe diuideretur, uenit liberanda. Ma- <sup>c uti fass</sup> millis cute detectis, & uenarum<sup>h</sup> ramis, qui à uenis brachium petentibus, il- <sup>est in dex-</sup> lis porriguntur, perpenſis, dextram mamillam à<sup>i</sup> musculo brachium pecto- <sup>tra figura</sup> ri ad ducente auferro, uenarum arteriarumque (si modò aliqua occurrant) <sup>23 fig.</sup> examinans propagines, ab illis quæ musculis thoraci incumbentibus deriuan- <sup>c uti fass</sup> tur, in mamillam assurgentes. Vbi mamillarum corpus à thorace fuerit libe- <sup>est in dex-</sup> rum, & adeps undiquaque studiosissimè ademptus, uarijs per mamillarum <sup>tra figura</sup> corpus ductis sectionibus, ipsarum substantiam condiscere licebit. Quan- <sup>23 fig.</sup> quam hæc quoque in uiro inquiri poterunt. is namque, si colore fusco, & ha- <sup>c uti fass</sup> bitu sit obfioſiore, hîc magna ex parte eandem cum muliere ostendet fabri- <sup>est in dex-</sup> cam. Dein<sup>j</sup> uenæ & arteriæ sub rectis latitantes musculis, pari modo in mu- <sup>tra figura</sup> liere, ac iam prius in uiro factum est, expenduntur: reliquaque administratio, <sup>23 fig.</sup> ad ua-

Penis corporis.

Recti intestini  
muscularum.Peritonæi ar-  
tus examen.Cuiusmodi di-  
ctari peritum  
administratio  
fit in muliere.Mamillarum  
examen.d e f g h  
i. d. d. d.  
e f. cap. 5  
lib. 3 e. f.  
g. 20 f. 2  
h. 22 f. g. h.  
i. 7 musc.  
tab. q.k. uti fass  
est in dex-l. 25 f. A.  
A. D.  
m. 2 musc.  
tab. A.n. 6 musc.  
tab. A. e. f.



ad uasorum usque feminalium<sup>o</sup> ortum, mulieri perinde ac uiro communis erit. Simulatq; igitur mulieris feminalium uasorum originem didiceris, solis manibus adinueniendus est<sup>o</sup> uterus &<sup>a</sup> uesica, insuper testes, & muscoli, & uenæ quoque cum arterijs uteri fundo & ceruici exporrectæ: priusquam scilicet horum aliquid diffices, suis<sup>ue</sup> quibus committuntur membranis detegas. quippe prius diductis cruribus, à pubis offe utrinque secundum pudendi colliculos sectione in cute ad podicem usque ducenda est, ut deinceps inguina aliquousque opportunè cute denudentur: & quæ sectionibus intercipitur cutis, uersus pudendum à pubis ofsibus etiam separatur, uuluaque adhuc appensa maneat. Pubis uerò ofsium cartilaginem, ut in uiris faciendum præcepi<sup>o</sup>, diuides: ac illis inuicem quàm poteris maximè ui diremptis, mox cultello<sup>o</sup> uenam ac arteriam feminales dextri lateris ad testem usque ex pingui, cui obducuntur, membrana nudabis, obseruans, ne<sup>o</sup> ramos ab illis, priusquam anfractus suos constituent, ad elatiorem fundi uteri sedem exporrectos uulneres. Postquam uerò<sup>o</sup> anfractus ad testem deduxeris, perinde ac in uiris, ipsorum insertionem, &<sup>x</sup> deferentis semen uasis processum, ipsiusque in uterum insertionem, & testis substantiam formamque examinato, uas illud ex pingui, cui inhæret<sup>o</sup>, membrana liberans, quæ uespertilionum alis imagine multum accedit. Quando hæc in altero quoque latere obseruaueris, animum adhibebis<sup>o</sup> uenis ac arterijs, inferiorem uteri fundi sedem, & ceruicem, uesicamque adeuntibus, quæ in grauidis animalibus accuratissimè, ut &<sup>o</sup> illæ quæ à feminarijs uasis in uterum porriguntur, utque etiam omnia uteri reliqua, in conspectum ueniunt, quandoquidem his supra modum uenæ arteriæque turgæant. <sup>b</sup> Vrinarij meatus, à renibus in uesicam pertinentes, similiter ac in uiris, ad uesicam usque à suis membranulis sunt emundandi, & deinceps uterus cum uesica ex corpore uenit eximendus, diffectis in ipsum & uesicam procedentibus uenarum, arteriarum & neruorum ramis, & membranulis uterum uasque illa continentibus, & fibris etiam, ipsoque adeò peritonæo, quorum interuentu uteri collum intestino recto ualide continuatur, unà amputatis. Exemplum uteri formam contemplaturus, ipsius ceruicem<sup>o</sup> inuolues: quo unà uesicæ ceruicis in illum pertinentis foramen, & uteri fundi orificium uideas: & modò opportunè uesicam, & ipsius ceruicem, musculumque uesicæ ceruici præfectum, longa sectione diuidas, uesicæ cavitatem, & urinariorum meatuum insertionem, uesicæque ceruicis cum uteri ceruice coalitum inspecturus. Quo operè si puellam, aut alioquin opinione tibi uirginem fecas, hymenis haudquaquam crissimmemor. Insuper uteri quoque ceruici eodem modo ad illius usque os longam sectionem inferes, ac acutiori nouacula uniuersum uterum secundum latera ab ipsius orificio ad cornua usque<sup>o</sup> diuides: ita enim illius sinum, substantiam, formamque exactissimè contemplaberis. Porro si interdum tibi grauidæ mulieris cadauer nacto, uterum duntaxat cum foetu, ipsiusque inuolucris intucui animus fuerit, ilico à nucronata pectoris ofsis cartilagine, ad pubis usque os, acutiori nouacula sectionem molieris, quæ peritonæum quoque penetret: deinde aliam utrinque ab umbilico ad ilia duces. Hac namque ratione ilico se uterus offerret: & si in alterum latus illum detruiseris, uenæ & arteriæ ipsi insertæ, supra modum apparebunt turgidæ: adeò, ut ipsarum neque series, neque ortus latère possint. His itaque uenis & arterijs diligenter obseruatis, ac uenis per humiliora abdominis conscendentibus (ut scilicet,

*Vteri ac uesicæ  
sini qui obijci-  
nandus.*

*Seminalis uas-  
orum examē.*

*Penarum ute-  
ri fundi humi-  
liorem sedē &  
ceruicem peten-  
tium.*

*Vrinariorum  
meatum.*

*Fœtus, ipsiusque  
inuolucrorum  
examen.*

num unâ quoque turgeant, exquiras) neutiquam neglectis, leuem sectionem nouacula secundum uteri longitudinem<sup>1</sup> tentabis, cauens, ne aliâ quam uteri est crassities, illam dimittas. Post hanc alias duas, utrinque nimirum unam molieris, cum longa illa rectos angulos constituturas. Sectionum labra unguibus apprehensa, inuicem modicè dirimes: & cui nam potissimum uteri parti fœtus hæreat, expendes: ut scilicet à crassa ea, quam lienis fabricæ comparauimus, substantia, uteri tunicam dilaceres, oris nimirum uenarum arteriarumque disruptis, quæ ex utero in eam substantiam pertinent. Quum primum itaque substantiæ huius amplitudinem connexumque ad uterum in ipsa diuisione didiceris, eam cum fœtu suisque inuolucris utero eximes, simul omnia pelui imponens: ut affusa dein aqua, subuiridis & ater sanguis & liquor diffuere abluîq; possit: qui plurimus ex ea substantia, disruptis iam laceratisque uasis emanat: potissimum quando illam comprimes, ac ueluti rursus à fœtus exteriori inuolucro abrumpere studebis. Non leuiter enim substantia ea uenit exquirenda, uasorumque per illam series animaduertenda. quod quum feceris, ac cultellis ab exteriori fœtus inuolucro eam substantiam utcunque abraferis, fœtum cum suis inuolucris mensæ imposito: & quæ exterioris huius inuolucris sit forma substantiæque, expendito, urina, quæ illi innatat, per foramen aliquod, aut sectionem, qua inuolucrum pertundes, emissâ, & dein ipso inuolucro diuulso & inuerso: ut interior ipsius superficies in conspectum ueniat, ipsiusque cum interiori & molliori fœtus inuolucro nexus pateat, qui per umbilici uasa tanquam ex puncto duntaxat perficitur. Cæterum dum exterius fœtus inuolucrum ab interiori aufers, lotijque, quod tantisper dum fœtus utero geritur, inter duo ipsius inuolucra colligitur, locum examinas, diligenter expende, num id uagum inter inuolucra passim diffuat: an uerò meatus, urinam fœtus per umbilicum deducens, uti plerumque à sagaci Natura factum fuisse comperimus, ueluti in prælongam quandam uesicam dilatetur: quæ impensè molli tenuique constans membrana, exiguis uenulis obsita, inter duo uera fœtus inuolucra completitur, & farcimini non uulgaribus dissectionum professoribus fuit comparata, & in fœtus inuolucrorum classe, etsi parum admodum tegat, commemorata. His non obiter expensis, interius fœtus inuolucrum perforabis. id namque totum iam sese offert: atque quum impensè pellucidum sit, promptè contentum in ipso fœtum, & innatantem ipsi sudorem, spectandum præbet. Longa igitur sectione est diuidendum: ac extracto fœtu, emissoque sudore, inuertendum: quò omni tandem ex parte eius intuearis fabricam, umbilicique uasa peritè aggrediaris. Venam dico, & arterias, & meatum, quo fœtus urina expurgatur: quæ mutuò sunt accuratè seiungenda, ac rursus ad inuolucra fœtus referenda. Abscisis modò umbilici uasis, unâ cum fœtus inuolucris, & fœtu in mensam extenso, à clauiculis per molles costarum cartilagineas ad pubis usque os sectionem, sed in sinistro magis latere, molieris, quæ in thoracem, & peritonæi usque cavitatem pertingat.<sup>2</sup> Deinde ab umbilico uenam in iecur, & arterias ad suos, quibus continuantur, magnæ arteriæ ramos, & meatum urinam fœtus educentem ad uesicæ fundum, paruo admodum negotio, quum scilicet nullo impedieris adipe, perduces, omnemque fœtus administrationem absolues. Nisi etiam uisum esset hic unâ inquirere, num in fœtu peculiaris aliquis processus<sup>3</sup> à uena caua ad uenalem arteriam, & ab arteria magna in uenam arterialem pertineat. Quandoquidem

umbilici uasorum examen.

<sup>1</sup> uti factum est in tab. fig. 10. & hæc omnia seriatim ostendunt relique tabellæ eius figure.

<sup>2</sup> ferèntur figure F, G, M, K, L.

<sup>3</sup> h. & c. figure & lib. 6. in G fig. 6. i. ab O in 1 figure 6. libri 6.

uerò

uerò prægñantes mulieres uix unquam ad publicani anatomen obtinemus, hanc quæ ad fœtum priuatim spectat sectionem, in brutis animalibus expectaturi, ea subinde in scholis proponimus: quemadmodum Galeni etiam occasione, toti alioquin sectioni illa quoque adhibemus animalia, quibus scripta ipsius in primis conuenire arbitramur. Atque ita ad acetabulorum examen, quum uterum muliebrem qualemcunque tandem tractabis, capra aut ouis, quæ non ita pridem concepisse colligetur, operi est accommodanda: ut dissecto huius utero, sinus illi appareant, quibus acetabulorum nomen ex merito, primoque à Veteribus fuit inditum. Tubercula uerò illa, ex quibus sinus isti confurgunt, in uaccæ aut capræ non prægñantis utero, quauis tandem ratione adaperto, sunt inquirenda. Vasorum autem ab utero in secundinam pertinentium, & carnis illius quæ ipsis circumnascitur, inuestigatio, in brutis quæ partui iam sunt proxima, rectè tentabitur, & in mulieribus, & illis, quod ego hac in parte proposui, discrimen perquiretur, pari omnino aggressu, quo mulierem utero gerentem administrari uoluimus. Hactenus itaque partium hoc libro descriptarum dissectandi rationem absoluius, & corpus nobis præcipuè propositum, in ea sectionis serie reliquimus: ut ad cæterarum partium, quas simul modò non plenè inspeximus, demonstratiorem, neutiquam futurum sit inutile, quam ultimo sexti libri Capitulum, & penultimo septimi, nos pertractaturos promissimus.

*Acetabulorum examen.*

LIBRI QVINTI FINIS.

ANDREAE



# ANDREAE VESALII


## DE CORPORIS HUMANI FABRICA LIBER

### SEXTVS, CORDI IPSI QVE FAMVLANTIBVS

organis dedicatus, ac mox in fronte figuras sibi proprias offerens, quo minus & hic quoq; eadem figuræ uarijs Capitibus palsim præfigantur.

#### PRIMA SEXTI LIBRI

#### FIGURA.



#### PRIMÆ FIGURÆ, EIVSDEM QVE

#### characterum Index.

*P* R A E S E N S figura tantam hominis in dorso ciebantis partem ex sinistro latere commonstrat, quantum ostendenda thoracis sedi sufficere arbitrati sumus. Ab interiori itaq; thoracis sede, & lateribus, ac dein ab aliqua colli regione cutem primum hic ademimus: ac dein musculis, qui costis obducuntur, resectis, costarum ossa à suis cartilaginibus unà cum pectoris osse liberauimus: & costarum ossibus (ut inter secundum sit) effractis, costarum cartilagine sursum uersus dextrum latus attraximus: ut thoracis cauitas, hancq; interfepientes membrane, & pulmo, reliquaq; in conspectum uenirent, quæ modo in characterum hinc significabuntur.

- A, A* Sinistri lateris costarum indicantur cartilagines, unà cum pectoris osse, dextrorsum sursumq; tracta.
- B, B* Intercostales musculi, interualla cartilaginum occupantes.
- C, C* Costarum à cartilaginibus seu uelatarum ossa.
- D, D* Intercostales musculi, interualla ossium adimplentes.
- E* Clavicula hic nuda, atq; in sua sede adhuc asseruata, cernitur.
- F* Venarum, arteriarum, neruorumq; in axillam perreptantium series.
- G* Exterior iugularis uena hic, mox auulsa cute, secantibus occurrens.
- H, H* Sinistra thoracis cauitatem interdiuidens membrana, superficie ipsius sinistra hic conspicua: quam etiam *L*, *M, N* & *O* indicant.
- I, I* Septum transversum, ea superficie hic apprensus, qua sinistram cauitatis thoracis sedem respicit.
- K* Sedes, ubi sinistra interdiuidentium thoracem membranarum, septo connascitur.
- L* Hæc protuberans sedes, cordis gratia hic in sinistru adeo prominet. id namq; unà cum suo inuolucro inter membranas thoracem interdiuidentes comprehensum, in sinistrum longè magis quam in dextrum porrigitur. atq; huius potissimum tuberculi occasione, præsentem figuram ex sinistro potius quam dextro latere expressimus.

*N* Vena

*M* Vena sinistro pectoris ossis lateri exporrecta, & tandem in superiora abdominis distributa.

*N* Arteria sinistro pectoris ossis lateri exporrecta, & similiter ac uena *M* insignita, abdominis petens superiora.


*O, O* Ramuli hic notantur, quos uena *M* insignita, & arteria *N* notata, in sinistram porrigunt membranam, thoracem interdiuidentem.

*P, P* Nervus septi transversus sinister, hic conspicua thoracem intersepientis membrana superficiei in progressu adnatus.

*Q* Vena in hominibus potissimum à iugulo unà cum septi transversus nervo deorsum excurrrens, & membrana thoracem intersepientis ramulos derivans.

*R, S, T, U* Pulmonis pars, sinistram thoracis cavitatem occupans. ac *R* & *S* huius partis sedem notant, qua còsis, seu ipsas succingenti membrana proxima est, gibba ue cernitur. T uero & *U* eius partis sedem indicant, quæ priusquam collaberetur, exteriori superficiei sinistra membrana thoracem interdiuidentis commiscetur. *Rursus R* & *T* partis huius pulmonis superiore insinuant fibræ, seu lobum. *S* autè & *U* inferiorem.

## SECUNDA SEXTI LIBRI FIGURA.




### SECUNDÆ FIGURÆ, EIVSDEMQUE characterum Index.

*P* RÆSENS figura, qua erectum, non autem humi prostratum virum finximus, primam sectionis serie subsequitur. etenim anteriori thoracis sede, & lateribus cute & musculis, qui illis adnascantur, denu-  
diatis, ac costarum cartilaginibus ab ossibus liliatis, ipsiq; ossibus extorsum effractus, tandem pectoris os unà cum  
ipso

ipsi coarctatis cartilaginibus, ab utrisq; thoracem intersepientibus membranis liber auimus, sursumq; deduximus, ut illius interior superficies obuia esset, & membranarum earum fabrica accuratius adhuc quam in prima figura exprimeretur.

- A, A Pectoris os, unâ cum costarum ipsi commissis cartilaginibus interior, seu thoracis cavitatem spectans superficies.  
 B, C Duae uenae, à iugulo pectoris os petentes, & ad elatiorem abdominis usq; regionem excurrentes.  
 D, E Duae arteriae, uenas nuper commemoratas ad umbilici usq; regionem concomitantes.  
 F Glandula sub elatissima pectoris os sede in iugulo reposita, uasorumq; distributioni praefecta.  
 G, G Dextra membrana thoracis interdiuentium membranarum sedes, quae dextro pectoris os lateri adnascatur.  
 H Dextra modo membrana dextra, seu pulmonem spectans superficies.  
 I, I Sinistra membrana thoracis cavitatem interdiuentium membranarum pars, quae sinistro pectoris os lateri ante sectionem connata fuerat.  
 K Dextra modo membrana sinistra, seu pulmonem respiciens superficies.  
 L, L Intervallum indicatur inter duas thoracem interdiuentes membranas inibi conspicuum, ubi humano pectoris os continuantur.  
 M, M Hec protuberans regio, cordis indicat situm, cor enim unâ cum ipso inuolucro immotum, inter membranas thoracem intersepientes hic collocatur.  
 N, O, P, Q Pulmonis gibbum, sedes ue costis contermina indicatur. neutra namq; ex parte pulmonis partes in latera repleximus. Verum N & O duas fibras dextrae partis pulmonis insinuant. N quidem elatiorem, O uero humiliorem atq; ita etiam in sinistro latere P quidem elatiorem, Q autem humiliorem proponit.  
 R, R Septi transversae sedes, quam à mucronata pectoris os cartilagine hic S insignita, & dem à cartilagine quae S pectoris os non coartulantur, mucronibus, liberaui.  
 T, U Cutis deorsum ab anteriori thoracis sede euerfa, eaq; superficie conspicua, quam musculus obducebatur.

### TERTIA SEXTI LIBRI FIGURA



#### TERTIAE FIGURAE, EIVSDEMQUE characterum Index.

Q U O N I A M duae praecedentes figurae, cordis ac pulmonis situm abunde indicant, praesentem figuram (uti & subsequentes uniuersas) tanquam è thoracis cavitare eunquam delineauimus: ne si singulis figuris truncum corporis appinxissemus, negotium frustra operosius redderetur. Tertia itaq; figura, ademptis modo membranis thoracem interdiuentibus, cor suo uestitum inuolucro continet, unâ cum pulmone, & septi transversae portione, cui in hominibus magna amplitudine cordis inuolucrum connascitur.

- A Hic uena cauae portione sursum confcendentem, & magnam arteriam praescidimus, tanta duntaxat uasorum cordis asseruata portione, quantum ipsius inuolucri origine ostendenda sufficit. ubi enim hic B ascripti, illic inuolucrum pertinacissime cauae uenae & magnae arteriae & uenae arteriali adnascitur, ab illis uasis non secus C quam à corde, toto illo interuallo abscedens, quod à B ad C pertinet. C enim cordis basis sedes regione ue indicat.  
 D, E, F Cordis inuolucri anterior sedes, cordis figuram nuci pincae non admodum ab similem referens. D enim & E basim notant, F uero mucronem.




G Ab F ad G sedes insignitur, qua cordis involucrium septo transverso in hominibus, secus multo quam in canibus adnascitur. Ceterum uenule hic in cordis involucrio conspicuae, non cordis, at ipsius involucri sunt. id namq. in hominibus tam crassum ualidumq. uisitur, ut cordis color per illud nix transpareat.

H Septi transversus pars.

I, I Septi transversus nervi.

L, M, N, O Pulmo. at singuli characteres singulas humani pulmonis fibras lobos'ue insinuant.

QUARTA SEXTI LIBRI  
FIGURA.



QUARTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

H A c figura cordis involucrium longa sectione diuisimus: idq. in latera descedentes, cor & cordis uasa anteriori ipsorum sede deximus, corde interim immoto.

A Sedes, qua cordis involucrium, cordis uasis supra illius basim continuatur, adnascitur'ue.

B, B Cordis involucrium, ab anteriori cordis sede in latera reflexum.

C, D, E Cordis anterior sedes. ac C quidem & D ipsius indicant basim, E uero mucronem.

F Vena caua.

G Arterialis uena.

H Magna arteria. Venalis autem arteria, nisi corde in dextrum latus (uisi'ia ostendit figura) reflexo, nulla ex parte conspici potest.

I Dextra cordis auricula.


K Sinistra cordis auricula apex.

L, L Venae ac arteriae, à uasis basim cordis cingentibus pronatae, atq. huc ex posteriori cordis sede, adeoq. sinistro ipsius latere amorsum reductae.

M, N, O, P Pulmonis indicantur fibræ, lobi'ue.

Q Septi transversus pars.

AND. VESALII, DE CORPORIS  
QVINTA SEXTI LIBRI  
FIGURA.



QVINTAE FIGVRAE, ET IPSIVS  
characterum Index.

*P* R A E S E N S figura, unà cum pulmone cor exprimit, ab ipsius inuolucro iam sectionis serie penitus liberum: ac in sinistrum latus in hoc reflexum, ut uenae cauae ad cordis basim continuas oculis subiceretur.

*A* Cordis dextrum latus, magnaq; ipsius posterioris sedis regio.

*B* Dextra cordis auricula.

*C* Venae cauae, quae in dextrum cordis uentriculum dehiscit, aut ab illo pronascitur.

*D* Venae cauae portio, septum transversum permeans.

*E* Septi transversi pars.

*F* Venae cauae portio, iugula petens, quam hic nunculo cum comite ipsius arteria excepinus, ac dein praesecimus.

*G* Venae pari carentis initium.

*H* Arteriae magne radix.


*I* Arteria magne truncus, qui deorsum ad spinam explicatur.

*K* Portio nervi sinistri, sexti paris nervorum cerebri, à quo subsequens figura, cordis neruulum depromi ostendet.

*L, M, N, O* Quatuor pulmonis fibrae.

*P* Hic aliqua uasorum pulmonem aduentrium series conspicitur.

SEXTA LIBRI SEXTI  
FIGURA.



PRÆSENS figura cor in dextrum latus ita deuolutum proponit, ut mox præcedens figura id ad sinistrum latus ostendebat reflexum. Atq; ut illa uenæ caua ad cordis basim continuitatem indicabat, sic præsens uenalem exprimit arteriam, & sinistram cordis aurem, & cordis deniq; neruulum. Ut uero huius ductus esset manifestior, arteria magna aliquot propaggines, & quasdam asperæ arteriæ & neruorum sexti paris cerebri portiones huius figuræ adnexas reliquimus.

A, B, C Cordis sinistrum latus, & posterioris ipsius sedis magna regio.

D Vena & arteria, cordis basim cingentes.

E, E Vena & arteria, à uasis cordis basim ambientibus deorsum per cordis longitudinem exporrectæ.

F Sinistra cordis auricula.

G Arteria uenalis.

H, H Arteriæ uenalis soboles, in sinistram pulmonis partem excurrentes, quæ uero in dextram feruntur, oculis non patent: quòd illarum radix sub corde mox in arteria uenalis ortu ad dextram pulmonis sedem prorepit.

I Vena arterialis principium.

K Arterialis uenæ pars, sinistram pulmonis partem petens.

L Arterialis uenæ pars, dextræ pulmonis parti distributa, ac secundum posteriorem caudicis magnæ arteriæ sedem reflexa.

M Apex dextræ cordis auriculæ.

N, N Vena caua.

O Magnæ arteriæ caudex.

P Magnæ arteriæ portio, deorsum ad dorsum uertebrae decortæ.

Q Magnæ arteriæ portio, sinistram axillam obliquo ductu accedens.

R Arteriæ magnæ portio, iugulum petens.

S Arteriæ magnæ portio iugulum petentis dextræ pars.

T Dextræ eius partis S insignitæ ramus, præcipua sua portione dextrum petens brachium.

U, X Soporariæ arteriæ, secundum asperæ arteriæ latera ascendentes.

Y Asperæ arteriæ caudex.

a Dexter neruus sexti paris neruorum cerebri.

b Ramuli, quos neruus a insignitis ad dextrum recurrentis nerui constitutionem digerit.

c Dexter recurrens seu reuersus neruus.

d Sinister neruus sexti paris neruorum cerebri.

e Sinistri nuper commemorati nerui surculus, sinistram pulmonis parti oblatus.

f Ramuli sinistri nerui d insigniti, à quibus sinister recurrens neruus consueuit.

g, g Sinister recurrens neruus.

h Neruulus secundum uenam arterialem exporrectus, ac cordis basim centrum adiens.

i, k, l, m Pulmonis indicantur fibrae.

n, o Septum transversum.

SEPTIMA SEXTI LIBRI  
FIGURÆ.





AND. VESALII, DE CORPORIS  
SEPTIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

*H* *A* *E* *C* figura cor à pulmone & septo transverso liberum ostendit, cuius dextrum ventriculum unica sectione, ab anteriori sede orificij uenae cauae ad cordis usq; mucronē ducta, aperuimus, & quoad fieri potuit, eundem distendimus: ut id uenae cauae in hunc ventriculum pertinens orificium, & ipsi praefecta membrana, in conspectum uenirent. Dein ut interior quoq; dextra cordis auriculae superficies oculis subiceretur, eam introrsum sinximus.

*A* Uenae cauae pars, septum transversum permeans.

*B* Uenae cauae pars, iugulum petens.

*C, C* Orificium uenae cauae, in dextrum cordis sinum pertinens.

*D, E* Orificia ascendentis & descendētis uenae cauae partium.

*F* Dextra cordis auricula inuersa, & inaequalem fibrosamq; ipsius internam notans superficiem.

*G* Coronalis uenae principium.

*H, H, H* Protuberans in uenae cauae orificio circulus.

*K, L, M* Tres membranulae, uenae cauae orificio praefectae.


*N, N* Fibrae ab inferiori sede membranularum uenae cauae orificij, deorsum ad uentriculi dextri latera mucronemq; ductae.

*O, O* Carneae partes, quae fibras nuper ductas amplexantur, teretemq; formam exprimunt.

*P* Haec uentriculi dextri cavitatis uersus uenae arterialis orificium spectat.

*Q, R* Grassies substantiae dextrum cordis uentriculum confluētis.

OCTAVA SEXTI LIBRI  
FIGURA



OCTAVAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

*O* *C* *T* *A* *V* *A* figura in hoc à septima differt, quòd insuper in hac ex dextri cordis uentriculi sede, quam *P* in septima figura notabat, sectionem duxerim in uenae arterialis usq; cavitatem: quodq; eius uenae orificium ita distenderim, ut membranae ipsius apte in conspectum ueniant.

*A* Uenae cauae portio, iugulum petens.

*B* Arteriae magnae caudex.


*C, D* Uenae arterialis orificium. Verùm singuli characteres indicant singula foramina ramorum, in quos arterialis uenae caudex primum discinditur.

*E, F, G* Tres membranulae, arterialis uenae orificio praefectae.

*H, H* Cordis uentriculorum notatur septum, seu sinistrum latus dextri cordis uentriculi. atq; ita hic uniuersa dextri uentriculi cordis cavitatis in conspectu est.

*I* Una membrana uenae cauae orificio adnatarum.

*K* Dextra hic pendet cordis auricula, adhuc inuersa, & cum cordis substantia, cui proxima est, reflexa.

NONA SEPTI LIBRI  
FIGURA.NONAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

PRÆSENS figura cor refert, cui una sectio ex arteria uenalis orificio ad cordis usque mucronem ita inducitur, ut uenalis arteriae orificium simul cum sinistro cordis uentriculo distendatur, apparentibus unam membranis illi orificio praefectis, & inuersa cordis sinistra auricula, ut & hac internam ipsius superficiem ostenderet.

A Magne arteriae caudex.

B Uenae arterialis portio.

C C Uenalis arteriae orificium.

D D Protuberans in uenalis arteriae orificio circulus.

E, F Duæ uenalis arteriae orificio praefectae membranae.

G, G Fibrae ab humiliori dictarum membranarum sede deorsum ad sinistri cordis uentriculi latera protensae.


H, H Carneae cordis substantia, eas quas modo G & G insigniui fibras amplectens.

I Sinistra cordis auricula, inuersum inuersa.

K Septum cordis uentriculorum, aut sinistri cordis uentriculi dextrum latus.

L Hac sinistri uentriculi amplitudo ad magne arteriae orificium confcendit.

M, M Substantia cordis, qua sinistrum ipsius uentriculum confcuiuit, crassities.

DECIMA SEPTI LIBRI  
FIGURA.

AND. VESALII, DE CORPORIS  
DECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

DECIMA figura, idem cor, quod in mox precedente, proponitur. verum hic amplius ex sinistri cordis uentriculi dextra elatiorq, sede sectionem ad arteriae magnae cavitatem usq, duximus, ut distento quoq, eius orificio, tres membranae illi praefecta una conficerentur.

A Arteria magna orificium.

B, C, D Tres membranae, in arteria magna orificio obvia. verum harum trium (ui inter dissectandū crebrò fit) una, cui B inscriptissimus, per medium dissecta est, & utrinq, altera ipsius pars conficitur.

E, F Principia duarum coronalium arteriarum.

G Coronalis uene & coronalis arteriae hic apparet portio per transversum dissecta.

H Arteriae uenalis orificium.

I, K Duae membranae, uenalis arteriae orificio appositae.

L Sinistra cordis auricula introrsum inuersa.

M Fibra ab humiliori membranarum ad uenalis arteriae orificium occurrentium sede, ad sinistri cordis uentriculi latera pertinentes.

N Carneae cordis substantia, dictas nuper fibras adaugens, amplectensq,

O Portio uenae arteriosae.

P, Q Cordis substantiae crassities, ubi haec sinistrum cordis efformat uentriculum.

R Cordis uentriculorum septum, aut potius sinistri uentriculi dextrum latus.

S, S Hic ad arteriae magnae radicem dura & ueluti cartilaginosa corae usitur substantia, quae quibusdam animalibus euadit ossea.

VNDECIMA SEXTI LIBRI  
FIGURA.



VNDECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

HAEC figura integrum aliàs cor per transversum dissectum ostendit, ut cordis substantiae secundum ipsius uentriculos crassities in conspectum ueniret, unaq, uentriculorum quasi effigies & praestantia proponerentur.

A Cavae uenae pars.

B Dextra cordis auricula.

C Arteria magna caudex.

D Vena arterialis.

E Sinistra cordis auricula, cui portio appendet uenalis arteria. Atq, hi characteres, cordis basim insinuant.

F Cordis mucro.


G, G Dexter cordis uentriculus.

H, H Sinister cordis uentriculus.

I, I Septum cordis uentriculorum: aut ea cordis pars, quae dextrum latum sinistri uentriculi constituit, ac in dextrum uentriculum procuberat, illius sinistrum latum efformans.

DVODE-





DVODECIMAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

*PRÆSENTI* figura, anterior pulmonis sedes, à qua cor cum ipsi conterminis membranis præsectum  
fuit, delineatur: quæ inferiori, terramq; spectanti bubuli pedis sedi non admodum imagine abfimilis uisitur.

*A, A* Stomachi, quo cibus in uentriculum fertur, parti.

*B* Asperæ arteriæ trunci portio.


*C* Vena arterialis.

*D* Venalis arteria.

*E, F, G, H* Quatuor pulmonis fibræ, seu lobi. Verùm *G* & *H* priuam pulmonis sedem indicant, quæ septi trans-  
uersi gibbo, thoracis cauitatem spectanti, congrui.

*I* Septi transversus portio, hic flaccide propendens.

DECIMATERTIA SEXTI  
LIBRI FIGURA.



DECIMATERTIAE FIGVRAE, EIVS-  
demq; characterum Index.


*HÆC* figura, pulmonis ex thorace eunsi posteriorem notat sedem, quæ superiorem bubuli pedis regio-  
nem forma utcuq; exprimit.

*A* Asperæ arteriæ portio, posteriori ex sede hic conspicua.

*B, C, D, E* Quatuor pulmonis fibræ, seu lobi.

SEXTI LIBRI FIGVRARVM, ET  
earundem Indicum finis.

Libri sexti ar-  
 gumentum.



VA'M affabrè corporis nostri architectus, cibi potusq; organa extruxerit, quemque ipsorum usus & actionis gratia numerum, situm, formam, cõnexum & substantiam denique singulis largitus sit, quintus liber nõ perfunctoriè explicuit. ac proinde præsens instruméta aeream, quæ continuò defluit, substantiam restituentia, & calorem innatum recreatã, opportunè complectetur. Quodd autem omnes respirationi pulsuiq; famulantes particulæ, in horum classem collocadæ ueniant, cuius perspicuum esse arbitror: & minus quoq; respirationis ac pulsus usum (quoad nobis animæ substantiam ignoratibus, hunc nosse datur) quenquam modò latere existimo. unde etiam nunc in illorum usu explicando, non est diu hærendû: præcipuè, quum in secundo libro, ubi respirationi subseruientes proponebantur muscoli, & in tertio, dum arteriarum munus recẽsebat, de respirationis & pulsus natura usq; nonnulla pertractauerim. Absolutam namq; horum tractationem neq; illic, neq; hic aggrediendã duxi: quod hanc priuatos, eosdemq; complurimos libros exigere, Galenus nobis abundè ostenderit. Quando inspiramus itaq; omnibus corporis partibus secundum naturam sese habentibus, & caloris ingenti (quem Galenus animam, aut primarium saltem ipsius instrumentum esse tradidit) qualitate, nulla occasione adaucta, tunc aerem per nares distenti thoracis beneficio attrahimus: cuius portio ad cerebrum, quum per<sup>a</sup> octauicapitis oris foramina, quibus præcipuè olfactus organorum<sup>b</sup> partes incumbunt: tum etiam, atq; id magis, per<sup>c</sup> meatus pituitam ex cerebro ad fauces deducents, assumitur, spiritum animale nonnihil enutritura. Verum copiosior per nares attracti aeris portio, ex amplis narium<sup>d</sup> foraminibus in fauces secundum posteriorem<sup>e</sup> gargarij sedem ducitur, nonnihil ab illo temperata. Hinc<sup>f</sup> in laryngem, & dein per totam asperam arteriam in frequentes ipsius per pulmonis substantiam propagatas soboles fertur. Postquam uerò aer ab hac substantia cordi quodammodo præparatus est, à<sup>g</sup> uenalis arteriæ furculis, pulmoni etiam intextis, ex asperæ arteriæ ramis elicitur: & in<sup>h</sup> finistrum cordis uentriculum delatus, tenui admodumq; seruido, quem corinibi continet, sanguini cõmiscetur. Huius aeris qualitate, contenti in hoc uentriculo caloris qualitas euentilatur, substantia autem caloris (quæ aere & spirituosi sanguinis exhalatione constat) istius aeris substantia cõnutritur. Quod uerò uelut fuliginosum ex hac peculiari cordis functione congeritur, rursus per uenalem arteriam in pulmonem ablegatur: & ab asperæ arteriæ propaginibus exceptum, unà cum reliquo aere, quem ex illis arteriæ uenalis germina, tanquam cordi incptum, non attraxerant, denuò per asperam arteriam, & laryngem, faucesq; & nares, concidentis contractiq; thoracis opœra, educitur. Huiusmodi sanè in naturali respiratione, aeris ductus perficitur: in non naturali uerò, aer potissimum per os attrahitur, efferturq; Vocamus autem uulgò non naturalem respirationem, qua alterius quàm temperatæ caloris innati qualitatis nomine utimur: ut quæ ea qualitas aliqua ex causâ in eum modum inreuit,

Qui aer in respiratione digeratur, cordisq; & ipsi subministranti partium functionis enumeratio.  
 Lib. 2. de Arte curat, ad Glauconem.

a 8 fi. cap.  
 6 lib. 1. A.  
 A, B.  
 b 12 fl. lib.  
 7 C. D. &  
 13 fig. L. L.  
 c 3 fi. cap.  
 12 lib. 1. the  
 racteres ad  
 latera de  
 positi.  
 d 2 fi. cap.  
 12 lib. 1. A. O.  
 e 6 musc.  
 tab. E.  
 f in figura  
 asperam ar  
 teriæ expro  
 mentè cap.  
 38 lib. 1. &  
 hic 6 fig. Y.  
 g 2 fi. cap.  
 15 lib. 1. &  
 hic 6 fi. G.  
 & 13 fi. D.  
 h Apertus  
 est in 9 fig.  
 & in 10.

increuit, ut per nares allatus aer homini non sufficiat: aut quoties exufflationem, uocem, eiusq; generis reliqua, ad quæ secundariò respiratio famulatur, tentamus. Ab aeris substantia in sinistro cordis uentriculo sanguini ibidè contento permixta, uitalis spiritus conficitur: qui ex hoc uentriculo in magnam arteriam unà cum sanguine impetu ruente ac feruido diffusus, per uniuersum corpus secundum arteriæ seriè digeritur, et calorè singulis membris priuatim innatū reficit, temperatq; quod ipsius diffusum est instauras, haud secus sanè atq; membrorū substantia à sanguine per uenas adducto restituitur. Et quemadmodum respiratio, & sanguinis ex<sup>k</sup> dextro cordis uentriculo in finistrum assumptio (quantumuis interim hæc nobis sit obscurissima) cordi ad uitalis spiritus, calorisq; natui repositionem faciunt: sic pari ratione materia à sinistro cordis uentriculo per arterias reliquo deducta corpori, aliarum partium spiritum & natium calorè recreat. Atq; huius etiam occasionis gratia idem pulsus & respirationis usus cēsetur. quod enim inspiratio materiei in sinistro cordis uentriculo repositæ præstat, id reliquis partibus in pulsu arteriarum dilatatio largitur: expiratio autem, arteriarum contractioni correspondet. At quibus organis, incredibili diuināq; artificis ui fabricatis, hæc omnia perficiantur, quaq; ratione hæc admiranda Naturæ opera compleantur, iam ordine enitar persequi: ea interim non repetiturus, quæ in primo libro de thoracis ossibus, & asperæ arteriæ cartilaginibus, ac in secundo de eorundem musculis, & in tertio de arteriarum constructione necessariò persecutus sum. Quapropter ut in libro hunc præcedente, à peritonæo sermonis cibi ac potus organorum initium opportunè instituimus: ita quoque & hîc à tunica costas succingente, non immeritò instrumenta aeræ substantiæ nutriendæ dedicata, aulpicabimur.

Respirationis  
& pulsus  
idem usus.

### DE MEMBRANA COSTAS SVCCINGENTE. Caput II.

QUANDO QUIDEM costas succingens tunica, aliud nihil quàm membrana est, neq; ita integrè à costis, ac peritonæum ab ipsi commissis musculis, liberari potest: cuius imaginem aliunde sumere non licet, quàm ex figurâ internam thoracis amplitudinem superficiemq; exprimentibus: cuiusmodi in primis occurrit octaua musculorum tabula, ac in osium figurâ illa, quibus omnia thoracis ossa simul proponuntur, ut duæ priores Capitulis decimoni libri primi, & tres ultima eiusdem libri figuræ.



a 7 musc.  
tab. A.

b 7 musc.  
tab. B.

VNICAE membranæ ue costas succingētis, ac *ὑποσώματος* Græcis, uulgò autem pleuræ dictæ, situm, ipsius nomen indicat. hæc namq; omnibus costis (præterquàm duodecimæ, à<sup>a</sup> septi transuersi implantatione prorsus occupatæ) præterea & toti pectoris ossi subtenfa: thoracis uerò uertebrarū corporibus, & superiori septi parti, thoracis amplitudinem respicienti, obducta, figurâ magnitudinemq; totius thoracis cavitati correspondent adipiscitur. Pertinet enim parte ipsius posteriore, à prima thoracis uertebra deorsum ad undecimam usq; è cuius regione septi pars arteriam<sup>b</sup> magnam transmittens, confilfit. anteriore autem ipsius parte, à iugulo ad humillimam usq; pectoris ossis sedem, cui septum innascitur, descendit. In lateribus uerò, à prima costa ad superiorem septi superficiem, quam thoracis cavitatem respicere diximus, fertur, hanc quoque uniuersam, ut & reliquam thoracis cavitatem, sublinens. Hæc itaq; membrana, perinde atq; thoracis cavitatis, figura admodum uariat. Superiore enim parte, ut & thorax, angusta est, ac uelut in acutū definit: inferiore uerò parte latior quàm su-

Nomen & situs membranae  
costas succingentis.

Magnitudo.

Figura.



quàm superiore existit. at in lateribus, thoracis quoq; modo, latior quàm inferiore sede uisitur. Dein anteriore parte breuior est: posteriore autem multo longior, ad obliqui situs septi rationem, existit. nam à pectoris ovis mucrone, ad undecimam thoracis uertebam obliquo admodum in celsu pertingit. Rursus anteriore parte, ut & in lateribus, membrana hæc exterius, quemadmodum & thorax ipse, gibba uisitur: at posteriore secundum uniuersam thoracis longitudinem, uelut ad internam ipsius amplitudinẽ, impressionem, thoracis ritu, obtinet, idq; uertebularum & radicum costarum ratione. Vertebularum enim corpora in thoracis prominent cavitatem: ut & costarum radices, quæ à uertebularum corporibus retrorsum tantisper reflectuntur, donec denud uersus anteriora deorsum procedentes obliquentur. Interius omni ex parte læuis, & ueluti aqueo humore perfusa est: præterquàm ubi processus quosdam membraneos exporrigit, ex quibus aut alias educit membranas, aut corpus aliquod sibi colligat. Fit autem id præcipuè secundum uniuersam posterioris suæ partis longitudinem, ad uertebularum nimirum progressum, ubi intersepientes thoracem producit membranas, & asperam arteriam, stomachum, magnam arteriam, & sine coniuge uenam firmat, & sibi ipsi uinculis connectit, illisq; ascititiis tunicas offert. Pariter se habet secundum ovis pectoris, & septi quoq; à pectore ad dorsum usq; ductum, ubi intersepientes thoracem membranæ illi cõtinuantur. Nonnunquam, haud secus quàm peritonæo, internæ huius membranæ sedia deorsum durior adnascitur: idq; præcipuè, ubi uertebri est propinquior, quaq; ipsius insigniores uenæ porriguntur. Quinetiam modò in uno, modò in altero latere membraneas fibras pulmonum applantat, quibus illum sibi admodum ualidè in hominibus, aliter ferè quàm in canibus, suis & simijs, adnectit. Hoc enim non quidem ad costas duntaxat, uerum & ad septi quoq; partem pulmonum uicinam. Præterea in hominibus priuatim, quæ hæc membrana thoracis cavitatem succingens, septo obnascitur, cordis inuolucrum magna amplitudine ipsi coalescit, cõtinuaturq; haud secus quàm si id hinc non minimam sui initij partem duceret. Porro hæc membrana superficie externa, quod undique adiacentibus partibus adnascatur, aspera, in æqualisq; inuicem cõnexarum membranarum imagine uisitur, uix aliqua tamen pinguedine inibi obducta. Quanquam interim non omnibus partibus quæ pertinet connata hæreat. ualidiùs namq; costarum ovis ac cartilaginibus, membranæ peculiariter unamquamq; costam inuestientis (cuius mox meminero) interuentu adnascitur, quàm internæ intercostalium musculorum sedi. Sic quoq; septi carnosæ parti longè remissiùs quàm neruosæ committitur. Quæ septo membrana hæc obducitur, ternis foraminibus est peruiua. uno quidem uenæ cauæ caudici parato: secundo autem, stomacho, ipsiq; attensis sexti paris neruorum cerebri ramis: tertio uerò magnæ arteriæ, & uenæ pari carentis fini. In iugulo, non unico amplo continuoq; pertunditur foramine: uerum quæ eam inibi perreptant uasa, pluribus foraminibus completitur, ipsisq; adnascitur. Transmittit uerò hic uenæ cauæ & arteriæ magnæ ramos, ad hæc stomachum, asperam arteriam, & præcipuas sexti paris neruorum cerebri propagines, cum septi transuerfi neruis. Postremo, secundum posterioris suæ sedis longitudinem utrinque ordinata serie perforatur, uenis ac arterijs costarum interualla petentibus uiam præbens. Substantia constat membranæ, dura scilicet, & tenui, alba, æquali, & robore nonnihil peritonæum superante: uerum similiter ac ipsius quoq; peritonæi, huius substantia ad dorsum

Membrana huius  
superficies  
gualis, quicquid  
earum ad alia  
partes uicinas.

Membrana co  
stas succingen  
s foramina.

substantia.

c. fig. H.  
K, L, O. 1  
fi. G, G, H.  
O, L, K.  
d. 1. fig. cap.  
28 lib. 1.  
e. 14. 15. fi.  
lib. 5. A, B.  
C.  
f. fig. cap.  
12 lib. 3. i.  
g. fig. cap.  
6 lib. 3. E, F.

b. fig. 1.1  
ad V.

i. fig. 1.1  
ad E.

a. 8 musc.  
tab. E, B.  
quæ dissec  
nuntur faci  
lè à costa  
rui ossibus.  
k. 7 musc.  
tab. primi  
fsecundum  
r. teruū q.  
i. Pete hos  
ex ult. fig.  
lib. 3.  
m. 7 musc.  
tab. E.  
n. 71. ch. F.  
o. 6. fi. 4. d.  
p. 3. fig. 1.1.  
q. fi. cap. 6  
lib. 3. G, G.  
r. fi. cap. 12  
lib. 3. h. h.

ad dorsum durior quàm iuxta pectus sentitur: quum scilicet ipsius origo à uer-  
tebrarum ligamentis, illarum corpora connectentibus, potissimum pendeat.  
Porro uenis ac arterijs & neruis quoq; abundat. ac primum quidem in poste-  
riore parte ipsi uena còiugis expers adnascitur: deinde & magna arteria in la-  
teribus uerò subtenfas habet longas, neq; eas ualde graciles uenas & arterias,  
quæ singulis costis exporriguntur. Priore autem parte, uasa ipsi incumbunt,  
sub pectoris ossè deorsum ad abdominis superiora prorepètia, & ramos in co-  
starum cartilaginum interualla digerentia. Nervos quoq; còtingit quàm plu-  
rimos: quippe in iugulo transmittit maximas sexti paris neruorū cerebri por-  
tiones, quæ in pulmonem, uentriculum & iecur distribuuntur, neruosq; re-  
currentes germinat. Deinde etiam ibidem iter, uti diximus, præbet septi ner-  
uis, à quibus innumeras soboles membrana hæc mutuatur, quæ septum suc-  
cingit. Atq; hos quidem neruos intus complectitur: exterius autem magni,  
ijdemq; una serie ad singula costarum interualla deducti, simul cum uenis ar-  
terijsq; ipsi attenduntur. Præterea in posteriori sede utrinq; illi subtenduntur  
sexti paris neruorum propagines, costarū radicibus exporrectæ, ac tandem  
in nutritionis organa diffusæ. Cæterum præter hanc membranam, costas  
thoracem uel succingentem, singulis costis alia peculiaris obgit, quam Græ-  
cos alteram succingentem costas membranam uocasse reor. Tale enim quid  
in libro de Constitutione artis medicæ Galenus, morbi lateralis species subdi-  
uidens, indicare uidetur. Est autem altera hæc succingens costas membrana,  
inuolucrum, quod omnibus propemodum ossibus còmune censetur: ea ni-  
mirum mēbrana, quam, quòd os ambit, circumossalem nūcupamus. Quem-  
admodum enim ossa huiusmodi membrana obcinguntur, ita quoq; & singu-  
læ costæ orbiculatim ipsas ambientem membranam obtinent, peculiare ni-  
hil ab eiusmodi cæterorum ossium membranæ sibi uendicantem: etsi Gale-  
nus interim externæ tantum costarum sedi illam uideatur ascribere, eamq;  
non unicuiq; costæ peculiarem. Cæterum thoracis cavitatem succingens ob-  
linensq; membrana, omnibus quæ thorax continet, inuolucrum quoddam  
euasit. unde etiam ab usu tunica (uti à substantia, membrana) dissectionum  
peritis uocatur. Ad hæc, ipsa quoq; ut & peritonæum, ijs omnibus quæ am-  
plectitur organis tunicas exporrigit, eademq; firmata colligat. Quòd autem  
cum thorace distendatur, arcteturque, neminem ambigere arbitror. thoraci  
enim undiq; adnata, tali constat substantia, qualis & inuolucrum loco habetur  
commoda, ac simul leuis sequaxq; est. His accedit, quòd præsens membrana  
septo transuerso tenui, sed robusto interim, opportunè facto, non inefficax ro-  
bur adiungat: & in ipso, ut & in intercostalibus musculis, membranæ muscu-  
lorum uentrem ambientis uicem abundè gerat: quanquam & propriā mem-  
branam intercostales musculi aliorum musculorum modo obscure fortiri ui-  
deantur. Cæterum uenæ & arteriæ & nerui, quibus hæc membrana com-  
mittitur, etiam si ad ipsius nutritionem & sensum usui sint: non tamen eius  
præcipuè gratia, sed uicinarum partium, illi adeò frequentes attenduntur. un-  
de etiam ipsi crebrior cum magna tensione, punctilq; cruciati, ut & cerebri  
membranis, inflammatio oboritur.

*Singulis costis  
peculiaris  
membrana.*

*Membrana co-  
stas succingen-  
tis uisus, & ip-  
sius construc-  
tionis ratio.*

## DE MEMBRANIS CAVITATEM THO- racis intersepientibus. Caput III.

*Membranae thoracis cavitatem interdiuidentes, non aliter oculis subicere potuimus, quàm id  
prima & secunda figura præstare conati sumus.*

MEMBRA-

*2 fig. B,  
C, D, E.*

*1 fig. capiti  
9 lib. 4 in-  
sertæ Q.  
Q. & S. S.  
u 2 fig. 1, 1.  
x speciem  
tur 2 fig. ca.  
11 lib. 4 se-  
cundum co-  
starum dic-  
tam.  
y 2 fig. cap.  
1 lib. 4 al-  
tera b in-  
signitur.  
z Hæc pri-  
um nulli  
bi delinea-  
uimus, quia  
membrana  
sit ossi ob-  
ducta, ex  
ossibus cir-  
cumscripti-  
one peten-  
da sit.*

*4 1 fig. lib.  
5. & 2 fig.  
lib. 5 A, B,  
C, D.*

*6 8 musc.  
tab. E, E.*

Interſepiētium  
mēbranarum  
nomenclaturā.



Numerus.

Situs.

Forma.

Magnitudo.

H A C figura  
triangulus ille, quē  
hic deſcribimus,  
proponitur, ſuas li-  
neas ſeriatim nu-  
meriſque characteribus  
notatus exhibens.



Quo pacto in-  
terſepiētes mē-  
branae inuicem  
diſſent.

Quid inter mē-  
branas interſe-  
pientes repo-  
natur.

EMBRANA, quam ſuperiore deſcripſimus Capite,  
uniuerſam thoracis cauitatem ſuccingit, ſublinitque. at  
membranę, quas Gręci *διαφραγματοειδεις*, nos uerò thoracem  
interſepiētes, aut uulgò mediaſtinum nuncupamus, ean-  
dem cauitatem interdiuidunt, in duas præcipuas ampli-  
tudines eam diſtinguētes, unde & nomen ſuum meritò  
obtinent. Habentur autem in thoracis medio utrinque ſin-  
gulę, ſecundùm ipſius longitudinē procedentes. à iugulo enim ad totam<sup>b</sup> ſe-  
pti tranſuerſi longitudinem pertingūt, & à tota peſtoris oſis longitudine ad  
thoracis uſque uertebrarum corpora exporriguntur. Atque his etiam terminis  
membranarum amplitudo circunſcribitur, quę triangulum quodammodo  
ex inæqualibus & obliquis lateribus coſtis ue. cōforma-  
tum refert. una enim coſta, quę & breuior eſt, à iugulo  
ſecundùm peſtoris oſis longitudinem ad eius uſque mu-  
cronem, & ſepti hīc cōnexum fertur: ſecunda uerò hac  
longior, à iugulo ſecundùm dorſi ductum ad undeci-  
mam uſque thoracis uertebram procedit: tertia, longitu-  
dine inter illas media, ab oſſe peſtoris ſecundùm ſepti longitudinem decliuiſ  
ad dorſum deſcendens, duas priores coſtas cōmittit. Membranę iſtę in mu-  
tua diſtātia & coitu plurimum uariant. ſecundùm dorſi enim longitudinem,  
quā uertebris committuntur, inuicem contiguę ſunt, & anguſtam ualde in-  
ter ſe cauitatem fibris membraneis oppletam efformant. Quā uerò peſtoris  
oſi committuntur, in homine quidem inuicem neutiſque contiguę ſunt,  
ſed pro<sup>c</sup> oſis peſtoris latitudine mutuò<sup>d</sup> diſtant. Superiōri enim parte, ubi id  
ampliſſimū eſt, ac clauiculas primamque utriuſque lateris coſtam ſuſtinet, mem-  
branę etiam inuicem admodum abſcedunt: cauitatem nihilominus uniuer-  
ſam, quam inter ſe continent, fibroſis membraneis que nexibus adimplentes.  
Vbi uerò peſtoris oſi ſecundā coſtę cartilago<sup>e</sup> in articulatur, quemadmodum  
peſtoris oſ illic arctius euafit, ita quoque dextra membrana minus inibi à ſi-  
niſtra remouetur. Hęc membranarum diſiunctio ſenſim ſecundùm oſis  
peſtoris longitudinem deſcendēs, capacior redditur, & perinde ac oſ ipſum  
dilateſcit: adeò, ut tanta in homine hīc membranarum conſurgat diſtātia,  
quanta undique peſtoris oſis ſecundum latitudo. Cæterum quā membranę ſep-  
to tranſuerſo<sup>f</sup> cōmittuntur, omnium maximè inuicem abſcedunt, inibi tan-  
tam efformātes cauitatem, quanta ſepti tranſuerſi membranei circuli undique  
eſt<sup>g</sup> latitudo. Cauitas hęc in hominibus nihil prorſus complectitur, præter  
cordis<sup>h</sup> inuolucrum, ipſumque cor, & uenam cauam ſeptum penetrantem: &  
dein in poſteriore inferioreque ſede<sup>i</sup> ſtomachum, ſeſe hīc à dextra corporum  
uertebrarum regione ſubleuantem, ac cum attēſis ipſi neruiſ<sup>k</sup> per ſeptum  
tranſuerſum ad elatius uentriculi oriſcium contendentem. In canibus uerò,  
& reliquis animalibus, longius peſtoris oſ, longioremque thoracem poſſi-  
dentibus, cauitas hęc multo capaciſ uſitur, nullis membraneis fibris ob-  
ducta. Dein eius baſis à cordis inuolucris mucrone multum, ſecus quā in  
hominibus, diſtat. & illa quoque in dictis animalibus pulmonis lobum con-  
tinet, qui ſubſterniculi & manus cuiuſdam inſtar cauam uenam hęc pro-  
gredientem ſuffulcit. Hoc enim homines, quum breuiori ductu ipſis uena  
quā illis animalibus ducatur, carent. quanquam Galenus, ex ſimijs & ca-  
nibus coniecturam faciens, hunc lobum etiam hominibus tribuerit. Præ-  
ter diſtācias, à membranarum, quā dorſo, peſtori & ſep̄to committuntur,  
efforma-

a 2 ſidex.  
tra G, G,  
H. ſiniſtra  
I, I & K  
inſignitur.

b 7 muſc.  
tab. A. & c  
fig. 1, 1.

c 6, 7 fig.  
ca. 19 lib. 1.  
d 2 fig. G,  
G diſtānt  
ab 1, 1.

e 1 ſi. cap.  
19 lib. 1. D  
ad b.

f 1 fig. K.

g ab n ad l  
7 muſc. tab.  
h 3 fig. C,  
D, E, F, G,  
dein quę  
habetur in  
B, B 4 fig.  
i 14, 15 ſi.  
lib. 1 A, B,  
C, D. dein  
T, V. & hu-  
ius lib. 12  
fig. A, A,  
h 7 muſc.  
tab. 1.



efformatas, alia occurrit illi quæ septo cōtinua est, quodammodo cōmunis, & ad cordis effigiem extructa. Præsentem enim membranæ in ipsarum medio cordis inuolucrum, & in ipso cor, uti diximus, complectuntur, & pro huius mole formaq; dextra membrana à sinistra in thoracis cavitatis latera abscedit. His in<sup>m</sup> medio nulla, nisi perquam rarè, adnascitur pinguedo: exterius uerò quæ quæq; suam thoracis respicit cavitatem, multo sæpe, ac præcipuè in hominibus, adipe abundant, adedò ut omento quibuscūq; partibus similes, & pinguioribus interdum uideantur. Præter adipem, ipsis adnascitur glandosum corpus, uasorum distributionibus in iugulo præfectū. Venis quoq; ac arterijs abundant, sed tenuibus, ac illis quæ per omenti mēbranas digeruntur perquam similibus. Venæ quidem non à caua, ubi septum permeat (quantum ita Galenus docuit) initium ducunt, sed potissimum ab illis quæ deorsum à iugulo pectoris ossi exporriguntur. Illæ enim uenæ ac arteriæ secundum harū membranarum ad pectus connexū descendentes, in progressu surculos dispergunt ex anteriorib. in posteriora pertinentes. Deinde aliquot soboles his membranarum à uena cōiugis experte offeruntur. At præter has plerunq; & potissimum in hominibus, alia notatu dignæ crassitudinis à iugulo secundum utriusque membranæ longitudinem deorsum ad septum usq; deducitur uena, septi neruo concommitata. Septi enim transuersi nerui externæ membranarū sedi adnati, deorsum protenduntur, equali ferè interuallo à pectore & dorso in progressu distantes. Atq; hi solūm nerui cum uasis & adipe externæ membranarum regioni, quæ pulmonem respicit, adnascuntur, eaq; læuis quodammodo, & aqueo quasi humore oblita uisitur: interdū etiam aliqua ex parte pulmonem adnatum possidens. Interna uerò membranarū sedes undiq; aspera est, tum propter fibras membraneas, quibus inuicem membranæ cōmittuntur, tum eas quibus ualidissimè cordis inuolucro adnascuntur. Mēbrana istæ ea membrana qua costæ succinguntur aliquid tenuiores existūt, ab hac omnibus illis sedibus quibus ipsi committuntur exortæ, primarioq; usu in hoc creatæ, ut cordis inuolucrum, ac proinde ipsum quoque cor, ne deorsum ac retrorsum concidat, in sua sede contineant. id enim (& si ab alijs minimè animaduersum fuerit) uiuorum & mortuorum sectio luculentissimè (si animū modò adhibueris) ostendit, quacunque ratione has membranas aggressus fueris. Deinde ad uasorum securiorem ductum auxiliantur: & postremò ex uniuersa thoracis amplitudine duas efficiunt cavitates, qui usus haudquaquam minimus censeri debet: quandoquidem huius beneficio altera thoracis cavitatem ex uulnere pertulsa, & pulmone hac sede propter aerem per foramen ingredientem à motu cessante, altera cavitatis adhuc illæsa animali famulatur, quemadmodum in uulneratis hominibus, & è uiuis brutorum sectionibus frequenter discimus. Num autem ab his membranarum, an uerò à membrana costas succingente organa in thoracis cavitatem reposita, ascliticiæ tunicas inuolucraq; mutuuntur, hic contentiose haudquaquam disceptandum duxerim: quum planè idem usus, quod ad eiusmodi tunicas uasorumq; connexus spectat, intersepientium membranarum & membranæ costas succingentis censendus ueniat. Præterea neutiquam inuestigandum est, num præter membranas singulis costis perinde ac reliquis ossibus orbiculatim circūdatas, una tantum in uniuerso thorace costas intus succingens sit membrana, quemadmodum eam descripsimus: num uerò duæ sint statuendæ: ut una quidē dextra esset, ea scilicet quæ dextram thoracis cavitatem succingeret, una cum dextra intersepiente membrana: alia autem sinistra, quæ ibidem thoracis cavitati

Quæ intersepientium membranarum cōstitutionem subeat.

Tum alibi sapientia, tū falsa in Aristotele argumenta conijungens, in de placitis Hip. & Plat.

Intersepientium membr. superficies & connexus.

Ortus.

ffsa.

qq obduce-

1. fig. L. 2  
fig. M. 1  
m. 2. fig. L.  
L.  
n. 2. fig. H.  
K.  
o. 2. fig. L. 5  
Q. Q. Q.  
et tota 4  
fig. eiusd. F.  
p. 2. fig. F.  
q. 1. fig. O.  
O. & Q.  
r. iuxta B  
fig. ea. 6. li.  
s. aut hic 5  
figure D.  
s. 1. fig. M.  
N. 2. fig. B.  
C. D. B.  
t. fig. cap. 6  
lib. 3. ff. F.  
u. 1. ff. Q. 1.  
c. 1. ff. P. P.

x. 2. fig. H. K.

y. 2. fig. L. L.

obduceretur, & eius sedis interdiuidentem membranam simul efformaret. quod prorsus non esset absurdum, essetq; peculiaris differētia, qua succingens costas membrana à peritonæo distingueretur, quum id unicum reuera sit: illa autem tunc duplex haberetur, quemadmodum etiam Galenus libro septimo de Administrandis sectionibus utrunq; manifestè censuit.

## DE ASPERA ARTERIA.

## Caput. IIII.

*A d spectandam asperam arteriam harmoniam in primis conducunt figurae trigessimioctavi Capituli libri primi, deinde ex qua trigessimoprimo Capituli libri secundi præponuntur.*



*Aspera arteria  
situs.*

**T**ERTIO libro, ubi<sup>a</sup> arteriarum è corde initium petentium complectebat seriem, traditum est, quib<sup>a</sup> arteria cuius historiam modò aggredior, simpliciter quòd aërem continet, arteria ueteribus primùm fuerit appellata, & quì temporis successu, quū & uasa uitalè spiritū sanguinèq; impetu ruentē ex corde deducunt, & in uenarū numero nō amplius habita, arteriæ etiam nomine donantur, hæc quidem uasa læues arteriæ, illa uerò asperæ, ab inequali qua cōstat substantia, sint nuncupata. Atq; ita eò nomine ad hunc usque diem aspera arteria nobis est obuia, quam nō homines modò, uerū & animalia quæ pulmonem nanciscuntur omnia, unicam habent longo ductu, instar caudicis cuiusdam, ex faucibus deorsum protensam, & dein frequenti sobole per pulmonis substantiam excurrentem. In faucibus enim<sup>a</sup> duobus narium foraminibus in oris amplitudinem pertinentibus, alia duo in humiliori faucium sede correspondent: quæ quidem non secundum latus, ut illa, mutuò contermina, sed unum altero prius cernuntur. Ac horum quidem posterius stomachi seu uia<sup>a</sup> cibum potumq; ex ore in uentriculum deducētis initium existit: anterius uerò, asperæ arteriæ principium est, quæ hinc deorsum rectà nusquā in latus declinans, secundum colli longitudinem ad quartam usq; thoracis uertebra ducitur, tota posteriori sede substratum habens stomachum, uertebra<sup>a</sup> corporibus, primoq; dorsum mouentium musculorum pari absq; alterius organi medio innitentem. unde etiam aspera arteria à uertebra tantum remouetur, quanta stomachi est crassities. Porro anteriori asperæ arteriæ sedi non eadem toto ductu prætenduntur. in elatissima nanq; sede, ubi oris spectat amplitudinem, os u<sup>a</sup> imaginem referens cum suis musculis & cute, ipsi prælocatur. Hinc uerò ad iugulum ac pectoris ossis elatiorem usque sedem, præter cutem & illi<sup>a</sup> subditum ex carnosa membrana musculus, arteriæ asperæ obtenditur \* bifidus musculus, qui à pectoris osse enatus, ossis u<sup>a</sup> referentis anteriori parti inseritur, & deinde<sup>a</sup> alij duo à pectoris quoque osse in humiliorem scutiformis cartilagineis partem pertinentes, proximè arteriæ hîc incumbunt. Vbi uerò thoracem ingreditur, principia quoque<sup>a</sup> musculorum ex clauiculis & pectoris osse ad<sup>a</sup> mamillares in capite processus deducuntur, tanquam propugnacula ipsi quoque præfiguntur. In iugulo<sup>a</sup> glandium inibi uasorum distributioni subseruiens, & uasa ipsa præter pectoris os illam obtegunt. Quod tamen ipsius corpori proximum est, in iugulo quidem est glandium, & paulo demissius in thoracis cavitatè<sup>a</sup> ramus arteriæ magnæ in<sup>a</sup> soporales arterias præcipuè distributus, quæ unà cum sexti paris cerebri<sup>a</sup> neruis, & p<sup>a</sup> internis iugularibus, asperæ arteriæ lateribus uicinè attenduntur. dein ad laryngis radicem utrinque<sup>a</sup> glandulosum, sed rubicans corpus (quod postea expressius describemus) ipsi adna-

*Ipsi commissæ  
corpora.*

a fi. cap. 12  
lib. 3. & 3  
fig. cap. 15  
lib. 3.  
b 1. 3. fi. ca.  
38 lib. 1.  
c 2 fi. ca. 12  
li. 1. n. o. & 2  
6 musc. 14.  
utrinque ad  
E.  
d Posset illa  
firre uetere  
ex 3 fig. ca.  
21 lib. 2. ut  
unum esse  
inter L. & 1.  
l. alteri ne  
ro ipsum su  
perius H.  
e 7 musc. 14.  
E subijciunt  
F. quod pri  
usquā præ  
scinditur  
incubebat  
super B & C.  
D.  
f 1 fi. ca. 21  
lib. 2. A. aut  
4 musc. tab.  
F cū R. Q.  
S. T. V.  
g 3 muscul.  
tab. F.  
\* 4 muscul.  
tab. S. T.  
h 5 musc. 14.  
alter F. no  
tatur, aut 1  
fi. ca. 21 lib. 2  
G in g pri  
ma fig. aut  
4 aut 6.  
i 4 tab. 10.  
k 3. 4. 3 fig.  
ca. 6 lib. 1. k.  
l 2 fig. F.  
m 6 fi. R. su  
per Y.  
n fig. capiti  
9 li. 4. infer  
te F. G.  
G.  
o Einsdem  
fig. N et O.  
dein Q. Q.  
S. S.  
p fi. ca. 6 li.  
3 S. aut spe  
cia hîc ult  
mā fig. li. 3.  
q 2. 3. 4. 5  
fi. ca. 21 lib.  
2. M.

112 fig. B.  
aut specula  
1 fig. ca. 23  
lib. 1.  
112 fig. E, G.  
112 fig. F, H.  
112 fig. I, K.  
112 fig. L, M.  
112 fig. N, O.  
112 fig. P, Q.  
112 fig. R, S.  
112 fig. T, U.  
112 fig. V, W.  
112 fig. X, Y.  
112 fig. Z, A.

ipſi adnaſcitur. Quū primum uere aſpera arteria ad quartæ thoracis uertebæ corpus uſq; deſcendit, in duos pares bipartita truncos, unum dextris pulmonis lobis, alterū ſiniſtris exporrigit, qui pulmonis ſubſtātia undique amplexi, parem cum pulmone ſedem occupant. Vnde etiā aſperæ arteriæ imaginem uix ulli rectius quā arbori à radicū propaginib. liberatæ aſſimilaueris, cuius caudex in duos primū diſciſſus ſit ramos, & hi rurfus in innumeras ſoboles diſſuſi. Huius nanque caudicis initium, laryngi reſpondebit: totus autem caudex reliquæ aſperæ arteriæ parti à larynge ad quartam uſque thoracis uertebam protenſæ conueniet: rami uerò, eorundemque innumera ſoboles, arteriæ in pulmonem diductibus conferentur. Vt enim caudicis initium radices educens, uarium, neque pari undique conſtans forma uiſitur, ſic & larynx undique pugnantem diſſimilemque figuram obtinet. Superiore enim parte prout aut depreſſum aut erectum ſinxiſis laryngis\* operculum, acuta aut depreſſa obtuſaque eſt. Anterior autem laryngis pars, & latera quoque, anteriorem<sup>v</sup> primæ ipſius cartilaginis ſuperficiem commonſtrant, quæ ſecundū ipſius longitudinem in medio extuberat, illinc lateribus oblique in poſteriora extrorſum procedens. Ad hæc, ut huius cartilaginis ſuperior pars longè amplior inferiore exiſtit, ita etiā laryngis ſuperior ſedes hic latior inferiore cernitur. imò<sup>u</sup> humillima laryngis ſedes, quæ ſecūda ipſius cōſtituitur cartilagine, amplitudinem latitudinem<sup>v</sup> ue reliqui aſperæ arteriæ caudicis ductus adæquat. <sup>a</sup> Poſterior laryngis regio, præcipua ſua ſede quodammodo plana eſt, propter inſignem primæ cartilaginis ad poſteriora ſuis lateribus progreſſum. aliæ enim hæc regio ſecundæ ac<sup>b</sup> tertiæ cartilaginū laryngis gratia, paulo minus toto teres eſſet: uti ſanè eſt<sup>v</sup> humillima poſterioris regionis ſedes, occasione ſecundæ cartilaginis humilius prima<sup>a</sup> procedentis. In poſteriori inſuper ſede, prout tertia cartilago in laryngis cauitatem cōtrahitur, aut retrorſum porrigitur, ita quoque elatiores ipſius apices in interiora exteriora<sup>v</sup> ue magis prominēt, laryngis figurā emutātes. Cæterū reliquas aſperæ arteriæ caudex (ut & arborum caudices ſerè ſolēt) ad ramorū uſque diſtributionē ſibi ſimilis eſt, nō tamē abſolutē. Nā quū cōcidit arteria, neque aere diſtēditur, anteriore quidē parte teres eſt: uerū paulo uidetur latior ac depreſſior, hinc ad latera ſic orbiculatim ducta, ut in poſteriora procedēs, reddatur anguſtior. Atque ita poſterior ſedes anteriore anguſtior eſt & plana, uerſuſque internā ipſius amplitudinē nōnihil orbiculatim impreſſa. Quū autē arteria diſtēditur, ipſius poſterior pars æquē ac prior, & magis quodammodo lateſcit, & in poſteriora tumens, orbicularis teresque, ut illa, efficitur. Eandē formā ſeruant omnes aſperæ arteriæ in pulmonem ſparſæ ſoboles, quæ arborū ramis aſſimilātur, & in omnes pulmonis partes frequētiſſimis germinibus, ut iam dictū fuit, excurrētes, uniuerſam ſeriem illius<sup>v</sup> imagini reſpondentē conſciūt. Externa aſperæ arteriæ ſuperficiēs præter dictā laryngis ſuperficiē inæqualis, ſed interim ordinata ſerie procedens uiſitur: ac quū arteria aere diſtēditur, à tergo quidē leuis inſtar cōtinuæ cuiuſdam mēbranæ eſt, à lateribus. uerò & anteriore regione inæqualis: mēbrana ſcilicet, quæ cartilagineſ mediat, tunc ipſis cartilaginib. magis extuberante, contrā uerò, quū laxa cōcidit: nā tunc cartilagineſ mēbrana ſubſtātia eminentiores protuberant. Ad hæc, inſtar membranarū quæ alijs connāſcuntur partibus, externa arteriæ ſuperficiēs aſpera eſt. Poſteriore etenim ſede fibroſis aliquot nexibus ſtomacho cōmittitur, & ſuperior laryngis regio, quū communem cum ſtomacho tunicam ſortiatur, ualidiſſimē illius tunicæ beneficio ipſi connāſcitur: quemadmodū & larynx ſtomacho firmiſſimē muſculorum

Aſpera arteriæ forma.

Qualis aſpera arteriæ exterior ſuperficiēs.

Connexus aſperæ arteriæ.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

112 fig. B.  
aut specula  
1 fig. ca. 23  
lib. 1.  
112 fig. E, G.  
112 fig. F, H.  
112 fig. I, K.  
112 fig. L, M.  
112 fig. N, O.  
112 fig. P, Q.  
112 fig. R, S.  
112 fig. T, U.  
112 fig. V, W.  
112 fig. X, Y.  
112 fig. Z, A.



opera cōnectitur, qui stomachū amplectentes, primæ cartilaginis laterib. im plantantur. Anterior asperæ arteriæ pars & latera attēsis musculis & uasis, ac præcipuè recurrentib. neruis cōnascuntur. Quinetiā ubi asperæ arteriæ rami

g fig. capiti  
p li. 4. infer  
te Q. Q.  
s. s.

interna asperæ  
arteriæ superfi  
cies qualis.

in pulmonē excurrunt, propter ipsi adnatā pulmonis substantiā minus læues existunt. Ceterū interior superficies etiā si inæqualis pro cartilaginū extuberantia semper sit, læuis tamen, ac uelut unctuosus humore perfusa, neque ullis fibrosis explantationib. aspera existit. & talis quoq; quod ad læuitatē spectat, interna laryngis est superficies: quamuis interim neq; orbicularis, teres ue sit, neq; tuberib. occurrat libera. In humillima enim parte, utcunq; aut arctetur, aut diducatur, orbicularis ad amussim patensq; eodem semper modo, ob perfectum quē secunda cartilago efformat circulū, euadit. in medio uerò quum arctatur, penitus conniuet, nō orbicularis quidē orificij ritu, uerū rectæ instar lineæ seu rimæ ab anterioribus in posteriora protensæ: quæ si dirimitur, aperiturq; ab anteriore parte sensim in posteriora tantisper latior efficitur, donec laryngis interior superficies tota quodāmodo orbicularis teresq; intus spectetur. Quando hæc rima arctatur, & cōniuet, ipsaq; inferior laryngis pars necessariò teres permanet, utrinq; ad rimæ illius latera una conspicitur fouea, aliū quodammodo quā rimæ superficies cōscendens, unde etiam hīc cornuta superficies sub rima cōsurgit. Superficies uerò laryngis supra rimā consistens, prout hæc aut recluditur, aut cōprimitur, etiam differt, nunquā tamen penitus est orbicularis, sed pro rimæ compressu ex posterioribus in priora magis minusq; arctatur. Inferior laryngis operculi superficies cōcaua, superior autem conuexa cernitur. Verū ne longius in asperæ arteriæ forma explicanda morer, ipsius aggredienda est substantia, quæ magna ex parte occurrit membranea & cartilaginea.

b 11, 12, 13  
fi. ca. 21 li.  
2. quarum  
indices spe  
ciab.

Aspera arteriæ substantia, quibus cartilaginibus cōsistatur.

Larynx namque (uti primo libro explicatū est non perfuntoriè) tribus constat cartilaginibus. prima nimirum, quam diffractionum periti scuto asimilarunt: secunda, quam quod nomine destituitur, quasi sine nomine uocauerunt: tertia, quæ gemina est, quamq; uasorum orificijs, quibus aquam manus lauaturis affundimus, respondere arbitrati sunt. Deinde laryngis operculum ipsius quoque conformationem ingreditur, ex cartilaginea membraneaque & pingui substantia (quemadmodum & tertiæ cartilaginis superior pars) constitutum. Reliquum asperæ arteriæ corpus innumeris conformatur cartilaginibus, quæ singulæ circulo correspondent, cui quarta pars sit exacta. Propius enim ad anuli circuli ue perfecti figuram, quam nōnullis uisum est, accedunt, circumferentiam corporū uertebrarum thoracis & lumborū referentes. Cartilagines hæc a specie *στυμοειδής* Græcis appellatæ, & *στυμοί* ab illis insuper dictæ, quibus uniuersa aspera arteria *στυμοί* nuncupabatur, in orbiculo, arteriæ figurā imitantur: corpus tamen ipsorum teres non est, sed quodammodo quadrangulare, multo interim latius quā crassius. Dein non eandem toto corpore seruant crassitiem: in medio enim crassiores sunt quā in extremis, quibus paulatim attenuantur, ac uelut in membranam degenerant. Neque arbitretur quispiam, illorum sententia delusus, qui à perfecti circuli figura cartilagines solum definire prodiderunt, ne arteria stomachum plus æquo comprimeret, eas hanc formam speciemq; in caudice ipsius arteriæ duntaxat seruare, in pulmonis uerò substantia completos effici circulos. quum in pulmonis substantia perinde ac in caudice sese habeant, continua serie æqualiterque mutuo distantes in arteria collocatæ, & hac denique ex parte quandam dorsī ossium suis corporibus contextus speciem proponentes. in qua cartilagines quidem ossibus ui-

i si uisum  
fuerit, seria  
tim specta  
figuras ca.  
38. lib. a.

h confert  
et 15 fig. ca.  
38 li. 1. cum  
humiliori  
bus L. L.  
fig. cap. 14  
lib. 1.

1 spectatur  
id. 1. 2. fi. ca.  
38 lib. 1.  
in confert  
et 15 fig. ca.  
R. R. 1. 2.  
L. fig. ca. 14  
lib. 1.

niant

niunt comparandæ, membranæ autem inter illas occurrentes, cartilagineis ligamentis uertebRARUM corpora colligantibus. Committuntur uerò hæc cartilagine, primùm propriæ cuiusq; cartilaginis membranæ interuentu. Quemadmodum enim omnibus ferè ossibus, ut & laryngis etiam cartilaginib. membrana quædã, eo quòd ossiũ sit inuolucrũ, circumossalis nuncupata<sup>a</sup> obducitur, pari quoq; ratione circulares asperæ arteriæ cartilagine simili mēbrana integuntur, quæ ex demissioribus elatioribusq; sui partibus processus exporrigens, illorũ interuentu cartilagine inuicē connectit, uelut mēbraneum inter duas cartilagine sese respicientes uinculum efformans. Neq; solũ inter cartilagine, ubi ab inuicem æqualiter distant, eiusmodi confurgit uinculum: uerũ etia ab extremis tenuissimisq; cartilaginũ partib. mēbranei processus educuntur, partes eas ita colligantes, ut cartilagine unā cum ligamēto à processib. illis cōflato cōtinuum ueluti efforment circulũ. His cartilaginib. membranisq; aliæ duæ accedunt mēbranæ, ab usu tunicæ nō immeritò appellatæ.

Atq; una quidē externam arteriæ superficiē undecunq; amplexatur, mēbraneis illis cartilaginũ uinculis pertinacissimè cōnata. Hæc tenuis est, illisq; tunicis par, quas peritonæũ & succingens costas mēbrana quæ ipsis affirmatur uasis præbent. Istius tunicę interuētũ arteria cōterminis partib. colligatur, ipsaq; in primis recurrētes neruos arteriæ quodāmodo proprios securissimè defert, uenulasq; laryngem & arteriæ caudicē implicatēs assumit. Altera arteriæ tunica, internam totius arteriæ sedem succingit, & ad cartilaginum inter se colligationis robur plurimũ auxiliatur, exteriore tunica multo crassior & ualidior, multisq; numeris dignior, & interna superficie læuis, pinguiq; quodammodo humore oblita. quamuis interim, non undecunq; eandem seruet crassitiem. quum enim linguæ, labrisq; & palato, & ipsi demũ stomacho communis sit, in laryngis cauitate crassior euasit, & pinguedine inter cartilagine & externam ipsius superficiē obducitur. Vbi uerò rima lingulæ uel laryngis<sup>b</sup> conuiuet, hæc tunica utrinq; ad latera dura callosaq; efficitur, ac cum substantia colorem quoque immutat: ut enim hic tanquam à frequenti, dum spiritum retinemus, compressu callosior euadit, ita quoque magis ibidem candicat, albescitque. Ea parte qua interior tunica ramos arteriæ per pulmonis substantiam diffusos succingit, tenuior longè quàm in larynge uisitur: in caudice uerò arteriæ, medio se habet modo. Per uniuersæ tanē arteriæ cauitatem, hanc tunicam rectis fibris quodammodo intertextam esse, ex sectione didicimus.

Quæ etiam ostendit<sup>c</sup> glandulas alterutra parte singulas ad laryngis radicem adnatas, quæ magnæ sunt, & fungosæ admodum, carnisq; propemodum coloris, sed magis nigricantes, & uenis satis conspicuis obductæ: quarum in secundo etiam libro meminimus, quum laryngis prosequeremur<sup>d</sup> musculos, hinc rursus neutiquam, ne prolixior sum, repetendos. Aspera itaq; arteria omni prorsus sanguine uacās, primariò ad aeris in respiratione transitũ ductum uel animanti confert: deinde & uocis organum facile est præcipuum. quibus etiam usibus uniuersa ipsius congruit fabrica. Aerem enim per nares aut os attractum, ex faucibus recta in pulmonem ducit, hunc per uniuersum pulmonis corpus ita numerosa ipsius serie distribuens, ut pulmonis substantia illum promptè alteret, ac cordis muneribus aptum efficiat. dein aspera arteria rursus omnem aerem cordi inutilem unā cum fuliginosis ipsius recrementis inter expirandum per os aut nares commodè, ita ut modò est locata, reddit. Ad quam sanè functionem, hanc instar mēbranei meatus, qui facilè inanitus concidere, atque rursus oppletus distendi posset, extrui conducebat. Quod

n Quia e-  
iusmodi mē-  
branae ac  
aliarũ tenui-  
um tunica-  
rum ratio  
extolli or-  
gani circũ-  
scriptione  
petitur, illa  
q; mēbra-  
ne tantum  
sunt, eas nuf-  
quam deli-  
neauimus.

o 12. fi. cap.  
22 lib. 2. f.

p 6 muscu-  
li. l. 1. c. 2.  
1. 4. 5. fi. c. d.  
22 lib. 2. ff.  
q. intueret fi.  
c. 22 lib. 2.

Qui aspera ar-  
teria cartilagi-  
nes inuicem col-  
ligentur.

Duarum aspe-  
re arteria tuni-  
cæ exterior.

Interior tuni-  
ca.

Glandes laryn-  
gis radici ad-  
natæ.

Musculi laryn-  
gu.

Aspera arte-  
ria uis, ipsi-  
usq; cōstructionis  
ratio.  
Situs ratio.

*Asperam arteriam membrana substantia oportuisse ex-  
trahi.*

enim nisi fuga uacui magnopere replendum est, ac rursus compressionis duntaxat uiuaniendum, distendi comprimiq; aptum esse oportet. Quum itaque inspirationem aeris ue attractionem dilatati pulmonis beneficio fieri omnibus concessum sit, pulmonisq; dilatatio aliud nihil censeatur, quam suorum uasorum distentio, non quidem simpliciter omnium, sed in primis asperæ arteriæ propaginum: quumq; expirationem fieri constet, quoties pulmo in se colligitur, concidit & arctatur, eaque ratione aerem in sua cavitare (uidelicet in asperæ arteriæ ramis) contentum exprimit, propellitq;, cuius ratione cinari promptum est, asperam arteriam, ut & distendi in inspiratione & denuo comprimi in expiratione posset, debuisse fabrefieri. Verum horum munium occasione sat erat hanc ex membranea quapiam nerueaq; substantia, ut uentriculum, stomachum, aut arterias ipsas & uenas construui, neque eam illis quibus abundat cartilaginibus donari erat necesse. adeo sanè ut nunc frustra, quod ad aeris ratione uacui attractionem, & asperæ arteriæ ex illo distentione, & quod ad aeris ob arctatam compressamque asperam arteriam, expirationem attinet, uel aliquam cartilagine rerum Opifex ipsi largitus uideatur. tantû abest, quod illi Opificis industriam ostenderent, qui omnes asperæ arteriæ ramos in pulmonis substantia distributos ex cartilaginibus perfectos circulos constituentibus fabricatos finxerunt, & aliam inibi asperæ arteriæ quàm quâ stomacho prætenditur constructionem enarrarunt: haud perpendentes, si aspera arteria ita extrueretur, pulmonem neque distendi, neq; laxari ita opportune posse: aut saltem in longitudinem, uel breuitatem duntaxat, non autem in amplitudinem asperæ arteriæ ramos proficere educi ue posse. Neque minus illi hallucinantur, qui arteriam hanc apertâ patentemq;, & nõ stomachi modo concidentem efformatam asserunt, quo aeris liberior esset ingressus & egressus: quandoquidè hi præterquam quod laryngis arctatione dilatationeq; ignorant, eo uenere ruditatis, ut ipsos lateat, si aspera arteria cum omnib. suis propaginibus semper æquè tensa aperta q; esset, pulmonē neq; unquam contringendum aut dilatandum, nihilq; uacui fuga in asperam arteriam (ut quæ prius non concidisset) attrahendû. Nā hoc uel ex folliis animaduertere debuerunt, quibus longè aliud artificium ad eam partem quæ aerē reddit, quàm reliquæ follium amplitudini adhibetur. Hanc enim artifices distendi comprimiq; promptam reddunt, ut oppleri inaniriq; possit: non autem ita canalem, quem rigidum faciunt, & uicissim distendi comprimiq; ineptum. cuius naturæ si totus follis esset, quis omnē ipsius usum nos perdituros, ac instar lagenæ uitreæ follem futurû ignorat? Atq; huiusmodi membranæ substantiæ arteriam constituentis est ratio, quæ hanc membranæ debuisse fieri cõmonstrat.

At cartilaginibus abundauit quoque, ut nõ modò respirationis, uerum & uocis quoq;, uti diximus, organum fieret. Quemadmodum enim asperam arteriam læuium arteriarum modò, respirationis nomine membraneam confici idoneû fuisse: ita quoq; ad uocē ampla, rigida, duraq; prorsus fistularû, tibiarum & cornuum ritu effingi debuerat. Quandoquidem ut uox fiat, symmetriam quandâ & robur esse oportet, aeris & substantiæ ab ipso percussæ. Huiusmodi sanè substantia est cartilago, ex qua uniuersam arteriâ solius soni gratia, tibiæ modò extrui sine ligamenti & mēbranæ oportuisset. Verum quum absq; inspiratione ac expiratione uox fieri nullo oportuerit modo, illiq; compressione ac distentione necessario indigeant, meritò laudabimus summi rerum Opificis solertiâ, qui asperam arteriam simul cõmodum respirationis & uocis organum molitus est. Imò tantam industriâ in laryngis constructione ostendit,

*Cur cartilago aspera arteriæ constitutionem subeat.*



ostendit, ut illa nunc magis, nunc minus claudi possit, & spiritum ex nostro arbitratu ad magnos sæpe usus retinere ualeamus, & uocem nūc grauem, nunc leuem, prout rimam illam (quæ profectò uocis primarium est instrumentum) arctamus uel laxamus. Hæc nanque illa est, quam tibicinarū coniunctis arundinum frustulis comparauimus: ac illi etiam rimæ respondet, quæ fistulis illis inest, quas labris amplectimur. Congruit etiam usu, quamuis non forma, cornuum & tubarum orificijs, quæ ori illa instantes accommodamus. Deinde & organorum quoque fistularum rimis, & illarum etiam fistularum foramini, quas transuerſim inflamus, laryngis rima comparatur. At hæc interim longè omnium eiusmodi foraminum aut rimarum in quibus sonus efficitur, artificium uincit. ut quæ ita extructa sit, ut modò minus, modò magis (uti paulo antè dicebatur, eam laxare, & uarias uoces, non autem unicam duntaxat edere ualeamus: & tanta demum thoraci uis inditur, ut ex nostro arbitratu nunc multum, nunc parum aeris ad solam respirationem, aut ut etiam simul uoci, quam effingere lubet, aer inter expirandum sufficiat, e-mittere queamus. Quàm uerò fuerit necessum secundam laryngis cartilaginem perfectum efformare circulum, & arteriam asperam hic ad laryngis radicem haud posse comprimi, animaduertes, si diligenter uocis generationem ex aere ab ampla uia in strictam, & hinc rursus in latam impetu deducto, fieri didiceris: atque simul<sup>9</sup> gargareonem uocis plectrum & palatum instar rotundi amplique spacij constructum, & cavitatem super id in narium foraminibus apparentem, & utriusque lateris<sup>9</sup> quarti maxillæ superioris ossis cauernas, ac dentes pariter & linguam, & labra rimatus fueris: ac demum musica artificum instrumenta, illarumque partium usum his Naturæ operibus diligenter contuleris. Neque hic in nominum disceptationem incidere uisum est, rixose certando de rimæ huius & laryngis operculi nomine, quod falso uocis proprium, præcipuumque organum plerique recensent: quandoquidem hoc nihil uoci, nisi fortassis ad illius aliquam modulationem accommodat, cibi interim & potus transglutientibus, in laryngem casum (uti primo explicauimus libro) prohibens. Imò præterquam quòd sensu id ad uocem nihil facere ex uera sectione perfectum habemus, ratione id alijs cognitum esse oportuerat. Nullus enim unquam, quo operculum id ageretur, musculus, ab alijs descriptus est: neque etiam ullis mouetur, quàm ijs quos ab osse<sup>9</sup> referente in ipsum inferi commemorauimus, quum interrim reliqui laryngis musculi ad unum omnes rimæ illi dilatandæ uel arctandæ subseruiant. Vti etiam eius gratia omnem laryngis cartilaginum fabricam extructam esse, non sine maxima uoluptate cognosces, si aliquo saltem Naturæ operū cognoscendi studio ardens, uel bruti alicuius laryngē in manus sumptis, artificumque in musicis instrumentis expendis indultriam, Naturæ opera proximè sectantem. Reliquarum etiam asperæ arteriæ cartilaginum in ipsius caudice situm nō esse uulgarē, hinc sanè constat, quòd crassior mediāque ipsarum pars in anteriore sede iniurijs magis, quàm posterior, occurrente spectetur: quodque cartilagine ubi à perfecti circuli figura in caudice arteriæ necessariò propter inspirationē deficiunt, opportunè stomachū respiciunt, quò minus illū cōprimant, minusque ipsius in ciborū assumptione distentionē præpediāt. Tunicas etiā asperæ arteriæ Natura nō oscitater extruxit. externa enim cartilagine instar inuolucri munit, ipsiusque interuētū arteria uicinis partibus colligata firmataque securiùs deorsum prorepat. Interna uerò non solum cartilagine firmius connexura, sed easdem quoque succinctura, & à grauioribus

Laryngis rima  
usum.Vocis genera-  
tio.Laryngis opera-  
culi usum.Cartilaginum  
coordinationis  
ratio.Aspera arte-  
ria tunicas ap-  
te extructas es-  
se.q 6 muscul.  
tab. E.

r 2 fig. ca. 12.

lib. 1. n. 9.

s 12 fig. ca.

g li. 1. r.

t 2, 3, 4 fig.

et 11 lib. 2.

K.

iniurijs munitura, crassior externa euasit. Sæpe enim aliquid pituitæ inutilis à capite per arteriã defluit, nec non potus aliquid & cibi inter deglutendũ in illam illabitur. Præterea acris quædã qualitas, uel fumi, uel cineris, uel carbonũ, uel alterius cuiusdã facultatis medicamentosæ, etiam inter respirandũ attrahitur. Adde, pus tussi expectorandũ quandoq; esse malignũ & erodēs: dein alius quis humor, utpote flaua bilis, ac atra, aut pituita falsa intus putredinẽ experta, per asperã arteriam interdũ efferri debet: à quibus omnibus obducta cartilaginibus tunica, ne illæ radantur, & rosionem alterationeq; ab his non sine graui ipsarum uitio sentiãt, præcauet. Atq; ut larynx eiusmodi noxijs (nimirũ ori uicinior) magis subijcitur: ita quoq; & tunicã hãc paulo crassiorẽ obtinet, quàm extremi arteriæ furculi, in quib. tunica tenuior euasit, ne plus e quo pulmonis substantiæ aerem cordi tẽperantis uim obtunderet, & aeris in uenalis arteriæ germina assumptionẽ, & rursus cordis fuliginosorũ in asperẽ ramos attractio nem prohiberet. Ceterũ pinguedo inter tunicã hãc & cartilagine in larynge potissimũ reposita, ipsaq; etiã tunica hic pinguior simul cum uiscido, quoundiq; oblinitur, humore, ad facilẽ aeris ductum cõferre uidentur: atq; etiã ne in magnis clamoribus, multisq; motib. exiccetur, uoxq; deficiat, plurimũ accommodare. Huc quoq; faciũt asperæ arteriæ ad laryngis radicẽ utrinq; appositæ glandes. humore siquidem meatum imbuunt, nõ fluido quidem, sed uiscido & pingui, quemadmodum & ipsæ crassiores spissioresq; cæteris humorem procreantibus glãdulis sunt. Quantus uerò eiulcẽ humoris ad uocẽ usus sit, indies fistulas humectante oleo inungi uidentes docemur. Neq; profectò eiusmodi humore procreando illæ tantũ quas diximus glandes sufficiunt, uerũ & alię laryngi accumbunt, quarũ historiam priuato Capite subijciemus: simulatq; hic insuper admonuerimus, humorem illum à glandulis continuò paratum, ad mutuam quoque illam laryngis & stomachi eleuationem & de tractionem, quæ in deglutientibus & respirantibus accidit, haud mediocriter ex usu esse: perinde ac miris modis illi etiam opitulatur interioris asperæ arteriæ, cum interiori tunica stomachi nexus & continuitas. Eius enim propemodum beneficio, quum stomachus cibum aut potum transglutit, ac trahendo seipsum quasi deorsum uellit, larynx pulchrẽ assurgit, & ueluti in oris cavitatem ducta, posteriori sua sède solida, & non ut reliqua posterior asperæ arteriæ pars membranea, accedens, illud stomachi munus haud impedit. quemadmodum etiam inspirantibus, arteriaq; aspera ueluti attractionem moliente, larynx deorsum fertur, fauciumq; angustia, quo minus ipsius rima commodẽ aperiri queat, non obsistit. Vnde etiam larynx (quæ expirantibus uocemque modulantibus sursum fertur) tanto magis ex faucibus uersus iugulum descendit, quo maiorem ipsius rimæ dilatationem molimur: huc sanẽ opem ferentibus musculis, qui à pectoris ossẽ pronati primam laryngis cartilaginem in ea functione deorsum protrahunt.

Pinguedinis et  
glandulariã la-  
ryngis ratio.

Laryngis &  
stomachi mus-  
culi ascensus et  
descensus ra-  
tio.

¶ 2 fig. ca.  
15 lib. 1.

¶ 5 mus. te.  
P. 17. 12 fig.  
cap. 11 lib.  
2 G.

## DE FAUCIUM GLANDVLIS.

## Caput v.

TRIPLEX glandium genus in faucibus repositum, uarijs spectatur figuris. Ac primum quidem genus sexta musculorum tabula L insignitur: & in secunda figura, tertia, quarta, quinta Capitis ingesimiprimi libri secundi A. Secundum uerò genus sexta quoque musculorum tabula F indicatur, & decima quarta quinti libri figura E, E. Tertium autem in prima musculorum tabula A notatur: & in quarta, inter G, Q, Z consistit.

QVONIAM

a 6 muscul.  
tab. L.  
b 6 muscul.  
tab. F. C  
i muscul. A



c fig. ultimi-  
marum li.  
v. a G ad 1.  
aut quod  
complectitur  
in effra-  
ctam maxilla  
fexte tabul.  
muscul.

d Post E 6  
muscul. tab.  
e figura ca.  
21 lib. 2.  
f. 2. 3. 4. 5 fig.  
ca. 22 libri  
2 H.  
g muscul. ta.  
L. 11.  
h 6 tab. D.  
i. 3. 4. 5 fig.  
ca. 6 lib. 1 P.  
h 5 ta. H. 1.  
l 1 fig. ca. 2  
li. 3. T. X. e.  
g. n. v. 7.  
m fig. ca. 6  
lib. 1 S.  
n fig. ca. 12  
li. 3 X. ad. 4.  
aut specia  
ultimam fi.  
lib. 3.  
o 6 muscul.  
tab. L.  
p 6 muscul.  
tab. F.

q 6 muscul.  
tab. E.

r muscul. ta.  
A. 4. ta. in-  
ter G. Z.  
Q.

VONIAM nonnullarū<sup>a</sup> glandium asperā arteriā hume-  
ctantium paulo antē mēti incidit<sup>b</sup> aliāq; eiusdē functio-  
nis gratia creatæ illis accumbunt, non inopportunē eas  
quoq; hic simul, de nominib. interim haudquaquā anxie  
disceptaturi, prosequemur. Nō minus enim modō, quā  
aliās, ingenti nominū pelago fluctuamus: ex quo ut emer-  
gamus, fauces nobis citra omnē contentionē uocari liceat  
Fauces,  
uelim, uniuersum spaciū ab<sup>c</sup> inferiori maxilla intus circumscriptū: illud dico,  
quod in profunditate ab interna mēti sede ad ceruicis usq; uertebraū corpo-  
ra pertingit in latitudine uerō, quicquid inter dextrā inferioris maxillæ partē  
& sinistram habetur. Hoc enim φάρυγξ ueteribus Græcis uocatū arbitror: quo  
nominē & laryngē, tanquā huius spaciij dignissimā partē, aliquando donarūt:  
Suidē distinctionē parum obseruātes, qua masculini generis uocē laryngi ac-  
commodat, fœminini uerō faucibus. Eundē locū & ἰσχυρ<sup>d</sup> ab angustia nuncu-  
passē uidētur, quod nulla in uniuerso corpore sit regio equē angusta, & tot in-  
terim organis infarta. Hac enim sede nariū<sup>e</sup> foramina in os descendūt, & hic  
reperiuntur larynx uniuersa, stomachi initium, linguæ<sup>f</sup> radix cum ossē vima-  
ginem exprimēte, ac numerosis illarum partiū musculis: præterea & musculi  
maxillam mouētes, tum<sup>g</sup> qui ab ossis cuneū imitātis<sup>h</sup> processib. instar alarum  
efformatis originē sumunt, tum<sup>i</sup> qui nō nihil huius etiā angustie causa in me-  
dio excarnes facti inferiorē maxillā deorsum uellūt. Adde præter tertij, sexti,  
septimi pariū cerebri neruorū<sup>j</sup> propages,<sup>k</sup> uenas iugulares, & arterias sopo-  
rales, & quas nūc lubēs enarrare glandulas hic cōtineri. Est aut harū genus tri-  
plex: ac<sup>l</sup> unū quidē, quod iuxta laryngis radicē asperę arterię laterib. adnatū, in  
præcedēti Capite recēsuimus.<sup>m</sup> Secundū uerō elatius laryngi apponit: quippe  
in spacio quod nobis hiantib. mediū inter nariū foramina & laryngē apparet,  
utrinq; in laterib. una reponitur glādula utcunq; insignis, & glādi forma per-  
quā similis. Oblōga enim est hæc glādula, ac secundū longitudinē sursum  
ac deorsum exporrigitur, cōmuni oris tunica, sed ea hic quā alibi tenuiore  
fungosiorēq; uestita. Substantia cōstat alijs ferē glandib. simili, at impenfius ra-  
riore, in hocq; propria, ut saluā procreet, ac asperā arteriā & stomachū quoq;  
cum tota oris amplitudine humectet. unde etiā apud Hippocratē quarto de  
Morbis uulgarib. libro, glādula istæ spongiarū nomen obtinuerūt. Vocantur  
autē insuper Græcis ῥιζομα, fortassis nō tam quod his angustijs cōtineantur,  
ac quod<sup>n</sup> gargareonis latera respiciant. Si enim hiantis oris cauitatem intuear-  
is, atque foramina narium & gargareonē obserues, quid aliud hīc foramina  
quā duo uelut maria, ipse autem gargareo instar angustæ terræ inter illa de-  
ductæ apparebunt: adeo ut nihil obstitit, gargareonem ἰσχυρ<sup>o</sup> aliquando à  
Veteribus, qui pueros in cadauerum sectionibus exercebant, nuncupatū fuisse  
arbitrari. Aliās enim si ad loci angustiam, instrumentorumque hac in sede  
frequentiam, animum duntaxat adhibuerimus, glandes asperæ arteriæ ad-  
natæ, quum in maioribus angustijs, quā secundū hoc glandium genus  
reponantur, ῥιζομα uocandæ forent. uerū quum illas ab Anatomes pro-  
fessoribus descriptas fuisse, hæcenus non obseruauerim, magis secundum ge-  
nus (quod etiam nimis quā oscitanter alij enarrarunt) ita appellandum du-  
xerim. Cæterū secundum hoc glandularum genus amygdalis quoque as-  
similatum, Græci etiā ἀμυγδαλας, ab opposito sibi inuicē forsan situ nuncupaue-  
runt, quam uocē interpretes tonsillas & amygdalas uertunt. Quamuis hæc  
posteriora nomina<sup>p</sup> tertio glandoso huius sedis generi quidam attribuisse  
uideantur,

Fauces,

ἰσχυρ<sup>d</sup>,

Triplex in fau-  
cibus glandiū  
genus.  
Primum.  
Secundum.

ῥιζομα,

ἀμυγδαλας,



uideantur, ignorâtes interim cum primo genere secundū. Nō tamen hic prætereundum est, Græcos, quū tumores præter naturā enarrant, glandularū quæ in faucibus sibi opponūtur, ac secundū glandularum genus cōstituunt, inflammationes *αἰμάδας* nuncupasse, & *κυστιμια* inflammationē glandularum, quæ in faucib. sunt: nō adijcienes, quæ nā illę censeantur. Porro tertiu genus, inguinum & axillarū glandibus respondet. numerosum enim sub auriū radicibus & uniuerso spacio inferiori maxilla circumscripto continetur, ac cauitates omnes exactē implet, uasorumq; diductib. distributionibus uē præfiscitur, has partes quoq; sua humectādi ui imbuens. Hoc glandularū genus nullo peculiari donatū est nomine: uulgus tamen hic in ijs quib. uescimur animalibus, & potissimū in syluestrib. porcis, ut & reliquis glādulas, in delicijs has quoque habet, ac Animellas seu Lacticina (perinde ac glandiū in iugulo repositum) nuncupat. Nū uerō & istas quoq; Græci *κυστιμια* appellauerint, sciremus sanē, nisi temporū iniuria Marini uiginti de Cōsektionibus libri, cum Græcorū omnium qui quicquā in Anatome dignū præstiterūt operibus, maxima ex parte intercidissent. quartus enim Marini liber inter cætera glādulas tractabat. Vt cunq; uerō sit, hoc tertiu in faucibus glandularū genus nō minus quā cætera duo ob uarios quib. implicatur affectus, & scrophulas præcipuē, perpendendum uenit: hocq; in primis tempore, quando non id solū genus, uerū & alia duo simul cum palato & gargareone Gallicus morbus miserē exercet.

Tertium in fau-  
cibus positū  
glandium ge-  
nus.

s. muscul.  
tab. I.

t. 2. fig. 7.

## DE GARGAREONE. CAPVT VI.

*I n hiante ore gargareonem circa dissectionem uidere est, quanquam in sexta musculorum tabula E inscribitur, in septima uerō A.*

Gargareonis  
nomina.



STA quoq; corporis particula pluribus donatur nominibus. gargar enim, gurgulio, gargareon, sibilus ac tintinabulum à uoce ac fonitu nūcupatur. Quia uerō instar uuæ superius angusta, inferius uerō globi instar rotūda aliquando, dū inflammatione corripitur, propēdet, Vua, seu *σφαγίς* appellatur. Deinde quod caudę muris, aut colūnæ modo extensa interdū ex humorū affluxu particula hæc producatur, ut & affectus ille, *κυστιμια* ac colūnella dicitur. Porro quoniā secundū naturam se habens, superius latior, inferius aut strictior uisitur, fundibulū aliqui eam uocauerūt. at nomina sonitus occasione ipsi indita, à multis toti laryngi, ab aliquib. uerō laryngis tantū operculo, etiam accōmodantur. Ceterūm gargareonis (ita enim particula ista in nostris scholis frequentib. appellatur) situs, forma, color, ac omnia ferē huc pertinētia, nō minus quā externa unguiū superficie euadēt cōspicua, si alicuius hiantis os inspicere nō piguerit. Vnde etiā horū enarrationi prolixius quoq; haud immorandū est. Oblōga cnim tūc spectantib. occurrit particula fungosa & carnea à palati fine, ubi nariū foramina fauces spectāt, in oris amplitudinē propendēs, superius ubi palato cōtinuatur latior, inferius pyramidis inuersę instar acutior. Venulas quasdā ex uasis palati tunicā adeuntib. in ipsius medio assumit: neruis aut non admodū participat. Porro gargareōis priuariū usum uocis modulationē esse, ac illū homini ad sermonē plurimū opitulari, argumēto sunt, qui hunc præfectū alias uē derosum habēt: dein quod soli homines, auiūq; quēdā tantū genera hoc donari uident. adeo sanē, ut nō immeritō uelut quoddā uocis plethrū, ita ad cauū palatū pendēs cēseat. Secūdario aut ad aeris attractionē, ne scilicet nimīū frigidus in pulmonē feras, aliquid & homini accōmodare creditur, quū his quib. gargareo præse-

Gargareonis f-  
m. forma, sub-  
stantia.

vsu.

d. 2. 3. 4. 5. 6  
f. ca. 21. lib.  
2. L.

præfectus est, frigidus aer impensius quàm cæteris noxius esse obseruetur. Sic quoq; & ad aeris expurgationem nonnihil conducit. nam puluerem sibi applicat, qui alioquin in laryngē simul cum aere erat assumēdus. At hic usus, quum cætera animalia ad terram magis quàm homo spirantia gargareonē destituantur, parui pendendus uidetur. Quamobrem uerò nonnulli gargareonem excrementorum à cerebro in os descendentium quoddam receptaculū esse tradiderint, non satis assequor, quum gargareon nullam, qua aptè aliquid suscipiat, cavitatem nanciscatur: imò quoties humore imbitur, laxatus muris caudæ forma propendet, aut alio quopiam sibi grauissimo uitio, dum fluxionem suscipit, conflictatur. At nunc tempestiuum erit, pulmonis in quem aer per asperam arteriam ducitur, constructionem aggredi.

## DE PVLNONE. CAPVT VII.

*PVLNONE* ostendit maior præsentia libri figurarum pars, prima uidelicet ad characteres R, S, T, U. Secunda ad N, O, P, Q. Tertia ad L, M, N, O. Quarta ad M, N, O, P. Quinta ad i, k, l, m. Duodecima ad E, F, G, H. Decimatercia ad B, C, D, E. Vasa autem pulmonem implicantia partim exprimuntur prima figura Capitis trigesimali libri primi, partim duabus figuris Capitis decimi quinti libri tercij.

a Vna ad  
dextrā la-  
tus G, G. al-  
tera ad fini-  
stram latus  
I, I. 2 fig.  
b eadē fig-  
et ipsē cha-  
racteres.



c 12 fig. B,  
C, D.

d Inter G,  
G et k, l, fi-  
gura. 2.  
e 7 mus. ta.  
h, l, m, n.  
f Que cani-  
sunt pecu-  
liaria, exi-  
pius petes  
dissolutione.

ITVM pulmonis<sup>a</sup> duæ insigniores thoracis indicant cauitates: in utraq; enim cauitate, inter costas & alterā thoracē intersipientiū<sup>b</sup> membranarū cōspicua, pulmo locatur, perinde ac cauitates illæ, geminus. Huius nanq; pars dextrā cauitatē occupans, illi quæ in sinistra spectatur, propriæ pulmonis substantiæ interuētū neq; cōtinua, neq; etiā con-  
tigua est: quū scilicet ambæ intersipientiū membranarum

Situs pul-  
monis.

Numerus.

medio inuicem dirimantur, & uasorū ex uno caudice in dextrā ac sinistram pulmonis partes digestorū duntaxat beneficio, inuicē sint cōmissæ. Ac dextra quidem pulmonis pars dextrā thoracis cauitatē, sinistra autē læuam ita implēt, ut nihil prorsus in uniuersā thoracis amplitudine, pulmonis substantia nō op-  
pletum se offerat, præter uniuersam regionē quam intersipientes mēbranas in se cōplecti, ac in ipso medio cōstituere diximus. Verūm ut mediæ huius regionis sedē, quæ supra<sup>c</sup> neruofam septi transuersi partē consistit, lōgē aliam in hominibus, quàm simijs & canib. occurrere nouimus: ita quoq; hīc uaria pulmonis obseruatur ratio. Homini namq; in tota ea regione nulla reponitur pulmonis portio, in canibus uerò & simijs ceterisq; quadrupedib. longiorem homine thoracem sibi uendicantibus, ob idq; etiā inter septū & inuolucris cor-  
dis mucronem notatu dignam amplitudinem cauitatemque in membrana-  
rum thoracem intersipientium medio demonstrantibus, pulmonis pars in ea amplitudine sese offert, quæ cauam uenā hāc procedēte per opportunē sufful-  
cit & cōplectitur. Hæc enim pulmonis pars, præcipua sua portione uenā illi sub-  
sternitur, & sinum insuper uenæ conuexo admodum cōtinuē responden-  
tem, sibi insculptum gerit, quo manus ferē modo, uenam continet, ac ueluti tutō deducit: suā alioquin qua collocatur libræ amplitudinis formam per-  
inde exprimens, ac dextra & sinistra pulmonis partes, suas quibus continen-  
tur sedes examusim referunt. Pulmo nanque nulla peculiari indigebat for-  
ma, sed pro accumbentium corporum effigie, ut & iecur ipsum, efformatur, prorsus suarū quibus continetur cauitatum imaginem haud secus assumens, quàm si quis argilla his cauitatib. impressa, pulmonē cōstruxisset. Vbicunq; enim cauitatū sedes cōcauæ sunt, inibi pulmo gibbosus euasit: ubi autem gibbæ  
extuberan-

Pulmonis  
forma.

extuberantesq; uisuntur, pulmo etiam cauus redditur. Quapropter etiam fit, dextram pulmonis partem sinistra iunctam, bubuli, aut ceruini, aut alterius bifulci animalis calcibus, unguibus uel simul commissis, rara quadam similitudine correspondere, aut alteram pulmonis partem unius unguis speciem referre. Tota enim posterior pulmonis sedes, lateraq; anteriori unguum regioni, ac lateribus adamsim conueniunt. Quemadmodum enim unguis anteriori parte lineae impressione; inuicem dirimuntur: ita quoq; & posterior pulmonis sedes huic lineae similem omnino impressionem, prominentium in thoracis cauitatem uertebrarum corporum occasione, obtinet. Et ut impressio hæc, secundum unguum longitudinem gibbumq; modice obliquatur: ita quoq; & pulmonis hac sede impressio secundum dorsum in exteriora incuruationem ducitur. Rursus ut unguis anteriore parte magis quam posteriore, contigui uidentur: ita & pulmo ipse, eo quod intersepientes membranæ ab inuicem multo minus ubi dorso committuntur distant, quam ubi pectoris ossis proximæ sunt. Deinde reliqua pulmonis posterior pars & latera, propter thoracis costarum inflexus, ut & unguis ipsi, gibba cernuntur. Porro unguum parti quæ ter ræ innititur, pulmonis regio septum transversum spectans, exactissimè congruit. Hæc enim, quemadmodum & illa, subcaua uisitur, propter gibbosam lepti hac in sede imaginem. Cæterum pulmonis regio pectoris os respiciens, ipsius uel anterior pars, adamsim refert posteriorem unguum sedem uniuersam, quæ terram non contingit. Ut enim illa utrinq; orbicularis est, & amplo interstitio dehiscit, ita etiam hæc pulmonis regio: quæ tanto posteriore etiam sede breuior est, quanto posterior unguum regio terram non contingens, longitudine ab anteriore uincitur. Cæterum alia adhuc impressio hætenus non commemorata pulmonis illic accidit, quæ a lateribus intersepientium membranarum accumbit. Harum namq; latera quum corinibi contineatur, utrinq; extuberant, gibbumq; efficiunt, cui proportionatum sinu pulmo sibi uendicat, illi correspondentem, quem inter unguis illic cernimus, ubi duriores pili in ipsarum medio occurrunt. Atque hæc de humano pulmone subaudita uelim, eoq; non flaccido, sed ut secundum naturam thoracem implet, distento. Aliàs enim quum concidit, atque in lobos seu fibras insigniter distinctus uisitur, elegans hæc propriaq; pulmonis forma deperditur. Vtræq; enim pulmonis partes in duos distinguuntur lobos, membranis fibris in hominibus inuicem hærentes, neq; ita inter rescandum separatu, ac in cane, promptos. Hoc loborum interstitium obliqua perficitur linea, e regione propemodum quartæ thoracis uertebræ incipiente, & oblique deorsum in priora, quasi ad pectoris ossis mucronem protensa: sic ut humilior lobus superiore existat longior. Neque etiam perpetuò in duos solum lobos pulmonis partes secantur, uerum aliquando in tres, interdum in nullos, aut duos ita inuicem nexos, ut sectionis potius nota, quam reuera distinctio in quibusdam hominibus uideatur. Lobum autem qui in canibus simijsq; cauæ uenæ caudicem suffulcit, ut iam antea dixi, nunquam in homine obseruauimus, & hunc illo destitui certo certius scio. Quamuis interim Galeni locus in septimo de Administrandis dissectionibus, mihi memoria non exciderit, quo inquit: quintum hunc pulmonis lobum eos non latere, qui rectè sectionem administrant: innuens, Herophilo & Marino eiusmodi lobum fuisse incognitum, uti sanè fuit, quum illi hominum cadauera, non autem cum ipso simiarum ac canum duntaxat aggredirentur, in quibus præsentī lobo nihil est manifestius: quemadmodum hominem secanti pulchrè etiam constat illum deesse, tum quod id sensus indicet,

g. 13. si. quæ  
immissam  
finges o. mu  
scul. tabu  
le thoraci.

h. 12. fig. G,  
H.  
i. 1. fig. I, I.  
k. 1. fig. M.  
O. P. Q.

m. 1. fig. T.  
V.

n. 1. fig. L. 1.  
fig. N. 1. M.

o. V. in 3. et  
5. figuris.  
p. Singulis  
lotis singu  
lor alibi  
characte  
res, it. i. s. si  
guis qui  
bus pulmo  
se offert.

q. Pete. hinc  
ex alieutis  
quadruped  
dis pulmo  
ne.

In quos lobos  
fibras pul  
mo diuiditur.

In lamine un  
tum pulmonis  
lobi canis cau  
decem sufful  
cit.

tum



15 fig. D. tum quodd' uena septum permeans simul cordis penetrer' inuolucrum, neq;  
 6 fig. N. aliquod prorsus sit interuallum ductus cauæ inter septum & inuolucrū, qua-  
 14 fig. B, B. le in canibus longissimum uisitur: unde etiam in illo, uena caua meritò hoc  
 quinto lobo tanquam à manu quapìa suffulciri amplectiq; debuit. Pulmo ex-  
 terna superficie læuis undiq; est, & ueluti humore lento madidus. attamen in  
 plerisq; hominibus non infrequenter hæc superficies aspera earum membra-  
 narum modò conspicitur, quæ inuicem cōnascuntur: quandoquidem in illis  
 iam dextra pulmonis pars, iam sinistra, iam utraq; etiam pertinacissimè thora-  
 cis lateribus fibrosarum nexuum interuentu colligatur, adeò ut id hominibus  
 quodammodo peculiare esse uideatur, ut & fuscus quidam, non autem can-  
 dente rubore rubeus color, & quædam instar nubium oblineatio, ac in colore  
 inæqualitas, in hominum pulmonibus conspicuntur: non quidem in laqueo  
 suffocatis solū, aut aliquandiu mortuis, uerū & in illis quibus adhuc uiuen-  
 tibus cor execatur: quamuis tamen sensim mortuis pulmones intensius ni-  
 gricent, concidantq;. In alijs itaq; animalib. non nisi perquam rarò, pulmo ulli  
 thoracis parti membranarum fibrarum medio hæret: connexus autem qui  
 uasorum sit beneficio, illis perinde ac hominibus censetur communis. Aspe-  
 16 fig. X. 12 ra enim arteria dorso colligata, & in pulmonem profecta, omnibus animali-  
 13 fig. A. bus eum æquè dorso alligat, & uena quoq; arterialis & arteria uenalis simi-  
 11 6 fig. 1. 12 liter illum cordi connectunt. Pulmonis substantia, caro est mollis, fungosa, ra-  
 12 fig. C. ra, læuis, aerea, ac uelut ex spumoso sanguine spumâ ue sanguinea cōcreta, mul-  
 10 6 fig. G. 12 tisq; uasorum germinibus scatens. Vasa sunt tria. ac primum quidem est aspe-  
 10 fig. D. ra arteria, quam iuxta quartæ thoracis uertebræ corpus in duos truncos didu-  
 11 11 fig. C. 18 ci innuimus, quorum dexter in dextram pulmonis partem, ut sinister in sini-  
 11 11 fig. B. stram, exporrigitur, & primum in duos ramos sectus, ac his rursus in plures,  
 hisq; rursus in alios diuisis, multiplici sobole pulmonē intertextit. Secundum  
 22 fig. C. 15 uas uenalis est arteria, tertium autem uena arterialis, quarum in tertio libro  
 11 11 fig. 15 cum reliquis uenis ac arterijs necessariò mentionimus. Adeò ut de illis hic nihil  
 11 11 fig. C. planè amplius, donec ad cordis constructionem deuenimus, repetendum  
 sit. Hæc uasa similiter ac aspera arteria in pulmonem ea digeruntur serie, ut  
 arterialis uenæ rami, asperæ arteriæ propaginum posteriori sedi attendantur,  
 uenalis uerò arteriæ soboles anteriori. Atque hæc uasorum digestio undecun-  
 que ad externam usq; pulmonis superficiem adamussim feruatur, nō situ mo-  
 dō semper sibi similis, uerū & magnitudine etiam. Vt enim multo maior  
 est arteriæ asperæ truncus pulmoni insertus, uenæ arterialis & uenalis arteriæ  
 primis in pulmonem implantationibus: ita quoque uniuerso per pulmonem  
 progressū, totaq; ramorum serie, soboles asperæ arteriæ ampliores, patentio-  
 resq; uenarum & arteriarum furculis existunt. Huic innumero uasorum im-  
 plexui, ea quam diximus pulmonis caro intertextitur, atque omnes uasorū am-  
 plectens furculos pulmonem efformat: quem admodum propria iecoris sub-  
 stantia, cum frequenti uenarum sobole iecur constituit. Insuper uniuersum  
 pulmonis corpus non aliter ac iecoris, tenui quadam membranaq; obducitur  
 tunica, principium ab illis uasorum inuolucris ducens, quæ asperæ arteriæ  
 alijsq; duobus pulmonis uasis ab intersepientibus thoracem membranis, seu  
 ea quæ costas succingit, offeruntur. Quū primum enim hæc uasa in pulmonis  
 nis tegmentum degenerat: cui neruuli à sexti paris neruis recurrētes neruos  
 constituentibus, & postmodum in uentriculi superius orificium diffusis com-  
 municantur. Nulli autem, aut perquam graciles in pulmonis substantiā sensu

Qualis pulmo-  
ni superficies.Pulmonis con-  
nexio.Pulmonis sub-  
stantia.

Vasa.

Pulmonis tu-  
nica.

Nerui.

*pulmonis usus,  
& constructio-  
nis ipsius  
ratio.*

non admodum indigentem disseminantur. Pulmo enim in hoc præcipuè factus est, ut aerem cordi (quo potissimum ad naturalis caloris non qualitatem solum, sed sanè & substantiam indiguit) præpararet, ac demum cor, uiscus aliquod sibi appositum haberet, ex quo aerem suis functionibus aptum semper allicere posset: & ne quemuis statim nos ambientem, eundemque aliter non immutatum assumere cogeretur, præcipuè quum Natura non solum cordis occasione quâ plurima animalia respirare uoluerit, uerum & uocis quoque gratia, ad commodam animalis uitam haud mediocriter necessariè. Quod enim à pulmone inter expirandum redditur, uocis optima cèsetur materia. Vnde etiam maximè rerû Opifex uniuersa respirationis organa in eum modum extruxit, ut nostro arbitratu aerem attrahamus, eumque rursus nunc ualidè, nunc remisè uariâque copia expellamus, quâ interim continuus infessusque cordis motus ex nostra uoluntate neutiquam pendeat. Quandoquidem uerò hæc quoque alibi, ac potissimum in thoracis musculorum historia, necessariò latius persecuti sumus, ad pulmonis constructionis rationem nunc sermo accommodandus uenit. Pulmo itaque instar promptuarij cuiusdam in asperæ arteriæ ramos aerem assumit, ut deinde cor per arteriæ uenalis propages ex asperæ ramis, adeoque peculiari pulmonis substantia, illum sibi alliciat: & rursus quod cordi inutile est, per expirationem à pulmone reddatur. Quis igitur asperæ arteriæ sit usus, neminem latet, quemadmodum neque uenalis etiam arteriæ officium multis est incognitum: si quidem id præcipuum sit, ut aerem cordi aptum in se pelliceat, huiusque interuentu cor eundem in sinistrum ipsius uentriculum attrahat. Arterialis uena in hoc maximè facta creditur, ut pulmoni aptum suæ substantiæ alimentum ex dextro cordis uentriculo exporrigat, quod leue, aereum, spumofumque esse oportuit, si modò pulmo facile colligi, & rursus distendi, sequaxque esse debuit. Ad quam functionem, uenalis quoque arteria pulmoni putatur esse utilis. nam & hæc illi sanguinem suo nutrimento aptissimum defert: quo pulmo tum propter ipsius mollietatem, tum propter continuum motum, tum propter caloris copiam, quâ ex cordis uicinia adipiscitur, plurimo præ cæteris corporis partibus indiguit. Quod autem pulmonis tunica ipsius substantiæ, quæ forsitan non uulgarè, & quâ modis omnibus à medicis grauius expendi inquiri; optauerim, alterandi aeris uim possidet, ramorumque implexus firmat, inuolucris uice sit, cuius perfectum reor. Sic quoque hanc iustissimè tenuem mollemque, ut promptè cum pulmone concideret, facileque dilataretur, factam esse, neminem decet ambigere.

## DE CORDIS INVOLUCRO.

## Caput VIII.

*Hoc inuolucrum membranis thoracis amplitudinem intersepientiibus liberum, nullâ ex parte differtum, tertia ostenditur figura, ad characteres B, C, D, E, F, G: uti apertum spectatur in quarta figura ad A, B, B. Dem ipsius quoque portio in ultima tertij libri figura ad B occurrit.*

*Forma inuolucris cordis.*



MEMBRANAM uniuersum cor cum suis auriculis & uasorum initijs instar arcule cuiusdam aut thecæ inuoluentem, in medio thoracem intersepientiû membranarum collocari antea diximus. Verum in præsentia huius inuolucris fitum paulo altius repetitur, eius effigiem pineæ nuci formæ quàm simillimam esse dicemus. Quemadmodum enim ex orbiculari & non penitus depressa basi, pinea nux in obtusum, neque impensè prominentè conum mucronem uel desinit, omniq;

*VI occurrit in 4. fig. ad A, B, B. b 2 fig. G, I, L.*

omniq; ex parte orbicularis quodammodo secundum latitudinem uisitur: sic quoq; & cordis inuolucrum orbicularem basim, & obtusum mucronē obtinet, pineāq; nucē proximē refert. Cæterum inuolucris basis haud cōtinua est, sed ut minimum quinque foraminibus peruia: ac primum quidem<sup>c</sup> cauē uenæ iter præbet. quā hæc septū<sup>d</sup> perforat. secundum autem illud est, quo eadē uenā sursum à cordis basi iugulū petit. tertiū porro foramen<sup>e</sup> uenā arteriale transmittit. quartum uerò<sup>f</sup> magnæ paratur arteriæ, & quintū<sup>g</sup> arteriæ uenali uiam offert. Atq; id quodāmodo duplex est, quod arteria uenalis priusquā ex inuolucro labitur, in duos truncos discinditur, bina in inuolucro foramina perpetuò ferè adeptos: quanquā & uenæ etiā arteriali duob. quodāmodo locis iter præbeatur. His uasis præsens inuolucrū ualidissimè<sup>i</sup> obnascit, quodāmodo ab ipsis principium ducēs. uidetur nāq; tertia arteriæ magnæ & uenæ arterialis tunica, & secunda uenæ cauæ & uenalis arteriæ, cordis inuolucris principū flatuere. Vasa etenim medio inter cor & ubi inuolucrū ipsis cōmittitur spacio, eiusmodi asciticijs suis tunicis penitus destituuntur, notatuq; dignum interuallum inter cordis basim & inuolucris ad illa uasa coalitum existit: & inuolucrum non magis cordis basim, quā mucronem aut latera illius contingit. quod Galenus in septimo de Administrandis sectionib. libro longè rectius, quā in sexto de Partiu usu, expedit. Cæterum hæc quæ modò enumerauimus foramina, inuolucris potissimum basis necessariò propter ipsam transeuntium uasorum seriè obtinuit, sese hīc quāmaximè licuit rotundā efformās. Reliquum autem inuolucris corpus nihil trāsmittens, continuū est, & sibi undecunq; præterquā in forma, quæ turbinis quodāmodo ritu ex basi, uti diximus, in obtusum mucronē tendit, respondēs. Basis hæc summo apice paulo altius quintæ thoracis uertebræ corpore locatur, huic nō penitus, sed duntaxat eregionē incumbens. Basis enim media est inter pectoris os, & quartā quintāq; thoracis uertebras, æqualiter ab utrisq; pectoris dico ossē & uertebris, distās. Item basis quoq; à dextris sinistrisq; costis pariter remota pēdet. In progressu uerò, descēsuq; inuolucris situs uariāt. ac alijs quidē animalib. longiore pectoris ossē quā homines donatis, inuolucrū id à dextris ac sinistris pariter ferè seiunctū descendit, sensum in anteriora porrectū: adeò ut iā basis posterior, aut si animal resupinum intellexeris, humilior ipso mucrone cōspiciatur. In homine aut, cui anteriorem thoracis partē rerū Opifex breuiorē cōdidit, inuolucrū adeò antrosum sinistrorsumq; protēditur, ut mucro magis deorsum quodāmodo pertingat, quā pectoris ossis<sup>k</sup> pars, cui superior maximeque antica septi transversi pars adnascit: dein in sinistrū adeò pertinet, ut dextrū mucronis latus uix thoracis mediū attingat. In anteriora quoq; adeò mucro procedit, ut sinistrū pectoris ossis latus, quæq; huic coarticulātur cartilagine, cōtingat. Inuolucrum hoc substantia constat membranæ, inq; simulariū partium numerū cum reliquis membranis reponēda. nullis enim fibris intertexta, sed simplex est membrana, utcunq; crassa, & admodū dura, cavitatēq; cōstituens, in qua cor facile dilatari constringiq; queat. Cautas hæc leuis omnino est, tenui quodā humore oblita, ac adipe penitus omni destituta. Exterior quoq; inuolucris superficies adipe uacat. Quanquā secus arbitratus sit Aristoteles, cordis inuolucrū pingue esse afferens: intersepientib. thoracē membranīs fortē delusus, quæ huic inuolucro obnata, præpingues, idq; potissimum in hominibus, perinde ac membranæ inuicē cōnata, aspera cernitur. Inuolucris enim laterib. intersepientes membranæ quodāmodo orbiculatim<sup>l</sup> obnascuntur. Anteriore parte, cui illæ membranæ nō adnectuntur,

Quibus uasis inuolucris cordis uiam præbeat.

Cordis inuolucris initium.

Inuolucris cordis sim.

Inuolucris cordis substantia.

Superficies & nexu.

c, fig. D.

f.

d, 7 inuolucris.

lab. r.

e, 4 fig. F.

f, 6 fig. I.

g, 6 fig. O.

h, 6 fig. G.

i, fig. B.

k, 3 fig. par.

vā sub s.

l, vii fig. in.

fig. c.



fibræ mēbranæ earum membranarū cavitatē implentes, cordis inuolucro adnascuntur. Posterior ipsius pars uniuersa intersepiētes quoq; mēbranas habet cōnatas. Cæterum inuolucrum mucro, & dextri ipsius lateris egregia portio septi trauerit<sup>m</sup> neruo circulo ualidissimè, amploq; admodū spacio<sup>n</sup> cōnascit, <sup>m 7 mus. 14. h. 1, m. n. n. 3 fig. 4 G ad R.</sup> quod hominib. est peculiare. Simijs quippe & canib. & porcis inuolucrū à septo multū distat: tantū abest, ut ipsi magna sui portione cōnecteretur. adeò sane, ut & hinc luce clarius cōstet, Galenū hominis uiscera aut oscitāter, aut neutiquā spectasse, simiasq; & canes nobis describentē, immeritò ueteres arguisse. Præterea homini priuatim anterior mucronis pars mēbranæ costas succingetti fibrosis nexib. heret, ea sede qua sinistri lateris sextæ & septimæ costarū cartilagine pectoris ossi coarctant<sup>r</sup>. sed & is inuolucrum nexus<sup>o</sup> inter thoracē inter- <sup>o Inferius L inter G et 1.</sup> diuidētes mēbranas perficitur: nullibi enim ex illarū medio inuolucrū cordis excedit, neq; pulmonē ulla ex parte nisi illarū interuentu cōtingit. Hoc nullas ferè arterias in se disperfas obtinet, neq; etiā uenas, nisi perquam<sup>n</sup> tenuissimās, <sup>p 3 fi. D. E. q. 1. fig. O, O, Q.</sup> ab illis ferè exortas, quæ intersepiētib. mēbranis tanquā in omentū digeruntur. quū enim cordis inuolucrū cauā transmittit, ab illa uix aliquid mutuatur: quā autē septo in hominibus cōnascitur, cōmunia cum septo uasa sibi uēdicat. Neruos quoq; adipiscitur nimis quā obscuros, ac ab illis dissectos, à quib.<sup>r</sup> re- <sup>r 2 fig. ca. a. lib. 4. r. s. euiflem fig. m. p.</sup> currentes nerui iam pullularūt. Quod uerò cordi id sit quod dicitur, omnibus conspicuum esse arbitror: quū instar domus & arcule cuiusdā ac thecæ cor luculentissimè amplecti, idq; intersepiētiū membranarū beneficio sustinere uideatur. Præterea ut leuius esset, & unā durius, ex ualida ipsum extrui mēbrana, neminē quoq; ambigere puta uerim. Cæterū an hominib. secundū naturam se habentib. inuolucrū id aquam cōtineat, quā serosi humoris modo in ipsius cavitatē inter diffecandū repositā obseruamus, mihi nō admodū perspectū est. Quamuis nullā sanè humani cordis sectionē unquā aggressus sim, in qua non multā eiufmodi aque quantitātē repperim: quocunq; etiā mortis genere, siue paulo, siue multo antè homo interiisset. etiā si adhuc maiore copiam in mulieribus, quā uiris animaduernerim: nisi illi natura admodū fuissent humida, aut aliās serosis abundasset succis. Quinetiā minus ferè aque in nuper mortuis adinueni, quā in his à quorū sectione diutius tēperassem. Is cui Bononiæ cor uiuo eximi spectauimus, aquā etiam in inuolucro cōtinere uidebatur: uerū id nō admodum cōmodè, utcunq; etiā nos tragædiæ adiugeremus, expēdere licuit. Patauij huius aque intuendæ cupidi, pulsans adhuc cor cū pulmone reliquisq; uiscerib. ilico atq; ex his quos uiuos in quatuor partes diffecāt, exēptum erat, in proximā pharmacopolæ officinā interdū deferri curauimus, ac in inuolucro aquam nonnullā repperimus. Viui canes, inuolucrum cavitatē & cordis superficie humectas habēt, in hisq; nulla diffluētis aquæ obseruatur quantitas: quum tamē notatu digna (etiā si ferè semper mediocris) in aliquādiu mortuis canibus occurrat. In porcis uerò uiuentib. plus aque quā in canib. spectatur: uti etiam porci iam diutius mortui, illā utcunq; copiosam proponūt. Adeò ut de uiuorū aqua nihil asserere uelim: uerū nullā penitus in illis cōtineri (ut hodie omnes ex spiritu in aquā post mortem cōuerso, hāc in mortuis reperi cōtendentes affirmant) falsum esse noui. Quandoquidē (ut sæpe antea monuimus) mēbranæ nullis partib. cōnatæ, neq; inuicē hærentes, perpetuò madidæ ac lubricæ apparēt, ut oculi palpebrarumq; interior superficies. Ad hūc quoq; modum mēbranæ cerebrū inuestientes, ubi mutuo inlernūtur, & interna costas succingentis mēbranæ, & peritonæi superficies, ac iecoris quoq; & intestinorum, reliquarumq; partiū inuicem tantum accumbentiū, non uerò connatarum

Quidam uasis  
ac neruis inuolucrum impli-  
cetur.

Inuolucrum uisus  
et constructio  
rationis ratio.

Cuiusmodi aqua  
in inuolucro  
obseruatur.

tarum superficies madorem lubrici contactus gratia semper commoustrant. Nunc aut quum cor in cōtinuo uersans motu, neq; dū uiuit animal unquā uel momento in ipsius, quod alioquin nō mouetur, inuolucro quiescens, calidissimi uiscus merito cēsetur, cur minus nō madore duntaxat, ut reliqua omnia, sed & aquam à Natura ipsi priuatim eiusdē usus gratia largitā nanciscetur?

## DE CORDIS SITV ET FORMA.

## Caput IX.

*SITVM cordis in sua proportionē ostendit ultima figura tertij libri: dein prima & secunda presentis libri figura idem quoq; ostendunt, quamuis in illis cor suo inuolucro adhuc obiectum sit, ac inter membranas thoracis cavitatem intersepientes contineatur. In prima itaq; figura id ad L spectatur, in secunda autem ad inferius L & M, N. Porro cordis formam ex quarta, quinta, & sexta figuris petere licet.*



**CORDIS** situm formaq; ipsius proximē enarratū commoustrat inuolucrum. Cor namq; pyramidalis etiā turbinatæ ue quodāmodo figuræ uisitur, nuci pineæ utcunque respondens, quum scilicet ex latiore<sup>b</sup> basi in<sup>c</sup> mucronē (at paulo quā nuci pineæ acutiorē, ac sinistrorsum ueluti detortum) sensum definat, multoq; longius quā crassum spectantib. sese offerat. Verū interim humanū

*Cordis figura.*

cor, quod ad externam superficiem totam<sup>a</sup> ue ipsius molem attinet, nō undiq; secundū orbem æqualiter crassum occurrit. Sua enim latitudo profunditatem non secus excedit, quā si quis cor in anteriore, posterioreq; sedibus egregiè comprimi, ac in latera prominere astrueret: instar mediæ, seu quæ utrinque aliam nucem commissam habuit, castaneæ quodammodo nuci. Hæc compressio in dextra potissimum sede ita accedit insigniter, ut cor secundū totam ipsius longitudinem inibi acutam potius, quā semiteretem superficiem uideatur constituere. quum tamen autū & quadrupedum corda, non multo latiora quā profunda spectentur, nuci<sup>d</sup> pineæ aut turbinis imagini longē exactius, quā humanum cor, accedant. Quod sanē discrimē Galenus scribere neuitquam præterisset, si modò hominis cor perinde, ac simiarum canumq; aggressus fuisset: hīc non segniter Naturæ expendens industriam, qua, quum homini breuis, sed latus, thorax necessariō obigit, tot differentias molitur, quibus hominē in pectoris oſis breuitate & amplitudine, & in pulmonis lobis, & uenæ cauæ ductu, & inuolucris cordis ad septum transversum nexu & situ à quadrupedum fabrica differre ostendimus: & qua hīc rursus humanum cor secundū proportionem multo simul latius & breuius, quā in illis animalibus, peropportunē euasit. & qua denique præter cætera non uulgaria paucaq; discrimina, alium cordis situm in homine, quā quadrupedibus longo arctoq; thorace donatis, reperiri docebinus: simulatque ea adhuc sermoni addiderimus, quæ de cordis forma insuper commemoranda ueniunt. Tota itaque exterior cordis superficies à basi ad mucronis usque extremum, impenſe læuis cernitur, nulli prorsus parti connata.<sup>e</sup> Coronalis tamen uenæ propagines à cordis basi ad mucronem usque cum coniugibus suis arterijs excurrentes, paulo magis reliqua cordis superficie extuberant, inæqualitatemque modicam efformant: quum scilicet non tota sui corporis portione in cordis substantiam imprimantur. deinde & adeps, quo humanum cor plerunque abundat, aliquid etiam inæqualitatis adfert. Basis, propter uasorum egressum inæqualis utcunque cernitur. dextræ enim ipsius sedi dextra auricula simul cum<sup>f</sup> uena caua, &<sup>g</sup> arteriali uena committitur: in si-

*Cordis superficies  
quælis.*

rr 3 sinistra

a 3 fig. C, D.  
E, F, G.  
b 4 fig. C, D.  
c 6 fig. A, B.  
d 4 fig. E, G.  
fig. C.

4 6 fig. D.

e 6 fig. E.

f 4 fig. I, J.

fig. B.

g 4 fig. F, G.

fig. C.

h 4 fig. G, H.

fig. I.

Cordis situs.

nistra autem sede 'læuam habet auriculam, & præter<sup>r</sup> arteriam uenalem, <sup>i 6 fig. F.</sup>  
 'magnæ quoq; arteriæ initium. Porro cordis auriculas, uasa, ut & ipsorum ori <sup>h 6 fig. G.</sup>  
 ficia & membranas, cordisque uentriculos seorsim ordine persequemur, cor- <sup>l 6 fig. O.</sup>  
 dis iam situm subnexuri, de quo dissectionum professores prolixè contenden-  
 dunt: his quidem id in sinistrum thoracis latus collocatum inuentibus, illis  
 autem in medio, quod ad dextrum ac sinistrum attinet. alijs uerò non ad hanc  
 tantum positionis differentiam cor in medio esse placuit, uerum & secun-  
 dum thoracis anteriora & posteriora, deinde & superiora ac inferiora. alijs  
 rursus hæc quidem omnia toti cordis moli, alijs autem duntaxat basi ascri-  
 bentibus. Quod autem in præsentia thoracem omnes appellant<sup>m</sup> quicquid <sup>m 1 et 2 ff.</sup>  
 costis & pectoris ossè, & duodecim thoracis uertebreis intercluditur, manife- <sup>ed. 19 li. 1.</sup>  
 stum esse arbitror: quum alioquin si uniuersus corporis truncus cum Aristo-  
 tele ipsis thorax hic appellaretur, plurimum in cordis situ explicando aberran-  
 rent, quamuis alioquin ad ueram situs descriptionem non ualde accedant.  
 Quandoquidem quadrupedibus, nō basis solūm, sed & cordis propemodum  
 mucro in medio, quod ad dextrum & sinistrum spectat, continetur. Dein se-  
 cundum dorsi longitudinem basis uicinior longè est primæ thoracis uerte-  
 bræ, quam mucro ipsi duodecimæ. Insuper magis ab elatiore pectoris ossis se-  
 de cordis basis remouetur, quam mucro à pectoris ossis<sup>s</sup> cartilagine gladij i- <sup>n 2 fig. S.</sup>  
 magini comparata. adeo ut hac dimensione, quam in longitudine metimur,  
 uniuersum cor mediam sedem nullis animalibus exactè occupet. Quod ad  
 anteriora posterioraque attinet, omnibus animantibus cordis basis in medio  
 ferè eius thoracis sedis, quam sibi uendicat, collocatur. Mucro autem in ante-  
 riora magis exporrigitur, non tamen pariter omnibus. Ceterum hominis cor  
 sua basi exactè, ut in reliquis animantibus, dextrè sinistræq; sedis medium ob-  
 tinet, atq; quod ad anteriora posterioraque spectat, pariter sese habet. tantum  
 enim à pectoris distat ossè, quantum à uertebrearum corporibus abscedit. In  
 thoracis autem longitudine, quæ posteriori sede duodecim constituitur uer-  
 tebris, quintæ uertebre corpus respicit. In anteriori uerò thoracis sede, quæ  
 pectoris ossis longitudine terminatur, elatior basis pars ad amussim mediam  
 sedem sibi uēdicat, tantundem à iugulo remota, quantum ab ea ossis pectoris  
 sede, cui septum inferitur. A' basi, reliquum cordis corpus sensim in anteriora,  
 & in sinistrum latus eousq; obliquè exporrigitur, ut mucronis posterior pars  
 magis ad pectus antrorsumque quam ipsum basis centrum uergat, utque dex-  
 tra etiam mucronis pars in sinistrum magis ipso basis centro protensa, me-  
 dium pectoris ossis in sinistrum excedat, ipsumque mucronis centrum sextæ  
 & septimæ costarum sinistri lateris cartilagine respiciat, quæ pectoris ossi co-  
 arctantur. Præsentibus terminis quibus cordis situs comprehenditur, illius  
 quoque magnitudo innotescit: quæ sanè homini, ut & cerebrū ac iecur, quam  
 cæteris animantibus ex proportionē obtigit grandior. Neque id solūm homi-  
 ni peculiare est, uerum & illi quoque cor septi transuersi neruossè parti in læuo  
 latere, cui cordis inuolucrum magno spacio<sup>o</sup> adnascitur, quam proximè acce- <sup>o 2 Gal F.</sup>  
 dit: sicut longè quam canibus & simijs, quibus cor magno interuallo à septo <sup>2 fig.</sup>  
 remouetur: adeo ut Galeni de cordis situ sententiæ canibus ac simijs, non ue-  
 rò hominibus, conueniant: præcipuè quum cor in thoracis medio, con-  
 trà Veterum placita, repositum contendit. neque eius omnino me-  
 mor est, quod in septimo de Administrandis sectionibus, de  
 cordis uertice prodidit.

Cordis magni-  
tudo.



Caput x.

CORDIS substantia quoad fieri licuit, illis potissimum figuris delineatur, quæ id quouis pacto diffec-  
tum referunt: ut septima, & quatuor illi proxime sequentes.



R A E C I P V A cordis substantia carne constat, musculo-  
rum carne paulo minus rubra, & duritia ac densitate fi-  
brarumq; quo intertextitur genere ab illa plurimū diuer-  
sa. Cordis enim caro lōgè durior existit, & dēfior, ac ueluti  
iniurijs ferendis pertinacior, & uario deniq; robustissi-  
marum fibrarū genere donata. quum interim unius mu-  
sculorum sedis caro unicā tantum fibrarū ferē speciem,

Cordis caro.

eamq; sparsim satis diffeminatam obtineat. Porro species fibrarum, quæ cor-  
dis carne cōtinentur (non enim de membranarum uenæ cauæ & uenalis ar-  
teriæ orificiorum<sup>a</sup> fibris modò agimus) haud æquē ac musculorū conspicua  
est: quandoquidē nullum prorsus inuenias muscolum, qui uel citra multam  
diffecctionem ilico atq; detectus est, fibrarum suarū differentiam nō aliquo sal-  
tem pacto demonstret, eam insuper accuratius proponens, si fortē coctus uel  
crudus unguibus aut cultro discerpitur: quum interim compactissimarum  
cordis fibrarū situm & seriem coniectura potius quā sectione assequamur.  
Quouis enim modo cordis carnem aut elixam aut crudā rectis uel obliquis  
uel transuersis sectionibus aggrediaris, uel utcunque lubet eandem unguibus  
dilaceres, uix unquam cordis notatu dignam portionem secundū unum  
duntaxat fibrarum genus diuelli posse obseruabis, at omnē carnis partem di-  
uersis multiplicibusq; (sed transuersis potissimum) fibris abundare astrues:  
non enim in corde, ut sanè in stomacho, uentriculo, intestinis, & ipso etiā di-  
stento ad fœtum utero, sectionis beneficio fibrarum situm adinuenire inte-  
grum est. Quanquam interim triplex fibrarū genus à Natura cordi largitum  
esse, nobis persuadeamus, quum ob uarium & rarum quem in illo uidemus fi-  
brarum implexum, & nullum simplicem earundem ductum: tum etiā pro-  
pter manifestam cordis functionem, quam fibrarum in primis, ut mox dictu-  
ri sumus, auxilio perfici opinamur. Cæterum etsi ratio fortassis suaderet re-  
ctas fibras, quibus attrahendi facultas tribuitur, intimas, & deinde his obli-  
quas, quæ in alijs organis naturali motu agentibus retentioni præesse credun-  
tur, positas esse, & extimam sedem transuersas ac orbiculares, quæ expellunt,  
obtinerē: non tamen cordis fibris eum situm ascribere possumus, quum se-  
ctio ipsa triplex hoc fibrarum genus inuicem commisceri ostendat, & nunc  
rectas, nunc obliquis, nunc transuersas, & rursus rectas & obliquis & trans-  
uersas perinde ferē commonstret, ac si tres priores differentię singulis uen-  
triculis peculiare essent, posteriores uerò toti cordi ambobusque uentricu-  
lis simul dedicarentur. Appello autem in corde rectas fibras, quas in eo per  
quā elixato, ex ipsius basi ad mucronis ipsius usque centrum deduci, tam  
per cordis uentriculorum septum, quā reliquam sedem cōspiciamus. trans-  
uersas autem, quæ orbiculatim & unā transuersum cor uentriculosque am-  
biunt: obliquis uerò, quæ quidem orbiculatim cor uentriculosque ample-  
ctuntur, at obliq; secundū cordis longitudinem procedunt. Suntq; hæ in  
duplici differentia. Aliquæ etenim in dextro cordis latere basi sunt uiciniores,  
in sinistro ipsi mucroni: aliæ aut in dextro latere mucronē magis respiciūt, in  
læuo basim. Atq; his sanè fibris pro cordis mole, si eā scilicet ad musculū con-  
feras, perquā numerosis, & carne has cōtinentē amplexatēq; potissima cordis

Cordis fibræ.

a7 fig. N.  
membrana  
rū K, L, M,  
& 9 fig. G,  
G. membra  
narū E, F.

substantia constituitur, cui eadē ferē cum musculorū uentrium substantia accidit cōpositio. Vt enim fibræ in musculis carnē undiq; habent circūpositam: sic & cordis fibræ peculiari ipsis carne continentur, fulciunturq;. Quæ porrō per uniuersum cor fibrarū & carnis simul sit crassities, ab alijs sanē parum anī maduerſa, tunc demū opportunē explicabitur, ubi cordis uentriculos oratione complexi fuerimus. In præsentia autē suffecerit, carnis fibrarumq; cordis usum, quēq; insuper adhuc ad cordis substantiā spectant, adiocere: ac pariter innuere, cordis carnem in mucrone quā in basi spissiorē solidioremq; apparere. Nō ob hoc sanē (ut Galenus arbitratur) ne hic cor in suis cōtractionibus pe-  
 & toris os accedens, facilius læderetur: uerū quod ea cordis pars tenuis sit, & quod ad eam fibrarū reſtarum concursus perficitur, qui carnē mucronis, & si aliās à reliqua nō differat, cōpactiorem cōmonſtrat, ad eū prorsus modum quo plerunq; solidiorē carnem in musculi capite, aut tendinis principio uidemus, quā in musculi uētris medio, ubi fibræ nō adeo atq; in illis locis compa-  
 & etē, ab inuicē magis dirimuntur. Carnis itaq; cordis nō postremus usus, cum musculorū carnis usu in fibrarū firmatione correspondet. Quod uerō propria peculiariq; ipsius secundū iustitiam temperie, ac essentiali pariter forma, ad præcipuas cordis functiones, quæ in sanguinis emutatione, & uitalis spiritus apparatu, potissimū consistunt, opituletur, imō primarius harū functionum  
 & autor sit, ex aliorum uiscerū substantia ratiocinamur. Cæterū cordis fibræ alteri subseruiūt munerī, quo cor scilicet tantisper dum uiuit animal, & dilata-  
 & tur & contrahitur, & aliquandiu inter contractionē dilatationemq; quiescit. Quemadmodum igitur cordis fibræ cum musculorū fibris nōnulla in cōpo-  
 & sitione sortiuntur cōmunia, sic etiā ut & illæ motui famulātur, sed prorsus di-  
 & uerso. Musculorū enim motus arbitrarius est: cordis uerō naturalis, ac absque lassitudine, inſcrutabili rerū Opificis industria penē indefessus, arbitrioq; no-  
 & stro minimē subditus, neq; ex cerebri neruis, ut musculorū motus, ulla ex parte dependens. Porrō cordis dilatationē, quæ mucronis ipsius ad basis centrum est attractio, & omnium laterum cordis distentio, rectæ efficiunt fibræ, mu-  
 & cronem uersus basim cōtrahentes. Quod sanē ita perficitur, ac si uimineo cir-  
 & culo orbiculatim eadēque serie cōplurimas iuncorū scirporum uē radices connecteres, & mucronib; illorum simul collectis, uelut pyramidē quandam efformares, ac demū funiculum ex illius uerticis medio per circuli centrū di-  
 & mitteres, quo deorsum tracto, pyramis breuior, in tusq; multo capacior (iun-  
 & cis nimirum in exteriora, ac in latera ab inuicē diremptis ac secedētibus) red-  
 & deretur. Hinc siquidem cordis dilatationem cōdiscere quā optimē liceret: quippe uimen quodāmodo cordis basi responderet, iuncorum autem colle-  
 & ctio cordis mucroni: deinde iunci ipsi & funiculus ille rectis fibris congrue-  
 & rent: iunci quidē illis responderent fibris, quæ in cordis lateribus & anterijs & posterijs consistunt: funiculus autem illis conferretur fibris, quæ in cordis car-  
 & neo<sup>b</sup> septo inter duos sinus posito frequentissimæ habentur. quanquā quod omnimodam cum rectarū fibrarum motu similitudinē obtineret, nihil con-  
 & fingere possimur. Transuersarum autē seu circularium fibrarum actionem ad aliquid referre, facilius uidetur. hæ enim cordis contractioni in primis præ-  
 & sunt, quæ mucronis ipsius à basi est discessus, & quæ à cordis productio, quam illæ moliuntur fibræ, quoties laxatis rectis impenſius arſtantur colligunturq;,  
 & haud fecus quā si prius cōtractum in pyramide illa funiculum iam laxes, ac manibus aut alio circulo in medio pyramidis iuncos introrsum comprimas,  
 & itaq; illius cavitatē minuas, & interim tamen proceriorem reddas. Nunc ue-  
 & rō qui

Carnis cordis  
usum.

Fibrarū usum.

b. fig. H.  
H. o. fig. K.  
1. fig. L. in  
ter H. o.  
G.

rò qui obliquæ fibræ quieti præfint, hoc est aliquâtiſper, prout cordis functionibus ex uſu cêſetur, ſimul cū aliis fibris ad cõtentas materias undiquaq; ſe cõtrahant, imaginari nō eſt arduū. præcipuè ſi diuerſos cordis pulſus in uiuo animali examinaueris. Quod ſanè facturus es iucundiſſimè ea adminiſtratione, qua ſeptimo libro totiſq; adeò operi finis imponetur. Cæterùm cordis fibras interim non motuū cordis dūtaxat opifices eſſe uulgo arbitramur, uerùm re-ctas ad attractionē, ad expulſionē tranſuerſas, & ad retentionē obliquas cōducere, etiā nobis perſuademus. Præter cordis carnē & fibras,<sup>g</sup> uenę ſubſtantiam ipſius enutriētes, &<sup>h</sup> arteriæ innatū ſuę ſubſtantiæ calorē fouentes, hīc etiā enu-merandæ ueniūt: ipſa uidelicet coronalis uena, & duæ coronales arteriæ per cordis ſubſtantiam quaſi muſculorū uafa diſtributæ. Quis uerò uenæ arteriarumq; coronaliū ſit ortus ac ſeries, in tertio libro abundè cōplexi ſumus. Qua-  
re cordis<sup>i</sup> neruulo ſermoni quoq; addito, ad cordis tunicā eſt accedendum: ac eum quidē neruulū in quarto libro à ſiniſtro ſexti paris cerebri<sup>k</sup> neruo depro-mi retulimus, quādo ab illo, ubi ſiniſtri lateris recurrentē neruum cōſtituit, ſo-  
bolem deriuari diximus, quæ cordis in uolucris baſim penetrās, & ſiniſtro<sup>l</sup> ue-næ arterialis lateri poſterioriſq; ſedi exporrecta, in cordis baſim (oppidò quā-m obſcurè) pertinet. Verùm cordis, de qua hīc agimus, tunica illi mēbranæ pror-  
sus corréſpondet, quæ muſculorū uentrib. pertinaciter obnaſcīt, tenuiſſima ni-mirū mēbranula, quæ à muſculorū ſubſtantiā plenè diuelli neq;. Eiufmodi nāq; mēbranula cordis extimæ ſuperfici ei circūnaſcitur: & in hominibus, idq; præ-  
cipuè ad cordis baſim, durioris adipis copia huic adnutritur. aliquādo etiā per reliquam cordis ſuperficiē ad mucronē uſq; ſecundū uenarum & arteriarum  
per cordis ſuperficiē<sup>m</sup> progreſſum ipſi mēbranulæ adeps perinde adnaſcitur, ac<sup>n</sup> omentū & mēbranas thoracē interſepientes ſecundū ſuorum uaforū po-tius ductum, quā reliqua ſede, copioſiorē adipem proponere nouimus. Inte-  
grū modò eſſet & ad cordis ſubſtantiā referre<sup>o</sup> tres mēbranas uenæ cauæ ori-ficio, &<sup>p</sup> duas arteriæ uenalis oriſicio præfectas, deinde & cordis<sup>q</sup> auriculas, &  
quatuor ſua, præter ipſum circunuoluētes uenas arteriaſq; uafa: niſi nūc tēpe-ſtitiuſ foret, ſingula ſeorſum priuatis Capitib. recēſere. Pari quoq; ratione, &  
cordis<sup>r</sup> os cartilaginofū ue ipſius ſubſtantiā hīc eſſet recenſenda, niſi & hāc pri-mo libro in reliqua oſium cartilaginumq; hiſtoria eſſemus perſequuti.

Cordis ſubſtan-  
tia peculiaris  
uenæ & arte-  
ria.

Neruuſ cordis.

Tunica cordis  
ſubſtantia ob-  
nata.  
Cordis adeps.

Que in ſuper-  
ſtantiā ſub-  
ſtantiam refe-  
runtur.

## DE CORDIS SINIBVS, SEV VEN- triculis. Caput XI.

SEPTIMA figura & octaua dextrum cordis uentriculum apertum proponunt, nona autem & de-  
cima ſiniſtrum: undecima, quæ cor tranſuerſim diſſectum oculis ſubijcit, fabricæ uentriculorum etiam oſten-  
dendæ plurimum iuuat.



VONA M pacto cordis uentriculū hominib; ac proin-  
de & reliquis animalib; pulmonē habentibus cōformen-  
tur, quoq; conſtent numero, nūc ſubiungam, ſermonem  
à Galeni cum Ariſtotele de illorū copia diſceptatione om-  
nino cōhibens. Humanum itaque cor intus duas inſigni-  
ter amplas obtinet cavitates, ſecundū cordis latera ſitas:  
unde etiā<sup>a</sup> unam uentriculū ſinum ue dextrū,<sup>b</sup> alteram  
ſiniſtrum meritò nuncupamus. Horū dexter ſiniſtrū amplitudine uincit, am-  
boq; inuicē forma plurimū uariant. Dexter nanq; magis deorſum ad cordis  
mucronem ipſo ſiniſtro deſcendēs,<sup>c</sup> cavitatē inſtar creſcentis lunæ paratam  
adipiſcitur: quandoquidem dextro ipſius latere, anterioriſq; & poſteriori ſede  
inſtar

Ventriculorū  
numerus &  
ſim.

Forma dextrū.

a Patet in  
7 et 8. et G.  
G in 11 fig.  
b Patet in 9  
et 10 et H.  
H in 11 fig.  
c 4 fig. E.  
6 fig. C.  
d Hanc ma-  
ximè oſten-  
dit 11. ſi. ad  
G, G.



instar exterioris semicirculi, aut ita extructi camerati sedis cōuexa est, exteriori cordis in his regionib. superficie, quę gibba est, respondens: in sinistro aut latere huius dextri sinus cavitās internę fornici aut semicirculi sedis ritu, caua cernitur, propter cordis uentriculorū septum seniorbis modo dextra ipsius superficie in dextri uentriculi amplitudinem protuberans. Perinde ac si crescentis lunę corpus ipsa esset cavitās, ac exterior quidē lunę pars à dextro circumscriberetur constitueretur uē cordis latere. interior aut eius lunę pars ex cordis uentriculorū septo huc, uti diximus, protuberante, cōstaret. Atq; hanc formam dexter cordis uētriculus à basi ad mucronē usq; seruat, simul cū cordis effigie ex latiori basi angustior redditus. Sinister uētriculus ampla incipit basi, sensimq; in arctū uersus cordis mucronem definit, cavitatē instar coni, quod ad totam superficiē spectat, orbicularē obtinens. Cordis nanq; uētriculorum septū sinistro ipsius latere, quo sinistri uētriculi dextrū latūs efformat, concauum, nō uerō ut dextro latere gibbū extuberansq; uisitur, & parē crassitiem naturāq; cū cordis substantia sinistrū latūs & anteriore posteriorēq; sinistri uētriculi sedes cōstituente obtinet: itaq; prorsus se habet, quasi sinistri uentriculi potissimū gratia cor cōstitueretur, ac ut dexter uētriculus fieret, tenuis quædam cordis substantia dextro septi lateri adnascetur. Vniuersa namq; cordis substantia, præter uentriculorū septum, dextri uētriculi amplitudinem cōstituens, tenuis admodum est: quę aut sinistrum uentriculū orbiculatim ambit efformatq; dextri uētriculi substantiā multis numeris crassitie superat, & undiq; equē crassa uisitur, præterquā in ipsa basi: ubi uasorū illinc prodeuntium dehiscentiūq; gratia, cordis carnea substantia tanta amplitudine deficit, quāta orificiorū est amplitudo. Vtriūsq; uētriculi superficies perquā in æqualis est, & multis quasi foveis in carneā substantiam penitus impressis obfita. Neq; istæ ad latera tantū cōsistunt, quibus dexter uētriculus sinistrū respicit, uerū (etsi interim secus ceteris omnib. Anatomen profitentibus uisum sit) per uniuersam prorsus uentriculorū superficiem, nō solum in nuper occisis animantibus, sed perpetuò, rāti sper dum cor ipsum seruare uolueris, apparentes, neq; unquā uel in exiccato corde cōniuentes. Vt cūq; interim hæ foveę sint cōspicue, nullę tamen, quod sensu cōprehendi potest, ex dextro uentriculo in sinistrū per eorundē uentriculorū septū permeāt: neq; etiā mihi meatus uel obscurissimi occurrūt, quibus uentriculorū septum sit peruiū, quāuis illi à dissectionum professorib. enarrētur, quū sanguinē ex dextro uētriculo in sinistrum assumi persuasissimū habēt. Vnde etiā sit, (quemadmodū quoq; alicubi monebo apertius) de cordis hac in parte officio, me haud mediocriter ambigere. Ceterū præter inæqualitatē quā foveę in uentriculorū superficieb. efformāt, quæq; in sinistro uētriculo nō nihil insignior est, ambo carneas quaddā explātationes processūs uē intus nanciscuntur, qui teretes sunt, & graciles, & in fibras mēbraneas cefsāt, humiliori sedi membranarū in ipsis uētriculis positarum cōtinuas. Cernuntur aut carni hi processūs potissimū ad uentriculorum mucronē, humiliorem uē sedē: eosq; ad fibrarū quas cōtinent robur facere ostendā, quū secundo ab hoc Capite membranarū cordis orificiorū naturam persequar. In utrisq; enim uētriculis duo habētur orificia, & totidē uasa in eminentiori uentriculorū sedē, atq; adeò in cordis basi occurrētia: & substantia, quum unum quidē uenosum, alterum aut arteriosum sit, differentia. Deinde ambobus uentriculis mēbranę quędam insunt, quas uasorū orificijs paulo pōst præfici commemorabimus. ac in dextro quidē uentriculo tres habentur, uenæ cauę os spectantes: in sinistro autem duę, uenalis arterię origini connatę,

forma sinistri.

Uentriculorū superficies.

fig. 1. I.  
8 fig. H. H.

fig. 1. I.  
8 fig. R.  
8 fig. H. H.  
19 fig. M. M.  
10 fig. Q. Q.

fig. Q. Q.  
R.  
Hoc est m.  
la fig. speculab.  
clavis melius, quam ex uideat.

In hac illis figuris obuia est, quibus uentriculi spectantur.

17 fig. O.  
O. 9 fig. H.  
H. 10 fig. N.  
O 7 fig. N. 9  
fig. G. G. 10  
fig. M.  
P 7 fig. K. L.  
M. 9 fig. E.  
F.

q 7 fig. C. C.  
C. 8 fig. C.  
D in dextro uentriculo. In sinistro aut 9  
fig. C. C. C.  
10 fig. A.  
r 7 fig. K. L.  
M. in dextro. In sinistro aut 9  
fig. E. E. E.  
gu. 9.

14 fi. I, K.

connatae, adeo ut & hinc uentriculis quaedam exurgat differentia, quemadmodum etiam & ipso usu, & quam continet materia inter se differunt. Porro uisum uentriculorum una cum cordis uasorum & orificiorum & membranarum & auriu usu, priuato Capite merito pertractabimus, quod haec simul omnia cordis functionibus famulentur: quas, nisi haru partium constructione plenius descripta, recensere absurdum foret.

DE CORDIS VASIS, ET EORVN-  
dem orificijs. Caput XII.

CORDIS uasis eorundemq; orificijs spectandis pleraq; conducunt figura: ac quinta quidem praecipue uenam caua[m] proponit ad characteres C, D, F. Sexta autem uenam arterialem l insignitam, & arteriam uenalem G notatam, & magnam arteriam O indicatam ostendit. Ceterum septima cauae uenae commo-  
strat orificium ad C, C. Octaua arterialis uenae orificium ad C, D. Nona uenalis arteriae orificium ad C, C. Decima magna arteriae orificium ad A.



a Tota fig.  
cap. 6 lib. 3  
hic autem 5  
fig. C, D, F.

VPERIORI Capite, quatuor cordis esse uasa, & totide orificia, obiter inuimus. Ac in uasoru quide numero sunt, uena caua, uena arterialis, arteria uenalis, & magna arteria: quae omnia singulis ad cordis uentriculos spectantibus donantur orificijs.

Cordis uasa  
quos, & quae

Vena caua

Vena igitur caua ad dextru cordis latus dextrumq; uentriculum refertur: num uero ab illo in hominibus originem ducat, non admodum contentiose friuolis quibuscumq; propositis autoru suffragijs, aggrediendu duxi, quum sectione (ut rationes subiceam) in natis hominib. nihil aliud quam caue ortum a corde pendere (non secus ac reliquorum trium uasorum) queam colligere. Atq; idem de foetibus, quoad haftenus illorum sectioni incubui, fateri cogor: non interim Galeni sententiae passim mihi reclamantis ignarus. Quae enim is de uenae cauae principio in sexto de Hippocratis & Platonis dogmatibus contra Aristotelis placitum adducit, omnia in illu (si modo id quis proposuisset) retorquere esset quam facillimu. Nisi forte illi cum Galeno conueniret, quod iecur sanguificationis officinam esse, haud falso enunciauerit. quanquam Achillem huic, praeter quaedam alia, arteriae uenosae principiu deturbaret. Ex dextro itaq; latere dextri cordis uentriculi ad humiliorē ipsius basis fedē, uena caua  
b amplo patentiq; admodu orificio exoritur, ac illico ab exortu (qui totius uenae capacitatem amplitudine multu superat, ac uelut extuberans ad cordis substantiae terminos, circulus uisus) sursum ad iugulu, & deorsum uersus septu<sup>a</sup> contendit non aut, ut quispiam forte arbitraretur, uno caudice ab ipsius exortu aliquousq; dextrorsum incedens, in duos truces magnae arteriae modo dirimitur. quum dextro basis cordis lateri instar recti pali attedatur, ac suo ueluti sinistro duntaxat latere uena ex dextro uentriculo enascatur, ac facile citra alia diuisionem (quod interim arteriae magnae ex cordis basis cetro quodammodo prode-  
unt negatu est) cordis inuolucrum permeet, sursumq; & deorsum prorepat. Neq; profecto alia cauae exortus, aut si mauis cu Galeno dicere, insertionis est species, quam originis trium reliquoru uasoru cordis uentriculos spectantiu. Ceterum quonā pacto toti anteriori caue exortus sedi secundum illius longitudine<sup>c</sup> dextra cordis auris adnascatur, in eo quod de cordis aurib. subnexurimus Capite, audies. Vena arterialis dextro etia cordis uentriculo ascribitur. estq; ea uena, quam quidem quod sanguinem in pulmonē desert, uenaeq; prorsus uicem gerit, Venam: quod uero arteriae corpus nanciscitur, Arteriale appellari antea diximus. Haec multo minori quam caua<sup>b</sup> orificio ex dextri uentriculi basis ela-

b fi. ca. 6 li.  
3 D. 7 figu.  
C, C, C.  
c 7 fi. H, H.

H.  
d 7 fi. A. B.  
aut D, E.  
\* ut in i. si-  
gura earu  
que o cap.  
lib. 3 inse-  
runtur.  
e ut 6 fig. O  
in P & R.

f 5 fig. B, 7  
figura F.  
g 1 fi. ca. 15  
li. 3, 6 fig. I.  
h 2 fig. C.  
i 6 fig. sub  
E, F, G.

Vena arteria-  
lis.

basis elatissima parte iuxta dextrum latus uentriculorum<sup>i</sup> septi enascitur, & magnæ<sup>k</sup> innitens arteriæ, sinistrorsumq; nonnihil suo caudice inclinans, tandem in<sup>l</sup> duos truncos discinditur: quorum dexter ad sinistrum latus caudicis magnæ arteriæ, posterioremque eius caudicis sedem dextrorsum reflexus, in dextros pulmonis lobos digeritur, sinister uerò in<sup>m</sup> sinistros. Porro<sup>o</sup> uenalis arteria, quam in tertio libro pariter cum arteriali uena persequuti fuimus, atque etiam ab usu, quòd aerem continet deducit<sup>ue</sup>, Arteriam: à substantia autem, quòd uenarum corpori respondet, uenalem nuncupari retulimus: inter sinistri cordis uentriculi uasa connumeratur: ac ut uenarum corpus adipiscitur, ita quoq; ex molliori eius uentriculi sede principium ducit. Ex sinistro enim sinistri uentriculi latere ad eiusdem uentriculi basis demissiolem partem, simili penitus modo quo caua ex dextro uentriculo, uenalis arteria<sup>p</sup> patenti admodum orbiculari; orificio enascitur, ac statim etiam ab ortu, aut in ipso potius ortu, in<sup>q</sup> duos truncos deriuatur: quorum dexter sub cordis basi productus, in dextram pulmonis sedem dispergitur, sinistro interim in sinistra pulmonis partem exporrecto. Quinam uero anteriori quoq; exortus uenalis arteriæ sedi<sup>r</sup> sinistra cordis auricula committatur, secundo ab hoc Capite, diligenter commemorauimus. Quartū uas, quod adhuc enarrationi deest, quartūq; cordis constituit<sup>s</sup> orificium, magna censetur arteria, pari ratione ex sinistro uentriculo, qua arterialis uena ex dextro, principium ducēs. Ex dextro enim elatissima sinistri uentriculi sedis latere, & ex cordis basis ueluti centro, arteria magna enascitur, aliquouſq; rectā<sup>t</sup> sursum sub uenæ arterialis caudice tantisper prorepens, donec cordis inuolucrum permeans, in duos discindatur truncos: quorum unus corporis superiora, alter inferiora petit. Atque ita profectò durorum crassorumq; uasorum, ipsius nimirum arterialis uenæ, ac arteriæ magnæ principia adeò inuicem correspondent, ut sinistrum arterialis uenæ latus dextro arteriæ magnæ lateri in ipsa origine adnatū sit, amboq; uasa hīc ex eminentissima cordis uentriculorum septi sede commune principium radicemq; possideant: quod eouſq; quibusdam animalibus, quanquam non homini, indureſcit, ut id Galenus reuera os esse affirmet. Cæterum<sup>u</sup> iste in sinistro cordis uentriculo ad septi eminentissimā sedem, adeoq; ad magnæ arteriæ orificium ascensus post dextram orificij uenalis arteriæ membranam inter diffecandum latens conscendensq; Aristoteli imposuit, ut inibi tertium cordis uentriculum constituerit, illum arteriæ magnæ principium esse recensens. quod sanè multo minus incusandum uenit, quàm quod uentriculorum cordis numerum pro animalium mole uariari scripserit. Quanquam nō mediocriter quoq; pendendum ueniat, Galenum in sexto de Partium usu libro, arteriæ magnæ orificiū amplius esse uenalis arteriæ orificio, asseruisse: quum scilicet hoc illo longè amplius cernatur. Neq; simpliciter Galenus magnæ arteriæ orificium, uenalis arteriæ contulit orificio: sed id ceteris etiam omnibus cordis orificijs latius ampliusq; esse cōtendit, adeò in Aristotelis dogmata incitatus, ut non animaduernerit uenæ cauæ orificium uel triplø amplius arteriæ magnæ orificio inueniri. Quandoquidē uerò<sup>z</sup> uenalis arteria mox in ipso ortu bipartitur, ac nullo ferè ductu diuīsa prodit, nonnulli dissectionum professores ipsius orificium tanquam geminum aliquod explicuisse, itaque plura quàm quatuor cordis orificia enumerasse uidentur. Vti etiam fortè orificiorum numerum illi insuper auxerunt, quibus uera uenæ cauæ<sup>4</sup> orificij uenæq; cauæ mox in ortu diuisionis constitit ratio. Eiusmodi namq; aliquid ex septimo de Administrandis sectionibus libro colligendū existimo, quum Galenus

i 8 fi. H. H.  
10 fi. I.  
h 6 fig. I. fup.  
per O.  
l 6 fi. L. K.  
m 3 fi. L. M.  
6 fig. I. h.  
n 6 fig. I. m.  
o 2 fig. 6. ap.  
15 lib. 3. 6.  
fig. G.

Penalis arteria.

Magna arteria.

Lib. 7 de Administrandis sectionibus.

Lib. 3. de Partibus animal. cap. 4.

In orificiorum numero recensendo Anatomicos uariare.

p 9 fig. D.  
D. 12 fi.  
gu. D.  
q 2 fi. 6. 15  
lib. 3. K. L.

r 6 fig. F.

s figura ca.  
11 li. 3. 6 fi.  
O.  
t 10 fi. A.  
u 10 fi. S. S.  
x 6 fig. O.  
sub I.

z 9 fig. L.  
sub E.

z 1 fig. 6. ap.  
15 lib. 3. H.  
in L.

4 7 fig. G.  
C. C.

Herophy-



Herophilum quidpiam illius Erasistratiq; sententiæ repugnans, censuisse indicat. Nisi etiam forsitan nonnulli ampliores orificiorum numerum proponentes, non illi proximo orificijs diductui, aut uicinisimæ illi uasorum bipartitioni  
 b fig. B. animum adhibuerunt: uerum ipsis cordis<sup>b</sup> auriculis, quarum una uenæ cauæ  
 c 7 fig. F. orificio, & altera arteriæ uenalis orificio adnascitur: ita singulis auriculis singula ascribentes foramina, seu orificia. utcunq; interim<sup>c</sup> auriculæ extra orificij uasorum circulum, atq; adeò extra cordis uentriculorum cauitatem & amplitudinem consistere, ipsisque etiam auriculis sinus cauitatesq; potius quàm  
 d, d. orificia ascribi oportere, non multo post docebitur.

DE VNDECIM MEMBRANVLIS QVA-  
 tuor orificiorum cordis. Caput XIII.

*Hæc membrane seriatim in septima, octaua, nona & decima figuris occurrunt. Septima namq; tres proponit, uenæ cauæ orificio præfectas, ac K, L, M insignitas. Octaua tres, in uenæ arterialis orificio positas, & E, F, G notatas. Nona duas uenalis arteriæ orificij, E & F indicatas. Magna autem arteriæ tres membrane, in decima B, C, D insignite proponuntur.*



A CORPORA cordis mēbranas nuncupamus, quæ cordis uasorum radicibus, ipsorum<sup>a</sup> ue exortibus adnata, colore, substantia, crassitie, prorsus membranæ existunt, materierum regurgitationibus (quantum cōiectura assequimur) præfectæ. Sunt porrò hæc omnes undecim numero: ac tres quidem singulis trium uasorum orificij, duæ autem duntaxat uni quarto<sup>a</sup> ue orificio adnascuntur. Ve-

*Membranarum  
 numero.*

a 7 fig. K. na cauæ<sup>a</sup> suas membranas, ut modò subiungam, locatas obtinet. Ipsi initio,  
 L, M. quod uelut extuberans in cordis substantia, ex qua prodit<sup>b</sup>, circulus est.<sup>c</sup> alius  
 b 7 fig. H. membranæ circulus proximè adnascitur, qui pari prorsus modo ac cauæ  
 H, H. initium, ex cordis substantia principium ducit: & quemadmodum illa ab or-  
 c 7 fig. I. tu extrorsum è cordis uentriculo fertur, ita quoq; membranæ hic circulus  
 K, L, M in- introrsum, inq; dextri uentriculi amplitudinem procedit. Insuper ut uenæ ca-  
 7 figura. uæ ilico à cordis substantia abscedit, solo exortu (qui breuissimus est) illi adna-  
 ta: sic etiam membranæ iste circulus minima amplitudine cordis substan-  
 tiæ hîc adnascitur, ilico ab illa abscedens & exacta, & solida, citraq; insignem  
 crassitiem ualida apparens membrana. Hæc in uentriculi cordis amplitudi-  
 d 7 fig. K. nem deorsum ducta, non procul à principio in<sup>a</sup> tres ueluti processus mem-  
 L, M. branulas<sup>a</sup> ue scinditur, quæ ex ampla basi in obtusum mucronem desinunt, à  
 semicirculi conuexo uix differentes. Mucronem autem harum membranularum  
 paulo supra mediam uentriculi dextri longitudinem cessat: & ipsæ nulla ex  
 parte, quàm circulari totius membranæ exortu, cordis substantiæ adnascun-  
 tur. Verùm ex tota inferiori tamen trium membranularum sede (quæ reli-  
 c 7 fig. N. quò ipsarum corpore nonnihil crassior ualidiorq; efficitur)<sup>c</sup> fibræ quædam  
 frequenti serie prodeunt: quæ deorsum per uentriculi amplitudinem ductæ,  
 uentriculi lateribus iuxta ipsius mucronem adnascuntur: non quidem dun-  
 f 8 fig. H. taxat, ut Galenus inuit, ad uentriculorum cordis<sup>c</sup> septum, at etiam ad reli-  
 H, H. u quam uentriculi mucronis (uti iam diximus) circūferentiam. Omnis namq;  
 fig. I. inferior membranularum pars illi uentriculi mucronis sedi fibras exporri-  
 git, quæ ipsi è directo constituitur. Hæ fibræ, quæ membranulis committun-  
 tur, excarnes sunt, & cordis substantiæ suis lateribus minimè adnascuntur: ue-  
 rum deorsum ad uentriculi mucronem uerticem<sup>c</sup> ue perductæ, suis tantum  
 7 fig. sinibus illi implantantur, prius aliquoufq;<sup>c</sup> carnosa substantia adactæ, sufful-  
 o, o. ss tæq;



ualidæ sunt membranæ, singulæ semicirculi modo principium ducentes. Venæ enim arterialis orificium introrsum, atq; in suam ipsius amplitudinē non-nihil in origine extuberans, suæ amplitudinis superficiem in tres semicirculos extrorsum à corde latefcentes distinctam obtinet: qui crassiores redditi, in ipsam uasis amplitudinem protuberant, ac suis tuberibus ueluti tres triangulos ita efformant, ut in puncto se cōtingentes circuli extra suam superficiem, suprà infraq; contactus terminum, angulos constituunt. Ab his semicircularibus tuberibus membranæ tota ipsarum amplitudine, quasi femiplenæ lunæ imaginem referentes, pronascuntur: nusquam uasi ipsi, præterquàm ad hæc tubera, adnatæ. Harum membranarū latissima sedes, quæ extrorsum à corde magis reliquis membranarum partibus remouetur, & sola membranarum latus est, uasi ipsi haud connatum, non ita instar circuli diametri recta cernitur, ut singulæ membranæ dimidij circuli amplitudinem prorsus expriment: uerùm ea sedes, aut latus, modicè introrsum obliquatur, & non adeò altè extrorsum uè in medio conscendit, atq; terminis, quibus utrinq; uasi continuatur. Quum itaque id membranularum latus instar dimidiatæ parentheſis ad hunc modum (inſectitur, & ipsarum membranularum exortus, & ad uasa connexus, semicirculum adamuſſim circumscribit, Græci has membranulas *συνωσίδες*, ab illorum C imagine, nuncuparūt. His tribus uenæ arterialis membranulis, tres in arteriæ magnæ ostiolo à Natura creatæ respondent, in nullo prorsus ab illis, quàm in magnitudine & robore differentes. Magnæ enim arteriæ membranulæ tanto grandiores ualidioresq; arterialis uenæ membranulis occurrunt, quanto eius uenæ corpus ab arteriæ corpore duritia amplitudineque uincitur.

Arteria magna  
membrana.

F. 10. fig. B.  
C, D. & F.  
cap. 2. infer  
te lib. 3. cha  
racteres 1,  
2, 3.

## DE CORDIS AVRICVLIS. CAPVT XIIIIL

CORDIS auriculas quarta figura proponit, I & K insignitas, ut & sexta M & F notatas. Verùm dextram auriculam inuersam ostendit septima figura F, & octaua K. Sinistram autem auriculam inuersam offert nona figura I, & decima L.



a 4 fig. I.  
5 fig. B.  
b 5 fig. B  
ad C, aut  
potius F se  
ptimæ fig.  
ad 11 pro  
ximum Q.

VRICVLAE cordis, dissectionum professoribus uocantur, appendices duo, basi ipsius adnati. à similitudine enim, quam illi in situ, non autem in usu, cum propriè dictis auribus obtinent, aurium nomine donantur. Dextra itaq; auricula, dextro cordis basis lateri attenditur, toti anteriori exortus uenæ caue regionis secundum illius longitudinem ita obducta, ut huius exortus ferè longitudini, dextræ cordis auriculæ basis longitudo respondeat. Auriculæ enim effigies pyramidem quodammodo refert: exq; oblonga basi in mucronem non ualde acutum, neq; admodum supra cordis basim protēsum definit. Basis enim longitudo, ipsius auriculæ etiam insignitè distentæ latitudinem ferè triplo excedit: & basis quoq; auriculæ longior multo est, quàm progressus à basi ad ipsius mucronem pertinens. Porrigitur autem auricula à basi fursum antrorsumq;: adeò, ut nulli auriculam forma, quod ad basim mucronemq; & deinde ad cauitatem ac compressionem distentionemq; attinet, exquisitiùs contuleris, quàm coriaceis tuberibus utrinque Turcarum fellis assutis, quæ equis fluuium transnatauri, uescicarum pilarum uè instar magno usu inslant. Exterior namq; auriculæ superficies pro illius repletionē uariat: quum enim auricula in cordis constrictione turget, oppletaq; est, gibba undiq; & æqualis cernitur. At inanita concidenteq; auricula, superficies hæc rugosa, ac ueluti plicis

Due cordis  
auricula.

Dextra auri  
cula sinis.  
forma.



oblita, spectantibus occurrit: interim tamen auricula exteriùs aqueo humore, ut & cordis superficies, obducitur. Verùm quandoque, licet id rariùs, exteriùs distentæ etiam auriculæ superficies inæqualis, propter adipem illi tunc obnatum, uisitur. Interior autem superficies, quæ cavitatem auriculæ circumscribit, uentriculorum cordis superficiei quodammodo respondet. Vt enim hæc, ubi uasa educit, læuis, tota uerò reliqua sede aspera, & foueis plena cernitur: ita quoque illa, ubi uenæ cauæ exortui adnascitur, læuis quidem est: reliqua autem amplitudine foueis ac fibrosis implexibus adeò scatet, ut cordis superficiem propemodum inæqualitate uincat. Atque hæc cavitatis amplitudine, prout auriculæ corpus aut concidit, aut distenditur, uariat: foueæ autem nunquam penitus explicantur. Auriculæ huius substantia, triplici fibrarum genere, & modica, eaq; admodum dura, & quasi cuticulari carne eas fibras amplectente constat: adeò ut auricula fibris cum cordis substantia respondeat, at carne (quæ, ut diximus, neruea magis, cuticularisq; & subnigricans est) à corde differat. Neque ab hac fibrarum cum carne ea commixtione, quæ uix cutis crassitiem superat, aliud peculiare auricula in sui constitutionem asciscit: non enim uenas arteriasq; & nervos priuatim ipsi insertos comprehendimus. Cæterùm auriculæ connexus propemodum ita se habet. Sinistrum sui basis lateris extremo cordis substantiæ, ubi anterior uenæ cauæ in dextro cordis sinu orificij regio consistit, adnascitur, aut uerius ab illo extremo auricula prodit. Dextrum autem basis lateris, uenæ cauæ corpori secundùm ipsius exortus à corde longitudinem, & in anteriori illius sede connascitur, ac ueluti cum uena commune corpus efficitur. tota reliqua parte auricula ab omni prorsus connexu libera est, & perinde ac cordis corpus, in inuolucro quoque cordis continetur, nullis fibrosis nexibus illi commissæ. Sinistra cordis auricula, pleraque cum dextra possidet communia: hæc namque in anteriori sede exortus uenalis arteriæ secundùm ipsius longitudinem consistit. Deinde ex basi in mucronem quoque cessat. uerùm is mucro (qui acutior dextræ auriculæ mucrone habetur) non adeò atque ille sursum, sed in sinistrum magis, ac in lateris exporrigitur. Insuper sinistra in prouectioribus ætate hominibus, dextræ auriculæ dimidiatæ etiam magnitudini cedit: ut & ipsum quoque uenalis arteriæ ostiolum longè minus uenæ cauæ orificio uisitur. Quod ad externam internamq; attinet superficies, auriculæ utrunq; mutuo respondent: quanquam exterior sinistræ superficies rugosior magis, multoq; inæqualior semper occurrit. Interior autem ipsius superficies similiter ac dextræ auriculæ, inæqualis, & foueis oblita cernitur. Substantia etiam similes sunt: uerùm sinistra multo durior, ac minus in constrictione distentioneq; sequax uisitur. Quinetiam si illam dextræ conferas, uelut marcidæ exiccataque spectabitur, adipe semper magis quàm dextra, exteriùs abundans. In connexu prorsus conueniunt. nam uti dextra uenæ cauæ, & dextro cordis lateri secundùm cauæ ortum adnascitur: ita quoq; sinistra dextro suæ basis lateri, cordis substantiæ, ubi uenalis prodit arteria, connascitur: sinistro autem latere, ipsi uenalis arteriæ corpori. Vsu, ut suo ordine paulo post dicturi sumus, parum admodum inter se differunt. Nunc enim omnium cordis particularum usum & functionem seriatim subijcere enitemur: hic adhuc admonentes, in fœtibus & nuper natis animalibus auricularum molem longè maiorem ex proportionem occurrere, quàm in ætate prouectioribus: ac insuper in uiuorum sectionibus auriculas deficiente cordis motu, etiam aliquandiu palpitare, moueriq;.

CORDIS,

*Dextra auriculæ substantia.*

*Nexus auriculæ.*

*Sinistra cordis auricula.*

e 7 fig. F.  
8 fig. K. ubi etiam cordis uentriculorum spectatur superficies.

d 6 fig. F.  
4 fig. K. 9  
fig. L. 10  
fig. L.  
e 6 fig. G.  
9 fig. G.

CORDIS, IPSIVSQUE HACTENUS COM-  
memoratarum partium functio & usus, ipsarumque adeo  
constructionis ratio. Caput XV.



OR irascibilis, seu uindictę honorisq; appetitricis animę *Cor cuius ani-  
mę sedes.*  
sedem esse, Hippocrati, Platoni, Galeno, & Stoicis ac Peri-  
pateticis pariter omnibus concessum fuit. Verum ad hæc  
Zeno, ipsiusque corroboraturus dogmata Chrysippus,  
Posidonius, cæteraq; Stoicorum familia, & Aristoteles  
cum Theophrasto, reliquisq; ipsius affectis, cor principiū  
fontemq; esse uoluere, non nunc dictæ tantum irascibilis

facultatis, sed etiam eius quæ ciborum, potuum, & uenereorū est concupisci-  
bilis: quam altricem Aristoteles, alij uerò naturalē, alij autem simpliciter con-  
cupiscibilem appellare consueuerunt. Deinde etiam Stoici unā cum Peripate-  
ticis, rationis uim, & ut semel dicam, animę principatum in corde colloca-  
runt, omnium id in animali functionū atq; officiorum initium esse arbitrati.  
Quanquam interim iidem inter se decretis pugnent. Aristoteles enim, Theo-  
phrastus, ac reliquis Peripateticorum chorus, & ex Stoicis Posidonius, irasci-  
bilem uim, ac concupiscibilem, & rationalem unius quidem substantię ē cor-  
de proficiscentis facultates esse asserunt: animę autem species partes ue esse  
inficiantur, neq; eas distinguūt. Chrysippus uerò, Stoicorum non postremus,  
sicut in unam substantiam, ita quoq; in unam facultatem & iram & cupidita-  
tem cum ratione coegit. At his omnibus refragatur, ex diuini atq; inter medi-  
cos facilē primarij Hippocratis, & inter philosophos eminentissimi Platonis  
sententia, Galenus, quum in alijs plerisq; locis, tum potissimum in nouē libris,  
quos de Hippocratis & Platonis dogmatibus inscripsit. Illis namq; libris tres  
animę species partes ue natura admodū inter se discrepantes docens, firmis-  
simis, & scientiam suo ipsius suffragio facientibus demonstrationibus compro-  
bat, iecur ciborum potuumq; & uenereorū concupiscibilis animę, cerebrum  
autem rationalis ac principis locum esse, cor duntaxat irascibilis animę erga-  
stulum esse, cōcedens. Porro ne hic forsitan in aliquem hæresis censorem im-  
pingam, ab hac de animę speciebus, earundemq; sedibus disceptatione, pror-  
sus abstinebo: quum tot hodie, ac potissimum apud nostrates, uerissimę no-  
stræ religionis iudices reperiās: qui si quempiam, uel quum corporum refe-  
ctiones aggredimur, eiusmodiq; in primis scrutari oportet, aut de Platonis,  
aut Aristotelis, suorum ue interpretum, aut Galeni de anima sententijs, mus-  
sitare audiuerint, ilico illum de fide ambigere, ac nescio quid de animarum  
immortalitate hæsitare astruunt: non pendentes, necesse esse medicis (si  
modò non temerē ad artem accedere, neq; inopportunē ægrotanti membro  
remedia inuenire, eademq; applicare uoluerint) de ijs quæ nos gubernant fa-  
cultatibus considerare, & quot numero sint generatim, & qualis quæq; sigil-  
latim habeatur, quo ue in animalis membro singulæ constitutæ sint, fomen-  
tumq; recipiāt: & præter hæc maximē (si modò id adipisci mente possemus).  
quæ animę substantia essentia ue sit. Quasi uerò non citra impietatem, nul-  
lamque prorsus fidei labem, quis de grauium illorum autorum decretis nihil  
proponere, aut etiam illorū rationes alijs nouis corroborare, aut friuola quo-  
rundam argumenta refellere posset: ac quasi non multo aliter de sanctissima,  
quæq; accedentibus pijs operibus fide saluamur, felicemq; æternitatem homi-  
num animæ adipiscuntur, quàm de his autorum dogmatibus, ac quas imbe-  
cillis & humana ratio suppetit hoc in negotio opinionibus, loquendū interro-  
gandumq;

*Medico de ani-  
mę facultati-  
bus ac sede con-  
siderandum.*

Cui functioni  
omnes cordis  
partes famu-  
lentur.

Inuolucris suis.

Situs cordis  
ratio.

Lib. 2. de De-  
cretis Hippocr.  
& Platonis.

Forma cordis  
ratio.

Cordis substan-  
tia usus.

Coronales ue-  
ne & conomi-  
cantia illam ar-  
teriarum usus.

Cordis nervuli  
usus.

Durioris cor-  
dis substantia.

gandumq; foret. Nihilominus interim omni de animæ facultatibus, functio-  
nibus, substantia, natura, speciebus, & earum sedibus, inuestigatione remissa,  
liberè asseremus, cor facultatis, atq; adeo spiritus uitalis fontem, & caloris na-  
turi sedem fomitemq; existere, ac pulsuum autorem esse, singulasq; cordis par-  
tes illi ad calorem spiritumq; spectanti usui subseruire commonstrabimus.

Quis itaq; cordis inuolucris (ut singula ea serie, qua earundem prius constru-  
ctionem enarrauimus, persequamur) sit usus, peculiare de inuolucro Caput  
utrunq; pertractauit. Deinde & cordis situs, antea comemoratus, in ipso tho-  
race est tutissimus, & ab omnibus que thoraci extrinsecus noxam inferre pos-  
sunt, remotissimus. Præterea cor in pulmonis, id suis lobis ueluti digitis qui-  
busdam amplexantis, medio ita consistit, ut æqualem prorsus ex omnibus pul-  
monis partibus, aeris per uenalem arteriam molitur attractionē, & rursus  
fuliginosorum recrementorū egestionem in pulmonē tentet, & iusta etiam  
portionem per uenalem arteriam & uenam arterialem pulmonī sanguinem por-  
rigat. Ad hæc, cor non admodum procul ab ore, per quod respirationē perfici  
necessum erat, locatū, eam corporis sedem nihilominus obtinet, ex qua com-  
modè per arteriæ magnæ ramos toti corpori natiuum calorem, spiritumq;  
uitalem offerre queat. Quamuis etiā, quod ad totum corpus attinet, à medijs  
partibus tantum superius recedat, quantum à pubis ossiū coalitus superiori  
sede distat. hæc enim erecti adultorum corporis exquisitum ferè habetur me-  
dium: non autem umbilicus, quem Galenus, cordis sitū enarrans, adamusim-  
esse medium censebat. Quòd porrò propter basim, quam latam amplamq; ob  
quatuor grandium ab illa prodeuntiu uasorum initia esse oportuit, cor non  
exactè rotundum effectum sit, etiamsi non dicatur, omnibus manifestum  
esse conijcio. Quancum Natura interim cor sphaericæ figuræ, iniurijs inno-  
xiè ferendis omnium pertinacissimæ, & cæteris omnibus capaciōri, adeo ac-  
cedere uoluit, ut cor in maximis ipsius dilatationibus prorsus sphaericum  
appareat: quemadmodum in ipsius contractionibus oblongum, & pineæ nu-  
cis modo productum cernitur. Neque etiam alia ratione cor oblongum esse  
dicimus, quàm quòd id in mortuis concidens, productumq; semper offendi-  
tur. Si enim id in mortuis ita distentum obseruaretur, quemadmodum in ui-  
uis sectionibus id, quoties intensè dilatatur, breuius quidem, sed latius & pro-  
fundius fieri spectamus: tunc merito non oblongum, sed rotundum, ac paulo  
minus toto sphaericū esse censeremus. Quis autem cordis substantiæ sit usus,  
in decimo Capite, quādo cordis cum musculo cōmunitatem, & rursus diffe-  
rentiam prosequabamur, necessariò cōplexi sumus: præcipuè tum explican-  
tes, cui potissimū munerī triplex fibrarum genus, cordis substantiam inter-  
texens, dein & caro has amplectēs & suffulciens, præficeretur. Cæterū uen-  
na, cordis basim coronæ instar cingens, & ramos per externam cordis superfi-  
ciem deorsum à basi exporrigens, cordi nutrimentum suppeditat: & cor-  
onales arteriæ, eius quam perreptant cordis substantiæ natiuum calorem con-  
temperant, magnamq; Naturæ suorum ramorum distributione attestantur  
industriam, quum horum plures amplioresq; secundum anteriora & poste-  
riora & sinistrum latus cordis porrigantur, quàm ad dextrum, ubi dexter cor-  
dis consistit uentriculus, cordisque substantia multo quàm alibi occurrit: te-  
nuior, minusq; ob id uenis & arterijs indigens. Cæterū neruulus basi cor-  
dis oblatas, tristantium duntaxat sensus gratia, non autem motus, cordi lar-  
gitur. Cordis cartilagineam, aut si uoles dicere osseam substantiam, uenæ ar-  
terialis & magnæ arteriæ origini additā, aut ex qua potius illa uasa originem  
ducunt,

d 1 fig. B.  
C, D, E, F,  
G. & A. H.  
B. B.

b Specta-  
tur id 3, 4,  
5, 6 figuris.  
c 6 fig. C.  
d 1 fig. I.  
e 1 fig. cap.  
f 1 fig. 3.  
g 1 fig. ut  
timari lib.  
1.

e fig. 4. ap.  
12 lib. 3.

g 1 fig. ut  
timari lib.  
1.

b 1 fig. C.  
dein 6 fig.  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

i 6 fig. D.

h 6 fig. D.  
10 fig. E, F.  
11 fig. cap.  
12 lib. 3. B.

1 Specta  
fig. 11.  
12 lib. 3. B.

1 circa S.  
S 10 fig.



ducunt, ad cordis fulcimentum facere, dissectionis professores arbitrantur. quamvis etiam ea ipsa substantia, nullum prorsus, cui insulat, firmamentum habeat, nisi forsitan quatuor cordis uasa, cordis inuolucrum penetrantia: quæ non magis tamen huic cartilagineæ substantiæ, quàm reliquæ cordis basi (si quid modò ad stabilitatem conducerent) firmamento essent. Porro cordis *Dextri cordis uentriculi usus.* uentriculorum officium eiusmodi ferè esse creditur.<sup>o</sup> Dexter, eo quòd sanguinem præcipuè continet, sanguinisq; elaborationi potissimum dedicatur, sanguineus nūcupatur. is namq; pulmonis duntaxat gratia, à summo rerū Opifice, insigni iustitia cordi insculptus putatur. Pulmo enim, qui instar pròptuarij cordi circūponitur, ut id ab illo aerè perpetuò allicere queat, rarus, fungosus, levis, ac ad thoracis motus sequacissimus fieri debuit. neque eiusmodi profectò functionibus idoneo nutrimento ali potuit, nisi priuatim illi sanguis ex eo quem caua continet, levis, aereus, spumofus, expurgatus, nihilq; minus quàm fæculētus, ab alio organo præpararetur, atq; ita ipsi pulmoni ad opportunam nutritionem deduceretur. At nullum organū corde ipso calidissimo, & pulmoni proximo uiscere, ad id munus erat aptius: neq; etiam aliud omnino iustius pulmoni hac in re famulari poterat. quandoquidem nimis quàm ingratum cor habendum foret, si pulmoni tam amicè aerem (quo, nisi ilico concidere emoriq; uelit, perpetuò indiget) ipsius nomine attrahēti, ac obsequētissimi famuli ritu præparanti, & illius potissimum gratia fabricato, nullas uices referēdas putaret: ac non modis omnibus cor, ut gratiam reponeret, pulmoni opportunum alimentum (quum id citra incommodum possit) conficere præparareq; studeret. Dexter itaq; uenterculus, in animalibus quæ illo simul cum pulmone donantur, à<sup>a</sup> caua uena, quoties cor dilatatur ac distenditur, magnam sanguinis uim attrahit, quem adiuantibus fortè ad hoc uentriculi foueis excoquit: ac suo calore attenuans, leuioremq; & qui aptius impetu postmodum per arterias ferri possit, reddens, maxima portione per uentriculorum cordis septi poros in sinistrum uentriculum desudare sinit: reliquam *Uena came ori sicut in cor perueniens usus.* autem eius sanguinis partem, dum cor contrahitur arctaturq; & per uenam arterialem in pulmonem delegat. Cur uerò hæc inter reliquas corporis uenas, arteriæ<sup>a</sup> tunicas adipiscatur, alibi obiter expressimus, quum eam crassam ualidamq; factam esse diceremus, tum propter continuos pulmonis & cordis motus: tum etiam, ne pulmo tenuis illius quem continet sanguinis, plus quàm ad nutritionem sufficere possit (etiam si quàm plurimo indigeat) sibi alliceret: dein ut pulmo, continuo ipsius motu & calore sanguinem in arteriali uena deductum sibi magis excoqueret, spumosioremq; redderet. qualis is iam profectò est, qui per arteriam uenalem ex sinistro cordis sinu pulmoni offertur, quum is iam in utroq; cordis sinu elaboratus fuerit. Accedit huic, arterialem uenam, organū soli nutritioni opportunissimè subserviens, quodq; secundum pulmonis cōpressionem & dilatationē quiescere, atq; quàm minum moueri oportuit, magna Naturæ prouidentia alijs corporis uenis impensius rigidum, crassumq; & cōpressu dilatuq; difficilius factū esse. Hæc siquidem ratione uenæ arterialis propagines, arteriæ uenalis & asperæ distentione & dilatatione minus impediūt: quum interim, si illæ propagines sequaces essent, atq; leui occasione distenderētur, magnā pulmonis amplitudinē illos dilatato impleant: & rursus cōpresso pulmone, promptè subsiderent, magnamq; uim in asperæ arteriæ propagines ex pulmonis cōpresso fieri prohiberent. Atq; hinc sanè, dum de uasorū robore loquimur, dextræ cordis auriculæ *Arterialis ne ne uisus, & ipsius constructio ratio.* usum forsitan petere poterimus. Quum enim cor ualido impetu distentum,

*Dextra cordis  
auricula uisus,  
et ipsius con-  
structionis ra-  
tio.*

sanguinem in dextrum ipsius sinum ex caua allicit, & quodammodo rapiens, eum absorbet: quumque ipsa uena caua, ut ex illa in alias corporis partes sanguis, non ita ac ille pulmonis tenuis, gratia nutritionis resudaret, nō adeo crasso ualidoq; atq; arteriæ, constat corpore: periclitaretur profecto uena in uali da illa cordis attractione, rumpi, nisi sagax Natura dextram cordis auriculam creasset, quæ ad cordis motus sequax, & sanguine plena, quum cor dilatatur, sanguinē eum quem cōtinet, in dextrum uentriculū diffundere posset: ipsaq; quodammodo in uentriculū, attractionis impetum solutura, cōuolueretur, cordiq; instar promptuarij esset. Atq; huic usui auriculæ correspondet cuticularis cōstructio, quæ leuis, & iniurijs interim perferēdis contumax, & ad cordis motus sequax est. caua autem uisitur, ut continere materiā possit: & fibris constituitur, ut attractioni, retētionī & expulsiōi subseruiat. Neq; etiam carne, quæ fibras illas amplectitur, destituta est: uerūm quod cordis substantiæ, ipsius auriculæ substantia adeo cōuenit, uidetur ostendere, & innata sibi facultate ad sanguinis leuem quandam cordis uētriculo præparationē conducere. Ceterūm ne irrita cordis, dum dilatatur, in dextrum uentriculū sanguinis ex caua uena fiat attractio, eodē scilicet rursus, dum cor cōprimeretur, per idem

*Membranula-  
rum caua orifi-  
cio præfecta-  
rum usus.*

orificium Euripi ritu propulso, tres mēbranulas cauæ uenæ orificio Natura præposuit, quæ quidē sanguinem dilatato corde in uentriculū ex caua influe- re admittūt: at cōpresso corde, ne idē in cauā resluat, prohibent. Quum enim dexter cordis uētricus distēditur (quod fit, quoties breuior redditus, in lati- tudinē profunditatemq; insigniter proficit) tunc mēbranæ illæ laxiores factæ, ad eius uētriculi latera cōcidunt: ac sanguini, recluso cauæ uenæ orificio, aditū præbēt. At uētriculo rursus cōstricto, seu (ut in cōstrictione fit) lōgiore facto, & interim arctato, membranarū fibræ, ipsæq; mēbranæ propter cordis mucronē ab ipsius basi magis abscedentē tendūtur. & quum uētriculi mucro in eum modū angustior efficiatur, membranarū quoq; fibræ mucroni uētricu- li potissimū adnatæ, inuicē colligūtur: ac proinde etiā eregionē cētri uenæ ca- uæ orificij, suis extremis inuicē accedentes, orificiū id occludūt: & quo minus sanguis rursus in cauā profluat, obstaculo sunt. Verūm & ad hanc actionē, san- guis ipse à uētriculi lateribus cōpressus, auxiliatur. is namq; quum uenæ cauæ orificium petit, ad posteriōrē membranarū sedem impetu ruit: easq; uersus orificij centrū tunc cōprimens, ut illæ magis inuicē connueant, autor est: ac si bijspsi, ne hāc illi aditus detur, obstat: uenæq; tunc arterialis orificium accedit, quod in cordis cōtractionibus patens, sanguinē uersus pulmonē transmittit. at quo minus sanguis rursus, dilatato corde, in dextrū uentriculū regurgitet,

*Membranarū  
arterialis uenæ  
orificij ratio.*

\* tres mēbranæ arterialis uenæ orificio præfectæ cauēt. Illæ etenim, quia prin- cipii cum uenæ arterialis origine ducūt, ac sursum tensæ, in uenæ cavitatem cessant, atq; ad uenæ latera cōcidunt, sanguinē in cordis cōtractionibus prom- ptē in uenā fluere sinūt. at quum is rursus ob cordis dilatationē ad uentriculū uacui fuga retractus, aut etiā in pulmonis cōpressionē uersus uenæ arterialis caudicē protrusus, ad cor impetu uergit, per uenæ latera descendēs, inter uenę corpus, & posteriorem membranarū sedem cōcidit, spaciū quod inter cor- pus uenæ ac mēbranas est, implens. Vnde etiā sanguis necessariō mēbranas deorsum protrudēs ipsis, ut ad orificij uenæ arterialis centrū inuicē connue- ant, orificiūq; claudant, occasio est: adeo, ut quanto uehementiūs cor sua dila- tatione sanguinē retrahit, ipseq; pulmo inter expirandū cōprimitur, tanto ex- actiūs mēbranæ arterialis uenę orificiū obturātes, sanguinē in cor refluere pro- hibēt. quanquā nō ita accuratē id præstēt, ut nihilo prorsus sanguinis in primo retractione

*u. 7 fig. K.  
L. M.*

*x 8 fig. E.  
F. G.*

<sup>7</sup> Patet in <sup>5</sup> Cr. 10. <sup>9</sup> figuris. retractionis impetu in cor rursus defluat. <sup>7</sup> Sinister cordis uentriculus, quod spiritum uitalem præcipue contineat & conficiat, aeremq; amplectatur, diffusionis professoribus spirituosus aeris uenuncupatus est: ac quæadmodum <sup>6</sup> fig. G. <sup>9</sup> fig. C. dexter ex caua sanguinem trahit, ita quoque iste aerem ex pulmone in arteriam uenalem attractum, ad se dilatato corde allicit, illoq; ad caloris innati refrigerationem, & substantiæ ipsius enutritionem, spiritumq; uitalem utitur, hunc aerem excoquens & præparans: ut is unâ cum sanguine, qui ex dextro uentriculo in sinistrum per uentriculorum septum copiosus refudare putatur, in magnam arteriam, totumque adeo corpus delegari possit. Quod autem eiusmodi alterationibus, cordis caro præficiatur, quoad diuinam hominis fabricam cognoscere possimus, fatemur. Cæterum si quæ fuliginosa recrementa ex hac aeris in sinistrum uentriculum attracti emutatione, ipsoq; innato calore producantur, ea rursus per arteriam uenalem, constricto corde, in pulmonem externi arbitramur. Atq; hæc potissima arteriæ uenalis in tunica ipsius tenuitate constructionis est ratio. nam continuè indefessèq; aerem ex<sup>b</sup> aspergunt arteriæ ramis, ipsoq; adeo pulmone, in se assumere debebat: & rursus suis motibus cordis rhythmis correspondentibus, fuliginosas cordis reliquias in asperæ arteriæ ramos propellere. quod sanè difficulter admodum fecisset, nisi corpus tenuius rariusque alijs arterijs nata fuisset. Nam etsi hæc eum reliquis partibus corporis usum præstent, in quo hæc cordi accommoda censetur, non tamen arteriæ pro ipsarum mole tantum aeris (qui illis non per occultos meatus, sed per patentes in ipsis cavitates à corde unâ cum sanguine offertur) assumere, rursusq; propellere, ac arteria uenalis, debebat. adeo sanè, ut hæc necessariò tenui & uenarum corpore tunica uenae conformetur. Quanquam Natura interim adeo suæ securitati, ac possibile fuit, prouiderit: quippe longum ex sinistro uentriculo ad pulmonem ductum (qui arteriæ uenali nocuus fuisset) præcauens, statim in ipso ortu eam<sup>c</sup> diuisit, atq; breuissimo prorsus incessu illam in pulmonem digessit: ut hæc ilico pulmonis substantia undiq; suffulta, implicataq; à ruptionis periculo redderetur securior. Deinde & ex uenalis arteriæ corporis tenuitate (quam Natura, nisi illa maximè indiguisset, facile uitassèt) alius accedit usus, pulmonis nutritioni accommodus. nam hæc arteria sanguine tenui ac spirituoso oppleta, etiam pulmoni idoneum suppeditat sanguinem, id pulmoni supplens, quod nimium seuera rigidaque arterialis uena ob corporis sui crassitiem, & sanguinem minus quam arteriæ uenalis sanguis leuem aeremq; pulmoni denegabat. Porro<sup>d</sup> sinistra cordis auricula, uenali arteriæ adnata, idem officium huic & sinistro cordis sinui præstat, quo cauæ uenæ & dextro cordis uentriculo dextram auriculam usui esse diximus. & sinistra auricula tanto minori donatur cavitare, quanto etiam arteriæ uenalis orificiū, cauæ orificio angustius uisitur. Dein & aer ipso sanguine sequeior est: ad eò, ut & hac quoque occasione sinistra auricula iurè minor dextra creetur. Nam quum aer ita promptè attrahatur, non tantum periculū erat ex attractionis impetu (qui potissimum uacui fuga aerē trahit) uenosæ arteriæ corpus, ita atq; cauæ, cœuelli. Quod autē sinistra auricula pro ipsius mole paulo carnosior, ac etiā crassior & pinguior, & ad motū minus prompta, quam dextra auricula occurrit, argumētū quoq; est, ad quandam materierū præparationem auriculas cordi famulari, & auriculas ipsas proportionē quandam cum cordis sinibus sortiri. Porro ut auricularū par usus est, ita etiā sinistri uentriculi membranulæ usu penitus cum dextri uentriculi membranulis conueniunt. <sup>e</sup> Duæ enim uenalis arteriæ orificio commissæ, ac introrsum in cordis uentri-

*Sinistri cordis uentriculi usus & constructio nō ratio.*

*Uenalis arteria corporis ratio.*

*Sinistra cordis auricula usus.*

*Membranulæ uenalis arteriæ & magnæ arteriæ usus.*

<sup>c</sup> 2. <sup>5</sup> fig. cap. <sup>15</sup> lib. 3. <sup>3</sup> H. in K. L.

<sup>d</sup> 6. <sup>5</sup> fig. R. <sup>9</sup> fig. L.

<sup>e</sup> 6. <sup>5</sup> fig. E. R.



uentriculum deductæ, corde quidem dilatato, aerem ex uenali arteria in uentriculum ferri admittunt, ipsarum fibris propter cordis mucronem uersus basim magis adductum laxatis, ipsisq; membranulis ad uentriculi latera concidentibus. Quum autem cor constringitur, obstaculo sunt, ne aer rursus in uenalem arteriam ruat, irritusq; cordis labor efficiatur. quanquam interim credamus, has membranulas, quum duæ duntaxat sint, suum officium, cui præficiuntur, non ita adamussim obturare, ut fuliginosis excrementis per uenalem arteriam exitum in cordis cōstrictione præpediant. Quinetiam magnæ arteriæ orificium occupantes<sup>f 10 fig. B, C, D.</sup> membranæ, ijs omnino functione correspondent, quas in uenæ arterialis orificio haberi retulimus. Hæ siquidem in cordis contractione spiritû uitale m unâ cum sanguine, qui impetu ruit, in magnam arteriam profluere sinūt. at corde rursus dilatato, spiritûq; ac sanguine denuò ad uentriculum tracto, illius regurgitationem in uentriculum prohibent, sanguine nimirum eas uersus magnæ arteriæ orificij centrum (ut in arteriali uena fieri nouimus) cōprimente. In cordis itaq; cōstructionis ratione, ipsiusq; partium usu recensendis, magna ex parte Galeni dogmatibus sermonem accommodaui: non sanè, quòd undiq; hæc ueritati consona existimem, uerùm quòd in nouo pascim partium usu officioq; referendo, adhuc mihi diffidam, neq; ita pridem de medicorum principis Galeni sententiâ uell latum unguem hic declinare ausus fuerim. Haud enim leuiter studiosis expendendû est uentriculorum cordis<sup>g</sup> interstitium, aut septum, ipsum<sup>h</sup> uel sinistri uentriculi dextrum latus, quod æquè crassum cōpactumq; ac densum est, atq; reliqua cordis pars, sinistrum uentriculû completēs. adeò ut ignorem (quicquid etiam de foveis hac in sede cōmenter, & uenæ portæ ex uentriculo & intestinis sectionis non sim immemor) quî per septi illius substantiam ex dextro uentriculo in sinistrum uel minimû quid sanguinis assumi possit: præcipuè quum tam patētibus orificijs uasa cordis in suorum uentriculorum amplitudinem dehiscant: ut modò taceam uerum uenæ cauæ ex corde progressum. Atque quum hæc animo obuersantur, simul sese multa in arteriarum serie offerunt, de quibus non immeritò uenit ambigendum: nimirum nullam ferè uenam absq; comite arteria uentriculum ac intestina, lienemq; adeò ipsum petere, & ferè totam portè uenam sua serie comitem sibi arteriam asciscere. Deinde renibus arteriæ tam grandes communicantur, ut neutiquam ad illorum calorem duntaxat temperandum, eas productas esse queamus affirmare: uti minus adhuc solius caloris natiui gratia tantas arterias uentriculo, intestinis, lieniq; insertas esse, possumus asserere. His accedit, quòd per uenas arteriasq; mutuos materierû fluxus & refluxus esse, ac nihil prorsus grauitatem & pondus materierû in uenis arterijsq; agere, plurimis argumentis oporteat fateri. Cordis insuper membranulæ, etsi dicto iam prius usui ferè subserviriât, non tamen omnem materierû regressum occupant. Quòd uerò aures, corde in uiuorum sectionibus per transversum dissecto, & cordis motu prorsus quiescente, adhuc moueatur ac palpitent, quodq; in foetibus & nuper natis tam grandes occurrunt, cui non cōstare debet maioris alicuius beneficij occasione, quàm uasorum roboris gratia, eas efformari? Atq; ita quoq; longè alia (ne quid de orificij uenalis arteriæ ad magnæ arteriæ orificiû collati amplitudine insinuem) partium dextrum uentriculum & sinistrum constituentium<sup>i</sup> discriminis in i

*Pulga in Anatomie  
comitorum placita  
cuius non leuiter  
acquiescedum.*

*g 8 fig. H.  
H. 10 fig. R.  
11 fig. I, I.  
h 9 fig. M.  
M 10 fig.  
P, Q.*

*Confer  
Q. R. fig. 7  
cuius M, M  
figure 9.*

innouare

innouare (quum simul in omnibus mihi haudquaquam satisfaciam) modò statuerim, partium aeræ substantiæ reficiendæ fabricatarum historiæ nunc finem imponam: ipsarum administrandi rationem ea serie iam pertractaturus, qua proximè præcedente libro cibi potusq; & generationis organorum sectionem absolui.

## CORDIS, PVLMONVM, RELIQVORVMQVE

respirationi seruientium organorum administrandi

ratio. Caput XVI.



RAE SENS Caput, quo potissimum earum quæ hoc libro traditæ sunt partium refectionem complecti statui-  
mus, in orationis serie, ultimo quinti libri Capiti nunc est  
subijciendum. quandoquidem hæc Capita cum penultimo  
septimi libri Capite, eum in modum digerentur, ut singula  
partium quæ suis libris explicantur administrandi rationem  
proponant: & interim eum ordinem (quem scitionem

licet paucis insuper additis necessario alioquin sermoni uerbis, id commodè  
præstari possit) unâ exhibeant, quo quis in corporum penuria, integram anatomen  
studiosis demonstrare queat, aut quo hi illam opportunè suo Marte  
aggrediantur. In eodem itaq; corpore, quo superiori libro usus es, administrationem  
continuaturus, illius ceruici fulcrum aliquod subijcies, cuius ope ea ex-  
porrigatur, caputque in posteriora reclinatum, & fulcro non innitens, uersus  
menfam dependeat. Mox, ut in secundo libro docui, faciem & uniuerfam an-  
teriore collis sedem cute nudabis. ac primum faciei<sup>a</sup> musculos, qui frontis

cutem & palpebras, & buccas & labra, & narium alas mouent, aggredieris: in  
quorum etiam numero<sup>b</sup> ille est, quem labra & buccas mouentium primum  
recensui. Quum igitur & illum quoq; administaueris, musculum à pectoris  
osse & clauicula refecabis, qui septimi caput agentium paris alter habetur, ac  
in<sup>a</sup> mamillarem capitis processum inferitur, à quo illum nunc dependere si-  
nes, & ad omnes ferè<sup>c</sup> musculos ossi<sup>v</sup> imaginè referenti proprios, sectionem  
conferes: unaq; à pectoris ossè<sup>e</sup> eos liberabis, qui ab illo pronati, primæ laryn-  
gis cartilagini inseruntur. Deinde à pectoris ossè, & clauicula, & costis, ad suam  
usq; insertionem, musculum separabis, brachium pectori adducentem, insu-  
per<sup>h</sup> illum à clauicula aufres, qui thoracem mouentium primus numeratur.

& eum à costis etiam diffecabis, qui scapulam pectori admouet. hæc interim  
obseruata ratione, ut singulos musculos ab insertionem hæere permittas, quò  
postmodum cum ceteris musculis in examen uenire possint, qui adhuc secan-  
di in illis ad quas ipsi referuntur partibus, sunt reliqui. Atq; hanc musculorum  
administrationem in uno latere moliri suffecerit: altero latere uenis, arterijs  
& neruis, qui sub cute & secundum musculos repunt, inspicendis ostenden-  
dis<sup>ue</sup> accommodato. quorum<sup>f</sup> series, si forsan memoria exciderit, ex tertio  
libro & quarto est petenda. Hic enim sermo in immensum excresceret, si illam  
quoq; nunc totam recensere. Modò igitur à pectoris ossè<sup>i</sup> clauiculas acutio

quoq; liberare contendes, robusta, quibus illæ pectoris ossi colligantur, li-  
ri cultello liberare contendes, robusta, quibus illæ pectoris ossi colligantur, li-  
ramenta diuidens: at interim accuratissimè cauens, ne cultello altius iniecto,  
quæ huic articulo subsunt, uasa uulneres. Atq; hic<sup>m</sup> cartilaginem examinabis,  
quæ clauiculam, pectorisq; ossis sinum, præter alias articularum cartilagine  
intercedit: & aliquò reponenda est, ut illa postmodum in sceleti connexu (si  
uifum fuerit) uti queas. Liberatas autem clauiculas nitèris ui à pectoris ossè  
attollere,

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

clauicularum à pectoris ossè liberatio:

Costarum car-  
tilaginum cum  
pectoris ossi-  
bus liberatio.

Membranarū  
thoracis ampli-  
tudinem inter-  
spiciunt  
examen.

Nervorum se-  
pti transversī  
examen.

Cordis in-  
volucrum.

attollere, ac ab illo primāq; costa in exteriora reflectere. ita enim primæ tho-  
racis costæ cartilago, quæ costæ ossi continuatur, in conspectum ueniet: quæ  
cultro non admodum crassio à suo osse est<sup>o</sup> liberanda: hīc quoq; mente adhi-  
bita, ne culter profundius demersus, quicquam in iugulo utiet. Vbi primæ co-  
stæ dissecueris cartilaginem, deinceps ordine reliquas omnes à costarum ossi-  
bus cultro dirimes, cōtinuāq; linea intercostales hīc musculos ad thoracis usq;  
capacitatē<sup>o</sup> diuides. Separatas nunc cartilagine simul cum pectoris osse non-  
nihil attolles, eas modò in dextrum, modò in sinistrū latus<sup>o</sup> deflectens, & tho-  
racem intersepientes membranas, quæ pectoris ossi proximæ sunt, unā cum  
cordis situ examinans.<sup>o</sup> Deinceps transuersa sectione<sup>o</sup> septum transuersum à  
pectoris osse, & commissis huic adhuc cartilaginibus, uenit adimendum: &  
pectoris osse sua mucronata cartilagine sursum eleuato, membranæ thora-  
cem intersepientes ab illo sensim sunt diuellendæ: quod quum feceris, uersus  
cadaueris caput pectoris os reflectes: moxq; iuxta<sup>o</sup> glandium, uenam & arte-  
riam utrinq; sub ipso prorepentes, retusiore cultello inter membranulas in-  
quires, quas ubi singulas uinculis interceperis, os pectoris cum ipsius simul ua-  
sis à thorace auferes: ac membranæ costas succingentis speciem, intercosta-  
liumq; musculorum, qui inter cartilagine habentur, naturam perpēdes. Aut  
musculis illis non aliter examinatis, os pectoris aliquantisper repones, dum  
thoracem mouentes musculos simul omnes post cordis administrationem  
ostendere uisum erit. Quò autem ea quæ in thorace aggredienda super sunt,  
commodiùs commonstrarētur, consueui primū hamulo hinc inde costas  
succingentem membranā auellere: & manibus pulmonē, si alicubi illi fibris  
cohæreret, ab ipsa dirimere: ac insuper perforato costarū quopiā interuallo,  
cui pulmo adnexus est, demonstrare, quò nam pacto hominis thorax subinde  
pertundatur: nō abolita interim respiratione, neq; motu pulmonis quiescēte.  
Mox diuisis intercostalibus musculis, costas ad medium ferē lōgitudinis ipsa-  
rum frangere solitus sum. quod paruo sit negotio, si singulæ seorsum manu  
fortiter apprehensæ, ui euertantur, inflectantur<sup>ue</sup>. Verū posteaquā facilem  
illam parandi sceleti rationem adinueni, ut ossa cadaueris illi compingen-  
do subserviant, costas reseruari malim integras, & manibus simul omnes co-  
stas, quantum licet, extrorsum retorqueri: & dein aliquousq; diuisis interco-  
stalibus musculis, inuicem costas sensim dirimi. ita enim satis patens thoracis  
efficitur amplitudo, potissimū si secundū dorsi longitudinem, ac ad tho-  
racis ferē medium, lapidem aut globum aliquem subieceris, cuius ui dorsi gib-  
bus extra thoracis cavitatem prominēs, intrò in thoracis cavitatem ducatur,  
grandiusq; inter dextri sinistriq; lateris costas fiat interstitiū. Costis itaq; hoc  
modo diductis, aut illo modo disruptis, pari semper ratione thoracis organa  
sunt aggredienda. ac primū à glandio ad septi transversī nerueam usque se-  
dem,<sup>o</sup> dextrum ipsius neruum à dextra thoracem intersepiente membrana  
cultello liberabis: deinde, si uoles, sinistrum quoq; quem ubi simul cum<sup>ue</sup>  
na à iugulo pronata exporrigi uideris, illum iuxta septum rumpes: ac uersus  
cervicem, ut postea ipsius uideas<sup>o</sup> originem, reijcies. Mox membranas interse-  
pientes, cultello secundū thoracis longitudinem inuicem seiunges: atque à  
cordis<sup>o</sup> inuolucro liberatas, ipsarūq; ad septum transuersum cōnexu, & ue-  
narum arteriarumq; in ipsis serie perpēsis, illas è thorace auferes: id duntaxat  
præcauens, ne uas aliquod insignius lædatur. rami enim membranas interre-  
ptantes, & cordis inuolucro intertexti, etiam si diuidātur, uix notatu dignum  
aliquod sanguinis profluuium concitant. Iam tempestiuum est, solis manibus  
cor cum

n inter ele-  
tissimum B  
et A. fig.  
ca. 12 lib. 1.

o ut scilicet  
est in 8 mu-  
scul. tab.  
p ut sit in  
1 fig.  
q ut ex 1  
fig. facias se-  
cundum.

r 1 fig. 1.1.  
2 fig. R. R.  
et 7 musc.  
tab. 1.  
s in ca. 1.  
2 fig. requi-  
res B, C,  
D, E.  
t ut speciat-  
tur in 8 mu-  
scul. tab.

u feret se-  
cundum est in  
1 et 2 fig.

x Sinister  
in 1 fig. P.  
p insigni-  
tur, in 3 au-  
tem fig.  
uicem 1.  
2 1 fig.  
Q. Q.  
22 2 fig. cap.  
11 lib. 4. n  
4 1 fig. m.  
4 1 fig. B.  
C, D, E.  
F, G.



cor cum suo inuolucro hinc inde mouere, quisq; ipsius situs formaq; inuoluc-  
 cri sint, examinare. quanquam & ad id summo opere cōducit inspectio, quam  
 prius, eleuato modice pectoris osse, cordeq; adhuc immoto, membranarū  
 intersepientium causa fieri uolui. Pulmonis quoq; lobi manibus iam sunt con-  
 trectandi, ut & ipsorū numerus, situs formaq; indagentur: ac tandem cogno-  
 scas, nullam pulmonis partem uenæ cauæ, quā<sup>b</sup> inter septum transuersum &  
 cor confistit, in hominibus subterni: imò uenam simul, citraq; interuallū ali-  
 quod, septum & cordis inuolucrū penetrare: & quā uena hac ducitur, inuo-  
 lucrum magna amplitudine hominū septo priuatum connasci. Quod ut spe-  
 ctes accuratius, inuolucrū cordis longa sectione<sup>a</sup> diuidetur, & liquor ipsi innatans  
 spongia extergebitur: ac demum à cordis uasis inuolucrum refecabitur,  
 adhibito studio, ne<sup>c</sup> sinistri recurrentis nerui principiū uitietur. Vt uerò cauæ  
 uenę per septum transuersum transitum, ac ipsius per thoracem ductum exa-  
 mines, sectionem septo ad uenæ usq; caudicem induces: præcauens, ne duo-  
 rum cauæ uenæ<sup>f</sup> propaginum in illud excurrentium radices simul uulneres:  
 dein sursum paulatim cōscendens, qui<sup>g</sup> caua dextræ cordis auriculæ commit-  
 tatur, citra ullam sectionem obseruabis. Sic quoq; supra cordis basim, à cauæ  
 dextro latere<sup>h</sup> uenam sine cōiuge enasci inuenies: cuius ramos ductumq; me-  
 lius disces, si primū dextram pulmonis partem uersus sinistrū latus eleuaue-  
 ris, & postmodū sinistram in dextrum latus reuolueris. hæc namq; citra alicu-  
 ius sectionem, modò reddūtur obuia: quanquā exempto corde & pulmone,  
 illa licebit adhuc exactius intueri. Neq; sanè hæc obiter sunt spectanda. at gna-  
 uiter Naturæ artificium in uenæ coniuge carentis ductu principioq; indagan-  
 dum est: diligenterq; obseruandū, num, ut in agnis & porcis aliquando occur-  
 rit, uer a quæpiam in sinistrum quoq; latus porrigatur, iuxta cauæ ad cor con-  
 nexum pronata. Porro cauæ in iugulo<sup>i</sup> distributio, retusiore cultello, quo in-  
 cumbens illi<sup>k</sup> glandium adimetur, inquirenda est. neq; sanè alio tibi utendum  
 est artificio, quàm ut nostras ad manum habeas uenarum delineationes: men-  
 temq; summa cura accommodes, ne uenam aliquam pertundas. Vbi uerò ca-  
 uæ seriem adinueris, utraq; iugularis, & brachium accedens uenæ truncus,  
 & deinde caua uena, ubi sine pari promit uenā, uinculis intercipiētur: ac quic-  
 quid uenarum inter uincula cōsistat, è corpore adimetur: & deinceps abluto  
 sanguine, ilico ad arterię magnæ propagines, neruosq; recurrētes adinuenien-  
 dos, sectio cōuertetur. Corde itaq; in manu assumptō, uenæ arterialis, &<sup>m</sup> ar-  
 teriæ uenalis, ipsiusq;<sup>n</sup> magnæ arteriæ radices, quæ cordis basi proximæ sunt,  
 intueris: quod factū est facillimum, si cū ipsarum coloribus, tum situi men-  
 tem adhibueris. Dextræ enim auriculæ uicina est arterialis uena: & albicans,  
 ac quodāmodo sinistrorsum proficiscens uisitur, & inter cordis uasa eminet.  
 Arteria autem uenalis, uenæ modo nigricat: & cæteris uasis demissior, pro-  
 pter sinistram auriculam latitat, ipsiusq; progressus minimo interuallo se of-  
 fert. Magna uerò arteria, in cordis basis medio, sub arteriali uena quodammo-  
 do occultata, occurrit. Hanc ubi primū intuitus fueris, omnes ipsius ramos  
 inquirito: quorum<sup>o</sup> superiores, ac iugulo proximi, citra aliud opus iam sunt  
 conspicui, nisi fortassis glandij aliquot reliquæ adhuc refecandæ super sint.  
 Truncus autem, qui ad dorsum retorquetur, nō nisi sinistra pulmonis parte  
 in dextrum latus eleuata, cōmodè apparebit. Cæterum ut recurrentes uideas  
 neruos, postquam laryngis musculos,<sup>p</sup> qui à pectoris osis elatiore sede proce-  
 dentes, infimę scutum imitantis cartilaginis sedi implantatur, ad insertionem  
 usq; ab aspera arteria diuulseris, dextrū sexti paris<sup>r</sup> neruum à soporali arteria  
 tt cultello

Caua uena di-  
 stributionis per  
 thoracē & iu-  
 gulum exami-  
 nari.

Arteriæ ma-  
 gnæ per thora-  
 cem & iugu-  
 lum & collum  
 distributionis  
 examen.

Neruum re-  
 currentium.

b fig. in-  
 ter D.

c f. G. F.

d ut fadu

e f. G. G.

f fig. cap. 6

lib. 3 C.

g f. G. C.

h f. G. G.

i f. G. cap. 6

lib. 3 F.

k hic sedu

lib. circa H

pecta figu

ram cap. 6

lib. 3. ut po

tiut ultimā

figura lib. 3

iuxta P.

k 2 fig. F.

l f. G. 1.

m f. G. G.

n f. G. O.

o f. G. R.

Q. S. T.

V. X.

p f. G. P.

q f. G. cap.

lib. 3 I.

r s musc.

tab. P. in N.

r f. G. a se

cutidum V.

cultello sensum liberabis: ac ubi thoraci appropinquaueris, huius nerui<sup>a</sup> ramu-  
lum, qui costarū radicibus exporrigitur, & quos hic musculus ex pectoris ofsis  
summo enatis deriuabat furculos, perpendes. Simulatq; uerò neruum ad<sup>a</sup> ar-  
teriam dextræ axillæ porrigendam deduxeris, tres quos ad illam reflectit fur-  
culos (nisi<sup>a</sup> duo, aut unus tantum sit) quàm poteris studiose uicinis membra-  
nulis acutiore cultello dirimes: ne fortè retusiore, membranulas inter scin den-  
dum trahēs, furculos uiolēs: quanquam denuò, ne acuto furculos simul cum  
membranis incautè reseces, cauendum sit. Inuentis furculorū principijs,<sup>a</sup> ner-  
uum asperæ arteriæ, lateri exporrectum, à suā cui nectitur membrana, ipsaq;  
aspera arteria, liberabis, longa sectione inter neruum & asperā arteriam acuto  
quoq; cultello facta. Liberatū hoc pacto neruum, summis sinistrae manus di-  
gitis apprehendes, illum modicè ab aspera arteria attollens: sexti uerò paris  
truncum, quā soporariæ arteriæ exporrigitur, dextra manu eleuabis: ac mani-  
bus deinde mutuò nunc sursum, nunc deorsum ductis, nerui recurrentis refle-  
xum naturamq; perquires. Ad eundem sanè modum, posteaquam<sup>a</sup> furculos  
quosdā pulmoni cordisq; inuolucro à dextro sexti paris neruo dein distribu-  
tos examinaueris,<sup>a</sup> sinistram sexti paris neruorū cerebri truncum à sinistri la-  
teris soporaria diuellere conuenit: & ipsius furculos, quos musculus à pectoris  
osis elatori sede enatis, & costarū radicibus exporrigit, indagare: ac postmo-  
dum<sup>b</sup> obseruatis, quas pulmonis tunice deriuat, propagininibus, & eo<sup>a</sup> furculo,  
quem secundum uenæ arterialis trunci sinistrū latus, cordis basi offert, etiam  
accuratè perquisito, ad magnæ usq; arteriæ<sup>a</sup> truncum, qui ad dorsum reflecti-  
tur, sexti paris huius lateris neruus est deducendus, & acuto similiter cultello  
soboles<sup>a</sup> recurrentem neruum hic efformantes sunt adinueniendæ. Has ubi  
uideris, obtusiore styllum sub eo arteriæ truncum uersus sinistram asperæ ar-  
teriæ latus protrudes: & leuato nonnihil stylo, truncum arteriæ à dorso, cui  
firmissimè cōmittitur, modicè dirimes. Deinde ab aspera arteria, recurrentem  
neruum ad arteriæ magnæ usq; truncum liberabis: & utraq; manu, mutuòq;  
tractu, ipsius reflexum, ut in dextro latere, ostendes.<sup>a</sup> Reliqua uerò sexti paris  
neruorū ad stomachū series, non nisi exempto pulmone aggredietur. ac pro-  
inde, si uisum fuerit, foramine nūc inter asperæ arteriæ cartilagine facto, illiq;  
fistula quapiam indita, & aspera arteria super foramen cōpressa, pulmonem  
inflari curabis: inflatus siquidē suam formam manifestiūs cōmonstrat, corq;  
ex toto amplexatur. Demissio dein pulmone, cordi à dextræ auriculæ radice  
ad ipsius usq; mucronē, nouacula sectionem<sup>b</sup> induces, in dextrum ipsius uen-  
triculum usq; penetrantem. Mox uentriculo digitis distento, spongia sangui-  
nem semel atq; iterum elues. Vena enim caua, & arterialis uena, ut sanguis in  
uentriculum fluat, isq; postmodum spongia exugatur, cōprimendæ sunt. Ex-  
terso sanguine, dextri uentriculi amplitudo est indaganda: deinde stylo<sup>a</sup> tres  
membranæ ori uenæ cauæ præfectæ, obiter ueniunt spectādæ. Vt uerò pror-  
sus in conspectū ueniant, cultello ex dextro uentriculo in cauam uenam intru-  
so, sectionem à uentriculo per auris corpus in uenam usq; ducēs: qua distenta,  
membranæ omnino uidebuntur: & auris cavitās, naturaq; si ipsam<sup>a</sup> in uerte-  
ris, facile hac administratione cognoscetur. Deinde quum uenæ cauæ expen-  
des orificium, coronalis uenæ<sup>a</sup> origo etiam apparebit: cui si styllum ex molli  
plumbo indideris, quoniam pacto cordis basim cingat, ramosq; in illius cor-  
poris superficiem deriuat, obseruabis. Hic uelim quoq; ex uenæ cauæ amplitu-  
dine styllum in<sup>m</sup> uenam coniuge destitutam inderes, ipsius à caua originem, ri-  
diculamq; nostrorum Aesculapiorum rationem consideraturus, qui in octo  
utriusq;

Pulmonis in-  
flatio.  
Dextri cordis  
uentriculi, &  
ipsius orifici-  
um membra-  
narumq; exa-  
men.

1. 2. fig. cap.  
2. lib. 4. h.  
dein h. h.

1. 6 fig. r.

4. fig. cap.

9. lib. 4. in-

serta p.

ad E.

1. 6 fig. b.

7. fig. cap.

11. 9. lib. 4.

inferia Q.

Q. 1. 6

fig. c.

1. 2. fig. cap.

2. lib. 4. q.

1. 6 fig. d.

ab X.

6. fig. c.

6. fig. b.

1. 6 fig. p.

1. 6 fig. f.

1. 6 fig. g.

g. 14. 15. h.

lib. 5. T. V.

1. 6. ut f.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

1. 7 fig. r.

utriusq; lateris inferiorum costarum inflammatione, Hippocratem, non mittendum esse sanguinem, asseruisse contendunt: quod cor ex uena sine pari sanguine adeo rapiat, ut nihil sanguinis missione ex uena hac educi possit. Quasi uero nunc tibi secanti non longè esset clarissimum, cor in sanguinis missione, inflammatis octo inferioribus costarum interuallis, nihil obitare, ac proinde sanguinem tunc quoq; mittendū: & Hippocratem non adeo fuisse stupidum, ut octo humiliores costas sub septo transuerso esse arbitratus fuisset, & inflammationem huius sedis ad clauiculā usq; tensionem etiam producere ignorauerit. Verū hic sermo, ne præter institutū, ad meum de uena in laterali morbo secunda placitū longius expaciatur, refrenandus uenit. quanquam meherculè nunquam magis hac de re ueritatem, quā præsentibus uenis, indagandam arbitrer: non autem citra uenarum cognitionē, solis auctorum distortis suffragijs eruendam. Porro simulatq; cōiuge carenti uenæ stylum immiseris, oblongus crassusq; baculus cauæ uenæ est<sup>o</sup> imponendus: quem quum absq; negocio rectā per cauam ad imum usq; uentrem protruseris, quā bellè Galenus & cæteri dissectionum doctores hucusq; hallucinati sint, disces, qui cauam ex iecoris gibbo, uno caudice enatam, similiter ac magnam arteriam in duos truncos, quorū hic inferiora, ille uero superiora petit, diuidi consueuerunt. Verū hęc, quum paulo post iecur aggredieris, uisurus es explicatius. quam nihil prohibet modò, septum transuersum è corpore, quantum poteris, refecare: iecurq; in sinistrum latus adeo reflectere, ut posterior ipsius sedes in conspectum ueniat. Quum itaq; baculum à uenæ cauæ sede, quā cor spectat, ad eam usq; regionem qua renibus uenæ offeruntur, detrusum, aliquandiu in uena seruaueris, animaduertisq; iecoris substantiā toti cauæ posteriori sedi non<sup>o</sup> obduci, cultello secundū baculi longitudinem ducto cauam diuides, ac uenarum à caua iecori exporrectarū<sup>o</sup> ora inuestigabis. Dein ijs qui nimium pertinaciter in Galeni Anatomes professorum primarij uerbaiurauerunt apellatis, singula ipsius argumēta de uenarum ortu resumēs: atq; studiosos, ne ex cōmentarijs nauigare discant, hortaberis, unicam ueritatem, non uero auctoritatem cōmendans. Porro sectione rursus ad cor conuersa, digito aut stylo in elatiore dextri uentriculi sede, arterialis uenæ orificiū<sup>o</sup> inquires: & cultello illi intruso, ex dextro uentriculo aliquousq; in arterialē uenam sectionem duces. Qua facta, sanguineq; si quis inibi occurret, eluto, uisus sese arterialis uenæ orificium simul cum suis<sup>o</sup> membranis offert: quas, ut exactius contempleris, stylo attolles, eodemq; arterialis uenæ ductum in pulmonē examinabis. Tunica etiam ipsius, ex quibus arteriæ instar conformatur, faciliè expenduntur, modò quis ductæ iam sectionis lateribus labris<sup>o</sup> ue animum adhibuerit. Sinistrum cordis uentriculū similiter longa sectione à sinistræ auris radice ad cordis usq; mucronem facta aperies, & sanguinē perinde atq; in dextro exterges. Huius primū intuebere amplitudinem, deinde cordis substantiæ in hac sede crassitiem: postmodum stylo<sup>o</sup> duas arteriæ uenalis orificio præpositas membranas faciliè adinuenies, ac quī inuicē in cordis contractione conuincant, obseruabis. Ut uero exactius se offerant, cultello uenalis arteriæ ori immisso, sectionem in ipsius usq; cauitatem<sup>o</sup> molieris: & ad aperto distentoq; ore, membranas denuo cōtemplabere, plumbeo stylo primas uenalis arteriæ in pulmone distributiones inquirens. Magnæ autem arteriæ<sup>o</sup> orificiū, & membranæ ipsi præfectæ inuenientur, si post<sup>o</sup> alteram arterialis uenæ membranam, quæ cordis uentriculorū septo uicinior est, digitum in elatissimā sinistri uentriculi regionem protruseris: is namque magnam subibit arteriam. & dein cultello

*Caua uenæ or-  
tis exāmen.*

*Arterialis ue-  
næ orificij ac  
membrana-  
rum exāmen.*

*Sinistri cordis  
sinus, ipsiusq;  
uiciorum &  
membrana-  
rum exāmen.*



secundum digitum in arteriæ orificium intruso, ex cordis uentriculo sectionem in arteriæ amplitudinē duces. Quando enim hanc tentaueris, & arteriæ magnæ<sup>b</sup> membranas in ipsarum sede, quā uasis corpori incumbunt, inspexeris, coronaliū arteriarum<sup>c</sup> ortus tibi occurret. aded ut nunc nihil in corde spectandum sit reliqui: nisi fortē illo uariē dissecto, ipsius substantiam, & arteriæ magnæ, arterialisq; uenę dissectis radicibus, os inquirere statueris, quod cordi priuatim ab Anatomes professoribus ascribitur. Si igitur nullū os, præter cartilagineas dictorum modō ualorum radices, in homine adinueris, illas à reliqua cordis substantia refecabis: ut simul cum cartilaginibus, clauicularū articulationibus, & alijs quibusdam articulis peculiaribus, ad olsium cōpositionem referuari recondiq; ualeant. Corde nunc abiecto, asperam arteriam (seruata interim larynge) examina- bis: primū quidē ipsius cartilagineas, C imaginem exprimentes, & membranas, quibus illæ inuicem colligantur: & dein ipsius primam in pulmonem seriem. qua inuenta, aliquam pulmonis fibram seu lobum integrē à reliquo pulmone abscabis: ac in uenæ arterialis ramum, & arteriæ uenalis & asperæ ramos, stylos intrudes: horumq; ramorum propagines, distributionisq; naturā inuestigabis. ad quod mirificē conduxerit undecunq; rupta diuulsa<sup>d</sup> ue lobi illius membrana, ipsum inter duos asseres adeo comprimere, ut pulmonis caro, ipsius<sup>e</sup> ue peculiaris substantia, à suis quibus obnascitur uasis abscedat. Licebit modō, aspera arteria ab ipsius capite diuisa, eaque deorsum à stomacho tracta, pulmonē omnino è thorace auferre, & stomachi<sup>f</sup> progressum adinuenire: qui citra aliam sectionem, pulmone reiecto, unā cum neruis sexti paris illum amplexatibus, cōspectui sese offerret. Tamen ut neruorum in uentriculi orificium seriem intuearis, septum transuersum à stomacho liberandum est: ipsaq; insertio, si fortē uētriculus adhuc in corpore asseruatus sit, indaganda. Insuper foramine alicubi in stomacho, quā collum perreptat, factō, fistulaq; illi indita, uentriculum quā poterit maximē inflari curabis: & deinde stomacho iuxta laryngis radicem diuiso, illum cum uentriculo, aut solum, si prius scilicet uentriculum ademeris, è corpore trahes, glan- dulis illis qui in medio ipsius ferē ductu plurimū cōsistunt, similiter examina- tis. Iam quoq; tempestiuum esset (si modō id antea non præstiteris) iecur à septo transuerso secernere, ac tandem ex corpore auferre. Quod ubi feceris, ipsiusq; formam diligenter cōtemplatus fueris, cultello uenæ cauæ iam flac- cidæ indito, hanc lōga sectione aperies, ut exactē pateat ipsius periecoris sub- stantiam transitus, deinde ramorū à caua in iecur ingressus. Vbi itaq; duo præcipua illorū uideris orificia, alteri stylum quā poteris penitissimē indes: & ablato uenæ portę, quo iam antea eam interceptisti, uinculo, illius quoq; ramo secundū uenæ cauæ rami, cui iam stylus inest, ductum in iecur procedenti, alterum stylum immittes: & postmodum obtuso cultro iecoris substantiam ab illis ramis, qui stylos continent, nitēris abradere: ut uenarū per iecoris cor- pus seriem, ipsiusq; substantiam discas, ac demum inter duos qui stylis disten- duntur ramos, bilis uesiculæ meatulos obserues, & bilis uesiculā à iecoris cor- pore erasam inuertas, solamq; sedulō, si adhuc fuerit asseruata, contempleris. Postremō, uenæ ab umbilico in iecur deductæ ingressum insertionemq; ex- pendes, mente dein thoracis uertebrarū corporibus adhibita, ut cultello gran- dem arteriam secundū longitudinē aperias, ramorum quos utrinq; in co- stas spargit, uifurus orificia. Ramis his dissectis, arteriam ex corpore adimito, & uenæ coniuge carentis<sup>g</sup> propagines expendito, ut & hanc quoq; à uertebra- rum corporibus liberares. Quo in opere non parum conduxerit, expendere in- ternam

Cartilagineæ  
cordis substan-  
tiæ examen.

Aspera ar-  
teria.

Pulmonis.

stomachi.

iecoris.

bilis uesiculæ.

b 10 fig.  
B, C, D.  
c 10 fig.  
E, E.

d ut specta-  
tur 14. &  
15 fig. lib. 5.

e 14, 15 fig.  
lib. 5, E, F.

f id ueluti  
usurans,  
quod 15 fi-  
liis. 5 expri-  
mitur ad  
X, Y, Z.  
g 2 fig. lib.  
5, F, G, 12  
fi. 33. ad 81.  
h fig. cap.  
12 li. 3 h, h.

i fig. cap. 6  
lib. 3, G, G  
ad F.

ternam uenæ pari carentis in suo exortu superficiē: uti & illorum ramorum, qui è caua uelut in iecur exporriguntur: quò proprij uenæ corporis membrana illic occurrat crassities, roboris in uasorum diductibus gratia efformata. Quanquam interim hīc negligi nolim, studiosorum nonnullos, quum de sanguinis misisione inter diffecandū agere solemus, aliquando contendisse, membrana illa uasorum eminentia, sanguinis in cauæ caudicem truncum ueregressum penitus præpediri. Resectis modò in thorace occurrentibus uenis &

*Examē eorum  
que uertebra-  
rum corporis  
exporriguntur.*

arterijs, in propatulo est utriusq; lateris sexti paris neruorum cerebri<sup>k</sup> ramus, qui radicibus costarum exporrectus, sub tunica costas succingēte ad organa à peritonæo circumplexa cōtendit. Vt uerò neruulos cernas, quibus ramus ille adaugetur, à thoracis uerteb<sup>l</sup>ris tunicam costas succingētem detrahes: quam ubi & à costis quoq; diuelles, dictas uenarum arteriarumq; propagines, & neruos costas exporrectos, promptè obseruabis: & cultelli mucrone ad costæ alius os proximè adactò, tunicam expendes, quæ priuatim singulis costis obuioluitur: eam dico, quam secundam costas succingentem tunicam nonnulli dissectionū periti nuncuparunt: quæq; membrana est, illis respondens, quas, quòd ossa ambiunt, uulgo circumossales dicimus. Quanquā interim hīc circa dorso uerteb<sup>l</sup>rarum contextum, præcipuè obseruandum sit, num duæ costas succingentes tunicæ ita ueniant constituendæ, ut una in dextro recenseatur latere, cum dextra thoracem interdiuidente membrana: & altera in sinistro latere, cum interdiuidēte eius lateris membrana: quum & ita nonnulli (uti suo diximus loco) duas tunicas, costas succingētes enumerauerint. Absolutis hūc in modum omnibus quæ peritonæo & tunica costas succingente inuoluuntur, si uisum fuerit, quàm poteris aptissimè costas in suas sedes reponere cona-

*Musculorū bra-  
chij, scapula-  
rum thoracē ca-  
put, dorsumq;  
mouentis exa-  
men.*

beris: & ossē pectoris quoq; cum cartilaginibus ipsi coarctatis assumpto, & clauiculis etiā in suam sedem repositis, quàm licebit studiosissimè musculos eos, quos iam antea ab infertione pendēre sinebas, suis locis situabis: primum dico thoracem mouentiū, primum brachij motuum opificem, scapulæ motorum<sup>n</sup> primum, eum qui à pectoris ossē & clauicula in manillarem capitis processum fertur. Quod ubi præstiteris, ea prorsus serie, quam in secundo libro docuimus, omnes brachium & scapulam mouentes musculos ex altero latere aggredieris: mox omnes qui thoracis motibus præsumt, & qui capitis, ac deinde dorso motibus famulantur: postremò temporalem, & masseterem. cubiti enim & brachialis, digitorumque motibus subministrantes musculos, licebit etiam post cerebri anatomen diffecare. Neq; est quòd hīc prolixè commemoratos musculos, seriatim ac sigillatim recenseam, quum id diffuse in secundo libro factum esse, minimè ignores. Cæterum in altero cadaueris latere, uasorum neruorumque seriem licebit sedulò exquirere: quum id factū sit facillimum, si illorū descriptio te non lateat, in musculorumq; sectione probè uersatus sis. quanquam & ego manus uasorum neruorumq; administrationem, utputa paulò difficiliore, etiam post ea persequar. In presenti autem os adeundum est: & quandoquidem iam faciei omnia extrinsecus persecutus es, ut id

*Temporalis &  
masseteris.*

*Oriū apertio, ut  
sanorumq; in  
suauius posito  
rius examē.*

aperias necessum est, quod nulla ratione perfeceris melius, quàm robusto cul-  
tro infimæ maxillæ inferioris sedi appposito: & postmodum huius, malleique opera, maxillæ inferioris ossē diuiso. Verum ad eum modum ossa, quæ sceletopræparando alioquin apta essent, propter fractam inferiorē maxillam, uitias: & si illæsa maxilla, illam in altero latere in suo ad temporis os articulo dissoluere conatus fueris, atq; ita maxilla in alterū latus reflexa, quæ in ore sunt administrare proposueris, sectionis claritati utcunq; oberis. Quapropter diuiso

tt 3 ad eum

*k 2 fi. cap.  
2 lib. 4. b.*

*l eiusdem  
fig. 4. b.*

*m Eā par-  
te que dex-  
træ manū  
subiicitur  
musc. tab.  
n 4 tab. d.  
o 3 tab. d.  
p 5 tab. r.  
q 4 tab. o.*

*r 4 tab. r.  
s 4 tab. d.*

*t ut sciat  
est in 6 mu-  
scul. tab.*

ad eum quem dixi modum, maxillæ ossæ, ipsius partes manibus extrorsum deorsumq; ui torquebis, osq; aperies. Insuper è narium foraminibus obliquatum instar syphonis stylum in oris usq; amplitudinem protrudes,<sup>u</sup> gargareonis naturam examinans. Mox cultello à gargareonis radice ad incisorios usq; dentes in oris tunica sectionem duces, eam cutis alicuius modo nonnihil ab incumbētibus organis liberans. In hoc opere tertium<sup>x</sup> neruorum cerebri par sese offeret, quæ linguæ & inferiori maxillæ deriuatur: dein<sup>r</sup> septimum cerebri neruorum par<sup>z</sup> sexto commissum, unà cum<sup>a</sup> soporali arteria,<sup>b</sup> interioriq; iugulari uena. & si aliquantulum ascenderis,<sup>y</sup> quartum quoq; neruorum cerebri par,<sup>z</sup> & ramos quosdam tertij paris & quinti paris, temporali exporrectos musculo uidebis, si modò unum organum ab alio sensim separare non piguerit. Ad hæc linguæ<sup>c</sup> musculi, uti in secundo docuimus libro, adinuenientur: in quorum administratione, neruorum in linguam excurrentium propagines, ac uenæ simul & arteriæ sese offerēt. Musculi etiam inferioris maxillæ reconditi, hic paruo negotio occurrūt: <sup>f</sup> is uidelicet, qui in ore delitescens, cum temporali & massetere maxillam sursum ducit: & <sup>e</sup> is qui à processu stylum referente enatus, ad summum mentum inferiori maxillæ implantatur. Præterea<sup>g</sup> tonfillæ,<sup>h</sup> aliæq; glandes, ualforum distributionibus in faucibus præfectæ, tibi hanc administrationem molienti pulchrè occurrent. Laryngis autem<sup>k</sup> musculi, ita prorsus atq; in secundo monuimus libro, sunt aggrediēdi: ipsorumq; nerui, dum dissecantur, non perfunctoriè ueniunt animaduertendi. Ablato itaq; nunc unà cum lingua, ossæ<sup>v</sup> imaginem referente, laryngeq; ac stomachi initio, inferiorē maxillam à superiori prorsus liberabis, non neglectis interim peculiaribus hic repositis<sup>l</sup> cartilaginibus: quas perinde ac cartilagines clauicularum cum pectoris ossæ articulos intercedentes, ad sceleti constructionem asseruare nihil prohibet. Atq; ita etiam pari ratione os<sup>v</sup> imaginem referens, & laryngis, nasiq;<sup>m</sup> alarum cartilagines, cum auris & palpebrarum cartilaginibus, ad eundem usum aliquod repones. Nunc palati tunicam, & eam quæ nares succingit, ab ossæ sedulo in hoc abrades, ut mutuum earum tunicarum discas nexum. Si uerò, quum caput dorsumq; mouentes musculos aggredieris,<sup>n</sup> primum dorsum agentium par ex sententia non spectaueris, id modò, ablatis his quæ fauces occupabant, factu est facillimum: adeò ut & capitis dorsiq; motibus præfectos musculos, tātisper integros asseruare nihil prohibeat, quousq; inferiorem maxillam, eaq; quæ faucibus continentur, sectionis serie ademeris. Quanquam hæc omnia ex secundo libro cuius obuia esse debeant: quemadmodum quoq; ex primi libri calce discitur, quæ costæ à uertebreis ad sceleti præparationem sint auferendæ, pectorisq; os, & cartilagines ipsi commissæ, seruandæ. Adeò ut nihil obstat, in proposito cadauere caput à prima uertebra nunc liberare, in illoq; quæ sequens liber enarrabit, cōdiscere: in cuius penultimo Capite, omnia quæ in nobis proposito cadauere adhuc uidenda sunt reliqua, commemorabo.

LIBRI SEXTI FINIS.

ANDREAE




# ANDREAE VESALII 755

DE CORPORIS HVMANI FABRICA LIBER  
SEPTIMVS, CEREBRO PRINCIPIS ANIMALISQVE  
facultatum sedi, & sensuum organis dedicatus: moxq; in initio omnes  
propemodum ipsius figuras, uti & duo proximè præce-  
dentes libri, commonstrans.

## PRIMA SEPTIMI LIBRI FIGURA



SUPERIORIS CALVARIAE PARTIS, QUAM  
A PRIMA FIGURA SECTIONIS SE-  
rie diuisimus, interior superficies.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
PRIMAE FIGVRAE, EIVSDEM QVE  
characterum Index.

*P R I M A* Septimi libri figura, humanum caput ita adaptatum exprimit, quemadmodum id cerebro ostendendo, concinne a collo inferiori, maxilla dissecantibus liberatur. Præterea tantam calvaria partem orbiculatim ferra absculimus, quantum quoque omnium quæ in calvaria continentur cavitatem videndorum gratia, auferri solet. Ut vero eius ablatae partis imago hic quoque occurreret, septimam sexti Capituli libri primi figuram præsentem figuram subiecinus, quod hac interior illius calvariae partis superficies adamussum exprimitur: quæ uniuersum id ante sectionem integebat, amplectebaturque, quod prima figura potissimum proponit. Hæc namque duram cerebri membranam adhuc illesam, neque aliqua ex parte pertusam, uulneratam uel, oculis subiicit: quamuis interior istius membrana uincula diuulsissimum, quæ per calvaria suturas, membrana illam exterius cingentis gratia efformandæ, porrigitur. Deinde cum his fibris pariter uascula sunt effracta, quæ per calvaria foraminula & suturas deducta, ipsi duræ membranae, ac illi quæ caluariam obcingit, communes censentur. Cæterum duorum qui figuram ambiunt conspiciuntur orbium humiliorem, cuius & membrana ipsi subditæ cõstitunt, elatior autem ipsa est calvaria. Uniuersum uero hoc orbe complexum, multisque characteribus insignitum, duram cerebri membranam refert.

*A, A* Dextrum duræ cerebri membranæ latus, seu eius membranæ pars, dextram cerebri regionem ambiens.

*B, B* Sinistrum duræ cerebri membranæ latus.

*C, C* Tertius duræ membranæ sinus, secundum capitis longitudinem exporrectus, & hic nulla ex parte per sectionem adaperitur.

*D, D, D* Duo inuicem appositi ductus, uenarum modo in duram cerebri membranam secundum ipsius uniuersum latus excurrentes.

*E* Uenam referens duræ cerebri membranæ ductus, in quem sexta caluariam ingrediens exhauritur uena.

*F, F, F* His characteribus uenule indicantur, à dura cerebri membranâ per caluariæ foraminula ad capitis cuius membra namque caluariam obcingentem, transmissæ, quarum frequentiores & crassiores iuxta *F* maxime latitantis sedem plerumque obseruantur.

*G, G, G* Portiunculae fibrarum, à dura cerebri membranâ per coronalem suturam ad caluariam obcingentis membranæ constitutionem profilientium.

*H, H* Portiuncula fibrarum, quibus sagittalis sutura uiam offert.

*I, I* Sedes, à qua fibrae porriguntur per suturam  $\Delta$  Græcorum similem.

*K* Unum duræ membranæ tuberculum eorum quæ inæqualibus caluariæ sinibus, plerumque iuxta sagittalis suturæ cum coronali coitum obuijs, adnasci solent. Caput, ex quo hanc primam depinximus figuram, tribus eius generis donabatur tuberculis, quorum unum *K* insignimus, & utrinque anterius *H* unum quoque se offert.

*L* Cavitatis frontis os in iuxta superciliorum sedem propria, quæ inter secandum subinde aperitur, si quando frontis os non procul à supercilij ferra diuiditur.

SECUNDÆ FIGVRAE (QVAM SEQVENS  
proponet pagina) eiusdemque characterum Index.

*S E C U N D A* figura, sectionis serie primam subsequens, tertium duræ membranæ sinum longa sectione secundum capitis longitudinem ducta, adaperitum commonstrat. Insuper ad huius tertij sinus latera, per capitis quoque longitudinem diuis deduxi sectiones, utrinque nimirum ad sinum singulas, quæ duram membranam dumtaxat penetrarunt, & duræ membranæ latera ab eo membranæ separarunt processu, qui dextram cerebri partem à sinistra dirimit. Præter tres iam commemoratas sectiones, in utroque latere aliam molius sum, quæ ab auris regione ad uerticem pertingens, solam quoque duram diuisit membranâ, ut illa postmodum apte à tenui membrana posset diduci, deorsumque (ut hic factum cernis) reflecti. Occurrit itaque hic tenuis cerebri membrana prorsus illesâ, cerebroque proxime obducta, & uasorum ipsius seriem in hactenus denudata regione eleganter commonstrans.

*A, A, A* Elatior sedes duræ membranæ processus, dextram & sinistram cerebri partes intercedentis, atque hæc sedes *A* & *A* notata, tertij duræ membranæ sinus costa est, caluariam contingens, & hic per medium dissecta.

*B, B* Hic tertij duræ membranæ sinus cavitatis est in propatulo.

*C, C* Orificia, uasorumque initia, ex tertio duræ membranæ sinu in tenuem membranam pertinentia. Atque hic quidem uasorum orificia in conspectu sunt, à læuo huius sinus latere in tenui membranæ partem pertinentium, quæ sinistram cerebri sedi obuoluitur. Orificia autem à dextro latere pronata, hic non conspiciuntur: uerum initia

SECUNDA SEPTIMI LIBRI  
FIGURA.

*D, D.* occurrunt uasorum in tenuem membranam, quæ dextra cerebri sedi obuoluitur, propagatorum, ac *D, D* & *D* insigniorum.

*E, E, &c.* Tenuis membrana, cerebrum inuestiens.

*F, F, F* Ductus, uasæ ue in tenui membrana secundum cerebri inuolutionum seriem excurrentia.

*G, G, G* Propagines notantur à ductibus secundum duræ membranæ latera excurrentibus, in tenuem membranam pertinentes.

*H, H, H* Duræ membranæ portiones, à tenui membrana diuisæ, & deorsum reflexæ.

TERTIAE FIGURAE (QUAM SEQVENS  
proponet pagina) eiusdemq; characterum Index.

*I* N tertia figura, à tota cerebri parte supra sectionem consistente (quam, id ostensuri, orbiculatim ferræ in calvaria molitur) utraq; cerebri membranam, tenuem nimirum & duram, auulsimus: ac duræ membranæ processum, dextram cerebri partem à sinistra dirimentem, & in secunda figura adhuc in sua sede seruatum, ab osseo diuisimus septo, quo odoratus organorum sinus distinguuntur. Deim processum hunc, ut ipsius speceretur effigies, super sinistram cerebri sedem explicatum reliquimus, dextræ & sinistræ cerebri partibus ad eò ab inuicem manuum opera ductis, ut callosi corporis superior sedes se hic spectandam offerat.

*A, A, A* Dextra cerebri pars.

*B, B, B* Sinistra cerebri pars.

*C, C, C* Hic passim cerebri conuolutiones, gyri & anfractus indicantur.

*D, D, D* Duræ cerebri membranæ processus, dextram cerebri partem & sinistram intercedens, hicq; ex sua sede super sinistram cerebri partem productus.

*E, E, E* Quum primum dissecantes, dextram cerebri partem à sinistra diducere & cõtendimus, tunc manu ea uasæ effringuntur, quæ ex tertio duræ membranæ sinu in tenuem membranam utrobiz; pertinent. ac proinde quum in  
huius



AND. VESALII, DE CORPORIS  
TERTIA SEPTIMI LIBRI  
FIGURA.



huius figurae administratione id quoque nobis faciendum fuerit, effraeta eorum uasorum initia hic oculis subiiciuntur.

*F* Ductus, uenae modo in humiliorem sedem durae membranae processus excurrentis, qui dextram cerebri partem à sinistra determinat: atque hic ductus à quarto durae membranae sinus anteriori sede enascitur.

*G, G, G* Ductus iam ante *F* insigniti propagines, in eundem durae membranae processum aliquosque sursum excurrentes.

*H, H, H* Surculi ab humiliori angulo tertij durae membranae sinus propagati in durae membranae processum, quo dextra cerebri pars à sinistra dirimitur.

*I, I* Principia sunt ductuum, qui à quarto durae membranae sinus, uenarum prorsus modo in tenuem cerebri membranam secundum superiorem callosi corporis regionem perferuntur, hicque una cum tenui membrana sunt auulsi.

*K* Initium uasis à quarti durae membranae sinus termino pronati, & sub eo cerebri corpore, quod testudini seu camerae instar arcus constructe assimilamus, in tertium cerebri uentriculum, & dehinc ad plexus constitutionem excurrentis, quem secunda seu satus inuolucris comparamus.

*L, L* Cerebri callosam corpus.

*M, M* Sinus utriusque ad callosi corporis latera in cerebro conspicui: quos hic aliter quam modo praestitimus, exprimere nequeas, quum angusti sint, & angustiores rimas plurimum referant.

*N* Durae cerebri membranae processus, dextram cerebri partem à sinistra inter diuidens, portio, quae septo seu octauo capitis ossis processui connascebatur, ossis uel organorum sinus diuisa.

*O, O* Tenuis membranae portiones, à cerebro diuisae.

*P, P* Durae cerebri membranae portiones, huc deorsum ex sectionis serie deflexae.

QUARTA



QVARTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
 characterum Index.

IN quarta figura omnes dextra tenuisq; membranarum partes, quae in prioribus figuris occurrerunt, reseruamus: ac dein dextram sinistramq; cerebri portionem sectionis serie ita ademinimus, ut iam cerebri uentriculi in conspectum uenire incipiant. Primum namq; secundum dextrum callosi corporis latus, ubi sinus altero *N* in tertia figura notatus consistit, longam moliti sumus sectionem, quae per dextrum cerebri uentriculum ducta, dextra cerebri partis eam portionem abstulit, quae supra sectionem habebatur, quae orbiculatim caluariam ferrea diuisimus. Atq; quum idem quoq; in sinistro latere absoluiimus, sinistram cerebri partem ita hic reposuimus, ut superiore sinistri uentriculi sedem aliqua ex parte comonstret, calloso interim corpore in capite adhuc seruato.

*A, A, A* Cerebri adhuc in caluaria relictæ pars dextra.

*B, B, B* Pars sinistra cerebri adhuc in caluaria relictæ.

*C, C, C* Portio cerebri sinistra, quae sectionis serie à reliquo cerebro ablata, hic resupina iacet.

*D, D, D* Linea partim cerebri anfractus, & partim narium cerebri substantiae color em commonstrantes, quicquid enim extra lineas consistit, quasi luteum & subcinericum magis est: quicquid intra lineas habetur, adamyssim album uisitur. Hac itaq; ratione sedes *E* & *F* insignita, apparent luteae. quibus uero *G* & *H* inscriptae buntur, prorsus albæ sunt, & nonnunquam rubris maculis interstinctæ.

*E, F.* mussim album uisitur. Hac itaq; ratione sedes *E* & *F* insignita, apparent luteae. quibus uero *G* & *H* inscriptae buntur, prorsus albæ sunt, & nonnunquam rubris maculis interstinctæ.

*I, I, I* Callosum corpus, utrinq; à cerebri substantia, cui aliqui continuatur, ex sectione liberum.

*K, K* Callosi corporis portiuncula, adhuc sinistra cerebri parti, quae adempta est, continua.

*L, L* Dexter cerebri uentriculus.

*M, M* Sinister cerebri uentriculus.


*N, N* Sinistri uentriculi superioris sedis portio.

*O, O* Plexus cerebri, ab imagine quam cum secunda seu tertius in uolucris similem obtinet, xogodis nuncupatus.

*P, P* Aranearum modo graciles uenae, dextri & sinistri uentriculorum substantia hoc in loco connatae, ac ab illis diucte uasis, quae nuper commemoratum plexum extruunt.

*Q* Uenulae a iam commemoratis uasis plexum efformantibus, in tenuem cerebri membranam sub callosi corporis anteriori sede huc excurrentes, & incerta serie (quemadmodum & uenulae *P* notatae) inter reseruandum se offerrentes.

AND. VESALII, DE CORPORIS  
QVINTA SEPTIMI LIBRI  
FIGURA.



QVINTAE FIGVRAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

QVINTA figura, quod ad reliquam in calvaria cerebri portionem attinet, nulla ex parte cum praecedente figura variat: atq. id solum habet propriū, quòd callosum corpus hic anteriori sua sede a cerebro primum liberauimus: ac dein elenatum, in posteriora refleximus, septum dextri ac sinistri uentriculorum diuellentes, & corporis instar testudinis extructi superiorem superficiem ob oculos ponentes.

Ab A ad A, A, A itaq. & B, B, B, ac dein D, D, D, & E & F, & G & H, eadem hic indicant, quae in quarta usq. figura. Sic quoq. & L, L, & M, M, & O & P & Q eadem insinuant.

R, R, R. Notatur inferior callosi corporis superficies. est enim id sua sede motum, atq. in posteriora reflexum.


S, T, U Superior corporis instar fornix seu testudinis extructi superficies, & ueluti ipsius triangularis circumscriptio, quam ab S ad T, & à T ad U, & ab U ad S metimur.

X, X. Dextrum uentriculum & sinistrum intercedentis septi inferior pars, corpori testudinem referenti continua.

I, I. Septiam commemorati superior pars, calloso corpori continua. Hoc namq. septum non aliter quàm modo disruptum est, depingi licuit. Et alia quoq. parata sui figura, in qua duae manus (ui inter secundum facere consueci) callosum corpus nondum in anteriori ipsius sede liberatum, modice attollebant, quo speculum seu septum adhuc integrum oculis subijceretur. Verum quum non adeo concinne negotium in pictura, atq. in ipsa sectione, successerit, eam figuram, ne frustra paginam obliteraret, reieci.

SEXTA



SEXTA SEPTIMI LIBRI  
FIGURA.SEXTAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

*H* & *E* figura, quod ad cerebri portionem in calvaria relictam spectat, etiam quartae correspondet: à quinta in hoc differens, quod corpus testudinis modo fabricatum, anteriori sua sede à cerebri substantia liberauerimus, id sursum in posteriora reflectentes, ut inferior ipsius superficies in conspectum ueniret, & uas illud etiam cerneretur, quod à quarto durae membranae sinu pronatum, sub corpore testudinis modo extructo fertur, & plexuum tandem non minimam partem constituit, quos secundarum imagini ueteres à simularunt.

*A, A* Corpus testudinis modo extructum, hic inferiori ipsius superficie, qua tertij uentriculi superiorem constituit sedem, conspicuum.

*B, B* Portio corporis instar testudinis efformati in dextro uentriculo, à cerebri substantia hic principium ducens.

*C* Portio corporis testudinem forma & usu referentis, qua ex sinistro cerebri uentriculo pronascitur.

*D, D* Dexter cerebri uentriculus.

*E, E* Cerebri sinister uentriculus.

*F* Arteria per inferiorem posterioremq; dextri uentriculi sedem à dextrae sphenoidalis arteriae ramo, duram cerebri membranam perforante, huc in dextrum uentriculum conscendens.

*G* Arteria in sinistram cerebri conscendens uentriculum.

*H* Uas à quarto durae cerebri membranae sinu principium ducens, ac sub corpore instar testudinis efformato, in communem dextri & sinistri uentriculorum cauitatem, seu tertium uentriculum properans, totoq; incessu miris modis implexum.

*I* Vasis *H* insigniti in duas portiones diuiso.

*K* Vasis *H* insigniti diuisionis altera portio, dextrum cerebri petens uentriculum.

*L* Portio nuper commemorati uasis, sinistrum accedens cerebri uentriculum.

*M* Plexus dextri uentriculi, secundinarum imagini comparatus, atq<sup>ue</sup> ab arteria *F* insignita, & uasis *H* indicati portione, quam *K* notauimus, constitutus.

*N* Plexus sinistrum cerebri uentriculum occupans, ac ex uasis *G* & *L* insignitis conflatus.

*O, O* Huiusmodi uenula cerebri substantia hic obnaſcuntur, ab illis producte uasis, quæ *K* & *L* notauimus.

*P* A uenis quæ cerebri substantia hic offeruntur, ramusculi extra uentriculorū amplitudinem hæc ad tenuem cerebri membranam pertinent.

*Q* Meatus ex communi cavitæte dextri ac sinistri uentriculorum, seu à tertio cerebri uentriculo rectâ decliuis perueniens uersus peluim, quæ cerebri pituitam excipiens, eam infundibuli modo deferit.

*R, S* Canales sinus' uel leuiter in uentriculorum substantia exculpti, & pituitam ad meatus nuper *Q* insigniti orificium deducentes.

## SEPTIMA SEPTIMI LIBRI FIGURA.



### SEPTIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE characterum Index.

*PRÆSEN* s' figura à tribus proximè præcedentibus plurimum uariat. in hac namq<sup>ue</sup> ea cerebri substantia, quam in illis adhuc ex sectionis serie reliqueramus, pars ablata cernitur, quæ dextri sinistriq<sup>ue</sup> uentriculorum sedem in illis figuris conspicuam efformabat. dein tota quoq<sup>ue</sup>, cerebri portio, quæ cerebello adhuc innitebatur, hic quoq<sup>ue</sup>, reſecta eſt: ut dura membrana occurreret processus, cerebellum ac cerebrum intercedens. Insuper dura membrana hic conſiſtentes sinus, etiam hac figura aperuimus: & uas à quarto dura membranae ſinu in cerebri uentriculos pertinens, ex tertio cerebri uentriculo ſubleuatum, & à plexibus ſecundinae ſimi-

libus aulsum, in posteriora refleximus: ut tertij cerebri uentriculi, seu communis dextri sinistriq; uentriculorum concavitatis sedes in conspectum melius ueniret, una cum eius cavitatis meatibus.

*A, A* Cerebri substantia adhuc in calvaria asseruata dextra pars.

*B, B* Cerebri substantia adhuc in calvaria asseruata sinistra pars.

*G, G, C* Linea hic passim obuia, illis correspondens, quas tres modo precedentes figurae similiter demonstrarunt. Uerum quia huiusmodi linea substantiae uel cerebri diuersas inibi duntaxat consistit, ubi cerebrum tenui membrana uicinius est, praecedentes figurae eam solum in lateribus ostenderunt: haec autem, quoniam tantam cerebri portionem ablata habeat, ut iam apparens superficies in basi non procul a tenui membrana distet, etiam hoc cerebri substantiae in colore discrimen, & dicta nunc linea in basi spectantur. Quod itaq; lineis hic intercipitur, *D, D.* ac *D, D, D* insignitur, subluteum est, & subpallidum: quod uero extra lineas consistit, cuius *E, E, E* inscribitur, album est, prorsusq; candicans.

*F* Portio soperalis arteriae, secundum humiliorum angustioremq; dextri uentriculi sedem sursum ad plexus secundum imitantis constitutionem prorepens. Ceterum si perpendaris, quae nam sede hic *F* reponatur, & quae nam in sexta figura occurrat, prompte obseruabis, qui dexter cerebri uentriculus (quemadmodum & sinister) ex posteriori sua sede instar cornu arctatus, deorsum in anteriora per cerebri substantiam ducatur. Hic namq; ubi plus substantiae cerebri, quam in sexta figura absulimus, praefert arteriae portio *F* notata, antrorsum magis uerget, quam *F* in sexta, eandem quoq; insinuans arteria portionem, ubi iam posteriorem uentriculi sedem conscendit. Atq; id *F* & *G* subsequens figurae magis liquido ostendunt, in qua huius uentriculi ductus nomine, adhuc plus cerebri substantiae, quam in hac quae ordine septima est, absuli.

*G* Arteria soperalis portio, secundum humiliorum posterioremq; sinistri uentriculi sedem sursum prorepens.

*H* Humillima sedes tertij uentriculi: quam, ut aptius cerneretur, nonnihil distentiam finximus.

*I* Ateus recta declinans ex tertio cerebri uentriculo pertinens, cerebriq; piumam ad pelum huius excipienda paratam deferens.

*K* Ateus ex tertio cerebri uentriculo inter cerebri testes natesq; in cavitatem cerebelli & dorsali medulla communem pertinens.

*L* Glandula nuci pineae non dissimilis, & uasorum ex quarto durae membranae sinu cerebri petentium fulcrum.

*M, N* Hanc cerebri partem, tenui adhuc membrana cerebri obductam, testes & nates cerebri appellamus.

*O, O, O* Durae cerebri membranae processus, portio uel inter cerebellum & cerebrum reposita. Qui hanc accedunt, aut per ipsam excurrunt instar uenarum ductus, partim à primo secundaq; durae membranae sinibus, partim uero à quarto pronascuntur.

*P, P* Durae cerebri membrana dexter seu primus sinus.

*Q, Q* Durae cerebri membrana sinister seu secundus sinus.

*R* Primi & secundi durae membranae sinuum congressus, quem Graecorum nonnulli *ἄνωρ*, quod est torcular, appellarunt.

*S* Principium tertij durae membranae sinus.

*T* Quartus durae membranae sinus, similiter atq; alij hic per sectionem adaptus.

*U* Vas à quarto sinu durae membranae in cerebri uentriculos porrectum, hic autem in posteriora ex sua sede reflexum.


*X, X* Hac sede cerebellum durae cerebri membrana non obiectum, sese offert.

*Y* Ductus, uenarum modo à quarto durae cerebri membranae sinu in tenuem membranam pertinentes, quae cerebellum ipsiq; cerebri testes induuntur.

*Z, Z* Durae membranae sedes, qua ossi omnium totius corporis ossium durissimo, & auditus organum intus continenti, adnascitur. hanc namq; calvariae regionem incumbente ipsi cerebro deteximus.



AND. VESALII, DE CORPORIS  
OCTAVA SEPTIMI LIBRI  
FIGURA.



OCTAVAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

OCTAVA figura à septima in hoc uariat, quòd hic adhuc cerebri plus rescuerimus, & cerebri testes longa sectione in hoc diuiserimus, ut meatus occurreret ex tertio uentriculo in quartum pertinens. Ad hanc, dura membranae portio cerebello obducta, hic dissecta, atq. in posteriora reflexa cernitur. Quum itaq. praesens figura usq. ad H. idem quod in septima, indicant. Verùm arteriae F & G insignitae, tanto magis hic quàm in septima antrorsum uergunt, quanto magis cerebrum uersus basim in septima quàm in sexta ablatum est.

I Meatus recta declinans descendens, cerebriq. pituitam ad pelum deferens.

K Meatus pituitae deducenda paratus, qui interdum ab illo deducitur meatus, qui ex tertio uentriculo inter testes in quartum uentriculum pertinet.

L Ne L in umbra prorsus latitaret, aut si suo poneretur loco, & eius nomine, quo in conspectu esset, umbra ueniret exculpenda, itaq. delineatio hic omnino uitanda, id L ad anteriorem cerebelli partem repositi, foramen meatumq. notaturus, qui ex tertio cerebri uentriculo in quartum fertur.

M Glandulam hic adhuc reliquimus, quae pineae nucis formam ostendens, usq. forum ex quarto dura membrana sinu in cerebri uentriculos pertinentium fulcrum efficitur.

N, O, P, Q Quatuor his characteribus corpus id indicatur, quod ante sectionem unicum est, atq. in septima figura M & N insignitur: hic uerò ex sectionis serie diuisum diductumq. occurrit. ac N & O eius corporis sedes indicant, quibus testium nomen accommodatur. P uerò & Q, illas insinuant sedes, quas nates ferè nuncupamus.


R, R, R Cerebellum, tenui adhuc obductum membrana.

S, S, S Vasa, uenarum modo tenuem cerebelli membranam implicantia.

T, T Pro-

- T, T* Propagines uasorum tenuem cerebelli membranam implicantium, ad eas producta arterias, quæ secundum dextri & sinistri uentriculorum cerebri posteriora sursum condescunt, plexus efformaturæ, quos secundum dissectionum procures contulerunt.
- U, U* Dura membrana processus, qui superiorem cerebelli sedem à cerebro dirimebat.
- X, X* Propagines notantur à uasis, dictum nuper dura membrana processum implicantibus, in tenuem membranam, quæ cerebellum uestitur, excurrentes.
- Z, Z* Idem hic *Z* & *Z* notant, quod in septima figura: duram uidelicet cerebri membranam, ossi adnatam, in quod auditus organum reponitur.

NONA SEPTIMI LIBRI  
FIGURA.



NONAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

In hac figura, eadem cerebri portio, quæ in octaua, seruat. uerum præsens figura in faciem prorsus reposita, cum dura membrana processum abscessum habet, qui cerebrum à cerebello dirimit. deinde cerebellum hic deorsum & sua caluaria sede manibus protractum, ac deorsum modicè inuersum propendet: ut ipsius regio, caluariae alias contigua, oculis subiceretur, & dorsalis medullæ cavitatis uideretur, alteram quartum uentriculi partem constituens. Ad hæc, præter uenarum quarundam & nervorum progressus, etiam primus & secundus durae membranae sinus hic aperti adanysim exprimiuntur.

- A, A* Cerebri portio adhuc in caluariae amplitudine reliqua, & hic in sua sede adhuc asseruata.
- B, C, D* Tribus his characteribus cerebellum deorsum ex sua sede reflexum indicatur, tenui membrana adhuc inuolutum, ac dorsali medullæ cōnatum. Verum *B* primatim cerebelli dextram indicat sedem, caluariae sinui *P* notando correspondentē. *D* uero sinistram, quæ illi caluariae sedi insidet, cui *R* inscribam. *C* autem cerebelli media pars insignitur, uermi nō absimilis, & suis finibus eos constituit processus, quos uermis uermi imagini coparamus.
- E* Posterior terminus mediae partis cerebelli, qui uermiformium processum posterior recensetur.
- F, G, H* Dorsalis medullæ pars, adhuc in caluaria consistens, ac *F* & *G* huius partis seu dorsalis medullæ sedes indicant, quibus cerebellum connascitur. *H* uero sedem dorsalis medullæ significat, & caluariae amplitudine procedentem.

I Dorsalis medulle sinus, calami quo scribimus mucronem non ab similis, ac mediam cavitatem constituens uentriculi medulle dorsali & cerebello communis.

K Uasis seu ductus uenis quam simillimi, & hac in cerebellum ab illis uasis pertinentes, quæ in primum & secundum duræ membrane sinus exhauriuntur. atque ut hi ductus frequentes admodum sunt, ita etiam non semper pari propagantur serie.

L Et hac quoque ductus uenæ similis in tenuem cerebelli membranam porrigitur, ab illis uasis quæ hac in parte duram cerebri membranam intertexunt.

M Quintum cerebri nervorum par.

N Sextum cerebri nervorum par.


O Septimum par nervorum cerebri. atque hic uidere est, quos surculus duo postrema cerebri nervorum paria principium à dorsali medulle initio, nequaquam uero à cerebello, ducant.

P, Q, R Sinus occipitis osus, quibus correspondet cerebelli figura. nam B cerebello inscriptum, P congruit. C autem, Q uero, R.

S, S, S Dexter seu primus duræ membrane sinus, hic cultelli mucrone adaptatus.

T, T, T Sinister, seu secundus duræ membrane sinus. In nulla autem cerebri delineationum, horum sinuum inaccessus ita conspicue, ac in presenti, oculis subijcitur.

## DECIMA SEPTIMI LIBRI FIGURA



### DECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE characterum Index.

Hæc figura eam cerebri portionem expressimus, quæ dorsalis medulle educit initium: dein cerebellum à dorsali medulle hic conspicua parte ademptum est: & cerebri testes, & nates, & glans, pineæ nucis imaginem referens. ac postremo cavitates ea dorsalis medulle, quæ cum cerebelli cavitatem quartum cerebri efformat uentriculum, hic pariter exprimuntur.

A, A Cerebri pars, dorsalem producens medullam, hinc ex reliquo cerebro resecta.

B Meatus ex tertio cerebri uentriculo in quartum sub cerebri natibus tendens: cuius terminum, in quartum

C. pertinentem uentriculum, C insigniui.

D Cerebri glans, nucis pineæ imagini à dissectionis professoribus assimilata.


E, F, G, H His characteribus, cerebri testes ac nates indicantur. uidentur namque dissectionis proceres gratia lineæ inter E ac F, & inter G & H conspicuæ, superiora tubera E & G insignita, ab inferioribus F & H notatis distinxisse: ac superiora testes uocauisse, quod illis glans, penis quasi modo incumbit: inferiora autem, nates, quod meatibus ex tertio uentriculo in quartum pertinentis terminus, podici conferri possit.

I, K Sedes duæ, quibus dorsalis medulle initium cerebello adnascitur.

L, M, N, O Cavitates dorsalis medulle initij, alteram partem quarti uentriculi constituens, calamiq; cavitati assimilata, quam scribentes atramento intingimus. Sedes enim L insignita, eius calami cavitatis parti responderet, quæ indici scribentis proxima est. M autem & N angulis illi assimilari possunt, quæ in cavitatis calami lateribus consistunt. O uero mucronem, quo characteres formamus, exprimit.

P Dorsalis medulla hic præfecta est, quæ in neruebras procedens, caluariam egreditur.





VNDECIMAE FIGURAE, EIVSDEMQUE  
characterum Index.

- H* *A* c figura cerebellum à calvaria, ipsaq; a deo dorsali medulla avulsam & supinum iacet, humilior em suam sedem, qua dorsalem spectat medullam, commonstrans. Ac proinde regiones ipsius, quibus dorsali medulle continuatur, ac sinum insuper ostendit, qui alteram portionem efformat quarti ventriculi, cerebello & dorsali medulle communis. Porro ad humiliorem praesentis figurae sedem, tanquam ex alio quouis cerebello exsectos pinximus fines mediae partis cerebelli, ut exactius processum uermis imaginem referentiù natura cõspiceretur.
- A* Dextra cerebelli pars, tenui membrana cerebellum inuestienti liberum, uti etiam totum cerebellu hic eam membrana denudatum apparet.
- B* Sinistra cerebelli pars.
- C, c* Media cerebelli pars. ac *C* notat huius partis anteriorem regionem, c uerò posteriorem.
- D, d* Fines terminiq; mediae partis cerebelli: quorum anteriorem *D* indicat, posteriorem uerò *d*.
- E* Cerebelli sinus, qui cum dorsali medulle sinu quartum ventriculum consuiuit.
- G, G* His sedibus cerebellum dorsali medulla adnascitur.
- H* Anterior finis mediae partis cerebelli hic, ac si ab alio cerebello is resectus esset, expressus.
- I* Posterior finis mediae partis cerebelli, à quopiam cerebello exectus.

DVODECIMA SEPTIMI  
LIBRI FIGURA.



*Hæc figura caput à sinistro latere exprimitur, dextro nonnihil subleuato. Ex caluarie autem cavitae cerebellum hic euulsumus, ea tantum cerebri relicta portione, quæ in octaua & nona figuris adhuc seruabatur. Verum illa cerebri portio hic in sua non consistit sede: sed eleuata est, & in posteriora ab ipsa caluarie basi aliquotq; reflexa: ut tandem in conspectum uenirent cerebri processus, forma neruis non absimiles, & olfactui subministrantes: quorum sinister e sua sede cum ipso cerebro eleuatus est: dextro adhuc dura cerebri membrana, quæ octauo capitis ossi obducitur, connexo.*

*A, A* Cerebri pars dextra.

*B, B* Sinistra cerebri pars, tenui membrana adhuc, quemadmodum & dextra pars, obuoluta.

*C* Dextrum olfactus organum, in sua sede adhuc seruatum.

*D* Sinistrum olfactus organum, una cum cerebro in posteriora reflexum.

*E* Sedes, cui sinistrum olfactus incumbit organum. eaq; regio dura membrana hic indicatur, quæ odoratus nomine hac in sede multis, sed exiguis foraminibus perua cernitur.

*F* Vena caluariam petentium sexta, hic in duram cerebri membranam aliquot surculis excurrentis.

*G* Septum, sedes olfactus organis incisus inter diuidens.

*H* Dura cerebri membrana processus portio, qui dextram cerebri partem à sinistra diuinit.


*I, I* Cerebrum, quod passim excavaute sibi in caluarie cavitati respondet, hic quoq; ad frontis ossis regionem sibi insculptis cauernis congruit, & leuib; tuberibus prominet, quæ aliq; mamillares cerebri uocantur processus.

*K* Vena caluariam petentium quinta, cui iter præbet foramen secundo neruorum pari exsculptum.

*L* L, ut & subsequentes characteres, in umbra occipitij cavitatis latitat, & parus etiam est momenti: quando-

*M.* quidem caluarie tantum indicat sinum, cui dextra cerebelli pars congruit. *N* sedem, quæ mediam cerebelli partem respicit. *N* sinum, in quem sinistra cerebelli pars reponitur. *O* uerò dextrum seu primum sinum in-

*P. Q.* dicat dura membrana. *P* autem tertium. *Q* secundum, seu sinistrum.



DECIMATERTIA SEPTIMI  
LIBRI FIGURA.

HUMANI FABRICA LIBER VI  
DECIMAE TERTIAE FIGURAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

769

*HÆ C figura occipitio prorsus imittitur: uniuersaq; cerebri substantia, quæ adhuc reliqua erat, in posteriora deorsum deflexa pendet: ut olfactus organa, & coitus uisiorum neruorum, & maximi soporalis arterie rami, in conspectum uenirent.*

*A, A Dextra cerebri pars, quam adhuc tenuis cerebri obtegit membrana.*

*B, B Sinistra cerebri pars.*

*C, C Cerebri tubera, a papillarum similitudine mamillares processus nuncupata.*

*D, D Sinus seu sedes olfactus organus paratæ.*

*E Septum, olfactus organus paratæ sedes interdiuidens.*

*F, F Sinus caluariæ, quibus mamillares cerebri processus C & C insigniti congruunt.*

*G, G Uteriq; notatur uena caluariam ingredientium sexta.*

*H Vena caluariam ingredientium quinta.*

*I Uas uenæ correspondens, quod in tenuem cerebri membranam à uasis excurrit in dura membrana confistens.*

*K Principium eorum ductuum, qui per duræ membrane latus excurrunt, perinde ac si uenæ essent arterijs coniunctis.*

*L, L Olfactus organa, hic unà cum cerebro à dura membrana deorsum diuisa.*

*M Neruorum uisiorum coitus.*

*N Uisorius neruus, dextrum petens oculum.*


*O Uisorius neruus, sinistrum petens oculum.*

*P Soporalis arterie ramus, duram cerebri membranam perforans, ad latus glandis cerebri pituitam excipientis.*

*Q Arteria P notatæ propago, dextrum accedens cerebri uentriculum.*

*R Arteria P notatæ propago, hic in tenuem cerebri membranam sparsa.*

*S Portio peluis, cerebri pituitam excipientis.*



DECIMAE QUARTA SEPTIMI  
LIBRI FIGURA.

*CAPUT hic in sinistram aurem reclinatum iacet, caluariæ cavitatis basin exprimens, duræ cerebri membrana*



membrana adhuc succinctam. Atq. tanta nunc dumtaxat cerebri dorsalisq. medulla asseruatur portio, quanta cerebri nervorum paribus videndis sufficit. Usuriorum porro nervorum exortum cœuamq. rescui, ne peluis nimum lateret, quo cerebri pituita excipitur.

*A, A* Modica cerebri portio, unâ cum dorsali medulle initio.

*B, B* Nervus usurior, ea parte hic tantum conficiui, qua calvarie cavitatem egrediuntur.

*C, C* Peluis, cerebri pituitam excipiens.

*D* Hic in peluim perinet meatus, cerebri pituitam ex tertio ventriculo deducens.

*E* Dextræ saporalis arterie ramus, duram membranam ad latus dextrum glandis perforans, qua cerebri pituita excipitur.

*F* Sinistræ saporalis arterie ramus, duram cerebri membranam perforans.

*G* Secundum cerebri nervorum par.

*H* Tertijs paribus nervorum cerebri gracilior radix.

*I* Tertijs paribus nervorum cerebri crassior radix.

*K* Quartum nervorum cerebri par, tertij paribus crassiori radici conterminum.


*L* Minor radix quinti paribus nervorum cerebri.

*M* Quintum nervorum cerebri par, seu maior quinti paribus radix.

*N* Sexti paribus nervorum cerebri principia ac furculi.

*O* Septimi paribus nervorum cerebri principia ac furculi. Si quid in hac figura spectandum sit reliquum, id absq. charactærum opera promptè, vel ex proximè præcedentibus figuris percipitur.

## DECIMAQVINTA SEPTIMI LIBRI FIGURA.



### DECIMAEQVINTAE FIGVRAE, EIVS- demq. characterum Index.

*P R A E S E N T I* figura portionem eam cavitatis calvarie dura cerebri membrana adhuc succinctam depinximus, quæ supra ossis cuneum imitantis medium habetur, unâ cum modo indicandis organis. Abs re namq. fuisset, integrum caput harum particularum gratia delineare.

*A, B* Nervorum usuriorum portiones.

*C* Sinistri lateris arteria, quæ duram membranam hic perforans, partim in tenuem cerebri membranam, partim uerò in dextrum cerebri ventriculum digeritur.


*D* Dextri lateris arteria.

*E* Hic peluis collecta, & à tenui membrana cerebri omnino diuisa, propendet, qua cerebri pituita ex tertio illius defluens ventriculo excipitur.

*F* Foramen, quo peluis infundibuli modo extructæ finis glandem petit, cerebri pituitam excipientem.

*G, G* Secundi paribus nervorum cerebri portiones.

DECIMA-



DECIMASEXTAE FIGURAE, EIVS-  
demq; characterum Index.

- H* A c figura nudam depinximus glandem, qua cerebri pituita excipitur, una cum pelvis, seu infundibulo, quo pituita huc deferetur, quodq; hic flaccidum propendet. *A* lateribus vero, arteriarum saporatum portiones, que reticularem plexum efformare dicuntur, ita hic expressimus, uti nobis inter secundum occurrere. Atq; ut eae arteriarum portiones sese varie secantibus offerunt, ita quoq; varie eas delineavimus.
- A* Glands, cerebri pituitam excipiens.
- B* Pelvis, seu infundibulum, cerebri pituitam super modo dictam glandem deferens.
- C, C* Arteriarum portio, quae secundum foraminis ipsius gratia in calvaria exculpti ductum oblique fertur.
- D* Sinistra arteriae ramus in durae cerebri membranae sinistram latem excurrans.
- E* Arteria sinistra portio, per proprium foramen ad narium usq; amplitudinem pertingens.
- F, F* His sedibus duarum arteriarum sedem delineavimus. ac dextrum quidem *F* arteriam notat e a serie ductam, ut hic in ramos non dividitur. sinistram autem *F* arteriam hanc in duos ramos, qui mox in unum rursus coeunt, dissectam insinuat.
- G* Arteria sinistra portio, duram cerebri perrepans membranam, ac partim in sinistram cerebri ventriculum, partim in tenuem membranam hic cerebri basi obductam digesta.
- H* Propago sinistrae arteriae, per foramen secundi paris nervorum cerebri calvariam egrediens, ac nervum deini fororum oculumq; petens.

DECIMASEPTIMA LIBRI  
SEPTIMI FIGURA.

- H* A c figura reticularem plexum finximus, cuiusmodi is esse *A, B.* deberet, qui Galeni descriptionibus conveniret. Significat itaq; *A* & *B.* arterias calvariam subeuntes, moxq; in mirabilem illum plexum diffusas. *C* vero & *D* ramos, in quos plexus illius propagines colliguntur, quicq; illis prorsus arterijs magnitudine respondent, quas *A* & *B* indicavimus. Ceterum *E* glandem notat, pituitam cerebri excipientem.



- P* R A E S E N T I figura, arteriarum ad glandis cerebri pituitam admittentis latus reptantium seriem depinximus, quam in ovium ac bovm capitibus sepe observamus. Hanc autem proponere libuit, ne quis nos latere arbitraretur, quae illorum animalium hic *A* di-  
*B, C.* clavam sapor glandem: *B* & *C* arteriarum sedem, qua primum calvariam ingreditur.

AND. VESALII, DE CORPORIS  
DECIMAOCTAVA SEPTIMI  
LIBRI FIGURA.

*PARVA* hac figura erectam finximus peluim, seu cyathum, quo cerebri pituita in glandem ipsi subditam distillat. ac deinde hic finximus quatuor ductus, à *A, B, C,* glande pituita per proxima glandi foramina deferentes. Indicet igitur *A* glandem, cui pituita instillatur. *B* peluim, qua hæc ducitur. *C* uero & *D, E, F* meatus ad faciliorem pituita huc decumbentis egressum paratos. Porro præter has septimi libri figuras, ad earum potissimum cognitionem spectantes, quæ in caluarie habetur casitate, etiam huc faciunt duæ figuræ mox ad finem primi Capituli libri quarti additæ, & septem parium nervorum cerebri delineationem exprimentes. quum uero illic earum indicem non admodum succinctum necessario complexi simus, abs re prorsus esset, easdem hic quoq; reponere. Præterea figuræ, oculi constructionem exprimentes, etiam si ad septimum referantur librum: tamen Capituli decimo quarto, quod oculorum fabrica de dicabitur, illas præponam, quum nulli alteri quàm illi famulentur Capituli.



SEPTIMI LIBRI FIGURARVM, ET  
earundem Indicium finis.

CEREBRVM GRATIA PRINCIPIS ANIMAE,  
quemadmodum & sensus quoq; ac motus ex nostro arbitratu  
pendentis, extractum esse. Caput I.

*Quid quintus  
liber & sextus  
pertractant.*



*Septimi libri  
argumentum.*

*Cerebri fun-  
ctionis & par-  
tium brevis e-  
numeratio.*

**N**STRUMENTA nutritioni famulan-  
tia, duobus proximè præcedentibus libris  
utunq; aggregati sumus. Prior namq; cibi &  
potus organa (in quorum præcipuo uiscere  
côcupiscibilem animam residere diximus)  
enarravit. Posterior autem eas partes recen-  
suit, quibus aeræ substantiæ reficiendæ, ac  
innati caloris augendi recreandiq; munus  
concreditur: in quorum primario uiscere  
uim irascibilis animæ insitâ esse innuimus,  
inibi Stoicorum & Peripateticorum suffra-  
gijs non adeò acquiescetes, ut & animæ prin-  
cipatum in corde collocari, nervosque ab illo originem ducere, donaremus.  
Quapropter quum sensus motusq; arbitrij, & principis animæ (cuius bene-  
ficio imaginatur, ratiocinamur & memoramus) fomes adhuc recensenda  
superfuit, præfens liber illi opportunè consecrabitur, cerebrum ipsiusq; partes  
uniuersas unâ cum sensuum organis pertractaturus. Quemadmodum itaq;  
cordis substantiæ, uitalis animæ uis, propriæq; iecoris carni, naturalis animæ  
facultas in duntur: ac ut iecur crassiores sanguinem, naturalemq; spiritum,  
& cor sanguinem impetu per corpus ruentem, unâ cum uitali spiritu confi-  
ciunt, & perinde atq; hæc uiscera per dedicatos sibi canales omnibus corpo-  
ris partibus suas exhibent materias: sic quoque cerebrum in proprijs sedibus,  
suoq; muneri appositè subministrantibus organis, animalem spiritum longè  
clarissimum tenuissimumque, & qualitatem ferè potius quàm corpus parat:  
quo ad diuinas principis animæ operationes partim utitur, partim autem ad  
sensuum motusq; instrumenta, per nervos, tanquam per funiculos, continuò  
distribuit, ea nunquam spiritu, qui præcipuus eorum instrumentorū functio-  
nis autor cefetur, destituens: nō minus sanè quàm iecur & cor nullas corporis  
partes



partes suis quas illis impertiunt materijs (tantiſper dum ualet homo) indigas relinquunt, etiamſi non ſemper cūm qualitate, tum copia eaſdem diffundāt.

Nerui igitur cerebro id præſtant, quod<sup>a</sup> magna arteria cordi, &<sup>e</sup> caua iecori, ut qui paratum à cerebro ſpiritus illis quibus hunc mandari oportet inſtrumentis deducant, diligentesq; cerebri ſatellites & nuncij cēſeantur. Cæterū animali ſpiritus materia ſuppetit uitalis ſpiritus, in arterijs numeroſa ſerie<sup>d</sup> duram membranā &<sup>e</sup> tenuem, quibus cerebrum inuoluitur accedentibus abundans: & dein aer quem uerſus cerebrum tum per foraminula priuatim odorū occaſione in octauo capitis oſſe exſculpta, tum cōprimis per ea caluariæ<sup>e</sup> foramina quæ palatum & fauces ſpectant, inter ſpirandū attrahi multo antè diximus. Ac aer quidē undequaq; ubi aditum reperit, in cerebri<sup>b</sup> dextrum &<sup>c</sup> ſiniſtrum, & horum<sup>k</sup> medium uentriculos ſeſe inſinuat. Vitalis autem ſpiritus eſti copioſiſſimus in<sup>i</sup> omnibus cerebri membranarū uiaſi ſiniſbus<sup>ue</sup> habeatur, attamen in dextrum & ſiniſtrum cerebri uentriculos plurimus à præcipuis arteriarum<sup>m</sup> ramis fertur, quæ ad<sup>n</sup> glandis cerebri pituitam excipientis latera porriguntur. Ab his namque non minimæ<sup>o</sup> ſoboles tenuis membranæ proceſſibus ſuffultæ, per humillimas dextri ſiniſtriq; uentriculi ſedes ingrediuntur, tandem per totum uentriculorū progreſſum in illorum amplitudinem incedentes. Verūm præter has arterias, a<sup>p</sup> quarto duræ membranæ ſinu<sup>u</sup> uas quoddam ſub<sup>v</sup> corpore teſtudinis cameræ<sup>ue</sup> inſtar arcus exſtructæ imaginem referente, in anteriora cerebri per communem dextri ſiniſtriq; uentriculi cauitatem contendit. quod poſt uarios implexus, in<sup>x</sup> duas tandem portiones bipartitum, una ad dextrum, altera ad ſiniſtrum uentriculum diffunditur, & eius loci arterijs commixtum, rete efformat, quod fœtus in uolucrum ſubſtantiæ potiſſimū comparatur. Ab aere itaq; in cerebrum ingreſſo, ac uitali illo ſpiritu ob frequentes ſanè anfractus ad cerebri uſus magis magisq; adaptato, in cerebri dextro ſiniſtroq; uētriculis, & ipſorū cōmuni cōcauitate tertio<sup>ue</sup> uētriculo animalis ſpiritus à cerebri uirtute elaboratur. Huiusq; portio ab eo cerebri<sup>a</sup> uētriculo per oblongū meatū inter<sup>x</sup> cerebri corpora quæ clunibus & teſtib. aſſimilātur porrectū, in cerebelli uentriculū fertur, quem partim cerebelli ſinus, partim dorſalis medullæ initij cauitas efformat. Ab hoc uentriculo in<sup>v</sup> dorſalem medullā, atq; ita in neruos ab illa propagatos, animalis ſpiritus nō mediocris portio digeritur. A<sup>i</sup> reliquis autem cerebri uentriculis, ſpiritus in neruos ab illis proximè principiū ducētes, ac ſic in ſenſuum motuſq; arbitrij organa diſpenſatur. Verūm interim non admodum anxie diſceptamus, num ſpiritus ille per aliquos neruorum meatus (ut uitalis per arterias) an ſecundū nerui corporis latera luminis modo ad columnam dirigatur: an uerò neruorum dūtaxat cōtinuitate cerebri uis ad partes pertingat. Atq; hæc tenus ſanè cerebri ſunctiones in uiuorum animalū ſectionibus admodum probabiliter & uerè quodammodo poſſum aſſequi. Sed quī in imaginatione, ratiocinatione, cogitatione, memoria (aut quomodo cūq; aliter, neſcio quorū dogmatib. acquieſcēs, principis animæ uires ſub diuidere, aut enumerare uelis) cerebrū ſuo fungatur munere, haudquaquā ex ſentētia apprehendo. neq; quicquam inſuper ab Anatomico, uel theologorū omnem rationis uim ac totam ſerè principis nobis uocatæ animæ facultatē brutis animalibus adimentium occaſione, indagandum puto: quē cerebri nimirum conſtructione ſimia, canis, equus, felis, & quadrupeda quæ hæc tenus uidi omnia, & aues etiam uniuerſæ, plurimāq; piſcium genera, omni propemodum ex parte homini correfpondeant: neq; ullum ſecanti occurrat diſcrimen, quod ſecus de

xx hominis,

*Bristorum cere  
bri conſtructio  
nem ab homi  
ni non differ  
re.*

a ſi. ca. 2.  
c 2. ſi. g.  
ca. 1. lib. 4.  
b ſi. cap. 12  
lib. 3.  
c ſi. g. ca. 6  
lib. 3.  
d Quidam  
deſcripſit  
m. ſi. g. c.  
ſi. g. H. H.  
e ſi. g. E.  
E. E.  
f ſi. g. ca. 6  
lib. 1. A, B.  
A.  
g paſſum  
arca M ſi.  
3 cap. 12  
lib. 1.  
h 4. ſi. g.  
L, L.  
i 4. ſi. g.  
M, M.  
k 7 ſi. g. H.  
l Tota ſi. g.  
ca. 14. li. 3.  
m 6 ſi. C.  
c. aut ſi. g.  
cap. 14 lib.  
3 L.  
n 16. 18 ſi.  
gura A.  
o 14 ſi. E.  
P. aut 6. 7.  
ſi. g. F, G.  
p 7 ſi. g. T.  
q 7 ſi. g. V.  
aut 6 ſi. g.  
H, I.  
r 6 ſi. g. A.  
A, A.  
s ſi. g. in  
K, L.  
t 6 ſi. M, N.  
u 7. 8. n. ab  
Hæper K in  
1 ſi. g. none.  
c 8 ſi. g.  
undecimæ.  
x 10 ſi. g. E.  
F, G, H.  
y 9 ſi. g. H.

hominis, quàm illorum animalium functionibus statuendum esse præscribat. nisi fortè quis meritò dicat cerebri molem homini, perfectissimo sanè quod nouimus animali, obtigisse maximam, eiusq; cerebrum etiam tribus bouum cerebris grandius reperiri: & dein secundùm corporis proportionē mox finiri, dein cani magnū quoq; nō secus obtingere cerebrū, quàm si animalia cerebri tantum præstaret mole, quāto principis animæ uirib. apertius uicinius' ue do nata uidetur. Verū quo magis cordis, iecoris, testis, hisq; subministrantiū organorum, quorū functiones (ne quid de generatione & corruptione dicam) nos cum multis animalib. certè cōmunes obtinere nō ambigimus, naturā ex aminio, quantoq; minus de principis animæ munijis aliter quàm sanctissima uerissimaq; nostra docet religio, statuendū mihi persuadaeo: tanto sanè magis admiror, apud scholasticos theologos perinde ac apud plebeios philosophos legi, hominis cerebrū tribus donari uentriculis: ac horum primū fronti; conterminum, sensus cōmunis uocari uentriculū: quod ab hoc quinq; sensuū nerui suis instrumentis deferatur: quodq; dein horū neruorū beneficio, odores, colores, sapores, soni & tactiles qualitates in ipsum pertingāt. Ac proinde, illi homines præcipuū primi uentriculi munus esse censent, ut obiecta quinq; sensuū is recipiat, illaq; meatu quodā in secundum uentriculū, in capitis medio repositum transmittat, ut iste de obiectis imaginari, ratiocinari & cogitare possit. Secundo enim uentriculo cogitationē, seu rationem tribuunt: tertiu (qui occipitium sibi uēdicat) memorię cōsecrantes. In hunc namq; secundū uentriculum omnia quæ ex obiectis illis, de quibus abundē ratiocinatus est, memoriæ mandari statuit, cōmodo deponere astruūt. subiiciētes dein, tertium uentriculum ista, prout humidior scior' ue est, aut ocysus, aut tardius sibi, uelut in ceram, uel cōtrā tanquā in lapidem duriorē, insculpere: & pro sculpturæ leuitate, aut difficultate, quæ ipsi delegantur, aut breuiori, aut lōgiori tēporis intervallo asseruare. Ceterū hunc tertium uentriculū illa nō sibi aut retinere aut insculpere docent, sed secundi uentriculi gratia: nimirū ut quoties hic de aliquo memoriæ sinui cōcredito, ratiocinari instituit, ille ocysus hoc quicquid est, in secundum uentriculum mandet, ac ueluti in rationis officinam uersandum exporrigat. Huiusmodi sanè opificis rerum Dei in corporum fabrica artificium nunquam insipientium, sibi; liberas undique sententias arrogantium sunt figmenta, non absque graui profectō impietate excogitata. quā enim illi in cerebri constructione enarranda aberrant, sequens sermo ostendet, eadē methodo qua in quinto & sexto libris usus sum, post perfunctoriam hanc cerebri descriptionē, ipsius partes seorsum singulas unā cum omnibus sensuum instrumentis explicaturus.

DE DVRA MEMBRANA CEREBRVM AM-  
biente, & membranula sub cute caluariam obcingente.

Caput 11.

*DURA* cerebri membrana in multis occurrit figuris. in prima enim, externa ipsius exhibetur sedes uniuersa, supra fissuram cōsistens, qua cerebrū ostensuri, caluaria diuidere solemus. Secunda uerò, eam membranae partem internam cōmonstrat sedē. uti etiam nona, duodecima, decimatercia, & magis adhuc decima quarta internam duræ mēbrane sedem illis regionibus proponunt, à quibus cerebrum aut cerebellum in illis figuris iam sectionis serie euulsum est. Ceterū membrana processum inter dextram & sinistram cerebri partes deductum, refert tertia figura ad D. D. Illum autem qui cerebello infernitur, septima figura O, O, O. Atque in illis etiam figuris duræ membranae occurrunt sinus, uti etiam optime figura Capitis decimi quarti libri tertij. Porro membranam caluariæ exterius obductam nullibi priuatim delineauimus, quum tenuis sit, ac ovis undiq; circumdetur, totaq; ex ovis circumscriptione petenda ueniat.

QVEM AD-

Thoma, Scoti,  
Alberti Cre-  
tius cohortis feri-  
ptorum de ce-  
rebri uentricu-  
lis opinio.



47. miscu.  
tab. A.  
b. 1, 2, 3. fil. li.  
A, B, C,  
D.

e Hæc oc-  
curre simul  
in 6 & 7 fi  
guris cap. 6  
lib. 11.

d. fi. A, A,  
B, B, 2 fig.  
H, H. dem  
in tota cal-  
uariæ basi  
in 14 figu.

e Que in  
cavitatē cal-  
uariæ extu-  
berat sedet,  
in 6 & 7 fi  
guris ca. 6  
lib. 11. specta-  
tur.

f Sinus quo  
que in istā  
occurrit fi-  
guris,  
g. 6 fi. ca. 6  
lib. 11. M.

h. 16 fig. A.  
i. 6 fi. cap. 6  
lib. 11. O, P.

h. 16 fi. E, F.  
Istā quoq;  
ex 6 fi. ca. 6  
lib. 11. sunt pe-  
tendi.

m In eadem  
potissimum  
figura.

n. 1 fi. G, G.  
H, H, 1, 1.

o. 1 fi. K. &  
sub H pro-  
ximum G.  
p. 1. ubi H,  
H coincidunt  
in G, G. aut  
3 fi. ca. 6 li.

1. B.  
q. 4 fi. ca. 12  
lib. 11. A, A.

r. 1 fig. E, F.  
& 3 fi. ca. 14  
lib. 11. X, X.

s. 7 fi. O, O.  
O, O. 8 fi-  
gura V, V.

VE M A D M O D V M sanè uniuersam corporis trun-  
ci cavitatem sub<sup>1</sup> septo transuerso conspicuā, peritoneo  
contineri, idq; instar sacci cuiusdā ipsi impositā amplecti  
recensuimus, ac pariter, ut costas succingentē mēbranam  
omnia quę in thorace collocatūr, ambire commemorauimus  
ita etiā uniuersa caluarię<sup>e</sup> cavitās cerebro excipiēdo  
adaptata, quadā subducitur<sup>d</sup> mēbrana, quā propter crassi-  
tiem, quā cæteris, nō cerebri modò, uerū totius etiā corporis prestat mem-  
branis, crassam, & ab insigni duritie durā, uti & cuticularē, nuncupamus. Hęc  
nō minus quā peritoneū, & costas succingēs membrana, unica cōtinuāq; ui-  
situr, adeò ut ipsius sitū, & externę suę superficiē formā magnitudinēq; oīsū  
cognitio elegāter edoceat. Nullū enim caluarię os priuati alicuius usus gratia,  
in caluarię cavitatē<sup>e</sup> extuberare scripsimus, cui hęc mēbrana nō cedat, seq; ab  
illo introrsum premi sinat. Rursus nullū in ea cavitatē narrauimus<sup>f</sup> sinū, quē  
hęc quoq; mēbrana non impleat, præter cuneiformis oīsīs<sup>g</sup> sinū, cui<sup>h</sup> glās pi-  
tuitam cerebri excipiens incūbit, & eos<sup>i</sup> sinus, qui præcipuis soporarię arterię  
propagininib. ad glādis illius latera excurrentib. cedunt, ad pituitęq; defluxum  
consentur accōmodi. In horū namq; sinuū regione, dura mēbrana à caluaria  
abscedit, & inter mēbranam & caluariā glans ea, dictęq; arteriarū propagines  
consistunt. quū interim per reliquā caluarię cavitatē, membrana oīsib. proxi-  
mē, & citra alicuius corporis mediū sit attigua, eumq; in modum illi ferē pri-  
mū cōmittatur, quo inuicē accumbētes musculi mutuo hēre cōnectiq; so-  
lent. quanquā eo cōnexionis genere in capitis basi mēbrana firmitus, quā in  
laterib; & uertice, & fronte, & occipitiō, oīsib. affirmetur. Deinde uniuersis  
acutiorib. in caluarię cavitatē descriptis<sup>j</sup> oīsū processibus, nri & caluarię<sup>k</sup> fo-  
raminū in hāc cavitatē spectantiū orbibus, pertinacissimē nō secus cōnascitur,  
quā si ab ipsius originē duceret. Ad hęc caluarię etiā adnectit<sup>l</sup> futuris, at cōne-  
xu nō eguē ualido, atq; is est, quē ad oīsū processum molitur: quòd nimirū ille  
instar simplicis tantū lineę, non autē notatu digna amplitudine, huius modo,  
accidat. Verū interim dura mēbrana, non solū futuris cōnascitur, sed tenues  
membraneasq; fibras, etiā per illas uersus capitis exteriora trāsmittit, quę supe-  
riori caluarię parte à dissecantib. abstracta, in dura mēbrana simplicis instar li-  
nē<sup>m</sup> extuberant, ipsiusq; superficiē asperam ostendūt, futurarum situm in illa  
quoq; referētes. Cæterū præter fibras, externā durā mēbranæ superficiem  
minus etiā æqualem reddunt<sup>n</sup> tubercula quędā in uertice iuxta sagittalis futu-  
ræ cum coronali<sup>o</sup> coitum, subinde inæqualiter prominētia, paresq; si bi in cal-  
uaria<sup>p</sup> sinus obtinētia, quib. ualidē innascuntur. Vnde etiā hęc non obiter, neq;  
per transfennā expendenda ueniunt, ne minus cauti in cauteriorū administra-  
tione & capitis cōtusionibus caluariā perforemus. etenim nulla horum tube-  
rum habita ratione, membranā unā cum ossē haud leui malo pertūderemus:  
quòd in his locis, uti in futurarū quoq; regionibus, illa ab ossē difficulter abscē-  
dat, & nō insigniter ab externa caluarię superficie remoueat. Præterea mē-  
branæ ad caluariā connexum, & exterioris ipsius superficiē asperitatē<sup>r</sup>, uenu-  
læ quędā daugent, per caluarię futuras & quędam foraminula partim ex du-  
ra mēbrana ad caluarię inuolucra, partim ab ipsius inuolucris ad duram mem-  
branam pertinētes. Porrò hęc nō toto suo corpore, ad hunc quē diximus mo-  
dum, caluarię oīsibus est attigua, sed<sup>s</sup> magnā sui portionem inter cerebrū ac  
cerebellum insinuat, quā uniuersam cerebelli superiorē sedem integēs, cere-  
bri regionem cerebello incumbentem ab illo interdiuidi, ac ueluti subleuat.

Dura mem-  
brana sinus, nu-  
merus, magni-  
tudo, & for-  
ma.

Dura membra-  
ne ad caluariā  
nexus, & ex-  
terne ipsius su-  
perficiē species.



Quinetiam à media sede huius duræ membranæ portionis, ubi dextra cerebri pars sinistrâ respicit, & secundû totam tertij duræ membranæ sinus (quæ cum cæteris illius uasis in tertio libro recensuimus) longitudinē, alia quoq; duræ membranæ portio processus<sup>u</sup> ue educitur, dextrâ cerebri partē à sinistra dirimens. Hic processus falcis mēstroræ imagini aliqua ex parte accedit: nā posterior ipsius sedes illi duræ membranæ portioni continua, quæ cerebellū integit, falcis basi correspondet.<sup>7</sup> anterior uerò, quæ septo sinuū olfactus<sup>u</sup> organorum connascitur, falcis mucroni assimilari potestis: nanq; membranæ duræ processus à posteriori capitis sede antrosum ductus, sensim falcis ritu arctatur. Deinde processus huius pars tertio duræ membranæ sinui continua, falcis dorso non absimilis secantibus occurrit. siquidē extrorsum curuatur, & tertij duræ membranæ sinus occasione crassior uisitur. Processus aut pars<sup>u</sup> callosum cerebri respiciēs corpus intrò obliquatur, falcis aciei formā referens. Hi durioris membranæ processus, nihil omnino à reliquo ipsius corpore, nisi una duntaxat sede in crassitie duritiāq; uariāt. Vbi enim processus cerebellū integens<sup>u</sup> natibus cerebri<sup>u</sup> proximus est, triplo ferè quàm in reliqua sede crassior duriorq; & propemodū cartilaginea euadit, adeò sanē, ut canes hoc loco os possideant superiorē cerebelli regionē integens, cerebrūq; ne id cerebellū premat, sufficiens. Verum interim neuter horum processuū (etsi Galenus rem parū expendens secus docuit) duplicatur, sed uterq; simplex est, quemadmodū & ipsa membrana, quā cerebri laterib; aut caluariæ attenditur. Nā etsi tertius duræ membranæ sinus cultello per lōgitudinē<sup>u</sup> dissectus, primo intuitu membranæ processum inter utraq; cerebri partes intercedentē geminū esse, ac ueluti duplicata mēbrana constare ostendit, id tamē sinus duntaxat occasione uisitur. Quātuūis namq; inferiorē tertij sinus angulū dirimere studueris, mēbranam tamē extra sinus amplitudinē nunquam in duas subdiuides. Ceterum, ut tertius sinus in hoc duræ membranæ processu, nō adamsim secanti imponit, ita quoq; in<sup>u</sup> processu cerebellū à cerebro dirimēte, primus, & secundus, & quartus duræ membranæ sinus falsam duplicationis proponūt imaginem. Horum duræ membranæ processuū superficies specie cum reliqua interiori totius membranæ superficie cōgruit, quā uix inter omnes corporis superficies aliam magis splendidā læuē<sup>u</sup> ue, & (quod nō obiter expendendū uenit) omni adipe, quemadmodū & omnia quæ in caluariæ cōsistunt cavitatē, desitutā reperiās. Quinetiam interior hęc superficies aqueo humore lōgē magis quàm exterior perfunditur, & multo candidior apparet: & quū fibris omnibus quibus alteri parti adnasceretur, uacet, impenitus lubrica teraq; quàm exterior superficies conspicitur. Porro quemadmodū exterior superficies ossa caluariæ respicit, ita & interior tenuē cerebri spectat<sup>u</sup> membranā, cui nullius corporis interuentu, quàm ductuū instar uenarum ab ipsa in tenuem membranā pronatorum ope cōmittitur. Quandoquidē si dura membrana pari modo tenui membranæ ipsiq; a deo cerebro, ut caluariæ cōnasceretur, ipsa quo minus tenuis membranæ uasa distendi contrahiq; possint impedimento foret. quod præcauens Natura, duræ membranæ cavitatē, nonnihil ampliorem ipsa cerebri cum tenui membrana mole, produxit, nō secus ac cordis<sup>u</sup> inuolucrū, ipso corde insinigner amplius uisitur. Quāquā interim Natura duram membranā à tenui non adeò, atq; cordis inuolucrum à corde, liberauerit, quum innumeros uenarum instar ductus dura membrana tenui membranæ exporrigat, mirabili industria horum beneficio illam sibi ita affirmans, ut ductus illi simul uenæ arteriq; & uinculi etiā uices gerant. Ceterum præsens sermo nūc sanē exigeret, ut<sup>u</sup> sinuum

Lib. 6. de Anatomia dissecti.

Dura membrana interior superficies qualis.

Dura membrana cum tenui connexio.

Ipsa uasa.

1. f. C, C,  
C. 2. fig. B,  
B.  
2. tota figura  
raccap. 14  
lib. 3.  
3. f. fig. D,  
D, D.  
4. f. fig. G,  
H.  
5. f. fig. ca.  
6. lib. 1. u.  
7. f. fig. C,  
D.

8. f. L, L.

9. 7 figura  
M, N.  
10. f. ad se  
mictriculi  
inter O, O.  
11. X, X  
cōsistentē.

12. f. in 2. fi.  
B, B.  
13. f. 3. figura  
D, D.

14. f. fig. O,  
O, O.  
15. f. P, P.  
16. f. fig. Q.  
17. f. fig. T.

18. f. E, E,  
E. 8. fig. R,  
R, R.  
19. f. fig. D,  
D, G, G.  
20. f. fig. X, X.

21. f. lib. 5  
B, B. circū  
C, D, E.

oppositissimū  
occurrunt  
tota fig. ca.  
14 lib. 31

ut<sup>o</sup> finuum uasorumq; duræ membranę numerum, situm & naturā explicarem: sed quū id in tertio libro unā cū reliquis totius corporis uenis ac arterijs haud obiter attētauerim, nō abs re hīc chartis pepercero, ac in durę etiā membranę foraminū, quæ modō subiungenda est, enarratione, foramina illa, seu uias potius & ductus præteribo, quibus dura mēbrana uenas arteriasq; in suas cauitates & sinus, uenarum & arteriarum usum præbentes, assumit, & ex illis sinibus uasa non pauca hinc inde profert. Cæterum uerorum foraminū, quibus dura cerebri mēbrana est peruia, inibi nō<sup>p</sup> modica occurrunt, ubi hæc<sup>q</sup> octauo capitis cōnascitur osi. Quemadmodū enim id odorū gratia exiguis multisq; foraminib. donatur, ita pariter & dura quę ipsi insertitur mēbrana, cribrī in modū est peruia. Dein septem neruorū cerebri paribus ita uiam præbet, ut horum gratia in utroq; latere octo exhibeat foramina. horumq; primū, primi paris alterum transmittit neruū<sup>7</sup> secundum foramē, alterū secundi paris emitit neruū: tertiū uerō minorē deducit radicē tertij paris, quæ in dura membrana (etsi secus in caluaria<sup>8</sup> accidat) cum secūdo pari nō procidit.<sup>8</sup> quarto foramine præcipua tertij paris radix cum quarto pari ducitur.<sup>9</sup> quintū neruulo paratur, qui iuxta quinti paris radicē enascitur, & quinto pari a nobis adnumeratur.<sup>10</sup> Sextum foramen præcipuæ quinti paris portioni cedit.<sup>11</sup> Septimum sexti paris, &<sup>12</sup> octauū septimi paris gratia exculpūtur. Adhęc, dura mēbrana<sup>13</sup> uno incōiugato & orbiculari ueroq; foramine pertunditur, quod<sup>14</sup> infundibulo cerebri pituitam excipienti uiam præbet. Insuper iuxta huius foraminis latera<sup>15</sup> aliud utrinq; spectatur foramen, maximū arteriarum cerebrum petentium ramum transmittens. Adhęc, dura mēbrana<sup>16</sup> maximo, eodemq; pari carente foramine dorsālē dimittit medullam: cui perinde ac neruis ipsam transeuntibus processum, ac uelut inuolucrū quoddam obducit, adeo ut dura & instar tegminis & tunice illis euadat. Verūm dura mēbrana etiam præcipuē extruitur, ut aptis quibuscūq; sinibus omnes caluariā petentes uenas, omnesq; (si<sup>17</sup> duos modō ramos dempseris) arterias excipiat, ipsarumq; materiā in suos sinus assumat, eam ita deducentes, ut hæc propagines instar uenarū ab illis sinibus depromptis in tenuem membranā commodissimē deferatur, & dura membrana lagenam imitetur, ex qua tenuis mēbrana, & dein cerebrū materiā sibi alliciat, in uenis & arterijs uersus caput trāsmisissā. Ad hæc, propagines à tertio durę mēbranę sinu utrinq; innumera serie in tenuem mēbranam deriuatæ, cerebrū ne deorsum cōcidat, uentriculūq; ipsius cōprimantur, sic suspensum sustinent, ut dura mēbrana pariter cerebri inuolucrū & fulcrū euadat. Ad quod rursus summo opere conducunt fibræ per futuras à dura mēbrana prorepentes, quæ illam (quod alioquin, durissimo osi non satis cōnasci poterat) caluariæ firmant, & quo minus cerebri grauitate tracta, deorsum labatur, autores sunt. Neque id lanē præstitissent, nisi Natura peculiare artificium extra caluariā moliretur: quod indies fabri imitantur, quoties clauorū acies, quando duos simul compingunt assēres, reflectunt, ne uno assere tracto, ex altero clauus promptē uellatur. Ipsa namquē fibras has, nō solum per reflexos, & obliquitatis etiam nomine firmantes ductus transmissit: uerūm trāsmisissas rursus dilatauit, auxit, atq; in unum omnes adeo commiscuit, ut in membranā quandam tenuem degenerent, quę quod caluarię obducitur, πρὸς πρῶτον Græcis nuncupatur. Quamuis interim hæc omnino non citra alterius corporis mediū caluariæ adnascatur: sub ipsa enim alia adhuc tenuis consistit membrana, alijs quoq; omnibus propemodum osibus communis, ac ab amplexu

Foramina.

Dura membrana  
ne usus, & cō  
structionis ra  
tio.

Membrana ex  
terius caluariā  
obcincta crea  
tio & usus.

quo ossa ambit, *πορὶς* appellata. Inter reliquas aut ossium sedes membrana hac priuatas, caluarię interna est cavitatis, cerebro excipiendo adaptata: cui nusquam, ubi duram membranā contingit, eiusmodi mēbranula obnascitur, adeo ut tanta etiam huius cavitatis sedes, quantæ dura mēbrana non connascitur, hac quoq; membranula alijs ossibus communi sit obiecta. Visitur autem illa sedes ubi duræ membranæ glandula cerebri pituitam excipiens, & maximi arteriarum cerebrum petentium rami substernuntur.

h vbi sub  
15 figura  
C, D, cōj-  
fuit tota 16  
figura.

## DE TENVI CEREBRVM INVOLVENTE membrana. Caput 111.

*TENVIS* membrana cerebro obducta in secunda quidem occurrit figura, auulsa autem in tertia. Atq; ita etiam cerebello obvoluta spectatur in octaua.

Tenuis mem-  
brana nune-  
tus.



**TENVIS** cerebri mēbrana, similiter ac dura, unica duntaxat & sibijpsi cōtinua est: nullam siquidem prorsus suæ naturæ portionem aut ad cerebellū, aut ad utramq; cerebri partem, aut in ipsis cerebri uētriculis anfractibusq; ac ut semel dicam, tota cavitatis, quam dura membrana constituit, inuenias, quæ non unius tenuis mēbranæ ad eum modū sit portio, quo in animalis cute iam à corpore detracta, partes quibus aures, pedes & cauda induebantur, reliquæ cuti continuas esse dicimus. Tenuis membranę situs ex cerebri ac cerebelli cognitione desumendus est. Nulla etenim exterioris superficie cerebri & cerebelli & dorsalis medullæ & neruorum portiuncula cōspicitur, quam tenuis membrana uicinisimè, & citra alterius substantię interuentū non integat, si modò superioris callosi corporis superficiem exceperis, quæ sola eiusmodi membrana, quam dura utcunq; sit, haud continetur. Præterea omnes cerebri ac cerebelli anfractus, in quos tenuis mēbrana undicunq; sui partes processus ueingerit, eius situm ostendunt, uti sanè & ipsius quoq; figuram & magnitudinem. Hęc membrana exteriori superficie uelut aqueo humore oblitur, secundum partium quas ambit eminentias extuberans. ipsa namq; uix alibi crassitiē uariat, tenuissimæ semper membranæ innumeris uasorum ductibus obsita: imaginem cōmonstrans. Quippe uasorū potissimum gratia illam rerum Opifex condidit, nimirū ut instar mesenterij ferè & humilioris membranæ omenti, ea uasa tutò deduceret, suffulciretq;. Quinetiā cerebri & cerebelli est in uolucrum quod ipsorū substantiā proximè continet & firmat, nō secus quam ca seorum formæ lac paulo antè coagulatum sustinent, & fingunt. His uisibus rerum Opifex hęc apprimè idoneam produxit. tam mollis enim tenuisq; & sequax est, ut aptissimè omnib. anfractibus sinibusq; sese ad profundissima usq; ingerat: & quæcunq; uasa cerebrum expetebat, ea tutò deducere possit. Quinetiam adeo leuis cernitur, ut sua grauitate neutiquam uim cerebro inferat: & tam ualida interim duratq; existit, ut à dura cerebri membrana sursum tracta non diuellatur: imò illū suspensionis impetum à frequenti numerosaq; & continua uasorum serie inductum eleganter sustinet, à plerisq; eo quod uasa cerebri instar inuolucrorum foetus complectitur, *χραιοειδης* nuncupata. Quamuis interim plexus quidē in dextro & sinistro cerebri uētriculis, & magna quoq; ex parte in media ipsorum cavitatis repositus, eo etiam nomine donetur, non tam, quod is uelut in membranula quapiam uarias uenarum arteriarumq; contineat propaggines, ac quod carneam insuper quandam commonstret substantiam uasis circumnata, illique carni similem quam exteriori foetus inuolucro

Exterior super-  
ficies.

Vasorum con-  
structionis ra-  
tio.

Vnde tenuis  
membrana e-  
tiā *χραιοειδης*  
dicatur.

4 Hęc ex fi-  
guris pece-  
re debes: si-  
cutionis serie  
sefe conse-  
quentibus,  
ut 2, 3, 8, 9,  
11, 12, 13,  
b 2 fi. L. L.  
c 2 fi. C, C,  
C. et passim  
in superfi-  
cie 11 fig.  
d in 2 fi. C  
in 8 et 9.  
e Potissimum  
pars 10 fig.  
lib. 5 et tota  
11 fig.  
f 2 fig. lib. 5  
c, e, e.

g fi. cap. 44  
lib. 5, S. T.  
T. T. C. 2  
fi. huius li.  
D. D. G. G.  
e fi. X. X.  
h Expressum  
tur fig. 30  
lib. 5.  
i 6 fi. H, M.  
N.  
h 2 lib. 30  
lib. 5, h, h.



inuolucro obnasci, uasisq; suffulciendis & amplectendis idoneam esse scripsimus. adeo ut eius substantiæ gratia, plexus ille potius, quàm tenuis membrana secundinis fuerit ab illis comparatus, quos Galenus propemodum arguit, quum se mirari inquit, quam obrem nonnulli, omnes tenuis membranæ partes nolint *procedēs* uocari: sic sanè, ut si tenuis membranæ & plexus illius substantiæ discrimen accuratè expenderimus, ac dein fœtus inuolucrorum uera compositio nos non lateat, haud leuiter illorum autorū diligentiam exoscula bimur, quorum rationem Galenus sibi scribit fuisse incognitam.

Lib. 8 de r<sup>sa</sup> partium.

DE CEREBRI AC CEREBELLI NUMERO,  
situ, forma, inuolutionibus & substantia. Caput IIII.

*Hic s. quæ presentī Capite pertrallantur ostendendis, potissimum serui tertia figura, ac dein omnes serè ad decimam quartam usq; sed potissimum prima figura Capituli secundi, libri quarti, basim cerebri ac cerebelli cum dorsali medulla initio proponens.*

\* Tota et  
1 fi. ca. 2 li.  
4, præter  
neruos.  
43 fi. A, A.  
et B, B. 1 fi.  
cap. 2 li. 4  
A, A.  
b 8 fi. R, R.  
R. tota 11  
fi. et 1 fi. ca.  
2 li. 4 B.  
d 3 fi. A, A.  
e 3 fi. B, B.  
f Quicquid  
præter ossa  
ult. fi. deli-  
neatur lib.  
4.  
g 7 fig. M.  
N.  
h 3 fi. L, L.  
i 6 fi. A, A.  
A.  
h 5 fi. X, X.  
Y, Y.  
l 11 fig. C.  
D. c. d.  
m 3 fi. ab e-  
latori L  
nerf. K sur-  
sum.  
n 3 fi. ab in-  
feriori L ad  
N dorsum.  
o 11 specia-  
tur in 1 fig.  
ca. 2 li. 4 et  
hic in 7, 8  
et 11 figu-  
p 3 fi. L, L.  
4 fig. I, I, I.  
q 5 fi. S, T.  
v.  
r 3 fi. X, X.  
Y, Y.  
s 7, 8 fi. H.  
t 1 fi. cap. 2  
lib. 4 D.  
u 11 figura  
G, G. comit-  
untur I, K  
figura 10.



IS SECTI ON VM professores, uniuersum \* cerebrū in<sup>a</sup> anterius, quod cerebrū, & in<sup>b</sup> posterius, quod cerebel- lum uocant: deinde anterius in<sup>c</sup> dextrū & sinistrū diuide re solent. nō quòd uniuersum cerebrū omnino diuisum, & non aliqua saltem ex parte sibi continuū sitat quòd, ut unica manus in digitos, ita quoq; id in diuerlas partes dis- cretum uideatur. Quemadmodū enim priùs de tenui ce- rebri membrana retulimus, sic<sup>d</sup> etiam dextra cerebri pars, & sinistra, & cum his cerebellū, & dorsalis medulla, neruūq; ad unū omnes, in super<sup>e</sup> & nates te- stesq; cerebri, deinde<sup>h</sup> callosum corpus, & id quod instar testudinis effigiatū est: præterea dextri sinistriq; uentriculorum<sup>k</sup> septum, & uermiformes cere- belli processus, & si quid est eiusmodi, inuicē continuę partes existūt, eademq; substantia cōstituuntur, in duritia solū coloreq; aliquantulū uariante. Insuper omnia quæ modò recensebā, situ, usu, conformatione, magnitudine, & alijs quibusdam in partiū constructione expendēdis, ita mutuò differunt, ut nō ali- ter quàm si uariæ disunctæq; essent partes, plerisq; Veterum scripta euoluen- tibus turpiter imposuerint. Cerebrū igitur quantumuis tota sede, <sup>m</sup> quā cere- bello incumbit, & <sup>n</sup> quā frontē spectat, penitus in duas partes dissectū sit, & ead- em sectio per totā cerebri longitudinē in ipsius elatori regione admodum profundē ducatur, nō tamen ob id in medio ipsius iuxta<sup>o</sup> basim prorsus diui- sum cernitur. Quāta enim callosi corporis est<sup>p</sup> lōgitudō, tanta quoq; sedes se- cundum cerebri longitudinē cōsistit, quā dextra eius pars sinistra cōtinuatur. atq; ita uel huius corporis interuentu, & eius<sup>q</sup> quod instar testudinis extructū est, & septi dextri sinistriq; uentriculorū, supra cōmunem illorum uentricu- lorum<sup>r</sup> cavitatē, tertium uel uentriculū duæ cerebri partes inuicē sunt conti- nuæ. Præterea in basi eas quoq; esse continuas ostendit, cum magna & secun- dū longitudinē & profunditatē quā cōtinuantur regio, tum cerebri testes & nates, omniūq; maximè ex cerebri basis medio pronascens dorsalis medul- læ<sup>s</sup> initiū, quod amplum crassumq; est, & perinde ac illæ duæ cerebri partes hoc in loco continuū unumq; Deinceps, etiā si dextra sinistraq; cerebri partes quā cerebellū integunt, nihil minus quàm cerebello cōtinuæ sint, tamen infe- rior cerebelli sedes iam dicto dorsalis medullæ initio duob. locis<sup>t</sup> cōtinuatur, quos pinde ac omnes paulo antè enumeratas partes, seorsum enarrabo. Quæ enim nūc præcessere, hætenus cōplecti libuit, ne in cerebri numero quis illud modò dissecturus, me unā cū alijs plerisq; hallucinatū arbitretur. Ab proinde

Cerebrinum.  
rui.

Quibus sedib.  
dextra cerebri  
pars sinistra cō-  
tinuatur.

Cerebellū quī  
cerebro sit con-  
tinuum.

Cerebelli sinus  
& magnitudi-  
do.

nunc cerebri cerebelliq; sitū opportunè aggrediar, quem ipforum membra-  
næ, & interna caluariæ amplitudo cavitatis uē docent. Quicquid enim eius  
cavitatis duabus cerebri mēbranis & glande pituitā cerebri excipiente, & ra-  
mis quibusdam maximarū caluariam ingredientium arteriarum nō occupa-  
tur, id uniuersum cerebro ac cerebello adimpletur. Cerebellū decuplo aut  
undecuplo minus cerebro est, atq; unā cum dorsalis medullæ principio eam  
caluariæ cavitatis sedem sibi uendicat, quæ posteriori parte<sup>a</sup> tuberū in calua-  
riæ cavitatem, auditus organorum causa prominentium, & deinde duobus  
occipitij ossis<sup>b</sup> sinibus circumscribitur, qui ut dextro & sinistro duræ membra-  
næ<sup>c</sup> sinibus, os cedat, caluariæ cavitati insculpuntur. Hanc enim instar circuli  
ductam circumscriptionem, cerebellum nulla ipsius parte excedit: idq; homi-  
nibus in occipitium non adeo porrigitur, ut postrema cerebri pars in poste-  
riora non magis quā ipsum cerebellum uergat, nobisq; uocatū occipitium  
impleat. Quippe postrema & elatissima humani cerebelli pars uix eò usque a-  
scendit, ubi infima occipitij partis musculorum exortibus insertionibusque li-  
beræ<sup>d</sup> sedes consistit: adeo ut nullam excarnem occipitij ossis regionem digi-  
tally complecti liceat, quam cerebellū infarciat: etiam si Anatomici illius situm  
ita recenscant, ac si totam in occipitio prominulā regionem (ex cuius gibbo  
uulgos memoriæ ingenijq; uim metitur) cerebellū occuparet: imò elatissima  
ipsius portio ad mediam duntaxat<sup>e</sup> regionem eius interualli pertingit, quod  
à posteriori sede<sup>f</sup> foraminis dorsalem medullā transmittentis, ad superiorem  
usq; futuræ A literam referētis<sup>g</sup> sedem exporrigitur: quum interim permulti  
ad illam usq; sedem, cerebellum conscendere, suis bobus & asinis & ouibus  
delusi, tradiderint. quod illis scilicet animalibus cerebellum superiori regione  
rotundum acuminatūq; spectetur, non autē humani cerebelli instar planum  
quodammodo & depressum, minimumq; in sui medio prominens. Caluariæ  
igitur sedes cerebello dedicata, ipsius situm, circumscriptionem, formā ac ma-  
gnitudinem edocet. Cerebellum etenim, quemadmodū & sua sedes, latius est  
quā lōgius aut profundius: & humiliori ipsius regione, idq; potissimū iux-  
ta ipsius posteriora, latioris globi imaginē exprimit: in cuius medio acuta, neq;  
admodum lata habetur<sup>h</sup> impressio, quā illi inducit<sup>i</sup> tuber instar crassissimæ li-  
næ in occipitij osse prominens, eiusq; ossis robur insigniter adaugens. Porro  
in anteriori parte,<sup>k</sup> qua cerebellum ad cerebri nates exporrigitur, id quasi in a-  
cutum fertur, undique suæ sedis formam accuratè referens. Cæterum cere-  
bri formam ac magnitudinē, ostendit reliqua caluariæ cavitatis cerebello non  
oppleta. Vnde etiā cerebrum in sua<sup>l</sup> basi admodū est inæquale & uariū.<sup>m</sup> Vbi  
enim oculorū sedibus & olfactus organorū sinibus innititur, ad sinus illos an-  
trorsum<sup>n</sup> extuberat: utrinq; autē ad sinuum latera, propter ossiū in caluariæ ca-  
uitatem oculorū gratia extuberantiū prominentiā, plana quasi superficie<sup>o</sup> cō-  
primitur. Deinde opplet duos grandes<sup>p</sup> cavitates, quæ ad ossis cuneum refe-  
rentis<sup>q</sup> sinus latera spectātur, quo glans cerebri pituitam excipiens sustinetur.  
Vnde etiā cerebrum hic ossis quo cōtinetur formā, glebæ ritu, sibi uendicans,  
utrinque in ipsius basi<sup>r</sup> tuber instar medij globi prominens, constituit. In ho-  
rum tuberum medio cerebrum<sup>s</sup> impressum cernitur, cuneiformis ossis pro-  
cessuum occasione hīc circum sinus glandem eam continentis latera pro-  
ductorum. Quinetiam simili prorsus modo, basis cerebri reliqua ipsius sede,  
ossiū tuberibus auditus organa continentibus, & superiori cerebelli regio-  
ni figura correspondet, omnibus sinibus sese inferens, & amicè admodū tube-  
ra admittens. Atque ita quoque in lateribus, & anteriore & posteriore &  
superiore

Cerebelli for-  
ma.

Cerebri ma-  
gnitudo  
forma.

\* Hic pro  
ponit 6 &  
7 figure  
ca. 6 lib. 1.  
7 tota 16  
fig.  
Hoc offe  
dit 8, 9, 11  
figure.  
a 7, 8 figu.  
Z. Z.  
b 3 fig. ca. 13  
lib. h &  
i, i.  
c 9 fig. 8, 8  
& T. T.

d 9 mus. 14.  
E. F.

e 3 fig. ca. 12  
lib. 1 k.  
f eius. fig. c.  
g 1, 4 fig. ca.  
6 lib. 1 D.

h Suprame  
dū 12 8 fi.  
aut ad c 11  
fig.

i 9 fig. Q.  
li 7 fi. X.  
X. prope  
M. N. &  
ad C 11 fi.  
l Spectatur  
optimè fi.  
ca. 2 lib. 4.  
m 1 fi. ca. 2  
li. 4 A iux  
ta l positū,  
& cerebri  
pars in 11  
fig.  
n 13 fig. C.  
C.

o 11 fi. A, A,  
B. B.  
p ubi consti-  
tuit H. Q.  
S, S, R, T  
fig. 3 cap. 12.  
q Eiusdem  
M.

r Supra e-  
latius A &  
B fi. 15. &  
tuber inter  
A & A cō-  
sistens fig. 1  
ca. 1 lib. 4.  
s Circa re-  
gionem H  
& G eius.  
fig.

superiore sedibus caluariæ cavitatis effigiem concinnè exprimit, inibi instar oblongæ sphaeræ utrobique uersus anteriora propter temporū cavitatem depressæ, rotundū euadens, & in posteriore parte multo quàm in anteriori latius redditum, sicq; ut semel dicam formatū, ac si id & cerebellū nullam peculiarem exigerent formā: ac abundè ipsis esset, si propria illorū substantia magna mole, & simul quouis modo, ut in se sinus uentriculos uel cerebri cerebelliq; functionib. aptos habere posset, collecta, in capite reponeret. Eiusmodi enim quid caluariæ basis sinus tuberaq; ostendūt, & impressiones in tēporib. uel temporalium musculorū gratia (ne quicquā interim de tā uarijs capitū adferam formis) cōspiciuæ. Caluariæ igitur cavitates externæ cerebri superficiē imaginē commonstrat, ad quā sectio cerebrū diuidens, & innumeri quidā gyri ac circumactūs quoq; referūtur. Vniuersa enim cerebri sedes illa sectione diuisa, atque ut bifurcorū pedes in duos quasi ungues illius beneficio disiuncta, extimæ cerebri superficiē magna habetur pars, quāuis interim dictā cerebri formā parum inturbet, quā scilicet dextra cerebri pars sinistræ accubat: neq; recta illa linea diuisæ partes inuicē magis dehiscāt, quàm quanta duræ cerebri membranæ, & tenuis duplicatæ est crassities. In homine etenim (secus quàm in oue) sectionem hanc occupat duræ membranæ portio processus uel, duas cerebri partes septi ritu interstinguēs. dein utramq; cerebri partem tenuis membrana foris ambit, & implicat. Ceterū gyri ac inuolutiones cerebri, quas tenuium intestinorum anfractibus Veteres pulchrè cōpararunt, per uniuersam cerebri superficiem undiq; eadē frequentia habentur. Sunt uerò inuolutiones illæ, sinus permulti penitus in cerebri substantiā penetrantes, & profectò imagine intestinorum tenuiū inuolutionibus simillimi. Neq; opinor illas alicui aptius quàm his, aut etiā nubibus quas rudes pictorū discipuli, aut in scholis delineare solent, cōferri posse: quanquā in similitudine indaganda non admodum sit laborandum, quandoquidē homo hos in cerebri substantiā apparentes circumactūs cum asinis, bobus, & alijs quæ hactenus uidi animantibus cōmunēs obtineat. Nisi forsitan aliquis hinc differentiā assumere statuisset, quod tāto profundiores homini illos gyros Natura insinuauerit, quāto ipsius cerebri substantia copiosior uisitur. Porro in illorū usu recensendo nō medici modò, uerū & philosophi se excruciant, cōtendentes, num ipsorū beneficio hominēs intelligant: quemadmodum Galenus contra Erasistrati placitū pugnans, in hunc modum illos ad intelligendum nihil conducere censuit. Quum asini etiam admodum multipliciter cerebrum habent complexum, quos deceret, quantum ad morum ruditatem attinet, omnifariam simplex, & minimè uariarum nancisci cerebrum. Melius autem arbitraretur bonam substantiæ temperiem corporis intelligentis (quodcunq; hoc fuerit) prudentiā sequi, & non uarietatem compositionis. Verū Galenus hīc sibi dum maximè ipsius operam requirimus similis, orationem uelut freno cohibens, aliò, quum inuolutionum usum exprimere debuisset, illam reflectit: satis esse arbitraturs, si eas intelligentiæ non præesse indicauerit. quòd sanè non inficiamur, sed interim ipsas non ob aliud quàm ad cerebri substantiæ enutritionem procreatas esse, à Galeno additum oportuit. Cerebri nanque substantia citra omnem membranarum fibrarum plexum continua, neutiquam adeò firma fuerat, ut per illam arteriæ uenæque, ut in reliquis corporis partibus, digeri possent: & tam multa crassaque est, ut uenæ & arteriæ in superficie ipsius tantum excurrentes ipsi nutriendæ, illiusque insito calore refocillando neutiquam sufficerent. Quod præuidens Natura, sinuosos illos implexus pascim

Cerebrum ac cerebellum uix propria eguisse forma.

sectio dextræ nobis uocatam cerebri partem à sinistra diuidentis, & cerebri anfractum.

Cerebri anfractuum usus.

Lib. 2. de 1<sup>a</sup> parte.

14 muscul. tab. 1.

11 Spectatur integra in 3 fig.

11 fig. C, C.

11 fig. D, D.

11 fig. li. 1.



cerebri substantiæ impressit, ut in hos<sup>1</sup> tenuis membrana frequentibus uasis  
 oppleta sese insinuaret, ita cerebri substantiæ alimentū appositisimè submini

Cerebri substantiæ  
 ratio.

stratura. Atq; huius etiā nutrimentū potissimū occasione cerebrū in<sup>2</sup> duas  
 partes dissectū fuit, ut scilicet tenuis mēbrana sese in ipsius mediū implicaret:  
 acinibi in reflexus deducta, cerebri substantiā cōtenta in suis uasis materia  
 enutritet. Haud enim citra eiusmodi cerebri dissectionem, & profundissimas  
 inuolutiones, illa cerebri sedes, qua dextra sinistrā respicit, enutrirī potuisset.

Cerebelli imple  
 xum ratio et  
 species.

Huic etiā sententiæ suffragantur cerebelli<sup>3</sup> inuolutiones, quæ ne utiquā æquē  
 ac cerebri inuolutiones altè penetrant, sed paulo minùs quàm superficiali, at  
 frequentes interim admodū; continua serie deductæ uisuntur. superficialiæ  
 quidē, quod exigua pars alēda sit, quodq; facile cerebellū à profundiorib. anfra

ctibus ad<sup>4</sup> uentriculū usq; ipsius perforaretur. frequētes aut, ut copia aliquan-  
 tulum leuē illam penetrationē suppleat. Porro harū series quodammodo<sup>5</sup> tri-  
 plex est, effigie cum cerebri inuolutionib. ne utiquā conueniens. apparet nanq;  
 cerebellum ob suas inuolutiones & impressum illū, quem ab occipitis ossis tu-  
 bere in posteriori sede obtinet, tribus partib. efformari, dextra una, & alia sini-

stra, & tertia media. ac dextra quidē sinistraq; cerebelli partes duos quodāmo-  
 do globos inuicē appositos referunt, in quorum inani spacio, ubi scilicet globi

sese non contingunt, tertia cerebelli pars reponitur, quæ ligni casei<sup>6</sup> ue uer-  
 mem imagine exprimit, ob suas inuolutiones, quæ transuersim secundum ce-  
 rebelli longitudinē mutuò æquē distantes ducuntur. Partis huius apices uer-

sus inferiorem cerebelli sedem reflexi, uermiformes cerebri<sup>7</sup> processus suo lo-  
 co efformare docebimus. Dextra porro sinistraq; cerebelli pars in superiore  
 cerebelli sede parallelas quoq; & secundum cerebelli latitudinē ductas inuo-

lutiones obinēt, quæ deorsum<sup>8</sup> protensæ, quasi in centrū colliguntur, ad ce-  
 rebelli<sup>9</sup> sedem, dorsalis medullæ initio adnatā contententes. Tres igitur hæ ce-  
 rebelli partes nequaquā inuicē discretæ sunt, sed inuicem cōtinuæ unicū cor-

pus, ipsū scilicet cerebellū constituunt. quod unicum, nō autem cerebri mo-  
 dō geminum, Galenus à Natura extructum esse docet, quod duo dorfa, neque

toutdem dorfales medullas, hominem habere minimè decuisset: quasi ex cere-  
 bro (quod necessariò ueluti in duas partes diuisum, & substantia nō esse conti-

nuum asserit)<sup>10</sup> unica dorsalis medulla produci nequiuisset, ac proinde cerebel-  
 lum ut corpus unicū necessariò procreatū fuisset, quo unicæ dorsali medullæ

aptum redderetur principiū. Verūm meherculè cerebrum in suæ basis medio  
 unicum, & non ut in superiori parte diuisum, cernitur, & unicam dorsalem

producit medullam, in cuius superiori sede mox ab ipsius exortu, Natura<sup>11</sup> fi-  
 num insculpsit, qua mediam quarti cerebri uentriculi amplitudinē constitui

dicemus<sup>12</sup> reliquam enim eius uentriculi amplitudinē, cerebellum supplet,  
 quod utrinque duntaxat ad dorsalis medullæ sinus latera quasi duabus circu-

laribus applantationibus dorsali<sup>13</sup> adnascitur, continuum cum ipsa corpus ef-  
 fectum. media nanque<sup>14</sup> posterioris cerebelli sedis pars, ut neq; etiā<sup>15</sup> antero-

ris, dorsali medullæ cōtinua, cōnatā<sup>16</sup> ue est, sed tantū tenuis mēbranæ interuētū  
 posterior cerebelli pars dorsali medullæ cōmittitur, & anterioris sedis media

pars dorsale medullæ ne cōtingit quidē. Nō aliter, mihi crede, quàm si Natura  
 cerebellū cōdidisset, ut dorsali medullæ trāsmisū à cerebri sinib. spiritū magis

adaptaret, tuereq; A<sup>17</sup> cerebello etenim, quantū uis in differētia ipsius duritiæ  
 à cerebro assignāda, & ratione cur id à cerebro diuisum sit expēdenda sollicitus

fueris, nullius omnino uel minimi neruuli propaginē<sup>18</sup> oriri reperies. & profe-  
 tō nulla est cerebri, quā frontē spectat, & qua in occipitiū fert, in duritiæ diffe-

rentia:

In lib. 8. de visu  
 part.  
 Cerebri ac ce-  
 rebelli durities  
 neruorumq; or-  
 tin.

f. 2. fig. E.  
 E. E.

g. 1. fig. A, A,  
 C, B, B.

h. Specul.  
 tur in 11. fi.

i. 11. fig. E.  
 h. 8. fig. R,  
 R, R. 9. fi.

A, B, C. 10. fi.  
 11. fig. A, B

C, C, D, C,  
 d.

l. 9. fi. C. aut  
 11. fig. C, D,  
 c, d.

m. 11. fig. C,  
 D C, C, d.  
 d. in H. I.

n. Ad A, B  
 11. fig.  
 o. 11. fig. G,  
 G.

p. 11. fig. cap.  
 11. lib. 4.

q. 11. fig. c. d. a  
 lib. 4. D.

r. 10. fig. L,  
 M, N, O.

s. 11. fig. E.  
 t. G. G. fig. u  
 re. 11. cōmit

tumtur 10  
 K. 10. fig.  
 u. Patet id

in 9. fig. E.  
 x. Patet id  
 ad L. 8. fig.

y. Specul.  
 tur id in 11.  
 fi. c. d. 11. 4.

*Cerebri, cerebelli, & dorsalis medullæ color & substantia.*

*Cerebri substantia cum osium medullæ differentiæ.*

*Cerebri substantia nutritioni qualiter proficitur.*

*Lib. 8. de prima part.*

rentia: neque etiam adeò notatu dignum cerebelli, quum tenui membrana id liberatum cernitur, cum cerebro in duritia est discriminè. At ut cerebri basis, unde dorsalis medulla ortū ducit, cæteris omnibus cerebri partibus, & ipso quoque cerebello durior uisitur: ita quoque dorsalis suo principio sensim durior euadit, neque colore, neque duritia supernato ipsi cerebello correspondens. Cerebellum enim magis flauum, cinericum<sup>a</sup> uel est, perquam paucis albescentibus lineis interstinctum, & duntaxat in sui<sup>a</sup> sinus superficie candicans. uniuersum uerò dorsalis medullæ initium cerebello adhuc in capite subnatū albissimum est, ut & cerebri basis ipsi originem præbens: quæ omni prorsus inuolutione ac anfractu, quibus cerebellum scætet, destituitur. Porro quæ horum omnium sit substantia, uel in mensa etiam ex uitulorum, aut leporum, aut auis alicuius cerebris discere integrum erit: est autem substantia quædam cum sua essentia li forma peculiaris & propria, qualem in uniuerso corpore similem nullā reperias, ad ingenas cerebro functiones idonea: non minus sanè quàm cordis substantia, & pulmonis, & iecoris, & lienis, & renū, & testī, ipsorumque; adeò musculorum, suis quibus præfunt munij aptissima cēsentur. Cerebri substantia, quam alij capitis, alij albam medullam appellarunt, ab osium medulla differt, tum alijs plerisque accidentibus, tum quòd liquefieri nequeat: neque inedia tēpore, aut alijs occasionibus, ut reliqua corporis pinguedo, absumatur, minuat<sup>a</sup>ur uel. Hæc non uniuersa candicat, uerū quicquid<sup>b</sup> reuolutionibus proximum est, subflauum aut subcinericum est, æquali semper ab inuolutionis superficie distantia. quanta nanque inuolutionis profunditas est, tātō quoque intima inuolutionis parte interuallo, in cerebri substantia, is quē diximus color obseruatur: quasi rursus color ille in substantia, quòd ad colorē attinet, inuolutiones duplicaret. Quicquid autem cerebri non ita coloratum est, id albisimum & candidū prorsus uisitur. Verū ut permultæ cerebelli sunt inuolutiones, ita quoque uniuersum propemodum, uti paulo antè admonui, flauum occurrit. Quacunq; igitur ex parte cerebri cerebelliue substantiam tenui quaproximè continetur membrana detexeris, hanc subflauam ac uelut aqueo humore oblitam, & nunquam uenis implicitam adinuenies: etiamsi interdum rubra & ueluti sanguinea puncta in illorū cerebri substantia potissimū obseruaturus sis, qui phrenitide ante mortem laborarunt, & qui suspensio perierunt. Verū eiufmodi puncta nullam uenæ exprimūt imaginem. Cerebrum nanque ex nullo uase alimentū assumit, quàm ex his quæ tenui mēbrana suffulta ipsi circundantur. ut aut illi frequētia uasa undiq; obducerentur, cerebrum in tot quot diximus partes præcipuè diuisum fuit: quanquā etiam diuisiones illę, ut & anfractus, ad mollē cerebri substantiā ne concidat sustinendā, æqualiterque suffulciendā, nō mediocriter auxiliuntur. Parū enim Galeni rationi, cur cerebrum diuisum, aut, ut ipse loquitur, geminū sit, tribuo. inquit nanque cerebrum hac occasione geminū esse, ut quemadmodū uno oculo uitiato, aut uno teste execto, alterū seruamus: ita etiam dextro cerebri uentriculo læso, sinister adhuc suo munere fungeretur. Hęc siquidē Galeni ratio aliquem in copia uentriculorum recensenda locum fortassis haberet, non autē in enarranda cerebri diuisione, quum id nisi supra uentriculos geminum diuisum uel sit. callosum enim nobis uocandum corpus, quod cerebri partium continuitatem commonstrat, ad elatissimam dextri & sinistri uentriculorum sedem consistit. Cæterum nunc tempestiuum erit, callosi eius corporis, ac uentriculorum cerebri historiam aggredi: atque ita internam cerebri superficiem, quæque ipsius partes adhuc absolutius enarrandæ super sunt, persequi.

DE CAL-

<sup>a</sup> uelut

<sup>a</sup> illud pe-  
tes ex dis-  
ta cerebri  
substantia in  
4, 5, 6, 7, 8  
figuris.  
<sup>b</sup> s. fig. C.  
c. c.

AND. VESALII, DE CORPORIS  
DE CALLOSO CEREBRI CORPORE, ET  
dextri sinistriq; cerebri uentriculorum septo. Caput v.

*SUPERIOREM callosi corporis sedem nulla ex parte diuulsam, eleganter proponit tertia figura characteribus L, L. Insuper hanc sedem, sed à cerebri substantia in lateribus liberam, ostendit quarta ad h, h, l. Hu milio rem uerò callosi corporis sedem spectandam offert quinta, ad R, R, R. ubi etiam ad X, X, dein Y, Y se ptum spectatur hoc Capite pertractandum.*

Callosi corporis  
sedes et no-  
men.



A V L O antè, omnem cerebri cerebelliq; substantiã exte riùs tenui membrana circumdatam, ea parte qua mem branam respicit, subflauã & quasi cinericiam esse retuli. At quædam cerebri<sup>a</sup> pars in externa ipsius superficie sese offert, tenui membrana non obuoluta. uerùm intimæ ce rebri substantiæ modo, externa superficie candicãs, albaq; & reliqua cerebri substantia ad superficiem consistente durior. unde etiam uetustissimi Græcorum partem hanc *τὸν ὀφθῦ* appellarũt: quos imitatus in orationis serie, eam partem callosum corpus semper nuncu pau. Deinde Græcorum nonnullis id etiam à forma, quod<sup>b</sup> inferiori sede duo rum arcuum modò sinuatum sit, & ab usu quòd sustineat, *καλλοσδῶν* uocatur: quanquam in cerebro aliud<sup>c</sup> corpus recẽsebo, hoc nomine à pluribus magisq; ex merito donatum. Cæterũ callosum corpus in medio cerebri consistit, si cerebri dextrũ sinistrũq; & basis cerebri medium in humiliori ipsius sede, & elatissimam cerebri in uertice regionem spectes, & quodammodo etiam ad priora posterioraq; attendas. Callosi enim corporis postrema pars anteriori cerebri sedi paulo uicinior est, quàm antica posteriori. In cõspectum autem secantibus uenit, dextra cerebri parte à sinistra manibus<sup>d</sup> leuiter dirempta. quicquid enim ita diducto cerebro, partes ipsius unire cõmittereq; apparet, album & candicans uisitur, ipsumq; adeò callosum est corpus, longum quidem, sed arctum. Præsens corpus illa superficie, quẽ primũ diducto cerebro in conspectum uenit, gibbosum cernitur: eo quasi pacto, quo capitis uertex su pra elatissimam frontis & occipitij sedẽ, & capitis latera protuberat. Quem admodum uerò cerebrum ita ut dicebã diremptum, superiorem callosi cor poris superficiem egregiẽ læuẽ æqualemq; ostendit: sic quoq; indicat, cor pus id communem cum cerebro partem esse, & non ex cerebri substantiæ su perficie quæ mollior & subflaua est, sed ex intimiori substantia quæ durior & alba uisitur, enasci. Obseruantur enim utrinq; ad callosi corporis latera secun dũ ipsius longitudinem singuli<sup>e</sup> sinus in cerebri substantia, instar profundio ris linẽ insculpti, ac cum superiore callosi corporis superficie eo magis pate scentes, quo cerebrum uehementius, quasi id sursum in latera etiam acturus, seiunxeris. Interior autem inferior<sup>f</sup> ue ipsius superficies non nisi dextro fini stroq; cerebri uentriculo adaperto secantib. occurrit: quæ etsi per callosi cor poris longitudinem quodammodo sinuetur, neq; ut superior gibba sit, haud tamen simplex spectatur. nam secundum ipsius longitudinẽ<sup>g</sup> duæ instar quar tæ circuli partis excauatæ superficies ducuntur, & in illarum medio tubercu lum quoddam instar linẽ ex porrectum uisitur, perinde ac si altero quidem extremo duas quartas circuli partes in callosi corporis medio iunctas, reliquo autem extremo ad latera sursum protensas, intelligeres. Tuberculũ hoc deor sum prominens, sensimq; extenuatũ, tandem dextri sinistriq; uentriculorum cerebri<sup>h</sup> septum efficitur: & tota interna callosi corporis superficies, tanta dex tri sinistriq; uentriculorum est portio, quanta uniuersa est superficies. ac dex tra quidem superficiẽ portio dextrũ uentriculum, sinistra autem sinistrum respicit.

Callosi corpo ris initium, seu cũ reliqua ce rebri substan tia continuitas.

Sinus ad callo si corporis late ra obuij.

as fi. L, L.

b s figura  
R, R, R.

c s fi. s, T,  
V. e figura  
A, A, A.

d uisus est  
est in 3 fig.

e Ad 233 fi.  
f s fi. id cor pus sursum et in poste riora uolte xũ est. atq; ita hic cer nitur ad R, R, R.

g Viri quẽ unũ ad Y, Y s fi. quibz chara cteribus tu berculum insignitur. b in s fi. di uisum est, et in pars X, X insi gnitur, alte ra Y, Y.



*Dextri sinistri uentriculorum septi hystoria.*

*Callosi corporis ac septi ius.*

respicit. Porro dextri & sinistri uentriculorū septum eadem cum cerebro cōstat substantia, sed in medio quod ad superiora & inferiora attinet, adeo est tenuis, ut quum clara luce dissectionem administramus, aut in altero tantū latere candelam admouemus, splendor ipsius tanquā per uitrum aut specularem lapidem pelluceat. Commodius tamen hanc septi regionem madidæ hostiæ, qualem sacerdotes Missæ adhibere solent, quàm duris illis lapidibus comparaueris. In superiore parte qua septum toti corporis callosi continuatur longitudo, & inferiore qua superiori regioni eius cerebri corporis, quod fornici cingere uel simillimum esse dicemus, unitur, ipsum crassius quàm in media sede existit. humiliorem namq; septi partem corpus testudinis modò effigiatur ex superiori sua regione educit: quemadmodum superior septi pars ab inferiori callosi corporis regione enascitur, produciturq;. Callosum corpus unà cum septo nullis uenis, ut neq; etiam tenui membrana, uel aliqua etiam ex parte atextum est, sed è uicinis sedibus nutrimentum assumit. Non enim adeo grandis, crassaq; cerebri est portio, ut priuatis uasis indigeat, quamuis interim magnum animanti usum præstet. Huius siquidem interuētū, dextra cerebri pars sinistræ continuatur: deinde dextri & sinistri uentriculorum cerebri septum producit, idq; etiam subleuat, ac demum illius medio & auxilio corpus testudinis imagini potissimū cōparatum attollit, quo minus id magna omnium cerebri functionum noxa, communē duorum cerebri uentriculorum cavitatem compressurum delabatur. Cæterum duo<sup>s</sup> sinus in cerebri substantia instar profundioris lineæ ad superiorem corporis callosi superficiem incisi, præter hoc quod extima superficialiaq; cerebri pars calloso corpori producendo inepta sit, idq; ex penitiori adeoq; duriori substantia nasci debeat, ad pituitæ defluxum ex superioribus cerebri partibus facere creduntur, quam excipientes per gibbam callosi corporis superficiem in anteriora profluere sinunt. Verum de pituitam expurgantibus meatibus suo loco agendum erit: nunc autem uentriculi opportunè pertractabuntur.

## DE CEREBRI VENTRICVLIS.

## Caput VI.

*Dextro cerebri uentriculum ostendunt quarta & quinta figura L, L, & sexta D, D. Sinistrum autem quarta & quinta figura M, M, & priuatim quarta N, N. dein sexta E, E. Communem uerò horum concauitatem seu tertium uentriculū exhibet septima & octaua figura H, cuius meatus ad quartum tendens uentriculū K insignitur: ipseq; quartus uentriculus partim undecimæ figura E notatur, & partim nonæ I, & decimæ L, M, N, O.*



*ENTRICVLORVM* cerebri numero is ascribitur, qui cerebello dorsaliq; medullæ communis est, ac quartus etiam uentriculus dicitur. tres nanq; præter illum in cerebro, Herophilum imitati, enumeramus: unum quidem in dextra cerebri parte, alterum in sinistra, & tertium in cerebro, seu duorum primorum uentriculorum medio recentes. Dexter sinistro, prorsus situ, forma, magnitudine, alijsq; omnibus quæ in partium constructione examinari solita sunt, correspondet: quare etiam singula quæ de dextro scribentur, de sinistro quoq; nos dixisse arbitrari conduxerit. In dextra itaq; cerebri parte secundum ipsius longitudinem dexter consistit uentriculus, tantum anteriori sede à fronte, quantum maximè posteriori ab occipitio, remotus: tantumq; illis sedibus ab externa cerebri superficie seiunctus, quantum ipsius uentriculi dextrū, exterius uel  
yy  
latus

*Ventriculorū numerus.*

*Dextri & sinistri hystoria.*

is ff. L, L  
O ff. R, R  
F, R. suble  
uanti Y, Y,  
X, X. cins.  
ff. Y, X  
attollit S,  
T, V cins.  
figure, ne  
A, A, A. 6  
fig. premat  
H, I, 6 fig.  
aut H 7 et  
8 figura,  
h 3 fig. M,  
M.

44, 5 ff. L,  
L. 6 fig.  
D, D.  
b 4, 5 fig.  
M, M. 6 ff.  
E, E.  
45 ff. A, A.

latus à superficie cerebri distat, suo caluariæ lateri contermina. Internū uerò dextri uentriculi latus secundū<sup>a</sup> callosi corporis longitudinem sinistri uentriculi interno lateri proxinū est: neq; aliud interstitiū ambos separat, quā tenuis quædam, & uelut, quod ad subtilitatem attinet, membranea cerebri portiuncula, quam septū uocauimus. Verū ubi uentriculi in ea cerebri parte consistunt, quæ prorsus diuiditur, ut illa quæ cerebello incūbit, & quæ fronti proxima est, ibi ipsorū latera maximè dirimūtur inuicē: nā præter cerebri membranas hanc sectionē subintrantes, etiam plurima cerebri substantia uentriculos seiungit, hæc; ratione uentriculorum incessus<sup>a</sup> obliquitas quædam in lateribus sese offert. Cæterū<sup>a</sup> anterior uentriculi pars obtusa est & rotunda, non uerò, etsi omnes mihi secus scribere uideātur, in acutum uersus olfactus organa, aut uisorios neruos definens. Neq; etiam hac parte aliquē ductum meatum<sup>a</sup> uē à se porrigit, nisi quod interno latere, ut mox dicā diffusius, decliuis ad<sup>a</sup> tertium uentriculū pertingat. Posterior autē uentriculi regio occipitium respiciens, obtusa quidē est & rotūda, ac deorsum sensim in cerebri substantiam uersus priora paulatim cornu in modū arctata tantisper<sup>a</sup> descendit, donec illuc perueniat, ubi olfactus organorū & uisriorū neruorum consistit principium, & quā maximī soporalium arteriarum<sup>a</sup> rami in cerebrū feruntur. Cæterū hic<sup>a</sup> ductus suo mucrone in sui lateris olfactus organū & uisorium neruū neutiquā cessat. multoq; minus quadā continuitate illud olfactus organum perforat, uerū in unā cerebri inuolutionū ibidē ad cerebri basim terminatur, & in se maximā cerebrum petentiū<sup>a</sup> arteriā cum tenuis cerebri membranæ processu illā suffulciente admittit, pituitæq; portionē in ipso collectam ad<sup>a</sup> infundibulū & cyathum defert, quē hac in sede pituitam excipere transfundereq; audies. Hæc quū dico, innumera Galeni dogmata mihi reclamare haud ambigo, quæ olfactus organa cerebri anteriores esse uentriculos uarie docent, & eosdē uentriculos tenues sensim factos in uisorios neruos suo mucrone finire: & quod longē alienissimū est, anteriores hos cerebri uentriculos uersus<sup>a</sup> os cribri aut spongiæ modo in nariū summo perforatū, pituitā per caua olfactus organa, tanquā per canalē, deducere attestatur: eiusmodiq; non pauca, quæ potius ex refectione, quā prolixa quapiā disceptatione disci cōsuerim. Vniuersa uentriculi superficies lubrica & aqueo humore oblita, & inter dissecandū subinde eodē oppleta cōspicitur. Deinde uniuersi<sup>a</sup> ductus uentriculi secundū cerebri longitudinē incedētis superior<sup>a</sup> pars, omnis inæqualitatis est expers. Inferiorē uerò eius<sup>a</sup> partē efficit inæqualē<sup>a</sup> sinus quidā, ex posterioris uentriculi sedis externo latere antrosum obliquē ad cōmunem uentriculorum cauitatem prorepens, & ad leuiorē pituitæ defluxū paratus. Dein ad inæqualitatem facit ea uentriculi<sup>a</sup> pars, quæ deorsum ē posteriore uentriculi sede prorepit. Ille nanq; uentriculi reflexus unā cum sinu illo in causa est, ut<sup>a</sup> monticulus quodāmodo in anteriori posterioriq; inferioris sedis uentriculi regionibus extuberet: qui à dextro latere decliuis ad sinistrū latus, uersusq; cōmunem uentriculorum cauitatē fertur. Inferiores enim uentriculi dextri & sinistri partes, quæ tota callosi corporis lōgitudine continuē<sup>a</sup> uisuntur, uersus utriusque medium cōmunemq; illam cauitatē deorsum inclinant, & non ut superiores uentriculorū partes & latera, orbiculatæ, & ab inuicē septo aliquo dirēpta spectantur. Neq; profectō aliud est cōmunis uentriculorū cauitas, quā inferiorū dextri & sinistri uentriculorū partiū sub<sup>a</sup> corpore testudinis imagini cōparato descensus cōcursusq; qui inferiori parte oblongā uallem duorū uicinarum montiū exprimit, acutum<sup>a</sup> uē per suam longitudinē angulum efformat.

Superiori

*Per multa Galeni parū uera dogmata hic non describi.*

*Communis uentriculorū dextri & sinistri cōcauitatē, seu tertij uentriculi huius.*

d s. fi. L. L.  
4 fig. 1. 1.  
e s. fi. 2. 2.  
e. Y. Y.

f Obliqui-  
tatem hanc  
ostendit 4  
fig. 4. b. L. ad  
M. et ab M.  
ad N. et ab  
N. ad N.  
g 4. fi. inf-  
rius L. et  
N.  
h 13 fig. L.  
L.

i 13 fig. N.  
O.  
k s. fig. sub  
S. T. V. et  
6 fig. ubi  
cōstitit H.

Let 7 fi. H.  
l superius  
L. et N. 4. fi.  
m Cōstr  
P. G. 6. 7.  
s figurarū.

n 13 fig. P.  
o Specia fi  
guram 3. ca  
pitū inferi  
lib. 4.

p 13 fig. ca. 2  
li. 4. char. 1  
aut 3.

q 13 fig. Q.  
e. 7. 8. E.

r 14 fig. C.  
C. 15 fi. E.  
s 8 fig. ca. 6

lib. 1. A. B.  
A.

t 4 fi. ab L.  
ad L. et ab  
N. ad N.

u 4 fi. N. N.  
x s. fi. L. L.

y 6 fig. R.  
aut S. et in  
ter L. L.

fig. 4. 5.  
z fi. ca. 3. li.  
4. inferi

B. C. D.  
a s. fi. L. L.

b Q. 4. fi. ab  
H. ad P. fi.  
6.

c 6 fig. sub  
H. 1. 7. 8. fi  
gura H.

d s. fi. S. T.  
V. 6 fig. A.

A. A.

c7, 8 fig. L

f 7, 8 fi. K.  
o octauae  
etiam L. 10  
fig. B, C.  
g 7 fig. M.  
N. 8 fi. N.  
O, P, Q 10  
E, G, F, H.  
h 7 fi. L. 10  
fig. D.i 10 figur.  
C. respon-  
denti autem  
haec orifi-  
cia superio-  
ri triangulo  
fig. cap.  
14 li. 3 in-  
ferie.h 7 fi. K. cō  
stituit in 814 fi. ca. 2 li.  
4. ch. 2 et  
fig. 14 D.  
m 9 fi. L. 10  
L, M, N, O  
cum 11 fi.  
E cōstituit  
quartū uen-  
triculum.n 1 fi. ca. 2  
lib. 4 D.  
o 7, 8 fi. K.  
10 fi. B.  
p 10 fi. L.  
M, N, O.  
q 9 fig. H.

r 10 fig. C.

110 fi. I, K.

r 11 fig. E.  
111 fig. G.  
G.  
x 8 fig me-  
dium R. 9  
fig. C.  
y 11 fig. C.  
D. c. d.

Superiori uerò sede ad testudinem imitantis corporis effigiē cauitas illa secun-  
dum concavum orbiculata, teres' ue uisitur. Cuiusmodi uerò corpus illud sit,  
sequenti Capite explicabitur: nunc interim uentriculorū sermone tantū insti-  
tuto, quorū iam duos dextrum uidelicet & sinistrū recensuimus, & propemo-  
dum etiam tertiu, qui communis amborū est cauitas, binos à se educens mea-  
tus, quorū<sup>e</sup> unus ex humiliori ipsius sede, ubi acutū angulū per totam sui lon-  
gitudinem uallis cuiusdā ritu exprimit, rectā deorsum uersus cyathū cerebri  
pituitam excipientē porrigitur. Alter autē meatus qui posterior est, tertij uen-  
triculi nō minima pars censendus uenit, & inter cerebri<sup>8</sup> testes & nates, ac su-  
per dorsalis medullę initium decliuis, ad quartū uentriculum retrorsum per-  
tinet. Meatus huius initium non adamsim orbiculare uisitur, sed quodam-  
modo triangulare. seruat enim in inferiori sede acutū suę cauitatis, unde pro-  
dit, angulum: in superiore uerò meatus parte, quæ<sup>a</sup> glandi uasorum tertiu ce-  
rebri uentriculum petentium diuisioni præfectæ, proxima cōspicitur, trans-  
uersa linea anguli illius latera connectit, ipsaq; cum illis alios duos angulos cō-  
stituit. Atque huiusmodi etiam meatus huius<sup>9</sup> orificium est, quo is quartum  
uentriculum sub cerebri natibus respicit. Ex inferiori meatus istius angulo,  
quā primū inter cerebri testes ferri incipit, meatus alius rarō educitur, qui  
per cerebri substantiam deorsum in priora protensus, ad<sup>k</sup> finē eius meatus tan-  
dem cessat, quē ex humiliori tertij uentriculi sede rectā deorsum duci, atq; in  
cyathum terminare diximus, in quē ambos istos meatus, cerebri pituitā defer-  
re audies. Ceterū<sup>m</sup> quartus uētricus, ex dorsalis medullæ & cerebelli fini-  
bus cōponitur, nō secus quā si utraq; manu unā fingeres cauitatē. Dorsalis i-  
taq; medulla ex cerebro<sup>o</sup> prodit, ubi tertius uentriculus<sup>o</sup> meatū uersus quartū  
uentriculum primū porrigit, testesq; cerebri & nates dorsalis medullę prin-  
cipio cōtinuantur, ac meatū illum tertij uentriculi cum dorsalis medullæ ini-  
tio æqualiter sic deducunt, ut meatus superior sedes illis, inferior autem dor-  
sali medullæ incisa sit. Postquam uerò meatus ille nates superauit, eius portio  
quæ dorsali incisa uidetur, dilatari incipit, ac<sup>p</sup> sinum efformat usque ad eum  
ferē dorsalis medullæ<sup>q</sup> locum, quā caluariam hæc egressura est, pertinentem.  
Sinum hunc Herophilus cauitati rectissimē assimilauit calami quo scribi-  
mus. nam si huic sinui eam calami partem, quam atramēto intingimus, com-  
paraueris, animaduertes profectō calami orificium, ubi adhuc calamus teres  
est, & sectioni uicinus, tertij uentriculi meatus<sup>i</sup> fini respondere, sub natibus  
prominenti: deinde cuspidem quo literas fingimus, similem obseruabis infi-  
mæ sinus parti, quā is in dorsalem medullā iam ex caluaria excisuram, ueluti  
porum angustumq; meatum producit. duos autē calami angulos, quos inter  
mucronem & elatissimæ sectionis initium fingimus, ipsiusq; calami cauitatis  
latera, sinus lateribus similima offendes. Ad huius dorsalis medullę sinus caui-  
tatis<sup>i</sup> ue latera, ubi anguli illi cōsistunt, unus<sup>i</sup> utrobiq; dorsalis medullæ orbicu-  
laris processus habetur, cui dūtaxat cerebellū adnascitur, & ad quem id conti-  
nuum cum dorsali medulla corpus efficitur. Huiusmodi igitur dorsalis me-  
dullæ cauitas est, alterā quarti uentriculi partē constituens. Quæ autem in ce-  
rebello spectatur<sup>i</sup> cauitas, inter<sup>i</sup> duas orbiculares cerebelli sedes, quibus dorsi-  
li medullę continuatur, & inter eius cerebelli<sup>x</sup> partis quam ueluti tertiā ipsius  
portionem recensuimus, & uermis imagini cōparauimus<sup>r</sup> extrema, exculpit-  
tur, latior quā lōgior, non tamen admodū profunda. Hęc alterā quarti uen-  
triculi partē constituit, qui in anteriori & posteriori sede, quantū ad cerebri  
cerebelliq; substantiæ continuitatē spectat, dehiscit, quū scilicet neq; anterior,

Quarti uentri-  
culi historia.



neq; posterior cerebelli pars dorsali medullæ adnascatur. quâuis interim uētricus iste tenui cerebri mēbrana, & anteriori & posteriori parte quodāmodo occludatur. In<sup>2</sup> anteriori enim parte tenuis mēbrana, qua cerebellū cerebro & cerebri natibus cōmittit, uentriculum obuoluit, <sup>3</sup> posteriorē uerō illius sedem obstruit, tenuis membranæ portio cerebellum dorsali medullæ ibidem colligans. Quartus uentriculus nihil in se præter aqueū humorem, qui in alijs uentriculis cōmunis est, inter dissecandū continere animaduertitur, quemadmodum neq; meatus ex tertio cerebri uentriculo in quartū pertinens. At dexter & sinister uētriculi, præter huiusmodi humorē, etiam<sup>4</sup> plexum quendā in se continent, quem dissectionum perit<sup>5</sup> secundinis fœtus ue inuolucris comparant. Tertius autē uentriculus<sup>6</sup> uenosum illud uas deducit, quod multifariam complicatū plexus illius cōstituendi gratia à quarto duræ mēbranæ sinu propagari, in tertio libro docuimus. Deinde anterior quoq; horū uentriculorum pars ab illo uasē<sup>7</sup> uenulas impēse graciles interdū assumit, illis quā similitas quibus<sup>8</sup> adhærentē oculi tunicam exornari cōspicimus. atq; huiusmodi uenulæ uentriculorū superficiēi adnascūtur facilius, quòd durior & quasi callosior cerebri substantia in uentriculorū superficie, quā alibi, occurrat. Cæterū Galenum, cæterosq; omnes qui post illum in Anatome nobis quicquā prodiderunt, miror scribere, trium primorū cerebri uentriculorū superficiē tenui membrana, uti ipsum cerebrum, cingi obducīq; quartum autē non ita: quum nulla prorsus alicuius uētriculi meatus<sup>9</sup> ue superficies tenui membrana obuoluitur. Quis enim, obsecro, diligenter humanæ fabricæ partes examinans, neque alicuius scriptis solū addictus, non uel hinc conspiciet, Galenum pleræque, & præcipuē in libris de Usu partium, imaginatū fuisse? Arbitrabatur namque tam mollem cerebri esse substantiam, ut incisi ipsi uentriculi in se colligi debuissent, si tenui membrana intus non succingerentur. dein duriorē cerebello tribuēs substantiam, sibi persuadebat, eius uentriculū citra membranā, quæ ipsi fulcri loco esset, beneficiū, posse contineri. Ego sanē arbitror Galenū, quū illos libros scriberet, apud Herophilū, aut Andream, aut Marinū, aut alium quēpiā legisse, in tres cerebri uētricos tenuis membranę processus partesue porrigi, nō item uerō in quartum uentriculū. qua oratione illi uētricos membrana quāpiā ueluti peritoneo, aut tunica costis subducta succingi non indicabant: uerū tenuis mēbranę<sup>10</sup> partes intelligebāt, uasa in uētricos deducentes, à quibus secundarū modo efformati plexus fabricantur, cuiusmodi pars in quartū uentriculum nulla exporrigitur. Quinetiam præter id quod uentriculi mēbranis neutiquā succinguntur, illæ obstaculo essent, quo minus cerebri substantia interstitio quodam præpedita, materiā suis uentriculis obla tam, in animales spiritus emutaret. Cæterū præsens Caput, ut uniuersum uentriculorum usum iam recenserē, expeteret quidē: at quicquid propemodum adducere scriptisq; mādare ausus essem, in huius libri initio, ubi cerebri usus obiter enarrādus erat, recēsi. Nihil enim in præsentia uētriculis aliud tribuere statui, quā illos cavitates sinusq; esse, in quib. attractus per inspirationem aer, uitalisq; spiritus à corde ipsis trāsmisus, priuatę cerebri materiei formęq; ui in animalem spiritū emutatur. qui postmodū per nervos ad sensum motusq; organa distribuitur, ut illa huius spiritus beneficio, & apta suis munij cōstructione, peculiari fungātur officio, quo muscoli mouēt, oculus uidet, olfactus organa olfaciūt, auditus organa sonos percipiūt, & lingua sapes dignoscit, & demū omnis ferē pars cui neruus exporrigitur, tactiles qualitates dijudicat.

Quid singulis  
in se uentricu-  
lis.

Tres primos ce-  
rebri uentricu-  
los tenui mem-  
brana non suc-  
cingi.

Uentriculorū  
usus.

27 ff. X.  
X iuxta M  
N.  
a 9 ff. qua-  
si ad l. cō  
mittres.

b 4, 5 ff. O.  
O. 6 figu-  
ra M, N.  
c ff. 30 li.  
f.  
d 6 ff. H, I.  
e 7 ff. V  
educuntur à  
T.  
f 4. ff. P.  
6 ff. O, O.  
f 8 ff. cap.  
14 h, h.

g 6 ff. M.  
N. h, l.

dijudicat. Hunc itaq; in gignendo animali spiritu usum ventriculis ascribere neutiquam uereor: at de principis animæ facultatum in cerebro sedibus nihil enarrandum duco. Quandoquidē omnes quibuscū uiuimus, præcipuas principis animæ uires simijs, canibus, equis, eiusq; generis animatibus, ut & auibus & piscibus omnino adimunt: & ut cæteras taceā, soli homini ratiocinandi facultatem, eamq; omnibus, quantū ab ipsis capere possum, parē tribuūt: quamuis interim homines nullo sinu permulta animalia superare inter dissecandū conspicimus: neq; solū numerus idem est, at cætera omnia (si modò molē & temperamenti fortē ad iustitiā integritatē excipias) inter se sunt similima. Liceat itaq; uel illorum hominū gratia me ab alio uentriculorū usu inquirendo abstinere: neq; uel hic Galeni placiti meminisse, quod in tertio de Hippocratis & Platonis dogmatibus libro, medium uentriculū: in libris autē de Partiū usu postremum, principalissimū esse docet. Ac proinde Deo rerum omniū opifici hymnos canentes, gratias agamus, quod nobis rationalem animā, quam cum angelis (ut Plato etiam malē tractatorum philosophorū haud immemor innuebat) cōmunem habemus, largitus fuerit: cuius beneficio, si modò fides adfit, æterna illa felicitate fruemur, quādo animæ sedem ac substantiā non corporum refectione, aut nostra corporeo adhuc uinculo obruta, & ex bona corporis sanitate constitutioneq; pendente ratione inquirere necesseum erit. nam is qui uera est sapientia, nos nō hoc generabili & putrescibili corpore amplius, sed spiritali suoq; quā similitimo constantes, edocebit.

## DE CEREBRI CORPORE, TESTVDINIS

fornicis'ue imagini comparato. Caput VII.

*Superiorem huius corporis sedem ostendit quinta figura S, T, U. quanquam & eius sedis modicam partem etiam proponat quarta figura L, M, & sexta figura B, C. ubi etiam inferior sedes spectatur ad A, A, A.*



ORNICIS seu testudinis modō extructū corpus, in illarum cerebri partiū numero reponitur, uel quarū etiam interuentū dextrā cerebri partē sinistraē esse continuā nequimus inficiari. Est itaq; id unicū, & in cerebri medio repositum, ac pariter utrisq; cerebri partibus commune. Ex posteriori enim dextri & sinistri uentriculorū sede, quæ hæc deorsum in priora reflectitur, statim in ipso reflexu corpus hoc<sup>1</sup> enascitur, similē prorsus substantiā cum cerebri uentriculorum substantia sortitum, nisi quod paulo quā uentriculorū substantia candidior, &<sup>2</sup> callosi corporis modo durior existit, nullibi etiam tenui mēbrana cerebri obducta. Huius corporis<sup>3</sup> pars, quam dexter uentriculus educit, ei cōtinua est, cuius principium ex sinistro pendet: ac simul ambæ partes latum quoddā corpus efficiunt, quod statim ab ortu à reliqua uentriculorum cerebri substantia abscedit, sensimq; in acutum<sup>4</sup> desinens, antrorsum perfertur, ad eum usq; cerebri locum pertingens, quo anterior tertij uentriculi pars<sup>5</sup> cessat. Ibidē nanq; acuto quodam angulo corpus hoc substantiæ cerebri rursus unitur, totoq; suo ductu triangularē figuram inæqualibus lateribus constantē refert. cuius<sup>6</sup> primum latus, quod & breuissimū est, à posteriori sede dextri uentriculi ad posteriorem sinistri protenditur.<sup>7</sup> Alterū in dextro cōsistit uentriculo, à posteriori ipsius sede uersus interiora usq; ad priorē tertij uentriculi partē protensum. Tertium in sinistro positū uentriculo, secundo lateri longitudine correspondet. Atq; ita corpus istud inferiore ipsius sede unica donatur<sup>8</sup> superficie, triangulari testudini fornicie quā similitima. unde etiam corpus hoc ab imagine,

*Testudinis in modum formati corporis similitudo.*

*Nexum.*

*Inferior sedes.*

44 fig. L.  
M. superio  
ra. 5 fig. S.  
T. 6 fig. B.  
C.  
b 7 fi. L. I.  
s fig. R. R.  
c si. S. con  
tinuum est  
cum T. et 6  
figu. B, A.  
cum A, C.  
d 4 fig. S. T.  
ad V. 6  
fig. B, C. ad  
superiū A.  
e iuxta P 6  
figura.  
f 8 fig. ab S  
ad T. aut 6  
fi. à B ad C.  
g 5 fi. ab S  
ad V. aut 6  
fi. à B ad su  
perium A.  
h 5 fi. à T ad  
V. aut 6 fi.  
à C ad su  
perium A.  
i 6 figura  
A, A, A.

quemadmodum & ab usu Græcis *ἡμικρανίς* & *ἡμικρανίος* nuncupatur. Cæterum<sup>h</sup> superior huius corporis sedes, gibba, ac pro inferioris sedis seu superficiei cauitatis ratione conuexa uisitur, non tamen ut illa simplex & cōtinua. Superior nāq; secundum corporis huius longitudinē in sui medio latioris instar lineę<sup>l</sup> extuberat, cōtinuāq; cum dextri & sinistri uentriculorū septo efficitur, adeo ut in utroq; superioris sedis latere una haberi uideatur superficies, quę in ipso corporis ex posteriori uentriculorū sede exortu impense orbicularis, ac oblonga sphaeræ superficiei tam similis cōspicitur, ut nōnullis hī<sup>h</sup> exortus eō usq; imposuerint, ut illos cerebri nates à Veteribus appellatos esse existimaerint. Tres itaq; corporis testudinis modo cōformati superficies, quę leues omnino sunt, & aqueo humore perfuse, cerebri undiq; spectāt uentriculos. tota enim inferior ipsius superficies tertij uētriculi superiorem sedē conficit, & sub ipsa dextri ac sinistri uentriculorū fit cōmunio. dextra autē superioris se dissuperficies dextrū respicit uentriculū, sinistra uerō sinistrū. Natura igitur corpus istud eum in modū creauit, ut instar testudinis, superiorū corporū impetum, quo minus illa corruant, sustinentis, tertium cerebri uentriculū amplum seruet, seseq; ipsum haud concidere sinat. ad quem usum, præter aptam constructionem, tres eius anguli quibus se tripodis modo sustinet, auxiliantur. quinetiam septum uentriculorum, callosi corporis beneficio sursum tractum, hoc corpus quoq; subleuat, & attollit. Quod insuper<sup>n</sup> uas quoddā uariē implexū, & à quarto duræ membranæ sinu pronatū, ac tandem in dextrū & sinistrum cerebri uentriculos bipartitum, sub se deduci sinit, & quo minus id à cerebri illi incumbenti substantia prematur, continuè prohibet.

## DE CEREERI GLANDE NVCIS PINEAE

imaginem exprimente. Caput VIII.

OSTENDITVR hæc septima figura L, & octaua M, & decima D.



Glandis pineae  
nuci similis  
structura, cō  
structio.

VXTA posteriorē testudinis modō formati<sup>a</sup> corporis sedem, quā<sup>b</sup> uas uenofum ex<sup>c</sup> quarto duræ membranæ sinu in tertij cerebri uentriculū, primū porrigi incipit, glandulam Natura cōdidit nuci pineæ aut turbinatæ ad eas figurę<sup>d</sup> similē, ac proinde *ἡμικρανίς* & *ἡμικρανίος* à Græcis appellata. Reponitur autē sub uasis illius initio, mucrone suo sursum spectās: basi uerō incūbit cerebri substantiæ, paulo posterius quā<sup>e</sup> meatus uisitur initiū, qui ex tertio cerebri uentriculo in quartum procedit. Neq; profectō aliter huius glandis sitū exprimere possim, nisi etiam eminētissimæ & anteriori<sup>f</sup> testij cerebri parti illā inniti adijcerē. Huic enim parti in homine, glans potius innititur, quā substantiæ quadā communitate unitur: perinde ac si glans cōtinua quēpiā cerebri substantiæ portiuncula haud esset censenda. In hominib; nāq; cerebro uix heret: frequētissimeq; nisi quis mentē operi accōmodet, in resectione unā cū uenoso cui substernit uasellū cōsueuit. In agno aut, aut prouectioris ætatis oue, nō tantum cerebro heret, uerū etiā cerebri substantiæ quodāmodo cōtinua cernitur. Insuper homo iam natu grandior, eam glandē minorem, quā uel agnus, fortitur. unde tum hanc ipsā, tum quæ sequēti Capite describentur organa uisurus, cōmodissimē agnū quoc; cerebrū aggredieris. habebit enim id omnia proceriora, & ut opportunē alicui rei eadē alsimiles, accuratius cōficta. Galenus glandem hanc (quę cerebri substantia durior, magisq; ad glādis quā ad cerebri naturā accedit) meatui à tertio cerebri uētriculo in quartū porrecto præesse, & (quod aliquib; dissectionis uisum erat professorib;.) glandē hāc meatū illum occludere, aperi-

Præsentis glandis  
usus.



re, aperireq; prorsus negat: nō eundē huic glandi cum<sup>e</sup> glādosō corpore usum tribuens, quod sub dextro uentriculi orificio, duodeno intestino connascitur, quodq; cōstructioni eius uētriculi orificij præesse arbitratu est. Verū ut id illius muneris gratia haud fabricatū esse, suo loco ostēdimus: sic etiā hīc cū Galeno testamur, præsentē cerebri glandē eum quē diximus meatū nequaquam obturare, uel ob hoc præcipuē, quod haudquaquā meatū adeo cōtingat, ut antē ipsius orificiū cōiuere possēt. Verū ob id factū opinor, ut quē admodum aliā corporis glādulæ permultæ, firmamentū esset<sup>h</sup> uasi quod terciū cerebri uentriculum accedit, & ab ortu statim in frequētes ramos tenui mēbrana cōtextos diuiditur, à præsentiq; glādula suffulcitur: ne dicti meatus principiō statim suo in cerebri cavitatē ingressu, proximē incumbens, eum obstrueret, animalemq; spiritum ex tertio cerebri uentriculo in quartum ferri prohiberet.

DE TESTIBVS ET NATIBVS CEREBRI. Caput IX.

CEREBRI testes & nates hæc primū in septima proponuntur figura ad N, N. dein in octaua ad N, O & P, Q. postremo in decima ad E, G & F, H.



AN C quoq; cerebri portionē sedem<sup>e</sup> ue illarū partium clasi annumeramus, quæ<sup>a</sup> dextrā cerebri partē<sup>v</sup> sinistræ continuam esse arguūt. Sunt autē testes hi natesq; aliud nihil prorsus, quā quādā cerebri portio in hoc fabricata, ut<sup>e</sup> meatus ex tertio cerebri uentriculo quartū accedens, tutō citra aliqūē à superiorib. cerebri partibus cōpressum deferretur: neq; etiam, etsi multitudinis nomine pars hæc

Testiū & natiū cerebri nomen.

donetur, ob id in plures diuinitasq; partes diuisa est. nam unica cernitur, eleganter à quadam similitudine, uti mox dicā, hæc nomina sibi uendicans. Reponitur enim inter anteriorem cerebelli sedem, & posteriorem tertij uentriculi regionem: deinde inferiori sede spectat dorsalis medullæ<sup>e</sup> initium, superiori eam cerebri partem quæ cerebello iam inniti incipit. Continuat<sup>u</sup> autem cerebro, aut (ut rectius dicam) à cerebro enascitur tota anteriore sua sede & inferiore. in lateribus uerò, & superiore & posteriore ipsius sedibus, nulli particulæ cerebri continua est, sed tantum tenui membrana ut reliqua cerebri superficies obducitur. Substantia ipsius subflaua est, illiq; substantiæ cerebri correspondet, quæ proximē tenui membrana accedit. In superiori parte

simi

substantia

iuxta anteriora, ipsi<sup>g</sup> glādula incumbit, quā paulo antē<sup>h</sup> uasis mirū in modum implexi deductui præfectā ostendimus. Pars hæc, effigiem quandā exprimit, duabus sibi commissis natibus quā similitam. Verū quoniam<sup>i</sup> superior<sup>i</sup> ipsius regio testes magis, propter glandem illam quæ peni assimilatur, refert, ueteres qui pueros iure hæreditario domi in confectionibus exercebant, *Ναύ* *μυς* eam appellauere. Nos itaq; illos imitati, testes ipsam & gemellos nuncupamus. Cæterū quia in<sup>o</sup> posteriori inferioriq; huius partis regione<sup>e</sup> orificium prominet<sup>m</sup> meatus, qui ex tertio uentriculo quartū petit, quodq; id orificium speciem ani referre uideatur, & in posteriori huius cerebri partis regione<sup>e</sup> impressio quædam instar lineæ transuersim feratur, superiora quodammodo ab inferioribus distinguens, huic posteriori inferioriq; regioni *γαστήριον* nomen ueteres indidisse arbitror: nos autem natulas, aut clunes dicere poterimus. Cæterū temporis successu uidentur Græci hæc nomina confudisse, & partem hanc, quæ (uti diximus) meatū ex tertio uentriculo in quartum deducit, continetq; modō *Ναύμυς*, modō *γαστήριον* appellauisse.

forma

forma

AND. VESALII, DE CORPORIS  
DE CEREBELLI PROCESSIBVS VER-  
mis imaginem exprimentibus, ac demum tendinibus illos con-  
tinentibus. Caput x.

PROCESSVM horum fabrica potissimum petitur ex undecimæ figura C, D, & c, d. ac dein ex  
H. I. Octaua uerò figura huc quoque confert, ad medium R uersus L, & nona figura C, E.

Cuiusmodi sint  
uermiformes  
processus.



Uermiformis  
processus qui  
à Galeno in s.  
lib. de vsu par.  
traditur.

VPERIV<sup>a</sup> S, quum cerebelli forma explicaretur, cuius-  
modi uermiformes cerebelli sint processus, innuimus. Di-  
cebamus namq<sup>ue</sup> unam quodammodo cerebelli partem  
à prioribus in posteriora, ueluti in orbem duci, eamq<sup>ue</sup> ta-  
libus implexâ inuolutionibus, ut uermis in ligno nascen-  
tis effigiem appositissimè commoñstret. Duo itaque hu-  
ius partis apices, processus<sup>ue</sup>, quorum<sup>b</sup> hic anteriorem

a s. ft. medi  
um R. 9 fi-  
gure C.

b et fig. C.

D & H.

c et fig. c, d

c et l.

d s. fig. K.

e et fig. C.

uentriculi cerebello & dorsali medullæ communis sedem respicit, ille uerò  
posteriorem, à dicta nuper similitudine Græcis σκαλιννοειδής nuncupabantur.

At non satis scio, cur Galenus uermiformem processum inferiori<sup>d</sup> meatus ex  
tertio uentriculo in quantum pertinentis<sup>e</sup> orificio præfectum esse tradiderit,  
ac uelut alterius tantum processus apicis<sup>f</sup> ue munus explicuerit. Quamuis e-  
tiam mihi haud constet, utrum ipsorum, anteriorem uidelicet an postero-  
rem, indicauerit. Nam si priorem intelligit, is suo mucrone, si quando educe-  
retur, ad meatus orificium nequaquam sese posset producere: quum tunc re-  
trorsum magis dirigeretur, communem cerebelli & dorsalis medullæ uen-  
triculum potius quàm illud meatus tertij uentriculi orificium occupaturus.

f et fig. L.

M, N, O et

E et fig. K.

Posterior aut processus seu apex, qui antrorsum ex posterioribus protenditur,  
præterquàm quòd suo mucrone in cerebelli sinus substantiam magis quàm  
prior cõfundi uideatur, neq<sup>ue</sup> ut ille promineat, neququam ad posteriori tertij  
uentriculi meatus orificiũ usq<sup>ue</sup> produci posset. Sed quorsum hæc cõmemoro?  
quum neminẽ ambigere existimem, meatũ illum nunquam debere occludi,  
quandoquidem nullũ obstructionis usum (quicquid nobis cõfinxerimus) in-  
dagare ualeamus: quũ interim, ut animalis spiritus cõtinuò in dorsale medul-  
lam cõfluat, illum meatum perpetuò patẽre cõducat. Neq<sup>ue</sup> quenquã, nisi for-  
tè ab Alberto, Thoma, Scoto, illiusq<sup>ue</sup> classis theologis edoctũ, esse opinor, qui  
alterum uermium (nã utriusq<sup>ue</sup> par usus in unius orificij clausione esse nequit)  
meatui huic præfectũ esse sibi persuaderet, ut phãta smata in memoriẽ sedem  
(quam illi in cerebello esse confingunt) ingredi sineret: & rursus fures, ut sic  
dicam, in memoriẽ carcere colligatos, in medium uentriculũ (quem rationis  
sedem esse aiũt) transmitteret. Siquidẽ frustra tunc rerũ opifex Deus eiismo  
di uermiformes processus cani, ouibus, & id genus animantibus, quib. illi nul-  
lam ratiocinandi uim ascribũt, elargiretur. Sed unde, obsecro, huic (quisquis  
tandem ille est) processui iste ex uoluntate sua pendẽs motus obtingeret? Dein  
si aliquis fortè motus, peculiaris alicuius essentialis formæ, aut tẽperiei ratio-  
ne illi assignandus esset, nõ tamen uermis modo processus is educi contrahiq<sup>ue</sup>  
posset, quum inuolutiones, quarum gratia processus isti uermibus comparan-  
tur, non orbiculatim ipsos ut uermium gyri ambiunt: quumq<sup>ue</sup> quo sese pro-  
cessus illi rependo firmarent, nihil aliud occurrat, quàm qua secundũ i-  
psorum etiam ductum, cerebelli substantiæ continui sunt. Vt cunq<sup>ue</sup> sit, mi-  
hi in præsentia sat est, locum constructionemq<sup>ue</sup> horum processuum in-  
dicauisse: illis interim nullum motum aut officium aliud tribuenti, quàm  
reliquæ cerebelli substantiæ. imò si quid confingere liberet, non unius tan-  
tum processus, quem Galenus aliquando duntaxat cognouisse uidetur, sed  
duorum,

duorum, quos rursus solo multitudinis nomine nonnunquā indicauit, usum nugacissimè ementirer, afferens anteriore quum elongatur, atq; in posterio-  
 ra magis ducitur, sese extenuare, principiumq; quarti uentriculi, cuius supe-  
 riorem sedem constituit, amplius apertiusq; reddere. Posterio-rem uerò pro-  
 cessum similiter in anteriora aliquando produci, & attenuari, ob idq; uiam  
 aperire confingerè, quæ ex quarti uentriculi in dorsalis medullæ regionem,  
 quæ modò ex caluaria procidit, instar meatus cuiusdam terminatur. Atque  
 ut processus quoties extenuarentur, apertioni præesse dicerem: ita rursus eos-  
 dem collectos, ob idq; in crassatos, meatus illos, quibus præsumt, angustiores  
 reddere affirmarem. At mihi non libet paruam aliquam, eamq; falsam Crea-  
 toris industriam recensere, & interim reliquum cerebri artificium propemo-  
 dum uniuersum destruere. Vnde etiam multo maximè Galenum miror, qui  
 tenuis membranæ partes cerebellum cerebri testibus<sup>h</sup> colligantes, uincula &  
 ueluti tendines appellauerit, qui utrinq; latera uermiformis processus com-  
 plecterentur, ne fortè dum is mouetur, in obliquū declinet. Nihil enim aliud  
 sunt illi Galeni tendines, quàm nunc dictæ tenuis membranæ portiones. Mi-  
 rum quoq; est, eam tenuis membranæ<sup>i</sup> sedem, quæ dorsali medullæ postero-  
 rem cerebelli partem, quæ uermiforme cerebelli corpus intrò ac ad anteriora  
 uersus quartum uentriculum reflectitur, colligat, in tendinum numero Gale-  
 num non reposuisse: quum illa membranæ portio posteriorem eius corporis  
 processum exactius, quàm priorem suæ sedis membranæ pars, dirigeret.

*Tendines qui-  
 bus uermiformes  
 processus  
 continentur.*

*h Inter M,  
 N, & X,  
 X 7 fig.*

*i Qæe ef-  
 fit ab E ad  
 H 9 fig.*

#### DE INFUNDIBULO, ET GLANDULA IN CAL- uariæ cavitatē ad cerebri pituitæ expurgationem paratis, & reliquis dein ductibus pituitæ excretioni famulantibus. Caput XI.

*Hic c primū spectant tertia figura M, M, sinus notantia ad callosi corporis latera superiori in sede po-  
 sitos. dein septima & octaua figura I, meatum indicans, qui ex tertio cerebri uentriculo pituitam rectā deor-  
 sum ducit. Præterea K octaua figura, ad cuius internum latus meatus occurrit ex meatu è tertio uentriculo  
 ad quartum producto initium sumens, & obliquè ad eius meatus finem per cerebri substantiam ductus, qui  
 recta ex tertio uentriculo descendit, ac I insignitur, inibi cessat, ubi in prima figura Capitis secundi libri quar-  
 ti character 2 spectatur. in qua etiam characteres, 2, 3, terminos notant reflexuum quos dexter & sinister  
 uentriculi à posterioribus ipsorum sedibus moluntur, quib; huc pituitam quoq; mandant ad cyathum seu in-  
 fundibulum, quod exprimitur S decimæ tertie figura, & C, C decimæ quartæ, & E decimæ quintæ, &  
 B decimæ sextæ ac decimæ octauæ. Glans uerò in quam hæc dein defluit, notatur A decimæ sextæ, & E  
 decimæ septimæ, & A etiam decimæ octauæ: ubi C, D, E, F obiter & quodammodo ductus notant, pitui-  
 tam à glande deferentes. Foraminum autem & sinuum per ossa pituitam deducentium notæ, ex secunda &  
 tertia figuris Cap. 12. lib. primi ueniunt petendæ.*

*a Spectan-  
 tur figuris  
 ca. 6. lib. 1.*



A L V A R I A E<sup>a</sup> futuras ad fuliginosorum cerebri excre-  
 mentorum transitū summopere opitulanti, primus liber,  
 ubi illarū usus recensebatur, ostēdit. Præfens aut loci exi-  
 git, ut partes singulas pituitosæ (qua cerebrum propter ip-  
 sius molem, & substantiæ suæ à sanguine discriminē, abun-  
 dat) excretioni famulantes explicemus. Sunt uerò hæc po-  
 tissimum, duo in cerebri substantia insculpti meatus, dein  
 tenuis membranæ portio infundibuli instar efformata, postmodum glandula  
 infundibuli huius mucronem excipiens, & meatus ac foramina à glandula  
 hac ad palatum nariumque cavitatem pituitam deducunt. Duos equidem  
 cerebri meatus, quum tertium cerebri uentriculum prosequeretur, antea recen-  
 sui. ac<sup>b</sup> unum quidem insigni satis amplitudine ex media ipsius sede rectā de-  
 orsum in cerebri substantia exculptum descendere dixi, ita sanè, ut præsentis  
 meatus

*Breuis enime  
 ratio partium  
 ad pituitæ de-  
 fluxum præci-  
 pue famulen-  
 tium.  
 Meatus ex ter-  
 tio cerebri uen-  
 triculo ducti*

*b 7, 8 fig. I.*



*Meatus ex ter-  
tio cerebri ven-  
triculo educti.*

meatus finis eregiōe eius caluariæ<sup>c</sup> partis cōsistat, quæ sinu<sup>d</sup> glandulæ qua ce-  
rebri pituita excipitur reponendæ aptū, constituit. Alter meatus, quæ rarissi-  
mè obseruauit, quæq; Galenus etiā in nono de Administrandis sectionibus libro  
præterisse uidetur, iam dicto lōgè arctior secantib. occurrit, ac ex<sup>e</sup> meatu illo  
progreditur, qui à tertio uentriculo in quartū per cerebri testes natesq; pertin-  
git. quamprimum enim meatus is cerebri testes subire incipit, ex anteriori in-  
feriorū ipsius sede, alter is pituitæ expurgandæ subseruiēs meatus educitur,  
sensim deorsum in anteriora tantisper in cerebri substātia protensus, dum in  
finem primi meatus terminetur, idemq; ex ambobus meatibus<sup>f</sup> orificiū con-  
surgat. Ad huius orificij latera, tenuis membrana etiam hic cerebri basim suc-  
cingens, orbiculatim à se educit sui<sup>h</sup> portionē processum<sup>ue</sup>, substātia prorsus  
cum reliqua tenui membrana similē: nisi quod gracilibus prorsus uenis, quan-  
quam interim frequentibus, intertextitur. Præsentis processus initium accu-  
ratè refert elatissimam regiōe infundibuli, quo uinū in angustioris orificij la-  
genas infunditur. est enim amplū, & orbiculare: ac dein ab exortu sensim in ar-  
ctum, infundibuli quoq; modo cogitur, donec tandē ueluti in angustā oblon-  
gamq; fistulā similiter atq; infundibula finiat, quæ deorsum protensa, per pe-  
culiare sibi in dura cerebri membrana excisum<sup>i</sup> foramen descendit, suo mu-  
rone ad glandē qua cerebri pituita excipitur, definens. Adeo ut uniuersum  
hoc membranē corpus infundibulo, & imagine & usu quā similitimū cen-  
seri debeat, unde etiam Græcis *χρυσιν* nuncupatur. quanquam etiam à scyphi,  
seu in qua in balneis lauamur cōchæ forma (quā superior huius corporis pars  
concinne exprimit) *πύλος* appelletur. Nihilominus alibi à nominū impolito-  
ribus, humilior corporis huius pars infundibuli fistulæ non absimilis, *χρυσιν* di-  
cta uidetur. reliqua aut pars superior, quæ sensim uersus inferiora in arcū desi-  
nit, magna<sup>q</sup>; ex parte uisorijs nervis, quā illi inuicē coeūt, subteditur, *πύλος*.  
Rursus integrū hoc membranē corpus, *πύλος* nonnullis uocatum uideo: glan-  
dem autem in quam pituita distillat, *χρυσιν*: quasi forma quæpiā esset, in quam  
aliquid infunditur. Verū si ueteres, qui suos pueros Anatomen docebant, id  
nomen glandi illi nō attribuerint, eam inter omnes in caluariæ cavitare repo-  
sitas partes solā priuato nomine indigā reliquisse uidebūt. Locatur aut hæc  
glandula sub dura cerebri mēbrana, in proprio ipsi in osse cuneum imitante  
exsculpto<sup>i</sup> sinu, cuius etiā effigiem quodāmodo exprimit. depressa nanq; est,  
& in humiliori parte gibbosa, in superiori autem concaua, & sinu quodam in-  
sinuata. deinde secundū orbem non prorsus circularis cōspicitur, uerū paulo  
minūs tota quadrata. Substātia constat glandulosa, sed cæterarū glandium  
corporis substantia longè duriore ac compactiore. Omni ex parte tenui mem-  
brana obducitur, quæ aut ab infundibuli termino glandulæ sinui innato exo-  
ritur, aut etiā à membrana caluariæ os tota illa sede succingēte, qua in hac re-  
giōe dura cerebri mēbrana à caluariæ ossib. abscedit, distatq;. Huius caluariæ  
inibi obductæ mēbranæ interuentu, glandula ossi firmatur, & etiā duabus inf-  
gnioribus soporalū arteriarum propaginib. adheret, quæ ad ipsius latera<sup>o</sup> pro-  
repunt. Nō secus profectō, quā si & illarū propaginum gratia, hæc glandula  
effingeretur, ipsiq; eum præberet usum, quo reliquæ glandulæ uasorum di-  
stributionibus diductibusq; firmādis & suffulciendis præfunt. Ad huius glan-  
dis latera deorsum utrinque<sup>o</sup> canales duo in osse cauati descendunt, ac unus  
quidem uersus anteriora prorepat in<sup>o</sup> foramen definens, quod<sup>o</sup> secundum  
cerebri neruorum par deducit, quodque contra Galeni placitum<sup>o</sup> fora-  
mine uisorium neruum transmittente multo maius esse inuimus. Altero  
uerò in

*Peluis ac cya-  
thi, in quam  
cerebri pituita  
desinit.*

*Glandis pitui-  
tam excipien-  
ti historia.*

*Canales à glan-  
dis de ducti.*

c 3 fi. ca. 12  
li. 1. M. aut  
hic ad D  
14 fig.  
d 16, 18 fi-  
gura A.  
e iuxta K  
8 figure.  
f 7, 8 fi. K  
10 fi. B. C.  
incedis per  
E, G, F, H.  
g 14 fi. D  
e 1 fi. ca.  
2 li. 4. cha.  
2.  
h 14 fi. C.  
c 15 fi. E.  
16, 18 fi. B.

i 15 fig. E.

h 13 figure  
S eff. sub M.  
N, O.

l 3 fi. ca. 12  
li. 1. M.

m 14 petes  
ex 16 figu.  
n 18 fig. C.  
D e E, F.  
e 3 fi. cap.  
12 li. 1. O.  
P.  
o 13 fig. ca.  
12 li. 1. G.  
p 14 fi. G.  
q 3 fig. ca.  
12 li. 1. E.

uerò in posteriora magis descendit, & per inæquale asperūq; foramen seu rimā ducitur, quæ ad anteriore sedē lateraq; foraminis quod soporalis arteriæ inferiorum ramum in caluariæ cavitatē transmittit, habetur. Atq; hæc omnia pituitæ cerebri euacuandæ ministrant. quippe duo meatus, quos in cerebri substantia incisos diximus, ex cerebri uentriculis humorem illum deferūt, ad infundibulumq; defluere sinunt. Ipsum autem infundibulum superius amplum latumq; extruitur, non horum duntaxat meatuū, qui in unum tandem orificium delinunt, occasione, uerū etiam ut fines illos dextri sinistriq; uentriculorum cerebri contineret, quos ex posteriori uentriculorum sede deorsum in anteriora reflexos, inter cerebri reuolutiones hic definire commemorauimus: quandoquidē & hi suæ sedis pituitā deducunt, & in infundibulū exporrigunt. Præterea infundibulū ea cōstat amplitudine, ut si quid pituitæ super callosum corpus & sinus illos colligeretur, quos ad callosi corporis latera superiori sua in sede, conspici retulimus, id ipsum in infundibulū tenuis membranæ beneficio procuberet. Siue enim eiusmodi humor ab anteriori callosi ac instar arcus protuberātis corporis sede, siue à posteriori descendat, ad tenuē membranā, cerebri basim inuestientē defluere, & hinc paulatim in infundibili amplitudinē prolabi potest. Infundibulū uerò ab omnib. his ductibus pituitam excipiens, in angustum cogitur, ut tandem hanc per unicum & priuatim sibi in dura membrana patens foramē ducat, innoxieq; in illius glandulæ centrum promanare sinat. Glandula aut quadam substantiæ familiaritate defluxus impetum sustinens, & quantū conijcere possum, os forsitan ab iniuria uindicans, pituitā hanc admittit, sensimq; citra stillicidiū à laterib. suis eam undique; defluere sinit, per omnia foramina hic in caluariæ basi tum uenis tum arterijs tum neruis ipsis exculpta. Nō enim hic cum Galeno in nono de Vsu partium libro, in quo de cerebri excrementorū purgatione potissimū & seriò agit, fateri queo capitis basim cauernosam, & pumicis in modū extructam, nulla; cōtinua squama obductā esse: hacq; ratione à frontis uerticis, occipitijs & temporum cōpositione multū differre, ut per illam, ueluti per spongiā pituita longiori mora, & nescio quo tandē raro & peculiari Naturæ artificio, trāscollaretur: neq; per patētia alioquin hic necessariò foramina, nō amplius coasseruanda, rectā deflueret, uti in primo libro, quū osis cuneū referētis fabricā persequer: diffuse propter quosdā scripsi, qui me cauernosam illā & multis foraminib. spōgiæ in modū obstitam osis struē, etiā nolle cōtueri fingunt: & propter alios quosdā, qui uoce cribri aut coli in cunei uocē unico in loco transposita, aut immutata, Galenū non secus atq; ego sentio, de pituitæ per ossa ductu, totaq; adeò ossium cōpositione iudicasse colligunt. Decūbit itaq; pituita & in palatū per ea quæ palatū spectant foramina, & nō minima profectò portione per foramen secundi paris neruorū ad oculorum sedis radicē, hincq; per amplum foramē cum alijs quā plurimis foraminibus, ceteris ignotū Anatomicis in narium amplitudinē fertur. Verū nō ambigo, aliquē & hic admiraturū, quamobrem nullus hætenus meatus pituitā ad olfactus organorū sinus deducens, cum Galeno in octauo potissimū & nono de Vsu partiū, enarrauerim; quod sanē nō ob aliud accidit, quàm quòd nullā prorsus pituitā per hos sinus octauum uē capitis os expurgari autumē: mirerq; plurimū, Galenū per tenues illos ac neruis non ab similes cerebri processus, quos olfactus organo tribuimus, ab anterioribus cerebri uentriculis pituitam qualitercunque tandem excedentem ad nares deduci, scripsisse: quum nullus omnino in ipsis meatus sit, neq; etiam in hominibus ea constent crassitie, ut uel meatum quo pituita deducere.

Eorum partiū  
quæ pituita ex  
purganda sub-  
seruire halle-  
mus diximus,  
ulius, & con-  
structionis ra-  
tio.

Pituitam per  
cuneiforme os  
longa mora &  
exiguus forami-  
nibus non colat-  
ur.

Pituitam nulla  
secundum natu-  
ram excre-  
tionem per ol-  
factus organorū  
sedem octauū  
ue capitis os ex-  
purgari.

r 2, 3 fi. c. d.  
12 lib. 1. 2. 3.  
5 ultime fi.  
lib. 3.

1. fi. c. d. 2.  
lib. 4. char.  
2, 3.

n 3 fi. L. 1.  
x 3 fig. M. 1.  
M.

9 Q ueri-  
tur sub ch. d.  
rallere φ  
in 12 c. d. li.  
1.

2 13 fig. L. 1.  
L.  
4 13 fig. D. 1.  
G c. d. D.  
G.

6 6 fig. D. 1.  
D. c. d. E. 1.

deduceretur, continere possent. Adde nullum prorsus pituitæ ductum ad olfactus organorum sinus imaginari posse, nisi fortassis<sup>c</sup> anteriore callosi corporis regione, quæ pituitam sibi influentem in illam sinuum olfactus organorum amplitudinem dimittere queat: uti fortassis accidit, si quando cerebrum nimia omnino pituita uexatur. unde etiam prorsus non naturalis per nares pituitæ fluxus tunc perficitur, & pruritus, calor, dolor & odorandi uirtutis noxa, eiusq; generis symptomata oboriuntur quàm plurima: quemadmodum indies in destillationibus quæ ad narium summa pertinet, ac grauedines nuncupamus, accidere experimur. adeo sanè, ut si adamus sim singula perpenderimus, necessarium per olfactus organorum sinus foraminula<sup>d</sup> ue aut cribri aut spongiæ modò forata, quum lege naturæ homo dispensatur, nihil pituitæ defluere fatendum erit: & si fortè casu defluit, longè magis præter naturam fluxum illum esse donabimus, quàm quum foramina quæ ad glandis cerebri pituitam excipientis sculpuntur latera, totam pituitam non plenè deducunt, hæc q; deorsum uersus<sup>d</sup> foramen dorsali medullæ transmittendæ paratum decumbit: ac cum dorsali prolapsus, in dorsum, & dein secundum neruorum ductum modò in brachia, modò in crura, modò in lumborum musculis, modò aliò quouis promanat. ut nunc taceam, quàm grauius Natura ueniret incusanda, quæ tam patientes amplosq; expurgandæ pituitæ in cerebro & eiusdem membranis, dum scilicet adhuc tenuis aqueaq; est, ductus fecisset. adeo autè retortos angustosq; & inflexos in<sup>e</sup> octauo capitis osse, aut etiam in cuneiformi osse produxisset.

<sup>c</sup> inferius  
L. 3. fig.

<sup>d</sup> Quo deducitur  
H. 3. figura.

<sup>e</sup> si. ca. 6  
lib. 1. A, B, A.

## DE QVIBVSDAM VASORVM PLEXIBVS

cerebro ascriptis. Caput XII.

*H. r. c. facit tota fere decimiquartum Capitis libri tertij figura, & huius libri figura quarta & quinta ad O. sexta ad H, I, K, L, M, N: & dein uniuersa propemodum decima sexta, & decima septima.*

Nullum retien-  
torem plexum  
sub cerebro, nisi  
Galenus illum  
describit, exi-  
stere.



**Q**VANTVM Galeni dissectionis professorum facile principi à medicis illum secutis nonnunquam præter rationem attributum sit, uel beatus ille & mirabilis plexus reticularis attestatur, quæ is nullibi non in suis libris inculcat, quoq; nihil frequentius medici in ore habent: hunc, etiã illum nunquam uiderint, ex Galeni sententia enarrantes. Nihil enim minus à soporalibus arterijs, quàm eiusmodi reticularis plexus, quæ Galenus recenset, perficitur. multoq; minus arteriæ, foramen caluariæ, quod ipse tradit, ingrediuntur, aut totæ etiam in plexum aliquem absumuntur. Primum enim tota soporalis arteria dextra (est autè par utriusque ratio) caluariam petens, per unum foramen diuisa, uti Galenus commemorat, non ingreditur, uerum ubi ad caluariæ usq; basin cõscendit, insignem sui propaginem ad<sup>b</sup> foramen neru<sup>o</sup> sexti neruorum cerebri paris exculptum, transmittit, quæ unà cum grandi<sup>a</sup> uena sibi coniuge in dextrum, primum<sup>a</sup> ue duræ cerebri membranæ sinum exhauritur. Secundò, soporalis arteria nequaquam commune<sup>c</sup> foramen cum<sup>d</sup> tertio neruorum pari obtinet: uerum longè maiori industria, quàm Galenus arbitratur, rerum Opifex usus est. præcipuonq; soporalis arteriæ ramo obliquè & in osse diu procedens<sup>e</sup> foramen machinatus est: in cuius ductu id forsità fieri uoluit, ob quod Galenus plexum efformatum contendit. ut enim uitalis spiritus in multis gyris anfractibusq; arteriæ excoqueretur, aptaq; animali spiritui efficiendo materia redderetur, Galenus arteriam ilico atque in caluariæ cauitatem ingressa est, in innumeros ramos diffundi dicebat, qui inuicem ita imponuntur commiscuntur<sup>f</sup> ue, ut plexum efformare

Hic præstat-  
bis 16 et 17  
et ipsi pro  
xima figu-  
rat.

a. si. cap. 13  
li. 3. Z. et si.  
ca. 14. lib. 3  
B, quod di-  
uiditur in  
F, G.

b. 2, 3. si. ca.  
12. lib. 1. c.

c. 12. si. ca.  
2. lib. 4. c.

d. si. cap. 14  
lib. 3. C.

e. 2, 3. si. ca.  
12. li. 1. Q.  
f. 12. si. ca.  
2. lib. 4. M.

g. 2, 3. si. ca.  
12. li. 1. X.

h. 17. si. ca.  
17. fig.



efformare uideantur illi similem, qualem in collecto piscatorio reti fieri cernimus: aut illi plexui, qui ex pluribus inuicem incumbentibus retibus confurgeret. Atque hunc implexum inter os & duram cerebri membranam fieri asserit: interim tamen duræ membranæ portiuncula, quæ os succingeret, plexui substrata. Deinde ut plexus ille ex uno uase, aut si Galenus dextrum sinistro coniunctum fingit, ex duobus complicari incipit: ita quoque plexus huius furculos post multam sibi quæ succedentem in ramulos seriem, sensim colligi, ac tandem in duo rursus uasa definere attestatur, cerebri uentriculos petentia, & mole illis uasis respondentia, quæ initio plexum efformare dicebantur. Quàm uerò hæc ab omni prorsus ueritate sint aliena, quantamque Naturæ oscitantiam arguant, is demum percipit, qui ueram eius arteriæ soporalis rami seriem didicit, quem per oblongum illud ovis foramen in caluariam penetrare diximus: & ut pleraque taceam, expendit pariter, quàm impossibile sit uasa æquè grandia cerebrum petere, atque in caluariam primum pertingunt: quum tam insignes rami duræ membranæ latera, & per foramina secundi paris neruorum cerebri ad oculos, ac ad narium amplitudinem ab illis uasis, priusquam tenuem accedant cerebri membranam, dispersgantur. Cæterum quæ horum uasorum, soporalium uel arteriarum uera sit series, in tertio libro, dum cerebri uasa non minus quàm reliquis totius corporis uenas & arterias persequeretur, adeò uerè & adamussim describere conatus fui, ut hic locus ne utiquam eius seriei enarrationem expetat. Ac proinde etiam plexus illius explicationi hic non est immorandum, quem aliorum animalium cerebra cum hominis cerebro prorsus communem, ac ueluti eundem, in prioribus cerebri uentriculis ostendunt, ab illis efformatum arterijs, quæ infimas dextri & sinistri uentriculorum sedes subeunt, quæ illæ deorsum uersus priora, atque adeò ad cerebri basis ferè medium pertingunt. dein ab illo uase, quod à quarto duræ membranæ sinu in tertium cerebri uentriculum exporrigitur, admodum profectò uariè, uti & uniuersus plexus, implicatum, membranæ quæ proponens speciem, innumeris uasis mutuo nunc coeuntibus, & nunc rursus diremptis, intertextam, & carnea quadam substantia ita obstitam, ut Veteres raram hanc membranæ, uasorum & carnis compositionem, scætuum inuolucris comparantes, hunc plexum ob id meritò *χορδωδης*, quemadmodum & antea monuimus, appellauerint. Num uerò ipsi eundem plexum, retibus simul complicatis, inuolutis quæ, ac, uti magna piscatorum retia iam sæpius quercus corticum decocto lota, apparere solent, rubentibus, etiam assimilauerint, & *μυλωδης πλέγμα* nuncupauerint, ex plexus colligendum est imagine, quæ dicto modo rubet, complicati quæ retis effigiem proponit: quum plexus nulla ex parte motus, in cerebri uentriculis inter secandum occurrit. Si quando uerò tunc expāditur, & ueluti explicatur, nihil æquè diducto reti conferre poteris, ac dictam uasorum plexus seriem. quanquam interim nullam mihi de nominibus uelim esse contentionem, qui modò plexuum quoque obiter memini, ne quid fortè in cerebri constructione hoc libro præterijisse uiderer. Atque quo minus id etiam fiat, singula sensuum organa seriatim nunc aggrediar.

*Plexus in prioribus cerebri uentriculis occurrens.*

i fig. cap.  
14 lib. 3, 7,  
x, f.

k fig. cap.  
14 lib. 3, d.  
e hic 4, 5  
fig. O. 6 fi.  
M, N.  
l fig. cap. 14  
lib. 3, 7, hic  
aut 14 fig.  
Q, 7, 8 fig.  
F, G.  
m fig. cap.  
3 lib. 4 in  
seria C  
ad D.  
n 1 fig. cap.  
3 lib. 4 cha  
racl. 1, 3.  
o fig. cap.  
14 lib. 3 i.  
hic aut 6  
fig. H, I. c.  
7 fig. V.  
p 7 fig. T.  
q Per h  
rum ratio  
nem ex ta  
bulis figu  
ra 30 lib. 5.




**T**ERTIVM libri quarti Caput describens, ac necessariò propter nervorum seriẽ, olfactus organi constructionem prosequens, arbitrabar me in præsentia prolixius ueriusq; de olfactus instrumento præcepturum, quàm illo Capite nudam ipsius constructionẽ enarrans, faciendum duxeram. Verũ quum aliud nihil certius mihi, studiose admodum odoratus organi naturam inquirenti, hæc tẽnus occurrerit, præsens Caput cum illo commune esse uelim. Præter\* duos enim illos nervis non absimiles cerebri processũs, qui in<sup>b</sup> octavi capitis ofsis sinus pertingunt, & frontis ofsis<sup>c</sup> sinus, & substantiam illis contentam, & duræ cerebri membranæ ac ofsium<sup>d</sup> foramina, hĩc penitus nihil recensere possem. Nolo namque hoc loco de odoribus, & huius sensus medio, & dein temperie, aliquid pertractare: ne meus iste conatus, qui præter opinionem iam excrevit, impensius, atque aded in immensum crescat,

a 12 fig. C,  
D. 13 fig.  
L, L.  
b 8 fi. cap.  
6 lib. 1 A,  
B, A.  
c 3, 4 fig.  
cap. 12 lib.  
1 K.  
d 13 fi. D,  
D C G, G.

DE OCVLO, VISVS INSTRVMENTO.

Caput XIII.

PRIMA DECIMIQUARTI  
CAPITIS FIGURA.



HAEC figura, earum quae praesenti Capiti proponuntur prima, alteram oculi partem exprimit, una sectione ab anteriori sede per posteriorem, atque ita per nervum majorem diuisi: perinde scilicet, ac si quis diuisa secundum longitudinem cepae alteram partem ea superficie delinearet, qua alteri parti connata continuatur fuerat. Atque hoc etiam modo caelos, & quatuor elementa, in plano depingere solemus.

- A Humor crystallinus.  
B Tunica anteriori humoris crystallini sedi obducta, tenuissimæq; ceparum pellicula instar pellucida.  
C Humor vitreus.  
D Nervi visorij substantia.  
E Tunica, quam reti æsimilamus, quamq; resoluta dilatata ne visorij nervi efficit substantia.  
F Tenuis cerebri membranæ portio, quæ nervo obducitur visorio.  
G Uvea tunica, in quam tenuis visoriorum nervum induens membrana degenerat, ac expanditur.  
H Hac sede uvea tunica in posteriora comprimitur, & corneam illi obductam non contingit tunicam.  
I Pupilla, seu foramen, quo uvea est peruia.  
K Tunica ab uvea initium ducens, & cilijs seu palpebrarum pilis imagine correspondens, ac interstitium pariter vitrei humoris ab aqueo.

- E* Dura cerebri membrana portio, neruum viserum obuolvens.  
*M* Dura oculi tunica, quam dura cerebri membrana constituit.  
*N* Dura oculi tunica pars, quæ cornu instar pellucida visitur.  
*O, O* Humor aqueus.  
*P, P* Musculi oculum mouentes.  
*Q* Adhærens, alba uel oculi tunica.

SECUNDA. III.

IIII.

V.

VI.



VII.

VIII.

IX.

X.

XI.




XII.

XIII.

XIIII.

XV.




XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.



DECEM ET OCTO FIGVRARVM HIC SERIATIM  
 primam subsequendum, & earundem characterum Index.

SECUNDA figura crystallinum duntaxat humorem anteriori sede ita exprimit, atq; is omnibus illum  
 ambientibus partibus liberatus, è directo intuenti occurreret.

TERCIA figura nudum prorsus crystallinum humorem commonstrat, ea sede se ostendentem, qua ex  
*R.* latere ab aliquo spectaretur. Verum *R* asperitatem sedemq; notat, cui oculi tunica, palpebrarum pilos referēs,  
 humori crystallino connascitur.



**QVART A** figura humorem uireum ita effictum commonstrat, quemadmodum is, si suam, quam in oculo obtinet, formam referuaret, in anteriori ipsius sede conspicuus esset, quum crystallinus humor ex illo euul-  
**S.** sus esset. **S** enim cavitatem ipsius indicat, in quam media crystallini humoris pars reponebatur.

**QVINT A** figur autrem humorem eadem facie, qua quarta, exprimit: uerum adhuc ipsi crystallinus  
**T.** humor **T** notatus innat.

**U.** **SEXT A** uireum humorem ex latere exprimit, una cum crystallino, qui ipsi innatus, **U** notatur.

**SEPTIMA** figura aqueum humorem (cui aliàs sudus sit) ex latere ita exprimit, quemadmodum in  
**X.** oculo consistit, & adhuc anteriorem crystallini humoris sedem iniegit. **X** namq; crystallini humorem in præ-  
**T.** senti figura notat. ac **T** eam humoris aquei sedem indicat, qua uuea tunica pars in ipso (dum integer est oculo) continetur, que à cornea abscedit, distatq;

**a, b.** **OCTAUA** figura uireum humorem **a** notatum, & aqueum **b** insignitum, simul commonstrat, ita  
**c.** inuicem distios, quemadmodum ea dirimuntur tunica, quam palpebrarum pilis non perperam in effigie as-  
**c.** milamus. Huius tunicule sedes inter hos humores consistens, **c** indicatur.

**NONA** figura uunicam anteriori crystallini humoris sedi obnatam, & insigniter pellucidam, hicq; ab ipso humore liberatam, à latere exprimit.

**DECIMA** figura crystallinum humorem à latere ostendit, adhuc ea tunica intellectum, quam nona si-  
**d, e.** gura expressit, atq; hic **d** uuniculam indicat. e uero crystallini humoris partem insinuat posteriorem, & illa u-  
**d.** nicula non obducta, sed in uiureo humore, quom integer est oculus, natuam.

**UNDECIMA** figura anteriorem seu posteriorem partem indicat tunice, quam uuea producit, quæq;  
**g, g.** palpebrarum pilis assimilatur. Cæterum hæc circulo **g** & **g** notato ab uuea pronascitur: circulo autem **f** & **f**  
**f, f.** insignio, humori crystallino inscriitur, adnascitur uic.

**h, h.** **DODECIMA** figura tunicam, quam undecima ostendit, adhuc crystallino adnatam continet. **h**  
**i.** enim & **h** tunicam notant: i uero, humorem crystallinum.

**DECIMATERTIA** figura uunicam ostendit, quam reti dissectionum periti comparant, quæq; hic  
**k.** à latere exprimitur, una cum nervi uisorijs substantia **k** insignita, & cerebri membranis libera.

**DECIMAQVART A** figura uuea tunice internam ostendit superficiem. hic enim ipsam euer-  
**l.** sam, uti inter secandum nonnunquam inuoluitur, eueritur uic, delineauimus. **l** itaq; portiunculam notat u-  
**m.** nica, in quam uisorijs nervi substantia dissoluitur. **m** sedem, in qua anterior uuea regio introrsum seu in poste-  
**n.** riora comprimitur.

**DECIMAQVINT A** figura externam uuea tunice superficiem ex latere delineatam continet, una  
**n.** cum nervi uisorijs substantia, tenui adhuc membrana cerebri obducta. **n** enim nervi uisorijs substantiam notat,  
**o.** hic à tenui qua inuoluitur membrana liberam. **o** ienus notatur membrana, nervi uisorijs substantiam integre,  
**p, p.** & hic à dura membrana, que ipsam quoq; ante sectionem obuoluit, denudata. **p, p** uenarum arteriarumq; à  
**q, q.** dura oculi tunica in ueam per inuentum sunt portiuncule, iam ex sectionis serie effraclæ. **q, q** sedes, qua uuea  
**r.** tunica anteriori in parte comprimitur, & à cornea abscedit. **r** foramen, uuea pupillam constituens.

**DECIMASEXT A** figura duram oculi tunicam ex latere commonstrat, transuersa sectione in hoc  
**f.** diuisam, ut series in conspectum ueniret uasorum ab ipsa in ueam per inuentum. Significet igitur **f** neruum ut  
**t, t.** forium, una cum duabus illum inuoluentibus membranis abtruncatum, & uenis arterijsq; concomitant. **t** u-  
**u, u.** ro & **t** uenas arteriasq; per duram oculi tunicam excurrētes. **u** autem & **u** ueam tunicam, hic propter du-  
**x.** ra sectionem, conspiciam, & ramulos dura tunica uasorum excipientem. Cæterum **x** sedem indicat, ubi dura  
**y.** oculi tunica instar cornu lenigatur, pellucidaq; cernitur. Sedi autem **y** notatæ, pupille respondet foramen.

**DECIMASEPTIMA** figura integram nudamq; duræ oculi tunice externam superficiem ex la-  
**α, β.** tere exhibet, una cum magna uisorijs nervi porzione: in qua **α** notat ipsius substantiam, β uero tenuem qua ob-  
**γ, δ.** ducitur membranam, **γ** autem duram cerebri membranam, & uenas arteriasq; neruum uisorijsq; concomi-  
**x, y.** tantes. Porro **x**, & dein **y**, idem hic atq; in decima sexta indicant.

**DECIMAOCTAUA** figura oculum à palpebris liberatū, atq; ex sua in caluaria sede erutum, una  
**ε, ζ, ζ.** cum ipsius musculis nondum disunctis, à latere exprimit. atq; **ε** neruum indicat uisorijs. **ζ** & **ζ** musculis oculi  
**η, θ.** lum mouentibus. **η** & **η** adhaerentem oculi tunicam. **θ** maiorem oculi circumum, seu iridem, ubi adhaerens mem-  
**κ.** brana desinit, corneaq; tunica pertinacissime adnascitur. **κ** autem sedem notabit, e regione pupille seu minoris  
**κ.** circuli consistentem.

**DECIMANONA** figura anteriore oculi integri, & à palpebris tantum liberi, sedem exprimit. atq;  
**λ.** hic **λ** carunculam insinuat, in maiori oculi sedis angulo repositam. **η** uero, & **θ**, & dein **η**, idem hic ac in præ-  
**η, θ, κ.** cedente figura indicant. Cæterum si alicui oculi enarrationem ab extimis ipsius partibus primis persequi ui-  
**λ.** sum sit, ut in uerso oculi figurarum ordine, decimanonam secunda loco habebit, & decimaoctauam tertia,  
**atq;** ita deinceps.



ATIONEM structuræ capitis primo libro perquirentes, oculorū situm descripsimus. in secundo autem libro, eorundem numerum, & ipsos mouētes musculos, uti & palpebrarum quoque naturam, necessariò tradidimus. In præsentia uerò, oculi sphaeræ modo rotundi fabricam enarraturis, eam à centro, aut ab ultima extima uel ipsius circumferētia auspicari integrum erit: perinde ac si quis

oculorū situm.

oculi constructio qui enarranda.

oui constructionē, ab ipsius luteo ad album, & dein ad tenuem membrulam albo obductā, & postea ad putamen crustam uel aggregeretur: aut illam à crusta ad tenuem membrulam, ac dein ad album, & hinc ad luteū enarraret: pari prorsus nimirū modo, quo mūdi partes, uel à terra ad aquam, aerem, ignem, lunæ cælum, ac sic deinceps ad extimū usq; cælum, uel ab hoc cælo uersus mundi centrum, recenseremus. Mundo namq; & ouo, oculi fabrica, quod ad constructionē spectat, conferri potest. Quam, ut exactiùs tradatur, ac postmodum memoriæ firmiùs hæreat, à centro primū ad extimam superficiem, & postmodū ab hac ad illud opportunè pertractabimus. Est itaq; oculi centrum

Centrum oculi

Humor crystallinus. sine colore

Centrum humorem



humor, quem Græci *ὑγρὸς ὕδαρ* uocāt: uti & nos quoq; qui & glacialē illum nuncupamus, à similitudine nimirū, quam cum lucidissima glacie & exactissimo crytallo obtinet, non quidem in cōsistentia aut duritie, uerū in colore, seu luce potius. Est enim is humor, optimi crytalli instar pellucidissimus, & omnia quibus iam exemptus, uitri alicuius modo imponitur, impēse quorundam utrinq; extuberantiū specillorum ritu adaugēt. Ea autem est cōsistentia, ut à cæteris oculi partibus per sectionē liberatus, humoris liquoris uel cuiusdam modo non diffuat: sed molliusculæ instar ceræ, suam asseruet formam. quæ etsi rotunda appareat, non tamen globum adamūsim rotundū refert: sed globi speciem exprimit, qui anteriori & posteriori parte non secus cōprimeretur, quā si ex lignei globi penitus exacteq; rotundi medio, secundum æquidistantes lineas orbem crassiusculū ferra exenissēs, & dein duas globi partes denuò cōglutinassēs: adeò ut præfens humor in anteriora & posteriora minus protuberet, quā secundum latera, & superiùs & inferiùs, quodāmodo scilicet ad lentis similitudinē. unde etiam hunc humorē *καρπεδὴν* Græcis nuncupatum fuisse arbitror. Superficie constat læui, & insigniter lubrica: uniuersaq; ipsius anteriori sedi<sup>b</sup> tunica obnascitur, instar tenuissimæ ceparū pelliculæ (quam inter crassiores ceparum orbes reperimus) tenuis, exacteq; pellucida, & transparēs. Verū hęc tunica, eius generis ceparū pelliculis durior est, nulla parte<sup>c</sup> posteriorē humoris crytallini sedem cōtingens: sed inibi cessans, ubi ille<sup>d</sup> amplissimus cernitur, ac ubi ipsius capacissimus cōsisteret circulus, si eum multis æquidistantib. circulis orbiculatim obuolutū fingeres. Huic tuniculæ nullum priuatim nomen inditum esse uidetur: nisi fortè à cōtinuarum araneæ telarum imagine ipsam *ἀράχνη* Græci uocauerint. respondet enim tenuitate, quamuis neutiq; robore & duritia, illis aranearū telis. Ego illam inter disseandū, uti iam dixi, ceparum tenuissimis membranulis cōfero: cornu etiam illam collaturus, si modò id in laminas diuisum, & lucernis adhiberi solitū, tam tenue ac transparēs & læue, atq; hęc est tunica, reddi posset. Huius enim substantia, à cornu substantia nihil differt. Sit igitur ipsa secundū in oculi cōstructione nobis enarratū corpus: quod quum anteriori tantum centri, seu crytallini humoris sedi obducitur, uelut semiglobus tantū in oculi fabrica censendū uenit. Cæterū posterior humoris crytallini sedes, in alio continetur<sup>e</sup> humore, qui uulgari quidē albo uitro iam refrigerato, colore seu

Tunicula cepi pellicula modo pellucida, anterioris humoris crytallini sedi obnata.

A g a x

vitrum γαλακτικόν humor.

luciditate correspondet: ac non adeò lucidus est, atq; crystallinus humor, aut exactissimū crystallum. Consistentia autē, humore crystallino longè mollior uisitur: & ab oculo exemptus, suum terminum formam' ue neutiquā retinet. quamuis interim aquæ modo non diffuat: sed ita cōsistat, quemadmodū uitrum in fornacibus fusum, quodque ferreis canalibus, quibus id ab artificibus inflandum formandumq; à fornace eximitur, obuolui cernimus. Huiusmodi uitro hic humor cōsistentia congruit: at non colore, quum humor, uti prius dixi, refrigerato uitro luciditate similis sit: fusum autem, liquefactūq; uitrum, candenti ferro quàm simillimū occurrit. Quando itaq; præfens humor cōsistentia suo uitro, luciditate autem refrigerato formatūq; iam uitro respondet, *ὑαλοειδής* Græcis, nobis uerò uitreus meritò nūcupatur. Hic humor multis numeris molē crystallini humoris superans, quum adhuc in oculo reponitur, semiglobū imagine refert: cuius plana superficies, oculi anteriora spectat: rotunda autem, seu cōuexa, in posteriora protēdit. Anterioris sedis, seu planæ superficie medio' sinus imprimitur tantus, quāta posterior est humoris crystal- f 4 fig. 3. lini pars. Is namq; humori uitreo ita immittitur, ac si globū in aqua natantem spectares, cuius media pars in aquam prorsus mergitur, altera supra aquā cōspicua utq; inter eiusmodi globum & aquam nihil mediat, ita quoq; inter crystallinum & uitreum nihil omnino intercedit: neq; illi humores inuicē secus committuntur, quàm globum aliquē in duriuscula pulte cōplexum fingeres. Porro reliquæ regioni sedis anterioris uitrei humoris crystallino non occupatæ<sup>e</sup> tunicā quandam obduci, suo loco audies, quæ cilijs palpebrarum ue pilis assimilabitur, quæq; orbiculatim lineæ tantum crassitie (ut sic dicam) crystallino humori, ubi is amplissimus est, <sup>a</sup> adnasci docebitur. Nunc autem inuolucrum mihi uenit enarrandum, quo posterior uitrei humoris sedes proximè continetur. <sup>f</sup> Nerus itaq; uisorius, tenui duraq; cerebri mēbranis, & aliquot uenis arterijsq; cōcomitatus, ad posteriorem oculi sedem fertur: ac illi non nihil uersus externum oculi latus insertus, sua substantia in enarrandū iam inuolucrum dissoluitur. tenuis autē membrana, nerui substantiā obuoluēs, in' aliam degenerat oculi tunicā, quæ uuea uocabitur: & dura quoq; mēbrana in' aliam cessat, quæ dura dicetur, & uenæ pariter & arteriæ (uti seriatim enarrabo) oculi constructionē subintrant. Quum primū igitur nerui uisorijs substantia in oculū mergitur, mollior reddita, dilatatur in latum quoddā inuolucrum, posteriori uitrei humoris sedi obductū, & non multum ultra mediam oculi sedē in anteriora pertinens, & extremē gracilibus & obscuris uenulis, ac item arterijs intertexta: quæ à tunicæ huius radice, ac sede qua neruus primū expanditur, ipsi exporrigūtur. Galenus in decimo de Partiū usu innuit, hoc inuolucrum à plerisq; tunicæ nomine non dignari: forsitan quòd cæterarū tunicarum modo membranea non sit, sed mollis, & ueluti mucor aliquis ex naribus procidens. quum enim hoc inuolucrū secantibus in unum colligitur, & à sua radice propendet, mucorē, aut cerebri substantiā aqua quapiā dilutam refert: non enim ita solidum crassumq; ac cerebri substantiā uisitur. Vt cunq; uerò sit, siue tunica nuncupandū ueniat, siue minus, cōstat Galenum quoq; in libris de Hippocratis & Platonis decretis, & item in octauo de Partium usu, hoc inuolucrum tunicā appellasse. Neq; ego scio, quòd nomen illi aptius quàm inuolucrum, aut tunicæ, indi possit: quum, uti diximus, toti posteriori sedi humoris uitrei proximè obducatur, illumq; integat: perinde atque tenuem oui pelliculā, oui album tunc cōtinere diceremus, quum dimidiā oui partem ab alia effractam, & adhuc oppletā, manibus seruaremus. Est enim hoc inuolucrū forma dimidiato

Oculi inuolucrum ex nerui uisorijs substantia solutū, & retii comparatum.

8 1 fig. K.  
 11 11  
 12 fig.  
 b 12 fig. b.  
 b adnascitur l.  
 i 1 fig. E.  
 13 fig. tota 13  
 fig. deiti 13  
 14 fig. cap. 2  
 lib. 4. 1 eda  
 15 fig. ex G.  
 h 17 fig. a  
 cum fig. A.  
 aut 1 fig. D  
 cū F & L.  
 l 1 fig. G.  
 16 fig. tota 16  
 17 fig. m 1 fig. M.  
 18 fig. tota 18  
 19 16  
 20 fig.



dimidiato tantum oui putamini comparandum: aut minori piscatorum reti, quod uni accommodatur baculo, & ex ampla basi, dimidiati globi modo in obtusum mucronem fertur. Ab huiusmodi enim retis imagine arbitror inuolucrum istud Græcis ἀμφιβληστροειδὲς nuncupatum fuisse. nam retis formam, non autem plexum refert, quum undiq; sibi sit continuum. nisi etiam fortè uenulas & arterias ipsi uariè intertextas, quis reti assimilandas contenderet. Hactenus igitur quatuor oculi partes recensui: duos nimirum humores, & totidem

Αμφιβληστροειδής

n fig. G  
ab F edu-  
A. 10.  
12 ferè 14.  
15 fig.

Tunica uuea, à  
tenui cerebri  
membrana pa-  
rata.

παύ

o fig. O.  
O. 7 fi.  
Y. 8 fi. b.  
p fig. M.  
enatum ab  
L. aut 16 et  
17 figure.  
q fig. H.  
14 fig. m.  
15 fig. q. q.

r 16, 17 fi.  
x. 18, 19  
fig. d.  
s fig. N.

t fig. L. 14  
fig. m. 15  
fig. r.  
u 16, 17 fi.  
y. 18, 19  
fig. u.

x 15 fig. p.  
p. 16 fig.  
u. u.

Pupilla.

Χροειδής

tunicas. ac proinde iam meritò eam aggrediar, quæ à tenui membrana, nerui uisorijs substantiam concomitante, producit. Mox enim atq; hæc membrana simul cum neruo oculum subit, in tunicam degenerat, non tantum posteriorem oculi sedem, tunica quæ à nerui confurgit substantia modo, occupantem, uerum & anteriori etiam sedi obductam. Hæc tota posteriori oculi sede tunicam proximè inuestit, à nerui substantia pronata: & in harum contactu nihil prorsus mediat, neq; ambæ etiam in uicem aliquo nexu, præterquam accubitu, committuntur. quæ autem tunica à tenui enascens membrana, anteriori oculi sedi obtenditur, interna sua superficie undiq; humorem contingit & complectitur, quem aqueum & albugineum paulo post uocabimus. Externa uerò huius tunicæ superficies ea tunica obducitur, quam à dura membrana uisorijs induentem pronasce dicam. Verum interim huic tunice, quam tenuis profert membrana, priuatim accidit, quòd exacti globi modo nò sit prorsus rotunda: quum scilicet anteriori regione nonnihil introrsum comprimatur, aliqua sui parte planam superficiem pro conuexa & rotunda commòstrans.

Quando enim hæc tunica ad eam usq; anterioris oculi sedis regionem pertinet, secundum quam maior oculi ducitur circulus, quem iridè uocamus, aut quo album oculi (ut ita loquar) à nigro distinguitur, & ea tunica à dura cerebri membrana pronatæ pars consistit, quam cornu in luciditate & substantia quoq; cõparabimus, ipsa inquam ab hac abscedit, quam dura procreat membrana: neq; amplius illam contingens, inibi in posteriora comprimitur, quæ illius parti, quam cornu assimilamus, fuerat subducenda: si modò undiq; à tunica, quam dura producit membrana, æquè proximè obuolui cingiq; debuisset. Neq; hac duntaxat compressione tunica à tenui membrana cerebri generata donatur: uerum etiam in huius cõpressionis medio, foramine quodam peruia est, quod minorem in oculo apparentè efformat circulum, & pupilla nobis appellatur. adeò ut hæc tunica, uæ folliculo, à quo pediculus, quo is affirmatur, euulsus est, quàm simillima sit: præsertim si uuam illic parum concidisse, & (uti etià fit) uacuari intelligas, ubi pedunculū extraxeris. Totus enim uæ folliculus tunicæ huic respondebit: ea autem coincidentia illi assimilabitur compressioni, quam in anteriori parte hæc tunica sibi uendicat: foramen uerò, quo pedunculus firmabatur, ipsi pupillæ cõparabitur. Atq; ab hac similitudine Græci præsentè tunicam χροειδὴς & ὕαλος, nos autem ueam appellamus. Quoniam uerò ipsa à tenui cerebri membrana, χροειδὴς etiam dicta, constituitur, Græci illam quoq; χροειδὴς nuncuparunt. Quandoquidem uerò passim quæ uuea tunica, illa obducitur, quam dura cerebri progenerat membrana, uenarum artiarumq; furculi ab hac in ueam pertingunt, illi ita ueam exasperat, ut hac quoq; externa ipsius superficie, internæ folliculi uæ superficie accedat, quæ fibras illas continet, quibus uæ caro & acini sustinentur. Præterea quum ab ea tunica, quam dura cerebri membrana procreat, complures, uti iam diximus, uasorū furculi sparsim in ueam producantur, eorum quoque furculorum interuentu uea illi tunicæ connascitur. Quæ uerò uea

*Vuea tunica  
colores.*

tunica ab illa secundum iridis circulum abscedit, introrsumq; premitur, uuea per totum circuli ductu ualide ipsi adnascitur, & colore euariat. Vuea namq; tota superficie, qua dura tunica proximè succingitur, perpetuo nigra est, & modicè humecta: in anteriori autem suæ compressionis sede uariè tingitur, eumq; semper exprimit colore, qui in oculi iride, seu maiori circulo, sanis hominibus occurrit, cuiusque gratia oculos nigros, aut cæsius, aut glaucos dicimus. Neutiquā enim is color ex oculi humorum copia, aut defectu, aut tenuitate, aut pupillæ etiā collectione uel dilatatione, aut oculi ueluti profunditate, aut tenuitate confurgit, alicuiusue consimili causæ acceptus ferri debet. Quod

*Ex humorum  
aut spirituum  
copia oculorum  
colorem non  
uariari.*

etsi magnum illis fortè uidebitur paradoxū, qui integros libros de oculorum coloribus consarciunt: non aliter tamen id probatum uelim, quā eum qui singulis hominibus (quantumuis is uarius sit, & sibi in utriusq; oculis, & in uno etiam oculo interdū dissimilis) obtingit colorem, perpetuo eundem in uuea apparere, siue integro oculo, siue effluxis ex dimidio, aut in uniuersum humoribus, siue ipsa uuea tunica per refectionem à conterminis liberata, diuulsaq; hunc examinaueris. adeo ut de oculorum coloribus haud secus disputandum arbitrer, quā de nigra, fusca & alba, in ipso etiā utero, hominibus data cute, ac rufis flauisq; & nigris capillis: uti etiam parem ferè cutis & oculorū coloris in uarijs nationibus rationem obseruari cernimus. Cæterum interna uueæ superficie diuersis, sed omnibus interim hominibus ijsdem, interstingitur coloribus. In posteriori enim oculi sede, qua hæc tunica primum pronascitur, subalba est: mox uiridis, & dein cærulea iridis in modum efficitur. atq; hos colores adhuc in posteriori oculi sede interna hæc superficies possidet, in anteriori autem oculi sede uniuersa impense nigricat. & non adeo leuis hic atq; in posteriori sede uisitur: quod illi potissimum accidit propter processus, quos à se hac in parte educit, tunicam constituturos, quæ anteriori uitrei humoris sedi obducitur: & ueluti<sup>r</sup> interstitiū est uitrei, eiusq; quem aqueū nominabimus.

*Tunica cilij et  
palpebrarū  
pili comparata.*

Hæc itaq; tunica planis duntaxat donatur superficiebus, non autem concauis aut conuexis. Eam siquidem constitueres, si ex tenuissima aranæ tela tantum orbē excinderes, quanta est anterior sedes uitrei humoris: ac dein in hoc orbe alium orbiculū excinderes, foramen factururus tam amplum, ac crystallini humoris est amplitudo. Huiusmodi namq; orbi præsentē tunicam conferre posses, si illū circulatim ab uuea tunica pronasci, & suo foramine crystallino connasci fingeres. Verum hæc tunica tenuitate aranæ telas ferè superat: & processulis ab uuea pronatis talibus constat, ut nigra cilia, seu palpebrarū pilos forma insigniter exprimat. Num autem tunica, aut aliter nuncupada sit, non admodum moror: modò quā nam sede reponatur, & quibus committatur, quaq; sit imagine & substantia, explicè. Neq; mihi ullum occurrit nomen, quod ipsi aptius indam, quā tunicæ: aut, si uoles, interstitij uel septi, inter uitreum humorem, & eum quem albugineum aqueum<sup>ue</sup> nuncupabimus, repositi. Jam tempestiuū fuerit, duram quoq; oculi tunicam sermone cōplecti, quā à dura cerebri membrana, uisoriū neruum inuestiente, pronasci ac dissolui credimus. Quum primum enim hæc membrana posteriori oculi sedi applatatur, dilatescit: & crassior ac durior ipsa cerebri dura membrana euadēs, orbiculatim undiq; oculo obducitur, tam in anteriora quā in posteriora pertingens. quanquam interim non pāsim sibi similis sit, neq; simplici donetur nomine. Quā enim posteriorē oculi sedem constituit, & in anteriori sede ad<sup>o</sup> maiorem oculi usq; circulū pertingit, crassa & dura est (unde & συληρότης nuncupatur) & dein duræ cerebri membranæ modo opaca, & minimè pellucida. <sup>a</sup> Ea uerò

*Dura oculi tunica, à dura cerebri membrana educta.*

Σκληρότης

y 1 fig. K.  
C 11, 12 fi  
gure.  
z 1 fig. K  
inter C &  
O. & s. fi.  
c inter a  
& b.

a 4 fig. M  
educta ab  
L. & tota  
ferè 16, 17.  
b 16 fig. f.

c 18, 19 fig.  
guy. d.  
d 1 fig. N.  
16, 17 fig. x  
simul, & y.

sede,

fede, qua oculi nigrum consistit, hæc tunica in cornu imaginem degenerat, quod exactè leuigatū, uetri alicuius loco lucernę accōmodatur. Neq; hæc præsentis tunicæ pars, cornu in luciditate, qua id etiā superat, solū respōdet, uerū & substātia quoq; est enim hæc tunicæ pars cornu modo dura, & cornu instar in laminas diuidi radiq; potest, perinde ac si ex laminis aliquot seu squamis inuicem cōpactis constitueretur. Atq; hinc est ea oculariorū medicorum cura, quæ senibus hanc tunicæ partem attenuari præcipit: quam à tanta cum cornu similitudine *λεγατοειδής* Græci, nos uerò corneam nominamus. Quamquam uideantur Græcorū pleriq; non hanc tantū duræ tunicæ partē ita ap-  
pellasse, uerū uniuersam quoq; (quum ipsa insigniter cornu in modū dura sit) tunicā. Interna huius superficies, tota ea fede, qua cornu modo non pellu-  
cet, uueam tunicā absq; alicuius substātię interuētū succingit, ipsiq; uenarum arteriarumq; beneficio, uti prius diximus, adnascitur: quemadmodū etiam il-  
li pertinacissimè ac orbiculatim adnectitur, secundū maiorē oculi circulū, seu iridem. Porro ea fede, qua hæc tunica cornu instar pellucida cernitur, ipsa uueā non cōtingit: & tātisper atq; oculus sanus est, ab uuea notabili interuallo inibi distat, quā uuea anteriori in fede cōprimitur. Hoc interuallū, & uniuersū  
f. in 1 fig. a B. ad I. g. 1 fig. O. O. tota f. re 7 fig. c 8 fig. b. humore illo adimpletur, qui adhuc enarrādus superest, ac uerus humor cēse-  
tur. nam aque modo tenuis fluidusq; quodāmodo secātibus & suffusiones cu-  
rantibus occurrit, & insigniter aquæ modo pellucidus cernitur: unde etiam  
*ιδιωπεϊδής* Græcis, nobis uerò aqueus nominatur. quanquam pleriq; hunc albo  
oui humori cōparantes, illum albugineū nuncupent: etiam si arbitrer Græcos  
hunc humoreō oui albo non cōtulisse, quum neutiquā æquē crassus sit, & mul-  
tum illi accedat humori, quem ex recētibus integrisq; ouis igni apposis refu-  
dare cernimus. Humor iste, uueæ tunicæ partē corneę in sano oculo non con-  
tiguam sustinet, & (uti dixi) in priore ac in posteriore eius partibus cōtinetur:  
& quum in oculo consistit, terminoq; inibi alieno cōcluditur, uitrei humoris  
modo dimidium exprimit globum, cuius posterior pars, quæ plana constat su-  
perficie, tantum habet sinum, quanta antrosum protuberans crySTALLINI hu-  
moris est pars. Anterior autē eius aquei humoris sedes, gibba, dimidiariq; glo-  
bi instar secundū oculi formam rotunda est. Cæterū externa duræ tu-  
nicæ superficies, tota fede qua pellucida, ac reuera cornea existit, admodū læ-  
uis est, & lubrica: uerū cætera fede ita aspera inæqualisq; uisitur, quemad-  
modum inuicem connatæ membranæ ad mutuū contactū exasperantur.  
Posteriori enim duræ tunicę sedi, præter<sup>a</sup> uenas & arterias ipsi implicitas, mu-  
sculus inseritur, quem musculorum oculum mouētium septimum numera-  
uimus: deinde lateribus, superioriq; ac inferiori externę huius superficiēi sedi-  
bus, neruosæ tenuitates musculorū inferuntur, quos sex primos oculum mo-  
uentes recensuimus. & deinde anteriori quoq; duræ tunicæ parti ad iridem  
usq; tunica obnascitur, quæ adhuc cōmemoranda superest, ac Græcis *ωθηρι-  
φωκός*, Latinis autem adhærēs, quod oculo obnata, adnatā ue, illum cōtineat,  
uicinisq; partibus committat, alba etiam à colore quem possedit, nuncupata.  
Hæc membrana anteriori tantū oculi sedi ad iridē usq; obducta, tenuis est,  
illiq; continua, quæ internam palpebrarū sedem inuestit, oculiq; partium nu-  
mero ascribitur: quemadmodum & ipsæ palpebræ, si modō cui id uisum sit,  
his quoq; partibus adijci possunt. Fuit itaq; hæc oculi partium series: <sup>1</sup> humor  
<sup>m</sup> crySTALLINUS: <sup>2</sup> tunica, cepis pelliculæ tenuissimæ modo pellucida, antero-  
<sup>n</sup> riq; crySTALLINI humoris sedi obnata: <sup>3</sup> humor uitreus, in posteriori oculi sede  
tantū

λεγατοειδής

Humor aqueus. ιδιωπεϊδής

ωθηριφωκός

Adhærēs al-  
bae oculi tu-  
nica.



tantum positus: tunica, in quam uisoriij nerui substantia resoluitur, & quæ o  
posteriorem humoris uitrei sedem tantum amplectitur: tunica uuea, à tenui p. i. fig. G.  
cerebri membrana principium ducens: tunica seu orbis, araneæ telæ modo h.  
tenuis & nigricans, & interstitiū uitrei humoris ab aqueo: tunica dura, quæ q. i. fig. K.  
in anteriori oculi sede cornu modo pellucida redditur: aqueus humor: se- r. i. fig. M.  
ptem oculum mouentes musculi: tunica adhærēs, seu alba, anteriori tantum s. i. fig. O.  
oculi fedi ad iridem usq; obnata: palpebræ, & demum uenæ ac arteriæ. Cæ- o.  
terum si quis modò oculi constructionem ab extimis ad intima aggredi uelit, t. i. fig. P.  
iam promptissimū est retrograda illum serie eas persequi: & dein separatim p. i.  
humores & tunicas cōmemorare. Ego autem nunc ea oculum enarratione n. i. fig. Q.  
persecutus sum, qua in scholis uti soleo. Verum ut oculi fabricā adeò studiose  
demonstrare cōsueui, ut spectantium nemo in ipsa quicquam desideraret: ita  
in ipsius partium usu explicādo hic prorsus obmutesco, quòd mihi ipsi de pri-  
mario uisus instrumento non satisfaciā, atq; hac in parte aliquid quod sanum  
undiq; sit, à me nō adferri posse, mihi persuadeā. Non sanè quasi crySTALLINUM  
humorem, præcipuum uisus instrumentum esse, & ut hic alatur, uitreum pro-  
duci, & huius gratia oculi reliquas partes efformatas esse, quemadmodū Gale-  
nus in decimo de Partium usu diffuse persequitur, cōmemorare, aut hic pro-  
lixè etiam scribere nequirem: sed quòd mihi certò, quòd uisus fiat, non constat,  
hincq; reliqua oculi cōstructionis ratio dependeat, quodq; potissimum de hu-  
iusmodi philosophorum & medicorum controuersijs priuatim quædam ali-  
quando mihi scribenda duxerim, hoc labore ad iustā nunc molem perducto.

oculi partium  
usus.

## DE AUDITVS INSTRVMENTO.

## Caput xv.



QVAE de auditus organi fabrica modò enarranda essent,  
superius in primo libro ita explicui, ut in præsentia, si inibi  
nihil cōmemoratum fuisset, ea pertractarem. In octauo  
enim eius libri Capite, cavitatem auditus organi gratia  
in temporis osse exsculptam, paratamq; & deinde cavi-  
tis illius foramina, membranas & ossicula recensui. In tri-  
gesimo sexto autem Capite, auris cartilaginis, & reliqua-  
rum ipsius partium constructionem, uti tunc occurrit, modòq; animo obuer-  
satur, persecutus sum. Nihil enim certius de auditu, sonituq; percipiendo hic,  
quàm inibi, attexere possum: nisi etiam modò plus, quàm dum illa enarrabā,  
ambigem, mihiq; longè minus satisfaciā: & non satis mirari queam, omnes  
de auditu, ipsiusq; obiectis, tam prolixè citra organi ipsius uel maximè super-  
ficiariam cognitionem scribere: ex quo tamen præcipuè ad hanc discepta-  
tionem demonstrationes petendæ fuerant.

a Hæc om-  
nia ossicula  
fig. cap. 8  
lib. 1.

## DE GVSTVS INSTRVMENTO.

## Caput xvi.



INGVAM gustus esse instrumentum, medicis iuxta &  
philosophis concessum est omnibus. Quandoquidem ue-  
rò uniuersam linguæ fabricam, cæterarum corporis par-  
tium constructione mihi minus, ut uerum fatear, cogni-  
tam, superioribus libris necessariò, ac ueluti quadam serie  
complexi sumus, hæc modò prolixè haud est repetenda.  
In decimonono enim secundi libri Capite, nouem lin-  
guæ mulculos, & uariam illam fibrarum & raræ substantiæ compositionisq;  
in ipsius

a Hi obij-  
sunt in figu-  
ra cap. 9  
lib. 1.

in ipsius parte, quam hiant ore citra sectionem conspicimus, speciem, unā cum illius inuolucris, seu tunicis, recensuimus. & in tertio libro uenarum arteriarumque linguam petentium frequentiam descripsimus: in quarto libro ipsius nervos minimè negligentes, quorum<sup>a</sup> alter præcipua maioris tertij nervorum coniugij radicis numerabatur portio, gustus potissimum occasione linguæ oblata: alter uerò septimi nervorum cerebri paris non minima propago, musculorum causā linguam multis furculis implicās. adeò ut nihil exactius hīc modò, quàm dictis nunc locis præstitum est, commemorare queam: qui non magis hīc de saporum differentijs & qualitatibus, quàm prius de odoratus, uisus & auditus obiectis, sermonem duxerim instituendum.

## DE TACTVS INSTRUMENTO.

## Caput XVII.



T tactus quoque instrumentum in quarti libri initio me persecutum arbitror, quum nullum neruum tactus sensu non præditum, per corpus digeri assererē, & Naturæ scopos in nervorum distributione, quantum is locus exigebat, enarrarem: illorum subridens sententiam, qui unam eiusdem nerui portiunculā sensui, aliam motui absque sensu præesse docuerunt. Ac proinde totius humanæ fabricæ partium enarratione pro mea uirili absoluta, nunc superest, omnium partium quæ præsentī libro aggressi sumus, sectionis rationem perscribere: & si alicuius partis in alijs libris traditæ secandi ratio non sit expressa, etiam illam ad huius libri calcem seriatim subiungere, postremoque de uiuorum sectione nonnulla proponere.

*Quid absoluta nunc partium corporis descriptione, in sequentibus Capitulis sit præstadium.*

## CEREBRI, AC OMNIUM QUAE PRÆSENTI

libro traduntur organorum administrandi ratio, unā cum uenarum & arteriarum ac nervorum denique brachia & crura percrepantium examine. Caput XVIII.



VMMODO musculos cervicem occupātes, & nervos à cervicis dorsali medulla profiliētes, in corpore quod nutritionis uitalisque facultatis organis inspicendis hactenus subseruiuit, aggressus fueris, suadeo nunc caput ita ut ad præcedentis libri finē recensui, à reliquo corpore auferri. Ablatum enim longè commodius, minoriq; molestia atrectabis. unde etiam capita detruncatorū hominum ad hunc usum sunt accommodatissima: præcipuè quòd illa uix bene mortua, sed interim (quod ad uasorum in primis inspectionem est incommodum) magna ex parte exanguia, statim à sumpto supplicio, minus morosorum iudicum ac præfectorum opera, obtineri possunt. Qualecunque igitur caput obtigerit, no-

*Qui caput ad cerebri inspectionem parandum.*

*Caluaria ad cerebri anatem qualiter aperienda.*

*a quemadmodum figuratur cap. 6 lib. 1 oblata est à 6 figura eius cap. ac ut 1 fig. huius libri est parata.*

uacula aut cultro in capitis cute ad os usque orbicularem<sup>a</sup> molieris sectionem, quæ pollicis latitudine elatius quàm supercilia sunt, non inopportunè auspicabitur: & hinc per tempora ad eminentissimā maximeque posticam occipitij sedem, & illinc rursus per tempora ad frontē perducetur. Dein ferra, qua membrīs in gangrena auferendis ut cōsueuimus, aut alia ab eburneorū pectinum artificibus petita, caluariam secundum illam lineam diuides: studiosè præcauens, ne altius quàm os sit, ferra descendat. In hoc opere conduxerit capitis crines nondū abrafos, neque etiam aures præfectas esse: quo leuiori negotio altera tua manu,

tua manu, & sodalis utraq; caput, ne ferræ cedat, contineatur. Vbi caluariam orbiculatim diuideris, obtuso cultelli mucrone secundum sectionem ducto, num aliqua ossis pars adhuc diuidenda superfit, examinabis, ut & eam quoq; ferra diuidas. Porro ne sectionis finē ipsius principio elatiorē demisiorem uere reddas, nihil obstitit, funiculum colore aliquo intinctum, caluariæ fortiter, illorum qui trabes in asseres diuidunt modo, circumdare: ut color is orbicularem lineam, qua ferram dirigas, caluarię intingat. Funiculum hunc ossi obuol uere conuenit, postquam iam cutem orbiculatim dissecuisti: quippe cutis sectio te manu ducere nequit, quum ipsius latera, dum caput ualidē cōtinetur, hinc inde, abscedente nimirum cute, diuellantur. Diuisa ad hunc modum cal uaria, si à ceruice inferioriq; maxilla caput habueris liberū, illud sua basi men sœ impones: utrinq; si uisum fuerit, ne in latera concidat, lapidem, aliud uel si mile collocās. Si uerò caput reliquo corpori quauis tandem sectionis ratione adhuc hæreat, tot ceruici occipitiq; quadratos lapides, aut truncū aliquem subijcies, ut caput in anteriora reflexum eleuatūq; ac si basi inniteretur, tibi assurgat. Insuper sectioni per caluariam factæ, ualidioris cultri dorsum trans uersim ad frontē primū impones: & illo modicē sursum deorsumq; actō, sectionem aliquouelq; dirimes. Idem quoq; in occipitio tēporibusq; tantisper faciendum est, quousq; superiorē caluarię partem à dura cerebri membrana liberam esse coniecieris: tunc enim uerticis crinibus apprehēsis, attrahentem manum os subsequetur. Adempto ossē, cutē simul cum adipe & carnea mem brana solis manibus facilē diuelles: & deinde cultelli mucrone Græcis uoca tum *πορνεύσιον*, ipsumq; hac in sede *πορνεύσιον* indagabis: ut & uenulas ex uerti b. f. f. f.

cute in caluariā uersus duram cerebri membranā, aut ab hac in illam pro fectas. Iam dura cerebri membrana, aliqua ex parte cultello est perforanda: & calamo, fistulā uel quo in eliciēda urina utimur syphone, foramini indito, sectionis latera ad illum digitis sunt comprimenda: ut postmodum inflato sy phone, quanto dura membrana cerebri mole amplior sit, cōdificas. Suffecerit autem in altero tantum latere eiusmodi foranē fieri. nam copiosus qui infla tur spiritus, undiquaq; duram cerebri membranā distēdit, inflatq;. Verūm si quum caluariam ferra diuideres, duram membranā alicubi oscitanter disse cueris, illa quoq; sectio, dum membrana inflatur, ne aerem trāsmittat, oppor tunē cōprimeretur. Dimissa modò, concidenteq;, ubi iam syphonem extraxe ris, membrana, acutioris cultelli mucronem tertio ipsius sinui, per totam ca pitis longitudinē in elatissima eius membranæ sede procedenti intrudes, lon gaq; sectione uniuersum, quoad poteris, diuides: & distēto sinu, ipsius formā, & ramorum qui utrinq; à suis lateribus, & ex inferiori eius sede pullulāt, ori ficia inspicias. Porro ut cerebrum dura ipsius membrana nudes, iuxta frontis os eam ad dextrum tertij illius sinus latus perforabis: & deinde stylo in fora men indito, secundum hunc cultello ad occipitis usq; os cōtinuò ad dextrum sinus eius latus sectionem deduces: ac dein rursus duram membranā cultelli mucrone propter aurē, quā ossi proxima est, perforabis: hincq; rectā sursum usq; in sectionem, secundum capitis longitudinē ductā, secando perges. Pos tremò in capitis uertice duos mutuò sibi incidentiū sectionum angulos un guibus attolles, & deorsum tractos à cerebro reflectes, habita ramorū ratio ne, qui ex tertio duræ membranæ sinu, & ijs uasis, quibus dextrum duræ mem branæ latus implicatur, in tenuem cerebri membranā pertinēt. Posteaquam uerò & in sinistro duræ membranæ latere hæc præstiteris, ac dextram cerebri partem à sinistra modicē manuum beneficio diduxeris, septum à dura c. Ex pri ma figura facies se cundam.

d. a. fig. G, C. & D, D.

e. a. fig. G, G.

f. a. fig. D, D inter A, A & B, B.

membrana

Cutis, adipis, membrana car nosa, ac dein caluariæ inuolutis, illiq; sub ditate ad huc me brana examē.

Dura membra na amplius qui exami nanda.

Tenuis mēbra na detelli.



membrana inter utranq; cerebri partem exporrectū, & soboles à tertio duræ membranæ sinu utrinq; in tenuem membranā diffusæ, quantū fieri poterit at tollentur, ut quī illarū interuentu cerebrū erigatur, utcunq; intuearis. ac dein acutiori cultello illis propaginib. à suo sinu liberatis, septum illud ab octauī ex cerebro eleuatum in posteriora reflectas, suo sinu quī uenæ instar toti inferiori ipsius sedi exporrigitur inspecto, longisq; in tenui mēbrana obseruatis uasorum ductibus, qui per capitis longitudinē in illam ex quartī duræ membranæ sinu termino hīc inter duas cerebri partes incedunt. Horum ortus in præsentia curiosius nō uenit inquirendus, ne fortassis quum cerebrū nimium studes disungere, aliquid incuria rumpas. Aliās enim hortarer, ut utraq; cerebri parte quā maximē in posteriori sede disiuncta, duram membranā quā cerebri partes in occipitio intercedere incipit, quā posses proximē ab illā duræ mēbranæ parte, quæ cerebellū ac cerebrum interuenit, acutioris cultelli mucrone diuideres. tūc enim quartus tibi appareret sinus, & quas ille educit propages. Verūm hæc cerebri portione ablata inspicere longē erit satius. ac proinde illis ductib. qui secundū capitis longitudinē in tenui mēbrana supra callosum corpus feruntur expensis, cultello aut unguibus alicubi tenuē membranā diuelles, ac deinde sensim à cerebro ipsiusq; anfractib. eam digitis detrahes. Cerebrū hac liberatum mēbrana suos ostendit anfractus: argumētōq; est, quī à tenui membrana cōtineatur: quum scilicet hac detracta, impense dilatescat, & cōcidens prorsus, quodāmodo diffuat. Porro cerebri anfractuū altitudo ac profunditas digitis aut stylo uenit indagāda. atq; ita etiā solo digitorum munere elatior callosi corporis sedes, & qui utrinq; hīc cōsistunt sinus, inquiruntur. Simulatq; uerō hos inueneris, utrinq; magnā cerebri auferes portionem, primū magna & acutiori nouacula sectionem per dextrū, qui ad callosum corpus cōsistit, sinū deducens, quæ totam cerebri partē sinu illo superiore, à fronte ad occipitiū usq; simul in dextro latere adimat. plurib. enim reiteratis sectionibus, operatio turpiter uitiat. Ademptā cerebri partē in mensam ita repones, ut elatior dextri uētriculi sedes in cōspectu sit. ea enim quam fieri præcepimus sectio, dextrum uentriculū diuidit, si modō rectē secundū sinum qui ad dextrum callosi corporis latus uisitur, administrata fuerit. Dextra cerebri parte ad eum modū ablata, in sinistra idem quoq; (ut & sinister pateat uentriculus) moliendū est, per sinistrū iuxta callosum corpus consistentem sinum facta sectione, callosoq; corpore quā fieri licebit maximē immoto, diuulsoq;. Id enim postquam sinistrum quoq; cerebri uentriculum inspecteris, uidendo uentriculorum septo seu speculo, sensum, & quā accuratissimē summis utriusque manus digitis modicē æqualiterq; attollendum uenit. Septum namque, si ad eum modum callosum corpus erexeris, & dein candellam contrario eius quod inspicis lateri (nisi illi clarior dies obluceat) adhibendam curaueris, euadet conspicuum. Iam callosum corpus anteriori parte à cerebro liberabis, & sursum digitis attractum diuulsumq; in posteriora reflectes. ita namq; elatiorem septi uentriculorum sedem calloso corpori, inferioriorem uerō illi cerebri parti quam testudini ac camerato assimilamus, connata cernes. Cameratum aut (cuius nunc superior sedes undiq; obuia est) obtusiori stylo uenit examinandū. ac primū quidē stylus ad syphonis formam obliquatus, sub camerato ex dextro uentriculo in sinistrū mittetur: & camerati perpenis lateribus, anterior ipsius pars cerebri substantiæ connata, cultello diuidetur, & digitis deinde eleuata in posteriora reflectetur, ut & ipsius

Aa inferior

Tenuis membrana à cerebri revolutionibus auulsa.

Superioris callosi corporis superficies examin.

Dextri & sinistri uentriculorum apertio.

Dextri & sinistri uentriculorum septi examin.

Corporis testudinis modo examin.

g 3 fi. N. aut  
6 fig. cap. 6  
lib. 1. n.  
h 3 fig. E & F  
secundū  
G. G.  
i fig. cap. 14  
lib. 4. e.

k 7 figura  
O. O. O.

l 7 fig. T.  
m fig. ca. 14  
lib. 3. Y, X,  
4, 5, 6, d, e,  
f, i.  
n 3 fi. L, L.  
o 3 fig. C, C, C.

p 3 fig. L, L.  
dein M, M.

q Paratulas & figuram, quæ in testudinis uisceribus.

r 5 fi. X, X, X, Y, Y.  
s Ex quarta fig. nunc p. 14 is quin.

t Vbi infimum l. cōsistit in 4 fi. gur. 4.

u 5 fi. Y, X, X fig. X.

v 5 fi. S, T, V. & 6 fig. A, A, A. & ex quinta figura paratib. sexta.

inferior superficies, quæ testudinis modo caua est, occurrat. Reflexo itaque ca-  
merato, qui id posteriori sua parte uelut ex dextro sinistroq; cerebri uentricu-  
lo enascatur, immisisis stylis peruestigabis, & deinde id in pristinam ipsius se-  
dem repositū longa sectione diuides, aut potius cultello uniuersum radicētus  
præcindes. Conduxerit tamen priusquā præfecerit, sub ipso stylum ad<sup>1</sup> eam  
usq; partem, qua ex quarto duræ membranæ sinu<sup>2</sup> uasa ductus<sup>3</sup> ue, ad antero-  
res cerebri uentriculos sub camerato pertinent subijcere, ac adamussim ipsius  
usum constructionisq; rationem longè elegantissimam examinare. Statim ue-  
rò atq; ademptum, longa<sup>4</sup> ue sectione diuisum, ac postea utrinq; diductū erit,  
attendes<sup>5</sup> plexui à secundarum imagine aut substantia potius *χρυσιδῆς* Græcis  
dicto, & ductibus pariter à quarti duræ membranæ sinus sine exporrectis. Ac  
proinde spectabis, qui per posteriores dextri & sinistri uentriculorum sedes  
ex posterioribus deorsum in priora descendentes, <sup>6</sup> arteriæ ascendant, quæ  
antrorsum prorepentes, unā cum ductibus à quarto duræ membranæ si-  
nu proficiscentibus eos plexus efformant: quos num retibus quoque compa-  
rare liceat, modò discēs. Cæterum quum his ductibus animum accommo-  
das, illi quoque spectandi sunt, qui tenui membranæ & humiliori duræ  
membranæ processui dextram cerebri partem à sinistra diuidenti, à  
quarto sinu offeruntur. Vbi enim hos expenderis, ductus qui à quarto sinu  
in cerebri uentriculos pertinent, ea sede cultello sunt diuidendi, qua in uen-  
triculos bipartuntur. Hinc cleuati, in posteriora leuiter reflectentur, ne<sup>7</sup> glan-  
dula nuci pineæ comparata simul auellatur. hæc siquidem illis ductibus  
sua sede remotis, in conspectuiacet. Verūm hæc tentanti, ouillum cerebrum  
ad manum esse uelim, quod id glandulam illam & cerebri<sup>8</sup> testes, natesque  
apertiū nonnihil quā humanum caput commonstret. Glandula hac in  
suum locum reposita, digitis<sup>9</sup> communem dextri sinistriq; cerebri uentri-  
culorum cauitatem, quæ modò instar rimæ spectanti occurrit, distendens, ac  
mox<sup>10</sup> meatum quo pituita uersus<sup>11</sup> peluim ex tenui membrana extructam  
defertur, unā cum<sup>12</sup> meatus principio intueberis, qui ex tertio uentriculo com-  
munie hac concauitate in quartum uentriculum pertinet. quibus inspectis,  
<sup>13</sup> totam cerebri portionem cerebello incumbentem transuersa in cerebro du-  
cta sectione adimes, id duntaxat hîc præcauens, ne<sup>14</sup> arterias per posteriorem  
dextri sinistriq; cerebri uentriculorū regionem ascendentes, unā disseces. Ap-  
paret modò duræ mēbranæ<sup>15</sup> processus, cerebellū ab ipsi incumbente cerebri  
portione diuidens: & ille pariter processus, qui inter dextram cerebri partem  
& sinistram ducitur, quapropter tempestiuum est, ut quatuor duræ membra-  
næ sinus simul examines. Tertio itaq; duræ membranæ sinui quē dudum per  
longitudinem<sup>16</sup> dissecuisti, plumbeum inferes stylum,<sup>17</sup> quem facile in tres reli-  
quos eius mēbranæ sinus hinc protrudes: si modò utrinq; ad latera primū,  
ubi cerebelli elatior pars ofsi proxima est, illū impuleris. ita enim dextrū & si-  
nistrum, seu primū ac secundum inuenies. Deinde si sub radice duræ mēbranæ  
processus dextram ac sinistram cerebri partem interuenientis stylum de-  
truseris, quartum sinum comperies. Quo tamen eos uideas exactius, acu-  
toris cultelli mucrone longis sectionibus omnes sunt aperiendi: & dein-  
de cultello totus duræ membranæ processus cerebello instratus, orbicu-  
lari sectione secundum os ducta, uenit præsecandus, <sup>18</sup> aut sectione secun-  
dum longitudinem ducta diuidendus, retrorsumque reflectendus, ut cerebel-  
lo obiter inspecto, cerebrum denuò aggrediaris, communem dextri sinistriq;  
uentriculi cauitatem distendens, exactiusque pituitæ ductum immisso stylo  
examinans.

Dextri & si-  
nistri uentri-  
culorum, & na-  
serunt in ipsis  
consistentium  
examen.

Glandula te-  
stibus incum-  
bentis.

Tertij uentri-  
culi, ipsiusq;  
meatum.

Duræ mēbra-  
na sinuum.

Cerebelli dete-  
ctio.

47 fi. v. ex  
T.  
66 fi. H. L.

44 fi. O.  
O. 6 fi. M.  
N.

d 6, 7, 8 fi.  
F. G.  
e 6 fi. H et  
I secantur  
in K. L.  
ffig. 66. 14.  
li. 3 Y. et  
b, d, c.

g 7 fi. L. 10  
fig. D.

h 10 fig. E.  
G 7 fi. H.  
i 7 fig. H.

k 7, 8 fi. L.  
l 14 fig. C.  
C. aut 15 fi  
g 4 E.  
m 7 fi. K. 8  
fig. L.  
p Parahis  
modò 7 fi.  
q 6, 7, 8 fig.  
F. G.  
r 7 fi. O. O.  
s 3 fi. D. D.  
t 3 fi. B. B.  
u 17 fi. ab  
S ac R po-  
nis stylum mo-  
dò in P. P.  
modò in Q.  
Q. et mo-  
dò in T.

x vii fig. A  
est in 8 fi.

examinans. Vt uerò tertij cerebri uentriculi meatū in cerebelli cauitatem por rectum obserues, obliquatum stylum meatui indes, leuiterq; in cerebellū con cidere fines. Stylus enim grauior, syphonisq; modo incuruatus, etiam non im pulsus secundum meatus ductum, in cerebellum deuoluitur. Manente adhuc in meatu stylo, digitis cerebellum nonnihil à cerebri testibus dirimes, quoad scilicet stylum inter cerebellum & testes ipsos intuearis. tunc enim (idq; præ cipue in ouis cerebro) quæ pars<sup>r</sup> testibus, & quæ<sup>r</sup> natibus similior sit, discēs.

910 fig. E, G.  
210 fig. F, H.  
217 fig. A  
218 in 8 fig.

Quod quum obseruaueris, cultello testes ipsos natesq; secundum stylum<sup>a</sup> di uides, ut meatus ille ex tertio uentriculo ad cerebellum porrectus, euadat conspicuus: pauloq; accuratius meatus obseruetur à cerebro ad peluim hinc nonnunquam pertinens, pituitamq; eò deducens. Poteris modò tenuem cere belli membranā hamulo discerpere, &<sup>b</sup> uenam quæ ab illius ductibus in po steriorem humilioremque anteriorum uentriculorum sedem pertinet, exa minare. Quippe hanc reperies facilius, modò illam iuxta anticæ cerebelli par tis cum cerebro connexum inquisueris, qui præsentis uenæ potissimum sit interuentu. Vt autem<sup>c</sup> coalitum cerebelli cum dorsali medulla cognoscas, ca put quasi in faciem<sup>d</sup> reclinandum est, & manu inter cerebellum & durā cere bri membranā occipitis ofsi commissam, imposita, cerebellum in priora, deor sumq; detrabi debet, quousq; uniuersum à dorsali medulla liberatū decidat. in ea enim administratione nihil obstat, quo minus<sup>e</sup> uenulas ductus<sup>e</sup> ue ex pri mi secundiq; duræ mēbranæ sinuum principijs: aut<sup>f</sup> uenis arterijsq; per trans uersos ceruicis uertebrearum processus repentibus, in cerebellum porrigi ui deas, ac dorsalis ex ipso cerebro ortum, formam, & sinum cum cerebelli sinu

Testium et na  
tium examen.

Dorsalis me  
dulla cum cere  
bello coalita.

c 10 figure  
1, K. ad 11, fi  
gure G, G.  
d 171 fig. A  
218 in 8 fig.

219 fig. K.  
f 171 figure  
libri figu  
re f, f.  
g 10 figure  
L, M, N, O.  
h 11 fig. E.  
i 171 fig. A  
in 11 figure  
111. f, C, D.  
219 fig. E, D.

quartum efformantem uentriculū cernas. Deinde cerebello in<sup>a</sup> pronū con uerso, ipsius intueberis sinum, & partes sedesq; quibus dorsali medullæ con nascebatur, & præcipue ipsius inuolutionum anfractuum<sup>e</sup> ue pulchram ima ginem. à quibus ilico uelut manu ducêris ad duos inuolutionum<sup>e</sup> apices uer mibus afsimilatos, & ueluti reuolutionum per cerebelli medium secundum ipsius longitudinem deductarum terminos. Atq; id apparebit clarissimè, si per eam longitudinem utrinque longa sectione ad earum reuolutionum la tera ducta, eas à reliqua cerebelli substantia liberaueris, exactasque in men sam exporrexeris. ita nanq; unus tibi apparebit uermis, illis quàm similimus, qui ueris tempore è salicibus decidere solent, aut bombicibus priusquam sese folliculo includunt: & adhuc nullo magis, quum iam aliquandiu inclusi fue runt, folliculum tamen nondum corrôdere. At si uniuersas illas cerebelli me dias reuoluciones simul non abstuleris, sed duntaxat extrema execueris, duos poteris cōmonstrare uermiformes cerebelli processus: unum quidē priorem, posteriorem uerò alterum. Porro non solum exactis ad hunc modum uermi

Quarti ventri  
culi examen.

vermiformis  
processum.

k 171 fig. A  
218 in 12 fig.  
l 13 fig. I, I.  
m 13 fig. A  
rd C, C.  
n 12 fig. C.  
D. 13 fig. L.  
o 171 fig. A  
in 13 fig.  
p 13 fig. S.  
q 14 fig. C, C.  
r 13 fig. B.  
14 fig. E, F.

formibus processibus, ipsorum imago examinanda uenit: uerū etiam quan do cerebellū à dorsalis medullæ initio auellitur, ipsorū usum præcipuo studio expendere conduxerit. Inspectis itaq; cerebelli partibus, neruorū paria coniu giaq; inuestigabuntur. quod ut fiat ocysus<sup>r</sup> manu inter cerebrū & frōtis os in sēta, cerebrū sensim attolletur, ut primū à plerisq; uocatos cerebri<sup>r</sup> mamil lares processus, & dein olfactus<sup>r</sup> organa quæ è suis sinibus stylo quopīa aut dig ito uenient euellenda, & unā cum cerebro sursum in posteriora flectenda: in quo opere caput non inutiliter in occiput<sup>r</sup> reclinabitur. ita enim reuolu tum, eorum organorū initia pulchrè ostēdet. Atq; hic pariter in conspectum ueniet<sup>r</sup> uisiorum neruorū exortus, & eorundem cōgressus, & sub illis<sup>r</sup> pel uis pituitæ cerebri expurgandæ parata. Mox<sup>r</sup> & arteriarum in duræ mem

Neruarum pa  
rium examen.



branæ amplitudinem ingressus occurrer, quæ partim in tenuem absumuntur membranar, & partim in dextrum & sinistrum cerebri uentriculos properant. Vt uerò exactam earū spectes seriem, & hic quoq; tenuē membranā à cerebro diuelles, & uentriculorū terminos inibi in reuolutiones, nō autem in olfactus organa uisorios<sup>r</sup> ue nervos finire, nihilq; minus quā à uentriculis in ea organa pituitam excerni, ac per illa uersus<sup>r</sup> octauū capitis os deduci animaduertes. Nunc uisorios nervos à cerebro diuides, & totam ipforū portionem in caluariæ cavitae tibi conspicuā, studiosè refecabis, ne nuper dictā peluim simul auferas. ea nanq; hac administratione tota occurrit, pulchreq; cernitur, quī<sup>r</sup> meatus ex tertio uentriculo ad hanc pertinet, & qualiter illa in<sup>r</sup> glandem cesset, quæ duræ membranæ subijcitur, facileq; iam proprio duræ membranę dilatato<sup>r</sup> foramine spectabitur. Cōduxerit tamen membranā inibi tantisper illæsam seruare, dum reliquos cerebri nervos examinaueris. Capite igitur in sinistrū latus<sup>r</sup> reclinato, & cerebri parte quæ adhuc reliqua est, in suum locum utcunq; repōita, cerebrū postea in sinistrū latus deorsumq; reflectes, & secundi paris originem contemplaberis, perinde ac<sup>r</sup> minorem tertij paris radicem: quā diuulsā, cerebrum adhuc magis in sinistrū deflectes, & mox<sup>r</sup> tertij & quarti paris exortū intueberis. insuper & quinti paris origo sese offeret, quam similiter diuidere cōpetit, ut<sup>r</sup> nervulus occurrat, qui iuxta quinti paris radicem principium obtinens<sup>r</sup> temporali musculo, & in ore<sup>r</sup> delitescēt, maxillamq; attollenti distribuitur. Sextum quoq; par & septimum euadent conspicua, si uarijs ipforū quibus ortum ducunt propaginibus animū adhibueris. Cæterū quum paria hæc perquiris, ductus quoq; uenarum modo ex duræ membranæ sinibus in tenuē excurrentes obseruandi ueniūt, & nervorum exortibus in sinistro si uisum erit latere, similiter adinuētis, quicquid dorsalis medullæ, aut cerebri in capite reliquum est auferes, ut duram membranā quæ cerebri basi subiaceret, adhuc integram uideas, & olfactus organorum sinus foraminulis peruios, & undiq; egrediētes nervos intuearis: quibus inspectis, primi ac secundi duræ membranæ sinuum originem, & in illos subeuntia uasā<sup>r</sup> examinabis, ac utiori cultelli mucrone ipsos aperies. Ductus autē secundum duræ membranæ latera, & in ipsius iuxta frontē basi uenarum modo excurrentes, uel citra aliam sectionē sunt obuij. ut uerò glandulā, & quem dissectionis professores ementuntur reticularem plexum uideas, animum adhibebis duræ membranæ<sup>r</sup> foramini peluis infundibilis uel mediū excipienti, & adhuc peluis portionem adnatam habenti: nō negligens interim arteriam, quæ ad foraminis illius latera utrinq; durā membranā penetrat. Vbi hæc obiter intuitus fueris, acutioris cultelli mucrone sectionē ex illo foramine utrinq; ad arteriarum usq; transitum ducēs: & distentis sectionum labris, glandula sese offeret, unā cum arterijs ad ipsius latus stratis. Verū hæ magis reddentur cōspicuæ, si hamulis & acutioris cultelli mucrone, quā poteris maximè durā membranā hic liberaueris, aperueris<sup>r</sup> ue, ac ab arteria durā penetrante membranā plumbeum stylū ad forporariā usq; arteriam in ceruice adhuc consistentē, impellas. Id nanq; in homine factu promptū est, si modò tuis oculis Galeni nomine fidem derogare nolueris. Hic enim, quā pulchra de reticulari plexu in hominibus cōmentū sint hætenus omnes, obseruabis: potissimū si ouillū aut bubulum cerebrū hīc quoq; sectioni adhibueris. Præterea glandulā sua sede dimouens, ac ut duriē ipsius experiaris eandem comprimens, perpendes quid Galeno in mentē uenerit, quod per crassissimā ossis cuneū referentis sedem, (quam spongiæ modò peruiam & citra squamæ obductionē cauernosā, &

r 8 fig. c. 6  
li. 1. A. B. A.  
s Vii p. d. u.  
est in 14. fi.

t 14 fig. D.  
u 16 fig. A.

x 15 fig. v.

y Vi in 14  
figura.

z 14. fi. G.  
a 14. fi. H.  
b 14. fi. I. K.  
c 14. fig. M.

d 14. fig. L.  
e 4. muscu.  
tab. r.  
f 6. musc. 12.  
D.

g 14. fig. N.  
dein O. aut  
potius seriatim  
specia. i  
figu. cap. 2.  
lib. 4.  
h Apparet  
in 9. fig. ad t.  
in 13. ad t.  
i Vi facit  
est in 9. fig.  
h 13. fig. H.  
K.

l 15 fig. F.  
m 15 fig. C.  
D.

n Inspectu-  
rus 16 figu-  
ram.

Eorum quæ in  
duræ membra-  
na basi sunt  
examen.  
Glandis pitui-  
tam excipien-  
tis, ipsius accu-  
rentium arte-  
riarum.

Lib. 9. de resu  
part.

à uerticis ofsium fabrica diuersam esse scribit) pituita ad palatum longa mora colari cēfuerit. Relicta modò interiori caluarię sede oculū aggredi conuenit, ad cuius sectionē humanus, si recētius adhuc fuerit cadauer, fuffecerit: alioqui enim bubulus quā nācisci poterit recētissimus, simul quoq; operi adhibebitur. Primū itaq; palpebrarū, & deinde oculi musculos, quemadmodū in secundo docuimus libro, inquires: in quo opere neruorū quoq; & uenarū arteriarumq; per oculorū sedem ductuū habenda est ratio, secundi dico neruorum cerebri paris, & minoris radices tertij paris. quorū ramulos facilè adinuenies, si eos in pinguedine oculi musculis obducta perquisiueris, & præcipuè si ossa ad sceleti constructionē integra reseruare nolēs, terra frontis os superiorem oculi sedē constituens, instar triaguli prius excueris: & deinde primū neruos illos, & postea extracto oculo ipsius musculos indagaueris. alius enim oculus cum musculis illeſo osse esset eruēdus, acutiori cultro in oculi circuitu proximè ad os ductis sectionibus, usq; ad nerui uisoriij è caluarię cauitate qua cerebrum continetur egressum. Vtcunq; uerò oculum euulseris, conduxerit semper adhærescentem membranā quā licebit uicinissimè ab osse dirimere, imò etiam eius portionem qua internam palpebrarum efformat sedem, oculo appensam seruare. ut interdum adhuc intactis oculi musculis, cultello acutiore ad iridem usque ab oculo, ac si cutem à corpore auferres, illam excoriare, & deinde unde ortum duxit rimari possis. Aliquando uerò ipsam membranā nō nisi ablatis oculi musculis aggredieris, perpendēs semper hac totā anteriorem oculi sedem, præter corneā tunicam seu pelluentē duræ tunicæ partem amplecti: illis uerò, totam posteriorem. Cæterum oculo & musculis & adhærescente membrana libero, uisoriū contemplaberis neruū, unā cum uenis arterijsq; secundum ipsum ex cerebro in durā usq; tunicā exporrectis: deinde de portione uisoriij nerui lōga sectione diuides, & cultelli mucrone duræ cerebri membranæ, & tenuis membranæ portiones neruū inuestietes, & postmodum nerui substantiā inquires, ut uelut trium præcipuarū oculi tunicarū initia ostendas, & insuper uisoriū neruum ab oculo diuidas, ut nihil præter durā, ceu exactissima quæpiā sphaera, appareat. Sphaeram hanc summis digitis sinistræ manus ita apprehendes, ut pollex quidem pupillā, reliqui autem eam sedem in quam uisoriū neruus implantatur comprehendāt, dein dextra manu acutiori nouacula sectionem quā poteris longissimā in dura oculi tunica transuersim duces, ut citra cōpressionem omnes oculi humores excidere possint. Hi enim hac ducta sectione, oculoq; in dextram manum assumpto, in manus sinistra uolā ita sunt demittendi, ut crystallinus uitreo elatiorē locum habeat: negocium enim confuderis, si uitreus super crystallinum reuoluatur. Atque id ne fiat uitabis, si quum in uolam ex oculo humores prolabi finis, oculū non admodum à uolā eleuatū teneas, & posterior oculi pars, qua uisoriū neruus inseritur, uolam magis respiciat. Susceptis ad hūc modum humoribus, & reposita aliquandiu illa oculi parte ex qua humores prolapsi sunt, manū leuiter modicè ue inuertes, ut aqueus è uolā sinistrae manus profluat, solusq; uitreus cum crystallino referuetur. Mox considerabis tunicā palpebrarū pilis quā similitimam, quæ orbiculatim crystallino humori connata, anteriorem uitrei humoris sedem inuestit, integitq;. Tunicā hanc cultelli mucrone à crystallino humore primū diuelles, & deinde à uitreo subleuatam supra chartam aliquam, cui & reliquas oculi partes feriatim adhibebis, extendes. Crystallinum humorem digitis ex uitreo quā minimè compressum eximes: & uitreo in suum locum in charta reposito, illæsum humorem crystallinum scri-

oculi admini-  
stratio.

o fi. cap. 10

lib. 2.

p figure. ca.

11 lib. 2.

q 2 fi. cap. 2

lib. 4. K.

r eius. fi. L.

118 fi. cap.

14. u. u.

118, 19 fig.

cap. 14. d.

u Vi in 10

12 cap. 14.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

14. u. u.

pturę alicui primũ impones, & deinde cultelli mucrone ipsius lateri modicę indito, scripturę nunc altius nũc demissius accõmodabis, quĩ omnia specilli nõ excauati instar lõgę quàm sint maiora reddat, consideraturus. Porro ipsius tunicę, quã tenuissimę in cepis pelliculę modò tenuę ac pellucidã, sed duriorę esse diximus, ex ipsius primũ lateribus cultelli mucrone dirimere conuenit: & deinde unguibus ab humore auulsam, ad suum in charta locum reponere. Vt uerò crySTALLINI humoris discas duritiem, poteris illum inter digitos premendo confringere, & postmodũ chartę adhibere. Cæterũ ut tres adhuc reliquas contempleris tunicas, oculi partem ex qua humores deciderunt, super sinistram pollicem euertes: & ilico quę ex uisorij nerui substantia dissoluitur tunica sese offeret, aut extensa adhuc, aut uti plerunq; solet, instar mucicollactę. quapropter tunc stylo rursus uenit extendenda, & quantam habeat amplitudinem, cuiusq; coloris & substantię sit, inquirendum. Deinde rursus erit colligenda, ac denique à suo principio ubi duntaxat firmatur abssecta, in chartam reponenda. Iam interna uueę tunicę sedes undiquaque est conspicua, in qua primũ ipsius intueberis colores, deinde hamulo uueam à dura diuellens, uenarum ex dura in illam transitum, & nigricantę ipsius colorem perpendes. quum uerò ad iridem diuellendo pertigeris, ipsius hęc contemplaberis ad corneam firmissimum connexum, & pupillam: cuiusq; coloris uuea sit. quã à cornea abscedit, atque è corneę regione consistit. Vueam hoc modo diuulsam, & à suo exortu ubi firmissimę durę tunicę committitur, dissectam, in chartã repones, & solam iam duram tunicam cum pellucida ipsius instar cornu parte contemplaberis, ipsius examinans crassitiem, & eam partem pellucidam. Vbi & hanc in suum ordinem in charta: locaueris, memoriarę omnia commendaturus, uelut ab oculi centro ad extimam usque superficiem, & hinc rursus ad centrum singula enumerabis: & postea, nisi molestum fuerit, sinistram aggredieris, à quo adhærentem membranam, & musculos, ut in dextro administrabis. uerũ in duram quę uueam simul penetret, sectionem, nullam duces, sed quam minimę compresso oculo nouaculę mucrone sensim sectionem in dura molieris, non quę primo iniectu eam diuidat, sed quę sæpius iterata, ad uueam usq; pertingat. sectioni deinceps tenuem, sed retusum stylum inferes, ac sensim uueam à dura dirimes, ut iam commodę forpicula durę tunicę sectionem, quę orbiculatim oculum ambiat, illæsa interim uuea perficere queas, ut uenarum ex dura in uueam transitum, & uuea postmodum dissecta, humorum situm paulo melius contempleris. Absoluta oculi anatome, auditus organum, si ossa reseruanda minus duxeris, erit aggrediendum. & primũ auri natura euadit conspicua, si à cartilaginea qua conformatur substantia, cutis utrinque separetur. At auditorij nerui processus difficilius adinuenitur, serra tamen maxima ossis portione, quę supra meatum habetur, & deinde cultro fortiori reliquo osse ad meatum usque execto, membrana in quam neruus degenerat, & huius organi ofscula euadunt conspicua. Si enim serra meatum tetigeris, omnia uiciabis, & cultro etiam subinde nihil promouebis, quòd in angusto & anfractuoso meatu, molis tenuisq; neruus facile cum ofsibus diuellatur, contundaturq;e. Omnia tamen mihi percommodę succedunt, si serra totam ofsis partem, quę auditus organum continet, à reliqua caluaria libero, & deinde transversum ualidiori cultro os uniuersum impetu dissecò. Cõuenit autem ita sectionem moliri, ut ea ofsis sedes quę neruum à cerebro procedentem primũ excipit, ab illa separetur, cui auri connascitur. Imò, si in uno latere negotium parum ex

*Alia oculi ad  
ministratio.*

*Auditus orga  
nizamen.*

d 10 fig. ca.  
14 d 10  
te 9 fig.

e 15 fig. ca.  
14.

f 14 fig. ca.  
14 l.

g tota fig. ca.  
14 fig. cap.

h 15 fig. cap.  
14.

i 14 fig. cap.  
14 p. p. o.

k 16 fig. u. u.  
15 fig. ca.

l 14 fig. q. q. o.  
18 fig. d.

m 15 fig. cap.  
14 r.

n 15 fig. cap.  
14 d q d q.

\* 18, 19 fig.  
cap. 14 n.

m 18 fig. ca.  
14 l. l.

n 15 fig. ca.  
14 d q d q.

o Exprimi  
tur fig. ca.  
8 lib. 1.



sententia cesserit, nihil sanè prohibet alterum quoq; aggredi, & brutorum caluarias, ut bouis & ouis, operi adhibere, quum illis animalibus organum auditus non multum ab hominis fabrica discrepet. Rursus si ossa haud referuanda putas, suaferim ut frontis os quà supercilia spectat, passim effingas, sinum illum quem continet accuratè examinaturus. idem quoq; in osse cuneum imitante molendum est, ut ipsius quoque<sup>a</sup> antra crebro apparentia, & quæ illis continetur materia in conspicuo sint, nihilque septimo hoc libro descriptum lateat. Cæterum nunc aliquot musculorum administratio (dummodo in uno corpore uniuersam absoluturus es anatomen) adhuc superest, quibus uidentis alterum latus suffecerit. Aggredieris itaq; musculos cubitum mouentes, & qui radium, & brachiale, & digitos mouent: mox tibiam mouentes, & qui femoris motuum autores censentur: deinde pedis & digitorum motuum opifices ita simul cum ligamenti refecabis, quemadmodum in secundo libro iam multò antè commemorauim. Prorsus enim abs re ducere, si illos musculos, eorundemq; administrandi rationem, uel obiter etiam hîc pertractarem. Quod uerò ad brachij & cruris uenas, arteriasque & neruos attinet, quum horum duntaxat administratio nondum expressa sit, eam nunc aggrediar. Primum itaq; à summo humero ad pollicis usque unguem in cute sectionem adeo leuiter duces, ut carnosam membranâ non uulneres: deinde sectionis labris inuicem diremptis, omni studio laborisq; patientia cutè à carneâ membranâ ita auferes, ut adipè omnem membranæ adhærere sinas. studioseq; obserues, ne uenâ quampiam, aut neruulû cuti connexû sinas. & si fortè aliquè ramum cuti exporrectum negligentia diuiseris, & cum cute aliquoufq; à carneâ membranâ seiuixeris, illum à cute sedulò refeca, & carneâ membranâ ita ut prorepebat, obtédito, ac dein cutem quemadmodum cœpisti adimito, nullibi cutis aliquid, neq; in brachio, neq; in cubito, neq; in manu relinquens. Iam uenulas & neruulos obseruabis, carnosæ membranæ quâ brachium attollentè integit musculum oblatos: dein<sup>a</sup> primum brachij neruû, qui carnosæ membranæ aliquoufq; in externa brachij sede exporrigitur, insuper<sup>a</sup> ramulum tertij nerui<sup>a</sup> inter musculum brachiû attollentem, & eum qui brachium pectori adducit, in carnosam membranâ hîc in anteriori brachij sede disseminatû. In posteriori autem brachij sede & inferiori regione externi lateris brachij<sup>a</sup> neruorum furculos expendes, carnosæ membranæ à quarto neruo brachium ingrediènte deriuatos, simul cum<sup>a</sup> ramo quem is externæ cubiti sedi obliquè offert. Mox<sup>a</sup> sexti brachij petentis nerui seriè uniuersam expendes. ea enim tota carnosè membranæ duntaxat exporrigitur. Iam humerariæ secundum internum latus musculi brachium attollentis<sup>a</sup> egressum spectabis, & ramulos quos hinc inde, donec cubiti attingat articulum, dispensat. Ad cubiti aut articulum, ramû obseruabis obliquè deorsum ad communis uenæ cõstitutionem, ab humeraria diffusum: dein<sup>a</sup> eum qui secundum radium in posteriora cubiti ad paruum usq; fertur digitum, axillaris uenæ ramû sibi affiscens. Ramum uerò quem humeraria rarius ad articuli cubiti profundiora mittit, si modò adfuerit, etiam citra sectionem expendes, axillaris uenæ<sup>a</sup> portioni animum accommodans, quæ sub media lōgitudine brachij carnosam membranâ subit. Hæc enim<sup>a</sup> ramum ad communis uenæ cõstitutionem promere cernes: dein<sup>a</sup> alios ipsius ramos secundum ulnam, seu inferiorem cubiti regionem, ad brachiale ferri spectabis: & etiam animaduertes huius portionis foboles per anteriorem cubiti sedem uariè admodumq; implicite ad brachiale usq; & manus uolam excurrentes. Dein<sup>a</sup> communis uenæ seriè uniuersam quoque intueberis, ad secundi

Musculorū in  
proprio huius  
corpo nō  
dissectorum ex  
amen.

P E N A.  
R. P. M. arte-  
riarum & ner-  
uorum brachij  
examen.

r. fi. ca. 6 li.  
3 d.  
s. 2 fi. ca. 11  
lib. 4. g. li.  
t. eius. fi. n.  
u. eius. fi. v.  
x. mus. t. d.  
inter p. &  
Δ.  
y. 1 fi. ca. 11  
li. 4. a. &  
char. 32. de  
riuat. d. o.  
z. eius. fig.  
char. 33.  
\* 2 fi. ca. 11  
lib. 4. v.  
a. fi. ca. 6 li.  
3 inferius d.  
dein c. e.  
b. eius. fig. h  
ad a.  
c. eius. fig. i.  
uersus l. ubi  
inscribit x.  
x.  
d. eius. fig. g.  
e. eius. fig. r.  
f. eius. fig. t.  
ad a.  
g. eius. fi. u.  
x. y. z.  
b. eius. fi. a.  
h. y. d. g.

brachium petentis nervi<sup>i</sup> propagines animū dirigens, quæ ab illo producuntur, simulatq; in cubiti articulo carneam membranam ex alto adit. adhæc<sup>r</sup> ramum quarti nervi etiam spectabis, qui per externā cubiti sedem ad brachiale usq; spargitur. Nervos digitos implicantes, aliquo pacto etiam modò cernis. uerū magis conduxerit, eos tum primū expendere, quā radices ipforum ad digitos usq; perduxeris. Postquā itaque hæc omnia non resecta adhuc carne membrana diligenter non sine magno usu spectaueris, illam unā cum ipsius annexis uenis & nervis à succumbentibus musculis auferes: ac mox<sup>i</sup> musculum, cuius beneficio brachium pectori adducitur, ad ipsius usque infertionem ab illis quibus adnascitur partibus liberabis. idem & in<sup>i</sup> illo molieris, qui brachium attollit, & ijs quoque qui scapulam mouentium primus & secundus habentur: dein claviculam à summo humero<sup>a</sup> resecabis, & musculum auferes à pectoris ossē & clavicula mamillari capitis processui insertum, & eum qui à scapula ossi<sup>i</sup> referentis implantatur, & eum quoque qui à prima pronatus costa, transuersis processibus ceruicis uertebrae inferitur. Cæterū quum hos adimis musculos, parum curandum est, num illos auferas illætos, nonnihilque uulneratos. hic enim non musculorum, sed uasorum natura uenit discenda: & perpetuò cauendum est, ne uas, non autem musculus uitetur. Si itaq; ad hunc modū accuratè hos musculos ademeris, in ceruicis uertebrae latere neruorū<sup>u</sup> radices seriesq; eleganter occurrēt, qui ab illis profiliunt uertebrae: atque ita etiam plexum neruorum in brachium excurrentium obseruabis, à quo seriatim cuiusque nervi digestionem persequeris. Ac<sup>\*</sup> primus occurrit, qui musculo brachium attollenti præcipue offertur: deinde<sup>i</sup> secundus, & tertius. quorum seriem cōmodius spectabis, si capita<sup>a</sup> musculi cubitum flectentium anterioris illinc unde prodeunt liberaueris, & musculum à subdito illi<sup>b</sup> musculo ad infertionem usque ipsius detraxeris. Mox enim ita præter secundi & tertij nervi ad brachium ingressum, etiam<sup>a</sup> quarti & quinti & sexti nervi, & dein<sup>a</sup> arteriæ & axillaris, & humerariæ uenarū ingressum adinuenies, sensimq; singulorū distributionem sequeris, quæ in secundo neruo obseruatu est prompta: & tertij quoque nervi series ad cubiti usque articulum in propatulo est, uti etiā & quinti nervi & sexti. Quartus autem neruus, quā secundum brachij os uersus externum illius tuber retorquetur, non occurrit, nisi obliquè secundum nervi ductum<sup>u</sup> musculos cubiti extensionis auctores dissecueris, nerviq; progressum ita uitatis musculis persequutus fueris. Vbi autem hunc ad externum cubiti articuli latūs usque deduxeris, ramosq; quos hætenus in progressu edidit examinaueris, musculis ab externo humeri tubere principium ducentibus, à sua origine liberatis, ramos quarti nervi expendes, qui illis musculis offeruntur: & eam sequeris<sup>k</sup> propaginem, quæ tandem externæ pollicis regioni, ut & indicis quoque & mediij furculos exhibet. hanc enim leui negotio reperiēs, si musculo attenderis bifido tendine brachiale extendenti. Iam quarti nervi<sup>m</sup> propago similiter inquirenda est, quæ ulnæ exporrecta, ad brachiale usq; excurrit, & musculis ab externa ulnæ sede initium ducentibus furculos depromit. Vt uerò reliquum<sup>o</sup> tertij quintiq; nervi, & dein<sup>p</sup> reconditæ axillaris uenæ portionis, & manus arteriæ in cubito & manu progressum uideas, musculorum ab interno humeri tubere originem sumentium capita ueniunt liberanda: ita enim in anteriori cubiti articuli sede uenæ & arteriæ, & tertij nervi in cubitum ingressus occurret: & eleuato secundos quatuor digitorum articulos flectente musculo, ipso ad brachiale usque progressum etiam obseruabis, unā cum quinti nervi (qui secundum po-

12 fi. cap. 11  
lib. 4. d. 2.  
17, 21, 22  
h. eius. fig.  
cha. 49.

13 muscul.  
tab. 2.

m 4 muscul.  
ta. 3.  
o 5 tab. 1.  
p 9 ta. 1, 2.  
q Vi lu 3  
musc. ta.  
r 4 tab. 2.  
s 5 ta. R. S.  
t 9 tab. C.

u Vi in 2 fi.  
cap. 11 h. 4.  
o ultima fi  
gu. lib. 4.  
x 2 fi. ca. 11  
lib. 4. f.  
y eius. fig. 5.  
o ult. fi. lib.  
4. S.  
z eius. fi. 7.  
et ult. fi. T.  
a 6 tab. 2.  
b 7 tab. P.  
c 2 fi. cap. 11  
li. 4. o. de  
iu. x. de iu. x.  
d fig. ca. 12  
lib. 3. N.  
e fi. ca. 6. li.  
3 m.  
f eius. fig. 4.  
g 9 muscul.  
tab. 5. T.  
h 9 fi. ca. 11  
lib. 4. y. 2.  
o cha. 32.  
i 9 tab. 2.  
o, A.  
h 3 fi. ca. 11  
li. 4 cha. 35.  
l 11 tab. A.  
m 3 fi. ca. 11  
lib. 4 cha. 37.  
37. diffin.  
dens cha. 38.  
38, 39, 41.  
n 10 muscul.  
A. 2. 1.  
o 2 fi. ca. 11  
li. 4 cha. 43.  
p fi. ca. 6. li.  
3 q. q.  
q fi. cap. 12  
li. 1 N.  
r 1 muscul.  
V. X. Y. Z.  
s 5 muscul.  
e.

dum posteriora interioris humeri tuberis in cubitum fertur) portione ulnæ exporrecta, & sub medio longitudinis ulnæ ramum spargente. qui in cubiti exteriora reflexus, externæ sedi parui digiti & anularis & medij furculos offert: quæ leui negotio, quum in superficie propemodum ducatur, adinuenies. reliquum uerò quinti nervi & tertij progressum reperiens, si transuersum in interna brachialis sede repositum ligamentum diuideris, ac dein exiguo cultello uenæ, arteriæ, & illorum neruorum seriem ad extremos usque digitos perduxeris. Cæterum priusquam cruris neruos & uasa inquires, etiam diligenter obseruabis neruorū ex thoracis uertebrarum lateribus profilientiū distributionem. quam tunc demum opportunè inuenies, quum sedulo illorum distributione uel in his nostris commentarijs perlecta, musculorū dissectionem perfectissimam habes, qua hic non minus indiges, quàm ante musculorū administrationem absolutissima ossium cognitione. Quā itaq; ad lumborū usque uertebras deuentū erit, ab inguine ad pedis usque pollicem, similiter atq; in brachio, sectionē duces, cutem ad carneā usq; membranā diuidens: ut dein uniuersam femoris, tibiæ & pedis cutē illæsa carnea mēbrana, & uenis & arterijs & neruis, inter hanc & cutē excurrētibus ad ipsam relictis, quoad licebit cōmodè, auferas: moxq; quatuor neruorum crus petentium radices exortusq; inquiras neruos è lumborum uertebris & sacro ossē profilientes, secundum ipsorum seriem subsequendo. Deductis uerò hunc in modū sectionis ordine ad crus quatuor ipsius neruis, primi nerui sobolē expendes carneæ membranæ in externa femoris sede exporrectam. dein secundi nerui sobolem in anteriori femoris sede ad carneā membranā plerumq; diffusam. Hic uenā quoq; obseruabis per femoris & tibiæ interiora ad pedis usq; summū, simul cū secundi nerui sobole exporrecta. Tertij nerui sobolē carneæ membranæ oblatam inuenies, si inguini animum adhibueris. Vt autem quarti nerui ramus in carneam membranā diffusus occurrat, primum femur mouentiū musculum ab ilium ossē & sacro, coccygeq; ad insertionem usq; liberabis, moxq; quarti nerui truncum eumq; ramum spectabis. Quo inuento, etiam ramum quarti nerui in carneam membranā iuxta poplitem, femorisq; humiliora diffusum inquires, & dein quarti nerui ramos tibiæ cuti multifariam simul cum uenis depromptos, in carneā membrana peruestigabis. & mox ad inguina reuersus, primi nerui seriem in musculis occultatā, cultello per musculos quæres, quod & in secundo & tertio facies: quanquam cum tertio etiam arteriæ & uenæ propagines inueniendæ sint, quæ per pubis ossis foramen in femur delabuntur. Venam autem & arteriam insigniores femur petentes, dissecis uitatisq; musculis sensim adinuenies: & obseruatis ipsarum ramis, progressum eorundem sequeris, quā secundum femoris os retorquentur, ac poplitem unā cum quarto neruo adeunt. Vbi tria hæc, uenam scilicet, arteriam & neruū reperiens, qui in poplite diuidantur peruestigabis, & musculis ligamentisq; uariè dissecis, uniuersam ipsorum seriem disces. Quo in opere quantum diligenti, & non semel tantum repetita nostrarum descriptionum lectione, & prompta imaginum ipsi resectioni adhibitione iuuaberis, ipso usu facile experieris. Cæterum si ex ossibus, quæ iam ex præsentī corpore tibi sunt reliqua, scēletum efformare, aut aliā illa ad ossium doctrinam inspectionemq; asseruare uisum fuerit, nostra parandorum ossium cartilaginūque ueteris ratione, quam ad calcem primi libri tradidimus, itaq; uniuersę mortuorum dissectioni colophonem adhibebis.



Quid mortuo-  
rum sectione,  
et quid uiuo-  
rum dissectio.



Ossium ac car-  
tilaginum usus  
in uiuo animan-  
te qui uiden-  
dus.

Ligamentorum  
usus.

Musculorum  
usus et fun-  
ctio qui spectan-  
tur.

Nervi in mu-  
sculis usus.

ERINDE sanè ac mortuorum sectio cuiusque partis numerum, situm, figuram, substantiæ proprietatem & compositionem accuratissimè docet: ita quoque uiui animantis sectio interim functionem ipsam manifestò ostendit, interim ad huius inuentionem ratiocinationes percommode exhibet. quare etiam meritò in mortuis animantibus primùm studiosi ueniunt exercitandi, ut postmodum actionem usumque partium inquisituri, promptè uiuum animal aggreddiantur. Cæterùm quum corporis permultæ sint particulae, differentibus actionibus usibusque dicatae: multiplices quoque uiuorum sectiones esse, neminem decet ambigere. In ossibus quippe, ut seriatim singula pertractemus, à uiuorum Anatome petimus, num corporis hæc optimum fulcrum ac firmamentum sint, numq; omnia his adnascantur, adstabilianturq;: quum enim uiui animantis os aliquod ruptum cernimus, uniuersum membrum fracturæ subiectum collabi, neque amplius firmari intuemur: quod quia crebrius casu obuenit, in ossium usu indagando, uiuorum sectionem nō magnopere requirimus. Cartilagine quoque similis ratione quædam firmare, quum franguntur, discimus: in articulo uerò alicuius dissectione, uidemus quid cartilago præstet, etiam si hanc in uiuo animante non obeamus. atque ita etiam ligamenti ossa colligantis usus in mortuis quoq; uisitur, ut & ligamentorū etiam trāsuer-  
sim tendinibus obduktorum. dum enim<sup>a</sup> trāsuerfum in brachialis interna se-  
de positum ligamentū diuidimus,<sup>b</sup> musculumq; digitorum secundos aut ter-  
tios articulos flectentem ad suum principiū trahimus, id uidemus in hoc po-  
tissimū factum, ut tendines, quo minus è sua sede exurgant, contineat. quan-  
quam id in cane uiuo etiam licebit cernere, si obiter cutem à cubito & manu  
liberaueris, & cultello trāsuerfum in brachiale ligamentum, &<sup>c</sup> alia quæ in  
externa ulnæ & radij sede ad brachiale habentur, diuiseris. mox enim quum  
canis suo impetu digitos flectet, & extendet, tendines è suis sinibus subleuari  
cernes. In hac etiam administratione musculorum actionem speculabere,  
quum illos in se, ubi maximè sunt carnei, colligi, crassescereque, & rursus pro-  
duci gracilesque fieri uidebis, prout collecti partem attrahunt, aut remissi e-  
ductiq; eam ab alio musculo in cōtrarium uelli sinunt, aut etiā alioquin suam  
collectionem non exercent. Neq; id hīc in cubito duntaxat est obseruandum,  
uerū altiùs ab eodem cane cutis est adimenda, ut brachium uniuersum axil-  
laq; denudetur, & nerui per axillam in id prorepentes appareant: ex illisq; ali-  
quem laqueo intercipias, cuius seriem in musculos quosdam pertinere cogno-  
ueris. Verū quum canis neruorum numerus distributioq; non admodum  
cum homine conueniat, suas erim, ut quum hanc sectionem in uiuo cane obi-  
turus es, mortuum quoq; ad manum habeas, in quo neruorum per brachium  
& cubitum excurrentium seriem didiceris, atque ita neruum aliquem in-  
ueneris, qui in musculos quosdam digeritur: uti ferè illi erunt, quorum al-  
ter in homine<sup>d</sup> tertius est, ac secundum anteriorem cubiti articuli sedem  
in cubitum fertur: alter uerò<sup>e</sup> quintus, secundum posteriorem interioris  
humeri tuberis regionem in cubitum properans. Huiusmodi enim nerui in  
cane etiam obseruantur, & illis alicubi priusquam ad cubiti articulum per-  
tingant ligatis, motus aboletur musculorum digitos & brachiale flecten-  
tium. unde si & illum neruum etiam uinculo interceperis, qui in homine  
mihi

a a. muscu-  
lab. 1.  
b b. 4. muscu-  
lab. 5. 5. 5.  
c.

c 2. muscu-  
lab. 1.  
characte-  
res 1. 2. 3.  
4. 5. 6.

d 2, 3. fi. ca.  
11. li. 4. 7. et  
cuiuslib. ult.  
figure T.  
e 2, 3. fi. ca.  
11. li. 4. 7. et  
ult. fig. m.

f. 2, 3. ff. ca. mibi<sup>e</sup> quartus numeratur, & secundum humerum ad externum ipsius tuber  
 11 li. 4. o. ff. porrigitur, etiam motus abolebitur musculorum brachiale & digitos exten-  
 ult. ff. g. e. dentium. Conduxerit autem huiusmodi nervos laqueis intercipere, quo illis  
 modò in hoc, modò in illo nervo solutis, musculorum motum restitui obser-  
 ues. Iam musculo alicui muris forma donato (quales hìc in cubito occurrunt  
 plurimi) longam sectionem induces, quæ uentrem totum penetret, ut mu-  
 sculi illius motum, huius sectionis gratia non perdi expendas. Dum aut trans-  
 uersam sectionem uentri induces, tantum musculi motum aboleri uidebis,  
 quanta erit sectionis profunditas. Quum uerò uentrem prorsus diuides, mu-  
 sculum ad insertionem ipsius una parte, alia uerò ad exortum colligi retrahiq;  
 obseruabis. Quòd si alterius alicuius musculi tendinè præscindes, musculum  
 uersus exortum còuelli cernes. Item si caput diuiseris, is ad insertionē contra-  
 hetur. Si uerò insertionē & caput unà abtruncaueris, musculus ad suum uen-  
 trem sedemq; quà maximè carneus est còglobabitur: itaq; musculorū functio  
 tibi hæc molienti erit obuia. Si aut priuatim nervi alicuius, aut peculiaris mu-  
 sculi functionē inquirendam duxeris, eum neruum & musculū, ut iam in bra-  
 chio & cubito faciendum præcepi, aggredieris. Neq; est quod hìc prolixè com-  
 memorem, qualiter in his administrationibus canes aut eius generis animalia  
 ligare còueniat, quum quisq; pro sua industria, si modò in mortuorū sectione  
 adamussim uersatus fuerit, hæc omnia rectissimè sit obiturus. Adeò ut de uiua  
 neruorū musculorūq; sectione, nihil dicendū supersit, quanquā & de neruis  
 recurrentibus paulo pòst quedā noua sese offerente occasione subiiciā. Vt aut  
 uideas num<sup>e</sup> nervi substantia, aut mēbranę illam inducentes, animalē uim præ-  
 cipuè porrigant, opportunè feceris, si cutem femoris tibię & pedis auferas, ac  
 primo femur mouentiū musculo à suis exortib. liberato, quartū femur per-  
 tentem neruū inquiras: & huius mēbranis à nervi substantia detractis, expēdas  
 quī pedis digiti ipsēq; pes adhuc moueantur, ipsēq; nervus concreditū sibi mu-  
 nus adhuc utcumq; exerceat. Verum si quis medullę dorsalis munus rimari sta-  
 tuisset, uisurus quī ea læsa, partes læsioni subditæ sensum motumq; perdant,  
 huic licebit canem ita asseri cuipiā aut trunco alligare, ut dorsum ceruicēq;  
 porrigat, quo dein grandiori cultro uertebrarum aliquot spinæ præscindi  
 queant, tandemq; dorsalis medulla ea sede nudari possit, qua illam quis secan-  
 dam arbitrabitur. nihil enim facilius est, quàm tunc uidere motum sensumq;  
 subditarum sectioni partiū aboleri. Cæterum in uenarum usu inquirendò,  
 uix quoq; uiuorum sectione opus est: quum in mortuis affatim discamus, eas  
 sanguinem per uniuersum corpus deferre, & partem aliquam non nutriri, in  
 qua insignis uena in uulneribus præscinditur. Item in arterijs, uiuorum sectio-  
 nem uix requirimus, quanquam licebit alicui<sup>e</sup> arteriam in inguina proceden-  
 tem nudare, uinculoq; intercipere, ac intueri, partem arteriæ uinculo subten-  
 sam non amplius pulsare. Atque ita leui negotio obseruatur in arterijs sangui-  
 nem natura còtineri, si quando arteriam in uiuis aperimus. Vt autem certio-  
 res fiamus, pulsandi uim non arteriæ inesse, aut contentam in arterijs mate-  
 riam pulsuum opificem existere, uerum à corde eam uirtutē pendere, præter-  
 quam quòd arteriā uinculo interceptā non amplius sub uinculo pulsare cerni-  
 mus, licebit inguinis femoris<sup>i</sup> ue arteriæ longam sectionem inducere, & cana-  
 liculum ex arundine tam crassum assumere, quanta arteriæ est capacitas: &  
 ita illum sectioni indere, ut superior canalis pars altius in arteriæ cauitatē per-  
 tingat, quàm sectionis superior sedes: & ita inferior quoque canalis pars, de-  
 orsum magis ipsa inferiori sectionis parte protrudatur: ac dein uinculum  
 arteriæ

Nervorum sua  
sua examiniDorsalis me-  
dulla.

Venarum

Arteriarum

g Intiman-  
 nervi substā-  
 tia, et duas  
 illi obdu-  
 ctas mēbra-  
 nas ostēdit  
 17 ff. ca. 14  
 huius libri  
 2, 3, 7.

h Vt in 10  
 mus. ita libe-  
 ratū est in  
 et uidetur

i 2, 3 ff. ca.  
 11 li. 4. cha.  
 71 c. ult.  
 figura 1, ult.

k ff. cap. 12  
 lib. 3. p.

arteriæ circundetur, quod ipsius corpus super canalem stringat. Quñ enim id fit, sanguis quidem & spiritus per arteriā ad pedem usq; excurret, uerūm tota arteriæ pars canali subdita non amplius pulsāt. Soluta autem uinculo arteriæ pars canali succedens, nō minus quā superior pulsū ostendit. Quāta uerō uis à corde per arterias cerebro deducatur, postea uidebimus: nunc Galeni uiuam in hac demonstratione confectionem summopere mirantes, qua omnia præscindi suadet quæ cerebro & cordi sunt cōmunia: semper omittens<sup>1</sup> arterias, quæ per trāsuerfos uertebrarū ceruicis processūs caput petūt, & etiā non mediocrem portionē uitalis spiritus in<sup>m</sup> primos duræ membranę sinus, atque ita etiam in cerebrum deferunt: adeò ut nō mirum sit, cerebrum diutius in illa administratione suo munere fungi, quā cōmodè Galenus fieri arbitrabatur. respirat enim in hac sectione diutissimè animal, & aliàs mouetur. si uerò currit, itaq; multo spiritu indiget, nō multo pōst concidit: quanquā adhuc postea cerebrū animalis spiritus substantiā recipiat, ab illis arterijs quas per transfuersos ceruicis uertebrarum processūs caluariā petere recensui. Ceterū hoc loco, ubi de uiuorum sectione obiter tantum pertractandum duxi, haud proposui Galeni aut rectè, aut minus rectè celebratas uiuorū sectiones cōmemorare: quum hīc abundè fecero, si perfunctoriè aliquot sectiones proferam singulis libris dicatas. Atque quum iam ad quintum usq; sit deuentum, modò de nutritionis organis sermonem instituemus, quorum munus ferè in mortuorum sectione etiam discimus. Videmus enim peritonēum omnium ipso complexorum organorum esse inuolucrum: omentum, ut & mesenterium, uasorum deductioni & distributioni optimè subseruire: uentriculum cibos & potum conficere, hosq; per stomachum huc deferri. Quanquam & uiuos canes, qui modò paulo aut multo antè cibum sumpserūt, uiuos aggredi, atque ita etiam intestinorum munus rimari, nihil prohibeat. Iecoris autem officium, ut etiam lienis, aut renum, aut uesicæ, in uiuorum sectione uix melius quā in mortuorum intueri possumus. nisi quis uiuo cani lienem excare uoluerit, uti & ego aliquando feci, diebusq; aliquot canem asseruauī. Atque ita etiā renem aliquando execuī: uerūm uulneris curatio molestior est, quā quæ hinc sumitur cognitio iucunda. nisi quis non tam organorum cognitionis ratione has sectiones aggredieretur, quā ut manū exerceat, ac abdominis uulnera aptè suere discat: quod & in intestinis studiosè experiendum est, quo quis uulnerata consue, atque in abdomen quum exciderint, imponere assuecat. Verūm hæc, perinde ac ofsius luxationes & fracturæ, quas in brutis aliquando molimur, exercendis potius manibus, & rectæ curationi instituendæ, quā organorum officijs indagandis conducunt. Porro uiuas sectiones instrumentorum generationi subseruientium, indies ferè in ramicum curationibus, & in animalibus quæ castrantur obseruamus. atque illæ propemodū uasis seminarijs & testibus spectandis sufficiunt: nisi quis illam quoq; addere uelit, qua cani testis substantiam ex tunica ipsi proximè obducta eximimus, aut etiam à seminarijs uasis testis substantiā unā cum illa tunica rescindimus. Verūm in fœtum uiua administratione iucundum est spectare, qualiter simulatque fœtus aerem ambientem contingit, respirare nititur. Atque hæc sectio opportunè in cane aut sue obitur, quum non multo pōst sus est paritura. Si enim ipsius abdomen ad peritonæi usque cavitatem diuiseris, atque dein uterum quoque in unius fœtus sede aperueris, ac<sup>c</sup> secundina ab utero liberata fœtum mensæ imposueris, cernes per pellucidas membraneasq; ipsius tunicas, qualiter is frustra respirare conatur, & uelut suffocatus moritur. si uerò fœtus inuolucra

fig. cap. 12  
lib. 3 F.

m 7 fi. P. p  
et Q. Q.  
9 fi. S. S. et  
T. T.

Eorum que per  
ritonæo conti-  
nentur funclio-  
num examen

Generationis  
organorum.

Fœtum.

m 14. fi. 30  
li. 5 F. et 2  
ta. K. et 3  
et 4. ta. Q.  
R.

pertuderis,



pertuderis, ipsiusq; caput illis liberaueris, mox illum ueluti reuiuiscere, & ele-  
ganter respirare cernes. Atq; quū id in uno foetu indagaueris, aliū aggredieris:  
quem ab utero nō liberabis, uerū apertū ex dicta iam foetus administratio-  
ne, uterū tantisper inuertes, & prius factæ sectionis labra extrorsum reflectes,  
dum alterius proximiq; foetus infima inuolucrorū pars sedes ue appareat, &  
hanc ad eam usq; regionem ab utero detegas, qua is exteriori foetus inuolucro  
connascitur: & qua ampla ea alienis subſtantiæ similis caro habetur, quæ uasa ex  
utero in exterius foetus inuolucrum pertinētia intertexit. Est enim hac admi-  
nistratio uasorū ille nexus integer asseruandus, & reliquū exterioris inuolu-  
cri ab utero detegendum, ut per pellucida foetus inuolucra arterias per ipsa di-  
stributas & umbilicū subeuntes, ad uteri arteriarū rhytmū pulsare, & foetū  
respirationem nudū conari moliriq; cernas: ac dein effractis pertusisq; inuolu-  
cris foetum tunc respirare, & inuolucrorū umbilicisq; arteriarū pulsum perire  
spectes, uteri arterijs adhuc cū reliquis extra ipsum arterijs pulsan-<sup>ibus</sup>. In cor-  
dis & pulmonis functionib; pleraq; expendimus, motū uidelicet pulmonis, &  
num aspera arteria eorū quæ bibūtur portionē assumat: dein cordis dilata-  
tiōe & constrictionē, ac num idē rhytmus sit pulsus cordis & arteriarū, item  
qualiter uenalis arteria distēdatur ac cōprimatur, & qui execto corde animal  
adhuc uiuat. In quibus obseruandis, magnoperē animali indigeremus latq; pe-  
ctoris osse donato, &° mēbranas thoracē intersepientes tam distātes obtinen-  
te, ut diuiso secundū longitudinē pectoris osse, sectionē inter eas mēbranas  
ad cor usq; ducere possumus, citra thoracis cavitatē (quib; pulmones cōtinen-  
tur) pertusionē. Verū quum nullū eiusmodi animal præter hominē, & non  
caudatam simiā occurrat, in canibus ac porcis, illisq; animalibus quorū nobis  
datur copia, sectiones ita sunt aggrediēdæ, ut prædicta omnia intuearis. Quod  
itaq; pulmo thoracis motū sequatur, hinc patet, quodd sectione in aliquo costa-  
rum interuallo ad thoracis usq; cavitatē ducta, læsi lateris pulmonis pars cōci-  
dat, neq; amplius cum thorace distēdatur, reliqua adhuc pulmonis parte tho-  
racis motū sequente: quæ etiā mox concidet, si & in altero latere sectionem in  
thoracis usq; cavitatem molieris. atq; ita animal, etiam si thoracē aliquandiu  
moueatur, nō minus morietur, quā si suffocatum esset. Verū in hac admi-  
nistratioe obseruandum uenit, ut sectionem quā proximē ad superiorem  
alicuius costę ducas sedē, ne ad inferiorē fortē, sectionē dirigēs, uasa hæc expor-  
recta pertundas. tum enim sanguis illinc profluere, qui aeris per uulnus im-  
missi & emissi gratia, spumofus redditus, pulmonis loco tibi imponeret. In-  
cautē enim secantib; eiusmodi spuma pulmo esse uidetur, ipsiq; pulmonē ali-  
quandiu etiā sua insita ui distēdi opinātur. Ut uerō naturalē pulmonis cū tho-  
race sequelā uideas, ex altero latere duarū aut trium mediarū costarum carti-  
lagines diffecabis: & sectionibus per illarum costarū interualla ductis, singulas  
costas extrorsum reflectes, ipsasq; franges, quo opportunā constituas sedē, per  
quam lateris illæsi pulmonē uidere queas. quum enim thoracē intercipientes  
membranæ in canibus admodum pellucidæ sint, perfacile est, per eas pulmo-  
nis partē thoracis motum adhuc sequentē intueri, ac illis etiam membranis  
leuiter pertusis considerare, qualiter & ea pulmonis pars intercizat. Prius-  
quam tamen eas pertundas, conduxerit<sup>ur</sup> arteriæ uenalis propagines in eam  
pulmonis partem, quæ iam concidit, manibus apprehendere, & aliquouſq; ab  
ipsis substantiam pulmonis liberare: ut discas, num illæ perinde atque cor mo-  
ueantur. Cordis enim motus etiam hīc tibi est conspicuus, præcipuē si cor-  
dis<sup>q</sup> inuolucrum diuiseris, & ab illo cor in eo latere detexeris, ubi hanc  
administratio-

*Cordis, ipsiq;  
subministrati-  
onem partium  
usq; examini*

02. fi. lib. 6.  
G, G, & I.

P. 6 fig. lib.  
G.

1, fi. lib. 6  
D, E, F.

adminiſtrationem moliris. Conduxerit uerò hanc in ſiniſtro latere tentari, ut ſcilicet dextra pulmonis pars adhuc moueatur, & unà uniuerſum arteriæ uenalis truncum manu commodè apprehendas. In huiuſmodi quoq; adminiſtratione non inutiliter cordis baſim amplectèris, unoq; uinculo uafa ab ipſa prodeuntia ſimul & ocyus intercipies, ac dein ſub uinculo cor execabis, ſolutisq; quibus animal colligatum eſt laqueis, currere ſines. Vidimus enim aliquouſq; etiã ita affectos canes, ſed præcipuè feles, cucuriſſe. Ceterùm cordis motus, ut & arteriarũ, rectiùs ſpectabis, ſi mox atq; canē aſſeri alligaueris, ſectionem à iugulo per coſtarum cartilagineſ, quã illæ oſibus continuantur, in utroq; latere acuto admodũ cultro duces, ac mox ab unius ſectionis ſine tranſuerſim ad ſinem alterius ſectionis, tertiam ſectionem in peritonæi uſq; cavitatē molieris, & leuato peſtoris oſſe cum ipſi coarctatis cartilaginibus, & ſep̄to tranſuerſo ab ijs liberato, peſtoris os ad animalis caput ſurſum refleſtes: ac mox diuiſo cordis inuolucro, una manu cor apprehendes, & alia arteriam magnam dorſo exporrectam continebis. Quanquã & hæc omnia melius obibis in ea uiua ſectione, quam inter alias utpote uberiorem in ſcholis exhibere cõſueui. atq; hanc ideo, ſimulatq; nõnulla de cerebro ſubiunxero, perſcribã proxiũs, ut ab alijs leuiori negotio quoq; aggrediatur. In cerebri igitur ipſiusq; partiũ examine, parum omnino in uiua ſectione uidendum eſt, quũ hĩc uelimũs noliũs, uel theologorum noſtratium cauſa, memoriã, rationem & cogitationem brutis animalibus adimere debeamus, utcunq; illis cum homine eadem ſit conſtructio: atq; ita Anatomes ſtudioſus, & in mortuorum ſectione uerſatus, nullaq; hæreſi infectus, probè intelligit, quã malè mihi conſultũ uelim, ſi quòd aliàs longè lubentiſſimè facerem, de cerebri uiua ſectione aliquid inſtuerem. Quòd tamen ad ſenſum & motum attinet, uidere eſt, cerebro ablato utrũq; perire. Atq; hĩc eadem indagandi eſt ratio, quam in neruorum adminiſtratione præcepimus. Num uerò cerebrum ſentiat, in homine uenit inueſtigandum: qui quũ id ſcinditur, aut premitur, indicet num dolore afficiatur, num uero quo cerebrum alteratur, ſentiat: uti in capitis uulneribus in dies experiri integrũ eſt. Ruſus caluariam canis poſſe frangi, & cerebri uentriculũ aut dextrum aut ſiniſtrum aperiri, ac quĩ animal motũ perdat, illumq; denuò occluſo uentriculo recipiat, neminem ambigere arbitror. Porro ſectionē quam me deſcripturum paulo antè pollicebar, in prægnante cane, aut ſue aggredieris: quanquam uocis occasione ſuem accipere magis conueniat. canis enim aliquandiu ligatus, utcunq; illum afficias, ſubinde neq; latrat, neq; ululat: itaq; uocis ablationem aut reſolutionē interdum expèdere nequis. Primũ igitur animal ut ſupinũ iaceat, anterioreq; colli ſedem, & liberũ corporiſ truncũ porrigat, aſſeri ita quãmpoteris ualidiſſimè pro tua induſtria rerũq; copia, alligabis.

r vii para  
ta eſt: fig.  
lib. 6.

Cerebri ſun-  
dium exa-  
men.

Viua ſectio,  
qua Anatomes ſpeculatio-  
ni in ſcholis co-  
lephon adhibe-  
ri ſoleat.

Hæc figura ſum aſſeri,  
quem uiuis ſectionibus admini-  
ſtrandi parare ſolemus, ac uſi-  
mo primi libri capite cõreliquis  
anatomicis inſtrumentis propoſui-  
mus, alligatũ cõſpicui, ut modus  
quo in noſtris ſcholis utimur, ali-  
qua ex parte foret obuius.



Nõ enim arduũ  
eſt, aſſerē quem-  
piã ſumere, cui  
foramina inſint  
ligadis cruribus  
apta: aut ſi nul-  
la adſint forami-

na, promptè aſſeri duo baculi ſubijciũtur, illisq; crura aduinciuntur. Inter cetera autem, ſuperioris maxillæ præcipua habèda eſt ratio, ut illa ualidè aſſeri firmetur. quod feceris catenulã, aut corda quapiam robuſtiora ante dentes caninos ligata, ac dein cuipiam aſſeris anulo, aut foramini, aut ut commodius du-  
xeris com-

xeris commissa, ut scilicet collum exporrectum, caputq; immotum sit, & interim animal liberè respiret clametq;. Priusquàm uerò animal ita uincitur, spectatoribus iam in mortuorū Anatome uersatis recensere soleo, quæ nam potissimum præsentī sectione sint uidentia, ne proluxa inter secandum dein enarratio operi obstat, idq; forsitan dicendo inturbetur. Mox itaq; longam in collo sectionem acutiori nouacula duco, quæ cutem & subiectos illi musculos ad asperam usq; arteriam diuidat: id cauens, nè sectio in latus aberret, uenamq; notatu dignam uulneret. dein manibus arteriam asperam comprehendo, & illam ab incumbentibus musculis digitorum duntaxat opera detegens, ad huius latera soporales arterias, illiq; attensos sexti paris neruorum cerebri neruos perquiro. dein recurrentes neruos lateribus asperæ arteriæ adnatos etiam obseruo, quos interdum laqueis intercipio, interdum præscindo: idq; primum ex altero latere, ut neruo hic intercepto præfecto ue dilucide obseruetur, quæ media uox pereat, totaq; ambobus neruis læsis intercitat: & si laqueos soluo, rursus redeat. id enim citò & citra insignem sanguinis fluxum expenditur, ac pulchrè auditur, quàm ualidam efflationem animal citra uocem moliatq; recurrentibus neruis cultello diuisis. Hinc ad abdomē uenio, & acuta ualidaq; nouacula sub spuriarum costarum cartilaginibus, mucronataq; pectoris ossis sede sectionem instar semicirculi uno ductu ad peritonæi usq; cavitatem molior: ex cuius sectionis medio ad pubem usq; aliam tento, quæ promptè succedit, si cultrum aut nouaculam peritonæi cavitati indemi, itaq; intestina & uterum foetibus distentū duabus illis sectionibus detegē, id sedulo studens, ut instantium quidā pollicē uasis obdat, quæ sub pectoris osse descendencia abdomen petunt. illa enim sola hæcenus multum sanguinis fundunt. Hic modò sectioni uiciniores hortor, ut manu<sup>b</sup> septo transuerso adhibita, ipsius motū experiantur: disitos aut, ut uentriculi & iecoris ueluti in thoracis cavitatē assumptionem & dimissionem spectent. Interea in altero thoracis latere longam sectionem ad costarum usq; ossa duco, ad eam ferè regionem, qua costæ in cartilaginē degenerant. & dein secundum costarum ossa transuersas sectiones molior, ut ossa incumbentibus musculis aliqua ex parte liberem: & insuper si operosiores administrationem sequi uisum sit, intercostales musculos in duobus costarum interuallis à tunica costas succingente auferam, ut dein mediam inter illa interualla costam solarum manuum auxilio à tunica costas succingente auellam: illaq; à sua cartilagine fracta, & deorsum in latus inflexa, magna tunicæ costas succingentis appareat amplitudo, quæ pellucida pulmonis motum utcunq; commonstret. Hac postmodum pertusa, uidetur quæ huius lateris pulmo cōcidat, thorace interim æquè ut prius moto. Ut uerò id magis reddatur conspicuum, plura costarum ossa à suis cartilaginibus libero, quàm possim maximè hoc thoracis latus<sup>a</sup> aperiens, ut commodè per membranas thoracem intersepientes, altera pulmonis pars, quæ in thoracis cavitata nondum læsa, pulchrè cum thorace mouetur, sese offerat: ac deinceps illis membranis pertusis, hæc quoq; mox à perforatione concidere & collabi uideatur.

Nunc in altero etiam latere acutiori cultro, una sectione costarum ossa à cartilaginib. libero, & à cartilaginibus pectorisq; osse septū transuersum refeco, ut cum cartilaginibus, os illud diuisis thoracē intersepientibus mēbranis, sursum ad collum reflecti queat, cordisq; inuolucrum in conspectu sit. quod ilico cultello aperiendum est, obseruandumq; quantum aquæ contineat, & quæ cor agatur. Verum cordis motui non diu animum adhibebis, quin potius animal iam ferè propter concidentem undique pulmonem suffocato succurres: ut dein

Speciæ si uisum fuerit figuram capiti 9 li. 4. impossitā.

Neruarum recurrentium examen, uocisq; eorum sectio ne abolitū.

a 6 muscu. tab. 4.

b 7 muscu. tab. 5.

Septi transuersi functionis examen.

c Inter T et S 6 muscu.

Pulmonis motum.

d Quasi parareur: fig. di. 6.

e Quasi 2 fil. 6. parareur.

Aquæ in cordis inuolucro repositæ, & cordis motui examen.



ut dein adamusim rursus cor arteriasq; & foetus in utero cōtentos, quamdiu uisum erit, examines. Haëtenus enim languinis fluxus parum incōmodi animali intulit, si modò illa quæ sub pectoris offe repunt uasa astans aliquis ob-  
 turauerit, ac pectoris os iam sursum ad collum reflexum iaciat, itaq; ob uaso-  
 rum obliquitatem illa nihil amplius fundant. quod & in uasis costis singulis exporrecis fit, quum costæ effractæ deorsum euertuntur: ipsæq; dum sectio-  
 nem administras, uasa tantisper dum obliquentur occludere admissis fueris. Ut  
 uerò uita animali quodammodo restituatur, foramen in asperæ arteriæ cau-  
 dice tentandū est, cui canalis ex calamo aut arundine in detur, isq; inflabitur,  
 ut pulmo assurgat, ipsumq; animal quodammodo aerem ducat. leui enim in-  
 flatu in uiuo hoc animali pulmo tantum quāta thoracis erat cauitas intumet,  
 corq; uires denuò assumit, & motus ipsius differentia pulchrè euariat. Inflato  
 igitur semel atq; iterum pulmone, cordis motum uisū tactuq; quantum lubet  
 examinas, & arteriæ magnæ caudicem dorso explicatam, aut in thoracis caui-  
 tate, aut ad lumborum uertebras comprehendis, & spectas pariter: nihilq; tibi  
 manifestius occurrit, quàm cordis & arteriarum pulsum rhythmus. quo ali-  
 quandiu obseruato, pulmo rursus inflandus est: hocq; artificio, quo mihi gra-  
 tius in Anatome nullum comperi, magna pulsum differentiarum cognitio  
 paranda uenit. Quum enim pulmo diu flaccidus concidit, undosus, formicās,  
 & uermicularis cordis arteriarūq; pulsus motus ue spectatur. inflato aut pul-  
 mone, magnus rursus & uelox efficitur, mirasq; inæqualitates proponit: & ut  
 semel dicam, hæc administratio eiusmodi est, qua omnium optimè pulsum  
 naturam medicinæ candidatis proponere soleo. Verum in horum examine  
 foetuum gratia nunc nō diu hæreo, sed in aliqua bicorni canis suis ue uteri se-  
 de, sectionem super foetum aliquem duco ad<sup>g</sup> exterius ipsius usq; in uolucrum  
 penetrantem: quo deinceps ab utero diuulso, foetum cum suis inuolucris exi-  
 mo, & exteriori effracto inuolucro, per interioris ualde pellucidū ostendo, qui  
 foetus respirare conetur, quamq; pulchrè interiori quoque inuolucro fracto  
 aerem ducat. Mox proximum foetum, quantum possum detego, uterum nula  
 ex parte ab exteriori inuolucro diuellens, ut hic ita foetus uasorum natura  
 examinetur, uti prius uiuam foetuum dissectionem faciendā præcepi. Quum  
 hæc molior, per interuallaq; pulmonem inflari curo, nondum cordis & arte-  
 riarum motus latet, uerum longo admodum tempore animalis uitæ succurri-  
 tur, & cordis<sup>h</sup> auricularum motus etiam promptè expenditur, perinde ac<sup>i</sup> ar-  
 teriæ uenalis, & uenæ arterialis: quas si non sat sit proximè ad cor tetigisse, in  
 aliqua pulmonis fibra ipsius substantiā à uasis unguibus discerpo, & quod hic  
 animaduertendum est, obseruari sino, 'dextrum postea cordis aperiens uen-  
 triculum, quo constet, qui cor illo etiam patente, nihilominus moueatur.<sup>m</sup> Si-  
 nistro insuper uentriculo unā ad aperto, aut media cordis parte transuersa se-  
 ctione<sup>n</sup> ablata, spectatores moneo, ut auricularū cordis motū nondū quiesce-  
 re intueantur. Dein si animali ante sectionē potum colore aliquo infectū por-  
 reximus, idq; cibos uarios seriatim ingesserit, cuiusmodi humor in pulmonis  
 asperæ arteriæ ramis occurrat, quæque ciborum in uentriculo sit series, per-  
 quiro: hac dissectione, toti Anatomiciæ speculationi colophonem in nostris  
 scholis perinde addens, atq; huic meæ de Humani corporis fa-  
 brica historiæ nunc illa finem impono.

Num cordis et  
arteriarū par  
pulsus sit, exa-  
men.

Foetus examē.

Arteriæ uena-  
lis, & uenæ ar-  
terialis motuū  
examen.

f. si lib. 6.  
B, C, D, E.

g Spectas  
mul tabe-  
las 30. figu-  
re lib. 5.

h 4. si lib. 6.  
1. K.  
i 6. fig. lib.  
6. G.  
k 6. fig. lib.  
6. I.  
l patet in 7  
fig. lib. 6.  
m patet in  
9. si lib. 6.  
n uti factū  
est in 11. si  
lib. 6.

# ERRATA POST LIBRI IMPRESSIONEM

AB IP SO AVTO RE ANIMADVERSA,  
sic emendabli.

In secunde paginæ Prefationis uersu 20. Alſcepiadum familia, tra. Pagina secunde figura ad tertiam eſt referenda, iuxta 6 lineam, 9. quarta ad ſup. 11. in margine huc attollendum eſt, Gal. lib. de Oſibus. 32. pars, cubitiar. 17. in figure indicis uerſu 11. quod 20. 31. libro 23. 20. accommodat 24. 42. dicit 31. 4. membræ uerſe fibre, quæ 33. 47. effigiem inibi 34. 22. ipſarum 35. 23. ſurſum per caua 37. 4. cavitatis & forme cuiuſdam qua oculos munire debet ergo 44. 33. illud retrorſum 51. 26. terminatur 62. 48. neruis hiſ 63. 37. cavitatis ad frontis oſis leuitatem in neceſſaria ipſius hic oculorum gratia caſſitie & forma, plurimum conferens, ca pax ſit, & qui oſis ueluti fibræ ſquammulisq; intertingitur, promptè 64. 48. formoſiſſimi 65. 32. de Nervorum diſ. 66. 14. an rea V 20. mamillarem 72. 18. quàm affabrè Na. 76. 27. quicquid etiam 81. 18. eſt, quo 86. 13. mucrones inſinuans 90. 47. proximis ipſi uertebriſ 97. 20. in margine, canibus plures quinq; 101. 48. ſinum 104. 56. medullæ 105. 28. quamq; ego 106. 47. mucronem ceſſantem con. 106. 4. effodiat. aut quod Galenus id perinde 6. quatuor eius oſia 114. 4. uertebrarum quam cor dandum eſt ſcapula (uti ſanè eſt uerſiſſimum) enaſci docet. Quan. 125. 11. primi 127. 1. proceſſu 129. 18. in margine, oſium maximum 37. huius 124. 4. oſtenditur 129. 16. uoce (quam Celfus interim appellato nobis cubito tribuit) clari. 142. 29. indice 143. 29. hoc 147. 19. longitidinem, quoniam oſſa inibi multo quàm ſuprà inſrag tenuiora ſunt, ipſa ab inuicem diſtuntur, & 45. uix poſi brachialis oſibus 149. 8. quod oſſa, ſi ſillum 10. qua manu ueluti unico tantum compoſita oſe 19. 1. quatuor digitorum oſis 23. in articulatione 29. exiguis uncis 132. 19. digitorum articulis occurrit, ſitu cum pollicis oſiculo reſpon. 21. obinet. Cæterum oſiaſa gitorum ſedem non nunquam reperiunt, tendinibus digitos extendentibus ad omnes ſerè articulos calli in modum innata, aut tendiuntur, & dein ſolipedum ſerè non autem biſulcorum talo 186. 44. lateris proceſſum 190. 10. ratio, oſiculorumq; ſeſamo compa ri huc quæ, non 192. 22. ut uerſe 193. 26. lit, puerulorū oſſa coquuntur, quum ſcilicet in 194. 25. lubinant 45. reſciendās 197. 37. ad aperturam 199. 12. iugalibus oſibus traieciſus, & 44. oſibus, ex 200. 23. quo 206. 1. illorum alicui tantum figure peculiaris ſit 207. 13. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

# RERVM ET VERBORVM IN PRAECEDENTIBVS DE HVMANI COR-

PORIS FABRICA LIBRIS MEMORABILIVM INDEX,

*in quo litera a & b numeris adiecta, superiorem & inferiorem pagina  
partem significant.*



<b>BARTI-</b>	abhaumos	207 b	duos obtinuiffe meatus, quo.
<b>culatio</b>	abhans os	ibid.	rū unus semini, alter uero u.
15 a	acceptabulum	ibid. a	rinæ destinatus erat
<b>Abdo-</b>	12 b	adoren	206 a.
<b>men cur</b>	accolarum Alpium, quæ Stiriam	adensacem	287 a
<b>summus</b>	spectant, deformitas	25 a	Aegyptiorum mos in uirginibus
<b>rerū O-</b>	acetabulum	12 b	proximè nupturis obstruatus
<b>pifex of-</b>	acetabulum femori articulando	653 b	653 b
<b>se desti-</b>	paratum	158 b	Aegyptiorum pudendū muliebris
<b>tutū ne-</b>	acetabulum herba	669 a	cariculas amputādī mos
cessariō creati uoluerit	acetabulum in coxendicis osse &	669 b	653 b
<b>Abdominis membrana</b>	humero	67 b	acer qui in respiratione digeratur,
591 a	acetabuli nomē ad quæ tertio fue	670 a	cordisq; & ipsius subministran
<b>abdominis musculi</b>	rit deductum	670 a	tium partium functionis enu-
334 a	acetabula, quæ secundō à ueteri-	669 b	meratio
<b>abdominis musculi trāsuersi</b>	bis fuerint appellata	669 b	708 a
336 a	acetabulorum uteri examē	697 a	aceræ substantiæ reficiendæ quas
<b>abdominis musculi trāsuersi à pe-</b>	acies digitorum quæ	208 a	partes natura fabrefecerit, &
<b>ritonæo separatu difficiles. i.</b>	142 b	207 b	quæ priuatim uitālī spiritali
<b>bid. b</b>	122 b	123 a.	708 a
<b>abdominis musculorum admini-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>stratio duplex</b>	207 b	207 b	708 a
337 b	207 b	207 b	708 a
<b>prior, qui</b>	207 b	207 b	708 a
<b>sic à musculorū exortu oblique</b>	207 b	207 b	708 a
<b>descendentis</b>	207 b	207 b	708 a
ibid.	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculi trāsuersi</b>	207 b	207 b	708 a
338 a	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorū altera ad-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>ministratio, uersus ipsorum ini-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>ria oblique descendens</b>	207 b	207 b	708 a
339 a	207 b	207 b	708 a
<b>oblique ascendens, recti &amp;</b>	207 b	207 b	708 a
<b>transuersi</b>	207 b	207 b	708 a
ibid.	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorum delinea-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>tio oblique descendens</b>	207 b	207 b	708 a
218 a	207 b	207 b	708 a
<b>ascendens</b>	207 b	207 b	708 a
219 a	207 b	207 b	708 a
<b>recti</b>	207 b	207 b	708 a
225 b	207 b	207 b	708 a
<b>transuersi</b>	207 b	207 b	708 a
ibid.	207 b	207 b	708 a
<b>in Abdominis musculorū descri-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>ptione uariis Galenus</b>	207 b	207 b	708 a
336 b	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorum functio-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>nem inepte medicorū uulgu-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>s assignare</b>	207 b	207 b	708 a
337 b	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorum octo ad-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>ministratio</b>	207 b	207 b	708 a
683 b	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorū octo descri-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>ptio. 334 a oblique descenden-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>tis. ib. ascendens. 335 a. rectorū</b>	207 b	207 b	708 a
<b>descriptio. ibid. b transuerso-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>rum</b>	207 b	207 b	708 a
336 a	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis octo musculorum bre-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>uis enumeratio</b>	207 b	207 b	708 a
334 a	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorum uenæ, ac</b>	207 b	207 b	708 a
<b>arteriæ</b>	207 b	207 b	708 a
555 b	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculorū usus</b>	207 b	207 b	708 a
336 b	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis musculos solos nouis-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>se uidetur medicorum uulgu-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>337 a</b>	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis recti musculi admini-</b>	207 b	207 b	708 a
<b>stratio</b>	207 b	207 b	708 a
338 b	207 b	207 b	708 a
<b>transuersi</b>	207 b	207 b	708 a
339 a	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis recti musculi pars,</b>	207 b	207 b	708 a
<b>qua simia abundans, &amp; canes</b>	207 b	207 b	708 a
336 a	207 b	207 b	708 a
<b>abdominis sectio</b>	207 b	207 b	708 a
682 b	207 b	207 b	708 a
<b>in Abdomine cādidiō linea</b>	207 b	207 b	708 a
338 a	207 b	207 b	708 a



- ἀνατομή 282 a  
 ἀνατομία 13 b  
 ἀνατομία, seu ἀνυσ, membrana cu-  
 iusmodi, & cur à ueteribus ita  
 dicta 671 b. 673 b  
 ἀμφιβλυσσοειδής inuolucrum 803 a  
 ἀμφιβλυσσοειδής tunica 517 b  
 amygdalæ faucium quæ 721 b  
 Anatomes professores ridiculè  
 hæcenus renum officium pro-  
 posuisse 691 a  
 ad Anatomes studium prouehen-  
 dum, præfectorum Italorum  
 diligentia & amor 682 a  
 ad Anatomem cuiusmodi corpus  
 adhiberi conueniat ibid.  
 in Anatome docenda, ostenden-  
 daq; quis ordo seruandus 681 a  
 anatomici hæcenus obseruata ra-  
 tio inutiles 190 a  
 anatomicorum de intestino cæ-  
 coniugæ 610 b  
 anatomicorum de pylori situ er-  
 ror 598 a  
 anatomicorum de uenæ causæ ex-  
 ortu, prolixè esse disceptatio-  
 nem 455 b  
 anatomicorum de uentriculi cel-  
 lulis error 598 b  
 anatomicorum de uentriculi exte-  
 riori tunica nimis in fundo  
 carnosa, error 599 a  
 anatomicorum uulgaris placitis  
 non leuiter acquiescendū 746 a  
 anatomicis ueteribus auditus of-  
 fuscila incognita fuisse 206 b  
 anatomici operis & inchoandi &  
 absoluedi, quæ nā Vesalio præ-  
 cipui autores extiterint 462 a  
 anatomicorum commentū, quæ bi-  
 lem in suam uesciculam asserua-  
 ri docent, ut secur à putredine  
 uindict 626 a  
 anatomicorum de cordis ossè la-  
 psus 117 a  
 anatomicorum instrumentorum  
 delineatio 200 a  
 anatomicos in orificiorum cor-  
 dis numero recedendo uariare  
 736 b  
 Anchæos 208 a  
 anchoræformis processus 207 b  
 ἄγκυον 135 a. 208 a. 207 b  
 ἄγκυροειδής processus 121 a. 207 b  
 Ioan. Andræ Albij, Hippocrati-  
 cæ medicinæ apud Bononien-  
 ses professores clarissimi, ho-  
 spitalitas 96 b  
 de Animæ facultatibus acfede cō-  
 siderare, medici quoq; officii  
 741 b  
 animarum immortalitatis atque  
 euentus disputationem solos  
 Theologos sibi uendicare 154 a  
 ἀνδρῶν 208 a  
 anima Galeno quid 708 b  
 animæ species tres 741 b  
 animalī spiritui materiam uitalē  
 suppeditare 273 a  
 animellæ quæ 722 a  
 annuli, quo Turcæ sagittantes u-  
 tuntur, effigies 187 a  
 annulum aureum imprudenter à  
 quodam deglutitum, eundēq;  
 sueno excreuit, Galenus re-  
 tulit 597 a  
 ἀνὰ κοιλίαν 346 b  
 ἀνάνυσον OS 208 a  
 ἀνὰ σπῆναι aut ἀνὰ σπῆναι dicta Herodo-  
 to, cutis humana 227 a  
 ἀνάνυσον OS, sacri ossis lateribus cō-  
 missum 155 b  
 ἀντρίδης faucium glandulæ quæ  
 721 b  
 ἀντρίδης 169 a. & 171 a. 208 b  
 ἀντρίξ 171 a  
 annulus ibid. a  
 anum referens in cerebro orifi-  
 cium 397 b  
 ἀντρίξ dicta arteria 791 b  
 ἀντρίξ 486 a  
 ἀντρίξ, id est eneruatio 15 a  
 ἀντρίξ, id est eneruatio 261 a  
 ἀντρίξ 482 b  
 ἀντρίξ 9 b  
 ἀντρίξ cum ἐπιφύω subinde ab  
 alijs confundi 10 b  
 appendix 8 a  
 appendices in ætate prouectiori-  
 bus pertinacius adhærere ib. b  
 appendices interdum ossium ca-  
 pita Galeno dicta 11 b  
 appendices non solum grandio-  
 ribus ossibus contingere 9 a  
 & quibus potissimum eod.  
 appendices sinuum medullam cō-  
 tintentes, non esse opercula 8 a  
 appendicē femoris, ilium ossis,  
 &c. delineatio 6 b  
 applantatio 8 a (rentiæ 10 a  
 appendicem & processum disse-  
 ctandi 61 b  
 aqua in cordis inuolucro cuius-  
 modi 728 b. ejusq; causa ibid.  
 aqua intercuti laborantis lien cu-  
 iusmodi 627 b  
 aqua in cordis inuolucro reposi-  
 tæ, & cordis motuum examen  
 823 b  
 aqua nouem libras in puellæ ce-  
 rebri cauitate repertas 24 a  
 aqueus humor 805 a  
 Arabes, tres in pene meatus, cum  
 unus tantum sit, falso enume-  
 rasse 650 b  
 ararum copia in confusione no-  
 minum improbata 453 b  
 aratum doctrina, de musculis ul-  
 rilibus & muliebribus impro-  
 bata 340 b  
 ἀργυροειδής dicta oculi tunica 801 b  
 ἀργύρον intestinum 611 b  
 arcualia ossa 206 b  
 arcualia futura ibid. a  
 aresfatu 208 b  
 Aristoteles de numero costarum  
 in homine, notatus 111 a  
 Aristoteles quid sub nerui nomi-  
 ne præcipuè intellexerit 19 b  
 Aristotelis de crurum in animali-  
 bus flexiones dogma 175 b  
 Aristotelis de auditorij organi  
 meatibus, lapsus 66 a  
 Aristotelis sententiæ de dentium  
 numero notata 58 b  
 Aristotelis locus de articulo-  
 motu 85 a  
 Aristotelem, ubi de epiglottide a-  
 git, perperam ab interpretibus  
 intellectum 188 a  
 Aristotelis omenti pars colon dor-  
 so colligens, pro omento non  
 habita 605 a  
 Aristotelis de lienis usu, senten-  
 tia expensa 629 a  
 Aristotelis de postbrachialis ossi-  
 bus sententia 146 b  
 Aristotelem falsò cordis inuolu-  
 cro pinguedinē tribuisse 727 b  
 Aristotelis de quadrupedum ge-  
 nu articulo lapsus 175 b  
 Aristotelis de feminalibus arte-  
 rijs sanguine destitutis opinio  
 reiecta 646 a  
 Aristotelis notata sententiæ de sen-  
 su cutis 278 a  
 Aristotelis de septo transuerso sen-  
 tentia 348 a  
 Aristotelis lapsus de futurarum  
 in uiris ac mulieribus differen-  
 tia, deq; canum caluarijs 32 b  
 Aristotelis de tertio cordis uentri-  
 culo lapsus 736 b. item de uen-  
 triculorum numero pro anima-  
 lium mole uariare solito ibid.  
 Aristotelis nullam generandi se-  
 minis uim testibus tribuentis,  
 sententia 647 b  
 Aristotelis de mammillarum 791  
 χυλῶν sententia 677 b  
 Aristotelis de mammillarum situ  
 ratio, non omni ex parte uera  
 699 a  
 Aristotelis locus de ossium per-  
 clauum connexu, & de situ tali  
 18 b  
 Aristotelis de thorace sententia  
 110 a  
 Aristotelis de ossium continuï-  
 te locus 19 b  
 Aristotelem feminarum uescicam  
 adeò in corporis alto reposita,  
 non uerè arbitratum esse 296 a  
 Aristotelem hominī octo costas  
 tribuisse 111 a  
 Aristotelis libri de animalium hi-  
 storia 111 b  
 Aristotelem nō esse audiendū, quæ  
 ab aure ad cerebrum nullū pen-  
 dere meatum asserat 66 a  
 amalia ossa 206 b  
 armus summus 270 b  
 armi summi nomina ibid.  
 arquato laborantis lien cuiusmo-  
 di 627 b  
 arteria quid, & quis eius usus  
 439 a

- arteria ad humiliorem mesenterij  
sedem 491 b  
arteria *dextra* Aristoteli quæ 486 a  
arteria dextri & sinistri lateris ab  
umbilico in magnam exporre-  
cta 556 b  
arteria dextrum brachium petens  
488 b  
arteria pubis ossis foramen transi-  
ens 492 b  
arteria apoplectica, lethargica,  
somnia subeteni, quæ 482 b  
arteria Hippocrati, Platoni & A-  
ristoteli, quæ 439 a  
arteria ac uenæ in musculorum fa-  
brica usus 261 a  
arteria ac uenæ, uentriculum pe-  
tentes 599 b  
arteria ac uenæ gracilium intesti-  
norum 609 b  
arteria & uenæ coli & recti inte-  
stini 612 a  
arteria cauum iecoris, & bilis ue-  
siculam petentis figura 559 a  
arteria cur cauæolum iecoris se-  
di exporecta 522 b  
arteria cur pluribus tunicis quam  
uena, conformata 440 a  
arteria aspera ex quibus consistet  
185 b  
arteria aspera respirationis instru-  
mentum, ac uocis principalis  
organum 185 b  
arteria aspera uteribus cur pri-  
mum simpliciter fuerit appella-  
ta 714 a  
arteria aspera cartilagines quo-  
modo inuicem colliguntur. 717 a  
arteria aspera cartilaginū coor-  
dinationis ratio 719 b  
arteria aspera commissæ corpora  
714 b  
arteria aspera connexus 715 b  
arteria aspera cõstitutionem cur  
cartilago subeat 718 b  
arteria aspera duæ tunicae, exte-  
rior, 717 a interior ibid.  
arteria aspera, & ipsius cartilagi-  
num figura 184 b. 185 a  
arteria aspera examen 752 a  
arteria aspera exterior superficies  
qualis. 715 b. item interna 716 a  
arteria aspera fabricæ cõstructio-  
nis necessitas 718 a  
arteria aspera appellatio quando  
cœpta 439 b  
arteria aspera figura. 184 a eiusq;  
cartilaginum descriptio eod.  
& 185 per totum  
arteria aspera forma 715 a  
arteria aspera gratia datum homi-  
ni collum 77 a  
arteria aspera membraneam sub-  
stantiã oportuisse extrui 718 a  
arteria aspera natura ubi pertra-  
ctetur 185 b (714 a)  
arteria aspera numerus ac situs  
arteria aspera pulmonĩ insertæ  
delineatio 707 a
- arteria aspera substantia quib. car-  
tilaginibus constituitur 716 b  
arteria aspera tunicas aptissimè  
extructas esse 719 b  
arteria aspera usus præcipuus  
quis 726 a  
arteria aspera usus, ipsiusq; con-  
structionis ratio. 717 b. situs ra-  
tio ibid.  
arteria cõstructionis ratio 440 a  
arteria corpus quale, & duæ ipsi-  
us peculiare tunicae 439 b  
arteria in femore series 493 a  
arteria magna, eiusq; ortus 736 a  
arteria magna unde principiū du-  
cat, & in quos ramos ipsius  
pars ascendens digeratur. 483 b  
arteria magna quartū cordis uas,  
eius que orificium cuiusmodi  
736 a  
arteria magnæ membranæ cuius-  
modi 739 a  
arteria magnæ ortus disceptatio-  
nem apud medicos & philoso-  
phos longè minorē esse, quam  
de uenarū neruorumq; princi-  
pijs 485 b  
arteria magnæ ortus non contro-  
uersus ibid.  
arteria magnæ per thoracem & iu-  
gulum & collū distributionis  
examen 749 b  
arteria magnæ caudicis biparti-  
tio, 486 b. partis ascendentis di-  
stributio, ac primū quæ ad sini-  
stri lateris primam costam obli-  
quæ tendit ibid. quæ sinistram  
axillā petit. 487 b. quæ dextrā  
ibid. maior portio superiora  
corporis petens. 488 b. sopora-  
lis sinistra. ibid. dextra. ibid. so-  
poralis ad caluariæ series 489 a  
arteria magnæ per uniuersum  
corpus delineata distributio  
483 a. eiusdemq; in duos trun-  
cos bipartitio. 482 a. ascenden-  
tis partis delineatio. ibid. quæ  
axillam petit. 482 b. soporariæ  
utriusque delineatio. ibid. calu-  
ariam petens 484 a  
arterie partis descendentes distri-  
butione delineata. ibid. b quæ ad  
inferiora costarum interual-  
la, septum. iecur, bilis uesicam,  
uētriculum, lienem, duodenū,  
coliq; partem. 484 b. 485 a. quæ  
ad renes utrinque ibid.  
arteria magnæ trunci amplioris  
descendentisq; in suos ramos  
series 489 b  
arteria magnæ truncorum diui-  
sionis supra os sacrum factæ  
series 492 a  
arterie omenti 606 a  
arterie ortus 456 a  
arteria magnæ supra os sacrum fa-  
cta diuisio, eiusq; supra cauam  
ascensum. 492 a. partium huius-  
sæ diuisionis distributio, ibid.
- quæ pubis ossis foramen tran-  
sit. ibid. b. per femur, tibiam &  
pedem distributio 493 a & b  
arteria magnæ & cauæ uenæ di-  
stributionum sub osse sacro ex-  
amen 690 b  
arterie magnæ super cauam ue-  
nam ascensum, ambarūq; supra sa-  
cri ossis initium diuisio 492 a  
arterie magnæ series in peritonæi  
amplitudine quomodo obser-  
uanda 690 b  
arteria magnæ in mesenterij ex-  
kursus 616 b  
arteria magnæ seu arterialis uenæ  
radicis figura 116 b  
arteria magnæ cum corde situs  
delineatio, 702 b eiusdem ori-  
ficium 703 b  
arteria magnæ nō idē cum stomi-  
cho per septum foramē 594 b  
arterie partis descendentes distri-  
butione. 489 b. quæ ad inferiora  
costarum interualla. ibid. ad  
septum transversum 490 a. quæ  
ad omentum, iecur, bilis uesicu-  
lam, uentriculū, lienem, duode-  
nū, coliq; partē accedunt porti-  
uncule. ibid. ad mesenterij &  
renes. 491 a. ad partem mēsen-  
terij humiliorem, & ad lumbo-  
rum uertebras, ad carnes abdo-  
minisq; latera ibid. b  
arteria ortus sedes 485 b  
arteria præcipua mesenterij ac-  
cedens 491 a  
arteria ramis, cuius pulsus ante  
brachiale exploramus. 488 a. e-  
iusdemq; delineatio 483 a  
arteriam soporalem non ferri per  
idē foramē cū tertio & quarto  
neruorum parti 65 b (636 b)  
arteria, in uelicā distributa ratio  
arteria neq; à cerebro, neq; ab ex-  
tremis corporis partibus nasci-  
tur 485 b  
arteria tertiæ series 500 b  
arteria uenalis, eiusq; ortus 735 b  
arteria uenalis quid 503 a  
arteria uenalis appellatio, & de-  
scriptio eius, &c. 738 a  
arterie uenalis eiusq; orificij de-  
lineatio ubi querenda 735 a  
arteria uenalis membranæ cuius-  
modi 738 a  
arteria uenalis & magnæ mēbra-  
nularum usus 745 b  
arterie uenalis ad cordis basim &  
pulmonem connexæ delinea-  
tio 702 b  
arteria uenalis pulmonĩ insertæ  
delineatio 707 a  
arterie uitalem spiritum fœtui de-  
ferentes 636 b (lis. 726 b)  
arteria uenalis pulmonĩ cur sit uti  
arterie uenalis in corpore ratio  
745 a. eiusdem usus 726 a  
arterie uenalis, & uenæ arterialis  
motuum examen 824 b  
arterie

# I N D E X.

arteriæ ad inferiora costarum in-  
terualla. 489 b. ad septum trā-  
uersum 490 a  
arteriæ ad lumborū uertebras &  
carnes abdominisq; latera. 491 b  
arteriæ coronales. 486 a. earūq; de-  
scriptio & ortus 492 b  
arteriæ duæ 441 a  
arteriæ ac uenę renib; sublata. 491  
a item ab umbilico 492 b  
arteriæ seminales. 491 a. carun-  
dem delineatio 484 a  
arteriæ seminales quando in ortu  
obseruadæ. 690 b (pertes. 646 a  
arteriæ seminales, an sanguine ex  
arteriæ supra sacros diuisio deli-  
neata. 484 b per crura distri-  
butio 483 a  
arterię tunicę peculiāres binę. 439  
b tunicę albiticię 440 a  
arteriæ tres ex altero latere calu-  
rię subeites. 496 b quę in pri-  
mū durę mēbranę sinū exhau-  
riuntur. ib. tertię caluariam pe-  
tentis arterię series. 500 b om-  
nium delineatio 502 a & b  
in Arteriārū ac uenarum natura  
artificium 441 a & b  
arteriarum Anatomes ratio. 687 a  
arteriarū p abdominis mūsculos  
reperitū administratio 683 b  
arteriarum per brachium & manū  
tendentium examen. 815 b. 816 a  
& b per crura 817 a  
arteriarū diductibus subditæ glā-  
dula 794 b (ratio. 522 b  
arteriarum in iecur excurrentiū,  
arteriarū & uenarū in animalinū.  
merus 440 b (atio. 494 b  
arteriarū & uenarū cerebri deline-  
ationem & uenarum in intesti-  
nis ratio 614 b  
arteriarum examen 819 b  
arterias naturam recondere. 488 a  
arterias neq; a cerebro, neq; extre-  
mis corporis partib; nasci. 485 b  
arterialis uena, eiusq; ortus. 735 b  
arterialis uena quid 503 a  
arterialis uenę, ac arterię uenalis  
delineatio 502 a  
arterialis uenę membranę 738 b  
arterialis uenę membranarum o-  
rificij ratio 744 b  
arterialis uenę orificij ac membra-  
narum examen 751 b  
arterialis uenę usus præcipuus  
quis 726 a  
arterialis uenę usus, & ipsius con-  
structionis ratio 743 b  
ἀρθροειδής ibid. (natura. 16 b  
ἀρθροειδής quando constituitur  
ἀρθροειδής 11 a. 15 a. 20. b  
ἀρθροειδής 15 a  
articulus 11 a. 12 a. 15 a. 20. b  
articulatio 15 a  
articuli capitis motib; parati 85 a  
articuli duplices quib; modis for-  
mentur 17 a  
articuli ossa mutuo esse contigua,

neque ab inuicē abscedere. 87 a  
articulum Hippocrates & Gale-  
nus quid nominarint 11 b  
articuli 208 a  
articuli ascendētib; & descen-  
tib; processibus parati 73 b  
articuli cur diuersa cōpositionis  
forma connectantur 15 b  
articulorū cōpositionis triplex  
forma 16 a  
articulorum maxillę ligamenta  
296 b  
articulorum motus non eadem ra-  
tio 15 b  
articulorum quibus digitorū ossa  
inuicem & cōterminis ossibus  
commititur ratio 150 a  
articulos omnes non iisdē agi mo-  
tibus 15 b  
artuum capita, non rectē ἐπιφύεσθαι  
& κινῆσθαι a Galeno dici 11 b  
arundo maior cruris. 208 b. minor  
cruris ibid.  
arundo maior & inferior brachij  
208 a. minor brachij 207 b  
ἀρὺν ἄνω, ἀρὺν ἑσθλὸν ἢε cartilago. 187 a  
ἀσείδ 207 b  
ἀσέδ 208 a  
ἀσείδ 207 b  
ἀσέδ 206 a  
ἀσέρος 207 b  
ἀσέρος uiuis sectionibus accom-  
modi 202 b  
ἀσέρος nexus 18 b  
ἀσέρος 176 a. 208 b  
ibid.  
Athlas uertebra 207 a  
Athlantis nomē a quibusdam se-  
ptimæ duntaxat ceruicis uerte-  
brę attribui ibid.  
ἀυτίον 12 a. 207 a  
auditorius meatus 66 a  
auditus instrumentum. 806 b. idē  
anatomicis parū probē cogni-  
tum 516 b  
auditus organum examen 814 b  
auditus organi ossicula quatuor  
188 b  
auditus organi ossiculorum usus  
45 b. & harmonia ibid.  
auditus organo parata cavitās  
magna, & foramina ab ipsa edu-  
cta, ac demum quinti paris ner-  
uorum in illam series 44 a  
auditus organorū cōstitutio. 45 b  
Augustanę mulieris texticris li-  
storia 627 b (45 b  
auditus ratio difficilior cognitū  
aures nonnullis hominibus mo-  
ueri 288 b  
auricula sinistra cordis 740 b  
auriculę dextrę cordis substantia  
& nexus ibid. a  
auris cartilago 183 a  
auris cartilaginis usus ibid.  
in Auris pinnula cur nulla cartila-  
ginis portio exporrigatur ib.  
auris utriusq; cartilago 189 b

aurium ossa. 206 b situs 22 b  
aurium iecoris situs 618 b  
axillaris uenę & humerarię per  
brachium, cubitum, & manum  
series 469 a  
axillaris uenę in brachio cōnstitu-  
tis series 470 b  
axillaris uenę in duos truncos  
præcipua distributio 471 a  
axillaris uenę portionis cutē sub-  
euntis series ibid. b  
ἀξὺν ἑσθλὸν dicta uenę ortus 86 b  
B 461 a



Alusta os, seu nux  
208 b  
basillare os, siue baxil-  
lare 206 b  
basillare nomen, cuneiformi ossi  
priuatum inditum 206 b  
βασιλῆος, 13 b. qui Hippocrati dicā-  
tur. ibidem 130 b  
βελγῶν 263 a  
Belgarum capita cur sint oblon-  
ga 23 b  
Beltoarmati insignis iuriscōsul-  
ti historia 628 a  
Βελτοαρμῶν processus 38 b. 206 b  
bilis flauę meatus cur intestinis  
& non uentriculo implantetur  
625 b  
bilis flauę natura & munus. ib. a  
bilem flauam quod expurgari con-  
duxerit 624 b  
bilis in intestina defluxus utilitas  
626 b (tio. 622 b  
bilis meatum in iecore situs ra-  
tio 752 b  
bilis uesciculę examen 629 a  
bilis uesciculę, eiusdēq; meatum  
delineatio 629 a  
bilis uesciculę in uentriculū mea-  
tus. 601 b. in iecore. 621 a. corūq;  
situs ratio 622 b  
bilis uesciculę meatus cur duode-  
cim infertus 624 a  
bilis uesciculę meatus duodeno  
infertus an propaginem uentri-  
culo offerat ibid.  
bilis uesciculę meatus in iecore  
621 a  
bilis uesciculę meatus portionem  
in uentriculum porrigi nullam  
uel minimā, præterquā in uno  
tricemliū pontificis remige Ve-  
salium animaduertisse 624 b  
bilis uesciculę situs, forma, sub-  
stantia, uenę, arterię & nerui  
623 a  
ex Bilis uescicula meatū in uētricu-  
lum nō semper deduci 624 b  
bilis uescicula carentes quosdam  
reperiri, ab Aristotele & Plī-  
nio memorię proditum 625 b  
bili excipiēdæ & emittendæ mea-  
tus parati 623 b  
biliosus naturis quid sit familia-  
re 625 b  
βίβλη 57 b  
Boum scutiformis cartilago, ab  
Bb 3 hominis



hominis quantum uariet 186 a  
 Brabantis omentum plumæ nomine dici 607 a  
 brachiale quid 208 a  
 brachiale ab ulna diuidens cartilago 139 a  
 brachiale mouentium musculorum administratio 388 a. primi & secundi. ead. tertij. 390 a. quartij 391 a  
 brachiale mouentium musculorum descriptio. 378 a. primi. ib. secundi & tertij. ibid. quartij 379 a. musculorum omnium minus ibid.  
 brachiale mouentium musculorum delineatio. primi. 222 b. secundi. 219 a. tertij. 236 a. quartij 241 b  
 brachiale octo ossibus constructum inter se forma differentibus 142 b  
 brachiale proprio motu in supinum & prouum non agi 379 b  
 brachialis addorsum proportio. 175 a  
 brachialis cum radio articulatione 139 a  
 brachialis cartilaginofum os quodnam ueteribus dictum 144 a  
 brachialis cur duo ossium ordines 143 a  
 brachialis primus os quot ossibus conterminum sit. 144 b. quot secundum & tertium. ibid. quot quartum, quintum, sextum, septimum & octauum 145 a b  
 brachialis ossis nomina 208 a  
 brachialis ossa, quibus se debent, ligamentis, & cartilagine obducuntur 143 a  
 brachialis ossa quot alijs ossibus contermina 144 b  
 brachialis ossa necessentium ligamentorum descriptio 385 a  
 brachialis ossium delineatio 141 a  
 brachialis ossium nomina 143 b  
 brachialis quartum os, quæ sibi peculiariter uendicet. 143 b. cui ossi committatur 144 a  
 brachialis quartum os, cui ordini ascribendum ueniat ibid.  
 brachialis quinti ossis processus 146 a  
 brachialis rectum os appellatum cuiusmodi 144 a  
 Brachion, brachium 129 a. 207 b  
 Brachionia quid appellet Hippocrates 123 a  
 brachium paruum 207 b  
 brachii parui nomina ibid.  
 brachium totum. manus Hipp. & Galeno dictum 142 b  
 brachii adiutorium. 207 b. canna, eod.  
 brachij, cubiti & manus excoriatione 388 a  
 brachij motus 15 b. & quot 311 a  
 brachij motorum musculus qui cipiæ a Galeno descriptus. quo similes & canes abundant, homi-

nes carent. 317 a. eiusdemque descriptio. ibid. & administratio 318 b  
 brachij motorum musculus primus, quo pacto duorum loco haberi possit 312 b  
 brachij motorum secundus musculus perperam a Galeno in plures diuisus 320 b  
 brachij motorum quintus, circulatorientium primus, a Galeno non descriptus 318 a  
 brachij os 129 a  
 brachijos seu humeri in omnibus animalibus scapulae inarticulatione 119 a  
 brachij ossis nomina 207 b  
 totius ligamentorum descriptio. 385 a. administratio 388 a. 339 a  
 brachium ac scapulam mouentes musculi, in quibus animalibus ab homine maxime uariet 320 a  
 brachium attollens musculus quis 314 a  
 brachium attollentibus musculis describendis Galenus varius. 315 a  
 brachium circumagentes musculi tres, atque eorum ortus 317 b  
 brachium deorsum trahens alius musculus, quo similes, canes, & alij permulti quadrupedum abundant 317 a  
 brachium mouens quispian musculus, male a Galeno assignatus 313 a  
 brachium mouentium primus musculus unde 311 b  
 brachium mouentium primi musculi fibras uariare ibid.  
 brachium mouentium secundum musculi origo & functio 314 a  
 brachium mouentium tertius musculus, non recte a Galeno inter circueurrentes brachium relictus 315 b. & 320 a  
 brachium mouentium quarti musculi ortus ac functio non recte a Galeno tradita 316 a  
 brachium mouentium musculorum administratio. 318 b. primi. 319 a. secundi. ibid. b. & 320 a. tertij 321 b. quartij. 320 b. quinti, sexti & septimi ibid.  
 brachium mouentium musculorum descriptio. 311 b. primi. ib. secundum. 314 a. tertij. 315 a. quartum. ibid. b. quintum. 317 b. sextum septimumque. 318 a  
 brachium petentes nerui 541 a  
 brachium pectori adducens musculus, quo similes abundant. 312 b  
 item alius musculus, quo similes abundant, quem Galenus omnes qui illum præcesserunt latuisse lacitatur 317 a  
 Brachion & ossa 206 b  
 Brachion quid 716 b  
 Brachion quæ ibid.  
 brutorum cerebri constructione

ab hominis non differre 773 b  
 buccas mouentium musculorum delineatio, primi & secundi. 217 b. tertij & quartij. 220 b. quinti & sexti. 217 b. septimi & octauum 220 b  
 buccas & labra mouentium musculorum descriptio. 288 a. primi & secundi. ib. tertij & quartij. 289 a & reliquorum quatuor. 290 a. eorundem administratio. 291 a. primi & secundi. ibid. tertij & quartij. 292 b. & reliquorum quatuor. ibid. a & b  
 buccella 12 b

## C



Accumforamen 65 a  
 cæcum intestinum & eiusmodi. 362 b & 610 a. in cane, gliribus & sciuris cuiusmodi ibid.  
 cæcum intestinum unde primum dictum. 611 a. unde principium ducatur ibid.  
 cæci intestini non unum, sed duo sibi proxima officia esse, quomodo sit intelligendum 610 b  
 cæci intestini ortum in cane & homine uariare ibid. a  
 cæco intestino cur natura appendicem formarit 611 a  
 Cælij Rhodigini lapsus 79 b  
 calaminum os 206 b  
 calamo alsimilatus ab Herophilo cerebri sinus 787 b  
 calcar capitis 206 b  
 calcar pedis 208 b  
 calcar quid 606 b  
 callosi corporis ac septi usus 785 a  
 callosi corporis initium, seu cū reliqua cerebri substantia cōtinuata. 784 b. sedes & nomen. ib. a sinus lateribus adiacentibus. ib.  
 callosi corporis superioris superioris fice examen 809 a  
 calor ingenitius corpori, Galeno calua 206 a (anima. 708 a  
 caluaria ibid.  
 caluaria ad cerebri Anatomen qualiter aperienda 807 b  
 caluaria cur non solido osse consistet 32 a (formata. 14 b  
 caluaria cur pluribus ossibus est. caluaria, ueluti galea & murus immobilis cerebro circumposita 110 b  
 caluaria canina 32 b  
 caluariæ anterioris humanæ & caninæ figura. 466 b. & ratio. ib. & 55 b  
 caluariæ basis interna sedes 60 b  
 caluariæ basim palatumque exprimens figura 482 a  
 caluariæ figuræ 21 a  
 caluariæ forma aptissima quæ 22 b  
 caluariæ internæ sedis pars superior 61 a  
 caluariæ

- caluariæ nomina diuersa 206 a  
caluariæ pars, in qua sagittalis  
futura in coronale incidit,  
cur sit mollissima, rarissima 37 a  
caluariæ pars superior, quæ doce-  
tur maxilla 49 a  
caluariæ sedes lapidosa 206 b  
caluariæ sinus duræ membranæ  
uasis cedentes 67 a  
caluariæ squamæ 25 b  
caluariæ cur futuræ 32 a  
caluariæ tam integræ quàm seiu-  
ctæ figura 25 b. 26 a b  
caluariæ uiginti ossa 188 b  
caluariæ senum futuris destitutæ  
33 a  
caluariæ tabulæ 25 b  
caluariam à quibusdam eam capi-  
tis partem, quæ crinibus orna-  
tur, uocari 206 a  
caluariam succingentis membra-  
næ externæ descriptio 775 b  
calx 208 b  
calcis anterior pars qualis. 178 b.  
eiusdem internum latus quale.  
ibid. a. externum quale ibid.  
calcis nomina 208 b  
calcis os ibid.  
calcis ossis sedes terram spectans.  
177 b. eiusdē superior sedes ex-  
tra tibiæ rectitudinē retrorsum  
ducta ibid.  
calcis ossis sinus 177 a  
calcis ossis figura, 173 b. 5. & 6. &  
descriptio ibid.  
calces duæ 189 a  
canalium corpus 790 a  
canales à glande deducti 794 b  
canis animal minimè pituitosum,  
& exactissimo odoratu prædi-  
tum 65 b  
canis caluariæ foramina ibid.  
canis caluariæ interna superficie  
secus quàm in hominis, latum  
tenueq; os spectari 42 a  
cani intestinum cæcum multo  
quàm homini esse amplius: ne-  
que ut in homine, omnino in-  
ne reperi 610 b  
canum caluariæ non absque futu-  
ris 32 b  
canum & simiarum caudatarū fu-  
turā in fronte & maxilla mani-  
festissimam esse 33 a  
canum iecur quale 619 b  
canum renes cur altius siti 631 a  
canum iecoris situs 618 b  
canū & hominū colō differre. 611 b  
canum & hominum πνεύματος co-  
loris diuersi 606 b  
canum omētū ratio, & ad hominis  
diuersitas 605 a & b  
canes colō & mesenterio ab homi-  
nibus differre 605 a  
canes nō paucis partib. ab homi-  
ne uariates in musculis thoracis.  
342 a, & 344 a. 345 a, & 350 b.
- 351 a & b  
canes, equos, boues in musculis  
brachium mouētib. ab homi-  
nibus uariare 315 a  
canes & simias utrinque duobus  
thoracem mouentibus muscu-  
lis abundare 342 b  
canes utuos in uolucris cauitatem  
& cordis superficiē humectas  
habere 728 b  
canibus macilētius obtigisse me-  
senterium 617 a  
in Canib. nulla cum hominis ofsi-  
bus similitudo 106 b  
canib. & simijs cor magno inter-  
uallo à septo remoueri 730 b  
canibus & simijs omentū uix co-  
lo conuasci 605 a  
canini capitis figura 46 b. 59 a  
caninæ caluariæ figura ibid.  
canini dentes 57 a. 207 a  
canini uteri delineatio 585 b  
canini & suilli uteri histōria 666 a  
itē uacini aut caprini 664 b  
canini renis ad humanum differe-  
rentia 633 a  
canna 207 b. 208 a  
canna brachij 207 b  
canna maior & minor 208 b  
canulæ 202 b  
capitula occipitis ossis primæ uer-  
tebræ inarticulantur 84 b  
capitula secundæ uertebræ 79 a  
capræ prægnātis uteris cuiusmodi  
di 669 b  
caput ad cerebri inspectionem  
quā parandum 807 b  
caput humanum oculorum gra-  
tia formatum 22 a  
caput in ossibus quid. 11 a. 12 a. itē  
capitulum ibid.  
caput Theriæ 208 b. 23 b (les. ib. b  
capitis figuræ aliquot nō natura-  
lis capitis non naturalium figurarū  
futurae 33 a  
capitis figurarum non naturalium  
cuiusmodi futurae. 32 a (pla. 23 b  
capitis figurarum uariarum exem-  
plis ligamentorum ad ceruicis  
primā secundāq; uertebrā de-  
scriptio. 333 a. administratio. ib.  
delineatio 332 a  
capitis motus proprius quispiā,  
cōtra Galeni sententiam 328 a  
capitis motum Galenum non re-  
cte assignasse 78 a  
capitis motum lateralem colli be-  
neficio fieri 85 a  
capitis motus proprii duo ib.  
capitis motus proprii & secunda-  
rii 328 a  
capitis motus dupliciter fieri. 24 b  
de Capitis motibus aliā quàm Ga-  
leni sententia 85 a (23 b  
capitis naturalis figura quæ. 22 b  
capitis olla, testis, scutella 206 a  
capitis ossa qualibus futuris præ-  
cipue compingantur 18 b  
capitis ossibus, & alijs futuræ co-
- munes 34 b  
capitis structura ratio, quotq; e-  
iusdem figura 21 b  
capitis futura figura 25 b  
capitis futura etiam in interna cal-  
uariæ sede conspicui 33 b  
capitis tabulæ 25 b  
capitis tota moles 206 a  
caput cur copiosiore euacuatione  
indigeat 32 a  
caput instar tecti domus calidæ.  
ibid.  
caput in ossibus quid 11 a. 12 a  
caput mouentium musculorum  
descriptio 328 a  
caput circumuertentium muscu-  
lorum descriptio. 298 a & b. ad-  
ministratio 299 b  
caput mouentium musculorum  
delineatio, partis primi. 243 a. se-  
cundi partis. 247 a. terti. 249 b.  
quarti. ibid. quinti. ibid. sexti. i-  
bid. septimi paris 222 a  
caput mouentium musculorum  
posteriorū descriptio. 328 b. par-  
eorum primum. ibid. par secun-  
dum. 329 a & utriusq; partis mu-  
nus. 330 a. par tertium. ibid.  
quartū. ib. quintū ac sextū par  
ib. & horum functio ibid.  
caput mouentium musculorum  
par secundum, in homine à Ga-  
leni descriptio de diuersum. 329 a  
caput mouentium musculorum  
iuxta septem partium ordinem,  
administratio 332 a  
caput mouentium, sed motu non  
proprio, musculorū traditio ē  
totam quære sub Doris moto-  
ribus. 4 partia prima, ratio  
330 a  
caput mouentes musculi anterio-  
res, eorūq; descriptio. 331 a. par  
omnium capitis motorum, se-  
ptimum. ibid. functio binis  
paribus posteriorum opposita  
330 a  
caput non potuisse supra primam  
uertebra in latus duci, neque  
etiam circum agi 86 b  
caput supra secundam uertebram  
cum prima circumagi, neutri-  
quam uerō flecti & reflecti. 86 a  
caput non potuisse super secun-  
dam uertebram flecti & reflecti,  
neq; in latus inclinari 87 b  
caput supra primam uertebrā fle-  
cti & reflecti motu proprio, nō  
aut in latera, aut aliter duci. 85 b  
caput supra primā uertebrā circū  
aginequāquam posse 86 a (b  
capita Belgarū cur sint oblonga. 23  
capita Genuesium, Græcorū &  
Turcarū cur globi imaginem  
expriment 23 a  
capita Germanorum cur lata, &  
compressa occipitio cernatur.  
ibidem  
capita futuris destituta 33 a  
capita ossium, cur etiam in quorūq;  
B b 4 seu appen.

- feu appēdices à Galeno uocata  
 11 b. item, an omnia appendice  
 formentur *ibid.*  
 capita uirorum à mulierum non  
 multum uariare 32 b  
 capitum in osibus, alia prominen-  
 tia, alia depressa 11 a  
 capitum in osibus differentia  
*ibid.* b  
 capitū in osibus usus. 13 a. ac dif-  
 ferentia *ibid.*  
 carina hominis 207 a  
 de Carne substantia manus inter  
 na regioni superstrata, Arabū  
 notata sententia 364 a  
 carne substantia interiori digito  
 rū regioni, ipsorūq; radicib. &  
 mediæ sedi uolæ supstrata 363 b  
 carne portionem decimo muscu-  
 lo femoris mouentium atten-  
 sâ 414 b  
 caro cur musculis addita 261 a  
 caro musculorum, præcipuū mo-  
 tus organum 264 b  
 caro, præcipua musculi substan-  
 tia *ibid.*  
 carnis in musculo usus 261 a  
 carnem illam, quam ualis inter u-  
 terum, & exterius foetus inuo-  
 lucrum denouo cū foetu proge-  
 nitum circumnasci asstabiliriq;  
 cernimus, an rectē ab Hippo-  
 crate, acetabula fuisse nūcupa-  
 ta, quidam cōtenderint 670 b  
 eadem in mulieribus cōtinua,  
 in animalib. autem sparsa cer-  
 nitur. *ibid.* eandem carnem Ga-  
 lenus ceruis & capris falsō as-  
 scribit *ibid.* (291 b)  
 carnosemēbranae administratio.  
 carnose membranae in abdomine  
 administratio 682 b  
 carnose cuiusdam substantie ex-  
 teriori foetus inuolucro obna-  
 tæ necessitas 673 a  
 καρωτις arteria 438 b  
 καρωτις quid 142 b. & 208 a  
 cartilago quid, eiusq; natura, u-  
 sus ac differentia 4 b  
 cartilago, aut os in cerebro 42 b  
 cartilago, χονδρῶν 206 a  
 cartilago brachiale ab ulna diri-  
 mens 139 a  
 cartilago clauiculæ articulationis  
 cū pectoris osse peculiaris. 125 b  
 cartilago epiglottalis 116 a  
 cartilago glucinis uicē subiēs 5 b  
 cartilago in articulis quibusdam  
 teria *ibid.* a  
 cartilago inter uertebras iuxta  
 Galeni sententiam, quid præ-  
 stet 359 b (360 b)  
 cartilago inter uertebras, triplex  
 cartilago innominata quæ 187 a  
 cartilago ligamentorum substan-  
 tiam ingrediens 5 b  
 cartilago mucronata, siue σφισσοειδής.  
 116 a eius usus *ibid.*  
 cartilago omnibus articulis com-  
 munis 55 b  
 cartilago scapulæ sinum frequen-  
 ter augens 126 b  
 cartilago spinarum apicibus ob-  
 nata 74 a  
 cartilaginis scapulæ sinum adau-  
 gentis figura 121 a  
 cartilaginis in maxillarum articu-  
 lo peculiaris effigies 55 b  
 cartilaginis in osium connexu  
 usus 19 b  
 cartilaginis natura 4 b. & 5 a b  
 cartilaginis palpebrarum usus  
 182 b  
 cartilaginis temperies 183 a  
 cartilaginis usus in articulis 5 a  
 cartilaginis usum communi osi-  
 um usui respondere 4 b  
 cartilaginem osse promptius dila-  
 tari & constringi 5 a  
 cartilagine aliquid continuū eri-  
 gentes *ibid.* b  
 cartilagine minorum natu, & se-  
 num, quales 6 a  
 cartilagine nasī. 13 b, asperæ ar-  
 teriæ 184 b  
 cartilagine nudis & extantibus  
 particulis adnatæ 5 b  
 cartilagine quibus tibiæ osis si-  
 nus augentur 103 a  
 cartilaginum asperæ arteriæ à eli-  
 quis osibus discrimen 5 a  
 cartilaginum differentia 6 a  
 cartilaginum costarum cum pe-  
 ctoris osse, ab ipsarum osibus  
 liberatio 748 a  
 cartilaginum numerus 189 a  
 cartilaginum osium quæ partes,  
 sedesq; diuersis nominibus ap-  
 pellari 8 a  
 cartilagine osium numerū lon-  
 ge excedere 189 b  
 cartilaginum palpebrarum & au-  
 rium descriptio 182 b  
 cartilaginum substantia 4 b  
 cartilagine tēporis successu osi-  
 feas fieri 6 a  
 cartilaginea, quæ cordis basi ascri-  
 bitur substantia, seu cordis os  
 116 b  
 cartilaginea cordis substantia. 190 a  
 cartilagineæ cordis substantie ex-  
 amen 752 a  
 cartilaginea uasorū radices quo  
 pacto inquirendæ 117 a  
 cartilagineum in uertebris liga-  
 mentum 71 b  
 cartilaginofum ligamentū 360 b  
 cartilaginofum os brachialis qd.  
 nam uertebus dictum 144 a  
 callos os 207 b  
 κατὰ κλάσιν quid 123 b. 207 b  
 caudæ os 207 b  
 caudicis uena 458 a  
 caua uena *ibid.*  
 caua uena, eiusq; ortus 735 a  
 caua uena à se tam grandē uenā  
 cur depromerit 461 a  
 caua uena quomodo arteriæ ma-  
 gne supra sacri osis initū sub-  
 iiciatur, & ipsius series 475 a  
 caua uena quo pacto portæ cōmit-  
 tatur, & in iecur ramos diffun-  
 dat, descripta 456 b  
 caua uenæ ad iugulum incessus,  
 & ipsius inibi distributio. 464 b  
 caua uenæ caudex in qua iecoris  
 sedecōsistat, ramosq; primum  
 proferat 458 b  
 caua uenæ distributionis per tho-  
 racē & iugulum examē 749 a  
 caua uenę distributionis descri-  
 ptionem, à iecore esse incipien-  
 dam 457 b  
 caue, & arteriæ magnæ distribu-  
 tionum sub osse sacro examen  
 693 b  
 caua uenæ & arteriæ magnæ se-  
 ries in peritonei amplitudine  
 facta, qui obseruanda 690 b  
 caua uenæ & arteriæ ad cordis ba-  
 sim continuitas 701 b  
 caua uenę in iecore series 458 a  
 caua uenæ membranæ 737 a  
 caua uenæ nomina 458 a  
 caua uenę orificio præfectarum  
 membranularum usus 744 b  
 caua uenę ortus à Galeno imbe-  
 cilliter confirmatus, & quo pa-  
 cto 453 b  
 caua uenę ortus apud autores cō-  
 trouerſi *ibid.*  
 caua uenæ ortus examen 751 a  
 caua uenę partis eius quæ supra  
 iecur consistit, exposita distri-  
 butio 459 b  
 caua uenę partem septū transeun-  
 tem, quæ sub iecore sita est, nō  
 esse arctiorem, cōtra Galenum  
 456 b. 459 b  
 caua uenę per collum caputq; se-  
 ries 466 b  
 caua uenę p septū transitus, ac ipsi  
 us in septum ramū, & in cordis  
 dextrum sinū adaptio 460 a  
 caua uenę portionis ad partes in-  
 fra septum trāuersum locatas  
 distributa series. 473 b. ad renis  
 inuolucrum, & ipsos renes. *ib.*  
 caua uenę rami lūborū uertebris  
 carnisq; oblati 475 a  
 caua uenę ramos caluariam ex al-  
 tera parte subeuntes, sex esse  
 numero 496 a (477 a)  
 caua uenę soboles in crus digestæ.  
 caua uenę supra iecur partis di-  
 stributionis series 459 a  
 caua uenę supra os sacrum biper-  
 titē delineatio 454 a  
 cauilla, cauille 206 b. 208 b (a)  
 cauitas auditus organo parata. 44  
 cauitatem inter duas squamas cō-  
 stituentes frontis os, cur non  
 nulli olfactus organum esse as-  
 serant 63 b  
 cayfeles dentes 207 a  
 Cor. Celsi codex, ubi ceruicis ex-  
 plicat uertebras, uitiatus 86 b  
 Cor. Celsi



- Cor. Celsi de postbrachialis ossi-  
bus sententia 146 b  
Cor. Celsi locus de primis colli  
uerberis uitatus 86 b  
Cor. Celsi de pectoris osse lunato  
sententia 115 b  
Cor. Celsus in ijs quæ ad Anato-  
men pertinet, sepelapsus 188 a  
Cor. Celsi de inferiori maxilla lo-  
cus 55 a  
Cor. Celsi de incerto brachialis  
ossium numero sententia, 142 b  
Cor. Celsum laryngis operculum  
perperâ lingula appellasse, 188 a  
κεφαλης κεφαλη 109  
κερατωδης oculi tunica 805 a  
κερη 135 a. 207 b  
cereopithecis eandē esse musculi  
brachium atrolentis speciem,  
eum hominum musculo 318 a  
cerebellum quid cerebro sit conti-  
num 779 b (da. ibid.)  
cerebelli delineatio unde sit petē  
cerebelli sedes, 38 a. situs 23 b  
cerebelli descriptio totius, 779 b  
situs ac magnitudo, 780 a. forma  
ib. b. implexu ustrato & species  
782 a. durities, ibid. b. color &  
substantia, 783 a. quo pacto conti-  
num sit cerebro, 779 b. admi-  
nistratio 810 b  
cerebelli processu uermiformiū  
descriptio, 792 a. delineatio  
ubi spectanda 791 a (geat. 110 a)  
cerebrū cur nullis musculis indi-  
cerebrum cur uniuersum ossibus  
ambiat, & quamobrem illa ua-  
ria sint, & futuris maxima ex  
parte commissa 31 b  
cerebrum rationalis ac principis  
animæ locus 741 b  
cerebrum cuius animæ facultatis  
sedes 741 a  
cerebrum homini grandius datū  
ex proportionē 620 b  
cerebrū, neruorū principū 508 b  
cerebrum quo pacto mole in ani-  
malibus uariet 774 a  
cerebrū rationis sedes, quale do-  
micilium natura sortitum 31 b  
cerebrū arteriæ 497 b  
cerebrū corpus collossum, 784 a. e-  
ius initū, seu cum reliqua cere-  
bri substantia cōtinuitas, ibid.  
cerebrū corpus testudinis forn-  
cis uel imagini comparatum, e-  
iusq; descriptio, 789 b. usus, 790  
a. delineatio unde petēda sit  
789 a. administratio, 809 b (779 a)  
cerebrū delineatio unde petēda sit  
cerebrū dura mēbrana, 775 a. admi-  
nistratio 808 b  
cerebrū descriptio totius, 779 b. nu-  
merus, ibid. magnitudo & for-  
ma, 780 b. anfractus, & eorundē  
usus, 781 b. partes, dextra ac sini-  
stra, ib. a. cur sic sectum, ibid. &  
quibus sedib. cōtinuetur, 779 b  
duricies neruorūq; ortus 782 b  
color & substantia, 783 a. quo pa-  
cto ab ossium medulla differat,  
ibid. nutritioni quo pacto pro-  
spectū, ibid. (nistratio, 807 b)  
cerebrū, eiusq; partū omnīū admi-  
cerebrū excrementorū in os descē-  
dentium receptaculum an gar-  
gareon 723 a  
cerebrū fabrica in brutis ab homi-  
ne nō differēs, 773 b (lea. 206 a)  
cerebrū figura, 22 a. 23 b. cerebrū ga-  
cerebrū glandis descriptio 790 b  
cerebrū infundibulū, glandula, &  
q. pituita excipientes ductus reli-  
qui, descriptio omniū 793 b. de-  
lineatio unde petēda sit ibid.  
cerebrū membranæ uenarum mo-  
do cauz 496 b  
cerebrū durę mēbranę sinus cuius  
modi sint, 497 a. quatuor sinuū  
cauitates quales, 498 a. usus si-  
nuū, 497 a. primi & secūdi sinus  
cōgressus, ib. b. tertius, ibid. &  
quartus sinus, 498 a. quæ a pri-  
mo & secundo sinu enascantur  
ppagines, ibid. b. quæ a tertio,  
ibid. a quarto, 499 a. processus  
a quarto sinu cerebrī pctēs uen-  
triculos, ibid. b. omniū delinea-  
tio 494 b  
cerebrū mēbrana tenuis, 778 a. ad-  
ministratio 808 b  
cerebrū neruorū partium aliquot  
examen 754 a  
cerebrū neruorū quinq; surculū tē-  
porali musculo oblatis 43 a  
cerebrū os cuiusmodi a Galeno  
traditum 42 a  
cerebrū partiū ac functionū breuius  
enumeratio, 772 b. examē 822 a  
cerebrū pituita ad palatum, per q̄s  
meatus eat, 794 a. 795 b & in  
narium amplitudinem 795 b  
cerebrū pituita per olfactus orga-  
na non expurgari 796 a  
cerebrū plexus secundus referen-  
tis traditio 797 b  
cerebrū plexus reticularis, & se-  
cundarū plexib. similis, descri-  
ptio, 796 b. delineatio ubi spe-  
ctanda ibid.  
cerebrū resolutiones intestinorū  
anfractibus eleganter ab Eras-  
strato collatz 781 b  
cerebrū substantia ab ossiū medul-  
la quo pacto differat 783 b  
cerebrū testū ac nariū descriptio  
791 a. delineatio unde petenda,  
ibid. administratio 811 a  
cerebrū torcular quid 500 a  
cerebrū uenæ, 496 a. 497 b (514 b)  
cerebrū uentriculū, seu sinus qui  
cerebrū uentriculorū anteriorū du-  
ctus, 516 a. delineatio, ibid.  
cerebrū ac cerebelli duricies, ner-  
uorumq; ortus 782 b  
cerebrū, cerebelli & dorsalis me-  
dullæ color & substantia 783 a  
cerebrū & cerebelli figura prima  
511 a. secūda, 512 a. unā cum carū  
dem characterum indice, ibid.  
quæ cerebrū & cerebelli formæ  
commonstrant,  
cerebrū anfractuum usus 781 b  
cerebrū dextra pars quibus sedib.  
sinistra cōtinuetur 779 b  
cerebrū dextrā partē sectio a sini-  
stra dirimens, & cerebrū anfra-  
ctus 781 a  
cerebrū meatus pituitæ expurgan-  
dæ parati 642 a  
cerebrū numerus 779 a  
cerebrū ossiū frequens contextus  
ad quid conferat 32 a  
cerebrū sectionis ratio 782 a  
cerebrū sedes & partes in septimo  
libro qui distinguuntur 514 b  
cerebro quid attribuitur 772 b  
cerebrum & cerebellum uix pro-  
pria egiſſe forma 781 a  
cerebrū oculorum gratia in capl-  
te locari, dein cerebrū nomine  
& reliquos sensus 212 b  
cerui, canes, lepores, animalia sic,  
ca 103 a  
ceruix 12 b. 207 a  
ceruicis flexioni preſecti musculi  
331 b. eorūq; administratio, 333 b  
ceruicis motus alius peculiaris, a-  
lius dorſo communis ib. a  
ceruicis motorū musculorū descri-  
ptio, 354 a. usus, 355 a. adminis-  
tratio, & sub iſſe ratio 331 b. 355 b  
ceruicis motuum differentię quæ  
328 a  
ceruicis uertebra primā secundæ  
necētis ligamenti descriptio  
333 b. administratio, ibid. deli-  
neatio 332 b  
ceruicis uertebrae  
cuiusmodi 74 b  
earundem delineatio, ibid. 75 a  
quot numero 77 b. 188 b  
ceruicis uertebra primæ ac se-  
cundæ ad caput annexio, liga-  
mētōrūq; descriptio, 333 a. admi-  
nistratio, ib. b. delineatio 332 b  
ceruicis nomina 207 a  
ceruicis primæ & secundæ uerte-  
bræ cum dente & ligamentis, ſi-  
gura 80 a  
ceruices uterū os, muliebrepuden-  
dum uocari 655 a  
ceruices in ossibus, qui potissimū  
dicantur 12 b (error 117 a)  
de Ceruini cordis osse medicorū  
chahab 208 b  
χαλκοειδής ossa 179 b. 208 a  
chames 591 a  
χέλη 13 b  
χέλι 142 b  
χελών 794 a  
χέρων commune in uolucrorum no-  
men 671 b  
χέρων & χάρμη quid  
χέρων cerebrū plexus curita di-  
ctus 759 b  
χορδαλιν

χοροειδής dicta membrana	778 b	106 a	coccygis canini descriptio	104 b	κόρυξ 206 a, 208 b
χοροειδής oculi tunica	803 b	108 b	eiusdemq; foramina	ibid.	κόρυξ 12 a
χοροειδής plexus 797 b, 499 b, & 501 b		108 b	coccygis humani descriptio	102 b	κόρυξ non recte Galeno dici ar
cibi attractionem, retentionē atq; expulsionem, nō musculis, sed fibris ventriculi & intestinorū uerē ascribendum esse	337 b	103 a	coccygis ossis in parturientibus maximum momentum	159 b	tuum capita 11 b
cibo apertui in corpore, concoquantis famulātia organa, earumq; ratio	590 a	103 a	coccygis ossis nomina	207 b	coniugalia ossa 206 b
cibum potumq; uentriculo deferentis uitæ nomina	593 b	103 a	coccygis ossis ossa quot	189 a	connexum instar clauī, ueteres etiam ad articulū contulisse 18 b
ciceri assimilatum ossiculum, ac ac mira eius uis	154 a	103 a	coccygis ossis ossa quot	189 a	κορυϊδής glās, quæ & κορυϊδής 790 b
Ciceroni parum recte mesenterium, medium intestinum dictum	615 b	103 a	κορυϊδής appellatio unde	100 a	κορυϊδής processus 797 b
cilia	182 b	103 a	coccygis ossis ossicula quatuor		κορυϊδής 397 b
ciliorum usus	ibid.	103 a	κορυϊδής 206 a		contextus squamarum modo cōmissi 206 b
κωόν cur pro gargareone	722 b	103 a	κορυϊδής 206 a		κορυϊδής processus 121 a, 207 b
κορυϊδής περιστεύτης 643 a 644 a		103 a	κορυϊδής 206 a		cor cuius animæ sedes 741 a
645 a		103 a	κορυϊδής 206 a		cor calidissimū uiscus merito censeri 729 a
cir conuersionis motus	15 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cor humanum uero osse destitui 116 b
clauale os	206 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cor in thoracis medio Galenus cōtra ueterum placita positum esse contendit 730 b
clauæ	207 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cor irascibilis, animæ ergastulum 741 b
clauium ossa	ibid.	103 a	κορυϊδής 206 a		cor irascibilis, seu uindictæ honorūq; appetitricis animæ sedē esse, Hipp. Plat. Gal. Stoicis & Peripateticis concessum 741 a
clauiculæ à scapula liberatio	327 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cor, secundum Chrysippum, Posidonium & Theophrastum, nō modò irascibilis facultatis, sed etiā eius quæ ciborum, potuum & uenereorū concupiscibilis est, quā Aristot. altricem, aliq; naturalem, aliq; concupiscibiliem uocant, esse 741 b
clauiculæ ad superiorem scapulæ processum nexus	127 a	103 a	κορυϊδής 206 a		cor an lienis beneficio refrigerare tur 698 a
clauiculæ cum pectoris osse articulationis, priuata cartilago	126 a	103 a	κορυϊδής 206 a		cor artiarum fons atque origo 485 b
clauiculæ mira curuitas	ibid.	103 a	κορυϊδής 206 a		cor neruorum principium nō esse 509 a
clauiculæ substantia, tubera, ac asperitates, leuitates & foramina	127 a	103 a	κορυϊδής 206 a		cor quatuor uasorum ad continentinas sedes connexu sustineri 117 b
clauiculæ, superiorisq; scapulæ processus usus	126 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis adeps 733 a
clauiculæ	207 b, 208 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis auricularum delineatio ubi quaerenda 739 b
clauiculæ duæ	198 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis auricularū situs ibid. dextræ situs & forma ibid. substantia, nexus; item sinistræ 740 a
clauiculæ tuberculi articulatio	123 a	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis auris dextra, & sinistra 702 b
clauicularum ad pectoris os articulationis	125 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis basis ratio 742 a
clauicularum à pectoris osse liberatio	747 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis basim cingens uena 460 b
clauicularū curuitas, earundemq; usus	126 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis dextrum latus expressum 703 a
clauicularum effigies	124 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis & artiarum pulsus numeri sit examen 824 a
clauicularū iuguli nomina	207 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis auriculæ duæ 739 b
clauicularum numerus	125 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis dextræ auriculæ situs & forma 739 b
κλινιδής 207 b		103 a	κορυϊδής 206 a		cordis dextræ auriculæ substantia ibid.
Clinianæ Bacchidis historia	597 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis dextræ auriculæ usus, & ipsius cōstructionis ratio 744 a
κλινιδής 40 a		103 a	κορυϊδής 206 a		cordis sinistra auricula 740 b
κλινιδής 633 b		103 a	κορυϊδής 206 a		cordis sinistrae auriculæ usus 745 b
clunes in cerebro	291 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis caro 731 a
clunium ossa	207 b	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis carnis usus 732 a
clypeus oris stomachi, ibid., thoracis	ibid.	103 a	κορυϊδής 206 a		cordis
κλινιδής 107 b 208 b		103 a	κορυϊδής 206 a		
κορυϊδής 15 a		103 a	κορυϊδής 206 a		
κορυϊδής, coccyx os quid	100 a, 207 b	103 a	κορυϊδής 206 a		
κορυϊδής appellatio unde	100 a, 103 a	103 a	κορυϊδής 206 a		
coccyx auis, cuculus	100 a	103 a	κορυϊδής 206 a		
coccyx os in homine, à Galeno dedita opera esse omisissimū, quibus argumētis eueriores librorum eius confirmare nituntur		103 a	κορυϊδής 206 a		





## INDEX.

<b>D</b>	ἀκτυλοὶ	208 a
	Δάφνη	281 b
	quid sit	281 b
	Δακτύλος	641 b
	dearticulatio	15 a
δελταειδής	dictus musculus	314 b
dens processus	76 b & 80 a	
dens secundæ uertebrae	tuber siue processus	80 a
dens secundæ uertebrae hominis	canino affimilatur	79 b
dentis dicti	osis ligamentum	
333 a. b		
	dentis alii cuius effracti ex casu portionem in pueris nunquā esse eruendam	58 b
	dentis processus cum prima uertebra, contextus	79 b
dentes ὀδόντες, eorumq̃ nomina		
207 a		
dentes quot		188 b
dentes etatem complentes		207 a
dentes canini		57 b
dentium caninorum nomina.		
207 a		
dentes cayfeles		ibid. a
dentes ὀδοντῆρες		ibid.
dentes cur doleant		57 a
dentes cur nudī conspiciantur, ibid.		
dentes gemini		58 a
	dentes	

dentes genuinos Ciceronem mo- lares uocasse 58 a	διχες ὄδον dentes διχες ὄδον πλέγμα διδυμοι cur dicti in cerebro διδυμοι cur testes dicti	207 a 797 b 791 b 641 a	digitorū tendinū insertiōes 376 b digitorum tertij ossis extremum & apex cuiusmodi 151 b
dentes genuinos quos Cicero uo- cet 207 a	διδυμοι cur testes dicti	208 a	digitos flectentiū musculi secun- di tendinū per primi tendines transitus 366 b
dentes ὀφθαλμοι ibid.	digitus annularis	ibid.	digitos mouentes musculi 365 a
dentes incisoriū 57 a. 207 a	digitus auricularis	ibid.	digitos singulos tribus ossibus merito efformari 149 a
dentiū incisoriū nomina 207 a	digitus cordis	ibid.	diploa 25 b
dentes maxillares ibid.	digitus impudicus	ibid.	direzan 206 a
dentes menfales ibid.	digitus infamis	ibid.	dissectionum professores de colo- cur se tam miserē torqueāt. 614 a
dentes molares 57 b	digitus magnus	ibid.	dissectionum professores de ieico- ris forma, ac fibris, quas Græci ἀβας appellāt, cōmentatio- nes suas unde sumperint. 619 b
dentes μυλῶν 207 a	digitus medius	ibid.	διὰ δὲ τὴν ἀνέκτατον intestinum 608 b
dentium molarium nomina. ibid.	digitus medij nomina	ibid.	domestica cruris 208 b
dentes mordentes ibid.	digitus medicus	ibid.	dorsalis medulla, cerebrum lon- gum uocatur 533 a
dentes mordentes à quibusdam etiā mrisorios uocari ibid.	digitus minimus	ibid.	dorsalis medulla, eius que descri- ptio ibid. ab ossiū medulla quo pacto differat ibid. que sint illi cum cerebro cōmunia, quæ peculiaria 533 b. cur sit unica 534 a. cur sit facta 533 b. municiā quo pacto in ossibus & mēbranis inuolucris. ibid.
dentes omnium ossium cur durissi- mi 57 b	digitus paruus	ibid.	dorsalis medulla, & neruorū ab ipsa prodeuntium numerus 533 a
dentes ὀφθαλμοι 207 a	digitus paruus cuius beneficio potissimum extendatur 140 b	208 a	dorsalis medulla ubi ueluti ē mul- tis funiculis cōpingatur 534 a
dentes paxillares ibid.	digitū quartū nomina	ibid.	dorsalis medullæ delineatio 536 a
dentes puerorum quales 58 b	digitū quintū nomina	ibid.	dorsalis medullæ cum cerebello coalitus examen 81 a
dentes quadrupli 207 a	digitū inæquales	151 a	dorsalis medullæ examen 81 b
dētes quomodo maxillis insigan- tur 57 b	digitū cur unguibus donati	181 b	dorsalis medullæ principii 515 a.
dētes radicib. inter se uariare. ibi.	digitorū acies et agmina quæ 208 a	181 a	785 b
dentes risoriū, à quibusdam mor- dentes dicti 207 a. corun- dem nomina ibid.	in Digitorū articulis naturæ sco- pi 151 a	208 a	dorsalis medullæ neruorū octauū paris, seu thoracis parium pri- mi series 538 b
dentes sensu præditi 42. 57 a	digitorum decens moles 149 a	150 a	dorsalis medullæ procreandi ne- cessitas 533 a
dētes soli omnium ossiū nudi ibid.	digitorū manus cuti internæ ner- uosa tenuitate subnati musculi descriptio 362 a. administra- tio 387 b	150 a	dorsalis medullæ terminus ex os- se prodiens sacro, inter neruos non cōfiscitur 534 b
dentes sensus, sapientiæ acintelle- ctus 207 a	digitorum manus ossa quot 189 a.	ibid.	dorsalis medullariæ pportio 73 a
dentes ferotini 207 a	pedis ibid.	ibid.	dorsum 157 a
dentes soli cur uim sentiendi obti- neant 57 a	digitorum manus ossium articu- lationis ratio & forma 150 a	148 b	dorsum cur sit extractum 71 b
dentes σφαγγονος ὄδον 207 a	digitorum manus ossiū delinea- tio 148 b	365 a	dorsum homini quanta industria Natura creauerit ibid.
dentes ut plurimum triginta duo. 188 b	digitorum motus 365 a	208 a	dorsum quot motib. agatur 353 a
dentium à cæteris ossibus disse- rentia 57 a	digitorum nomina 208 a	12 a	dorsum mouētium musculorum delineatio, paris primi 230 a.
dentium alueoli 57 b	digitorum ossa 12 a	150 a	secundi ibid. tertij 247 a.
dentium alueoli & fossulæ 57 b	digitorū ossa Galenus perperam medulla prius carere sēsit 150 a	189 a	quarti 245 b. quinti 230 b.
dentium appendices 58 b	digitorū ossa in utroq; pede qua- tuordecim 189 a	149 b	sexti 247 a. septimi 249 b
dentium cauitas ibid.	digitorū ossa perperam Galeno solida constituta 3 b	189 a	dorsum mouētium musculorum descriptio 353 a
dentium dolori remedium opti- mum 58 a	digitorum ossa qui supra & infra ab integris digitis forma uari- ent, & cuiusmodi ossiū sit sub- stantia 149 b	147 a	dorsum mouētium musculorum iuxta singulorum parium ordi- nem administratio 358 b. pa- rium quatuor priorum ibid.
dentium excessus præsecandi aut exurendi mos 57 a	digitorum ossa triginta 189 a	151 b	quatuor postremorum, nempe quinti 359 a. triū sequentiū. ib.
dentium frequentiam uitæ longi- tudinem arguere 58 b	digitorum ossa Vesalius quindecim enumerat 147 a	152 a	dorsum mouētium musculorum iuxta octo ipsorum paria figul- latim expolitus usus 353 a. b.
dentium nomina 207 a. & nu- merus 57 a	digitorum ossiū interna sedes cu- iusmodi secundum longitudi- nem 151 b	149 b	C c 354 a. b.
dentium numerum aliquando ua- riare 58 a	digitorum ossiū latera cuiusmo- di 152 a	151 b	
dentium pictura, qui maxillis in- figuntur 56 b	digitorum ossium magnitudo & forma decentissima 149 b	151 b	
dentium præsepia 57 b (58 b)	digitorum ossium tendines 151 b	151 b	
dentium puerorū appendices quales dentiū radicib. affixi neruuli 57 a	digitorum pedis figura 68 & 72 a	172 a	
dentium utriusq; maxillæ figura. 56 b	digitorū pedis ossa, eorumq; de- scriptio 172 a	181 a	
dentium usus 58 b	digitorum pedis ratio 181 a	208 a	
Deo opt. max. gratiæ agendæ, quæ nobis animā rationale, & cum angelis communem habemus, largitus sit 789 a	digitorum secundū & tertij quatuor articuli qui 150 b	ibid.	
δέρμα, cutis dicta 278 a			
deriūctum 207 b			
δέρμα 346 b			
δερματιον τὸν τὸν μέμβρανæ quæ 712 a			

# I N D E X.

354 a. b. 355 a. paris primi. 353 b.  
secundi & tertij parium usus.  
354 a. quarti, quinti, sexti ib.  
septimi, octauī 353 a  
dorsum mouētium musculorum  
par primū Galenoparum apte  
in plures diuifum 353 b. usus  
non rectē assignatus 354 a  
dorsum mouētium musculorum  
par quintum à Galeno non re-  
ctē descriptum 355 b  
dorsi ligamenta ualida quædā, &  
corū usus 360 b. ligamēta in  
spinarū interuallis posita 361 a  
dorsi nomina 207 a  
dorsi osium copię causa 72 a.  
& quot constet ossibus ibid.  
dorsi osiū impar magnitudo. 72 b  
dorsi osium spinæ, seu postero-  
res processus 74 a  
dorsi pars thoraci respondēs, pro  
prios flexionis musculos cur  
non habeat 356 b  
dorsi uertebræ 207 a. earun-  
dem appendices 9 a  
dorsi uertebrarū ligamēta, iuxta  
Galeniplicitum, eiusq; impro-  
batio 360 a  
dorsi uertebrarum ligamenta, uel  
περὶ τῶν ἐν σπονδύλοις dicta. ibid. b  
dorsi uertebrarum ligamentū spe-  
cies canibus propria 361 a  
dorsi uertebras necientium liga-  
mentorum descriptio 359 b.  
administratio 361 b  
duales dentes 207 a  
duodeno intestino cur nulli an-  
fractus 613 b  
duræ membranæ ad caluariā ne-  
xus, & externæ ipsius superfi-  
ciei species 775 a  
duræ membranæ amplitudo qui  
examinanda 808 b  
duræ membranæ interior superfi-  
cies qualis 776 b. cum tenui  
cōnexus ibid. ipsiusq; uafa.  
ibid. & foramina eiusdē 777 a  
duræ mēbranæ sinuū examē 810 b  
duræ membranæ situs, nūmerus,  
magnitudo & forma 775 a  
duræ membranæ usus, & constru-  
ctionis ratio 777 b  
dura ossa 206 b

## E



Καφίσις 9 b  
elephantiasis morbo af-  
fectorū color qua-  
lis 627 a  
elephantiasis laboran-  
tis lien maior 627 b  
ἐμυρῶν 378 a  
emulgetes uenæ cur dicte 474 a  
enarthrosis quando in simplici ar-  
ticulo 16 a  
ἐνάρθρωσις ibid.  
eniformis cartilago 207 b  
ἐντόρρα 607 a  
ἐντόρις 633 b  
ἐντόρις tunica quæ 641 b

epiglottalis cartilago 203 b.  
cur ita uocetur 116 a  
ἐπιγλωττῖς & γλωττῖς inter se quid  
differant 306 b  
ἐπιγλωττῖς delineatio 305 b  
ἐπιγλωττῖς quid 188 a. 306 a  
ἐπιγλωττῖς usus 188 a  
ἐπιγλωττῖς lingulam Theodorus  
Gaza in Aristotele male uertit,  
cum Aristoteles laryngis oper-  
culum intelligat ibid.  
ἐπιγονατῖς 172 a. 208 b  
ἐπιμυρῖς 208 b  
ἐπιμυρῖς 207 b  
ἐπιμυρῖς 805 b  
ἐπιμυρῖς 603 b  
ἐπιμυρῖς, &c. 602 b  
ἐπιμυρῖς 8 a  
ἐπιμυρῖς cum ἐπὶ τῷ ab Anatomi-  
cis subinde confundi 10 b  
ἐπὶ τῷ, seu appēdices, cur ossiū  
capita Galenus uocarit 11 b  
ἐπὶ τῷ 36 b  
ἐπὶ τῷ 126 a. 207 b  
ἐπὶ τῷ dictus musculus 314 b  
ἐπὶ τῷ dictus maximus scapulæ  
musculus 122 b  
equos, boues, & cætera animalia,  
quæ clauiculis carent, plurimū  
in brachiū & scapulā mouētib.  
musculis, à simijs uariare 320 a  
Erasistrati de seminalibus arterijs  
sanguine destitutis, opinio re-  
iecta 645 a  
Erasistrati & Aristotelis opinio,  
qui feminales arterias sangui-  
ne uacuas esse dixerunt, reie-  
cta ibid.  
Erasimū Rot. cum Plinio malleo-  
los in hominibus talos pepe-  
ram dixisse 170 a  
ἐν τῷ nomine antea uocatū. ibid.  
Eudemī de postbrachialis ossib.  
sententia 146 b  
Eugion 654 a  
exortus, cur duodenū intestinum  
appellatum 597 a  
exortus ucnæ cauæ qui  
expiratio naturalis & uiolenta.  
349 b  
expiratio quibus musculis perfici-  
atur 350 b  
expirationis usus 709 a  
expirationem naturalem cur citra  
musculorum opem perfici Ga-  
lenus censet 349 b

## F



Aucē, Haly abbatis  
interpretis quid pri-  
uatim uocet 207 a  
fauces quid 721 a  
fauciū glandulæ triū  
generum 720 b  
faucium organorū examen 753 b  
femen 208 a  
femur ibid.  
femur mouentis musculi descri-  
ptio 355 b

femur mouentes musculi quoe  
constituendi 414 b  
femur mouentium musculorū de-  
cem administratio ordine ex-  
posita 415 b  
femur mouentium musculorū de-  
lineatio, primi 236 a. secundi  
237 b. tertij 245 a. quarti ibid.  
quinti 247 b. sexti 232 b. se-  
ptimi & octauī ibid. & 229 a.  
noni, decimi 239 a  
femur mouētium musculorū de-  
scriptio 409 b. primi ibid.  
secundi 410 a. tertij, quarti,  
quinti ibid. munus omnium  
412 a. 413 a. sexti, septimi, octa-  
ui ibid. b. noni, decimi. 413 b.  
decimo appendicæ carneæ por-  
tiones 414 b  
femur mouentium musculorum  
quintus, totius corporis mole  
maximus 411 a  
femoris ad coxē dicis os ligamen-  
ta 429 b  
femoris appendices s. b. eo-  
rundem delineatio 6 b. 7 a  
femoris capita 6 a. 7 b  
femoris duo inferiora capita, eo-  
rundemq; sinus 162 a  
femoris capita inferiora cur re-  
torum producuntur 162 b  
femoris humiliora capita quid  
commodi præsentent ibid.  
femoris ceruix cur statim à coxē,  
dicis articulo foras porrigatur  
165 a  
femoris ductus cur non rectō tra-  
mite ferantur 164 b  
femoris figuræ 161 a  
femoris motus 15 b. 16 a. 405 b.  
processus, rotatores 45 a  
femoris duo processus, seu rota-  
tores 163 b  
femoris exterioris processus no-  
mina 208 b  
femoris processus externus cur  
γλωττῖς uocatus 163 b  
femoris duorū processuū usus. ib.  
femoris os magnitudine cunctis  
humanæ fabricæ ossibus præ-  
stare 162 a  
femoris os, sed ualde ppcrā 208 a  
femoris ossis capitulum latera cur  
multis cæcis foraminulis op-  
pleantur 163 a  
femoris ossis nomina 208 a  
femoris ossis, unā cū tibie ossē, &  
fibula, quibus ea ligamēta ad-  
huc cōnata hæret, figura 254 a  
femoris posterior pars cur sima  
cauæq; uisatur, anterior autem  
gibba 165 a  
femoris secundum ipsius longitu-  
dinem forma 163 a  
femoris superius caput 162 a  
femori articulando acetabulum  
paratum 165 b  
femora duo 189 a  
fenestratum os 208 a  
fibræ



- fibræ uenarum 436 b  
 fibræ rectæ, obliquæ, circulares, tranſuerſæ 437 b  
 fibrarum cordis & muſculorū ratio quatenus eadem aut diuerſa 732 a  
 fibrarum in fronte ſeries 282 b  
 fibrarum in inteſtiniſ ratio 614 b  
 fibrarum per futuras à duramembra proropentiū uſus 777 b  
 fibrarū, quæ naturali motui præſunt, ab ijs quæ arbitrariorum mutantur, differentia 436 b  
 fibrarum motibus naturalibus ſeruientiū ſpecies & functio. 437 b  
 fibrarum ſtomachi motus duplices 337 b  
 fibrarum in ueſica, uentriculo, & bilis ueſicula ratio 635 b  
 fibrarum uſus 742 b  
 fibras non tantum ad uentriculorum cordis ſeptū, ſed etiam ad reliquam uentriculi mucronis circumferentiam adnaſci, contra Galenum 737 b  
 fibula 167 b. quid Veſalio propriè uocetur ibid. & 208 b  
 fibula quid à ſura differat 167 b  
 fibula ſecundum ipſius longitudinem triangula 170 b  
 fibulæ ad tibiam os nexus 168 b.  
 in qua parte de hiſ dicat 169 a  
 fibulæ appendix 170 a  
 fibulæ cum talo articulatione 169 b  
 fibulæ excarnis pars 170 b  
 fibulæ duæ 189 a  
 filum ſectioni aptum 202 b  
 focile maius & minus 208 b  
 focilis maioris & minoris nomina ibid.  
 focile maius brachij 207 b. minus brachij 208 a  
 foetus bubali inuolucrorum figura 588 b  
 foetus canini exterioris inuolucric delineatio 588 a  
 foetus humani tunicarū ſeu inuolucrorum expreſſio 586 b  
 foetus inuolucrum primum ac extremum cuiuſinodi 671 b. & quali ſubſtantia ibid.  
 foetus inuolucrum ſecundum, & tertium ob farciminiſ ſpeciem dictum 671 b. & 673 b. tertium autem ob mollicie candoremque ab agno nomen mutuatur, ibid.  
 foetus inuolucric extimi nomina, 671 a  
 foetus inuolucra à mulierib. exuri uel deſecti, ab animalibus uero ruſum deuorari 675 a  
 foetus qui ſe habeant inuolucra, pluribus ſimul exiſtentibus foetibus 675 b  
 foetus inuolucrorū examen 695 a  
 foetus in utero ſitus 586 b  
 foetus ſudor, ac dein reliqua excremēta ubi coaceruatur 674 b  
 foetus urinae meatus 636 b, 674 a.  
 cur ἀφαιρός & ἀφανός appelleretur. 674 a. item quæ ſit ipſius ratio. ibid. & quomodo inquirendus 696 b  
 foetus urina & recremento uterique ceruicem irrigari atque diſſedi, ad faciliorem partum 675 a  
 foetui uitalem ſpiritum aſerentes arteriæ 636 b  
 foetus humanum & caninum & bubalū duobus ambiri inuolucris: ac dein quib. exterioris inuolucric ad uterum ſit nexus, quib. uſus 671 b  
 foetus inuoluens mēbrana à qui buſſidē exiccata, cur aſſeruari ſolita, eiꝯque diuerſa nomina. 675 b  
 foetus inuoluens membrana falſa non omnibus pueris cōmunis habita, deꝯ eo mulierum ſuperſtitiones ibid.  
 foetus examen 820 b. 824 b  
 foramen ad excolandam in nare pituitam præcipuè paratū 62 b  
 foramen cæcum 66 a  
 foramen dorfali medullæ paratū. 100 b  
 foramen, quo dorfali medullæ aptum paratur iter 72 a  
 foramen in oculi ſede omnium maximum quod ſit 62 a. quib. uſus eiꝯ uſus ibid.  
 foramen orbiculare cur in ſedis oculi radice elatiſ ſimū, & in cuneiformi oſſe incifum ibid.  
 foramen prime uertebræ, dorfalem tranſmittens medullam 77 b  
 foramen, ſecundum par dorfali medullæ neruorum in poſteriora tranſmittens 80 a  
 foraminis dextræ oculi ſedis effigies 62 b  
 foraminis maximo ſiniſtræ ſoporalis arteriæ ramo parati effigies 65 b. eiꝯque uſus ibid.  
 foramina auditus organi cavitatem ingredientia 66 a  
 foramina cæca in uertebrarū corporibus 90 a  
 foramina in poſteriori ſacri oſſis ſede, cur minora quàm in anteriori ſpectentur 102 a  
 foramina neruis emittendis parata 73 a  
 foramina neruos tranſmittētia, in dorfali oſſibus etiā cæleri ibid.  
 foramina octauū oſſis capitis, & ſedes, quibus oſſis tactus organa reponuntur, in hominibus & canibus uariari 63 b  
 foraminum capitis, ſiue caluariæ deſcriptio 59 b  
 foraminū octauū oſſis capitis uſus 63 a. & figura ibid.  
 foramina ſacri oſſis ad neruorum emiſſionem deſtinata 102 a  
 foraminū in uertebris neruos in latera tranſmittentiū natura 83 a  
 foraminula per caluariæ ſuperficiem ſparſim obuia 67 b  
 forſicula 202 b  
 fornicis ſeu teſtudinis in modum formati corporis ſitus 789 b.  
 ſubſtantia, nexus, inferior ſedes 790 a. uſus ibid.  
 frontis muſculoſa ſubſtantia 282 a  
 frontis muſculoſæ ſubſtantia ad miniſtratio duplex 282 b.  
 prioris 283 a. poſterioris. ibid.  
 frontis cutem mouentis muſculi delineatio ubi ſpectanda 217 b  
 frontis muſculi ibid.  
 frontis os 206 b. eiꝯque circumſcriptio 46 b. & forma 36 b  
 frontis os cum uerticis oſſe iunctum, cur ibi ſit craſſius 37 a  
 frontis oſſis nomina 206 b  
 frontem tranſuerſis ſectionibus non eſſe tentandam 282 b  
 fulcrum 207 a  
 furcula pectoris oſſis 114 b  
 furcula ſuperior 207 b. item humilior ib. inferioris mediū. ib.  
 furculæ 207 b. inferiores ibid. fuſi oſſa 207 a



G

Alea, foetus in uolvens mēbrana, qui buſſidē dicta 675 b  
 Galenus ad ginglymon tribus oſſibus opus eſſe nō animaduertit 18 a  
 Galenus coccygis oſſa à ſacri oſſibus peritæ, admodumque anaromice ex ſimiarum canumque fabrica diſtinxit 105 b  
 Galenus cordis ſitum mediū eſſe, ut umbilicū, malè aſſignat 742 a  
 Galenus cur de uena pari carente ram uariè ſcripſerit 463 a. 464 a  
 Galenus cur omentū modiciſ & laxiſ nexibus, idque ad dextrum tantū latus colo inteſtino committi proderit 605 b  
 Galenus de ceruicis ueſicæ muſculo notatus 395 b  
 Galenus de laterali capitis ſupra primam uertebram motu reſutatus 85 b  
 Galenus de penis neruis notatus 650 a  
 Galenus de pituita in cuneiformi oſſe tranſcolatione deſenſus 40 a  
 Galenus de pituita tranſcolatione notatus 795 b. 818 a  
 Galenus de uentriculorum cerebri præſtantia uariis 789 a  
 Galenus de proceſſibus cerebri notatus 776 a  
 Galenus de reticulari plexu ſub cerebro notatus 796 b  
 Galenus de ſoporalis arteriæ dextræ per unum foramen in caluariam ingreſſu notatus 795 b.  
 neque, ut ipſe ſentit, cōmune eſſe foramen cum tertio pari neruorum ibid.  
 Cc 2 Galenus

- Galenus de tibiā mouentibus musculis notatus 398 b
- Galenus de transuersis thoracis processibus confutatur 90 b
- Galenus de uenę mcatu notatus. 638 a
- Galenus de uenis mesenterij explicatus 616 b. 617 a
- Galenus de uenis omenti notatus 605 b
- Galenus de uentriculi situ notatus 595 b. & 696 a
- Galenus de uermiformibus processibus notatus 793 a
- Galenus de umbilici uena notatus 481 b
- Galenus dissectionis studiosorū facile precipuus 670 a
- Galenus dissectionum profellorum facile princeps 796 b
- Galenus dorsi motores musculos quatuor postremos ignorans. 356 b
- Galenus duo brachij ligamenta ignorauit 261 b
- Galenus ex iniūm nature miraculum, artificiumq; 301 b
- Galenus ex simijs & canibus coniecturam faciens, etiam hominibus hunc lobum pulmonis, quo tamen destituuntur, attribuit 712 b
- Galenus in boum dissectione delusus 501 b
- Galenus in ceruicis uertebrarum historia confutatus 84 a
- Galenus in describēdis brachiū attollentibus musculis uariis. 318 b
- Galenus in descriptiōe dorsi musculorum notatus 353 b
- Galenus in descriptione ossis faciei & coccygis notatus ac resutatus 103 b
- Galenus in descriptione uenarū humerarū & axillaris partim uerus, partim falsus, & quo pacto 470 a
- Galenus in lumborum musculorum seu carnis enarratione, ab hominis compositione, suis simijs delectatus, aberrauit. 412 b
- Galenus in Pindaro irridēdo magis, quā spectandis ossibus occupatus 176 a
- Galenus in traditione musculorū intercostalium uariis 350 a
- Galenus in uasorum mamillas perceptiū distributionis usu explicando cur sit admodum diffusus 680 a
- Galenus malē sensit, quod parem quasi articulationem thoracis uertebris tribuerit 89 a
- Galenus maxillā non unicū esse os asserens, resutatus 55 a
- Galenus meatuum alterum ex cerebri tertio uentriculo educitū præterijt 794 a
- Galenus nature summus admirator 611 a
- Galenus nimium fauēs simijs, futuras frōtis & maxillæ hominī similes esse, plus satis sibi persuasit 53 b
- Galenus omnes costas duobus internodijs articulatī, malē sensit 91 a
- Galenus penis musculos nō probē affecutus 650 b
- Galenus per obliquum motum quid intelligat 139 b
- Galenus quomodo sacrum os & coccygis descripserit 103 a
- Galenus simiarum uenas ex professo docens, hominum uenas non persequitur 447 a
- Galenus tertij cordis sinum, cui Aristoteles arteriarū originem tribuit, ad dextrum cordis uentriculum malē retulit 486 a
- Galenus tertij usum peritonæi, quod id scici alimenti superflua, septi transuersi accedente opera, propellere asserit, malē asserit 593 b
- Galenus uertebrarum cōtextum ad ginglymon malē retulit 18 a
- Galenī anatomica demonstratio, qua glandosum corpus semini parando non præesse, confiteatur 647 a
- Galenī sentētia de adipe inter cutem manus internę, & tendinē illi subnatum, notata 363 a
- Galenī de trib. animæ speciebus, aut partibus inter se natura diuersis, sententia 541 a
- Galenī de arterię magnæ & uenę orificijs lapsus 735 b
- Galenī locus de arterię ortu 486 a
- Galenī sententia de astragali situ notata 18 a
- Galenī sententia de proprio brachialis motu improbata 379 b
- Galenī sentētia de motu brachialis in pñū & supinū notata 256 b
- Galenī locus de capitis motu in latum super primā uertebra improbat 85 b. & deinceps.
- Galenī de capitis motibus sententia resutata 84 b
- Galenī de cæco intestino sententia 610 b
- Galenī descriptiō de cæco intestino, canī rectius quā simiæ accommodari posse 610 b
- Galenī de cerebelli duplicitate sententia improbata 782 b
- Galenī uana ratio de cerebelli simplicitate 783 b. & 534 a
- Galenī ratio de cerebri diuisione notata 783 b
- Galenī sententia de cerebri reuolutionibus improbata 781 b
- Galenī de cerebri torculari appellatione ambigua 500 a
- Galenī sentētia de cerebri uentriculorum superficie, tenui membrana cincta, eiusq; improbatio 788 a
- Galenī dogmata non pauca de cerebri uentriculis notata, alia omissa 786 b
- Galenī erratū de tribus primis cerebri uentriculis, quos tenui membrana succingi asserit, exponitur 788 a
- Galenī permultadogmata de cerebri uentriculis parum esse uera 786 b
- Galenī sententia, *Λόγος* seu artuum capita *ὑπόφωτος* & *κονδυλάς* uocari docentis, reiecta 11 b
- Galenī de cordis osse sentēt. 105 b
- Galenī de costarum articulatione notata sententia 113 a
- Galenī de costarū cartilaginis sententia 112 a
- Galenī loca, quibus inter cutē & tendinem adipē reponi negat, notata 363 b
- Galenī defensores de coccyge osse, à Vesalio resutant. 106 b. 107 a
- Galenī defensorū impudentia taxatur, quod eum homines magis quā simas descripsisse cōtendant 103 b
- Galenī opinio, de fibrarū, musculorum, buccarum, labrorum, & nasalium ortu, notata 288 a
- Galenī de fibris ad uētriculum cordis septū adnatis erratū. 737 b
- Galenī de foetus inuolucris dogmata quatenus cū ueritate consentiant 675 b. & 676 a
- Galenī de humeri tuberculo interiore & exteriori sententia falsa 131 b
- Galenī de humero post femur omnibus ossibus grandiore, sententia 129 a
- Galenī opinio de laryngis operculi usu, notata 310 b
- Galenī liber de Ossibus, cum Syluij editus commentarijs, qualis sit 105 b
- Galenī libri de Administrandis sectionibus partē, in qua linguę musculos recensuit, unā cum libris de Musculorū refectione, absq; dubio interijisse 301 b
- Galenī de Vsu partium libri notati 379 b
- Galenī librorū eueriores notantur 106 a
- Galenī & aliorū philosophorum de mamillarum situ ratio non omni ex parte uera 679 a
- Galenī locus de masseteribus musculis notatur 293 b
- Galenī locus de maxillæ superioris futuris explicatur 293 b.
- alius de eorundē ossium constitutione ibid.
- Galenī loca aliquot de maxillę superioris ossiū numero, futuris, resutata

- refutata 33 a. 294 b. & deinceps.
- Galenī locus de membranis pro-  
cessus uermiformes continen-  
tibus notatur 256 a
- Galenī opinio ē esse falsam, qua  
statuit secundum uiculi mouen-  
tium digitos, tendinem in pri-  
mo internodio dilatari 366 b
- Galenī locus, musculum inter li-  
gamēta & neruū ponentis esse  
mediū, improbat 261 b. 262 a
- Galenī locus de musculo brachi-  
um attollēte notatus 313 b. 314 b
- Galenī de quarto brachij motorij  
musculo notata sententia 315 b
- Galenī super musculo quopiam  
brachij motore, in hominibus  
autem non reperto, notata sen-  
tentia 316 b
- Galenī sententia de musculo tan-  
quam brachium circumuerten-  
te notata 315 b
- Galenī de musculo quopiam tan-  
quam brachij motore notata sen-  
tentia 313 b
- Galenī sententia de musculo pri-  
mo flexentium cubitum nota-  
ta 381 b
- Galenī super cartilagine inter uer-  
tebras dorsi repolita, notata sen-  
tentia 359 b
- Galenī ratio, quia cerebellum sim-  
plex esse docet, uaria 534 a
- Galenī de cordis osse sententia.  
116 b
- Galenī de crurum in animalibus  
flexione, &c. dogma 175 b
- Galenī sententia de cubiti flexio-  
nibus planē imaginaria, nota-  
ta 383 a. eiusdem in enume-  
randis musculis harum autori-  
bus uarietas ibid.
- Galenī in cuneiformis ossis de-  
scriptione lapsus 40 b
- Galenī de digitorum forma sen-  
tentia 150 a. & articulatione.  
ibid. item, an sint medullæ ex-  
pertia digitorum ossa ibid.
- Galenī placitis de dorsi motibus  
sententia contraria 94 a
- Galenī de femoris adcoxendicis  
os motu lapsus 162 b
- Galenī de foetus inuolucris, atq;  
eius formatione dogmata, qua-  
tenus uera 676 a
- Galenī sententia de foraminis se-  
cundum neruorū cerebri par-  
transmittētis magnitudine im-  
probata 62 b
- Galenī sententia de foraminibus  
cribrum referentibus, ac pitui-  
tam cerebri expurgantibus, fi-  
cticia 795 b
- Galenī de glandulosa carne ad in-  
ferius uentriculi orificium sen-  
tentia 597 b
- Galenī de musculo quopiam tan-  
quam scapulam mouente, no-  
tata sententia ibid.
- Galenī sententia, de musculo tier-  
uosa sua exilitate mediæ uolæ  
& internæ digitorum sedis cu-  
ti subnato, improbata 362 b
- Galenī sententia de quarto thora-  
cis musculo notata 354 a
- Galenī super primo tibiā mouen-  
tium musculo notata sententia,  
400 a. super secundo ibid. b.  
super tertio 401 a. super quar-  
to ibid. b. & 402 b. super quin-  
to 403 a. super sexto, quē per-  
functoriē tantū attigit 404 a.  
super nono 406 a. super  
tendinibus tibię musculorum.  
ibid.
- Galenī de quinto musculo tibiā  
mouentium sententia 403 a
- Galenī in 2. de Administr. sect. sen-  
tentia cum uera musculorū de-  
scriptione enarratur 399 a
- Galenī locus de numero muscu-  
lorum digitos mouentium, re-  
stitutus 372 b
- Galenī super musculorū dorsum  
mouentium pari primo notata  
sententia 353 b
- Galenī & Aristotelis de mamilla-  
rum situ rationē non omni ex  
parte ueram esse 679 a
- Galenī sententia de tribus mēen-  
terij an sit ueritati conformis,  
616 b. & cuiusmodi 616 a
- Galenī de musculi in poplite lati-  
tantis functione notata senten-  
tia 409 a
- Galenī de musculorum caput mo-  
uentium pari secundo notata  
sententia 329 a
- Galenī de quarto musculorū pa-  
ri, ossi hyoidi propriorum, no-  
tata sententia 298 b
- Galenī in describēdo quinto dor-  
sum mouentium musculorum  
pari notata sententia 355 b
- Galenī in describēdo sexto dor-  
sum mouentium musculorum  
pari notata sententia ibid.
- Galenī opinio de musculorum fi-  
bris notata 270 b
- Galenī de musculorū intercosta-  
lium functione notata senten-  
tia 345 a
- Galenī sententia de primo radium  
mouentiū musculo notata, 380 a
- Galenī in musculorum scapulam  
mouentium traditione notata  
sententia 326 b. ac deinceps.
- Galenī locus de musculorum ten-  
dinibus notatus 272 b
- Galenī sententia de musculorum  
thoracem mouentium numero  
exposita 342 a. b
- Galenī notata sententia, qua mus-  
culos, quibus ossa mouentur,  
tendinibus carere statuit 272 b
- Galenī in describēdis ab dominis  
musculi uarietas reprehensa.  
336 b
- Galenī de musculis cubitum mo-  
uentibus figmenta 381 b
- Galenī loca pugnancia de muscu-  
lis manus digitos mouentibus  
notata 366 a. b. 367 a. 368 a. b. &  
369 a. b. 371 a. & 374 a
- Galenī locus de musculis labra  
mouentibus notatus 288 a. &  
289 b
- Galenī sententia de musculis pol-  
lici prefectis notata 376 a
- Galenī sermonem de musculis pe-  
dem mouentibus, simiarum fa-  
brice, non hominis conuenire,  
422 b
- Galenī sententia de musculis pri-  
mis pedem mouentibus nota-  
ta 419 b. de quarto muscu-  
lo 420 a. de quinto 421 a.  
de octauo 423 a. de muscu-  
lis pedis digitos mouentibus.  
426 a. b
- Galenī locus de naturali expira-  
tione, quam citra musculorum  
opem perfici asserit, declaratus  
349 b
- Galenī de secūdo pari neruorum  
brachium subeunte sententia er-  
ronea 542 a
- Galenī error notatus, quōd pec-  
liaria ossa, quibus incisorij den-  
tes insignuntur, in homine con-  
stituerit 53 b
- Galenī loca de ossiū inter se con-  
missura, à ueritate discrepantia,  
ē multis aliqua enumerata 20  
a. b. & deinceps.
- Galenī de synarthrosi ossium pe-  
ctoris erratum diluitur 114 a
- Galenī orationem in secundo de  
Administrandis sectionib. ob-  
scuram atq; imperfectam esse,  
nec undiq; suis in tertio de Par-  
tium usu placitis respondere.  
416 b
- Galenī sententia de ossis cunei-  
formis constitutione ac usu no-  
tata 412 a
- Galenī sententia de ossis cunei-  
formi tanquam perforato instar  
spongiz, improbata 64 b.  
& quōd pituita illa non cole-  
tur ibid.
- Galenī locus de ossē inter cere-  
brum ac cerebellum in canib.  
posito, explicatus 422 a
- Galenī de ossē maxillæ inferioris  
tanquam gemino, notata sen-  
tentia 35 a
- Galenī de tertio quodam ossē in  
summi humeri cum clauicula  
nexu sententia 123 a
- Galenī sententia, quōd ossa digi-  
torum medullæ sint expertia,  
improbata 150 a
- Galenī loca de ossiū inter se stru-  
ctura, à ueritate aliena, ē multis  
aliqua enumerata 19 a
- Galenī sententia de ossibus digi-  
torum



- torum tanquam solidis impro-  
bata 3 b  
Galeni de patellæ cartilagine la-  
pſus 172 b  
Galeni de pedis & manus oſſiſſi  
pari numero lapſus 181 a  
Galeni de pituita cerebri per olſa  
ſub canales educenda lapſus.  
515 b  
Galeni de portæ uenæ, ut ſangui-  
nem conſiciente, ſententia ua-  
ria 449 a  
Galeni de primo pollicis oſſe la-  
pſus 180 b  
Galeni de acuto ulnæ proceſſu,  
quem ſtylo comparamus, ſen-  
tentia 139 a  
Galeni ſententia de proceſſu pri-  
mæ ceruicis uertebræ antero-  
rinotata 78 a  
Galeni ſententia de proceſſuum  
in cerebro uermiformium uſu  
notata 796 a  
Galeni ſententia de proceſſibus  
duræ membranæ tanquam du-  
plicatis notata 776 a  
Galeni de quinto pulmonis in ho-  
mine lobo error 724 b  
Galeni ſententia de quinto pulmo-  
nis lobo, cauam uenâ ſuſtinen-  
te, notata 462 b  
Galeni de quadrupedum genu ar-  
ticulo lapſus 168 b  
Galeni ratio de renum ſitu mini-  
mè approbata 631 a  
Galeni reticularis plexus nuſquā  
inuentus 796 b. ſuper quo  
locus è libro De uenarum & ar-  
teriarum ſeſſione ibid.  
Galeni de reticulari in caluaria  
plexu lapſus 643 a  
Galeni de ſacro oſſe & coccyge  
ſententia notata 103 a. 105 b. 106 a  
Galeni de ſeminali uenarum or-  
tu & ductu ſententia 642 b  
Galeni de ſimiarum ad hominem  
differētia, notata ſententia 417 a  
Galeni notata ſententia de ſinibus  
in dura cerebri membrana con-  
ſtitutis 497 a  
Galeni de ſtomachi cum arteria  
inceſſu ſententia 594 b  
Galeni ſententia de tendine lato,  
qui plantę cuti ſubnaſcitur, no-  
tata 419 b  
Galeni ſententia de tendinibus  
xvii muſculi digito mouen-  
tium notata 374 a  
Galeni opinio de tendinibus pro-  
ceſſus uermiformes continen-  
tibus notata 793 a  
Galeni notata ſententia de tibiæ  
motuum differentiis 399 b  
Galeni de tibiæ oſis ſinibus ſen-  
tentia notata 168 a  
Galeni ſententia de neruo paris  
tertij notata 519 b  
Galeni exploſa ſententia, quod  
neruorum alijs ſenſu, alijs motui  
præſint 546 b  
Galeni ſententia de neruorū opti-  
corum foraminibus 518 a  
Galeni in neruorum traditione  
notata ſententia 548 b  
Galeni locus de neruis è primo  
de Locis affectis notatus 541 a.  
eiſdem locus alter è libro 3. de  
Adminiſtrationibus anatome.  
542 a  
Galeni locus de oculi tunica, è de  
cimo de Vſu partium 802 b  
Galeni de omenti membrana, co-  
lon dorſo colligante, ſententia.  
605 b  
Galeni ſententia de acutis oſſium  
proceſſibus notata 10 b  
Galeni placitis quæ potiſſimum  
repugnant 20 a  
Galeni de poſtbrachialis oſis  
ſententia 146 b  
Galeni ratio de renum ſitu, qua  
dextrum ſiniſtro editiorem eſſe  
docet, improbata 631 b  
Galeni ſententia in tradendo ſca-  
pulæ motorum primo, ſecundo  
& quarto muſculo, notata.  
327 a b  
Galeni ſcripta in ſolis ferè Anato-  
micis interpretem quàm maxi-  
mè deſiderare, cum ſibi nō ſint  
undiq; conſona 671 a  
Galeni locus de tendinū in digi-  
tos manus inſertione notatus.  
376 b. contraria de his do-  
cens 377 a  
Galeni de uenæ ſine pari ortu ſen-  
tentia 463 a  
Galeni de uenæ cauæ per crus ſe-  
rie deſcriptiones uariæ, & pa-  
rum ueræ 480 b  
Galeni irrefutabilis demōſtratio  
de cauæ uenæ ortu conſutata.  
457 a  
Galeni argumenta de uenæ cauæ  
exortu in Ariſtotelem, non o-  
mnia ex tripode dicta 455 b  
Galeni de ortu uenæ ſine pari ſen-  
tentia ſibi neutiſſimè conſta-  
re 463 a  
Galeni ſententia, qua cauam ue-  
nam, ubi iecoris gibbo conne-  
ſcitur, ampliſſimā eſſe ſtatuit,  
reſutata 459 b. 456 b  
Galeni dogma, quo uenā cauam  
ex corde prodire incitatur, o-  
mnino reſpuendum eſſe 456 a  
Galeni locus, à uena cauæ, priuſ-  
quam ad cor pertingat, uenas  
in membranas thoracem inter-  
cipiētes deduciac diſtribui do-  
cens, reiectus 462 b. eiſdē  
alius de uenę arterialis ortu no-  
tatus 463 a  
Galeni de uenarū ortu commen-  
taria ſic eſſe legenda, ut magis  
ueritas, quàm ipſius in illis au-  
toritas ſpectetur 751 b  
Galeni de tuberculo primæ cerui-  
cis uertebræ attributo, notata  
ſententia 78 a  
Galeni de numero proceſſuū uer-  
tebrarum ceruicis erratū 82 b  
Galeni de cauæ uenæ in omētum  
ductu error 605 b  
Galeni de cauæ uenæ ortu irrefu-  
tabilis demōſtratio conſuta-  
ta 457 a  
Galeni de cauæ uenæ principio  
ſententia exploſa 735 b  
Galeni de uena cauæ uentriculo  
ſubſtrata opinio 599 b  
Galeni de uena pari carente ſen-  
tentia cur ſit tam uaria 464 a  
Galeni de uenis meſenterij ac in-  
teſtinorum lapſus 616 b  
Galeni de umbilico corporis me-  
dio ſententia 595 b  
Galeni de uteri cornibus notata  
ſententia 341 a  
Galeni de uteri uenis in mamillas  
ſeſe exonerantibus ſententia 630 b  
Galeni in aſſignatione aliquot in  
lumbis uertebrarū uarietatis no-  
tata 97 a. eiſdem ſententia,  
lumborū uertebris proceſſum  
aſſurgentis, ad imitationem ſi-  
miarū ac canū, improbata 96 b  
Galeni proceſſum, lumborū uer-  
tebris aſcriptum, in hominibus  
Veſaliū nunquam reperiſſe,  
ibid.  
Galeni ſententia de nexu corpo-  
rum thoracis uertebrarum no-  
tata 79 a. item de foraminibus  
uertebrarū neruos tranſ-  
mittentibus 90 a. item de co-  
ſtarū ad uertebras articulatione  
90 b. item de tranſuerſis  
inſimarum thoracis uertebra-  
rum proceſſibus ibid. & 94 a  
Galeno ignota uenæ axillaris di-  
uiſio quædam 470 a  
Galeno in humani corporis fabri-  
cæ cognitione nimium à ple-  
riſq; tribui 670 a  
Galeno quid teſtis caput appella-  
tum 641 b  
Galeno uaccinus caninus' ue ute-  
rus, non muliebris diſſectus at-  
que deſcriptus 664 b  
Galeno umbilicus non rectè cor-  
poris mediū conſtituitus 449 a  
Galeno ignota non pauca capitis  
foramina 64 b  
Galeno non eſſe credendū, quod,  
utcumq; internum humeri tur-  
ber grande ſit, id externo gran-  
dius eſſe prodiderit 131 b  
Galeno minimè aſſentientium, q  
maxillam ſuperiorem medulle  
expertem, durisq; oſſibus, nec  
leuitate indigentibus efforma-  
tam doceat 49 a  
Galeno præteritus muſculus in-  
ter brachij motores quintus,  
378 a  
Galeno quid ſit peculiare 348 b  
Galeno

Galeno tres secundum pollicis os  
flecentes musculi ignorati 372 a  
Galeno sacrum os, & coccygis os,  
ut in simia se habent, descripta  
105 a  
Galeno uenæ axillaris diuisione igno-  
ra 463 b  
Galenum in abdominis descriptio-  
ne uarium esse 336 b  
Galenum Aristoteli imposuisse, quod  
tres uentriculos cordis consti-  
tuerit 736 b  
Galenum axillaris uenæ diuisione  
integram latuisse 471 a  
Galenum in brutorum animalium  
seccione potius quam hominū  
uersatum esse 626 b  
Galenum canum intestina magis  
quam hominum inspexisse 611 a  
Galenum de capitis supra primam  
uerteram, & primæ supra secū-  
dam, & dein reliquarum ceruicis  
uerterarum moribus, longēse-  
cus quam Vesaliū, sentire  
84 a  
Galenum rationem unitatis cere-  
belli parū apte designasse 782 b  
Galenum mirabilem illum reticula-  
rē cerebri plexum sua imaginat-  
ione in hominibus consinxisse  
65 b  
Galenum, cor in medio repositum  
esse, contra ueterum placita con-  
tendere 730 b  
Galenum dissectionibus mirifice  
oblectatum esse 417 a  
Galenum, diligentem & eruditum  
solertem quē & in dustrum audito-  
rem requirere, qui ea quæ de ca-  
pitis moribus in 12 de Vtupartū  
libro pertractarit, capere possit  
84 a  
Galenum foramen sinistra sopo-  
rali arteriæ paratum latuisse  
65 b  
Galenum de foramine dextræ ocu-  
liferis, aliter quam Vesaliū,  
sensisse 62 b  
Galenum & genu cartilaginibus  
ligamentorum nomen indidisse  
256 b  
Galeni de glādis cerebri usu rectē  
sentire 791 a  
Galenum, Hippocratem in Anato-  
micis nunquam esse lapsū, ni-  
mium audacter testari 620 a  
Galenum hominis anatomiam nū-  
quam aggressū esse 470 a  
Galenum hominis pedem nunquā  
dissecuisse 422 b  
Galenum non hominis cor, sed si-  
miarum & canū aggressū esse  
729 b  
Galeni non hominum, sed simia-  
rum musculos descripsisse 411 b  
Galenum pro hominum anatome,  
simiarum nobis obtrusisse 420 b  
Galenum humani corporis anatomo-  
miam nunquam esse aggressū,

unde Vesalius conijciat 470 a  
Galenum neruorum recurrentium  
inuentorē ac summum admira-  
torem fuisse 524 a  
Galenum parem integrorum digi-  
torum ac eorundem ossiū formā  
minus rectē proposuisse 152 a  
Galenum quædam ossa ipsi non ui-  
sa, tanquam in humano essent  
corpore, recensere 422 a  
Galenum subinde dorsum & spi-  
nam, in tibia mouentium mus-  
culorum descriptione confun-  
dere 156 a  
Galenum ueterum de homine de-  
scriptiones suis simis accommo-  
dasse 106 a  
Galenum viscera hominis oscitan-  
ter, aut ne utiquam spectasse: si-  
mias quæ & canes describentē, im-  
merito ueteres arguisse 728 a  
Galenum humani penis fabricam  
nunquam spectasse 648 b  
Galenum falsū humerum exterius  
gibbum, interius simum, &c. sta-  
tuisse 131 b  
Galenum inuolucrorum historiā  
non uerē proposuisse 676 a  
Galenum ut minimum duo liga-  
menta, anulorum modo tendi-  
nes continentia, latuisse 385 b  
Galenum neque 11, neque 12 musculo-  
rum dorsum mouentium doctri-  
nam rectē tradidisse 356 b  
Galenum in lumborum musculo-  
rum, seu carniū enarratione,  
ad hominum compositione ab-  
errasse 412 b  
Galenum omnes teretes tibia mo-  
uentium musculorum tendines,  
ac si lati ampliū essent, descri-  
psisse 406 b  
Galenum duos musculos laryngis  
operculi latuisse 309 a  
Galenum non ex omni parte sibi cō-  
sentire 398 b  
Galenum os tertium in superioris  
scapulæ processu nunquā uidisse  
123 b  
Galenum uacuum ossium articulo-  
rum sedem finxisse, cum sint po-  
tius mutuo contigua 87 a  
Galenum penis corporum originē  
non rectē assecutum esse 394 b  
Galenum in processibus scapulæ  
non undique sibi constare 124 a  
Galenum sibi haud conformia di-  
cere 426 a  
Galenum simiarum cōstructionē,  
non hominum descripsisse 313 a  
Galenum simiarum, non hominū  
Anatomia aggressū esse 724 b  
Galenum simiarum uenas, non ho-  
minum, persectum esse 447 a  
Galenum simijs nimium tribuisse  
606 a  
Galenum unicum tantum tendinē  
tribus pollicis ossibus cōmunē  
cognouisse 375 b

Galenum in quarundam uteri par-  
tium descriptione esse ualde an-  
cipitem, sibi quæ parum fidere 667 a  
a. scilicet in uteri formæ explica-  
tione, musculorum, cornium, ace-  
tabulorum, uenarum & arteria-  
rum ibid. item uasorum semen-  
deferentium 663 a  
Galenum muliebrem uterum neque  
dissecuisse, neque descripsisse  
664 b  
Galenum, non muliebrem, sed uac-  
cinum caprinum uterū descri-  
psisse 341 a  
Galenum de uenarū arteriarumque  
seccione sibi ne utiquam respon-  
dere 494 a  
Galenum errare, quod uenas mem-  
branarum intersepiuntium à ca-  
ua, ubi septum permeet, initium  
ducere, asserat 713 a  
Galli sacerdotis Bononiæ aqua  
intercutem in xenodochio mor-  
tui historia 627 b  
Gallicus morbus quæ loca homi-  
nis potissimum infestet 722 a  
γαλλικὸν 606 a  
gargar 722 b  
gargareon ibid. b. curi idem quod a uete-  
ribus Græcis nuncupatus 721 b  
gargareonis nomina 722 b. eius-  
demque situs, forma, substantia,  
usus. ibid. b  
gargareonis præsecutio uero derosio,  
quid incommodi pariat ibid. b  
gargareoni Gallicus morbus infe-  
litus ibid. a  
gargareonem temerē à quibusdam  
excrementorum cerebri recepta-  
culum esse, confictum 723 a  
gargareonem soli inter animalia  
homini, & quibusdam auibus ob-  
tigisse 722. b  
γαστήρ unde dictus Græcis uentri-  
culus 595 b  
γαστροκυκλία 167 b  
γαλκίοι dentes 207 a  
gemelli dicti in cerebro 791 b  
generationis organorum examen  
820 b  
γούρ 207 a  
genu rotula 208 b. oculus. ibid. a  
genu utriusque duæ cartilagines 190 a  
Genuensium, Græcorum & Turca-  
rum capita, cur globi imaginem  
representent 23 a  
gemini dentes 58 a. 207 a  
geminos dentes Cicronem mola-  
res uocasse 58 a  
Germanorum capita cur lata, & cō-  
presso occipitio cernantur 23 a  
Gibberus siue gibbus ulnæ proces-  
sus 136 a. 208 a  
γύγλυμος humeri orbita 16 b  
γύγλυμοειδής 130 b  
glandis pineæ nucis similis, situs &  
cōstructio 790 b. usus. ibid.  
glandis pituitam excipientis histo-  
ria 794 b  
glandia



glandis cerebri pituitam excipien-  
tis, ipsiq; accumbentium arteria-  
rum examen, seu administratio  
812 b  
glandes hominis, quarum loco in  
bibus sunt musculi 310 a  
glandes intestinorum 610 a  
glandes laryngis radici adnate  
717 b  
glandes nō omnes uasorum distri-  
butioni accommodas, huic tan-  
tum muneri subseruire 442 a  
glandium genus secundum Hip-  
pocratem spongiarum nomen  
cur obtinuerit 721 b  
glandium in faucibus triplex genus  
ibid. b  
glandium in faucibus positarū ter-  
tium genus 722 a  
glandium 646 b  
glandulæ cerebri testula incubentis  
administratio 810 a. eiusdē historia  
794 b. de lineatio unde spectā-  
da 793 b. canales ab ea ducti 794 b  
glandulæ, cui pituita influit, unā cū  
pelui & quatuor ductibus à glā-  
de auris porius, pituitam de-  
ducentibus, effigies 64 a  
glandulæ cur, & quando uasorum  
distributionib; immittantur 441 b  
glandulæ faucium cur περιόμια uo-  
cata 721 b  
glandulæ sub aurium radice ad po-  
steriorem inferioris maxillæ se-  
dem repositæ 211 a  
glandularum in mamillis ratio di-  
uersa 676 b  
glandularum & pinguedinis laryn-  
gis ratio 720 a  
glandulæ testibus incubentes 810 a  
glandulæ uasorum diductibus ro-  
boris gratia immisse, adnexæq;  
441 a  
Glandularum quæ in faucium ini-  
tio sibi opponuntur, ac secundu  
genus constituit, inflammatio-  
nes, Græcos αἰτιδᾶς, quæ uerō  
in faucibus, περιόμια appellasse  
722 a  
glandularum stomacho crebro ad-  
natarum usus 595 a  
glandularum quæ uasorum distri-  
butionib; immittuntur descriptio  
441 b. nomina. ead. usus 442 b  
glandulis faucium infestus morbus  
Gallicus 722 a  
glandulas frequentes ubi natura po-  
tissimum circumposuerit 477 b  
glandes siue glandosum corpus  
mesenterio cur natura addide-  
rit 617 b  
glandosum corpus uasorum semen  
deferentium insertionem exci-  
piens 645 a  
glandosum omenti corpus 606 b  
glandosi corporis uesicæ collo ad-  
natusus 647 a  
glandosum corpus ad uesicæ cer-  
uicem in uiris positum, est uaso

rum inibi uariæ partitioni opē  
ferat, excipendis tamen uasis se-  
minarijs, & peculiari humore  
procreando, potissimum, famula-  
ri 442 b  
glandulosi corporis in ipsa uaso-  
rum distributione positi delineat-  
io 565 a  
glandulosa caro non procul ab in-  
feriori officio distans 597 b  
γλῶττις quid propriè uocetur 12 b  
γλῶττις & κοτύλις discrimen 12 a  
γλῶττις & σῖνους 79 a  
glīres atq; sciuros cæcum intesti-  
num adeo amplum sepe nactus  
esse, ut amplitudini ipsorum uen-  
triculi facile respondeant: feci-  
busq; turgidum in sectione ob-  
seruetur 610 b  
γλῶττις quid 188 a. 306 b. ἐπιγλῶττις  
ibid.  
γλῶττις qualiter spectanda admini-  
stranti 310 a  
γλῶττις & ἐτυμολογία ratio 188 a  
γλῶττις & ἐπιγλῶττις differre,  
310 b  
γλῶττις dicta in cerebro 791 b  
γλῶττις 208 b  
γόμεφοι dentes 207 a  
γόμεφοις 18 a  
Græcos διδύμους & γλῆτις nomina  
confudisse 791 b  
granatum malū, cartilago epiglot-  
talis 207 b  
granatum malum testiculorum,  
208 a  
grandinosum os 179 b. 208 b  
γραφοειδὲς processus 38 b. 136  
gula 594 a  
gulæ appellatio quibusdam pro sto-  
macho 181 b  
gulosi atq; timidis maius secur da-  
tum 620 b  
gurgulio quid 722 b  
gustus instrumentum 806 b  
gutturis os 207 a  
gutturium 187 a



**H**  
Hæmorrhoidum flu-  
xus par ratio cum  
mensuuo sanguine  
663 a  
hæmorrhoidum mo-  
dus 449 b  
hæmorrhoidum sanguis unde pro-  
fluat 663 a  
hamuli 201 b  
hamulus unde Vesalius parare cō-  
fueverit 181 b  
ἀρμύνη harmoniarum coitus cuiusmodi  
19 a  
ἡβῆς os 208 a  
Hæstorab Achille circum Troiam  
tractus quo pacto 420 a  
ἡ πᾶσι καὶ dicta uena  
ἰσχυρὸν σφίγγει 458 a  
72 a. 207 a

ἡρῶν os 207 b. unde uocetur 99 b  
Hippocrates in Aphorismis, quid  
sub acetabuli nomine intellexe-  
rit 670 a  
Hippocratis locus de secundo cer-  
uicis uertebræ nomine 79 b  
Hippocratis sententia, de phlebo-  
tomia in pleuritide quæ 464 b  
Hippocratis sententia de septo trā-  
uerso, notata 348 a  
Hippocratis de stomachi incessu,  
sententia notata 594 b  
Hippocratis de summo humero lo-  
cus 122 b  
Hippocratis de temporalibus pla-  
gis locus 43 a  
Hippocrati quæ uocentur acetabu-  
la 670 a  
Hippocrati qui dicantur βαρμῖνες  
13 b  
Hispani cuiusdam in fallenda me-  
retice calliditas 597 a  
histrionis Tridentini in dentibus,  
miraculosum robur 295 b. itē  
cuiusdam histrionis Turci & Mā-  
tuani 181 b  
homo quibus locis à simia differre  
Galeno perspectus 648 b  
homo cur respiret 341 b  
hominis glandes, quarum loco in  
bibus sunt musculi 310 a  
hominis maxillæ cur sinus & cau-  
itates medulla infarctæ attribua-  
tur 54 b  
hominis maxillam cur duram ossē  
oportuit 181 b  
hominis maxillam ferē unico ossē ex-  
trui 181 b  
hominis maxillam inferiorem esse  
breuissimam 181 b  
hominis uesicæ dissectionum rudi-  
bus cur ita imponat 684 b  
hominis uiscera ad ipsorum fabricā  
discendam haud inutiliter coqui  
627 a  
hominem pluribus ossibus quā  
reliqua animantia, motus gra-  
tia consistere 14 b  
hominem producere immortalem  
materiam occasione non licuisse  
638 b  
hominem pulmonis occasione col-  
lo donari 77 a  
hominem ut augetetur, diutiusq;  
uiueret, instrumentis eguisse ua-  
rię nutritioni famulantibus: ac  
demum quæ instrumenta nutri-  
tioni circa cibos potusq; uer-  
sant priuatim sint extructa 599 b  
homines frontis & maxillæ sutura  
desitui 53 a  
homines quosdam uesicula bilis  
carere, ut Aristoteles & Plinius  
cum alijs enarrant, Vesalius ha-  
cenus se comperisse negat 625 b  
hominum & canum παχυμερὲς di-  
uersi coloris 606 b  
hominum fabricę ratio 638 b  
hominibus breuior thorax q; qua  
drupe-



dupedibus à natura datus 461 b  
humanae & caninae anterioris cal-  
variae figura 46 b  
humani alimenti ad plantarum nu-  
tritiam uim differentia 601 b  
humani caput oculorum gratia  
formatum 22 a  
humerales musculi sex 131 a  
humeralia uena 467 a  
humerales uenae iuxta cubiti arti-  
culum series 469 b  
humeralia uenae ortus, & prius-  
quam brachium subeat, series  
467 a  
humerus quid 129 a. 207 b  
humerus seu brachii os 207 b  
humerus summus, ibid. b. eiusque  
fus 124 a  
humeri appendix 7 b  
humeri articulus 120 b. cur à costis  
remoueat 126 b  
humeri caput 11 a  
humeri in anteriori fede asperitas  
ad quid parata 132 a  
humeri externum tuber cui radius  
articulatur 130 b  
ab Humeri externo tubere sex mus-  
culos nasci 131 a  
humeri figura & descriptio 123 a  
humeri foramina in quibus locis ap-  
pareant, & quis eorum usus  
132 a  
humeri inferioris sedis internum tu-  
ber 131 a  
humeri inferioribus processibus  
nulli appendices 10 a  
humeri orbita Hippocrati γυγλομοσι  
dicta 130 b  
humeri ossis figura 2 b. 6 a  
humeri partis superioris descriptio  
129 a. inferioris humeri partis  
descriptio 130 a. item media-  
rum partium descriptio 131 b  
humeri tuberculum externum ibi.  
2. internum ead.  
humerum scapulae necentium li-  
gamentorum descriptio 322 a.  
administratio b  
humeri 207 b  
humerorum scapulis in seculo con-  
iungendorum ratio 199 b  
humero excipiendo paratus sinus  
120 b  
humeri motus 16 a  
humeri orbita, cui ulna articula-  
tur 130 a  
in Humeri orbita, seu rotulae supe-  
riori sede, curnatura duos sinus  
exculperit ibid. b  
humerum post femur non esse om-  
nium ossium grandiozem  
129 a  
humeri duo 133 b  
humeri 207 b  
humeri crystallinus 801 a  
ὁ αλοειδης dictus oculi humor 802 a  
ὁ βλεος 203 a  
ὁ αρατοειδης humor 805 a  
hydrocephalus 24 a

ὁ αλω 279 a. 654 a  
hymen puellarum uenule consti-  
tuentes 654 a  
ὁ οειδης os 69 b. 117 a. 207 a  
hoydis ossis figura 69 a. eiusque si-  
tus & nomina ibid. b  
hyoidis ossis formatio & usus  
70 b  
hyoidis ossis medium ossiculū 69 b  
latera humiliora eiusdē 70 a. i. ē  
superiora, & commissa ipsius ossi-  
cula ibid.  
hyoidis ossis quorū ossicula 183 b  
hyodes os quomodo formetur 70  
b. eiusque usus ibid.  
hyoidis latera superiora, & commis-  
sa ipsius ossicula ibid. a  
ὁ κωκ 290 b  
ὁ κωκωδης quid 709 b  
hypiti 206 a



I  
Acobus Niger patri-  
cius Genueusis, iu-  
ris peritiss. 111 b  
ianitor uentriculi ori-  
ficium 596 b  
ἱατρικος 208 a  
iecoraria dicta uena quae  
iecur quid 453 a  
iecur an crapula absumatur 620 b  
iecur anteriori peritonaei fedi cuius  
beneficio connectatur 621 b  
iecur ciborum potuumque & uene-  
reorum concupiscibilis animae lo-  
cus 741 b  
iecur cuius facultatis animae sedes,  
ibid.  
iecoris caui delineatio 566 b  
iecur homini grandius, & quibus  
maius obtigerit 620 b  
iecur humanum cur maiorem sui  
portionem in dextro latere exte-  
rius habeat 613 a  
iecur in fibras aliquo pacto diui-  
sum, nunquam Vesalium in spe-  
xisse 620 a  
iecur magnum & crassum orga-  
num fieri cur fuerit necessarium  
619 a  
iecur maxima ex parte costis suc-  
cingi, muniturque 618 b  
iecur nulla peculiari egiuisse forma  
619 a  
iecur quare sanguine nutriatur cras-  
siori 622 a  
iecur septo connectentium praeci-  
puum ligamentum 556 b.  
553 a  
iecur sanguinis officina 618 a.  
619 b  
iecur, uentriculus, lien, prius ueluti  
in thoracis cauitatem tracta, quo  
modo deorsum decumbere pos-  
sint 636 b  
iecoris, aut renū, aut lienis, aut uesi-  
cae officium in uiuorum sectio-  
ne uix melius quam in mortuo-  
rum intueri posse 820 b  
iecoris carnis, proprieque substantie

ratio 622 b. uenarum seriei ratio  
ibid.  
iecoris examen 752 b  
iecoris fibrarum ridicula quorundā  
efficta nomina 620 a  
iecoris fibrarum uentriculum ap-  
prehendentium figmentum un-  
de enatum 629 b  
iecoris focus 620 a  
iecoris forma uaria 618 b  
iecoris gibba, posterioris sedis de-  
lineatio 571 a. cauae 572 b  
iecoris gibbus 557 a  
iecoris humani formam à canis &  
porcorum & simiarum iecoribus  
uariare 619 b  
iecoris ligamenta, & ex illis pronas-  
cens tunica 621 a  
iecoris nerui 621 b  
iugula 207 b  
iecoris neruorum tunicae, & uincu-  
lorum ratio 622 b  
iecoris officium, ipsiusque structurae  
ratio 621 b  
iecoris significatio quoniam fodo per-  
ficiatur 622 a  
iecoris sedis figura 361 b  
iecoris situs 618 a. eiusdem si-  
tus ratio, ibidem. & examen  
633 b  
iecoris substantia 620 b  
iecoris substantia uasis circumfusa  
621 a  
iecori quid attribuitur 772 b  
ieiunum & ilium cur medium uen-  
tris iustissimè occupent 613 b  
ieiunum intestinum quare cremo-  
remocyus transmittat 615 b  
ieiunum intestinum quid 603 b  
ieiunū ab ileo nihilo minus quam  
inanitione diuimendum 603 b  
ieiuni intestini finis, ubi constituē-  
dus 609 a  
ieiuni intestini uenae & arteriae.  
ibid. b  
ileon intestinum cuiusmodi 608  
b  
ileum intestinum in crassi intestini  
principium desinere ibid. b  
ibid. b  
ilei & ieiuni intestinorum neuus  
609 b  
ilei intestini initium ubi statuen-  
dum sit, Vesalius conijcere sa-  
tis nequit ibid. b  
Ilum, mare, fames, &c. apud poe-  
tas cur sacri nomine uocentur  
99 b  
ilium os 155 b. 208 a  
ilium ossis appendix 157 a  
ilium ossis appendix quibus mu-  
sculis occupetur. ibi. b. quibus in-  
terna eius amplitudo ead.  
ilium ossis figura 2 b. & 6 b  
ilium ossis sedes sacro ossi commissa  
qualis 156 a  
ilium ossis pars retrorsum magis  
quam sacri ossis transuersi pro-  
cellus exporrecta 157 a  
ilium

- dium ofis sedes, sacro offi comissa  
 qualis 156 b  
 ilium ossa cur in mulieribus am-  
 pliora 159 b  
 ilium ossa, cum offe sacro necen-  
 tium ligamentorum descriptio  
 439 b. administratio 431 b  
 impericia quorundam in dinoscen-  
 dis partibus similibus, taxata  
 319 a  
 incisorij dentes 57 a  
 incudi comparatum ossiculi 44  
 a. ipsius figura 43 b. index 203  
 a. eiusdem nomina ibid. a  
 indulum quibusdam dicta foetum  
 inuoluens membrana 675 b  
 Inuolus 436 b  
 Inuolus 206 b  
 innominata cartilago quæ  
 inspiratio quibus musculis fiat  
 349 b  
 inspiratio naturalis & uiolenta.  
 ibid. b  
 inspirationis & expirationis neces-  
 sitas atq; usus 342 a  
 instrumenti cuiusdam figura, quo  
 duriora ossa leui negotio perso-  
 rantur 196 b  
 instrumenta connectendis ossibus  
 idonea 202 b  
 instrumentorum Anatomicorum  
 delineatio 200 a  
 instrumentorum triplicium nutri-  
 tionij subserviuentium necessitas  
 589 b. 590 a  
 intercostales musculi utrinque tri-  
 ginta quatuor 345 a. externi. ibi.  
 interni ibid. b  
 intercostalium musculorum descri-  
 ptio & administratio 346 a. ex-  
 terni ead. interni ead. b  
 intercostalium musculorū munus.  
 ibid. a  
 intercostalium musculorum uero-  
 rum sex tantum esse numero.  
 ibid. a  
 internodia 208 a  
 intercalpiliij uertebrae 207 b  
 intestinum ἀπὸ τοῦ μαστοῦ 611 b. ἀπὸ τοῦ  
 ibid.  
 intestinum cæcum à Galeno alicu-  
 bi inter crassiora referri 610 a  
 intestinum cæcum, canibus multo  
 quàm hominibus esse amplius,  
 neq; ut in hominibus omnino  
 inane reperiiri 610 b  
 intestinum cæcum cuiusmodi. ibi-  
 dem a  
 intestinum cæcum hominis unde  
 principium ducat 611 a  
 intestinum cæcum unde primum  
 dictum ibid. a  
 intestini cæci, non unum, sed duo  
 sibi proxima orificia esse, quo-  
 modo sit intelligendum 610 b  
 intestini cæci, colore citiusq; imago &  
 ductus 562 a  
 intestino cæco appendicem cur na-  
 tura format 591 b  
 intestinum colon ibid. b  
 intestinum colon ab hominibus  
 nō ad amussim, ut in canibus, te-  
 res esse ibid. b  
 intestini coli à recto differentia. ibi-  
 dem b  
 intestini coli & recti uenæ atq; ar-  
 teriæ 612 a. nerui ibid.  
 intestinum crassum in colon & re-  
 ctum diuidi 611 b  
 intestini crassi ductus situsq; ibid. a  
 intestinorum crassorum exterior tu-  
 nica, cur sit graciliorum interio-  
 ri durior 619 b  
 intestinorum crassorū historia 610 a  
 intestinorum crassorum tunica.  
 611 b  
 intestinis crassis cur sit magna am-  
 plitudo 614 a  
 intestinum δυνάμει καὶ ἀκρίβει 608 b  
 intestinum duodenum 563 a  
 intestinum duodenum à quibusdā  
 ἐκφυσι, id est, exortum seu pro-  
 cellum, non intestinum uocari  
 608 b  
 intestinum duodenum cur in nul-  
 los anfractus ducatur 613 b  
 intestinum duodenum neruus, si  
 quos habet, à quib. asciscat 610 a  
 intestini gracilis ductus forma 609  
 a. substantia. ibid. tunica duæ. ibi.  
 eiusdemq; in tria diuisio 608 a  
 intestina gracilia cur sint angusta  
 614 a  
 intestinorum gracilium interior tu-  
 nica cur sit interiori uentriculi tu-  
 nica mollior 614 b. exterior, cur  
 sit exteriori uentriculi tunica mi-  
 nus camosa ibid.  
 intestinorum gracilium uenæ & ar-  
 teriæ 609 b  
 intestinum ieiunum 608 b  
 intestinum ἰλεον 563 a. 603 b  
 intestinum longum 611 b  
 intestinum rectū ibid. b princeps  
 ibid.  
 intestini recti musculi 296 a.  
 612 b  
 intestini recti portiois cū suis mus-  
 culis figura, eiusq; characterum  
 index 296 a  
 intestini recti situs ratio 614 a  
 intestina à mesenterio quomodo re-  
 secanda, & à corpore auferenda  
 688 a  
 intestina continuum quidem esse  
 corpus, sed pluralitatis numero  
 uarijs nominibus diuersas ob-  
 causas donari 607 b  
 intestina cur forma tereti creata 614  
 intestinorum à uentriculo exortus,  
 & gracilis ductus seu situs 607 b  
 intestinorum anfractus cur à natu-  
 ra comparati 613 b  
 intestinorum caua pars Anatom-  
 cis que dicitur 609 b  
 intestinorum constructionis ratio  
 613 b. item situs ratio ibid. itē sub-  
 stantiæ & tunicarum uenarum  
 ac arteriarum, item fibrarum 614  
 b. item neruorum 615 a  
 intestinorum crassorum tunica.  
 611 b  
 intestinum medium an recte à Ci-  
 cerone uersum pro mesenterio  
 615 b  
 intestinum princeps quod nā 611 b  
 intestini recti anularis musculi de-  
 lineatio 393 a  
 intestini recti musculorum examen  
 694 a  
 intestinorum forme ratio 614 a  
 intestinorum glandes 610 a  
 intestinorū historiæ breuis enume-  
 ratio 607 b  
 intestinorū ductus longitudo quā-  
 ta 688 b  
 intestinorum munera 612 b. ac eo-  
 rundē constructionis ratio & si-  
 tus 613 b  
 intestinorū nomina quæ Vesalius  
 complectatur 607 a  
 intestinorum pars caua quæ dica-  
 tur Anatomicis 609 b  
 intestinorum in foetum descensus  
 603 b  
 intestinorum sedis figura 561 b  
 intestinorum primum, quod duo-  
 decim digitorum est longitudi-  
 ne, cur pleriq; exortum nominet  
 597 a  
 intestinorum situs examen 685 a. e-  
 iusdem ratio 688 b  
 intestinorum substantia 614 a. tuni-  
 cæ duplices ibid. b  
 intestinorum tenuium præcipuum  
 munus 613 b  
 intestinorū tunicae cur partim trās-  
 uersas, partim rectas fibras for-  
 tiantur 614 b  
 intestinorum tunicam anteriorem  
 aliquando in aëris putrescere,  
 exteriore salua 614 a  
 intestinorum tunice 563 b  
 intestinorum tunice quæ examinan-  
 dæ 688 b  
 intestinis adeps obnatus 612 b  
 intestinis cur sint tunicae à natura at-  
 tributæ 614 b  
 intestinis nullas uenas propagari à  
 caua, contrā quā Galenus tradi-  
 dit 616 b  
 Introductorij seu Medici autor a-  
 lius à Galeno 19 a  
 inuerecundum os 206 b  
 inuolucrum cordis quibus uasis ac  
 neruis implicetur 728 a  
 inuolucrum foetus interioris 673 b.  
 cur Latinis agnina, & amicu-  
 lum ueteribus sit nūcupata ibi-  
 dem.  
 inuolucris foetus exterioris ad ute-  
 rum nexus in mulieribus alius  
 quàm in cane: & alius adhuc in  
 bubula aut uacca, quàm in mu-  
 liere & cane spectatur 672 a  
 inuolucris usus, & constructionis ra-  
 tio 728 a  
 inuolucrum 610 a

# I N D E X.

Inuolucrum uteri exterius quā à far-  
 ciminis specie nomen obtinue-  
 rit 673 b  
 In Inuolucro cuiusmodi aqua ob-  
 feruetur 723 b.  
 Inuolucra, quæ foetum mox cum  
 sanguinis quodam ob absceden-  
 tia uasa defluxum subsequitur,  
 mulieres sale asperso ferè exure-  
 re, aut aliquò defodere: bruta ue-  
 rò permulta, nisi ab astantibus  
 præcipiantur, deuorare 675 a  
 Inuolucrorum ueram historiam à  
 Galeni placitis multum esse re-  
 motam 676 a  
 Ioachimū Rcelants primarij apud  
 Mechlinienfes medici inuentio  
 662 b  
 Ioannes Centurio patricius Genuē-  
 sis, iuris peritissimus 111 b  
 Ioānes Paulus Guidicius Vrbinas  
 Vesalio amicissimus 58 b  
 Ioannis Andreæ Albij commenda-  
 tio 96 b  
 Irascibili seu uindictæ honorisq;  
 appetitricis animæ sedes, cor,  
 741 b  
 Iris oculi circulus, quis 286 a  
 Iſa. iou 159 a. 208 a. 429 b  
 Iſtius cur pro faucibus 721 a  
 Iruus 13 b  
 Italix circumſcriptionem referens  
 os 2a  
 iugale os 42 b  
 iugale os cur à Græcis ἰγυαία nun-  
 cupatum 42 b  
 iugale os ex quibus constet ibid.  
 iugalis ossis usus 42 b  
 Iulij Pollucis lapsus 76 b  
 iugulum pectoris ossis 114 b  
 Iſtius uentrebræ 207 b

## L

Abra 13 b  
 Labra mouentes musculi  
 288 a. corundem admi-  
 nistratio 291 a  
 laborum consuetudo, dein qua-  
 tuor musculi labris proprij, seu  
 in altero latere tertius, & postea  
 quartus, uel omnium 5. 6. 7. &  
 8. 290 a  
 laborum fungosa substantia 292 a  
 lac nonnullis uiris per pubem ex-  
 primi, & per suctum frequentio-  
 rem, crebramq; ac multā contre-  
 ctationē prodixisse Aristoteles af-  
 ferit: quod etiā Vesalius sæpe ui-  
 disse testatur 678 a  
 lactis in māmillis generatio, eiusq;  
 ratio 679 b. 680 a  
 lactes an rectè pro mesenterio, Ga-  
 za uerterit 615 b  
 lacticiuina quæ 722 a  
 λαγύνης 334 b  
 λαγύνας os 208 a  
 λαμβδονδης os 69. a. 207 a  
 λαμβδονδης futura 32 b. 206 a  
 lambdoidis nomina 206 a. eiusdem  
 futuræ additamenta 34 b

lapidosa caluarię sedes 207 a  
 larynx asperæ arteriæ caput 186 a  
 larynx cur pluribus cartilaginibus  
 constet 306 b  
 larynx etiam φάρυγξ dicta 721 a  
 larynx quib. cartilaginibus constet  
 716 b  
 laryngis ac totius asperæ arterię car-  
 tilaginum delineatio 184 a  
 laryngis binij musculi 308 b. descri-  
 ptio ibid.  
 laryngis prima cartilago 186 a  
 secunda cartilago ibid. tertia  
 cartilago 187 a  
 laryngis tres cartilagines 189 a  
 laryngis cartilaginum bases 187 a  
 laryngis cartilaginum coordinatio  
 nis ratio 720 b  
 laryngis cartilaginū motores mus-  
 culos esse 306 b  
 laryngis cartilaginum sinus pro-  
 cessus actubera 186 b  
 laryngis cartilaginum unā cum  
 musculis 13 figuræ, & descri-  
 ptio, earundemq; characterum  
 index 304 b. 305 a  
 laryngis & stomachi mutualascen-  
 sus & descensus ratio 720 b  
 laryngis glandes radici adnatæ  
 717 b (da 310 a)  
 laryngis γλωττις quomodo specifi-  
 catur laryngis ligamenta 309 a  
 laryngis lingua, seu rima, & præci-  
 puum uocis organum 188 a  
 laryngis musculi 717 b  
 laryngis musculorum administratio  
 309 b. sex communium or-  
 dine. ibidem. propriorum ordi-  
 ne. 310 b  
 laryngis musculorum delineatio.  
 304 b. communium primi & se-  
 cundi 305 b. tertij & quarti ibi.  
 quinti & sexti ibid. propriorum  
 delineatio ibidem. & deinceps  
 laryngis musculorum alios pro-  
 prios, alios communes esse. pro  
 priorum numero 12. descriptio  
 & functio 306 a. b. communium,  
 qui sex sunt, descriptio & fun-  
 ctio 308 a. b  
 laryngis musculorū descriptio 306  
 b. examen 754 a  
 laryngis musculos duodecim pro-  
 prios esse, communes octo  
 306 b  
 laryngis operculum 187 b  
 laryngis operculum non esse uocis  
 principaliss. organum, cōtra Ga-  
 lenum 310 b  
 laryngis operculum, trianguli, aut  
 secundū Hipp. hederæ folij ima-  
 ginem exprimere 187 b  
 laryngis operculum unde oritur.  
 ibid. b  
 laryngis operculi duo musculi Ga-  
 leno ignorati 309 a  
 laryngis operculi duorum muscu-  
 lorum administratio, qui è com-  
 munebus non habentur ibid. b

laryngis operculi musculorum de-  
 lineatio 306 a. descriptio 308 b  
 laryngis operculi substantia 187 b  
 laryngis operculi superficies infe-  
 rior cōcaua, superior cōuexa 716 a  
 laryngis operculi usus 719 b  
 laryngis pinguedinis & glandula-  
 rum ratio 720 a  
 laryngis rimæ usus 719 a  
 laryngis rimula seu lingua, quo-  
 modo spectanda 310 a  
 laryngi appositæ glandulæ ibid. a  
 laryngem succingens tunica, seu  
 membrana 309 a  
 laryngem tribus cartilaginibus cō-  
 stitui 186 a  
 in Laterali morbo quæ uena secan-  
 da 451 a  
 latum os 207 b  
 laude 206 a  
 laude os ibid. b  
 Lazarus Hebræus de Frigels ibid.  
 λανός 500. a. 763 b  
 λανός, seu torcular cerebri  
 leopardorum pelles 672 a  
 λανθιδονδης ossa 206 b  
 λανθιδονδης προσκολληµατα 33 b  
 λανθιδονδης futuræ 205 b  
 λανθιγερτα 482 b  
 λανθιδος 208 a  
 lien cur linguosum uicissus appelle-  
 tur 626 a  
 lien cur risus autor uulgo habea-  
 tur 630 b  
 lien quid in uentriculum cruetur,  
 quòque meatu 629 b  
 lienis beneficio, an cor refrigeret-  
 tur 630 b  
 lienis eximendi ratio 689 a  
 lienis nutritio, eiusdēq; ratio 590 a  
 lienis omenti membrana adhuc  
 recti figura 558 b  
 lienis omni ex parte conspicui fi-  
 gura 571 b  
 lienis situs examen 686 a  
 lienis situs forma, superficies, co-  
 lor 625 a  
 lienis substantia ibid.  
 πνεύµατος  
 lienis tunica 628 b. ipsius nexus. ib.  
 lienis tunica qui obseruanda, simul  
 cum ipsius ad uentriculū nexu  
 & substantia 689 b  
 lienis, uenarum, arteriarum & ner-  
 uorum series 559 a  
 lienis uasorum series 627 a  
 lienis uenæ, arteriæ & nerui unde  
 ducantur 628 a  
 lienis usus ac functio 629 a  
 lienis usum, ad uentriculi uim appe-  
 titricē incitadām, uanū esse 630 a  
 lienem cursoribus extimi stultè E-  
 rasistrato ex uulgi opinione per-  
 suasum 629 a. (re 626 b)  
 lienem hominis ab animalū differ-  
 lienem non ad abdominis quasi  
 medium anterioraq; promine-  
 re, neq; etiam tactu admodum  
 deprehendi posse 626 a  
 lienem



- lienem suo calore innato ac frequentibus quillium intersepiunt arterijs uentriculi concoctione fouere 630 b
- ligamen ab interiori scapula processu in superiorem pertinens 322 b
- ligamentum capitis transuersi den- ti obductum 333 b
- ligamentum cartilagineum corpora uer-tebrarum intercedens 73 b
- ligamentum, Græcis οὐδὲν ἔστω, quid 255 b
- ligamentum ceruicis uer-tebram pri- mam secundæ annectens 333 a
- descriptio ibid. administratio ibid. delineatio 332 b
- ligamentum inter ulnam & radiū 336 b
- ligamentū linguæ faucib. colligans 303 b
- ligamentum ossis dentis dictū 333 b
- ligamentum primam uer-tebram ca- piti cōmittens ibid. a. secundam uer-tebram ibid. primam secun- dæ colligans ibid. b
- ligamentum secundum linguæ lon- gitudinem ossis uicem præstans 303 b
- ligamenti descriptio, qua ostendi- tur, caput super uer-tebram secū- dam ad anteriora posterioriūque non moueri 333 b
- ligamenti & nerui in musculo ne- cessitas 260 b
- ligamenti & nerui in musculus con- sistendi permixtio 261 a
- ligamenti in tendinibus continen- dis usus 255 b
- ligamenti latescens tendinis uicē subeuntis 433 a
- ligamenti substantia 255 a
- ligamenti ab humeri cum scapula articulo ad extremam usque digi- torum aciem consistentia 385 a
- ligamēta alijs sedibus quā ad cor- pora uer-tebrarum posita 361 a
- ligamenta annulorum modo tendi- nes continentia 385 a
- ligamenta articularū maxillæ 296 b
- ligamenta aut membræ finibus obductæ ad quos musculi refle- ctuntur 256 b
- ligamenta caput humeri scapulae annectentia 318 b eorundem de- scriptio ibid.
- ligamenta capitis, & primæ secun- dæq. ceruicis uer-tebrarum 332 b.
- ligamenta clauiculæ ad pectoris os 350 a
- ligamenta digitorum manus 385 b
- ligamenta dorsi uer-tebrarum 360 b
- ligamenta iuxta forā, id est transuer- sa, seu anularia 256 a
- ligamēta femoris ad coxæ dices os 429 b
- ligamenta fibulam ubiq. ossi com- mittentia 431 a
- ligamenta genu articuli 430 a
- ligamenta humerum scapulae con- nectentia 322 a. cæteris articulis commune ligamētum. ibid. tria propria ibid.
- ligamenta laryngis 309 a
- ligamenta musculorum manus con- stitutionem subeuntia 387 a
- ligamenta nerui nomine uocita- ta 360 b
- ligamenta ὑποχονδρῶν οὐδὲν ἔστω, id est, ligamenta cartilaginea di- cta 258 b
- ligamenta ossa colligantia 255 a ten- dines in suis finibus continentia ibid. (386 a)
- ligamenta ossa inuicē cōmittentia
- ligamenta ossium acetabula augē- tia 256 b
- ligamenta ossium sinus succingen- tia 256 b propugnaculi uicē præ- stantia ibid. b. quæ interstitij lo- co sunt 257 a. musculi cōstructio- nem subeuntia ibid. b
- ligamenta pedis alia, quibus ossa tā- tum committuntur 431 b
- ligamenta pedis transuersa ibid. a
- ligamenta propria canum 361 b
- ligamenta quibus unicus tantum usus, & quibus multiplex attri- buitur 257 b
- ligamenta sacri ossis, & ipsi adne- xorum ossium 429 a
- ligamentum, tendines & processus cerebri dorsalisq. medullæ, ner- uos generatim uocari 502 a
- ligamenta thoracis 352 a
- ligamenta uer-tebrarum corpora cō- mittentia 359 b
- ligamentorum ab usu desumptæ dis- ferentiæ quinque 255 a. a. prima ibid. secunda ibid. b. tertia 256 b. quarta 257 a. quinta ibid.
- ligamentorum administratio 322 b.
- ligamentorum adhuc reliquorum administratio 435 a (256 b)
- ligamentorum breuis enumeratio
- ligamentorum capitis administratio 333 b
- ligamentorum capitis ad ceruicis uer-tebram primam & secundā descriptio. ibid. a administratio ibid. b delineatio 332 b
- ligamentorum differentia uariæ & ab ortu 258 a. itē à partibus quas connectuntur ibid. à partibus qui- bus committuntur. ibi. à substan- tia ibid. à situ ibi. b à forma ibid.
- ligamentorum dorsi administratio 361 b
- ligamentorum in brachio, cubito & manu occurrentium, quæ in- star inuolucrorū habentur 385 a
- ligamentorum in digitis admini- stratio 391 b
- ligamentorum in externa & inter- na cubiti sede administratio 387 b
- ligamentorum maxillam inferiorē
- superiori necessestium administ- ratio 296 b
- ligamentorum os sacrum cæteris annectentiū administratio 406 b
- ligamentorum os sacrum ilium os- sibus colligantiū descriptio 299 b. & administratio 304 b
- ligamentorum quorundam inspe- ctio 416 b
- ligamentorum substantiam ingre- diens cartilago 5 b
- ligamentorum thoracis descriptio & administratio 352 b
- ligamentorum transuersorum ad digitos flexentium musculorū tendines usus 370 a
- ligamentorum transuersorum in externa cubiti sede administ- ratio 390 b
- ligamentorū uiscidus humor 259 a
- ligamentorum usus 318 b
- ligamentorum uariis usus 255 b
- ligamentorū usus in colligando præ- cipuus ibid. a
- ligamentorum usus, quæ instar in- terstitij sunt 257 a. item quæ instar propugnaculi sunt 256 b
- ligamentorum usus, quæ musculi constructionem subeunt 257 a
- ligamentis communia 259 a
- ligamentis transuersis ascribendæ membranæ 256 b
- ligamētis ossiū & cartilaginū ar- ticulos colligari atq. teneri 255 a
- ligamentosa cartilagineis 256 b (ui b)
- Ligures iuxta aduēti ueteribus dicti ligures nauali terrestriq. pugna stre- nui ibid. b
- in Liguribus corporum symmetria opt. ibid. b
- limborum uaria insuitio 18 b
- lingua cur musculis egeat 301 a
- lingua gustatorum organum cuius beneficio efficiatur ibid. b
- linguæ cū suis musculis figuræ tres 300 a. earundemq. characterum index ibid. b
- linguæ fibrarum delineatio 300 a
- officia 303 b
- lingua in musculis quid rarum ob- tinerit 301 b
- linguæ ligamentum 303 b. ossis ui- cem præstans ibid. b
- linguæ magnitudinem iustā esse, il- lamq. musculis regere, quorum cognitio perdifficilis est 301 a
- linguæ motus in libris de usu par- tium, qualiter à Galeno tractetur ibid. b
- linguæ musculi 300 a
- linguæ musculorum cognitio cur sit difficilis 301 a & c b
- linguæ musculorum examen 754 a
- linguæ musculorum nouem euidē- tium descriptio ordine 302 a. itē eorundem administratio ordi- ne 303 b
- linguæ nouem musculorum natu- ra ac situs delineatus 301 b
- linguæ

linguæ musculorum sectio apud Galenum interijt ib. b  
linguæ os 207 a  
linguæ pars ante sectionem conspiciua, quibus particulis consistet 301 b  
linguæ reliqui corporis administratione 304 a  
linguam faucibus alligans ligamentum quale ibid.  
linguam mouentium musculorum delineatio 300 a  
liberos ossa 43 a. 206 b  
lumbare os 208 a  
lumborum uertebrae numero quot. lumborum uertebrae quinque. 188 b. 207 b  
lumborum uertebrae quomodo foraminibus a ceruicis uertebreis uariant 83 a (tio. 94 b  
lumborum uertebrae delineatio. lumborum uertebrae quomodo mutuo dearticulatur 93 b  
lumborum uertebrae corpora cuiusmodi sint 95 b  
lumborum uertebrae foramina. 95 b  
lumborum uertebrae ascendentes ac descendentes processus 96 a  
lumborum uertebrae processus quales 92 b  
lumborum uertebrae transuer si processus 95 b  
lumborum uertebrae uariæ figure, & delineationes 94 b  
Luteriæ, a diui Iacobi porta, ad eam usque quæ sancti Martini dicitur, iter sexies nomen suum uetariæ 607 b (671 a  
loculi extimum fetus inuoluti longa on iustissimum 611 b  
laxationes appendicum in pueris frequentiores quæ articulo. 33 a

M



Agori & occulcephi losophiae sectatorum, de osculo Albada ran superstitio. 154 a  
malleoli exterior 170 a  
malleoli exterioris & interioris figura & descriptio 167 a  
malleolo non dissimile ossiculum 145 a  
malleolum ab Anatomicis perperam pro talo usurpari 170 a  
malleoli 208 b  
malleolorum nomina ibid.  
malleus 202 b (tio. 43 b  
mallei in auditu organo delineatio malum granatum 207 b  
malum granatum pectoris ossis cartilago cur uocetur. 116 a ite testiculorum 208 b (206 b  
mamillaris capitis processus. 38 b  
mamillæ ex deuorato muliere pilo uexari reuocari possint 677 a  
mamillæ cur homini elatius, ceteris animalibus demissius possint

tae 679 a  
mamillarum genitalibus affinitas, & utero 679 b  
mamillarum examen 694 b  
mamillarum forma. 670 b. substantia. ib. & situs 675 b  
mamillarum formæ ratio. 675 b  
mamillarum munus, & constructio ratio. 678. situs ratio. ib.  
mamillarum natura oculis subiecta 581 a  
mamillarum situs ratio, forma, substantia, &c. 676 b  
mamillarum nerui unde ducuntur 678 b  
mamillas homini elatius, reliquis uero animantibus, humiliorum reponi ex Aristotelis, Galeni, philosophorum & medicorum suffragio, non omnino uerum esse, Vesalius declarat 679 b  
mamillas petentium uenarum series 677 b  
manchar 207 b  
mandibula ibid. a  
manus colliculorum siue montium apud chiromatas fabrica. 363 b  
manus interior cutis cur sit depilis 363 a  
manus delineatio 141 a  
manus digitorum lateribus addita, substantia carnea cur 365 a  
manus digitorum ossa cuiusmodi, & quot singulorum. 149 a. eorum dem tendines 150 b  
manus digitorum regioni internæ superfrata substantia carnea. ib.  
manus digitos flectentium musculorum administratio. 389 a. primi, secundum. ibid. tertium. 390 a octo sequentium. 391 b. quinque sequentium. ib. decimiseptimi omnium 236 a. decimioctauum. ibid. decimiononum 236 b. uigessimum. 212 b. secundum & tertium 223 a  
pollicem maxime abducens. 212 b. adducens. ibid. quatuor musculorum digitos quatuor pollicis adducentium 239 a  
manus digitos mouentium musculorum descriptio. 365 a. numerus. ibid. primus. ibid. secundus. ib. secundus. 366 a. tertius. 367 a. functio amborum. 371 a. octo sequentes primis quatuor digitorum ossibus præfecti. 370 b. duo sequentes pollicis ossi primo præfecti. 371 a. qui secundum, tres rursus alij. ibid. b. fun-

ctio que. ibid. decimus septimus. 372 b. decimioctauus & decimus nonus. 373 a functio omnium. 374 b. uigessimus. ibid. uigessimus primus. secundus. ibid. functio utriusque. 375 a. uigessimus tertius. ibid. b. sex reliqui, quorum duo pollicis. 376 a. reliqui quatuor digitis præfecti ibid. b  
manus digitos mouentium musculorum insertiones simul colledæ 377 a  
manus diuisio 141 b  
manus extremæ ossa quot 171 a  
manus ligamentorum descriptio 385 b. quæ tendines continent anulorum modo. ibid. quæ ossa conuertunt. 386 a quæ musculorum constitutionem subeunt 387 a  
manus nomine quid Hippocrates & Galenus intelligat. 142 b  
manus ossicula sesanina cuiusmodi 151 a  
manus pectem & pectus 208 b  
manus summæ adnata caro, quid præstet 365 b  
manus summæ cutem internam qualemparari deuit 362 b  
manus uolæ medij neruosa tenuitate sua subnati musculi descriptio. 362 a. administratio 264 a  
manus utriusque ossa 189 a  
Marcum Antonium Genuam, & Vuolfgangum Heruuo: it, operis Anatomici & inchoadi & absoluenti præcipuos autores Vesalio extitisse 46 a  
Marini quartum librum Anatomicæ suæ inter cetera glandularum tractasse 722 a  
masseter, seu massorius musculus 294 b  
masseteris administratio 297 a  
masseteres duos Hippocrate constituisse 294 b  
masseteres tres, cur à nonnullis constituantur ibid.  
maxillæ processus 38 b. 206 b  
maxilla superior cur pluribus ossibus constet, ipsæque cauis & leuibus 49 a  
maxilla inferior nullos appendices obtinet 11 b  
maxillæ alterius lateris primus musculus, seu temporalis 293 a  
maxillæ duo utrinque processus 55 b  
maxillæ foramina ibid.  
maxillæ inferioris figura. 6 b. item ceruix 12 b (54 a  
maxillæ inferioris binæ figure maxillæ inferioris motus, quos octo complent musculi 293 a  
maxillæ inferioris secundus musculus, masseter 293 b  
maxillæ inferioris os unicum. 188 b  
maxillam inferiorem homini breuissimam



- uissimam obtigisse 54 b  
 maxillā inferiorē superiore quiescente moueri 292 b  
 maxillę in posteriori sede amplitudinis, tenuitas, sinus, asperitates 55 b  
 (tio. 49 a)  
 maxillę ossium brevis enumeratio 292 b  
 maxillę primi ossis historia ib. b  
 maxillę secundum os. 50 a  
 tertium os. ibid. quartum os. 51 a  
 quintum os. 52 a sextum os. ibid. b  
 maxillę superioris nomina 207 a  
 maxillę superioris uniuersa ossa esse duodecim 52 b. 54 a  
 maxillę hominis cur sinus & cauitates medulla infarctę attri- buantur 54 b  
 maxillam alterius lateris mouentium quartus musculus, aut omniū 7 & 8 295 b  
 maxillā hominis cur durā esse oportuit 54 b  
 maxillam homini ferē unico osse extrui ibid.  
 maxillis quomodo dentes insigantur 57 b  
 maxillares dentes 207 a  
 meatus ex tertio cerebri uentriculoeducti 787 a. 793 b  
 meatus sctus urinam educens, & sctus peculiare arterię uesicę commissę 636 b  
 meatus urinam sctus inter duo ipsius inuolucra perferēs. 674 a  
 meatus urinę seminiq; communis 649 a  
 meatuum urinam ē renibus in uescam deducentiū historia 636 b  
 eorundem artificiosa insertio 637 b  
 meatuum alterum ex tertio cerebri uentriculoeductum, Galenum pręterisse 794 a  
 medianum pro mesenterio 615 b  
 medianum uulgo quid 712 a  
 medico de animę facultatibus ac sede, ad mediā opportunē ægrotis inuenienda, considerandum 741 b  
 medicorū commentū, quo uentriculū à iecore quinq; fibris amplecti asserūt, unde enatū. 609 b  
 medicorum de urinę excolatione commentū duabus figuris expressum 632 b  
 medicorū error, de curatione dentium. notatus 58 a  
 medicorum & philosophorum de cerebri anfractuū usu, cōtentiones 781 b  
 medicorum quorundā in sectione uenarum ridicula contentio 472 b. & 473 a  
 medullę ossium nutrimentū propriū 3 b  
 medullę, quę ossium parte reponatur 3 b  
 308 a  
 meloncholicū succum per portę ramos purgari 449 a  
 membrana 436 b  
 membrana altera costas succingēs quid 711 a  
 membrana carnosā quę. 278 b. cur sic dicta ibid. a  
 membrana cerebri tenuis unde etiā χορσος dicta 778 b  
 membrana circum ossalis 360 a  
 membrana pubis ossis foramen occupans 429 b  
 membranam musculus obnata 386 a  
 membrana seu tunica costas succingens 709 b  
 membrana singulis costis peculiaris 711 a  
 membrana cerebri tenuis numerus. 778 a  
 situs. exterior superficies, usus & constructionis ratio ibid. b  
 membrana costas succingentis foramina. 710 b. substantia. ibid. principium 711 a  
 membrana costę succingentis nomen & situs. 709 b. magnitudo, figura ibid.  
 membrana costas succingentis superficie, quales, quisq; earū ad alias partes nexus 710 a  
 membrana costas succingētis usus, & ipsius constructionis ratio. 711 b  
 membrana exterioris caluarię obnata creatio & usus 777 b  
 membrana pręter carnosam musculus in cubito obnata administrationis 388 a  
 membrana interserpentes. 712 a. & quo pacto inuicem distēt. ibid.  
 membranarum arterialis uenę orificij ratio 744 b  
 membranarū cavitatē thoracis interserpentiū nomē clatura 712 a  
 membranarū interserpentiū constitutionem quę subeant 713 a  
 membranarum interserpentiū numerus, situs, forma, magnitudo 712 a  
 membranarum interserpentiū superficie & connexus. 713 a. ortus atq; usus ibid.  
 membranarū thoracis amplitudinē interserpentiū examen. 748 a  
 membranarum uenalis & magnę arterię usus 745 b  
 inter membranas interserpentes quid reponatur 712 b  
 membrana uesicę figura, quę quī sctus urinā inter illius inuolucra uagans non defluit, ex meatu urinam per umbilicum deflente expanditur 674 b  
 memorię os 206 b  
 mendosa ossa ibid.  
 mendosa futura ibid.  
 mensales dentes 207 a  
 menstruę purgationes quę coarcentur, & unde fluant. 662 b  
 162 a. 208 a  
 meri 594 a  
 mesenterium, an rectē mediū intestinum Cicero uerterit 615 b  
 607 a. 610 a  
 mesenterij adeps. 617 b. glādes. ib.  
 mesenterij binę membranę, cur in canibus difficiliter quā in hominibus expandantur 617 b  
 mesenterij natura quę indaganda 687 b  
 mesenterij nomina 615 b  
 mesenterij situs. ib. substantia. ib. forma & ortus ibid.  
 mesenterij substantię ratio accusus 616 a (ibid. b)  
 mesenterij uenę, arterię & nerui. mesenteriatia Gal. posuisse 615 b  
 208 a  
 146 b. 203 a  
 207 b  
 208 b  
 206 b  
 667 a  
 208 a  
 172 a. 208 b  
 molares dentes 57 b. 208 a  
 Mōtissilis suspensi historia. 627 b  
 mordentes dentes 207 a  
 mortuorum sectione quid discatur, quid item uiuorum 818 a  
 mucosorum membranarum usus 370 a  
 mucronata pectoris cartilago 115 a. 207 b  
 mucronatę pectoris cartilaginis, ensi comparatę, nomina 207 b  
 mucronatę cartilaginis usus. 116 a  
 muliebri uterus an septem cellulas seu loculos, ut quidā inepre cōtingunt, obtineat 667 a  
 mulierū quę sit suppositio, ubi sctus aliqua ex parte obuolutus, in lucem egrediatur 675 b  
 mulierum testes 657 b  
 muliebres testes uirilibus multo minores esse 658 a  
 muliebrum testium forma 657 b  
 muliebrum testium inuolucra 658 b  
 muliebrum testium sinus, & in illis contentus humor ibid. a  
 mulieribus seminaria uasa cuiusmodi sint 659 a  
 mulieribus utero gerētibus quomodo natura prospexerit. 159 b  
 musculus quid. 260 a. 264 a. itē quę sit eius compositionis ratio, secundum aliorū Anatomicorū sententiam 260 a  
 musculus, nerosa sua exilitate, uolę & interorum digitorum sedis cuti subnatus 362 a  
 musculus alarū nasi presentis capitis in altero latere, aut omniū 9 & 10. 290 b. itē in altero latere 6, aut omniū 11 & 12 ibid.  
 musculus brachij attollens quīs 314 a  
 musculus brachij pectoris adductens,



cens, quo simia abundat 312 b  
 musculus quispiam brachium mouens, male à Galeno assignatus 313 a  
 musculus motorum brachij à Galeno descriptus, quo simia & canes abundant, homines cauerent 317 a eiusdem musculi descriptio in simia, cane & bobus. ibid. & administratio 318 b  
 musculus primus brachij motorum, quo pacto duorum loco habeatur 312 b  
 musculus primus brachium mouentium, unde. 311 b. secundus unde, & quæ eius functio. 314 a  
 musculus brachium attollens secundus ibid. b  
 musculus alius brachij deorsum trahens, quo simia & canes uti cū alijs quadrupedib. quàm plurimis abundant 317 a  
 musculus quintus brachium circumagens, unde oritur. ib. b quæ sit eius substantia ibid. & quæ forma 318 a  
 musculus brachij motorum quintus, circumuertentium primus, à Galeno non descriptus, ibid.  
 musculus δελτοειδής dictus 314 b  
 musculus digitos mouentiū decimus septimus 372 b  
 musculus digitos mouentiū decimus octauus. 373 a decimus nonus. ibid. uigessimus 374 b. uigessimus primus. ibid. uigessimus secundus & uigessimus tertius ibid.  
 musculus dorsum mouens decimus tertius & decimus quartus. 357 b. decimus quintus & decimus sextus 358 a  
 musculus ιππικῆς 314 b  
 musculus orbiculatim intestino obductus 397 a  
 musculus primus alterius lateris faciei, uel simul omnium primus ac secundus 288 a  
 musculus secundus alterius lateris faciei, uel omnium tertius & quartus 289 a  
 musculus in superiori pedis sede locatus, & pollicem, tresq. ipsi proximos digitos extrorsum abducens, & numero 16 418 a  
 musculus in poplite occultatus, qui non rectè à Galeno precipuus tibie flexionis habetur 408 b  
 musculus inter scapulam attolentes à Galeno perperam descriptus 326 a  
 musculus scapulā attollens, quo simia abundat 325 a  
 musculus tertius simia scapulam attollens ibid.  
 musculus quartus scapulam attol

# I N D E X.

lentium, quæ simia sibi priuatim, secus quàm homines, uendicant 325 b  
 musculus primus in altero latere thoracem mouentium 342 b. secundus canum thoracem mouentium, quo homines destituntur. 343 a tertius hominis, qui canū & simiarum, quartus est. ibid. quintus canum, quo humanus thorax destituitur. ibid. b. hominis quartus, simiarum sextus. 344 a. hominis quintus, simiarum septimus. ibid. b. hominis sextus, simiarum octauus ibid.  
 musculus tibiam mouentium primus. 400 a. secundus. ib. tertius 407 a. quartus. ibid. b. quintus 402 b. sextus. 404 a. septimus. 405 a. octauus. ib. nonus 406 a  
 musculus uesciæ uirilis. 395 a. muliebris. ibid. eorumq. usus. ibid.  
 musculus ceruicis uesciæ 394 b  
 musculus caput 261 a  
 musculus caput tendere non semper tenuius esse 272 b  
 musculus ex carne caput tendere non semper esse tenuius 267 b  
 musculus finis seu cauda & tendo 261 a  
 musculus mēbrana ibid. b  
 musculus nomen unde deductum 267 b  
 musculus structuræ depicta ratio 259 a & b  
 musculus uenter 261 a  
 musculus uenter designatus 259 a  
 musculus uenter ubi reponendus propriè 272 a  
 musculus uirilis administratio. 341 a item muliebris ibid. b  
 musculus primi brachium mouentium administratio 319 a  
 musculus primi brachium mouentium fibras uariari 311 b  
 musculus secundi brachij mouentium administratio 320 b  
 musculus primi & secundi brachiale mouentium administratio. ibid. 389 a. primi digitos mouentium ibid. secundi. ibid. b. tertij digitos mouentium 390 a  
 musculus tertij brachiale mouentium administratio. 390 b. decimus octauus & 17 digitos mouentium administratio, ibid. decimionis administratio. ibid. 21 & 22 digitos mouentium, & dein eius qui in illorum descriptione 23 numeratur 391 a. quarti brachiale mouentium administratio ibid.  
 musculus tertij brachium mouentium substantia, forma, ortus, atque functio 315 a  
 musculus quarti brachium mouentium ortus ac functio, non re-

ctè à Galeno tradita 316 a  
 musculus quarti brachium mouentium, ortus, substantia atq. officium. 315 b. 316 a eiusdem non esse simplicem motum, sed uarium, pro fibrarum discrimine. ibid.  
 musculus quinti brachium circumagentis, Galenum non meminisse 318 a  
 musculus sexti brachij mouentium substantia atq. origo ibid. a  
 musculus septimi brachij mouentium substantia, origo atq. peculiare munus ibid. b  
 musculus primi ac secundi parium capitis, officium 330 a  
 musculus prima 4 digitorum ossa, & primum secundumq. pollicis flectentes, tredecim numero 370 b  
 musculus digitos mouentiū 23 minus, non ad digitos pertinet 375 b  
 musculus 3, 4, 5, 6. dorsum mouentis munus 355 a  
 musculus masseteris administratio. 297 a. eiusdem descriptio 294 a  
 musculus maxillā deorsum trahentis, ac tribus illis superadditi, quartiq. descriptio 296 a  
 musculus in ore delitescens administratio. 296 a. eiusdem descriptio 295 b  
 musculus tertij in ore latitantis, origo 295 a  
 musculus penis parū à Galeno inuaduersi 394 b  
 musculus in poplite latitantis. 424 a  
 musculus secundi & tertij digitos mouentium ibid.  
 musculus, quæ carnosa mēbrana in simiarum & canum axillis constituit, examen 318 b  
 musculus recti abdominis administratio. 338 b. transuersi 339 a  
 musculus primi scapulā mouentium administratio. 327 a. secundi, tertij, quarti ibid.  
 musculus secundi scapulā mouentium administratio, ut reliquos brachij scite aggrediaris 319 b  
 musculus temporalis administratio 296 b (ex historia. 295 b  
 musculus temporalis robur maximum, musculus primi thoracē mouentis administratio. 350 a. secundi. ib. b. tertij canis musculus administratio. ib. b. tertij hominis, quarti canis. ibid. quinti hominis, 7 canis. ib. quinti canis. 351 a. quarti hominis, 6 canis. ibid. sexti hominis, octauus canis 351 b  
 musculus uesciæ ceruicis, ipsiusq. uesciæ fundi & ceruicis examen 693 b  
 musculus natura inter ligamentum & neruum esse medium 260 b

- musculum inter ligamentū & ner-  
 uum natura nō esse mediū. 262 b  
 musculum non aequē nerui ac li-  
 gamenti natura participare  
 261 b  
 musculū primum oīsi v referenti  
 commiſſum, cæteris omnibus  
 ualidiorem, & crassiorem atq;  
 bifidum esse 297 b  
 musculum, qui scapulam antror-  
 sum agit, à Galeno malè pro  
 brachij motore haberi 313 a  
 musculum, quobrachium detra-  
 hitur, scapulā nō mouere 326 b  
 musculum uolē suo tendine late-  
 scētē nō femel deesse 363 a  
 musculi abdominis 334 a  
 musculi articulorū motores pri-  
 mi, sipe fīciei proximi 270 a  
 musculi primos articulos flecten-  
 tes, qui tertio musculo in nu-  
 mero succedunt, ac decē à Ve-  
 salio enumerantur 427 a  
 musculi brachium circumagētes  
 tres, eorūq; ortus 317 b  
 musculi brachium mouentes. 311 a  
 musculi mouentes brachium atq;  
 scapulam in quibus animalib.  
 ab homine quām maximē ua-  
 rient 320 a  
 musculi motuum brachialis opifi-  
 ces. 378 a. brachiale mouentium  
 primum. ibid. secundus. ibid. ter-  
 tius. ibid. quartus 379 a  
 musculi quarti brachium mouen-  
 tium administratio. 321 b. item  
 septimi, quinti & sexti ibid.  
 musculi buccarum, labrorum, &  
 nasi alarum 288 a  
 musculi caput mouentes 328 a  
 musculi solius ceruicis motib; præ-  
 feci 331 b  
 musculi ~~quodammodo~~ dicti, nullū forti-  
 untur musculū contrariū. 340 b  
 musculi in interna cubiti sede 387 a  
 in externa. ibid. in brachio. ib.  
 musculi cubitum flectentes & ex-  
 tendentes. 381 a. primus fle-  
 ctiens. ibid. b. secundus, seu  
 flectentium posterior. ibid. a. pri-  
 mi & secundi musculorum mu-  
 nus. 383 a. extendentium pri-  
 mus. ibid. b. carnosa pars qua  
 primus extendentiū augetur,  
 qua secundum constituere li-  
 cet. 384 a. tertius extendentiū.  
 ib. quomodo in canibus cubitū  
 agentes musculi habent 384 b  
 musculi digitos mouentes uigin-  
 tio. 365 a. primus. ibid. secun-  
 dus. 366 a. secundi musculi ten-  
 dinum per primi tendines tran-  
 situs. 366 b. tertius musculi. ib.  
 musculi sex digitos mouētes ad-  
 huc reliqui 376 a  
 musculi manus digitos mouen-  
 tes 365 a  
 musculi quatuor digitos quatuor  
 pollicis adducētes, seu 19, 20,
- 21, 22  
 musculi dorsum mouentes 352 b  
 musculi dorsum mouentes sede-  
 cim. 353 b. primus ac secun-  
 dus, seu primum par. ibid. ter-  
 tius & quartus. 354 a. quintus  
 & sextus. ibid. septimus & o-  
 ctauus. 355 a. nonus & deci-  
 mus. ibid. b. undecimus & duo  
 decimus. 356 b. decimustertius  
 & decimusquartus. 357 b. deci-  
 musquintus & decimussextus  
 358 a  
 musculi femur mouētes 409 b. pri-  
 mus femur mouentiū. ibid. secu-  
 dus. 410 a. tertius, quartus, quin-  
 tus. ibid. b. sextus, septimus o-  
 ctauus. ibid. nonus & deci-  
 mus 412 b  
 musculi femur mouentes quot nā  
 constitui possint 414 b  
 musculi an aliqui secundario fe-  
 mur flectant 413 a  
 musculi recti intestini 296 a  
 musculi in anteriori lumborū fe-  
 rie qui nam occurrant 355 b  
 musculi in manu quot 387 a  
 musculi os aperientes qui 295 b  
 musculi in ore delitētes qui  
 295 b  
 musculi à pectoris ossē & clauicu-  
 lis in caput inserti, atq; in hu-  
 ius capitis numero 13 & 14  
 musculi pedis digitorū 1, 2 & 3 in  
 simis q̄modo se habēt 426 b  
 musculi pedis digitos mouentes  
 424 a. primus pedis digitos  
 mouentium, item secundus &  
 tertius. ibid. b. decimusquartus.  
 427 b. decimus quintus. ibid.  
 musculi primi & secundi pedem  
 mouentium. 433 a. tertij, quar-  
 ti, item primi digitos mouen-  
 tium, decimiseptimi, item deci-  
 mioctauū. ibid.  
 musculi pedem mouentes. 418 b.  
 primus pedem mouentium. i-  
 bid. secundus. 419 a. tertius. ib.  
 quartus. ib. quintus. 420 b. sex-  
 tus & septimus. 421 a & b. octa-  
 uus. 422 b. nonus 423 a  
 musculi primi duo penis. 393 b. ter-  
 tius & quartus 394 a  
 musculi peni peculiare 392 a  
 musculi duo, qui pollicis primo  
 oīsi famulantur. 371 a. tres qui  
 secundo pollicis oīsi famulan-  
 tur. ibid.  
 musculi tres, pollicis os flectētes  
 Galeno ignorati 372 a  
 musculi radium in pronom & su-  
 pinum agentes 380 a  
 musculi quatuor radium peculiā-  
 riter agentes. ibid. primus. i-  
 bid. secundus. ibid. tertius. i-  
 bid. quartus 381 a  
 musculi scapulam hominis mo-  
 uentes quatuor. 323 a. primus.  
 ibid. secundus. ib. tertius. 326 a,
- quartus. ibid.  
 musculi sedem attollentes 396 b  
 musculi temporum malè affecti,  
 quas noxas inferant 42 b  
 musculi tendinib; delituti, & un-  
 diq; carnosī 265 a  
 musculi thoracē mouentes 341 b  
 musculi tibiae mouentes 398 b  
 musculi in posteriori tibiae fede  
 quot cōstant. 432 a. item quot  
 in anteriori tibiae fede. ib. b. itē  
 quot in pede. ibid.  
 musculi in tabulis depicti, quo-  
 modo intueri debeant 209 b  
 musculi latefcentem tendinem e-  
 ducentes 388 b  
 musculi quo ordine à Galeno tra-  
 dantur 362 a  
 musculi suū munus qualiter ob-  
 eant 264 a  
 musculi ueteribus, ac potissimūm  
 Aristoteli, carnis nomine appel-  
 lati 19 b  
 musculi muliebris uteri 340 b  
 musculorum abdominis admini-  
 stratio duplex. 337 b. prior, qui  
 fit ab exortu musculorum, ob-  
 liquē descendentes. ibid. alter  
 modus ab ipsorū terminis, obli-  
 quē ascendētis 338 a  
 musculorum abdominis functio-  
 nem medicorum uulgo in-  
 eptē assignare 337 b  
 musculorū abdominis usus 336 b  
 musculorū tertij & quarti brachia-  
 le mouentium munus 379 b  
 musculorum brachium mouen-  
 tium administratio. 318 b. pri-  
 mi. 319 a. secundus. ibid. & 320 a.  
 tertij. 321 b. quarti. 320 b. quinti,  
 sexti & septimi. ibid.  
 musculorum brachium, scapulā,  
 thoracem, caput, dorsumq; mo-  
 uentium examen 753 b  
 musculorum buccas, labra & nasi  
 alas mouentium administratio  
 291 a  
 musculorum caput mouentium  
 administratio. 332 a. primi paris  
 administratio. ibid.  
 musculorum caput mouentiū se-  
 cundum par, impense uariū. 329 a.  
 tertium par. 330 a. quartum,  
 quintum & sextum par. ibid.  
 a & b  
 musculorum capitis 13 & 14 mu-  
 nus 331 b  
 musculorum capita maximē car-  
 nis expertia non minus quām  
 tendinem sentire 263 b  
 musculorum capita cæsa conuul-  
 sioni esse obnoxia. ibid.  
 musculorum primum par, aut ca-  
 put, aut primam uertebra mō-  
 uentium 328 b  
 musculorum omnium capitibus  
 neruos non inserti, aut alio-  
 quin attendi, etiam si aliās li-  
 psorum substantiā neruus in-  
 seratur



feratur 262 b  
 musculorū carni adipem intexi,  
 contrā quā alij affirmarunt  
 264 b  
 musculorum etiam carni, non car-  
 ni simpliciter, adipē intexi, boi  
 Brabantiorū exemplo ostendi-  
 tur. 264 b. & mulierum quoque  
 obſarum ibid.  
 musculorum colli uesciæ & ani  
 administratio. 397 b. eorundem  
 in mulieribus administratio  
 398 a  
 musculorum differentię quinde-  
 cim. 265 a. à substantiā. ibid. ab  
 ortu. ibid. ab infertione. 266  
 b ab ea quæ mouetur parti-  
 la. 267 a ab infertione & ortu  
 simul. ibid. à forma. ibid. à fora-  
 minibus. 269 a. à magnitudine.  
 ibid. à colore. ibid. à situ. 207  
 a à fibrarū genere. ibid. à fibra-  
 rum genere & cōpactione 271  
 a ab ipsorum capitibus. ibid.  
 à uetribus. 272 a à tendinibus.  
 ibid. à mutua musculorū in offi-  
 cio oppositione. 274 a. à mune-  
 re ibid.  
 musculorum uariæ differentię uni  
 de petantur 265 a  
 musculorum digitos mouentium  
 22 & 23 munus 375 b  
 musculorum digitos mouentiū,  
 infertionum collectio 377 a  
 musculorum tres digitos pollicis  
 adducentiū, & prima quinq; di-  
 gitorū ossa flectentiū. 434 b.  
 quinti pedē mouentiū, itē sexti  
 pedē mouentiū. ib. 14 digitos  
 mouentiū, unā & noni pedem  
 mouentiū. ib. decimi quinti. ib.  
 musculorū dorsum mouentiū ad-  
 ministratio. 398 a. primi & secun-  
 di. ibid. tertij. 439 & 10. ibid. b 5  
 & 6 359 a. 7 & 8, u & 12. ibid. 13, 14,  
 15 & 16 ibid.  
 musculorū effigies cur Vesalius  
 in integras tabulas digesserit  
 209 b  
 musculorum & ligamentorū bra-  
 chij, cubiti & manum oc-  
 cupantium administratio. 387 a  
 musculorum fabricæ expositio to-  
 tius. 259 b. eiusdemq; delineat-  
 io ibid.  
 musculorū fabricæ quid præſtet  
 ligamentum, item quid neruus  
 260 b  
 musculorū femur mouentiū admi-  
 nistratio. 415 b. primi musculi  
 administratio. 416 b. secundij, ter-  
 tij, quartij, quintij, sextij, septimij,  
 octauij, nonij & decimi ibid.  
 musculorū femur mouentiū, quē  
 ordinē Gal. instituerit 415 a  
 musculorum quinq; primorū fe-  
 morum munus 412 a  
 musculorū humeri, seu brachij os,  
 & cubiti ossa cōmonſtrans, se-

cunda figura 259 b  
 musculorum impressiones 272 b  
 musc. recti intestini examen. 694 a  
 musculorū laborum, &c. 5, 6, 7, 8  
 administratio. 292 a itē 9 & 10  
 administratio. 292 a. itē 11 & 12,  
 item 3 & 4 ibid. b  
 musculorū laryngis alios p̄prios  
 esse, alios cōmunes propriorū  
 numero 12 descriptio ordine  
 306 b. 307 a & b. functio. ibid. cō-  
 muniū, quī sex sunt, descriptio  
 308 a functio ibid.  
 musculorū linguæ sectionē apud  
 Galenum interijſſe 301 b  
 musculorum linguæ cognitio cur  
 si perdifficilis ibid.  
 musculorum mouentium linguā  
 delineatio 300 a  
 musculorū nouē euidentiū lin-  
 guæ natura & situs. 301 b. descri-  
 ptio. 302 a. administratio 303 b  
 musculorum manū occupantium  
 administratio 391 a  
 musculorū inferiorē maxillā mo-  
 uentium administratio 296 b  
 musculorū motū esse arbitrariū,  
 cordis uerō naturalem 732 a  
 musculorum neruea pars. 270 a. li-  
 uida pars. ib. carnea pars ibid.  
 musculorum numerus cur ab alijs  
 diuersus statuatur 274 b  
 musculorū numerus unde peten-  
 dus. 275 a. ut à fibris, ab impres-  
 sionib. à capitib. ibid. à tendi-  
 nibus, à mutuo connexu, à con-  
 cursu 276 a  
 musculorum numerum nō prom-  
 ptē posse defini. 274 b (287 a)  
 musculorum oculi administratio  
 musculorum ortus omnium iux-  
 ta Galenum. ab osse 265 b  
 musculorū ossis v descriptio. 299 b  
 musculorum ossis v propriorū pa-  
 ria quatuor. 297 b & deinceps.  
 non propriorum assignatio. i.  
 bid. 299 a. administratio unde  
 petenda ibid. b  
 musculorū ossis v propriorū iuxta  
 quatuor paria administratio. 299  
 b eorundemq; functio 297 b  
 musculorum ossis v par quatuor  
 scapularum motibus non sub-  
 seruire, ut Galenus sensit. 298 b  
 musculorum ossis v referentis par  
 quatuor quid peculiare sibi uē  
 dicet 298 a  
 musculorum ossa mouentiū non  
 pauci tendinibus carent, cōtrā  
 quā Galenus 297 b  
 musculorū palpebras mouentiū  
 administratio 284 b  
 musculorum nouem pedem mo-  
 uentium munus 423 b  
 musculorum penis officium. 394 a  
 administratio ibid.  
 musculorum quamlibet corporis  
 partem mouentium historiam,  
 sub cuiusque partium earum

elemento initiali reperies: ue-  
 lut eorum qui frontis cutem,  
 qui palpebras. oculos, buccas,  
 labra, nasi alas, maxillam infe-  
 riorē, linguam, larynga, bra-  
 chium, scapulam, caput, ab-  
 domen, testes uiriles, mulie-  
 brem uterum, thoracē, dorsum,  
 manus, pedes, &c.  
 musculorum, qui à cœcendicis of-  
 sis appendice enascitur 407 a  
 musculorum quorundam ualorū  
 administratio 747 a  
 musculorum scapulam mouentiū  
 administratio 327 a  
 musculorum secundariatio 280 b  
 musculorū tendines qualiter dif-  
 ferant 272 b  
 musculorum testium administ-  
 ratio 341 a  
 musculorum thoracem mouen-  
 tium administratio 350 a  
 musculorum mouentium thora-  
 cem numerus ac necessitas,  
 342 a  
 musculorum thoracem mouen-  
 tium enumeratio, & quando  
 illi suo fungātur munere. 349 a  
 musculorum in tibia & pede se-  
 dem obtinentium, & ligamen-  
 torum omnium quæ hæcenus  
 non reſecta sunt, administran-  
 di ratio 432 a  
 musculorum tres radices ab ul-  
 nā longitudine procedentes,  
 quarum tertie decimus nonus  
 musculus si pars 373 a  
 musculorum usus & functio qui  
 spectentur 818 b  
 musculis cur addita caro 261 a  
 musculis cur additæ uenæ & arte-  
 riæ 261 b  
 musculis nerui non omnibus in  
 capitibus exortu inseruntur, &  
 quomodo 262 b  
 musculis quid nerui uerē præſtet  
 263 b  
 musculis non omnibus neruum  
 misceri, & quibus. 262 a. & 265 b  
 musculis omnibus unum tantum  
 fibrarum genus Galenus attri-  
 buit 271 a  
 musculis quando tendines anne-  
 ctantur 265 a  
 musculis temporalibus natura  
 quomodo prospexerit 42 b  
 musculos non æquas portiones  
 & nerui & ligamenti recipere,  
 & quomodo 261 b  
 musculos non omnes ab ossibus  
 procreari 266 b  
 musculos omnes à scapula in hu-  
 meros usque porrectos, Ga-  
 lenum in quinto de Admini-  
 strandis sectionibus mirē con-  
 fuisse 318 b  
 musculis ossi v referenti com-  
 missos, partim ipsi, partim alijs  
 subseruire partibus 297 b  
 D d 3 muscu.



musculos peranimalem spiritum  
 suis fungi munijs 264 a  
 mafeulos tres curnatura secundo  
 pollicis ofsi attribuerit 369 b  
 musculosa frontis cutem mouens  
 substantia 282 a  
 musculosa frontis substantia du-  
 plex administratio ibid. b  
 mustacem Latinos labri quandā  
 portionem uocare 290 b  
 μυλακρὸς 208 b  
 μυλα 172 a, 208 b  
 μυλῆται dentes 207 a  
 μύλον quid 653 b



**N** Anged 207 a  
 nasi alæ 184 a  
 nasi cartilagineæ 183 b  
 duæ 189 b  
 nasi cartilaginis mo-  
 tus tantum voluntarius 184 a  
 natis 208 b  
 natulæ in cerebro 791 b  
 natura in neruis digerendis sco-  
 pus 509 b  
 natura prouidentia in collocatio-  
 ne testium 692 a  
 natura solertia in structura uer-  
 brarum colli 80 b  
 naturam arterias recondere 458 a  
 naturam propagandæ speciei pro-  
 uidisse 638 a  
 nauiculare os 208 b  
 nauicularia ossa duo 189 a  
 nauicularis ossis anterior sedes,  
 & tres ipsius planæ superficies  
 178 b  
 nauicularis ossis sinus ibid.  
 nauiforme os 208 b  
 negne gidî 207 a  
 nerdi 208 b  
 nerualia ossa 206 b  
 nerualis sutura ibid. a  
 neruus dexter sexti paris recurres  
 seu reuersius. 513 a. sinister re-  
 currens ibid. b  
 neruus iuxta quinti paris radicē  
 principium ducens 511 b  
 neruus primus brachium subiens  
 541 a. secundi nerui ingressus  
 ibid. b. secundi cum tertio con-  
 gressus. 542 a. reliqua secundi se-  
 ries ibid. b  
 neruus quib. partib. cōstet 508 b  
 nerui in musculis usus 818 b  
 nerui nomē, quibus corporis par-  
 tibus tribuatur, & quid pro-  
 priè neruus uocetur, unā cū  
 ipsius differentia & usu 507 a  
 nerui nomine quid ueteres sub-  
 audierint 19 b  
 nerui tertij ad cubiti usq. flexum  
 progressus 543 a  
 nerui quarti in brachium ingres-  
 sus, ipsiusq. series ibid. b  
 nerui quinti in brachium ingres-  
 sus, ipsiusq. series cum tertio  
 544 b  
 nerui sexti in brachium ingressus,

# I N D E X.

ac series 547 a  
 neruum nullum tactus sensu non  
 præditum esse 807 a  
 neruum singulis musculis, ita ut  
 alijs dissectionū professoribus  
 uisum fuit, non misceri 262 a  
 nerui in brachium à quibus pari-  
 bus ducantur 541 a  
 nerui musculis quid uerè præbe-  
 ant 263 b  
 nerui papillam petentes 540 a  
 nerui quatuor crus petentes. 549 a  
 primi nerui series ibid. se-  
 cundi series. ibid. tertij series  
 550 a. quarti series ibid.  
 quartus neruus, qui ueluti plu-  
 ribus funiculis constare uidea-  
 tur 551 a  
 nerui reuersiui cur facti credan-  
 tur 524 a  
 nerui uentriculi 601 a  
 neruorum à dorsali medulla pro-  
 deuntium nudam seriem figura  
 ostendens 526 a  
 neruorum cerebri initium unde 515 a  
 neruorum cerebri quot paria ibid.  
 neruorum cerebri secundum par.  
 519 a. tertium par ibid.  
 neruorum cerebri quinti paris se-  
 ries & ortus 521 a  
 neruorum cerebri sextum par 522 a  
 neruorum cerebri septimum par  
 525 b  
 neruorum cerebri furculos duos  
 Vesalii, præter tres Anatomi-  
 cis notos, adinuenisse 43 a  
 neruorum cur alius mollior aut du-  
 rior reddatur 509 b  
 neruorum congressus ratio 518 a  
 neruorum crassities 547 a  
 neruorum delineatio quæ septem  
 parium neruorum, qui à cerebro &  
 dorsalis medullæ initio pronas-  
 cunt, ortus demonstrans, & di-  
 stributionē serieq. omnium parium  
 quæ à dorsali medulla in dorsū  
 ossib. cōplexa originē ducunt,  
 pulcherrimè referens 554 a  
 neruorum differentia ab originis  
 forma 510 a  
 neruorum differentia à cavitatē nul-  
 la ibid. b  
 neruorum differentia à serie 510 b  
 neruorum differentia triplex 507 a  
 neruorum discrimen à mollitie &  
 duritie 504 a  
 neruorum femur, tibiam & pedē  
 adeuntium distributionis ratio  
 549 a  
 neruorum implexus brachium ad-  
 euntium 541 a  
 neruorum in brachium series quomo-  
 do citra sectionē experiri pos-  
 sit 546 a  
 neruorum in duræ mēbranæ basi  
 existentium examen 812 b  
 neruorum ortus à cerebro, nō ē du-  
 ra eius membrana, nec à corde  
 508 b

neruorum ortus, partim à cerebro,  
 partim à dorsali medulla 507 b  
 neruorum paria, Græcis *ευρυίαι*  
 uocari 515 a  
 neruorum paria, quot nam à cere-  
 bro & dorsalis medullæ parte  
 adhuc in caluaria consistente,  
 originem sumant 514 b  
 neruorum paria quot à dorsali di-  
 scindantur 534 a  
 neruorum parium examina 811 b  
 neruorum quinque parium è lum-  
 borum uertebrib. prodeuntium  
 series. 547 b. è sacro osse proflit-  
 entium series 548 a  
 neruorum duodecim parium dor-  
 salis medullæ, thoracis comple-  
 xæ uertebrib. series 538 a  
 neruorum 30 parium, quæ à dorsā-  
 li medulla dorsū ossibus conten-  
 ta originem ducunt, nuda deli-  
 neatio 527 a  
 neruorum parium septē è ceruicis uer-  
 tebris proflientium series 534 b  
 neruorum primi paris ortus. 517 a  
 neruorum primi paris in oculum  
 ingressus, & in tunica, quam re-  
 ti comparamus, dilatatio 517 b  
 neruorum primi paris uia, dorsā-  
 lis medulla 78 b  
 neruorum primi paris incessus. 517 a  
 neruorum primo pari quā uiam  
 natura prauerit 534 b  
 neruorum secundi paris egressus  
 & series. 535 a. item tertij 536 a  
 quarti ibid. quinti ibid. b.  
 sexti 537 b. septimi 538 a  
 neruorum tertij paris tenuioris ra-  
 dicis ortus ac series. ib. b. cra-  
 ssioris radicis origo, & distribu-  
 tionis series 520 a  
 neruorum tertij paris utriusq. du-  
 plex radix 519 a  
 neruorum quartū paris ortus 520 b  
 neruorum quinti paris ad auditus  
 organum series 44 b  
 neruorum sexti paris in thoracis am-  
 plitudine reliqua series 524 a  
 neruorum sexti paris in nutritionis  
 organa series ibid. b  
 neruorum noni paris series 539 a  
 neruorum parium reliquorum à  
 thoracis uertebrib. proflientium  
 series ibid.  
 neruorum reliquum anterioris ra-  
 mi quinti paris 537 a  
 neruorum per brachium, cubitū,  
 & manum series 540 b  
 neruorum propagines tēporali mu-  
 sculo quot nam offerantur. 521 b  
 neruorum recurrentium examē,  
 uocisq. eorum sectione aboli-  
 tio 822 a  
 neruorum recurrentium liberatio  
 749 b  
 neruorum septi transuersi examē  
 748 b  
 neruorum septi transuersi consti-  
 tutio 536 b  
 neruorum



- conterminum sit. 144 b. quot  
 secundū. ib. q̄t tertius. ib. q̄t quar-  
 tū. 145 a. quot quintum. sextū,  
 septimum & octauum. ibid.  
 os quantum brachialis, quæ sibi  
 pecularia uendicet. 143 b. cui  
 osi committatur. 144 a. item  
 cui ordini ascribendum ue-  
 niat. 144 a.  
 os calcis. 208 b.  
 os caudæ. 207 b.  
 os colatorij. 206 b.  
 os coxæ. 156 a. 208 a.  
 os coxædici. 156 a.  
 os coccyx. 207 b.  
 os cribratum. o. b.  
 os cristatum. 207 a.  
 os cubiforme. 208 b.  
 os cuneiforme. ibid.  
 os cuneiforme. 206 b.  
 os cubi tesseram ue referēs. 208 b.  
 os cuneiforme an cauernulis obli-  
 tum sit, uel citra squamæ leui-  
 ue osis obductionem pumicis  
 aut spongia speciei referat. 40 a.  
 os cuneiforme cur *πολύμορφον* nun-  
 cupatum. 39 a.  
 os *ἰσομήκης*. 207 a.  
 os femoris in homine cūctis alijs  
 magnitudine præstare. 162 a.  
 os frontis cum uerticis osse iun-  
 ctum, cur ibi sit crassius. 37 a.  
 os genu articulo præpositū. 144 a.  
 os grandinosum, uarium. 208 b.  
 os gutturis. 207 a.  
 os *ἰσὸν* unde uocetur. 99 b.  
 os *ἰσομήκης*. 69 b. *λαμβάνει* ibid.  
 os hyodes quomodo formetur. 70 b.  
 eiusq̄ usus. ibid.  
 os *ἰσολοφῆς*. 69 b.  
 os ilium. 155 b.  
 os in cerebro à Galeno traditum,  
 quale. 42 a.  
 os iugale. ibid. b.  
 os iugale ex quibus conflet. ibid.  
 os iugale cur à Grecis *ὑγώγιμα* nun-  
 cupatum. ibid.  
 os latum. 207 b.  
 os laude. 206 b. 207 a.  
 os linguæ. 207 a.  
 os lumbare. ibid. b.  
 os maxillæ secundū. 50 a. tertium,  
 quartum. 51 a. quintum. 52 a.  
 os morfus Adam. 207 a.  
 os occipitis. 38 a.  
 os occipitis cur sit cum leuitate  
 simul asperum & inæquale. 38 a.  
 os occipitis ubi crassissimum. 37 b.  
 os palati. 206 b.  
 os pectoris. 110 a. 207 b.  
 os pectoris utrinq̄ lunatum. 115 b.  
 os *ἰσῶν*. 99 b. 207 b.  
 os proræ. 206 b.  
 os pubis. 155 b.  
 os pubis cur maximo foramine  
 peruiū, & dein ipsius sinus &  
 tubera. 160 a.  
 os pubis in uiris cur teres crassiq̄  
 sit. ibid. b.  
 os pyxis. 206 b.  
 os quadratum. 208 b.  
 os sacrum. 207 b.  
 os sacrum seu amplum quid. 99 b.  
 os *σκαφοειδὲς*. 208 b.  
 os *σφαιροειδὲς*. 34 b.  
 os *σπυγγοειδὲς*. 207 a.  
 os tertium à Galeno in superioris  
 scapulæ processu cum clauicu-  
 la nexu recenseri. 123 a.  
 os tertium in superioris scapulæ  
 processu, Galenū nunq̄ uidisse.  
 os tibiar. 167 b. (113 b.)  
 os tibiar cur spina appellatū. 171 a.  
 os tribus in simijs & canibus ef-  
 uocatum osibus, quod sacrū  
 uocamus. 103 b.  
 os u referens rarō liberum. 70 b.  
 osis coccygis descriptio. 102 b.  
 osis coxædici acutus processus. 159 a.  
 osis coxædici appendix, & muscu-  
 lorū ipsius quatuor, usus. ib. b.  
 osis coxædici robori quomodo  
 sit prospectum. ibid.  
 osis coxædici sinus superioris se-  
 di in scapula. 158 a. eiusdemq̄ tu-  
 bera. ibid. (na. 208 b.)  
 osis cubi formā referentis nomi-  
 osis cuneiformis circūscriptio. 34 b. item interior sinus quib.  
 processibus conflet. 40 a.  
 eiusdem nomina. 206 b.  
 osis cuneiformis media sedes  
 qualis. 39 b.  
 osis cuneiformis processus alis  
 similes. 41 b. (208 b.)  
 osis cymbam referentis nomina  
 osis cymba referentis sinus. 178 b.  
 osis cymba referentis superior fe-  
 des. 178 b. item inferior. 179 a.  
 osis frontis circūscriptio. 36 b.  
 forma. ibid.  
 osis frontis nomina. 206 b.  
 osis illiū appendix quibus. 157 a.  
 osis illiū dorsi linæ, & quibus id  
 musculis occupetur. 157 b.  
 osis illiū interna amplitudo quib.  
 musculis occupetur. ibid.  
 osis illiū pars renorsum magis  
 quàm sacri osis transuersi pro-  
 cessus exporrecta. ibid. a.  
 osis illiū sedes, sacro osi com-  
 missa, qualis. 156 b.  
 osis iugalis usus. 42 b.  
 osis linguæ nomina. 207 a.  
 osis natura. 1 a.  
 osis naucularis anterior sedes,  
 & tres ipsius plani superficies. 178 b.  
 osis naucularis sinus. ibid.  
 osis occipitis capitula. 38 a.  
 osis occipitis circūscriptio. 37 b.  
 os octauī capitis cribro aut co-  
 lo aut spongiæ comparati no-  
 mina. 207 a.  
 osis pectoris humani descriptio. 114 a.  
 osis pectoris ad ensē compa-  
 ratio. 115 a.  
 osis pectoris substantia. ibid. b.  
 osis pectoris usus. ibid.  
 osis penis nomina. 208 a.  
 osis postbrachialis nomina. ibid.  
 osis primi maxillæ historia. 49 b.  
 osis primi ipsius pollicis & post-  
 brachialis osium ad brachiale  
 contextus. 145 a.  
 osis pubis foramen cur *σφυροειδὲς*  
 uocatum. 160 a.  
 osis pubis historia. 159 b.  
 osis sacri anterior sedes cuiusmo-  
 di. 101 b.  
 osis sacri descriptio. 100 a.  
 osis sacri foramina neruis emit-  
 tendis parata. 102 a.  
 osis sacri latera cuiusmodi. 101 a.  
 osis sacri posterior sedes cuius-  
 modi. ibid. b. iū cur insigniter  
 aspera sit, ac ueluti cariosa. ib.  
 osis sacri fex ossa. 188 b.  
 osis sacri spinas omnes deorsum  
 spectare. ibid.  
 osis sacri superior sedes cuiusmo-  
 di, item inferior. 100 b. 101 a.  
 osis temporis processus styli a-  
 cus ue imaginem referentis no-  
 mina. 206 b. item uberis papilla  
 representantis nomina. 206 b.  
 osis tibiar secundum ipsius longi-  
 tudinem figura. 171 a.  
 osis tibiæ sinus & tubera, quib.  
 talo articulantur. 169 b.  
 os u aut Δ imaginem exprimens. 207 a.  
 osis vreferentis duæ figuræ. 69 a.  
 situs & nomina. ibid. 70 a.  
 item latera humiliora. ibid.  
 osis vreferentis nomina. 207 a.  
 osis vreferentis ossicula ferē un-  
 decim. 188 b.  
 osi sacro quinque osibus tantū  
 extructo, quid eueniat. 102 b.  
 ossa ad disciplinam utilissima que  
 habeantur. 195 b.  
 ossa artualia. 206 b.  
 ossa articulis mutuo esse cōiūga-  
 neq̄ ab inuicem abscedere. 37 a.  
 ossa brachialis quib. sedibus, liga-  
 mentis, & cartilagine obducun-  
 tur. 143 a.  
 ossa brachialium sedecim. 189 a.  
 ossa caluarie uiginti. 188 b.  
 ossa capitis qualib. futuris magna  
 ex parte compingantur. 18 b.  
 ossa *χελυοειδῆς*. 208 b.  
 ossa coniugalīa. 206 b.  
 ossa corporis humani posteriorifa-  
 cie propolita. 205 a.  
 ossa cur circa cōnexū molliora. 8 b.  
 ossa decē sub lumborū uertebris,  
 quib. reliqua dorsi pars à lūbis  
 ad anū pertinens cōstituit. 99 b.  
 ossa digitorum. 12 a.  
 ossa digitorū in utroq̄ pede qua-  
 tuordecim. 189 a.  
 ossa digitorum perperam Galeno  
 solida constituta. 3 b.  
 ossa digitorum triginta. 189 a.  
 ossa duo cur natura interdū pluri-  
 bus ar-



bus articulis commiserit 17 b  
 ossa emundata quo modo iungen-  
 da 196 a  
 ossa inter se omnia contigua 14 b  
 ossa lapidea, siue lapidosa 206 b  
 ossa *λίθοειδῆ* 43 a 206 b  
 ossa lateribus sacri ossis commissa  
 in pueris tribus ossibus forma-  
 ri 19 a  
 ossa *λίθοειδῆ* 206 b  
 ossa manus utriusque octo 189 a  
 ossa maxillæ superioris duodecim  
 52 b 54 a  
 ossa omnia præter dentes tacta 4 a  
 ossa paria, siue paris 206 b  
 ossa parietalia ibid.  
 ossa pectoris humani in adulis  
 qualia 114 b  
 ossa pectoris humani septena. Ve-  
 salio nunquam occurrisse. ibid.  
 nec semper eodem numero eer-  
 ni ibid.  
 ossa pectoris tria simul inuēta, ma-  
 nubij alicuius gladij imaginē  
 referre 155 b  
 ossa postbrachialis quatuor à Ve-  
 salio enumeratū, ab alijs plura  
 146 b 147 a  
 ossa postbrachialis quatuor cuius-  
 modis sint. 147 a item in appen-  
 dicibus, & mutuo nexu ib. b  
 ossa postbrachialis qui musculis  
 cedant, & adaptentur 147 b  
 ossa postbrachialium octo 189 a  
 ossa prærupte rupi similia 43 a  
 ossa, quibus commissurarum disce-  
 rentijs inter se iungantur, & quig-  
 harum motum edant 15 a  
 ossa quomodo sentiant 4 a  
 ossa quorum beneficio inuicē cō-  
 necantur 19 a  
 ossa rasæ pedis 208 b  
 ossa sacri ossis lateribus commis-  
 sa duo 159 a  
 ossa sacri ossis laterib. cōmissa in-  
 uicē in pube coalescere 19 a  
 ossa sacri ossis laterib. cōmissa, in  
 puerulis tribus cōformari ossi-  
 bus 160 b (189 a)  
 ossa tarsi in utroque pede quatuor  
 ossa tympanum 206 b  
 ossa thoracis 110 a  
 ossa tibiæ duo 189 a  
 ossa temporum 206 b  
 ossa uerticis utriusque mollia, cur du-  
 ris tēporū ossib. cōmittant. 14 b  
 ossiū brachialis cur duo ordines  
 143 a  
 ossium brachialis delineatio. 141 a  
 ossium brachialis nomina 143 b  
 ossiū capitis & maxillæ superio-  
 ris foraminū descriptio cur in-  
 situta 59 a (11 b)  
 ossiū capita plerāq. sine appendice  
 ossium cartilaginūq. inter se stru-  
 ctura & contextus 14 a  
 ossiū cerebri siueque contextus  
 ad quid conferat 32 a  
 ossium commissuræ, earumq. ear-

tilagines. 4 b. & 5 a b  
 ossium crassorum substantiæ cur  
 uasorū surculi insinuentur. 90 a  
 ossium differentia ab usu. 12 a item  
 à magnitudine & forma. 1 b. &  
 2 a. itē ab appendicib. processib.  
 bus, capitibus, & alijs quibuscūq.  
 2 b. item à foraminibus 3 b  
 ossium digitorum tendines 151 b  
 ossiū dorsi spinæ, seu posteriores  
 processus 74 a  
 ossium dorsi cōtextum posteriori  
 facie. & uniuersam dorsalis me-  
 dullæ neruorum seriem cōmon-  
 strans figura. 528 a. eiusdemq.  
 characterum index 529 a  
 ossium dorsi impar magnitudo  
 72 b  
 ossium dorsi transuersi processus  
 74 b  
 ossium & cartilaginū articulos  
 ligamentis colligari atque ce-  
 neri 255 a  
 ossium & cartilaginū usus in  
 uiuo animante qui uidendus.  
 818 a  
 ossium humani corporis ex latere  
 delineatio 204 a  
 ossium humani corporis simul cō-  
 pactorum anterior facies 203 a  
 ossium in calce macerandorū, ac  
 dein in flumine emundandorū  
 ratio 190 a  
 ossiū in uniuersum numerus. 189 a  
 ossium iugalium nomina 206 b  
 ossiū liber, præ ceteris anatomicis  
 libris Galeno tribuendus 107 a  
 ossium maxillæ breuis enumera-  
 tio 49 a (ratio. 16 b)  
 ossium mutui contextus duplex  
 ossium naturalis compositio cur  
 facta 15 a  
 ossium numerus 188 b  
 ossium nutrimentum proprium,  
 medulla 3 b  
 ossium partes, sedesq. diuersis no-  
 minibus appellari 8 a  
 ossium pectoris in canibus & si-  
 mijs cuiusmodi ratio 114 a  
 ossiū pedis dextri delineatio 6 a  
 ossium pedis figuræ 173 a. 174 a  
 ossium per coctionē parandi mo-  
 dus 191 a (147 b)  
 ossium postbrachialis interualla  
 ossium processus 9 b  
 ossium pubis anterior sedes cur  
 sitaspera 160 b  
 ossium pubis superior pars, quæ  
 inuicem cōmittuntur, cur ex  
 asp. retur ibid.  
 ossium quibusdam sedibus perin-  
 de ac si undiq. circūscriberen-  
 tur, nomina imponi 42 b  
 ossium sacri ossis inter se conne-  
 xus. 100 a (forū effigies. 154 b)  
 ossiū sacri ossis lateribus cōmis-  
 sa ossium sacri ossis laterib. cōmis-  
 sorum usus 156 a  
 ossium sacro ossi nexorum, in us-

ris & mulierib. differentia. 199 b  
 ossium sinūs & capita cur consti-  
 tuta 15 b  
 ossium temporum anse 206 b  
 ossium tēporum circumscriptio  
 38 b  
 ossium temporum nomina 206 b  
 ossium tibiæ figuræ 165 a. 166 a  
 ossium uerticis circūscriptio. 36 b  
 ibid.  
 ossibus non solum grandioribus  
 appendices coniungere 9 a  
*ὁ ἀπὸ τοῦ* quid 640 a  
*ὁ σφῖν* uertebræ 207 b  
*ὁ σφῖν* os 206 a  
*ὁ σφῖν τῶ ἀκρωτίου* 207 b  
*ὁ σφῖν κατὰ τὴν ἐν τῇ σπονδύλῳ*  
*ἀσφῖ* os circūscribitur 206 b  
*ὁ σφῖν* à Celso propter uenatum  
 similitudinē, albas uenas nun-  
 cupari 637 a  
*ὁ σφῖν* ut meatus, qui & *ὁ σφῖν*  
*τιμὸν* πρὸς dicuntur. 637 a (669 b)  
 ouis prægnatis uterus cuiusmodi  
 12 b  
*ὁ σφῖν* 23 b



**P**  
 Alati os 206 b  
 palato infestus morbi  
 Gallicus 722 a  
 palma 146 b. 208 a  
 palpebræ anterior immobilis. 284 b  
 palpebræ duo musculi 283 b  
 palpebræ superioris & inferioris  
 figura 182 b  
 palpebræ superioris usus ibid.  
 palpebræ utriusque una carila-  
 go ibid.  
 palpebrarum superiorem cur mo-  
 ueri oportuerit 283 b  
 palpebrarum musculi. ib. a. consti-  
 tutio ibid.  
 palpebras mouentium musculo-  
 rū difficile esse cognitionē. 284 b  
 palpebras musculorū mouentium  
 delineatio unde petēda. 283 a. ad  
 ministratio. 284 b. descript. 283 b  
*παγκράτις* quid 606 b  
 panniculus carnosus 279 a  
 pāniculus carnosus an sint octo  
 abdominis musculi ibid.  
 papilla, *πίλη* 676 b  
 papilla cur sit tenera & promi-  
 nens 679 b. cur sensu exa-  
 ctiore, & neruorū surculis ab-  
 undet. ibid. cur sit substantia ea-  
 rum glandulosa ibid.  
 papillæ constructionis, & totius  
 substantiæ eiusdem ratio 679 b  
 papillæ substantia 677 b  
*παράκλιον* 208 b  
*παράκλιον* ibid. a  
*παράκλιον* 378 a  
*παράκλιον* 207 b  
*παράκλιον* 346 b  
*παράκλιον* 126 a  
*παράκλιον* 69 b. 207 a  
*παράκλιον* 69 b. 207 a  
*παράκλιον* ibid.  
*παράκλιον*

*περὶ γυναικῶν* quid. 621 a eiusque os.  
 ibid. *περὶ γυναικῶν* lienis 627 b  
 paris, siue paria ossa 206 b  
 parietalia ossa ibid.  
*περὶ σπλάχνων*, faucium glandulæ cur  
 721 b  
 partium dictarum administratio  
 in uiris, cuiusmodi sit in mulie-  
 re 694 b  
 partium ad pituitæ defluxum præ-  
 cipue famulantium, brevis enu-  
 meratio 793 b  
 partium pituitæ expurgandæ sub-  
 seruientium usus, & constructio-  
 nis ratio 795 a  
 partium functiones naturales a-  
 liæ per fibras sunt, aliæ absque  
 illis 436 b  
 parturientibus non recludi pubis  
 ossa 159 b  
 partium generationi subservien-  
 tium brevis enumeratio 638 b  
 Parauini cuiusdam historia 627 b  
 patella 172 a, 208 b  
 patella quæ femoris ossi connecta-  
 tur 172 b  
 patellæ figuræ & descriptio, 171 b.  
 situs & forma 172 a.  
 patellæ nomina 208 b  
 patellæ substantia, 172 b. usus ib.  
 patellæ duæ 189 a  
 patellam cartilaginofum os male  
 dici 172 b  
 patellam non esse cartilaginofam,  
 ut Galenus atque Marinus sen-  
 serunt ibid.  
 paxillares dentes 207 a  
 paxillum 206 b  
*περὶ ὀφθαλμῶν* 135 a, 207 b  
 pecten 180 a, 208 a b  
 pectinis os 208 a  
 pectus 110 a, 208 b  
 pectus, & pectus *περὶ μετὰ καὶ ὑπὸ*  
 quibusdam 146 b  
 pectus manus. 208 a. & pecten pe-  
 dis ibid. b  
 pectoris cartilago ensi comparata  
 207 b  
 pectoris humani ossis descriptio  
 114 a  
 pectoris humani ossa in adultis  
 qualia ibid. b  
 pectoris humani ossa non eodem  
 semper numero cerni ibid.  
 pectoris humani septena ossa Ve-  
 salio nunquam occurrere ib.  
 pectoris inferiorem partem a qui-  
 busdam *σπλάχνων* uocari 207 b  
 pectoris mucronata cartilago. 115  
 a & b. 207 b  
 pectoris mucronatæ cartilaginis  
 nomina ibid.  
 pectoris os. 110 a, 207 b quale in  
 quadrupedibus. 113 a. eiusdæ sy-  
 narthrosis ibid.  
 pectoris os utrinque lunatum 115 b  
 pectoris ossis ad ensim comparas-  
 tio ibid. a  
 pectoris ossis ad cartilagines co-

staturæ liberi delineatio 109 a  
 pectoris ossis cum cartilaginibus,  
 & c. administratio 747. 748 a  
 pectoris ossis unicum ipsi coar-  
 ctatis cartilaginibus, interior su-  
 perficies expressa 699 a  
 pectoris ossis cartilago, cur malum  
 granatum uocetur 116 a  
 pectoris ossis furcula, iugulum,  
*σφαγὴν* 114 a  
 pectoris ossis nomina 207 b  
 pectoris ossis substantia. 115 b. &  
 usus ibid.  
 pectoris ossis superiorem dunta-  
 xat partem a nonnullis *σφίγγων*  
 dici 207 b  
 pectoris ossis quot ossa 188 b  
 pectoris ossium in canibus & si-  
 milibus cuiusmodi ratio 114 a  
 pectoris tria ossa simul iuncta, ma-  
 nubij alicuius gladij imaginem  
 referre 115 b  
 pectoris scutum 207 b  
 pectoris uertebrae ibid.  
*περὶ ὀφθαλμῶν* 180 a, 208 b  
 pedij ad digitos articulatio 181 a  
 pedij ad tarsum coarticulatio. 180 b  
 pedij descriptio ibid. a  
 pedij historia ibid.  
 pedij ossis nomina 208 b  
 pedij ossa in utroque pede quin-  
 que 189 a  
 pedij ossa quot. ibid. eorundem ap-  
 pendix. 7 a. 8 b. capita 11 a  
 pedij ossium interualla 180 b  
 pedij ossium figura & descri-  
 ptio 6 b  
 pedium quinque ossibus constare. 180 b  
 pedij pecten 180 a  
 pedis dextri ossium delineatio 6 a  
 pedis digiti 181 a, 208 a  
 pedis digitorum figura 6. & 7 a.  
 motus 41 b, 424 a  
 pedis amplitudinem subeuntis li-  
 gamenti descriptio. 417 b. admi-  
 nistratio 433 a  
 pedis ac digitorum motibus famu-  
 lantium musculorum alij in ti-  
 biæ sede anteriore consistunt.  
 432 b. alij in posteriori. ib. alij, in  
 pede. ibid. & quot figillatim. ib.  
 pedis calcar 208 b  
 pedis cruris cauitas, per quam tra-  
 iectio fuit Hector ab Achille  
 circum mœnia Troiæ actus. 420 a  
 pedis digitorum motus 424 a  
 pedis digitorum mouentium mu-  
 sculorum numerus 429 a  
 pedis digitorum ratio 179 b  
 pedis digitos musculorum mouen-  
 tium administratio. 433 a. primi,  
 secundi, tertij, quarti. 433 a. &  
 434 a & b. decimiseptimi & de-  
 cimioctauum. ibid. decimi quarti  
 & decimiquinti, ite decimisepti-  
 ti. 434 b. reliquorum quatuor. ib.  
 pedis digitos mouentium muscu-  
 lorum delineatio. primi 251 a.  
 secundi. ibid. tertij. ibid. eorum

qui primos digitorum articulos  
 flexit, & sunt decem. 251 b, 252  
 a. decimi quarti. 223 a. decimi.  
 quinti. 226 b. decimisepti. ibid.  
 decimiseptimi. 219 a. decimio-  
 ctati. 217 a. quatuor musculorum  
 digitos quatuor pollicis adju-  
 centium. 250 a. & 251 b  
 pedis digitos mouentium muscu-  
 lorum descriptio. 424 a. primus,  
 secundus, & tertius. ibid. qua-  
 liter in simis sese habeant. 426 b.  
 decem sequentes primis digi-  
 torum articulis præfecti. 427 a.  
 decimus quartus & quintus.  
 ibid. b. decimus sextus pollicis  
 ac tres proximos digitos abdu-  
 cens. 428 a. decimus septimus &  
 octauus. ib. b. reliqui ad 22. usque  
 digitos quatuor pollicis ad-  
 ducentes 429 a  
 pedis ligamentorum transversio-  
 rum descriptio. 431 a. alia, ossa  
 pedis committentia. ib. b. admi-  
 nistratio 432 a  
 pedis motus 418 b  
 pedis ossium figuræ 173 a, 174 a  
 pedis ossium numerus 181 a  
 pedis ossium delineatio. 173 a & b.  
 174 a  
 pedis ossium quibus in manu nul-  
 lum respondeat 179 a  
 pedis *σπλάχνων* 180 a  
 pedis unius sesamina ossicula duo  
 decim 189 a  
 pedem ad manu uno osse, cœtra Ga-  
 leni placitum, superari 181 a  
 pedis plantæ cuti subnati tēdinis  
 lati descriptio 417 b  
 pedem mouentium musculorum  
 administratio. 432 a. primi & se-  
 cundi. 433 a. tertij & quarti. ib. b  
 quinti. 434 b. sexti. eod. septimi  
 & octauum. 435 a. noni 434 b  
 decimiseptimi & decimiocta-  
 ui. 433 b. decimi quarti & deci-  
 miquinti. 434 b. decimisepti.  
 435 a.  
 pedem mouentium musculorum de-  
 scriptio. 418 b. primus. ead. secun-  
 dus, tertius, quartus. 419 a. & b.  
 quintus. 420 b. sextus, septimus.  
 421 a & b. octauus 422 b. no-  
 nus. 423 a. munus omniū. ib. b  
 pedes ac digitos mouentium mu-  
 sculorum traditio apud Galenum  
 obscura & imperfecta 416 b  
 pedum petentes nerui 549 a  
 pedum ac manuum digitorum fa-  
 bricæ ratio 181 b  
 pedum in quadrupedibus & ho-  
 minibus similitudo 175 b  
 Pelopis sententiam de uenarum,  
 articularum & neruorum exor-  
 tu, falsam esse 485 b  
 peluis aut cyathus, in quam cere-  
 bri pituita defluit 794 a  
 penis constitutio 393 b (648 b)  
 penis constructionem subeuntia  
 penis

# I N D E X:

penis corporum examen	694 a	tionum examen	820 a	lis ofisium ad brachiale contex	tus	145 a
penis corporum ortus, & uenarum,		peritonæo cõtenta quomodo sint		pollicis os flectentes musculi tres,		372 a
arteriarum & neruorum huc		refecanda	341 a	Galeno ignorati		191 a
pertinentium examen	693 a	peritonæum in simularium partium		pollicis os secundum, uix extra re-		150 a
penis cutis carnea membrana &		esse numero	591 a	ctam lineam extendi		150 a
musculi	690 a	περίων quid	167 b, 208 b	pollicis ofis primi ad brachiale		150 a
penis fabricæ totius delineatio	392 b	περι	208 b	contextus		150 a
penis figura, & quæ ipsi adiecta,		per osorum ofisium appellatio un-		pollicis secundum os, qui tertio ar-		150 a
quartæ figuræ cum earundem		de	43 a	culetur		150 b
characterum indice	392 b	φαινομένης dictus humor	801 b	pollicis secundo ofsi cur tres mus-		369 b
penis glans	649 b	φαινομένης ueterib, quid uocatur,	721 a	sculos natura attribuerit		208 b
penis ipsius duo præcipua corpo-		φαινομένης	57 b	polus		179 b
ra	648 b	φαινομένης	346 b	πολύμορφος dictum cuneiforme os		206 b
penis musculi parum à Galeno a-		φαινομένης in mammillis quid	677 b	πολύμορφος dictum os cuneo com-		208 b
nimaduersi	394 b	παιχτες	135 a, 208 b	paratum		189 a
penis musculorum examen.	693 a	pinguedinis humanæ usus.	193 a	poplitici utriusque sesamina ofis cu-		619 a
penis musculorum officium	394 a	piscis musculi, quæ & mytilum		la duo		207 b
administratio	ibid.	uocant, forma	267 a	porcorum iecur quale		517 b
penis os à barbaris subinde femo-		pituita in palatum per quæ fora-		porcinum rostrum		ibid.
ris os appellari	208 a	mina decumbat	795 b	portæ ad bilis uesculam		ibid.
penis ofis nomina	ibid.	pituita leuissima cur foraminulis		ad uentriculi humiliori orificiū,		445 a
penis potissima substantia	648 b	ociaui ofis capitis excoletur	63 a	portæ caudicis extra iecur distri-		445 a
penis situs	ibid.	pituitæ cerebri purgandæ parati		butio		445 a
penis structuræ ratio	ibid.	meatus	40 a	portæ caudicis in duos præcipu-		445 a
penis uenæ, arteriæ & nerui.	649 b	pituitam cerebri excipientes du-		os truncos sectio ibid. b ad		445 a
penis unum tantum esse meatum,		ctus	793 b	dextram uentriculi fundi se-		445 a
non tres, ut Arabes imaginan-		pituitam nulla secundum naturam		dem, & ipsi proximam omen-		445 a
tur	656 b	excretionem per ofis actus orga-		ti partem, ibid. ad duodenum		445 a
περιτοναία	777 b	norum sedem, ociauum uel ca-		intestinum		445 a
περιτοναία	272 b	pituita os expurgari	795 b	portæ dextri caudicis trunci se-		447 b
περιτοναία	206 a	pituita in per cuneiforme os lon-		portæ uenæ distributionis gra-		448 b
περιτοναία	42 a, 352 b	ga mora, & exiguis foraminib-		tia		444 a
περιτοναία	778 a	bus non colari	795 b	portæ uenæ integra delineatio		444 a
περιτοναία	591 a	pixis os	208 a	portæ nomina		449 a
περιτοναία	ibid.	planta pedis	180 a, 208 b	portæ uenæ nudæ delineatio, & e-		443 a
peritonæum non undique æqualiter		plantæ appellatio	179 a	iusdem characterum index.		443 a
crassum	592 a	plantæ cuti subnatus latefcens te-		portæ uenæ officium		622 a
peritonæum quibus partibus per-		do	416 b	portæ uenæ omenti membrana ful-		559 a
uium sit	ibid. b	planum pedis	180 a, 208 b	ta figura		559 a
peritonæum quibus uasis ac ner-		Platonis de generationis amore à		portæ uenæ rami unâ cum arterijs		687 a
uis implicetur	ibid.	Deo nobis ingenito, sententia	639 a	& neruis illis attentis, qui exami-		687 a
peritonæum tactus sensu etiam præ-		Platonis de septo transuerso sen-		portæ uenæ ramorum officium		590 a
ditum	ibid.	tentia	348 a	portæ uenæ propagines in intesti-		617 a
peritonæum transfusus abdomi-		Platonem & Aristotelem muscu-		na cur insertæ		443 a
nis musculis pertinaciter adhæ-		lorum rationem penitus latuisse		portæ uenæ rami, unâ cum arterijs		443 a
rere	336 b	sc	264 b	& neruis illis attentis quomo-		687 a
περιτοναίον ονέπασμα	591 a	πλατὺ os	99 b, 207 b	do examinandi		445 a
περιτοναίον ὕμιν	ibid.	πλεξὺς	207 b	portæ ramorum in iecoris substa-		445 a
περιτοναίον χιτὼν	ibid.	plexus in prioribus cerebri uetri-		portæ uenæ ramos priusquam iec-		621 b
peritonæi à partibus extrinsecus		culis occurrens	797 b	cori succulentum id porrigant,		446 a
ipsis commissis liberatio	683 b	plexus in prioribus cerebri uetri-		rudem aliquam sanguinis for-		446 a
peritonæi ad uesciæ fundum ne-		culis constitutio	501 a	mam, ut Galenus opinatur, ne-		446 a
xus	557 a	plexus reticularis Galeni quid,		quanquam conferre		446 a
peritonæi apertio, & unâ uasorum		ibid. b		portæ finis trunci series		446 a
umbilici administratio	684 a	πλεξὺς	38 b, 206 b	portæ uenam sanguinem non con-		446 a
peritonæi figura, 556 b & descri-		Plinij in appellatione tali lapsus	170 a	ficere		446 a
ptio	ead.	Plinij de mestrui sanguinis prau-		postbrachiale		146 b, 208 a
peritonæi laterum uenæ	356 b	tate & grauolentia error	662 b	postbrachialis ofis nomina, ibid.		postbra.
peritonæi magnitudo & situs.	591 a	plumæ nomina omenti apud Bru-				
a connexus, ortus, forma, su-		xcellentes uocari	607 a			
perficies, ibid. usus	592 a	pollex	208 a			
peritonæi nomina	591 a	pollicis nomina	ibid.			
peritonæi ortus examen	694 b	pollicis primi ofis & postbrachia				
peritonæi usus	592 b					
peritonæo medicos ridiculæ ad-						
modum tactus sensum admi-						
re	ibid.					
peritonæo quæ continentur fun-						



postbrachialis ossa neſtentia liga-  
menta 147 b  
postbrachialis ossa octo 189 a  
postbrachialis ossa quatuor cuius  
modi ſint. 147 a. item in appen-  
dicibus & mutuo nexu ibid.  
postbrachialis ossa qui musculis  
cedant & adaptentur 147 b  
postbrachialis ossa Vesalii qua-  
tuor enumerat ibid. a  
postbrachialis ossiū & primi pol-  
licis ossis ad brachiale conne-  
xus 145 a  
postbrachialis ossium interualla  
147 b  
postbrachialis uoce utendū 146 b  
præcordia dicta quæ 346 b  
prægnantis uacæ, capræ, ceruæ,  
aut ouis uterus cuiusmodi. 669 a  
prægnatiū uterus cuiusmodi. 655 a  
prægnantibus uteri os quale ib.  
præputium 650 a  
præpiola dentium 57 b  
princeps intestinum 611 b  
principia hominem dispensantia  
tria esse 110 a  
processus 9 b  
processus à quarto sinu cerebri  
uentriculos petens 499 b  
processus *κρωσθῆος* 79 b  
processus secundæ uertebræ dens  
appellatus 77 b  
processus mammillaris. 38 b. *μυατα*  
*δις*, scriptorio stylo similis. 79 a  
*αυαθῆς*, *συλῆς* *ἡς*, *βελωνῆος*, ibid.  
item, temporis ossis,  
portionem iugalis ossis con-  
stituens. 39 a. uertebrarū 9 b  
processus ossium ib. b  
processus, quæ Galenus ex abuns-  
danti lumborum uertebris af-  
scribit 96 b  
processus superioris seu summi  
humcri diligēs descriptio. 122 a  
processus à peritonæo enati. 592 a  
processus appendicibus donati a.  
lij, alij non 10 a (rati. 42 a  
processus gallorum cristæ compa-  
processus transuerſi colli uertebra-  
rum in animalibus quales. 92 b  
processus transuerſi primæ uerte-  
bræ 78 b  
processus transuerſi uertebrarum  
superiorum thoracis nouē. 92 a  
processus uespertilionū alis con-  
parati 41 b. 206 b  
processuum ascendentium & de-  
scendentium natura 81 b  
processuum differentia 10 a  
processuum femoris, maxillæ, &  
aliorum delineatio 62 a. 7 a  
processuum numerus 82 b  
processuum, qui aut olfactus or-  
ganum sunt, aut ipsi præcipuè  
subministrant, ortus 516 b  
processuum secundæ uertebræ den-  
tem appellari 77 b  
processuum transuerſorū eueruicis  
uertebrarum natura 81 a

# I N D E X.

processuum transuerſorū colli uer-  
tebrarum ductus 92 a  
processuum transuerſorum fora-  
men 81 a  
processuum usus 10 b  
*περὶ κνήμιν* 208 b  
promanens ibid. a  
*περὶ μετωπιδίων* 282 a  
propagines à 1 & 2 sinibus duræ  
mēbranæ enatæ. 498 b. à tertio.  
ibid. à quarto 499 a  
proræ os 206 b  
prioræ futuræ ibid. a  
*περὶ οὐκλήμιατα λαπιδόσῃ* 33 b  
prosperi Marcelli obitus 628 a  
*ἡ ἀνωστή* corpus 790 a  
*ἡ ἀνωστή* cerebri substantia cur ita  
uocata 784 a  
*ἡ βία* musculi 355 b  
*ἡ βία* uertebræ 207 b  
*πύρις* 177 b. 208 b  
*πύρις* processus 41 b. 206 b  
pubis os 155 b. 208 a  
pubis os eur maximo foramine  
peruium, & dein ipsius sinus &  
tubera 160 a  
pubis os in uiris, cur teres cras-  
sumq; sit ibid. b  
pubis ossis foramen cur *εὐποδῆς*  
uocatum 160 a  
pubis ossis historia 159 b  
pubis ossa qui dirimenda 693 a  
pubis ossium anterior sedes cur  
suaſpera 160 b  
pubis ossa an usquā puellis nuper  
natis diſiungantur, facilius par-  
tus gratia ibid. a  
pubis ossa mulierib. in partu nō  
non recludi 159 b  
pubis ossa qui dirimenda 693 a  
pubis ossium pars superior, quæ  
inuicem committuntur, cur ex-  
asperetur 160 b  
pudibundum os 208 a  
puellarum duarum non uulgari-  
ternobilium historia 658 b  
puellis cur uteri fundus multo  
minor quàm prægnantibus, &  
qui iam diu coierūt, uel aliquā-  
do uterum gesserunt 656 a  
puerorum dentes quales 58 b  
pueris quomodo dentes eruendi.  
58 b  
pueros domi sedulo diſſecandi ra-  
tionē ueteres olim docuisse. 8 a  
pulmo cur instar pſiptuarij cor-  
di circumponatur 743 a  
pulmo in quot lobos seu fibras di-  
uidatur 724 b  
pulmonis anterioris sedis deli-  
neatio. 707 b item postero-  
ris ibid.  
pulmonis causa hominē collo do-  
nari 77 a  
pulmonis cordi inuoluti deline-  
atio 700 b  
pulmonis superficies qualis, itē  
connexus. 725 a. substantia, ua-  
sa, tunica, nerui ibid. b

pulmonis examen 745 a  
pulmonis fibrarū seu lobarū deli-  
neatio 701 a. & 707 b  
pulmonis lobum in homine nullū  
cauæ caudicem suffulcire. 724 a  
pulmonis uasorum ratio 725 a  
pulmone carentia animalia etiam  
dextro cordis uentriculo care-  
re 743 b  
pulmonis dilatatio quid 718 a  
pulmonis examen 752 a  
pulmonis forma 723 b  
pulmonis flaccidi forma 724 b  
pulmonis in homine nullum lobū  
cauæ caudicem suffulcire. 724 b  
pulmonis inflatio 750 b  
pulmonis motuū examen 823 b  
pulmonis situs, numerus 723 a  
pulmonis usus, & constructionis  
ipsius ratio 726 a  
pulmonem thoracis sequi figurā,  
non thoracem pulmonis 11 a  
pulmonū gratia homini colli da-  
pulsuum autor cor. 742 a (tū. 77 a  
pupilla 803 b  
puppis capitis os 206 b  
puppis sutura ibid. a  
*πύρις* 207 b  
*πύρις* 792 a  
*πύρις* 596 b  
*πύρις* & *πύρις* processus. 79 b  
pyxis os 206 b

## Q

**Q**uadratum os cuiusmo-  
di 208 b  
quadrupedum cum ho-  
minis cruribus ac pe-  
dibus similitudo 175 b  
quadrupli dentes 207 a  
quaterij dentes ibid.  
quatrio tali tuber eur dicat 176 b

## R

**R**abino saccosos cecos  
que amplū illud coli  
intestini initium, fac-  
cū, uel ut ipsi loquū-  
tur, orbum & monoculum neu-  
tquam esse, turpiss. contende-  
re 610 b  
Radius 135 a. 207 b  
radius, cur motu laterali destitu-  
tus 16 a  
radij ad humerū articulatio 136 a  
radij ad ulnam articulatio 138 a  
radij cū ulna & humero motus. 16 a  
radij duo 183 b  
radij & brachialis externa sedes  
qualis 140 a  
radij & brachialis externa sedi-  
eum multi & uarij sinus inſcul-  
pti 140 b  
radij inferioris historia 138 b  
radij nomina 207 b  
radij obliquitas 137 b  
radij per ipsius longitudinem le-  
uitas & asperitas 138 b  
radij sinus deducendis locandisq;  
musculis, & ipsorum tendini-  
bus apti 140 a  
radius

# I N D E X.

radium ab ulna in hominibus & animalibus brutis multum distare 138 a  
radium brachiali necessentia ligamenta ibid.  
radium cum humero necessentia ligamenta 387 a  
radium in pronom ac supinum con-stituentium musculorum descriptio 380 a. primus ibid. secundus & tertius ibid. b. quartus 381 a. administratio. 151 b  
radium pronom & supinum constituentium musculorum delineatio: primi 231 a. secundi 229 a. tertij 231 a. quarti 247 a  
radium mouentium musculorum administratio 391 a  
raia piscis 268 a  
ramicos molles, quos carnosos uulgos appellat, ex omenti prolapsu incrementoq; potissimum progigni 603 b  
rascha 208 a  
raseta 208 b  
raseta pedis 208 b  
raseta ossa 208 a  
rasga 208 b  
rationis ossa 206 b  
rationis sedes cerebrum 741 a  
rectum intestinum 611 b  
rectum intestinum attollētib; musculis nullus opponitur 396 b  
rectum intestinum quod, & cuiusmodi 612 a  
recti intestini à colo differentia. ibid.  
recti intestini tunica ac fibræ, uenæ & arteriæ, & nerui ibid.  
recti intestini situs ratio 397 a  
recti intestini musculorum descriptio 396 a. sedem attollentium ibid. orbicularis 397 a. administratio ibid. delineatio 396 a  
recti intestini musculi 612 b  
recti intestini musculorum examen 694 a  
recrementum duplex in iecoris sanguificatione 622 a  
renis canini & caprini ad humanum differentia 633 a  
renum arteriæ 491 a  
renū cur alter altero elatior 631 a  
renum fabrica negligētius ab Anatomom prosectoribus expensa 632 b  
renum forma 631 b  
renum in internis sedibus cōformatio 632 a  
renum magnitudo, substantia. 631 b  
renum minus 634 a  
renū numerus, situs, & usus. 630 b  
renum sinus cuiusmodi 533 a. b. de Renum sinibus falsa quorundam persuasio 632 b. 633 a. b  
renum sitū esse plerumq; uariū. 473 b

renum tunica ac nerui 634 b  
renum tunicarum, totiusq; adeo eorundē fabricæ examen. 690 b  
renum uertebrae 207 b  
renib; oblatæ uenæ & arteriæ. 632 a  
respiratio naturalis quomodo fit at 708 b  
respiratio non naturalis uulgò quæ uocetur ibid.  
respirationis & pulsus idem usus 709 a  
respirationē hominī cur summus rerum Opifex cōcesserit 341 b  
rete & reticulum 606 a  
reticularem plexum sub cerebro, uti Galenus illū describit, nulum esse 796 b  
retorta 284 b  
retorta uelut futura 341 b  
retorta tunica 206 a  
retorta 803 b  
retorta 71 b. 207 a  
retorta 18 b  
retorta 207 b  
retorta 803 b  
retorta 207 a  
risus autor cur lien uulgò dicatur 630 b  
rostrum porcinum 207 b  
rotator processus 208 b  
rotatores femoris processus 10 a.  
45 a  
rotula genu 208 b

## S

Acromos, *σκιλον* 207 b  
sacri nomine cur potius etallium, mare, famem, &c. uocent. 99 b  
sacrum seu amplum os quid. ibid.  
sacri ossis anterior sedes cuiusmodi 101 b  
sacri ossis appellatio 106 b  
sacri ossis constitutio 72 b. 74 a.  
descriptio 100 a  
sacri ossis & coccygis figuræ 98 a. 99 a  
sacri ossis, & ipsi adnexorum ligamenta 429 a  
sacri ossis foramina neruis emittendis parata 102 a  
sacri ossis latera cuiusmodi 101 a.  
item superior & inferior sedes cuiusmodi ibid.  
sacri ossis lateribus cōmissa ossa, in pueris tribus ossibus formari 19 a  
sacri ossis lateribus ossa cōmissa, inuicē in pube coalescere. ibid.  
sacri ossis ossium inter se connexus 100 a  
sacri ossis posterior sedes cuiusmodi 101 b  
sacri ossis posterior sedes cur insigniter aspera sit, ac uelut cariosa ibid.  
sacri ossis sex ossa 188 b  
sacri ossis spinas omnes deorfum spectare 101 b  
sacro osse quinq; ossibus tantum

extructo, quid eueniat 102 b  
sacrum os & coccygis quomodo Galenus descripsit 103 a  
*σκιλον* 606 a  
sagittale os 206 b  
sagittalis futura 206 a  
sagittalis futuræ nomina ibid.  
sanguificationis in iecore modus ac ratio 590 a. 622 a  
sanguinis in iecore generatio cuiusmodi 590 a  
sanguificationis organum primum iecur 622 b  
sanguineus cordis uentriculus dexter cur appellatus 743 a  
*σκαρπιον* 206 a  
*σκαρπιον* os 178 b. 208 b  
scapula 207 b  
scapulæ angulitres, ac laterū eius plenior descriptio 120 a  
scapulæ anterior, seu costis proxima sedes 121 b  
scapulæ basis 119 b  
scapulæ basis appendices ibid.  
scapulæ basis cartilago ibid.  
scapulæ utriusq; basis cartilago. 189 b  
scapulæ basis quæ appendicibus decoratur, substantia 124 b  
scapulæ caput 207 b. ceruix 120 a. b  
scapulæ ceruicis longitudo 120 b  
scapulæ forma triangularis 119 b  
scapulæ interioris & inferioris processus nomina 207 b  
scapulæ nomina ibid.  
scapulæ oculus ibid.  
scapulæ posterior sedes, seu dorsum 122 a  
scapulæ spina ibid. b. & 207 b  
scapulæ sinus cur non admodum celeretur: nec eius longitudo & amplitudo, humeri capitis longitudini & amplitudini respōdeat 120 b  
scapulæ superior processus, qui summus humerus dicitur, quibus tantum animalibus obtingit 124 a  
scapulæ superioris inferiorisq; laterum differentia 120 a  
scapulam in hominibus, & quæ clauiculis donantur animalibus, ligamentorum auxilio clauiculae contextæ 119 a  
scapulæ duæ 188 b  
scapularum quatuor figuræ 117 b. usq; descriptio ibid. item situs & nexus 119 a. earundem uariis usus ibid.  
*σκιλον* Galeno quid dicatur 208 b  
*σκιλον* oculi tunica 804 b  
*σκιλον* cerebri processus. 792 a  
scoptula 207 b  
scoptulorum opertum ibid.  
scriptorio stylo similis processus. 38 b  
scrotum siue scortum quid 640 a  
scutiforme os 208 b

Ec scutiforme.

# I N D E X.

scutiformis cartilago	186 a	sefamina ossicula in singulis manib.	sinus quibus occipitis os inartacula
scutiformem cartilagineam, in u-		bus ut minimum duodecim oc-	tur
ris pregestim, geminam obserua-		curre	78 a
ri	ibid. a	189 a	sinus seu acetabula in ossibus quæ
scutum	207 b	sefamina ossicula cuiusmodi sint	12 b
scutum cordis ibid. b. pectoris. ib.		152 b. quot in manu occurrant	sinus uertebrae impares
sectionis inter cutem & carnosam		153 a. quot in pede obseruentur.	83 a
membranam discrimen, & dein		ibid.	sinuum in ossibus usus
inter carnosam & subditi illi		sefaminis ossibus in tendinibus. digitos	13 a. ac
musculos	281 b	pedis & manus extendentibus	differentia
sectionis ordinem pro cadauerum		respondentium sediti examē	sinuum medullam continentes ap-
opportunitate esse uariā	652 b	6. septimi & 8. pedis mouentium	pendices, non esse opercula
secunda, seu secundina quid		435 a. decimifexti digitos mouē	8 b
sedes caluarie, lapidosa dicta.	206 b	tium	207 a
sedes, cui femur ad tibiam articula-		σινδγον	σφρονιστης dentes
tur	163 a	σινδγον	207 a
sedes inferior	207 b	σινδγον	σφρονιστης processus
semen muliebri cur sit humidius		σινδγον	121 a
atq; frigidius uirili	662 a	σινδγον	207 a
seminis inuoluntario fluxu labo-		σινδγον	207 b
rantes, qua fede ulceribus potissi-		σινδγον	207 b
mum infestentur	649 b	σινδγον	207 b
seminales arteriæ	491 a	σινδγον	207 b
seminales arteriæ qui in ortu obser-		σινδγον	207 b
uandæ	690 b	σινδγον	207 b
seminarium dextram uenam a de-		σινδγον	207 b
xtri tenis uena, sinistram ex ca-		σινδγον	207 b
uæ caudice nequaquam enasci		σινδγον	207 b
642 a		σινδγον	207 b
seminarium uasorum in muliere e-		σινδγον	207 b
xamen	695 a	σινδγον	207 b
seminarium uenarum in uiris & mu-		σινδγον	207 b
lieribus series	474 a	σινδγον	207 b
seminaria uasa mulieribus cuiusmo-		σινδγον	207 b
di	659 a	σινδγον	207 b
senam	206 a	σινδγον	207 b
senasem	207 a	σινδγον	207 b
senes cur minus dorsum mouentes		σινδγον	207 b
& extēdētes, adeo in eorum uertu	84 a	σινδγον	207 b
senum caluarie futuris destitutæ		σινδγον	207 b
33 a		σινδγον	207 b
sensus communis os	206 b	σινδγον	207 b
sensus ac sapientiæ & intellectus		σινδγον	207 b
dentes	207 a	σινδγον	207 b
sensus organa, cur mollioribus ner-		σινδγον	207 b
uis opus habeant: reliqua uerò,		σινδγον	207 b
quæ moueri necessum est, durio-		σινδγον	207 b
ribus	509 b	σινδγον	207 b
sensum seruato motu perire, & con-		σινδγον	207 b
trā	546 b	σινδγον	207 b
septum, eiusq; foramē, nō esse ob-		σινδγον	207 b
staculo, quo minus cibus ē uen-		σινδγον	207 b
triculo superiora reperta	595 a	σινδγον	207 b
septum transuersum, seu musculus		σινδγον	207 b
utriq; lateri communis	346 b	σινδγον	207 b
septi transuersi figura qualis	263 a	σινδγον	207 b
septi transuersi foramina	347 a	σινδγον	207 b
septi foramina Galenus ex Hippo-		σινδγον	207 b
cratis sententia duo, Vesalius		σινδγον	207 b
autem tria statuit	347 b	σινδγον	207 b
septi transuersi functionis examen		σινδγον	207 b
823 b		σινδγον	207 b
septi transuersi munus	348 a	σινδγον	207 b
septolini dentes	207 a	σινδγον	207 b
serra	202 b	σινδγον	207 b
serrata compago	18 b	σινδγον	207 b
σημαντικῶν ossicula	208 b	σινδγον	207 b
sefaminis ossicula cuiusmodi adnu-		σινδγον	207 b
merari possunt	153 b	σινδγον	207 b



cetur *ibid.* b  
 stomachi examen *752 a*  
 stomachi anterior facies *568 b.*  
 posterior facies *569 a*  
 stomachi fibræ cur duplices so-  
 lum *594 a*  
 stomachi situs & incessus *ibid.* b  
 stomachi obliquus ductus, cur  
 nervis etiam accommodus sit,  
*595 a*  
 stomachi oris clypeus *207 b*  
 stomachi substantia, forma & tu-  
 nica *594 a*  
 stomacho cur glândulæ crebræ ad-  
 nare *595 a*  
 stomachum non eodem cum arte-  
 ria magna uti foramine septi.  
*594 b*  
 stomachum nō esse angustiore,  
 quā utriculo continetur,  
 quā in ceruice *595 a*  
 styli *202 a*  
 subventris processus *38 b. 136 b. 206 b.*  
 supercilia *13 b*  
 supercilia in coxendicis ossis si-  
 nu cur altissima, & maximè p-  
 minentia conspiciantur *ibid.*  
 sura quid *167 b. 208 b.*  
 sura tibix venter *ibid.*  
 suis utrix asseri alligata sectio.  
*822 b*  
 sues & boues lienem magis albi-  
 cantem habere, homines uerò  
 nigricantē, canes deniq; splēdi-  
 dius ipso iecore rubentē *627 a*  
 summi humerus *207 b*  
 summi humeri appellatio *122 b.*  
*124 a.* & usus *ibid.* 126 b  
 suram cōstituentes musculorum  
 uentrices *410 a*  
 suspensi cuiusdam Patavij histo-  
 ria *644 b*  
 futura *18 b*  
 futura coronalis *32 a. 206 a.*  
 lambdoides, &c. *ibid.*  
 futura cuneiforme os circumscri-  
 bens, quibus sedibus occurat.  
*35 b.* eiusdem interualum.  
*ibid.* & 36 a  
 futura frontis & maxillæ homi-  
 nes desitui *53 a*  
 futura, frontis os à maxillæ ossib.  
 stirimens *36 a*  
 futura omentum anterioris uen-  
 triculi fundo cōmittens *557 b*  
 futura insar teli, ueru, aut uirgæ,  
 secundū capitis longitudinem  
 proprepens *206 a*  
 futura obelica *32 b*  
 futura capitis figura *25 b*  
 futura interuallū cuneiformi &  
 frontis ossi commune *35 b*  
 futura nomina *206 a*  
 futura non naturalium capitis fi-  
 gurarum *33 a*  
 futuram frontis & maxillæ in ca-  
 nibus caudatisq; simijs manife-  
 stissimam esse *55 a*

futuram inter dentium præsepio.  
 la in canibus aut simijs ductā,  
 à superciliorū medio deorsum  
 cōtinuo progressu minimè fer-  
 ri *ibid.* b  
 futura capitis ossib. & alijs com-  
 munes *34 b*  
 futura à imitantis additamenta,  
*ibid.*  
 futura oclauum capitis os circū-  
 scribentes *ibid.*  
 futura *ῥαφαῖ* *206 a.* eorumq;  
 nomina *ibid.*  
 futurarū capitis delineatio *29 a.*  
*30 a. b.* ratio *14 b*  
 futurarum coitus qualis *18 b*  
 futurarum squamæformium no-  
 mina *206 b*  
 futurarum uoce plerorū etiā har-  
 monias completi *19 a. 33 b*  
 futurarum usus *32 a*  
 futuris capita quædā desitui *33 a*  
 futuras capitis etiā in interna cal-  
 uariæ sede conspici *ibid.* b  
 futuras & harmonias nullius cor-  
 poris interuentu cōmitti *19 b*  
*συνφυσις* *ibid.* a  
*συνάρθρωσις* *15 a. 20 b*  
 synarthrosis motus qualis *20 b*  
 synarthroseos uocem quomodo  
 Galenus acceperit *ibid.*  
*συνκρίσις* *19 b*  
 synchipsis ossa *206 b*  
*συνδιήρησις* *19 b*  
*συνπάρησις* *ibid.*  
 syphones *202 a*  
*συνεργήσασα* *72 a*  
*συνζυγωμένη* *206 b*

T



Tactus cur toto cor-  
 pore aequaliter fu-  
 sus *22 b*  
 tactus instrumentum.  
*807 a*  
 talus, *ἄστρογαλόν*, & *ἄστρον* *206 b.*  
*208 b.*  
 talus appendice caret *11 b*  
 tali ad calcem contextus *177 a*  
 tali ceruix *7 b*  
 tali cum calce commissurarum si-  
 nus *177 a*  
 tali cum osse cymbam referēte ar-  
 ticulus *ibid.*  
 tali delineatio *6 a. 7 b*  
 tali hominis tuber cur *πτεροφυρ-  
 uocetur* *176 b*  
 tali hominis situs, ac ipsius cum ti-  
 bix osse & fibula articulatio-  
 nis ratio *ibid.* a  
 tali nomina *208 b*  
 tali posterioris sinus, quibus ten-  
 dines deducit *177 a*  
 tali sinus, quibus à tibix osse & fi-  
 bula ligamenta assumit *176 b*  
 talum ante sectionem tactui non  
 occurrere *170 a*  
 talum falsò appellari à quibusdā  
 exteriorem malleolum *ibid.*  
 tali duo *189 a*

tarsus *179 a. 208 b*  
 tarsi descriptio *179 a*  
 tarsus cur non sit mollis, perinde  
 ac reliqua palpebra *284 a*  
 tarsi ad brachialis constructione  
 proportio *179 a*  
 tarsi nomine quid Græci intelli-  
 gant *ibid.*  
 tarsi nomina *208 b*  
 tarsi ossa in utroq; pede quatuor,  
*189 a*  
 tarsi tria ossa interiora *179 b*  
 tarsi ossium formam & quantita-  
 tem uariam esse *ibid.*  
 tarsi ossium struem, Latini plan-  
 tam minus propriè appellarūt,  
*ibid.* a  
 tarsi quantum & extimū os. *ibid.* b  
*τάρσος* appellatio *182 b*  
 temporalis & masseteris examen.  
*753 b*  
 temporalis musculi administra-  
 tio *296 b*  
 temporales plagæ cur soporiferæ  
 Hippocrati dictæ *43 a*  
 temporales futura *206 b*  
 temporalium musculorum læsio,  
 ne quæ mala inducantur *42 b*  
 temporalibus musculis quomo-  
 do Natura prospexit *ibid.*  
 temporis ossis cavitatis *38 b*  
 temporis ossis processus, iugalis  
 ossis portionē constituens *39 a.*  
 processus styli acus ue ima-  
 ginem referētis nomina *206 b.*  
 processus uberis papillam re-  
 ferentis nomina *ibid.*  
 temporum musculi malè affecti,  
 quas noxas inferant *42 b*  
 temporum ossa *206 b.* eorumq;  
 circumscriptio *38 b*  
 temporum ossa qualia esse oport-  
 tuerit *34 a*  
 temporum ossium anse *206 b.*  
 & nomina *ibid.*  
 tendo latecens, cutiplantæ sub-  
 natus *416 b*  
 tendinem capite musculi cur nō  
 nulli crassiorē esse dicant *263 b*  
 tendinem ligamento, non autem  
 neruore spondere *ibid.* a  
 tendines & enervationes quādo  
 musculis dentur *265 a*  
 tendines, quibus uermiformes  
 processus continentur *793 a*  
 tendines uermiformium proces-  
 sum apud Galenū nihil aliud  
 esse, nisi tenuis membrane por-  
 tiones *ibid.*  
 tendinum digitorū insertiones.  
*376 b*  
 tenon uertebra *207 a*  
 tenuis membrana in cerebri reuo-  
 lutionibus auulsio *809 a*  
 tenuis membranae detectio *808 b*  
 tergum *207 a*  
 testiculorū malum granatū  
 testis caput quid Galeno *641 b*  
 testis inuolucrū intimum cuius-  
 modi *Ec 2*

- modi 640 b  
testis musculus exteriori ipsius  
in uolucro innatus ibid.  
testis neruulus 642 b  
testis tunica exterioris apertio,  
uasorumq; seminaliū detectio.  
692 b  
testem interdum unum tantum,  
interdum tres in homine repe-  
riri 639 b  
testem sinistram petentium uaso-  
rum examen 691 b  
testes ouerū nomen, & præcipue  
ab Arabibus, inuenisse 639 b  
testes mulierum cuiusmodi 657 b  
testes muliebres, uirorum multo  
minores esse 658 a  
testium constructio ad iecur  
collatio 545 b  
testium muliebrium situs delinea-  
tio 580 a  
testium in mulieribus musculo-  
rum descriptio 340 b. & ad-  
ministratio 341 b  
testium cum suis musculis deli-  
neatio 577 a  
testium singulorum priuata inuo-  
lucra 640 a  
testium substantiæ insertæ uenue-  
læ 639 b  
testium uasa duplicia cuiusmodi.  
638 b  
testium & uasorum seminalium  
examen 692 b  
testium uene cuiusmodi, earumq;  
ortus 641 b. & cum arteria  
connexus 642 b  
testium in uiris musculorum de-  
scriptio 340 a. eorum usus.  
ibid. administratio 341 a  
testium uirilium ratio 638 b  
testium muliebrium & uasorum  
seminalium ratio 662 a  
testium muliebrium forma 658 a.  
& in uolucra ibid. b  
testium muliebrium sinus, & in il-  
lis contentus humor ibid. a  
testium & natium cerebri examē.  
811 a  
testium & natium cerebri nume-  
rus, situs, substantia, forma, u-  
sus 791 a. b  
testium & penis a suis in uolucris  
detectio 691 b  
testium in uolucra utriusq; testibus  
communio 639 b. priuata  
utriusq; 640 a  
testium musculorum administratio  
341 a  
testium partium constructionis ra-  
tio 645 b  
testium situs ac numerus 639 b.  
forma & substantia ibid.  
testium substantia an seminis fa-  
cultate sibi ingenta sit procrea-  
trix 692 a  
testium situs examen 645 b  
testibus sanguinē ac spiritum de-  
ferentium uasorum numerus
- & ortus 641 b  
testudinis camerae ue in modum  
formatum corpus quid 789 b.  
eiusdem situs, substantia, nexus,  
inferior sedes ibid. superior  
sedes & usus 790 a  
testudinis modo efformati corpo-  
ris examen 809 b  
testudinis tali tuber cur uoceſ. 176 b  
tharuca 208 b  
Thersitæ caput q̄os̄ cur 21 b  
thorax quid 110 a. 207 b  
thorax cur tot ossibus cōstet 110 b  
thoracis clypeus & scutum 207 b  
in Thoracis fabrica rerum Opifi-  
cem ad quatuor potissimū sco-  
pos attendere oportuit 110 a  
thoracis figura oualis ibid.  
thoracis figuræ sequi pulmonem,  
non thoracem pulmonis ibid.  
thoracis ligamenta 352 a. eo-  
rumq; administratio ibid. b  
thoracis motus causa 110 b  
thoracis motum iure arbitrarium  
esse 341 b  
thoracis nomine quæ significen-  
tur 730 a  
thoracis ossi necessitatem testu-  
dines pulcherrimē edocēt 110 b  
thoracis ossa ibid. a  
thoracis ossium uariæ figuræ 107  
b. 108 a. b. 109 a  
thoracis prima uerebra cum 11 &  
12 quid habeat proprium 89 b  
thoracis situm cur clatiorem esse  
quàm stomachi oportuerit. 593 b  
thoracis uerbræ x 11 188 b. 207 b  
thoracis uerbrarum corpora q̄-  
modo inter se discrepent 89 a  
thoracis uerbrarū corporibus  
quid commune ibid. b  
thoracis uerbrarū corporibus  
etiam substantiæ ratione quan-  
dam accedere differentiā 90 a  
thoracis motum an musculi bra-  
chium aut scapulam mouentes  
adiuuent 349 b  
thoracis motorum musculorū de-  
scriptio 341 b. primus in alte-  
ro latere thoracem mouentiū.  
342 a. secundus ibid. tertius  
canum thoracem mouentiū,  
quo homines destituunt 343 a.  
item tertius hominis, qui canū  
& simiarum quartus est. ibid.  
quartus hominis, simiarū sex-  
tus 344 a. quintus hominis,  
simiarū septimus ibid. b. itē  
quintus canum, quo humanus  
thorax destituit 343 b. sextus  
hominis, simiarū octauus 344 b  
thoracis musculi intercostales.  
345 a  
thoracis musculis septum quoq;  
adnumeratur, & eius traditio  
tota 346 b  
thoracis uerbrarū foramina 83 b  
thoracis uerbrarū figuræ 87 b.  
88 a. item, quot numero ple-
- runq; 89 a. 93 a  
thoracis uerbrarū processum  
numerus 94 b  
thoracis uerbræ transuersi pro-  
cessus cuiusmodi 90 a  
thoraci cur musculi interponan-  
tur 110 b  
thoracem mouentium musculo-  
rum administratio 350 a. eo-  
rundē delineatio: primi 225 b.  
secundi 211 b. tertij 240 a.  
quarti ibid. b. quinti ibid.  
sexti 235 a. intercostalium mu-  
sculorum delineatio 227 a  
thoracem mouentium musculo-  
rū numerus ac necessitas 342 a  
thoracē, ut Aristoteles dixit, non  
esse uniuersum corporis trun-  
cum, quem à iugulo ad pubem  
usq; metimur 110 a  
thoracem mouentes musculi ne-  
cessariō ad thoracis dilatatio-  
nem & cōpressionem facti, &  
eorundem ratio 342 a  
thoracem mouentium musculo-  
rum enumeratio, & quando il-  
lis uoſungantur munere 349 b  
thoracem mouentium musculo-  
rum numerus uniuersus ibid.  
& quando singuli functionem  
obeant ibid.  
thoracē mouentium musculorum  
sex, non intercostaliū functio.  
342 a. primi, secundi, tertij. ibid.  
quarti 344 a. quinti, sexti. ib. b
- duplex 464 b  
dygordis cartilago 186 a  
tibia 167 b. 208 b  
tibiæ appendix 170 a  
tibiæ motus quot 399 b  
tibiæ os 167 b  
tibiæ os cur spina appellatū 171 a  
tibiæ os quid Vesaliō propriē uo-  
cetur 167 b  
tibiæ os quomodo femori articu-  
letur 168 b  
tibiæ ossis & fibulæ appendices.  
ibid. a  
tibiæ ossis secundum ipsius longi-  
tudinē figura 171 a  
tibiæ ossis sinus & tubera, quibus  
talo articulantur 169 b  
tibiæ ossium figuræ 165 a. 166 a  
tibiæ uenter, sura 167 b  
tibiā mouentium musculorum  
administratio 406 b. primi 407  
a. secundi ibid. tertij, quartij,  
quinti, sexti ibid. b. septimi &  
octauij 408 a. noni 407 b. Eo-  
rundē delineatio: primi 219 b.  
secundi 203 a. tertij 239 b. quartij  
& quinti ibid. a. sexti 219 b. se-  
ptimi 229 a. octauij. ib. noni 223 a  
tibiā mouentium musculorum  
descriptio 398 b. primus 400 a.  
secundus ibid. b. tertius 401 a.  
quartus ibid. b. quintus 402 b.  
quintus iuxta Galeni sententiā.  
403 a. iuxta ueritatem ibid.  
sextus

sextus 404 a. septimus & octa-  
uus 405 a. nonus 406 a  
de Tibiā mouētibus musculis Ga-  
lisenſiſentia uaria 403 b. 404 a  
ribiarum ossa duo 189 a  
tintinnabulum pro gargareone.  
722 b  
τοὶ δὲ dentes 207 a  
τῷ ὅ· unde 507 b  
tonſillæ, earumq̃ uſus 595 a  
tonſillæ faucium quæ 721 b  
tonſillarum examen 754 a  
torcular 763 b  
torcular cerebri quid 500 a  
trachametra maior 208 b  
τροχὸς 12 a. 207 a  
τροχὸς ὡς processus 738 a  
τροχῶς, id eſt pilaris morbus ma-  
millarū, cur parum rectè ab A.  
riſtocele ſit aſſignata 677 b  
τροχὸς ὡς 208 b  
τροχὸς ὡς femoris ꝑceſſus 163 b  
tubercula illa, quæ ſubſtaua, & di-  
miſidia piſc ſimilia ſunt, in mu-  
liebri aut aſina utero nulla re-  
periri, ſed in uaccino, & alijs  
quibuſdam animalibus 670 a  
tunica cilijs & palpebrarum pilis  
comparata 804 b  
tunica coſtae ſuccingens quid 709  
b. eiufdem nomen, ſicus, ma-  
gnitudo, figura ibid. ſuper-  
ſicies qualis, quiſq̃ earū ad a-  
lias partes nexus 710 a  
tunicæ ſuccingentis coſtas fora-  
mina 710 b. ſubſtantia ibid.  
tunica coſtas ſuccingens altera ue-  
teribus dicta quæ 711 a  
tunicæ coſtas ſuccingentis ſecun-  
dæ examen 733 b  
tunicæ coſtas ſuccingentis uſus,  
eiufdemq̃ coſtructionis ratio.  
711 b  
tunica oculi adherēs, albæ ue 805 b  
tunica oculi dura, à cerebri dura  
membrana eduſta 804 b  
tunicula, cepis pelliculæ modo  
pellucida, anterioriq̃ humoris  
crystalini ſedi obnata 801 b  
turdulorum gentis quosdam Ari-  
ſtoteles ſeptenis coſtis creari  
dixit 111 a  
τύλις 676 b  
τυμολογία cerebri ſubſtantia 784 a  
tymparum ossa 206 b  
τυφλόν foramen 66 a  
τυφλόν in teſtini cūſiſmodi 610 a



V Accæ prægnātis ute-  
rus cuiuſmodi 669 b  
uacini aut caprini  
uteri hiſtoria 664 b  
uarium os 208 b  
uas ſemen deferens, Herophilum  
αὐτοματινὸν ὡς appellat 644 b  
uaſis ſemen à teſte ad ueſicæ cerui-  
cem deferentis hiſtoria 643 b  
uaſis ſemen deferentis ſtructure  
ratio 646 b

uaſa & nerui, quibus perſonæ  
implicatur 592 b  
uaſorum corporis robori quomo-  
do natura proſpexerit 442 a  
uaſorum per lienis corpus ſeries.  
627 a  
uaſorum ſeminaliū circa teſtē, ac  
ipſius adeo teſtis examen 692 b  
uaſorum ſeminalium ſiniſtrum te-  
ſtem petentiū ortus examē. 691 b  
uaſorum teſti materiam deducen-  
tium ortus ratio 645 b  
uaſorum teſtibus ſanguinem ac  
ſpirītum deferētium numerus  
& ortus 641 b  
uaſorum ad teſtes ductus 642 a  
uenalis arteria cur ſit pulmoni u-  
tilis 726 b  
uenalis arteria, eiufq̃ ortus 733 b  
uenalis arteriæ corporis ratio.  
745 a  
uenalis arteriæ & magnæ arteriæ  
membranarum uſus 745 b  
uena quid 436 b. & qualiter à  
membrana corpus eius diſſe-  
rat ibid.  
uena ab umbilico iecori deducta,  
qua ſœtus nutrimentum acci-  
pit, quæq̃ poſt partū exanguis  
in uſu eſt 602 a  
uena abſq̃ conſue, & paris ex-  
pers dicta 761 a  
uena arterialis, eiufq̃ ortus 735 b  
uena axillaris 433 b  
uena axillaris diuerſa nomina à  
medicis poni 454 a  
uena axillaris & humerariæ per  
brachiū cubitumq̃ & manum  
ſeries 459 a  
uena axillaris in brachio conſi-  
ſtens ſeries 470 b  
uena axillaris in duos truncos præ-  
cipua diſtributio 471 a  
uena axillā ad euntis ortus 464 b  
uena axillaris portionis cutem  
ſubeuntis ſeries 471 b  
uenam axillam petentem, priuſ-  
quam brachiū ſubeat, aliquot  
ramos ſpargere 465 b  
uena αἰγὸς dicta 461 a  
uena per pubis oſis foramen fe-  
mur petens 476 a  
uena ſuperiora coſtarū interualla  
petens 464 b  
uenarum quæ per brachium diſtri-  
buuntur appellationes uariæ,  
453 b. axillaris & afellaris. ib.  
auris 454 a. baſilica 453 b. &  
454 a. capitis uena, & cephalica,  
& communis 453 b. corpo-  
ralis 454 a. cubiti interior &  
exterior 453 b. funis brachij,  
ibid. & 454 a. humeraria, ieco-  
raria, lienaria 453 b. & 454 a.  
media 453 b. mediana 454 a.  
nigra 453 b. obliquæ diſtæ ue-  
næ 453 b. οὐραία ibid. ocula-  
ris, ſaluaſtella & ſalubris 454 a.  
ſpatularis 453 b. ſylen 454 a

uena caua 458 a  
uena caua, eiufq̃ ortus 735 a  
uena caua quomodo arteriæ ma-  
gnæ ſupra ſacri oſis initium ſub-  
ſiſciatur, & ipſius ſeries 475 a  
uena caua ad iugulum inceſſus,  
& ipſius inibi bipartitio 464 b  
uena caua caudæ in qua iecoris  
ſede coſiſtat, ramosq̃ primū  
proferat 458 b  
uena caua quo pacto portæ com-  
mittatur, & in iecur ramos diſ-  
fundat, deſcripta 456 b  
uena caua diſtributionis deſcri-  
ptionem à iecore incipiendam  
eſſe 457 b  
uena caua exortum, & ad iecoris  
gibbum in duos truncos diſtri-  
butionē, ridiculè & nugaciter  
haſtenus à quibuſdam Anato-  
micis, literis prodita eſſe 620 b  
uena caua in iecore ſeries 458 a  
uena caua libere ab omnibus par-  
tib. & integra delineatio 450 a  
uena caua membranæ nomina.  
458 a. 737 a  
uena caua oriſicij in cor pertinentiſ  
tis uſus 743 b  
uena caua ortus apud authores  
controuerſus 453 b  
uena caua ortum è iecore eſſe im-  
becilliter à Galeno confirmatū.  
ibid. & quo pacto princeps  
uena caua partis, quæ ſupra iecur  
conſiſtit, diſtributionis ſeries.  
459 a  
uena caua partis eiuf quæ ſupra  
iecur conſiſtit, expoſita diſtri-  
butio 459 b  
uena caua partē ſeptū tranſeun-  
tem, illa quæ ſub iecore conſiſ-  
tit, non archiorem eſſe ibid.  
contra Galenum 456 b  
uena caua per collum caputq̃ ſe-  
ries 466 b  
uena caua per ſeptū tranſitus, ac  
ipſius in ſeptum rami, & in cor  
dis dextrū ſinū adaptio. 460 a  
uena caua portio expreſſa 438 a  
uena caua portio ad partes in-  
fra ſeptum tranſuerſum locatas,  
diſtributæ ſeries 473 b. ad re-  
nis inuolucrū ibid. ad renes  
ipſos ibid.  
uena caua rami, lumborū uerte-  
bris carnibusq̃ oblata 475 a  
uena caua ramos caluariam ex al-  
tera parte ſubeūtes, ſex eſſe nu-  
mero 496 a  
uena caua ſoboles in crus dige-  
ſtæ 477 a  
uena caua ſoboles quo pacto in  
iecoris ſubſtantia portæ uenæ  
propaginitibus committantur,  
quæ ratione uena caua iecoris  
eas ſoboles offerat 455 b  
uena caua ſupra os ſacrum bipar-  
titè delineatio 454 a  
uena caua totius characterū deſi-  
neationis



heatonis index 451 a  
 uena caudicis 458 a  
 uenas cerebri substantiæ non in-  
 nasci, sed ipsius membranis im-  
 plicari, membranasq; uenarum  
 modo cauari 456 b  
 uenæ communis series 472 b  
 uenæ compositionis usus 438 a  
 uenâ cōiugis experte quo pacto  
 à caua educi oportuerit 460 b  
 uena cordis basim cingens ibid.  
 uena coronalis 463 a  
 uenæ corpus in quo nam amem-  
 brana differat 436 b  
 uena crassa 433 b  
 uena crassa dicta Hippocrati 455 b  
 uenæ emulgentes cur dicat 474 a  
 uenæ cum arteria cōmixtio & im-  
 plexus 642 b (sitas 261 b  
 uenæ & arteriæ in musculo neces-  
 sitas 462 b  
 uenæ corpus in primum duræ  
 membranae sinum exhaustæ, i-  
 pliusq; sinus series 497 b  
 uenæ ac arteriæ in testis substan-  
 tia, ipsiusq; proximum inuo-  
 lucrum insertio 643 b  
 uenam cauam idem prestare ieco-  
 ri, quod magna arteria cordi,  
 nerui cerebro 773 a  
 uenę humerarię iuxta cubiti arti-  
 culum series 469 b  
 uenæ humerarię ortus, & priusq;  
 brachium subeas, sitas 467 a  
 uena iecoraria 458 a  
 uena inferiori abdominis sedi  
 exportecta 476 b  
 uena iugularis interior, eiusq; se-  
 ries 466 b, exterioris ortus at-  
 que series ibid.  
 uena iugularis interna quibulcā  
 falsō dicta 468 a  
 uena magna 449 a, 458 a  
 uenæ maioris femoris series 477 b  
 uena mediana seu media, cur com-  
 munis uocetur 471 b  
 uenam non unam, sed plures, à lie-  
 ne in superius uentriculi orifi-  
 cium perferri 600 b  
 uenę omentum implicantes 605 b  
 uenę pari carētis uaria series 461 b  
 uenæ pari carētis series expressa,  
 462 a  
 uenam pari carentem unde enasci  
 oportuerit 464 a  
 uenæ portæ descriptio 444 b, ra-  
 morū in iecoris substantia series,  
 445 a, extra iecur distributio,  
 ibid. ad bilis uescicā ibid. ad  
 uentriculū humilium orificium,  
 ibid. ad intestinū duodenum,  
 446 a. in duos præcipuos trun-  
 cos sectio 445 b. ad dextram  
 fundi sedem, & ipsi proximam  
 omenti partem ibid. trunci si-  
 nistri series 446 a. dextri cau-  
 dicis portæ trunci series 447 b.  
 distributiōis totius ratio 448 b  
 uenæ portæ integra delineatio,  
 444 a

uenæ portæ nudæ delineatio, e-  
 iusdēq; characterū index 443 a  
 uenæ portæ ppaginū series 442 a  
 uenæ quatuor in maximum nu-  
 merum redactæ 440 b  
 uenæ sub pectoris osse deorsum  
 repentes 465 a  
 uenæ tertiæ calvariam petētis se-  
 ries 500 b  
 uenæ, ē quibus falsō uirginibus  
 menstruæ purgationes mana-  
 re creduntur 476 a  
 uenæ tunica 436 b  
 uenę tunica asciticia, & non pecu-  
 liaris 438 b  
 uenæ feminales an à renium uenis  
 oriantur 642 a. earumq; du-  
 ctus ibid.  
 uenarū cerebri delineatio 494 b  
 uenarū per abdominis regionem  
 inter cutem & carnem mem-  
 branam excurrentium admini-  
 stratio 683 a  
 uenarum artieriarumq; omnium  
 integra delineatio 505 a  
 uenarū artieriarumq; simul com-  
 missarum seriem octio figuræ  
 commonstrantes ibid.  
 uenarum & artieriarum simul aut  
 citra cōsortium excurrentium  
 historia unde sit paruida 503 b  
 uenarū, artieriarū, & neruorum  
 brachij examen 825 a  
 uenarum artieriarumq; cerebri se-  
 ries 494 b  
 uenarum, artieriarū, & neruorum  
 cruris examen 817 a  
 uenarum, artieriarū & neruorum  
 per abdominis musculos repē-  
 tum administratio 683 b  
 uenarum & artieriarum in intesti-  
 nistratio 614 b. neruorum ra-  
 tio 615 a  
 uenarum, artieriarum & neruorū,  
 quibus membrana costas suc-  
 cingens cōmittitur, usus 711 b  
 uenarum & artieriarum numerus,  
 449 a  
 uenarū brachij, cubiti & manus  
 cutem perperantium uaria no-  
 mina 453 b  
 uenarum examen 819 b  
 uenarum iecoris series 620 b  
 uenarum mamillam petentium se-  
 ries 677 b  
 uenarum manus cutem implican-  
 tium uariam esse seriem 472 b  
 uenarum, quæ inter pollicem &  
 indicem, inter annularē & mi-  
 nimū habentur, ignorata se-  
 ries apud medicos. ibid. & 473 a  
 uenarum quintæ ac sextæ calua-  
 riam petentium series 500 b  
 uenarum radices quot semur pe-  
 tant 477 a  
 uenarum seriei ratio, & utri cum  
 nonnullis consortium 680 a  
 uenarū seriei crebrō uariare 473 a  
 uenarum sex caluanā ingredien-

tium descriptio 496 a. earum  
 quæ in primum duræ membra-  
 næ sinum unā cum arterijs ex-  
 hauriuntur 497 a. tertiæ ue-  
 næ series 500 a. quintæ ac  
 sextæ ibid. omnium deli-  
 neatio 494 b  
 uenarum feminalium series in ui-  
 ris 474 a. sinistra & dextra,  
 ibid. b. in mulieribus ibid.  
 uenarum uescicæ distributorum ra-  
 tio 636 a  
 uenarum uentriculū munus 600 b  
 uenarum usus 438 b  
 uenarum uteri fundi humiliorum  
 sedem & ceruicem petentium,  
 695 a  
 Veneris hortus, seu umbilicus  
 herba 669 a  
 uenter 595 b  
 uentris mappa 602 b  
 uētriculus cur yashig & lauhia Græ-  
 cis 595 b  
 uētriculus cur sit rotundus &  
 oblongus 596 a  
 uētriculus, lien, omentū & me-  
 senterium quī simul eximēda,  
 & quæ in eo opere obseruāda,  
 689 a  
 uētriculus sub thorace locatus,  
 593 b  
 uētriculi artieriarū munus 600 b  
 uētriculi capacitatis maxima 690 a  
 uētriculi capacitatis & tunica-  
 rum examen ibid.  
 uētriculi cauitatē respiciens in-  
 terior tunicæ pars cur plurib.  
 rectis fibris donetur 599 a  
 uētriculi anteriorē sedem omen-  
 to nequaquam integri 602 a  
 uētriculi exteriorē tunicam in  
 fundo non esse impenitē carno-  
 sam 599 a  
 uētriculi concoquendi facultas  
 quib. auxilijs roboretur 602 b  
 uētriculi forma 596 a. situs 595 b  
 uētriculi historia ibid.  
 uētriculi munijs quomodo sub-  
 seruiant partes ipsi acumben-  
 tes, atq; ita illius ad alias partes  
 contactus 602 a  
 uētriculi nerui 601 a. eo-  
 rumq; usus ibid. b  
 uētriculi orificia duo 596 b  
 uētriculi inferioris orificium cur  
 superiore sit actius 597 a  
 uētriculi orificiorū non par am-  
 plitudo ibid.  
 uētriculi in orificijs protuberās  
 substantia 598 a  
 uētriculi os inferius seu dextrū,  
 696 b  
 uētriculi substantia quibus tuni-  
 cis formetur 598 b  
 uētriculi superficies ibid. a  
 quantitas ibid. b  
 uētriculi superiorē partem car-  
 nosiorem esse inferiore 599 b  
 uētriculi totius munera 601 b  
 uentri-

- uentriculo interiori cur etiam ob-  
 liquæ fibræ additæ 599 a  
 uentriculi cerebri Galeno nunc me-  
 dius, nunc postremus præstator  
 dictus 789 a  
 uentriculi cerebri anteriores non  
 sunt olfactus organa, ut puta-  
 bat Galenus, & quædā alia 786 b  
 uentriculorum cerebri administratio,  
 primorum 809 b, tertij 810 a  
 quarti 811 a  
 uentriculorum cerebri delineatio  
 ubi querenda 785 b  
 uentriculorum cerebri descriptio  
 786 a. eorundemq; numerus  
 785 b. dexter & sinister. ibid. cō-  
 munis amborū concavitas, quæ  
 tertij uentriculi nomen obtinuit  
 786 b. quarti uentriculi histo-  
 ria 787 a. meatus à tertio uentri-  
 culo educit. ibid. quid singulis  
 insit uentriculis 788 a. quis sit u-  
 sus. ib. b. tres priores cerebri uen-  
 triculos tenui membrana nō suc-  
 cingi ibid.  
 uentriculorum cerebri septū. 787  
 a. eiusdem descriptio. ibid. usus.  
 ibidem  
 uentriculorum & sinuum cerebri  
 numero, animantis hominis homi-  
 nes nō movet æquare, sed etiam  
 cætera omnia cum ipsis habere  
 similia 789 a. & 773 b  
 de Ventrulis cerebri confutata re-  
 centium opinio 773 b  
 uentriculum cur natura proximè  
 ori subiunxerit 593 b  
 uentriculum pcientes uenæ & ar-  
 teriæ 599 b  
 uentriculi cerebri anteriorem par-  
 tem obtusam & rotundam esse  
 788 a  
 uentriculi tertij ipsius cerebri cum  
 meatibus examen 810 b  
 uentriculi quarti ipsius cerebri hi-  
 storia 787 b  
 uentriculi quarti cerebri examē sub  
 uentriculorum cerebri dextri & si-  
 nistri apertio 809 b  
 uentriculi dextri cordis forma 733  
 b. sinistræ forma 734 a  
 uentriculorum cordis numerus &  
 situs 733 b  
 uentriculorum cordis superficies  
 734 b  
 uentriculi dextri cordis usus 743 a  
 uentriculus cordis dexter cur fan-  
 guineus appellatus 743 a  
 uentriculus cordis sinister, cur spiri-  
 tuosus æreus uē appellatus. ibi. a  
 uentriculus cordis dexter unde fan-  
 guinem trahat, & sinister unde  
 aerem hauriat ibid. a  
 uentriculi iecoris & lienis situs e-  
 xamen 685 b  
 uentriculorum cerebri numerus  
 633 b, 785 b  
 uentriculorum dextri sinistræq; se-  
 pti historia ibid. a
- uentriculorum dextri & sinistri fe-  
 pti examen 809 b  
 uentriculorum dextri & sinistri, &  
 ualorum in ipsis consistentium  
 examen 810 a (sint 792 a  
 uermiformes processus cuiusmodi  
 uermiformium processuum exa-  
 men 811 b  
 uermiformium processuum usus  
 qui à Galeno in 8 de Visu partiū  
 traditus 792 a  
 uerpus 208 a  
 uertebræ, uertebrum 11 b  
 uertebræ nomine quid ueteres in-  
 telligi uoluerint 86 b  
 uertebræ alicuius cervicis undecim  
 processus à Galeno assignantur,  
 quibus à Vesalio adhuc duo ad-  
 iecti 82 b  
 uertebrarum appendices 92 a, 83 b  
 uertebrarum colli processus trans-  
 uersi in animalibus quales 92 b  
 uertebrarum colli processuum trās-  
 uersorum ductus ibid. a  
 uertebrarum colli undecim figuræ  
 74 b, 75 a  
 uertebrarum corpora, & quis eo-  
 rundem usus 73 b  
 uertebrarum corporibus quæ ex-  
 porrigantur examen 753 a  
 uertebrarum in pueris pluribus con-  
 stare ossibus 97 b  
 uertebrarū in senib. nexu. ibid. b  
 uertebrarum ligamenta 359 b  
 uertebræ lumborum numero quot  
 95 b  
 uertebrarum lumborum corpora  
 cuiusmodi sint ibid.  
 uertebrarum lumborum delineatio-  
 nes ibid.  
 uertebrarum lumborum uariæ fi-  
 guræ 94 b  
 uertebrarū lumborū foramina 95 b  
 uertebrarum lumborum processus  
 quales 92 b  
 uertebrarum lumborum ascenden-  
 tes processus 96 a. descendentes  
 processus ibid.  
 uertebræ lumborum quomodo mu-  
 tuò dearticulatur 93 b  
 uertebrarum lumborum spina qua-  
 lis 96 a  
 uertebrarum lumborum transversī  
 processus 95 b  
 uertebrarum nexu uariu 18 a  
 uertebrarum omnium quæ supra  
 sacrum os habentur, articulatio-  
 num, quæ istis consent process-  
 sibz, quæ sit ratio 92 b  
 uertebræ prima in suo corpore ex-  
 cauata, cur processu quodam, &  
 tuberculo anteriori sede augea-  
 tur 78 a  
 uertebræ prima spina caret ibid. b  
 uertebræ prima thoracis cum 11, &  
 12, quid habeat proprium 89 b  
 uertebræ primæ cum capite articu-  
 lationes quales 85 b  
 uertebræ primæ foramen, dorsale
- transmittens medullam 77 b  
 uertebræ primæ transversī proces-  
 sus 78 b  
 uertebram primam cum capite su-  
 pra secundam duntaxat circum-  
 agi, contra Galenum 17 a  
 uertebræ secundæ 207 b  
 uertebræ renum ibid. b  
 uertebræ secundæ processum den-  
 tem appellari 77 b  
 uertebræ secundæ dens 79 b  
 uertebrarum processus 9 b  
 uertebrarum thoracis corpora quo-  
 modo inter se discrepent 89 a  
 uertebrarum thoracis corporibus  
 etiam substantiæ ratione quan-  
 dam accedere differentiam 90 a  
 uertebrarum thoracis corporibus  
 quid commune 89 b  
 uertebrarum thoracis figuræ 87 b  
 88 a. itē, quot numero plerumq;  
 89 a, 93 a  
 uertebrarum superiorum thoracis  
 processus transversī nouem 92 a  
 uertebrarum thoracis processus  
 numerus 94 b  
 uertebris thoracis transversī proces-  
 sus cuiusmodi 90 a  
 uertebrarum thoracis spinæ 91 a  
 uertebris quibus natura motum la-  
 teralem concesserit 87 a  
 uertebram unam in dorsi medio  
 cur uiciniq; scilicet oportuerit 94 a  
 uerticis ossis nomina 206 b  
 uerticis ossa utrumq; mollia cur di-  
 ris temporum ossibus committun-  
 tur 14 b  
 uerticis ossium circumscriptio 35 b.  
 forma ibid.  
 uerticulum 11 b  
 uerticuli 207 a  
 uerticulorum ossibus susorum,  
 quæ in posteriori sede acurum  
 educunt processum, nomina.  
 ibid.  
 Vesalius in oue, quæ non ita diu u-  
 terum gesserat, quid uerē sint u-  
 teri acetabula, primum inspicit  
 669 a  
 Vesalius in uentriculo sinistro cor-  
 dis alicuius uiri nobilis, arq; do-  
 ctiss, duas glandulosæ carnis, &  
 subnigricantis, libras reperit.  
 24 b  
 Vesalius quas mulieres fecerit 663  
 Vesalij annotationes in Galeni a-  
 natomica 385 a  
 Vesalius non satis assequi posse,  
 quid sibi Gale, uelit, quod inte-  
 stinis, ipsiq; ad eō mesenterio ue-  
 nas ostendi testetur 616 b  
 uescuet 594 a  
 uesica cur membraneo neruouē  
 corpore consist 635 b  
 uesica urine receptaculum 535 a  
 uesicæ ceruix 657 b  
 uesicæ cur musculus orbiculatim  
 circumducatur 638 a  
 uesicæ forma, subtilitā ac fibræ 535 a  
 Ec 4 uesicæ

uesticæ meatus licet uirīs ac mulie-  
 ribus idem sit, uirīs tamen ad se-  
 minis quoq; ei aculationem sub  
 seruire 638 a  
 uesticæ situs 535 a  
 uesticæ tunica cur durior 635 b. &  
 636 a  
 uesticæ uenæ, arteriæ ac nerui:  
 ibid. a  
 uesticam cur sua eminentiore parte  
 oblongiorem rerū opifex extru-  
 xerit 635 b  
 uesticam ex triplici fibrarum gene-  
 re intertexam esse ibid. b  
 uesticulabilis, homines quosdā ca-  
 rere, ut Aristoteles & Plinius cū  
 alijs asserunt, Vesalius hac tenus  
 nondum comperit 625 b  
 uesticulæ bilis meatus, cur duode-  
 no infertus 624 a  
 uesticulæ bilis meatus infertionis in  
 duodenum ratio 615 a  
 uesticulæ bilis meatū in uentricu-  
 lo rarisimum esse 601 a  
 uestigium 180 a. 208 b  
 ueteres pueris domi Anatomē pro-  
 posuisse 671 b  
 ueterum plerosq; perinde ac Ga-  
 lenum, multorum animalū ana-  
 tomia cōsūsam proposuisse 42 a  
 uia cur pro gargareone 722 b  
 uia uentriculo cibū potumq; de-  
 ferentis nomina 597 b  
 uirginibus proximē nupturis, pro-  
 mulas in ceruicis orificio ca-  
 runculas, ne longius exerantur  
 atq; propendat, amputare Aeg-  
 yptios consueuisse 653 b  
 uirginum carnea membrana, infer-  
 ta collo uesticæ, interius hymen  
 & eugion appellata 654 a. cur  
 mulieribus frangatur, & abolea-  
 tur ibid.  
 uirorum capita à mulierū non mul-  
 tum uariare 32 b  
 uirīs ac mulieribus idem costarum  
 numerus 111 a  
 uirīs an mulieribus plures dentes  
 rectē assignentur 53 b  
 uirilīs membri penis uē structura  
 648 a  
 uirilīs musculi administratio 341 a  
 uirilīs testis musculus unde enatus  
 340 a  
 uiriliū testium musculi ibid.  
 uis ratiocinandi an soli homini re-  
 ctē tribuatur 789 a. & 773 b  
 uisoriū nerui num sint perforati  
 517 b  
 uisoriū neruorum à cerebro di-  
 uisio 812 a  
 uisoriū neruorum coitus cui si-  
 nui innitatur 62 b  
 uitreus humor 801 b  
 uita sectio, qua Anatomēs specula-  
 tionis in scholis colophō adhibe-  
 ri solet 822 b  
 uitalis spiritus in quibus cerebri  
 uentriculis copiosissimus habea-

tur, & quomodo in ipsis fera-  
 tur 773 a  
 uialem spiritum, animalī spiri-  
 tui materiam suppeditare, ibid. a  
 uina 135 a. 207 a  
 uinæ ad brachiale ductus, & infe-  
 rioris ipsius sedis historia 136 b  
 uing ossis nomina 208 a  
 uinæ processuum & sinus descri-  
 ptio 135 a  
 uinæ secundum ipsius longitudi-  
 nem forma, & utilitas 137 a. b  
 uinæ & radio, cur nulla foramina  
 notata digna, obtigerint 140 b  
 uing duæ 188 b  
 umbilici uasorum examen 696 b  
 umbilici uasorum præfectio 684 b  
 umbilici uena quid appelletur.  
 481 a  
 umbilici arteriarum series 482 a  
 umbilici uenæ initium unde exur-  
 gat, quæ uē sit ipsius series 481 a  
 uoluulus 608 b  
 uox qualiter fiat 718 b. 719 a  
 οὐρανός & οὐρανός meatus quid.  
 674 a  
 urinæ peculiare inter duo inuolu-  
 cra fœrus receptaculum 674 a  
 uring, sudorisq; ac inuolucrorum  
 cuiusmodi in partu egressum  
 675 a  
 urinarū initium unde pen-  
 deat 634 a  
 utinariorum meatuum ad uesticā,  
 & uasorum semen deferentium  
 ad glādosum uesticæ corpus uisq;  
 examen 663 a  
 utinariorum meatuum examen  
 695 a  
 utēdi appetitus, generationis orga-  
 nis adiectus 639 a  
 uterus qualis in non pregnantibus  
 631 b in imprægnatis qualis.  
 632 a  
 uterus muliebris & asinæ, aceta-  
 bulorum expers 670 a  
 uterus quib. partibus adnascatur,  
 & quas solum tangat 660 a in  
 quem modum à peritonæo liga-  
 tus pendeat 656 a  
 uterici uesticæ situs qui obseruan-  
 dus 695 a  
 uterici acetabula quid uerē sint, &  
 quæ primū mīta fuerint nuncu-  
 pata 669 a  
 uteri arteriæ & uenæ 659 b  
 uteri canini & suilli historia 666 a  
 uteri canis non prægnantis expres-  
 sio 585 b  
 uteri ceruix in puellari ætate cur sit  
 reliquis mollior 655 b  
 uteri ceruix quibus de causis in-  
 duretur ibid.  
 uteri ceruicis cavitās, nulli sibi neq;  
 uirginibus neq; mulierib. coitu  
 exercitatis angustior, sed eque  
 capax, quā fundo contineatur,  
 & quā in pudendum cessat,  
 655 a

uteri ceruicis internæ superficiei la-  
 terum ad inuicem nullum esse  
 in uirginibus connexum 655 a  
 uteri ceruicis ratione distensionis  
 non eadem latitudo ibid. b  
 uteri interna ceruicis superficies  
 653 b. externa 652 b  
 in Uteri ceruicis orificio prominu-  
 læ carunculae 653 b  
 uteri ceruicis ratio 661 a  
 uteri ceruicis substantiæ 657 a  
 uteri ceruicem pro mulieris libidi-  
 ne turgidiorem, angustiores &  
 directionem effici 655 b  
 uteri diuisio in fundum & ceruicē  
 651 a  
 uteri forma 652 b  
 uteri formæ ratio 661 a. item magni-  
 tudinis, substantiæ, fibrarū, su-  
 perficiei, & nexui orificij fundi.  
 ibid.  
 uteri fundus cur puellis multo mi-  
 nor, quā prægnantibus, & qui  
 tam diu coierunt, uel aliquando  
 uterum gesserunt 656 a  
 uteri fundi orificium 655 a. præ-  
 gnantium quale ibid.  
 uteri fundi orificium quoties debi-  
 scit, orbiculae, ut & ceruicis ori-  
 ficium, uel adij 655 b  
 uteri fundi orificium sita ut ceru-  
 cis orificium ex mulieris arbitra-  
 tu aperiri possit, quæ noxa inde  
 consequeretur 655 a  
 uteri fundi ceruicisq; parem in nō  
 pregnantibus longitudinem sta-  
 tuere, absurdissimum esse 656 a  
 uteri fundus cur leui opera deor-  
 sum ac sursum agi possit 651 b  
 uteri fundi sinus 653 a. cuiusmodi  
 ibid.  
 uteri fundi substantia 656 b  
 uteri fundi tunica ubi sit crassissi-  
 ma 657 a  
 uteri fundi interior tunica ibid.  
 uteri muliebris magnitudo 655  
 b. item à corpore exempti, figu-  
 ra 584 a  
 uteri nerui 660 a  
 uteri officium, ipsiusq; conforma-  
 tionis ratio 660 b. situs ratio. ib.  
 uteri officium in coitu non semper  
 aperiri, neque penem eo excipi,  
 655 b  
 uteri os, num secundum Hippocra-  
 tis sententiam, omento in admo-  
 dum obesus ita comprimi pos-  
 sit, ut conceptum impediatur 603 a  
 652 b  
 uteri os prægnantibus quale 655 a  
 uteri os quibus de causis aperiatu-  
 r. ibid. b  
 uteri situs, & cum accumbentibus  
 ipsi partibus contactus 651 b  
 uteri ipsius scrobes, & uesticæ col-  
 li in illum inferio 653 b  
 uteri duarum tunicarum exterior  
 unde principium ducat 656 b  
 uteri unā cum illum peritonæo  
 alligantibus



# I N D E X.

alligantibus membranīs à cor-  
pore exsecit, delineatio 583 a  
utero, leuius gerendo, & facilius e-  
tiam pariendo, quomodo natu-  
ra prospexit 160 a  
uterum ad generationis appetitū,  
ad penis summum tanquam ani-  
mal quoddam, ex Platonis sen-  
tentia, hiare 656 a  
uterum humanum nunquam spe-  
ctasse, Galenum, nedum disse-  
cuisse, quibus rationibus proba-  
ri possit 664 b. & 665 a. b.  
& 666 b. 667 a  
uterorum atq; inuolucrorum ani-  
malium magnam esse differen-  
tiam 589 a (722 b  
uua seu σαφυλῆ cur pro gargareone  
uuea tunica à tenui cerebri mem-

brana parata 803 a  
uueę tunica; colores 804 a  
V V O L F G A N G I H E R-  
V V O R T patricij Augustini  
laus 46 a



X  
ιφοεδῆς in pectore lo-  
catum os 115 b  
ξιφοεδῆς cartilago 207  
b



ξιφοεδῆς cartilago ab  
infima pectoris ossis sede edu-  
cta 115 b



Y  
Αλοεδῆς dictus humor  
802 a  
ιδαντοεδῆς, Latinis a-  
queus, uel albugine-  
us dictus humor 805 a

v referentis ossis figura 69 a. 207 a  
769 a  
ισοεδῆς os ibid. b  
ιπιῦν 290 b  
ιπιῶν tunica Græcis dicta, quæ  
709 b  
ιφιῶν os 69 b. 207 a  
ιφιῶν futura 206 a.



Z  
Eudech 206 a  
Ziphac & Zimphac  
591 a  
Zirbus 602 b  
ζιρῶν ossa 206 b  
ibid. b

FINIS.

## SERIES CHARTARVM,

a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u x y z A B C D E F G H I K L M N O  
P Q R S T V X Y Z. aa bb cc dd ee ff gg hh ii kk ll mm nn oo pp qq rr  
ss tt uu xx yy zz Aa Bb Cc Dd Ee

Omnes terniones; præter X, semiternionem : & bb, Aa, quaterniones. Cæterum in X,  
uenarum & arteriarum typo, obseruabis ideo semifolium iniectum, ut ex imaginibus ipsi im-  
pressis, uariæ portiuncula; ipsi typo suis quæq; locis committi queant. Sic & bb, pro-  
pter influendam ante initium Libri V. Nuerorum figuram,  
quaternio efficitur.

BASILEAE, EX OFFICI-  
NA IOANNIS OPORINI, AN-  
no Salutis per CHRISTVM parte M D L V.  
Mense Augusto.